

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №4 (24)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 4 (24)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-va-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очилов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ НИЗКОИНТЕНСИВНОЙ ЛАЗЕРНОЙ ТЕРАПИИ (НИЛИ) ПРИ ЛЁГКОМ ОСТРОМ ПАНКРЕАТИТЕ**Акбаров М.М.^{1,2}, Султанов А.И.³, Мардонов Ж.Н.^{1,2}**¹ГУ «Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр хирургии им. акад. В. Вахидова», г. Ташкент, Узбекистан²Ташкентский государственный медицинский университет, г. Ташкент, Узбекистан³«Центральная клиническая больница №1 Главного медицинского управления при Администрации Президента Республики Узбекистан», г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. Цель исследования. Оценить влияние низкоинтенсивного лазерного излучения (НИЛИ) на клиническое течение и исходы лёгкого острого панкреатита. Материал и методы. Обследованы 60 пациентов с лёгким острым панкреатитом, рандомизированных на 2 группы: стандартное лечение ($n=30$) и стандартное лечение + НИЛИ ($n=30$). Лазерная терапия проводилась ежедневно курсом 5 дней. Результаты. У пациентов, получавших НИЛИ, купирование лихорадки происходило быстрее, восстановление перистальтики - на $2,4 \pm 0,5$ день против $3,6 \pm 0,6$ ($p < 0,05$). Интенсивность боли снижалась более выраженно уже в первые 48 часов терапии. На 3-и сутки уровень амилазы составил $125,3 \pm 11,5$ Ед/л против $356,4 \pm 24,1$ ($p < 0,001$), С-реактивного белка - $15,8 \pm 2,1$ мг/л против $36,2 \pm 3,8$ ($p < 0,001$), прокальцитонина - $0,07 \pm 0,01$ против $0,16 \pm 0,03$ нг/мл ($p = 0,005$). Также быстрее нормализовались билирубин ($15,1$ против $21,3$ мкмоль/л; $p = 0,002$), лейкоциты ($6,6$ против $8,1 \times 10^9$ /л; $p = 0,004$), показатели АЛТ и АСТ ($p = 0,001$). Частота санационных лапароскопий была значительно ниже, как и потребность в экстренных вмешательствах. Средняя длительность госпитализации сократилась до $3,8 \pm 0,3$ суток. При годичном наблюдении рецидив отмечен лишь у 6,7% пациентов основной группы против 23,3% в контрольной ($p < 0,05$). Заключение. Применение НИЛИ у пациентов с лёгким острым панкреатитом обеспечивает ускоренное купирование симптомов, снижение маркёров воспаления, уменьшение частоты хирургических вмешательств и рецидивов. Методика может рассматриваться как эффективное дополнение к стандартным протоколам терапии.

Ключевые слова: острый панкреатит; низкоинтенсивное лазерное излучение; воспаление; клиническая эффективность; рецидив.

CLINICAL EFFICACY OF LOW-INTENSITY LASER THERAPY (LILT) IN MILD ACUTE PANCREATITIS**Akbarov M.M.^{1,2}, Sultanov A.I.³, Mardonov J.N.^{1,2}**¹Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Surgery named after Academician V. Vakhidov, Tashkent, Uzbekistan²Tashkent State Medical University, Tashkent, Uzbekistan³Central Clinical Hospital No. 1 of the Main Medical Department of the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan, Tashkent, Uzbekistan

Resume. Objective. To evaluate the effect of low-intensity laser irradiation (LILI) on the clinical course and outcomes of mild acute pancreatitis. Material and Methods. Sixty patients with mild acute pancreatitis were randomized into two groups: standard treatment ($n=30$) and standard treatment plus LILI ($n=30$). Laser therapy was administered daily for a course of 5 days. Results. In patients receiving LILI, fever resolved faster, and peristalsis was restored on day 2.4 ± 0.5 vs. 3.6 ± 0.6 ($p < 0.05$). Pain intensity decreased more significantly within the first 48 hours of therapy. On day 3, amylase levels were 125.3 ± 11.5 U/L vs. 356.4 ± 24.1 ($p < 0.001$), C-reactive protein was 15.8 ± 2.1 mg/L vs. 36.2 ± 3.8 ($p < 0.001$), and procalcitonin was 0.07 ± 0.01 vs. 0.16 ± 0.03 ng/mL ($p = 0.005$). Bilirubin (15.1 vs. 21.3 μ mol/L; $p = 0.002$), leukocytes (6.6 vs. 8.1×10^9 /L; $p = 0.004$), and ALT and AST levels ($p = 0.001$) also normalized more quickly. The incidence of debridement laparoscopy was significantly lower, as was the need for emergency interventions. The mean length of hospital stay was reduced to 3.8 ± 0.3 days. At one-year follow-up, recurrence was observed in only 6.7% of patients in the study group versus 23.3% in the control group ($p < 0.05$). Conclusion. The use of LILI in patients with mild acute pancreatitis leads to faster symptom resolution, a decrease in inflammatory markers, and a reduced incidence of surgical interventions and recurrences. This method can be considered an effective adjunct to standard therapy protocols.

Keywords: acute pancreatitis; low-intensity laser irradiation; inflammation; clinical efficacy; recurrence.

ЕНГИЛ ЎТКИР ПАНКРЕАТИТДА ПАСТ ИНТЕНСИВЛИКДАГИ ЛАЗЕР ТЕРАПИЯСИНИНГ (ПИЛТ) КЛИНИК САМАРАДОРЛИГИ

Акбаров М.М.^{1,2}, Султанов А.И.³, Мардонов Ж.Н.^{1,2}

¹“Академик В.Вохидов номидаги Республика ихтисослаштирилган хирургия илмий - амалий тиббиёт маркази” ДМ, Тошкент ш., Ўзбекистон

²Тошкент давлат тиббиёт университети, Тошкент ш., Ўзбекистон

³Ўзбекистон Республикаси президенти администрацияси ҳузуридаги тиббиёт бош бошқармасининг 1-сонли марказий клиник шифохонаси, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. Тадқиқот мақсади: ўткир панкреатитнинг енгил кечишида ва унинг оқибатларига паст интенсивликдаги лазер нурланишининг (ПИЛН) таъсирини баҳолаш. Материаллар ва усуллар. Ўткир панкреатитнинг енгил шакли билан касалланган 60 нафар бемор текиштирилиб, улар икки гуруҳга рандомизация қилинди: стандарт даволаш ($n=30$) ва стандарт даволаш + ПИЛН ($n=30$). Лазеротерапия 5 кунлик курс билан ҳар куни ўтказилди. Натижалар. ПИЛН олган беморларда иситманинг бартараф этилиши тезроқ кузатилди, перисталтика эса $2,4 \pm 0,5$ кунда тикланди (назорат гуруҳида $3,6 \pm 0,6$ кун; $p < 0,05$). Оғриқ интенсивлиги даволашнинг дастлабки 48 соатидаёқ анча сезиларли даражада пасайди. Учинчи суткада амилаза даражаси $125,3 \pm 11,5$ бирлик/л ни (назорат гуруҳида $356,4 \pm 24,1$; $p < 0,001$), С-реактив оқсил - $15,8 \pm 2,1$ мг/л ни (назорат гуруҳида $36,2 \pm 3,8$; $p < 0,001$), прокальцитонин - $0,07 \pm 0,01$ нг/мл ни (назорат гуруҳида $0,16 \pm 0,03$; $p = 0,005$) ташиқил этди. Шунингдек, билирубин ($15,1$, назоратда $21,3$ мкмол/л; $p = 0,002$), лейкоцитлар ($6,6$, назоратда $8,1 \times 10^9$ /л; $p = 0,004$), АЛТ ва АСТ кўрсаткичлари ($p = 0,001$) тезроқ меъёрлашди. Шошилишч аралашувларга бўлган эҳтиёж каби, санацион лапароскопиялар частотаси ҳам анча паст бўлди. Шифохонада ётишнинг ўртача давомийлиги $3,8 \pm 0,3$ суткагача қисқарди. Бир йиллик кузатув натижасида касаллик қайталаниши асосий гуруҳ беморларининг атиги $6,7$ фоизда, назорат гуруҳида эса $23,3$ фоизда қайд этилди ($p < 0,05$). Хулоса. Ўткир панкреатитнинг енгил шакли билан касалланган беморларда ПИЛН қўлланилиши симптомларнинг тезроқ бартараф этилишини, яллиғланиш маркерларининг пасайишини, жарроҳлик аралашувлари ва касаллик қайталанишлари частотасининг камайишини таъминлайди. Ушбу усулни стандарт даволаш протоколларига самарали қўшимча сифатида кўриб чиқиш мумкин.

Калит сўзлар: ўткир панкреатит; паст интенсивликдаги лазер нурланиши; яллиғланиш; клиник самарадорлик; рецидив.

e-mail: doctor_jamshid@inbox.ru

Введение. Острый панкреатит (ОП) остаётся одной из наиболее актуальных проблем современной гастроэнтерологии и интенсивной терапии. Несмотря на достижения последних десятилетий, включая стандартизированные диагностические и лечебные алгоритмы, частота осложнённых форм заболевания и летальность при деструктивном панкреатите сохраняются высокими. Патогенез ОП характеризуется ранней внутриклеточной активацией протеаз, развитием системного воспалительного ответа и полиорганной недостаточности [1]. Международные клинические рекомендации подчёркивают необходимость комплексного подхода, включающего адекватную инфузионную терапию, нутритивную поддержку и контроль инфекционных осложнений [2].

В последние годы внимание исследователей привлекают методы адьювантной терапии, направленные на модуляцию воспалительного ответа и коррекцию микроциркуляторных нарушений. Одним из таких методов является низкоинтенсивное лазерное излучение (НИЛИ), обладающее противовоспалительным, анальгетическим и антиоксидантным эффектами [3]. Экспериментальные и клинические работы показали, что внутривенное лазерное облучение крови, а также локальное воздействие на проекции поджелудочной железы способствуют ускоренному купированию болевого синдрома, снижению ферментемии и воспалительных маркёров [4]. Зарубежные исследования указывают, что комбинация антиоксидантной терапии (например, мексидола) с НИЛИ способна воздействовать на ключевые звенья патогенеза ОП, улучшая прогноз заболевания [4].

Таким образом, изучение роли НИЛИ в комплексной терапии острого панкреатита представляет собой перспективное направление, требующее клинической верификации и сопоставления с международными стандартами лечения.

Цель исследования. Оценить клиническую эффективность низкоинтенсивной лазерной терапии (НИЛИ) в составе стандартного лечения пациентов с лёгким острым панкреатитом на основании динамики болевого синдрома, лабораторных маркёров воспаления и потребности в инвазивных вмешательствах.

Материал и методы. Исследование выполнено в 2020-2024 гг. на базе РСНПМЦХ им. акад. В. Вахидова и ЦКБ №1 ГМУ. Включено 60 пациентов с лёгким острым панкреатитом (по классификации Атланта-2012), госпитализированных в первые 48 часов от начала заболевания (табл. 1).

Пациенты рандомизированы на 2 группы:

- **Основная группа (n=30):** стандартная терапия (инфузии, анальгезия, ингибиторы секреции) + низкоинтенсивная лазерная терапия (НИЛИ);
- **Группа сравнения (n=30):** стандартное лечение без НИЛИ.

Таблица 1.

Распределение больных по полу и возрасту

	п	%
Мужчины	33	55,0%
Женщины	27	45,0%
Средний возраст	52,7±1,76 (от 27 до 74 лет)	
20-44 года	18	30,0%
45-59 лет	14	23,3%
60-74 года	28	46,7%

При поступлении у всех пациентов подтверждена лёгкая степень заболевания: средний балл по шкале Ranson составил 1,3, по APACHE II - 5,6, по Marshall - 1, что свидетельствовало об отсутствии органной недостаточности (табл. 2).

Таблица 2.

Оценка состояния (Ranson, Marshal, APACHE II) при формировании окончательного диагноза

Шкала оценки	Средний балл	Диапазон (min-max)
Ranson	1,3	0-2
APACHE II	5,6	2-10
Marshall	1	0-2

Критерии включения: возраст 18-75 лет, лёгкий ОП, информированное согласие.

Критерии исключения: органная недостаточность (Marshall ≥ 2), панкреонекроз, поздняя госпитализация (>72 ч), декомпенсированные сопутствующие заболевания, беременность, фоточувствительность.

Методика НИЛИ: аппараты «Мустанг»/«Милта», инфракрасный диапазон ($\lambda \approx 890$ нм), мощность 5-10 мВт, частота 1000 Гц, воздействие 10-15 минут, 1-2 раза в сутки, курс 5 дней.

Критерии оценки:

- клинические: интенсивность боли (ВАШ), длительность лихорадки, сроки восстановления перистальтики;
- лабораторные: амилаза, С-реактивный белок, прокальцитонин, билирубин, лейкоциты;
- лечебные исходы: частота санационных лапароскопий, лапароскопической холецистэктомии, ЭРПХГ, продолжительность госпитализации.

Лечение: Все пациенты получали стандартную терапию, включавшую инфузионную терапию, анальгезию, спазмолитики, ингибиторы панкреатической секреции и динамический мониторинг. В основной группе дополнительно проводилась низкоинтенсивная лазерная терапия: чрескожное воздействие инфракрасным излучением (аппараты «Мустанг» или «Милта», $\lambda \approx 890$ нм, мощность 5-10 мВт, модуляция 1000 Гц, длительность сеанса 10-15 минут, кратность 1-2 раза в сутки, курс - 5 дней).

Статистика: нормальность проверялась критерием Шапиро-Уилка; использовались t-критерий Стьюдента или U-критерий Манна-Уитни для количественных данных, χ^2 или точный критерий Фишера для категориальных; $p < 0,05$ считалось значимым.

Результаты. В основной группе сохранялась Лихорадка в течение $1,1 \pm 0,6$ суток в основной группе и $1,5 \pm 0,9$ суток в группе сравнения ($p = 0,002$). В основной группе восстановление кишечной перистальтики происходило на $2,4 \pm 0,5$ день, в группе сравнения - на $3,6 \pm 0,6$ день ($p < 0,05$).

Продолжительность госпитализации: в основной группе - $3,8 \pm 0,3$ суток; в группе сравнения - $4,6 \pm 0,2$ суток ($p = 0,034$). Нежелательных реакций на лазерную терапию не зарегистрировано.

В начале наблюдения, на момент поступления в стационар, лабораторные показатели у пациентов обеих групп были клинически сопоставимы, что подтверждается отсутствием статистически значимых различий по всем анализируемым параметрам ($p > 0,05$). Уровень амилазы составил $969,4 \pm 18,6$

Ед/л (818,1-1161,4) в группе сравнения и 962,5±24,5 Ед/л (810,3-1155,2) в основной группе (p=0,922), что соответствует диагностическим критериям острого панкреатита. Высокие значения С-реактивного белка (СРБ) - 189,5±5,47 мг/л (136,1-247,6) и 191,7±7,6 мг/л (132,4-251,3) соответственно (p=0,938) - также указывают на выраженный воспалительный процесс. Показатели прокальцитонина (0,58±0,03 нг/мл в группе сравнения и 0,56±0,04 нг/мл в основной группе; p=0,799) не демонстрировали признаков септического состояния. Число лейкоцитов в крови составило 13,9±0,33×10⁹/л (11,2-16,5) и 13,6±0,4×10⁹/л (10,1-17,2) соответственно (p=0,778), также не выявлено достоверной разницы.

Уровень общего билирубина был несколько повышен в обеих группах: 52,6±6,3 мкмоль/л (16,4-90,1) и 55,4±6,2 мкмоль/л (17,2-99,3) соответственно (p=0,794). Концентрация мочевины составила 8,2±0,22 ммоль/л (5,3-9,8) в группе сравнения и 7,6±0,24 ммоль/л (5,7-9,4) в основной группе (p=0,445), а уровень креатинина - 99,8±2,7 мкмоль/л (74,2-121,3) и 101,3±2,6 мкмоль/л (76,5-126,4), соответственно (p=0,909).

Показатели общего белка также не различались статистически значимо: 63,1±0,8 г/л (53,9-67,9) против 61,3±0,66 г/л (54,2-68,1), p=0,605. Активность печеночных трансаминаз (АЛТ и АСТ) была умеренно повышена, однако достоверной разницы между группами не наблюдалось: АЛТ - 109,2±4,0 Ед/л (89,5-149,9) и 116,4±4,13 Ед/л (86,2-146,7), p=0,631; АСТ - 102,5±3,2 Ед/л.

Таким образом, все пациенты соответствовали критериям лёгкого (интерстициального) панкреатита, что позволило рассматривать применение немедикаментозных и физиотерапевтических методов, включая НИЛИ, в рамках комплексной терапии.

На первые сутки лечения (табл. 3) в обеих группах наблюдается снижение амилазы, однако в основной группе это снижение оказалось более выраженным: 655,2±33,8 Ед/л против 805,7±44,2 Ед/л (p=0,009).

Таблица 3

Сравнительная динамика лабораторных показателей на 1-е сутки лечения у пациентов с лёгким ОП

День 1	Группа сравнения (n=30)	Основная группа (n=30)	p
Амилаза, Ед/л	805,7±44,2 (658,3 - 955,1)	655,2±33,8 (510,7 - 795,3)	0,009
Лейкоциты, 10 ⁹ /л	11,6±0,6 (8,6 - 14,6)	10,2±0,5 (7,3 - 13,1)	0,078
СРБ, мг/л	131,4±14,6 (91,2 - 171,8)	102,3±11,8 (62,7 - 142,5)	0,127
Общий билирубин, мкмоль/л	42,6±5,9 (15,6 - 75,7)	39,3±4,8 (14,1 - 64,2)	0,488
Прокальцитонин, нг/мл	0,43±0,05 (0,23 - 0,63)	0,31±0,04 (0,11 - 0,52)	0,062
Мочевина, ммоль/л	7,1 ± 0,5 (5,1 - 9,1)	6,7±0,4 (4,8 - 8,6)	0,534
Креатинин, мкмоль/л	96,5±8,8 (72,1 - 122,4)	91,2±7,9 (67,3 - 116,8)	0,655
Общий белок, г/л	62,3±2,2 (56,2 - 68,2)	63,2±2,1 (57,4 - 69,3)	0,768
АЛТ, Ед/л	96,3±8,9 (71,1 - 121,7)	81,7±7,8 (56,3 - 106,5)	0,191
АСТ, Ед/л	86,2±7,9 (61,4 - 111,3)	71,5±6,9 (46,2 - 96,3)	0,167

Лейкоцитарная реакция также ослабевает - до 10,2×10⁹/л в основной группе против 11,6×10⁹/л в группе сравнения (p=0,078). Показатели прокальцитонина снизились до 0,31 нг/мл и 0,43 нг/мл соответственно (p=0,062), что говорит о начавшемся снижении системного воспаления. Несмотря на то что большинство различий пока не достигают статистической значимости, положительная динамика в основной группе уже отчетливо прослеживается.

На вторые сутки (табл. 4) тенденция становится более явной.

Уровень амилазы в основной группе снизился почти вдвое по сравнению с группой сравнения - 305,8±19,2 Ед/л против 558,2±29,7 Ед/л (p<0,001). СРБ также значительно ниже: 41,5±4,8 мг/л против 71,8±7,9 мг/л (p=0,002). Уровень лейкоцитов составил 8,1±0,4×10⁹/л в основной группе, что достоверно ниже, чем в группе сравнения (9,6±0,5×10⁹/л, p=0,022).

Прокальцитонин снизился до 0,16±0,02 нг/мл в основной группе, тогда как в группе сравнения он составил 0,29±0,04 нг/мл (p=0,005). Активность печеночных ферментов (АЛТ и АСТ) также статистически значимо ниже в основной группе. Таким образом, к этому времени эффект НИЛИ становится отчетливо выраженным: регресс воспаления и ферментной активности приобрёл достоверный характер (табл. 4).

Таблица 4

Сравнительная динамика лабораторных показателей на 2-е сутки лечения у пациентов с лёгким ОП

День 2	Группа сравнения (n=30)	Основная группа (n=30)	p
Амилаза, Ед/л	558,2±29,7 (452,6 - 655,3)	305,8±19,2 (210,4 - 395,1)	<0,001
Лейкоциты, 10 ⁹ /л	9,6±0,5 (7,6 - 11,7)	8,1±0,4 (6,2 - 10,3)	0,022
СРБ, мг/л	71,8±7,9 (41,5 - 101,3)	41,5±4,8 (21,2 - 61,9)	0,002
Общий билирубин, мкмоль/л	28,1±2,6 (13,1 - 53,2)	21,1±2,3 (11,4 - 41,5)	0,048
Прокальцитонин, нг/мл	0,29±0,04 (0,15 - 0,43)	0,16±0,02 (0,06 - 0,27)	0,005
Мочевина, ммоль/л	6,6±0,4 (4,8 - 8,4)	5,9±0,3 (4,1 - 7,7)	0,167
Креатинин, мкмоль/л	90,8±7,7 (69,3 - 113,1)	83,5±6,7 (61,2 - 106,3)	0,477
Общий белок, г/л	63,7±2,0 (57,8 - 69,7)	65,4±1,9 (59,1 - 71,2)	0,54
АЛТ, Ед/л	71,4±6,8 (51,2 - 91,9)	51,2±5,3 (31,4 - 71,8)	0,022
АСТ, Ед/л	61,1±5,9 (41,3 - 81,5)	46,3±4,2 (26,7 - 66,5)	0,045

На третьи сутки лечения (табл. 5) улучшения в основной группе приобретают многопараметрический и статистически значимый характер. Уровень амилазы в основной группе снизился до 125,3±11,5 Ед/л, в то время как в группе сравнения он составил 356,4±24,1 Ед/л ($p<0,001$). Уровень СРБ в основной группе достиг 15,8±2,1 мг/л против 36,2±3,8 мг/л в сравнительной ($p<0,001$), что указывает на практически завершённый острый воспалительный процесс. Прокальцитонин снизился до 0,07±0,01 нг/мл в основной группе и 0,16±0,03 нг/мл в контрольной ($p=0,005$). АЛТ и АСТ в основной группе составили 30,9±3,1 и 28,7±2,4 Ед/л соответственно, что достоверно ниже значений в группе сравнения (50,8±4,9 и 45,7±4,1 Ед/л; $p=0,001$ по обоим параметрам).

Таблица 5

Сравнительная динамика лабораторных показателей на 3-и сутки лечения у пациентов с лёгким ОП

День 3	Группа сравнения (n=30)	Основная группа (n=30)	p
Амилаза, Ед/л	356,4±24,1 (285,2 - 425,8)	125,3±11,5 (85,1 - 165,8)	<0,001
Лейкоциты, 10 ⁹ /л	8,1±0,4 (6,6 - 9,7)	6,6±0,3 (5,1 - 8,2)	0,004
СРБ, мг/л	36,2±3,8 (16,1 - 56,7)	15,8±2,1 (5,4 - 26,3)	<0,001
Общий билирубин, мкмоль/л	21,3±1,5 (11,6 - 42,7)	15,1±1,2 (9,2 - 29,4)	0,002
Прокальцитонин, нг/мл	0,16±0,03 (0,09 - 0,23)	0,07±0,01 (0,03 - 0,13)	0,005
Мочевина, ммоль/л	6,1±0,3 (4,6 - 7,6)	5,1±0,2 (3,6 - 6,7)	0,007
Креатинин, мкмоль/л	85,6±6,9 (66,2 - 106,5)	76,4±5,8 (56,1 - 97,2)	0,312
Общий белок, г/л	65,2±1,7 (59,3 - 71,3)	67,3±1,6 (61,5 - 73,4)	0,374
АЛТ, Ед/л	50,8±4,9 (36,3 - 66,1)	30,9±3,1 (16,7 - 46,2)	0,001
АСТ, Ед/л	45,7±4,1 (31,2 - 61,4)	28,7±2,4 (18,3 - 41,1)	0,001

Также отмечено статистически значимое снижение лейкоцитов (6,6 против $8,1 \times 10^9$ /л; $p=0,004$) и общего билирубина (15,1 против 21,3 мкмоль/л; $p=0,002$).

Обсуждение. Результаты нашего исследования подтверждают значимость включения НИЛИ в комплексное лечение лёгкого ОП, что согласуется с рядом международных и региональных исследований. Forsmark и соавт. (2016) указывают, что течение и исходы ОП во многом определяются выраженностью системного воспалительного ответа и нарушениями микроциркуляции [1]. Наши данные о более быстром снижении уровня амилазы и С-реактивного белка при использовании НИЛИ соответствуют этим патогенетическим положениям.

Клинические рекомендации (Banks и Freeman, 2006; Greenberg et al., 2016) подчёркивают отсутствие специфических патогенетических методов лечения ОП, кроме базовой терапии [2,3]. В этой связи включение НИЛИ представляется перспективным адъювантным подходом, способным воздействовать на ключевые механизмы воспаления.

Отечественные данные Parzyan и Geinits (2001) демонстрируют, что НИЛИ в сочетании с антиоксидантной терапией снижает выраженность ферментативной токсемии и улучшает клинические исходы [4]. Urmantseva и соавт. (2019) также показали положительное влияние НИЛИ при хрониче-

ском панкреатите в отношении купирования боли и нормализации лабораторных показателей [5]. Это перекликается с нашими результатами, полученными у пациентов с острым процессом.

Дополнительно, Greenberg и соавт. (2016) отмечают, что контроль воспалительного ответа остаётся ключевой задачей в лечении ОП [3], а исследования Yadav и Lowenfels (2013) подтверждают рост глобальной заболеваемости панкреатитом и необходимость поиска новых терапевтических стратегий [6].

Зарубежные работы (например, рабочая группа IAP/APA, 2013; Tenner et al., 2013) подчёркивают важность внедрения методов, способных ограничивать системное воспаление и полиорганную дисфункцию [7,8]. На этом фоне применение НИЛИ как части комплексной терапии является патогенетически обоснованным и соответствует современным тенденциям индивидуализации лечения.

Таким образом, использование НИЛИ обеспечивает ускоренное купирование воспаления, стабилизацию клинического состояния и снижение потребности в инвазивных вмешательствах. Полученные результаты подтверждают необходимость дальнейших многоцентровых рандомизированных исследований для уточнения оптимальных параметров лазерного воздействия и оценки долгосрочных исходов.

Заключение. В госпитальный период у пациентов основной группы, получавших НИЛИ, отмечены более благоприятные показатели: лихорадка купировалась за $1,1 \pm 0,6$ суток против $1,5 \pm 0,9$ ($p=0,002$), перистальтика восстанавливалась на $2,4 \pm 0,5$ день против $3,6 \pm 0,6$ ($p<0,05$). Уже с первых суток зафиксировано более выраженное снижение воспаления и ферментемии: на 3-и сутки уровень амилазы составил $125,3 \pm 11,5$ против $356,4 \pm 24,1$ Ед/л ($p<0,001$), СРБ - $15,8 \pm 2,1$ против $36,2 \pm 3,8$ мг/л ($p<0,001$), прокальцитонин - $0,07 \pm 0,01$ против $0,16 \pm 0,03$ нг/мл ($p=0,005$). Также быстрее нормализовались лейкоциты ($6,6$ по сравнению с $8,1 \times 10^9$ /л; $p=0,004$), билирубин ($15,1$ по сравнению с $21,3$ мкмоль/л; $p=0,002$), АЛТ и АСТ ($p=0,001$), что подтверждает эффективность НИЛИ в ускоренном купировании воспаления и стабилизации состояния.

Список литературы:

1. Banks, P. A., & Freeman, M. L. (2006). Practice guidelines in acute pancreatitis. *American Journal of Gastroenterology*, 101(10), 2379-2400. <https://doi.org/10.1111/j.1572-0241.2006.00856.x>
2. Forsmark, C. E., Vege, S. S., & Wilcox, C. M. (2016). Acute pancreatitis. *New England Journal of Medicine*, 375(20), 1972-1981. <https://doi.org/10.1056/NEJMr1505202>
3. Greenberg, J. A., Hsu, J., Bawazeer, M., Marshall, J., Friedrich, J. O., Nathens, A., Coburn, N. G., May, G. R., Pearsall, E., McLeod, R. S., & other members of the University of Toronto Acute Pancreatitis Guideline Group. (2016). Clinical practice guideline: management of acute pancreatitis. *Canadian Journal of Surgery*, 59(2), 128-140. <https://doi.org/10.1503/cjs.015015>
4. Парзян, А. Г., & Геинитс, А. В. (2001). Низкоинтенсивное лазерное излучение в комплексном лечении панкреатита [Low-intensity laser radiation in the complex treatment of pancreatitis]. *Вестник Хирургии имени И.И.Грекова*, 160(1), 42-46.
5. Урманцева, В. Д., & Ключков, А. С. (2019). Опыт применения низкоинтенсивного лазерного излучения в комплексной терапии при хроническом панкреатите на примере работников сельского хозяйства [Experience of low-intensity laser therapy in complex treatment of chronic pancreatitis among agricultural workers]. *Вестник Новых Медицинских Технологий*, 26(3), 95-101. <https://doi.org/10.24411/1609-2163-2019-16308>
6. Working Group IAP/APA. (2013). IAP/APA evidence-based guidelines for the management of acute pancreatitis. *Pancreatology*, 13(4 Suppl 2), e1-e15. <https://doi.org/10.1016/j.pan.2013.07.063>
7. Tenner, S., Baillie, J., DeWitt, J., & Vege, S. S. (2013). American College of Gastroenterology guideline: Management of acute pancreatitis. *American Journal of Gastroenterology*, 108(9), 1400-1415. <https://doi.org/10.1038/ajg.2013.218>
8. Yadav, D., & Lowenfels, A. B. (2013). The epidemiology of pancreatitis and pancreatic cancer. *Gastroenterology*, 144(6), 1252-1261. <https://doi.org/10.1053/j.gastro.2013.01.068>

Для цитирования: Акбаров М.М., Султанов А.И., Мардонов Ж.Н. Клиническая эффективность низкоинтенсивной лазерной терапии (НИЛИ) при лёгком остром панкреатите // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 4(24). – С. 3–8. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19414386>

ҚОҒОНОҚ ПАРДАНИНГ ТУҒРУҚЧА ҲАВАЛАЛАШТИРИШНИНГ НЕОНАТАЛ НАТИЖАЛАРИ**Исматова Л.М., Индиаминова Г.Н.**

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Қоғоноқ пардасининг туғруқча муддатидан олдин ҲАВАЛАЛАШТИРИШ (PROM) ҳомила учун асосий биологик ҳимоя тўсигининг йўқолиши бўлиб, неонатал даврда жиддий асоратлар хавфини оширади. Ушбу ҳолатда "сувсиз давр"нинг давомийлиги чақалоқларда неонатал сепсис, респиратор дистресс синдроми ва туғруқдан кейинги бошқа инфекция-яллигланиш жараёнларининг ривожланишига бевосита таъсир кўрсатади. Тадқиқотда қоғоноқ сувлари эрта кетишининг чала туғилиши ва неонатал ўлим кўрсаткичлари билан боғлиқлиги таърифланган. Натижалар неонатал асоратларни камайтириш учун профилактик антибактериал терапия ва туғруқни бошқариш тактикаларини оптималлаштириш зарурлигини кўрсатади.

Калим сўзлар: қоғоноқ пардаси, неонатал асоратлар, сувсиз давр, сепсис, чала туғилиш, перинатал хавф.

NEONATAL OUTCOMES OF PREMATURE RUPTURE OF MEMBRANES**Ismatova L.M., Indiaminova G.N.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Premature rupture of membranes (PROM) before the onset of labor represents the loss of the primary biological protective barrier for the fetus, significantly increasing the risk of serious neonatal complications. In this context, the duration of the "latency period" (anhydrous period) directly influences the development of neonatal sepsis, respiratory distress syndrome, and other postpartum infectious and inflammatory processes in newborns. This study describes the correlation between the early rupture of amniotic fluid and rates of preterm birth and neonatal mortality. The findings emphasize the necessity of optimizing delivery management strategies and implementing preventive antibacterial therapy to reduce neonatal morbidity.

Keywords: fetal membranes, neonatal outcomes, latency period, sepsis, preterm birth, perinatal risk.

НЕОНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ РАЗРЫВА ПЛОДНЫХ ОБОЛОЧЕК ДО НАЧАЛА РОДОВ**Исматова Л.М., Индиаминова Г.Н.**

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Преждевременный разрыв плодных оболочек (ПРПО) до начала родовой деятельности представляет собой утрату основного биологического защитного барьера плода, что значительно повышает риск серьезных неонатальных осложнений. В данной ситуации продолжительность «безводного периода» напрямую влияет на развитие неонатального сепсиса, респираторного дистресс-синдрома и других инфекционно-воспалительных процессов у новорожденных в послеродовом периоде. В исследовании описывается связь раннего излития околоплодных вод с показателями преждевременных родов и неонатальной смертности. Результаты указывают на необходимость оптимизации тактики ведения родов и проведения профилактической антибактериальной терапии для снижения неонатальных осложнений.

Ключевые слова: плодные оболочки, неонатальные осложнения, безводный период, сепсис, преждевременные роды, перинатальный риск.

e-mail: latofatismatova08@gmail.com, gulrukhindiaminova@gmail.com

Қоғоноқ пардасининг туғруқча муддатидан олдин ҲАВАЛАЛАШТИРИШ замонавий акушерлик ва перинатологиянинг энг мураккаб ҳамда ечими тўлиқ топилмаган муаммоларидан бири бўлиб қолмоқда. Статистик маълумотларга кўра, қоғоноқ пардани туғруқча ҲАВАЛАЛАШТИРИШ барча ҳомиладорликларнинг 8–10 фоизига, муддатига етмаган ҳомиладорликларнинг эса 30–40 фоизига учрайди. Ушбу ҳолат неонатал касалланиш ва ўлим кўрсаткичларининг юқорилиги билан бевосита боғлиқдир.

Қоғоноқ пардаси ҳомила ва ташқи муҳит ўртасидаги механик ва биологик тўсиқ ҳисобланади. Унинг ҲАВАЛАЛАШТИРИШ натижасида ҳомила атрофидаги стериллик бузилади, бу эса ўз навбатида асаб,

нафас ва қон айланиш тизимларининг шаклланишига салбий таъсир кўрсатади. Сувсиз даврнинг узайиши инфекцияларнинг ҳомилага кўтарилувчи йўл билан ўтишига шароит яратади. Қоғонок пардани туғруққача йиртилишининг неонатал натижалари кўп қиррали бўлиб, улар қуйидагиларни ўз ичига олади:

Неонатал сепсис: инфекцияланиш хавфи сувсиз давр 18–24 соатдан ошганда кескин ортади.

Респиратор дистресс синдроми (RDS): айниқса муддатидан олдин йиртилиш ҳолатларида ўпка сурфактант тизимининг етишмаслиги асосий муаммо ҳисобланади.

Гипоксик-ишемик зарарланишлар: қоғонок сувлари камайиши (олигогидрамнион) киндик тизимасининг қисилиб қолишига ва ҳомила гипоксиясига олиб келиши мумкин.

Қоғонок суви — она қорнидаги ҳомилани ўраб турадиган суюқлик. Ҳомилани ташқи таъсиротлардан ҳимоя қилиб, унинг тўғри ўсишини таъминлайди. Қоғонок суви физиологик аҳамиятга эга, у ҳомиланинг қимирлашига қулайлик яратади, унга кислород ва озик моддалар етказиб туради; ҳомила киндигини сиқилиб қолишдан сақлайди, туғруқ вақтида бачадон бўйнининг нормал очилишига имкон беради. Туғруқ бошланишига қадар қоғонок сувининг кетиб қолиши анча хавфли, бунда ноҳуш оқибатлар юзага келиши мумкин. Бундай ҳолларда ҳомиладор аёлни туғруқхонага жўнатиш керак. Қоғонок сувида моддалар алмашинуви жараёнида ҳомила ажратадиган маҳсулотлар бўлади. Шунинг учун қоғонок суви таркибини ўрганиш акушерга ҳомиланинг аҳволи тўғрисида анча аниқ тасаввурга эга бўлиш ва зарур бўлганда унга ўз вақтида тегишли ёрдам кўрсатишга имкон беради. Ҳомиладорлик охирида сув миқдори 1 — 1,5 л га етади. Қоғонок сувининг нормадан кам бўлиши ҳомилада туғма нуқсонлар вужудга келишига, сув кўп бўлиши эса ҳомиладорлик ва туғиш даврида турли асоратлар (дард тутишининг суст бўлиши, қон кетиши ва бошқалар)га сабаб бўлади. Шунинг учун ҳомиладор аёлда кўп сувлик аломатлари сезилганда дарҳол туғруқхонага ётқизиб текшириш ва даволаш талаб этилади. Қоғонок пардани туғруққача йиртилиши перинатал даврда ҳомила ва янги туғилган чақалоқ учун жиддий асоратлар билан кечувчи патологик ҳолатдир.

Муддатидан олдин туғилиш, инфекцион асоратлар, гипоксия ва неонатал ўлим қоғонок пардани туғруққача йиртилишининг асосий перинатал натижалари ҳисобланади. Шу сабабли, қоғонок пардани туғруққача йиртилишини эрта аниқлаш, ҳомиладор аёлларни тўғри кузатиш ва замонавий перинатал ёрдамни ташкил этиш перинатал салбий натижаларни камайтиришда муҳим аҳамият касб этади.

Қоғонок пардани туғруққача йиртилиши ҳомиладорликнинг муддатига етган ва муддатидан олдинги даврларида учраши мумкин ҳамда она ва ҳомила саломатлиги учун турли даражадаги хавфларни келтириб чиқаради. Қоғонок пардани туғруққача йиртилиши перинатал касалланиш ва ўлим кўрсаткичларига сезиларли таъсир кўрсатиши сабабли, унинг перинатал натижаларини чуқур ўрганиш муҳим илмий-амалий аҳамиятга эга.

Қоғонок пардани туғруққача йиртилиши натижасида туғилган чақалоқларда қуйидаги ҳолатлар тез-тез учрайди: неонатал инфекциялар, неврологик бузилишлар, терморегуляция етишмовчилиги, узоқ муддатли реанимацион ёрдамга эҳтиёж. Ушбу асоратлар чақалоқнинг ҳаёт сифати ва келажақдаги ривожланишига салбий таъсир кўрсатиши мумкин.

ҚПТЙ нинг ҳомила учун перинатал натижалари; ҚПТЙ нинг энг кўп учрайдиган перинатал натижаларидан бири муддатидан олдин туғруқдир. Амниотик суюқликнинг камайиши бачадон деворининг қисқарувчанлигини кучайтиради ва туғруқ фаолиятининг эрта бошланишига олиб келади. Натижада, ҳомила етилишмаган ҳолда туғилиши мумкин.

Интраутерин инфекция ва неонатал сепсис. Қоғонок пардалар ёрилгач, бачадон ички муҳитига микроорганизмларнинг кириб бориши осонлашади. Бу ҳолат хориоамнионит, интраутерин инфекция ва туғилгандан сўнг неонатал сепсис ривожланиш хавфини оширади. Неонатал сепсис перинатал ўлимнинг асосий сабабларидан бири ҳисобланади.

Муддатига етган ҳомиладорликда (37 ҳафта ва ундан юқори) қоғонок пардасининг йиртилиши (ҚПМОЙ) кўпинча ижобий яқунланса-да, латент даврнинг (сув кетганидан туғруқ бошлангунча бўлган вақт) узайиши перинатал асоратлар хавфини экспоненциал равишда оширади.

Гипоксия ва асфиксия: Амниотик суюқликнинг камайиши киндик ичакчасининг сиқилишига олиб келиши мумкин. Бу эса ҳомилада сурункали ёки ўткир гипоксия, туғруқ вақтида эса асфиксия ривожланишига сабаб бўлади. Гипоксия марказий асаб тизими зарарланиши билан кечиши мумкин.

Паст вазн билан туғилиш: ҚПТЙ фонида ривожланган интраутерин гипоксия ва инфекция ҳомиланинг ўсишдан орқада қолишига олиб келади. Натижада чақалоқ паст тана вазни билан туғилади, бу эса неонатал даврда парвариш ва даволашни мураккаблаштиради. Инфекцион-яллиғланиш асоратлари: неонатал сепсис ва пневмония.

Муддатига етган ҳомиладорликда ҚПМОЙнинг энг хавфли перинатал оқибати бу вертикал трансмиссия орқали юқадиган инфекцияларнинг ривожланишидир. Эрта неонатал сепсис (ЕНС): тадқиқотлар шуни кўрсатадики, сув кетганидан кейин 18–24 соат ўтгач, неонатал сепсис хавфи 3 баробарга ортади (Gunn et al., *Epidemiology of Term PROM*, 2020).

Муддатига етган ҳомиладорликда (37 ҳафта ва ундан юқори) қоғонок пардасининг туғруққача йиртилиши (Term PROM) ҳолатларида энг асосий перинатал хавф омили — бу вертикал инфекцияланишидир. Парда бутунлиги бузилиши билан бачадон бўшлиғининг стериллиги йўқолади ва қин микрофлораси юқорига қараб (ascending infection) кўтарила бошлайди.

Ҳомила 37 ҳафталикдан ошган, яъни морфологик ва функционал жиҳатдан етилган бўлишига қарамай, қуйидаги хавфлар долзарблигича қолади:

1. Меконий муаммоси (яшил сувлар): 37 ҳафтадан кейин ҳомила ичаклари тўлиқ шаклланган бўлади. Агар сув кетганда у яшил рангда бўлса, бу ҳомила гипоксия (кислород етишмаслиги) туфайли бачадон ичида биринчи нажасини (меконий) чиқариб юборганини билдиради.

Хавф: бола туғилаётган пайтда бу ифлосланган сувни ўпкасига тортиб олиши мумкин (меконий аспирацияси синдроми). Бу янги туғилган чақалоқнинг нафас олишини қийинлаштиради ва интенсив терапияга муҳтож қилади.

2. Киндик ичагининг компрессияси: ҳомила атрофида суюқлик бўлмаганда, у ўз оғирлиги билан киндик ичагини босиб қўйиши мумкин. Натижада болага кислород ва озиқ моддалар етказиб бериш вақтинча тўхтайдиган бўлиши, бу эса ҳомила юрак уришининг пасайишига (деселерация) сабаб бўлади.

3. Туғруқнинг оғрикли кечиши: сув “ёстик” вазифасини бажаради. У йўқолганда, бачадон қисқаришлари (тўлғоқлар) бевосита болага ва бачадон бўйнига қаттиқроқ таъсир қилади, бу эса оғриқнинг кучлироқ сезилишига олиб келиши мумкин.

4. Гипоксия ва киндик ичагининг қисилиб қолиши: сув миқдори камайиши (олигогидрамнион) натижасида киндик ичаги ҳомила танаси ва бачадон девори орасида қисилиб қолиши мумкин. Бу ҳомиланинг ўткир кислород танқислигига олиб келади.

5. Чақалоқлар сепсиси ва пневмонияси: агар она организмида хориоамнионит ривожланса, ҳомила нафас олиш ёки ютиш орқали инфекцияланган қоғонок сувини қабул қилади. Бу туғилгандан сўнг оғир ўпка яллиғланишига сабаб бўлади.

6. Аспирация синдроми: сувсиз давр узоқ давом этса, ҳомила стресс ҳолатида меконий (илк ахлат) ажратиши ва уни ютиб юбориши мумкин.

Тиббий тактика ва профилактика. Замонавий протоколларга кўра, 37 ҳафтадан кейин сув кетса, икки хил тактика қўлланилади:

Кутиш тактикаси: (24 соатгача) туғруқнинг ўз-ўзидан бошланишини кутиш (агар инфекция белгилари бўлмаса).

Фаол тактика: туғруқни дори воситалари билан индукция қилиш (кўзғатиш).

Адабиётлар рўйхати:

1. Ahmed S., Al-Badr A. Antibiotic prophylaxis in PROM: A systematic review. *Journal of Clinical Medicine*. 2025;14(3):1022.
2. American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG). Prelabor Rupture of Membranes: ACOG Practice Bulletin, Number 217. *Obstet Gynecol*. 2020;135(3):e80-e97.
3. Asadov D.A., Negmatullaeva M.N. Modern approaches to the management of patients with premature rupture of membranes. *Journal of Reproductive Health and Medical Research*. 2024;5(1):12-18.
4. Bond DM, Middleton P, Levett KM, et al. Planned early delivery versus expectant management for women with preterm prelabour rupture of membranes prior to 37 weeks' gestation. *Cochrane Database Syst Rev*. 2024;3:CD004744.
5. Cunningham FG, Leveno KJ, Bloom SL, et al. *Williams Obstetrics*. 26th edition. New York: McGraw-Hill Education; 2022.
6. Elias S, Nguyen T, Gyamfi-Bannerman C. Neonatal outcomes after preterm premature rupture of membranes. *Seminars in Perinatology*. 2023;47(2):151703.
7. Goldenberg RL, Culhane JF, Iams JD, Romero R. Epidemiology and causes of preterm birth. *The Lancet*. 2021;371(9606):75-84. (Updated review 2024).
8. Karimov A.Kh., Ikramova X.S. Clinical significance of amniotic fluid index in PPRM. *Central Asian Journal of Medical Sciences*. 2024;10(2):88-94.
9. Khamidova N.R., Abdullaeva M.A. Neonatal complications in newborns from mothers with prolonged anhydrous period. *Samarkand Medical Journal*. 2025;3(2):45-51.
10. Lee J., et al. Respiratory distress syndrome in late preterm infants after PROM. *Journal of Perinatology*. 2024;44(2):189-195.

11. Mercer BM. Preterm premature rupture of the membranes. In: Resnik R, et al., editors. *Creasy and Resnik's Maternal-Fetal Medicine: Principles and Practice*. 9th ed. Elsevier; 2023.
12. Morales WJ. The effect of chorioamnionitis on the neurological outcome of the preterm infant. *Clinics in Perinatology*. 2022;49(3):651-662.
13. National Institute for Health and Care Excellence (NICE). Preterm labour and birth. NICE guideline [NG25]. London: NICE; 2022 (updated 2024).
14. O'Brien CM., et al. Long-term neurodevelopmental outcomes after PPRM. *Developmental Medicine & Child Neurology*. 2025;67(2):140-148.
15. Park JS, Maertens P. Neonatal brain injury and preterm rupture of membranes. *Journal of Child Neurology*. 2023;38(5):312-320.
16. Romero R, Dey SK, Fisher SJ. Preterm labor: One syndrome, many causes. *Science*. 2022;345(6198):760-765.
17. Royal College of Obstetricians and Gynaecologists (RCOG). Preterm Prelabour Rupture of Membranes. Green-top Guideline No. 73. London: RCOG; 2021.
18. Shrestha S., et al. Correlation between latency period and neonatal sepsis. *Journal of Neonatal-Perinatal Medicine*. 2024;17(1):55-62.
19. Siddikov A.A. Optimization of obstetric tactics in case of premature rupture of membranes. *Scientific Progress*. 2024;5(4):112-119.
20. Smith GCS. The management of preterm prelabour rupture of the membranes. *BJOG*. 2021;128(10):1553-1555.
21. Tanir HM., et al. Risk factors for neonatal mortality in PPRM. *Archives of Gynecology and Obstetrics*. 2024;310(1):15-22.
22. Tchirikov M, Schlabritz-Loutsevitch N, Helmer H, et al. Management of preterm premature rupture of membranes (PPROM) at 24–34 weeks' gestation: a joint guideline. *J Perinat Med*. 2023;51(3):315-328.
23. Thomson AJ. Care of women with PPRM: A clinical perspective. *Journal of Obstetrics and Gynaecology*. 2023;43(1):215-220.
24. Tinnion R., Gnanamanickam J. Neonatal Management of Preterm Prelabour Rupture of Membranes. *Neonatology Today*. 2023;18(4):10-16.
25. Umarova G.A. Perinatal outcomes in women with pre-labor rupture of membranes in the Samarkand region. *Theoretical & Applied Science*. 2023;121(5):34-39.
26. World Health Organization (WHO). WHO recommendations on interventions to improve pre-term birth outcomes. Geneva: WHO; 2022.
27. Zhang J., Wu J. Neonatal outcomes of late-preterm premature rupture of membranes. *International Journal of Gynecology & Obstetrics*. 2023;161(2):450-457.
28. Zulkifli S. Microbiological profile of amniotic fluid in PROM patients. *Medical Journal of Indonesia*. 2023;32(4):210-216.

Иқтибос учун: Исматова Л.М., Индиаминова Г.Н. Қоғоноқ пардаинг туғруқча йиртилишининг неонатал натижалари // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси*. – 2026. – № 4(24). – Б. 9–12. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19414521>

MODERN METHODS OF FOLLOW-UP AND REHABILITATION OF PATIENTS WITH PHACOGENIC GLAUCOMA

Sabirova D.B., Rizayev J.A.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Phacogenic glaucoma is currently a priority among socially significant ocular diseases, as it is one of the main causes of irreversible blindness. The aim of this study was to monitor and evaluate rehabilitation methods for patients with phacogenic glaucoma. At the outpatient clinic of the multidisciplinary clinic of the Saratov State Medical University, follow-up care for patients with phacogenic glaucoma in the eye department is based on clinical guidelines for glaucoma. To establish a diagnosis, patients undergo the minimum necessary tests, such as uncorrected and maximum-corrected visometry, biomicroscopy, gonioscopy, direct ophthalmoscopy, tonometry, and examination of the central and peripheral visual fields, which corresponds to the equipment available in primary care. Visual acuity is determined using a Sivtsev-Golovin optotype chart placed in a Roth apparatus and a visual sign projector. Refractive errors are examined and corrected subjectively using a standard set of trial spectacle lenses. Biomicroscopy is performed using a slit lamp, typically a domestically produced one, which is standard equipment in ophthalmologists' offices at the clinic. Attention is paid to the conjunctival vessels, cornea, anterior chamber depth, iris, and crystalline lens. Gonioscopy was performed using a van Beuningen gonioscope, followed by an assessment of the angle profile, the presence of synechiae, pseudoexfoliation, and pigment deposition. According to our data from the annual report of the ophthalmology service, as of January 1, 2025, 389 people had phacogenic glaucoma, representing 12.3% of the total number of glaucoma patients in the Samarkand region. Of these, 78 were newly diagnosed. A total of 389 outpatient reports were processed for analysis. An average of 40-60 people are identified annually, and an ophthalmologist examines 15-18 patients with this condition daily per shift.

Keywords: medical rehabilitation, medical examination, monitoring, phacogenic glaucoma, vision, ophthalmology.

ФАКОГЕН ГЛАУКОМА БИЛАН ОҒРИГАН БЕМОРЛАРНИ КУЗАТИШ ВА РЕАБИЛИТАЦИЯ ҚИЛИШНИНГ ЗАМОНАВИЙ УСУЛЛАРИ

Сабинова Д.Б., Ризаев Ж.А.

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Факоген глаукома ҳозирда кўриш органининг ижтимоий аҳамиятга эга касалликлари орасида устувор ўринни эгаллайди, чунки у қайтариб бўлмайдиган кўрликнинг асосий сабабларидан биридир. Мақсад факоген глаукома билан оғриган беморларни реабилитация қилиш усуллари кузатиш ва баҳолаш эди. СамДТУ кўп тармоқли клиникасининг амбулатория клиникасида офтальмология бўлимида факоген глаукома билан оғриган беморларни диспансер кузатуви глаукома бўйича клиник кўрсатмалар асосида амалга оширилади. Таъхис қўйиш учун беморлар минимал зарур ҳажмдаги тадқиқотлардан ўтадилар, масалан, визометриясиз ва максимал тузатиш билан, биомикроскопия, гониоскопия, тўғридан-тўғри офтальмоскопия, тонометрия, марказий ва периферик кўриш майдонларини текшириш, бу бирламчи амбулатория ёрдами бўлимининг ускуналарига мос келади. Кўриш ўткирлиги Рот аппаратида жойлаштирилган Сивцев-Головин оптотип столи ва визуал белги проектори ёрдамида аниқланади. Рефракция хатоларини текшириш ва тузатиш субъектив равишда стандарт синов линзалари тўплами ёрдамида амалга оширилади. Биомикроскопия одатда маҳаллий ишлаб чиқарилган ёриқ лампа ёрдамида амалга оширилади, бу клиниканинг офтальмологлар кабинетларида мавжуд. Эътибор конъюнктива томirlарига, шох пардага, олдинги камера чуқурлигига, рангдор пардага ва кристалли линзага қаратилади. Гониоскопия ван Беунинген гониоскопи ёрдамида амалга оширилди, сўнгра бурчак профили, синехиялар мавжудлиги, псевдоэксфолиация ва пигмент чўкмаси баҳоланди. Офтальмология хизматининг йиллик ҳисоботидан олинган маълумотларга кўра, 2025-йил 1-январ ҳолатига кўра, 389 кишида факоген глаукома бор эди, бу Самарқанд вилоятидаги глаукома беморларининг умумий сонининг 12,3% ни ташкил қилади. Улардан 78 нафари янги таъхис қўйилган. Таҳлил қилиш учун жами 389 та амбулатория шакли қайта ишланди. Ҳар йили ўртача 40-60 киши аниқланади ва офтальмолог ҳар куни сменада ушбу ҳолатга эга 15-18 беморни текширади.

Калит сўзлар: тиббий реабилитация, тиббий кўрик, мониторинг, факоген глаукома, кўриш, офтальмология.

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИСПАНСЕРНОГО НАБЛЮДЕНИЯ И РЕАБИЛИТАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ С ФАКОГЕННОЙ ГЛАУКОМОЙ

Сабинова Д.Б., Ризаев Ж.А.

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Факогенная глаукома в настоящее время занимает приоритетное место среди социально-значимых заболеваний органа зрения, так как является одной из основных причин необратимой слепоты. Целью было провести мониторинг и оценить методы реабилитации пациентов с факогенной глаукомой. На базе поликлиники многопрофильной клиники САМГМУ в глазном отделении диспансерное наблюдение за пациентами больных факогенной глаукомой осуществляется на основании клинических рекомендаций по глаукоме. Для постановки диагноза пациентам используются минимальный необходимый объем исследований, таких как визометрия без коррекции и с максимальной коррекцией, биомикроскопия, гониоскопия, прямая офтальмоскопия, тонометрия, исследование центрального и периферического полей зрения, что соответствует оснащению первичного поликлинического звена. Определение остроты зрения проводится с помощью таблицы оптотипов Сивцева-Головина, помещенной в аппарат Рота и проектором зрительных знаков. Исследование и коррекция аномалий рефракции выполняется субъективным методом с использованием стандартного набора пробных очковых стекол. Биомикроскопия проводится на целевой лампе, как правило, отечественного производства, которой оснащены кабинеты врачей-офтальмологов в поликлинике. Обращали внимание на сосуды конъюнктивы, роговицу, глубину передней камеры, радужку, хрусталик. Гониоскопия проводилась гониоскопом по Ван-Бойнингену, с последующей оценкой профиля угла, наличия синехий, псевдоэкссфолиаций и отложения пигмента. По нашим данным из годового отчета офтальмологической службы с факогенной глаукомой на 01.01.2025 г состоит 389 человек, что составляет 12,3% от общего количества больных глаукомой по Самаркандской области, из них впервые выявленные 78 пациентов. Для анализа обработано 389 диспансерных форм. Ежегодно выявляется в среднем по 40-60 человек, ежедневно за смену врачом-офтальмологом осматривается по 15-18 пациентов с данной патологией.

Ключевые слова: медицинская реабилитация, диспансеризация, мониторинг, факогенная глаукома, зрение, офтальмология.

e-mail: dilrabo_sabirova@mail.ru

Relevance. The problem of phacogenic glaucoma is as pressing in Uzbekistan as it is worldwide. The incidence of phacogenic glaucoma in the population of Uzbekistan over 40 years of age is approximately 1.0–1.5%, and 10% for those over 70 years of age [1]. In the Samarkand region, the incidence of glaucoma is also increasing annually. Since 2020, 28 medical organizations in the region have been submitting patient records with phacogenic glaucoma (suspected glaucoma) to the Department of Quality Control and Safety of Medical Activities and Statistics, along with their annual ophthalmology service reports [2]. The incidence of phacogenic glaucoma has also increased in the service area. In 2021, 340 people were registered for outpatient care, accounting for 52% of the total number of people registered with an ophthalmologist[9]. In 2022, this figure reached 364 people (53%), and in 2023, 375 people (53.3%)[3]. Phacogenic glaucoma is the leading cause of visual disability, accounting for 47.5% of all visual disabilities in the adult population.[4] Therefore, it is necessary to improve the organization of outpatient care for this population group within the Samara State Medical University outpatient clinic. Currently, a significant number of regulatory legal acts have been approved within the specialized legislation in the field of public health in Uzbekistan, regulating the activities of medical institutions in the organization of medical care, many of which are universal in nature and are applicable regardless of the specific medical specialty[10]. The effectiveness of antiglaucoma work depends primarily on the quality of its organization. Improving the effectiveness of glaucoma services should be carried out in the following key areas: early detection of patients with phacogenic glaucoma, mandatory lifelong medical examination, comprehensive examination during follow-up, a combination of continuous and course-based comprehensive treatment, and explanation of the nature of their disease to patients [5]. Early diagnosis of glaucoma is directly related to a thorough initial examination of the patient. Active monitoring of identified patients with the required frequency of examinations and adequate treatment—all these factors depend on the staffing issue[11]. Monitoring during a stabilized course of glaucoma should be carried out at least once every three months[12]. At the first stage of medical examination, based on the current level of equipment in most outpatient clinics and the requirements of regulatory documents, the required scope of glaucoma examination in a clinic or central regional hospital setting includes the following activities: visom-

etry - 4 times a year; ophthalmoscopy - 4 times a year; perimetry - 2 times a year kinetic and 1 static one; tonometry - 4 times a year; biomicroscopy - 4 times a year; gonioscopy - once every 2 years; specialist consultations (if the patient has diseases that affect the clinical picture); collection of a family history. For patients with unstable phacogenic glaucoma, individual follow-up periods are established. Monitoring capabilities during the second stage of clinical examination depend on the material and technical resources of the coordinating center and the regional characteristics[7]. The quality of clinical work in the outpatient clinic network is constantly discussed in publications, which indicate significant shortcomings in this activity [6].

Objective: To monitor and evaluate rehabilitation methods for patients with phacogenic glaucoma.

Materials and methods of the study. At the outpatient clinic of the multidisciplinary clinic of the Saratov State Medical University, in the ophthalmology department, outpatient monitoring of patients with phacogenic glaucoma is carried out based on clinical guidelines for glaucoma [8]. Outpatient monitoring of patients with phacogenic glaucoma involves continuous dynamic observation; therefore, examinations are conducted for such patients once every 3 months if the disease is stable, and more frequently if the disease is unstable. To establish a diagnosis, patients undergo the minimum necessary amount of examinations, such as visometry without and with maximum correction, biomicroscopy, gonioscopy, direct ophthalmoscopy, tonometry, and examination of the central and peripheral visual fields, which corresponds to the equipment of the primary outpatient clinic. Visual acuity is determined using the Sivtsev-Golovin optotype table placed in the Roth apparatus and a visual sign projector. The examination and correction of refractive errors is performed subjectively using a standard set of trial spectacle lenses. Biomicroscopy is performed using a lit lamp, typically a domestically produced one, which is standard equipment in ophthalmologists' offices at the outpatient clinic. Conjunctival vessels, the cornea (presence of edema and endothelial pseudoexfoliation), anterior chamber depth, the iris (pupillary margin and pseudoexfoliation), and the crystalline lens are examined. Gonioscopy is performed using a van Beuningen gonioscope, followed by an assessment of the angle profile, the presence of synechiae, pseudoexfoliation, and pigment deposition. Intraocular pressure is measured using a Maklakov tonometer with a 10-gram weight and an automatic pneumotonometer. Reverse ophthalmoscopy using a slit lamp and aspheric lenses (60 and 90 D) is performed to assess optic disc excavation, peripapillary atrophy, vascular bundle shift, and minor hemorrhages. Perimetry was performed using a manual Förster perimeter, and in some cases, kinetic perimetry was also performed using a PERIKOM automated perimeter. According to our data from the annual ophthalmology service report, as of January 1, 2025, 389 people with phacogenic glaucoma were diagnosed, representing 12.3% of the total number of glaucoma patients in the Samarkand region. Of these, 78 were newly diagnosed [14]. A total of 389 outpatient reports were processed for analysis. An average of 40-60 patients with this condition are diagnosed annually, and 15-18 patients with this condition are examined by an ophthalmologist per shift. Patients schedule appointments independently; when the clinic had outpatient appointments with an ophthalmologist, the ophthalmology department nurse actively called for patients. Diagnosis is made during the initial patient visit to an ophthalmologist. Very few patients with elevated intraocular pressure (IOP) are identified during adult medical examinations due to limited technical resources. IOP is measured in the prevention department using a transpalpebral tonometer (IGD 03), which has low reliability. In 2023, 10 patients were referred to an ophthalmologist for the second stage of their medical examination. Most patients were diagnosed with phacogenic glaucoma at stage II (38%), while 6.4% were diagnosed at stage IV. The minimum age of patients was 37 years (1 patient, or 0.1%), with 4 patients under 40 (0.3%). The maximum age was 99 years, with an average age of 65. Stage I phacogenic glaucoma was diagnosed in 370 patients (31.1%), including 34.3% men and 65.6% women. The minimum age was 37 years, and the maximum was 90 years. Stage II glaucoma was diagnosed in 34.7% of those examined (413 patients). Women accounted for 71% of this group, while men accounted for 29%. The youngest age in this group was 43 years, and the maximum was 89 years. Stage III glaucoma was newly diagnosed in 21.3% (253 patients), including 63.6% women and 36.3% men. Stage IV glaucoma was diagnosed in 11% of those newly registered, including 62.6% men and 37.3% women. The minimum age in this group was 44 years, and the maximum was 99 years. The average age was 69 years. It is important to note that in the work Fifty-eight patients (4.8%) were of able-bodied age at the time of registration for dispensary care. It should be noted that 77.7% of the total number of patients were diagnosed with glaucoma in both eyes. Of the total number of patients with phacogenic glaucoma, 145 patients (193 eyes) underwent surgery, of which 48% receive additional conservative treatment (1-2 medications), and 35% (51 patients) receive three or more medications after surgery. Twenty-eight patients are receiving maximum therapy (3 or more drops) but not undergoing surgery. 42.4% (82 eyes) were in stage III, and 24.3% (47 eyes) were in stage IV. The number of patients blinded by glaucoma in one eye (32 patients) and in both eyes (1.0% (2) of the total number of patients with glaucoma). Patients are prescribed subsidized medications (timolol 0.5%, pilocarpine 1%), and dorzolamide 2%), which is insufficient to fully cover the adult popula-

tion. Coverage of glaucoma patients in the outpatient clinic group was 69% in 2023, compared to 73% in 2022. More than 30% of patients are not seen by an ophthalmologist, which is partly due to staffing constraints at the clinic. Of these, 20% were actively requested by a nurse but failed to show up. Glaucoma accounts for 47.5% of all visual disabilities in the adult population. Forty-five patients (54.2%) were classified as Group I, 21 (25.3%) as Group II, and 17 (20.4%) as Group III. Of the workers, two were recognized as Group I disabled, one as Group II disabled, and three as Group III disabled. Disabilities were most often the result of delayed medical care and subsequent registration for follow-up. Patients presented to ophthalmologists with newly diagnosed glaucoma in stages 3 and 4, when significant visual loss is observed. Rehabilitation of individuals with glaucoma depends on organizational measures aimed at prevention, detection, and timely treatment. Public awareness of this type of ocular pathology plays a key role. However, it was found that many did not follow medical prescriptions. The doctor-patient relationship—compliance—determines the course and prognosis of the disease. Low access to ophthalmological care due to staffing shortages also plays a significant role.

Conclusions. The set of measures we developed to improve the organization of follow-up care for patients with phacogenic glaucoma includes improved resource provision (material, technical, and personnel), as well as organizational, informational, and educational activities. These include, first and foremost, improved public health education, active population screening for the early detection of glaucoma, effective follow-up care for identified glaucoma patients, restoration of preventive measures to combat glaucoma to reduce incidence, and improved ophthalmology department equipment. Based on the compiled matrix, we determined that advanced computerization and software will increase the volume of medical services. Having trained medical personnel will help meet the high demand for this type of service. By providing services to the general city population, demand can be increased. Insufficient staffing hinders the ability to fully serve the population. Deteriorating working conditions and outdated equipment make it difficult to attract staff. Market instability and rising equipment prices increase the cost of purchasing modern medical equipment. A decrease in the number of people assigned to a clinic leads to a decrease in demand for services. The measures we have developed to improve the organization of follow-up care for patients with phacogenic glaucoma include the following areas: improving the material and technical infrastructure, organizational, informational, and educational. These include, first and foremost, improving public health education, actively screening the population for the early detection of phacogenic glaucoma, organizing effective follow-up care for identified glaucoma patients, reinstating preventive measures to combat phacogenic glaucoma to reduce the incidence rate, and improving the ophthalmology department's equipment.

References:

1. Егоров Е.А., Егорова Е.В., Чижи́к В.И., Распопова Т.Н. Клинический потенциал оптической когерентной томографии с ангиографией в диагностике первичной открытоугольной глаукомы // Вестник офтальмологии. – 2019. – Т. 135, № 1. – С. 14–20.
2. Егоров Е.А., Егорова Е.В., Чижи́к В.И., Распопова Т.Н. Клиническое значение морфологических изменений пластинки ретикулярной оболочки при ранней диагностике глаукомы // Вестник офтальмологии. – 2019. – Т. 135, № 2. – С. 7–13.
3. Егоров Е.А., Егорова Е.В., Амонов Ю.М., Чижи́к В.И., Распопова Т.Н. Прогнозирование глаукоматозной оптической нейропатии при первичной открытоугольной глаукоме на основе анализа кровотока глаза // Вестник офтальмологии. – 2019. – Т. 135, № 3. – С. 29–36.
4. Егоров Е.А., Егорова Е.В., Чижи́к В.И. и др. Использование спектрального анализа для оценки эффекта гипотензивной терапии при открытоугольной глаукоме // Вестник офтальмологии. – 2020. – Т. 136, № 1. – С. 4–10.
5. Егоров Е.А., Егорова Е.В., Чижи́к В.И., Распопова Т.Н., Шчуко А.Г. Взаимосвязь между кровотоком глаза и постокклюзионной реактивной гиперемией у пациентов с первичной открытоугольной глаукомой // Вестник офтальмологии. – 2021. – Т. 137, № 2. – С. 4–11.
6. Сабирова Д.Б. Совершенствование медицинской реабилитации после операции факотомии при глаукоме. // Биология ва тиббиёт муаммолари. – 2025. – №1 (158). – С. 311–315.
7. Rizayev J.A., Sabirova D.B., Kadirova A.M. Ikkilamchi fakogen glaukomaning klinik ko'rinishi va davolashni baholash. // Tibbiyotda yangi kun – 2025. - №4(78). – S. 964-968.
8. Сабирова Д.Б., Ризаев Ж.А., Бобоев С.А. Факотомия при глаукоме: тактика операции катаракты и глаукомы // Биология ва тиббиёт муаммолари. – 2025. – №2 (159). – С. 177–180.
9. Bolek, B., Wylęgała, A., Rebekowska-Juraszek, M., & Wylęgała, E. (2024). Endocyclophotocoagulation Combined with Phacoemulsification in Glaucoma Treatment: Five-Year Results.

10. Casson, R. (2022). Medical Therapy for Glaucoma: A Review. *Clinical & Experimental Ophthalmology*, 50, 198-212.
11. Cui, J., & Dong, J. (2019). Clinical Efficacy of Phacoemulsification for the Treatment of Early Primary Angle-Closure Glaucoma. *Chinese Journal of Ocular Trauma and Occupational Eye Disease*, 41, 5-8.
12. Habash, A. A., & Albuainain, A. (2021). Long Term Outcome of Combined Phacoemulsification and Excisional Goniotomy with the Kahook Dual Blade in Different Sub-types of Glaucoma. *Scientific Reports*, 11.
13. Kaleem, M. A., Rajjoub, R., Schiefer, C., Wall, J., Applegate, C., Tian, J., & Sunness, J. (2021). Characteristics of Glaucoma Patients Attending a Vision Rehabilitation Service. *Ophthalmology. Glaucoma*.
14. Narzullaeva, D. U., Latipova, N., & Bobokha, L. (2024). Importance of Parental Compliance in Postoperative Rehabilitation of Children with Glaucoma. *Vestnik oftalmologii*, 140(4), 12-16.
15. Pozdeyeva, N., Gorbunova, N. Y., Frolychev, I., Voskresenskaya, A., & Yakovlev, R. A. (2023). Rehabilitation of Patients with Posttraumatic Aniridia and Secondary Glaucoma. *Vestnik oftalmologii*, 139(6), 69-76.

For citation: Sabirova D.B., Rizayev J.A. Modern methods of follow-up and rehabilitation of patients with phacogenic glaucoma // *Bulletin of Fundamental and Clinic Medicine*. – 2026. – № 4(24). – P. 13–17. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19414586>

БОШ МИЯ ГЛИОМАЛАРИНИ МАГНИТ-РЕЗОНАНС ТОМОГРАФИЯ АСОСИДА ДИАГНОСТИКА ҚИЛИШНИНГ ЗАМОНАВИЙ ЖИХАТЛАРИ ВА СУНЪИЙ ИНТЕЛЛЕКТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИНГ РОЛИ

Исмоилов И.Б.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Бош миЯ глиомалари марказий нерв тизимининг энг кўп учрайдиган бирламчи ўсмаларидан бири бўлиб, юқори ногиронлик ва ўлим кўрсаткичлари билан тавсифланади. Уларни эрта ва аниқ диагностика қилиш касаллик прогнозини яхшилашда муҳим аҳамиятга эга. Магнит-резонанс томография (МРТ) глиомаларни аниқлаш ва дифференциал таъхис қўйишда етакчи тасвирлаш усули ҳисобланади. Сўнгги йилларда сунъий интеллект асосидаги алгоритмлар МРТ тасвирларини таҳлил қилишда кенг қўлланилиб, ўсмаларни сегментация қилиш, малигнлик даражасини аниқлаш ва даволаш самарадорлигини баҳолаш имконини бермоқда. Мазкур мақоланинг мақсади бош миЯ глиомаларини МРТ асосида диагностика қилишнинг замонавий жиҳатларини таҳлил қилиш ҳамда сунъий интеллект технологияларининг радиологиядаги аҳамиятини ёритишдан иборат. Таҳлиллар шуни кўрсатадики, МРТ ва сунъий интеллект интеграцияси диагностика аниқлигини ошириш ва клиник қарор қабул қилиш жараёнини оптималлаштириш имконини беради.

Калит сўзлар: бош миЯ глиомаси, МРТ, нейроонкология, магнит-резонанс томография, сунъий интеллект, радиология, диагностика, сегментация.

MODERN ASPECTS OF DIAGNOSING BRAIN GLIOMAS BASED ON MAGNETIC RESONANCE IMAGING AND THE ROLE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNOLOGIES

Ismoilov I.B.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. Brain gliomas are among the most common primary tumors of the central nervous system and are associated with high morbidity and mortality rates. Early and accurate diagnosis plays a crucial role in improving patient prognosis. Magnetic resonance imaging (MRI) is considered the leading imaging modality for the detection and differential diagnosis of gliomas. In recent years, artificial intelligence algorithms have been increasingly implemented for the analysis of MRI data, enabling automated tumor segmentation, malignancy grading, and treatment monitoring. The aim of this article is to analyze the modern capabilities of MRI in the diagnosis of brain gliomas and to highlight the role of artificial intelligence technologies in radiological practice. The integration of MRI and artificial intelligence may improve diagnostic accuracy and optimize clinical decision-making.

Keywords: brain glioma, MRI, neuro-oncology, artificial intelligence, radiology, diagnosis.

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ДИАГНОСТИКИ ГЛИОМ ГОЛОВНОГО МОЗГА НА ОСНОВЕ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ И РОЛЬ ТЕХНОЛОГИЙ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

Исмоилов И.Б.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Глиомы головного мозга являются одними из наиболее распространённых первичных опухолей центральной нервной системы и характеризуются высокой инвалидизацией и смертностью. Ранняя и точная диагностика играет ключевую роль в улучшении прогноза заболевания. Магнитно-резонансная томография (МРТ) считается ведущим методом визуализации при выявлении и дифференциальной диагностике глиом. В последние годы активно внедряются алгоритмы искусственного интеллекта для анализа МРТ-изображений, что позволяет осуществлять автоматическую сегментацию опухоли, оценку степени злокачественности и мониторинг эффективности лечения. Целью данной работы является анализ современных возможностей МРТ в диагностике глиом головного мозга, а также освещение роли технологий искусственного интеллекта в радиологической практике. Интеграция МРТ и искусственного интеллекта способствует повышению диагностической точности и оптимизации клинического принятия решений.

Ключевые слова: глиома головного мозга, МРТ, нейроонкология, искусственный интеллект, радиология, диагностика.

Кириш. Бош мия глиомалари марказий нерв тизимининг энг кенг тарқалган бирламчи ўсмалари қаторига киради. Эпидемиологик маълумотларга кўра, глиомалар барча интракраниал ўсмаларнинг 25–30 % қисмини ташкил этади [1]. Жаҳон миқёсида глиомалар билан касалланиш кўрсаткичи ҳар 100 000 аҳолига ўртача 5–6 ҳолатни ташкил этади ва бу ёш ҳамда географик жойлашувга қараб ўзгариб туради [2]. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилотининг сўнгги таснифига кўра, глиомалар молекуляр-биологик хусусиятлари ва малигнлик даражасига кўра бир неча гуруҳларга ажратилади. Уларнинг клиник кечиши ўсманинг жойлашуви, ўсиш тезлиги ва инвазивлик даражасига боғлиқ бўлиб, кўпинча оғир неврологик асоратлар билан намоён бўлади.

Замонавий нейроонкологияда тасвирлаш диагностикаси, хусусан магнит-резонанс томография, глиомаларни аниқлаш ва баҳолашда “олтин стандарт” усул сифатида эътироф этилади. МРТ ёрдамида ўсмаларнинг ҳажми, чегараси, некроз ўчоқлари, перифокал шиш ва контраст тўпланиш хусусиятлари аниқланади. Сўнгги йилларда эса сунъий интеллект технологияларининг ривожланиши радиологик тасвирларни автоматик таҳлил қилиш имконини бермоқда. Хусусан, чуқур ўрганиш (Deep Learning) ва машинали ўрганиш (Machine Learning) алгоритмлари МРТ тасвирлари орқали нафақат ўсма чегараларини аниқ сегментация қилиш, балки уларнинг молекуляр маркерларини (масалан, изоцитрат дегидрогеназа (IDH) мутацияси) ноинвазив усулда башорат қилиш даражасига етди [3].

Мазкур мақоланинг мақсади бош мия глиомаларини МРТ асосида диагностика қилишнинг замонавий жиҳатларини таҳлил қилиш ҳамда сунъий интеллект технологияларининг амалий аҳамиятини ёритишдан иборат.

Глиомалар таснифи ва патоморфологик хусусиятлари. Глиомалар нейроэктодермал келиб чиқишга эга бўлган ва мия паренхимасининг глиал хужайраларидан ривожланадиган бирламчи ўсмалар гуруҳига киради [4]. Улар марказий нерв тизими бирламчи ўсмаларининг тахминан 70–80 % қисмини ташкил этади [1]. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилотининг 2021-йилги таснифига кўра, глиомалар молекуляр-генетик хусусиятлари ва малигнлик даражасига қараб I–IV даражаларга ажратилади [5]. Бу таснифда ўсмаларнинг фақатгина гистологик кўринишига таянмасдан, генетик ва молекуляр профилига кўпроқ урғу берилган бўлиб, касалликни аниқроқ дифференциация қилиш имконини тақдим этади [6]. Паст даражали (I–II) глиомалар нисбатан секин ўсиш хусусиятига эга бўлса, юқори даражали (III–IV) глиомалар инфильтратив ўсиш ва тез прогрессия билан тавсифланади [7]. Айниқса, IV даражали глиобластома энг агрессив шакл ҳисобланиб, марказий некроз ва микроваскуляропролиферация билан характерланади [5]. Глиобластомаларда ўртача яшовчанлик даври, гарчи жарроҳлик, нур ва кимётерапия каби комплекс даво чоралари қўлланилса-да, аксарият ҳолларда 2 йилдан камроқни ташкил қилади [2].

Сўнгги йилларда глиомаларни таснифлашда молекуляр маркерларнинг аҳамияти ортиб бормоқда. Хусусан, IDH мутацияси ва 1p/19q коделесияси ўсманинг биологик хусусиятлари ва прогностини белгилашда муҳим кўрсаткич ҳисобланади [8]. Масалан, IDH мутациясига эга бўлган астроцитомалар прогноз жиҳатидан мутациясиз (wild type) турларга қараганда яхшироқ клиник кечишга эга эканлиги исботланган [9]. Ушбу молекуляр ўзгаришлар тасвирлаш диагностикаси натижалари билан корреляция қилиниши мумкинлиги сабабли, МРТ маълумотларини чуқур таҳлил қилиш зарурати ортмоқда.

Замонавий сунъий интеллект, хусусан радиомика моделлари ёрдамида мультипараметрик МРТ тасвирларидан айнан IDH ва 1p/19q статусини операциядан олдин, яъни жарроҳлик биопсиясиз ҳам юқори аниқликда (тахминан 90–95%) башорат қилиш бўйича йирик мультисентрик тадқиқотлар амалга оширилмоқда [10]. Бу келажакда даволаш тактикасини тўғри режалаштиришга мустаҳкам замин яратади [11].

Глиомаларни МРТ асосида диагностика қилишнинг замонавий имкониятлари. Магнит-резонанс томография глиомаларни аниқлаш ва баҳолашда асосий тасвирлаш усули ҳисобланади [4]. МРТ юқори контраст резолуцияси туфайли юмшоқ тўқималарни аниқ дифференциаллаштириш имконини беради. Стандарт протоколга T1- ва T2-оғирлаштирилган тасвирлар, FLAIR секвенцияси ҳамда контраст кучайтириш киради. T1-оғирлаштирилган тасвирларда паст даражали глиомалар одатда гипointенс сигнал кўринишида намоён бўлади, T2 ва FLAIR тасвирларда эса гиперинтенс ўчоқ сифатида аниқланади [4]. FLAIR секвенцияси перифокал шишни аниқлашда айниқса муҳимдир. Юқори даражали глиомаларда кўпинча марказий некроз ва нотекис контраст тўпланиши кузатилади [5]. Бунинг устига, сўнгги йилларда клиник амалиётга кенг жорий этилаётган диффузион-тензорли томография (ДТИ) ва функционал МРТ (фМРТ) ўсманинг оқ модда трактлари ва мотор/нутқ марказларига нисбатан жойлашувини аниқ хариталаш имконини бермоқда, бу эса нейрожарроҳлик амалиётини режалаштиришда бекиёсдир [12].

1-жадвал

Паст ва юқори даражали глиомаларнинг МРТ белгиларининг таққосланиши

Белгилар	Паст даражали глиома (I–II)	Юқори даражали глиома (III–IV)
T1 сигнали	Гипоинтенс	Гетероген, некроз ўчоқлари
T2/FLAIR	Гиперинтенс	Кучли гиперинтенс, перифокал шиш
Контрастланиш	Одатда йўқ ёки минимал	Нотекис ёки ҳалқасимон
Диффузия (DWI)	Чекланиш кам	Диффузия чекланиши
Перфузион кўрсаткич (pCBV)	Паст ёки нормал	Ошган
Некроз	Одатда кузатилмайди	Кўпинча мавжуд

Контраст модда қўлланилиши гематоэнцефалик тўсиқ бузилган соҳаларни аниқлаш имконини беради. Ҳалқасимон контрастланиш юқори даражали глиобластома учун хос белгидир [7]. Бироқ контрастланиш даражаси ҳар доим ҳам малигнлик кўрсаткичига тўлиқ мос келмайди. Диффузия оғирлаштирилган тасвирлар (DWI) ўсма хужайраларининг зичлигини баҳолаш имконини беради. Юқори даражали глиомаларда диффузия чекланиши кузатилиши мумкин, бу эса АДС кўрсаткичининг пасайиши билан намоён бўлади [4].

Перфузион МРТ ўсманинг қон билан таъминланиш даражасини баҳолайди. Релатив серебрял қон ҳажмининг (pCBV) ошиши юқори даражали глиомалар учун хос ҳисобланади [1]. Шунингдек, МР-спектроскопия ёрдамида холин, Н-ацетиласпартат ва лактат пиклари таҳлил қилиниб, ўсманинг метаболик хусусиятлари аниқланади [4]. Булардан ташқари, Amide Proton Transfer (APT) деб аталадиган янги молекуляр МРТ технологияси хужайра ичидаги оксиллар ва пептидлар концентрациясини хариталаш орқали ўсманинг малигнлик даражасини одатий усуллардан кўра анча эрта кўрсатиб бериш салоҳиятига эга [13].

Сўнгги тадқиқотлар шунини кўрсатадики, мультипараметрик МРТ протоколлари юқори ва паст даражали глиомаларни дифференциал ташхислашда сезгирлик ва спецификлик кўрсаткичларини оширади [14]. Шунингдек, перфузион ва диффузион параметрларнинг комбинацияси инвазив биопсияга эҳтиёжни камайтириши мумкин [15]. Шундай қилиб, мультипараметрик МРТ глиомаларни аниқлаш, дифференциал ташхис қўйиш ва даволаш тактикасини белгилашда муҳим рол ўйнайди.

Сунъий интеллект технологияларининг глиомаларни МРТ асосида баҳолашдаги роли. Сўнгги йилларда сунъий интеллект (СИ) технологиялари тиббий тасвирларни таҳлил қилиш соҳасида жадал ривожланмоқда. Радиологияда, айниқса нейроонкологияда, катта ҳажмдаги МРТ маълумотларини тез ва аниқ баҳолаш зарурати СИ алгоритмларини жорий этишга туртки бўлди [16]. Чуқур ўрганиш (Deep Learning) асосидаги конволюцион нейрон тармоқлар (SNN) тасвирлардан мураккаб хусусиятларни автоматик аниқлаш имконини беради [16]. Ушбу алгоритмлар инсон томонидан белгиланган параметрлар билан чекланмай, тасвирдаги яширин нақшларни аниқлаш қобилиятига эга.

Анъанавий СНН моделларидан ташқари, сўнгги пайтларда Vision Transformers (ViT) архитектуралари ҳам тиббий тасвирлашда устунлик кўрсатмоқда. ViT моделлари тасвирнинг глобал контекстини яхшироқ тушуниш имкониятига эга бўлиб, ўсманинг турли қисмлари ўртасидаги мураккаб боғлиқликларни ишончли аниқлай олади [17]. Глиомаларни баҳолашда СИ технологияларининг энг муҳим йўналишларидан бири — ўсмаларни автоматик сегментация қилишдир. МРТ тасвирларида ўсма чегарасини аниқлаш, некроз ва перифокал шишни ажратиш клиник режалаштиришда муҳим аҳамият касб этади [18].

СИ ёрдамида ҳажмий ўлчамларни аниқлаш субъектив хатоларни камайтиради. BraTS (Brain Tumor Segmentation) каби йирик халқаро танловлар ушбу йўналишдаги СИ моделларининг аниқлигини тажрибали мутахассис-радиологлар даражасигача олиб чиқишда муҳим майдон вазифасини ўтамоқда [19]. Шунингдек, радиомика ёндашуви орқали тасвирлардан кўплаб квантитатив параметрлар ажратиш олинади ва улар асосида ўсманинг малигнлик даражаси прогноз қилиниши мумкин [20].

Айрим тадқиқотларда СИ моделлари IDH мутация статусини МРТ тасвирлари асосида тахмин қилиш имкониятини кўрсатган [20]. Бироқ, СИ тизимлари ҳали тўлиқ клиник мустақил восита сифатида қаралмайди. Маълумотлар базасининг сифати, алгоритмни валидация қилиш ва этик масалалар долзарб муаммолар қаторига киради [16]. Беморлар махфийлигини таъминлаш ва марказлашган маълумотлар хавфсизлиги каби тўсиқларни енгиб ўтиш мақсадида ҳозирда Федератед Леарнинг (федератив ўрганиш) усуллари фаол ўрганилмоқда, бу маълумотларни турли клиникалардан ягона марказга узатмасдан туриб, СИ моделларини биргаликда ўқитиш имконини беради [21]. Шунингдек, шифокорлар ва беморлар ишончини қозониш учун сунъий интеллектнинг тушунтириб берилувчи (Explainable AI - XAI) хусусиятини ошириш ҳозирги куннинг асосий мақсадларидандир [22]. Шу сабабли, сунъий интеллект радиологнинг ўрнини босувчи эмас, балки ёрдамчи диагностик восита сифатида баҳоланади.

Хулоса. Бош мия глиомалари марказий нерв тизимининг мураккаб ва клиник жиҳатдан аҳамиятли ўсмалари қаторига киради. Уларни аниқлаш ва баҳолашда магнит-резонанс томография асосий диагностик усул ҳисобланади. Мультипараметрик МРТ ёрдамида ўсмаларнинг морфологик ва функционал хусусиятларини аниқлаш имконияти мавжуд. Ушбу илғор технологияларнинг муттасил ривожланиб бориши келгусида нейрожарроҳлик ва онкологияда беморлар учун шахсийлаштирилган ёндашувларни (персонализед медисине) амалиётга кенг жорий этишга замин яратади [23].

Сунъий интеллект технологияларининг жорий этилиши МРТ тасвирларини автоматлаштирилган таҳлил қилиш, ўсма ҳажмини аниқлаш ва малигълик даражасини прогноз қилишда қўшимча имкониятлар яратмоқда. МРТ ва СИ интеграцияси нейроонкологик диагностиканинг аниқлиги ва самарадорлигини оширишга хизмат қилиши мумкин. Келгусида клиник жараёнларга бундай моделларининг босқичма-босқич татбиқ этилиши шифокорлар иш юкламасини камайтирибгина қолмай, касалликларга барвақт, обектив ва аниқ ташхис қўйиш асосидаги янги тиббиёт эрасининг дебочаси бўлиб хизмат қилади [24, 25].

Адабиётлар рўйхати:

1. Ostrom QT, Cioffi G, Waite K, Kruchko C, Barnholtz-Sloan JS. CBTRUS statistical report: Primary brain and other central nervous system tumors diagnosed in the United States. *Neuro Oncol.* 2022;24(Suppl 5):v1–v95.
2. Silva, A., et al. "Applications of artificial intelligence in magnetic resonance imaging for glioma diagnosis: Advances, techniques, and limitations." *Research, Society and Development*, 15(1), 2026.
3. Wang, H., et al. "Artificial intelligence in glioma research: a bibliometric analysis of global trends, hotspots, and future directions." *Frontiers in Neurology*, 2025.
4. Osborn AG. *Diagnostic Neuroradiology*. St. Louis: Mosby; 2018.
5. Louis DN, Perry A, Wesseling P, et al. The 2021 WHO Classification of Tumors of the Central Nervous System: a summary. *Neuro Oncol.* 2021;23(8):1231–1251.
6. Li, X., et al. "Gliomas Analysis via Multimodal MRI-Deep Learning Fusion: Technical Innovations in Segmentation, Molecular Subtyping, and Clinical Translation Pathways." *PMC*, 2025.
7. Weller M, van den Bent M, Preusser M, et al. EANO guidelines on the diagnosis and treatment of diffuse gliomas. *Lancet Oncol.* 2021;22(8):e357–e369.
8. Cancer Genome Atlas Research Network. Comprehensive genomic characterization of diffuse lower-grade gliomas. *N Engl J Med.* 2015;372:2481–2498.
9. Saluja, S., et al. "Deep CNNs for glioma grading on conventional MRIs: Performance analysis, challenges, and future directions." *Mathematical Biosciences and Engineering*, 21(4), 2024.
10. Chen, L., et al. "Deep Learning and Habitat Radiomics for the Prediction of Glioma Pathology Using Multiparametric MRI: A Multicenter Study." *Academic Radiology*, 2025.
11. Smith, J., et al. "IDH and 1p19q Diagnosis in Diffuse Glioma from Preoperative MRI Using Artificial Intelligence." *medRxiv*, 2023.
12. Rulseh, A. M., et al. "Advanced presurgical fMRI and DTI tracking in brain tumor patients: standardizing the workflow." *Journal of Neuroimaging*, 34(2), 2024.
13. Zhou, J., et al. "Amide proton transfer (APT) magnetic resonance imaging in neuro-oncology: a comprehensive review." *The Lancet Oncology*, 25(1), 2024.
14. Delgado AF, Fahlström M, Nilsson M, et al. Advanced MRI in glioma grading: current state and future directions. *Eur Radiol.* 2022;32:1234–1245.
15. Thust SC, Heiland S, Falini A, et al. Glioma imaging in Europe: A survey of 220 centres. *Eur Radiol.* 2023;33:4567–4578.
16. Esteva A, Robicquet A, Ramsundar B, et al. A guide to deep learning in healthcare. *Nat Med.* 2019;25:24–29.

17. Hatamizadeh, A., et al. "UNETR: Transformers for 3D Medical Image Segmentation." IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2023.
18. Menze BH, Jakab A, Bauer S, et al. The multimodal brain tumor image segmentation benchmark (BRATS). IEEE Trans Med Imaging. 2015;34(10):1993–2024.
19. Baid, U., et al. "The RSNA-ASNR-MICCAI BraTS 2021 Benchmark on Brain Tumor Segmentation and Radiogenomic Classification." Medical Image Analysis, 2024.
20. Kikingereder P, Bonekamp D, Nowosielski M, et al. Radiomic profiling of glioblastoma: identifying an imaging predictor of patient survival. Radiology. 2016;280(3):880–889.
21. Shellko, B. et al. "Federated learning in neuro-oncology: privacy-preserving AI for brain tumor segmentation." Neuro-Oncology Advances, 6(1), 2025.
22. Dvorak, P., et al. "Explainable artificial intelligence in radiology: bridging the gap between accuracy and clinical trust." European Radiology, 2024.
23. Zhang, Y., et al. "Personalized medicine in neuro-oncology: the role of multi-omics and advanced imaging." Nature Reviews Clinical Oncology, 2025.
24. Bi, W. L., et al. "Artificial intelligence in cancer imaging: Clinical challenges and applications." CA: A Cancer Journal for Clinicians, 73(3), 2023.
25. Kikingereder, P., et al. "Next-generation neuro-oncology: AI-driven integration of radiology, pathology, and genomics." Brain, 148(1), 2025.

Иқтибос учун: Исмоилов И.Б. Бош мия глиомаларини магнит-резонанс томография асосида диагностика қилишнинг замонавий жиҳатлари ва сунъий интеллект технологияларининг роли // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2026. – № 4(24). – Б. 18–22. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19414643>

ЖИГАРНИНГ ХАВФЛИ ВА ХАВФСИЗ ЎСМАЛАРИНИ МСКТ ТАСВИРЛАРИ АСОСИДА ДИФФЕРЕНЦИАЛ ДИАГНОСТИКА ҚИЛИШДА СУНЪИЙ ИНТЕЛЛЕКТНИНГ АҲАМИЯТИ

Содиқов Х.К., Насриддинов Б.З.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Жигар ўсмалари бутун дунё бўйлаб касалланиш ва ўлим кўрсаткичларининг асосий сабабларидан бири бўлиб қолмоқда. Ўсмаларни хавфсиз (гемангиома, фокал нодуляр гиперплазия, аденома) ва хавфли (гепатоцеллюляр карцинома, холангиокарцинома, метастазлар) турларга эрта босқичда тўғри ажратиш беморларнинг ҳаётини сақлаб қолиш ва оптимал даволаш режасини тўзишда ҳал қилувчи аҳамиятга эга. Ушбу обзор мақоланинг мақсади мультиспирал компьютер томографияси (МСКТ) тасвирлари асосида жигар ўсмаларини дифференциал диагностика қилишда сунъий интеллект (СИ), чуқур ўқитиш (Deep Learning), машинали ўқитиш (Machine Learning) ва радиомика технологияларининг бугунги кундаги ўрни ҳамда самарадорлигини таҳлил қилишдир.

Калим сўзлар: Жигар ўсмалари, мультиспирал компьютер томографияси (МСКТ), сунъий интеллект, чуқур ўқитиш (Deep Learning), машинали ўқитиш (Machine Learning), радиомика, дифференциал диагностика.

THE SIGNIFICANCE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THE DIFFERENTIAL DIAGNOSIS OF MALIGNANT AND BENIGN LIVER TUMORS BASED ON MSCT IMAGES

Sodiqov H.K., Nasriddinov B.Z.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. Liver tumors remain one of the leading causes of morbidity and mortality worldwide. Accurate early-stage differentiation of tumors into benign (hemangioma, focal nodular hyperplasia, adenoma) and malignant (hepatocellular carcinoma, cholangiocarcinoma, metastases) types is of crucial importance for saving patients' lives and developing an optimal treatment plan. The objective of this review article is to analyze the current role and efficacy of artificial intelligence (AI), deep learning, machine learning, and radiomics technologies in the differential diagnosis of liver tumors based on multislice computed tomography (MSCT) images.

Keywords: Liver tumors, multislice computed tomography (MSCT), artificial intelligence, deep learning, machine learning, radiomics, differential diagnosis.

ЗНАЧЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ И ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ ПЕЧЕНИ НА ОСНОВЕ МСКТ-ИЗОБРАЖЕНИЙ

Содиқов Х.К., Насриддинов Б.З.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Опухоли печени остаются одной из ведущих причин заболеваемости и смертности во всем мире. Точная дифференциация опухолей на ранних стадиях на доброкачественные (гемангиома, фокальная нодулярная гиперплазия, аденома) и злокачественные (гепатоцеллюлярная карцинома, холангиокарцинома, метастазы) имеет решающее значение для спасения жизней пациентов и разработки оптимального плана лечения. Цель данной обзорной статьи — проанализировать современную роль и эффективность применения технологий искусственного интеллекта (ИИ), глубокого обучения (Deep Learning), машинного обучения (Machine Learning) и радиомики в дифференциальной диагностике опухолей печени на основе изображений мультиспиральной компьютерной томографии (МСКТ).

Ключевые слова: Опухоли печени, мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ), искусственный интеллект, глубокое обучение (Deep Learning), машинное обучение (Machine Learning), радиомика, дифференциальная диагностика.

e-mail: hakimbekd7@gmail.com, behruz_nasriddinov@bsmi.uz

Долзарблиги. Жигар ўзининг ноёб қон таъминоти тизими (артериал ва портал) ҳамда метаболик фаоллиги туфайли турли хил бирламчи ва иккиламчи (метастатик) ўсмалар энг кўп

учрашадиган аъзолардан бири ҳисобланади. ЖССТ ва Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги маълумотларига кўра, жигар саратони ва онкологик касалликлар структураси йилдан йилга ўсиб бормоқда [8]. Тарихан жигар ўсмаларининг морфологик тузилиши ҳақидаги дастлабки тушунчалар 1970-йилларга бориб тақалади. М. Ж. Пҳиллипс ва унинг ҳамкасблари томонидан хавфсиз ўсмаларнинг, хусусан жигар ҳужайрали аденома ва гепатик гамартомаларнинг ультраструктуравий патологияси классификация қилинган бўлиб, улар хавфсиз неоплазмалар ҳам ўзига хос мураккаб тузилишга эга эканлигини исботлашган [2]. Бугунги кунга келиб, жигар хавфсиз ўсмаларининг диагностикаси ва бошқаруви бўйича халқаро стандартлар ишлаб чиқилган [12, 13]. Й. Ҳа таъкидлаганидек, хавфсиз ўсмалар — гемангиома, фокал нодуляр гиперплазия (ФНГ) ва гепатоцеллюляр аденома ўзининг клиник кечиши ва қон билан таъминланиши жиҳатидан хавфли карсиномалардан фарқ қилса-да, айрим ҳолларда визуал диагностикада уларни фарқлаш жиддий муаммоларни келтириб чиқаради [3]. Ушбу жараёнда Мультисприал компьютер томографияси (МСКТ) ва унинг контраст кучайтирилган (динамик) усуллари олтин стандарт ҳисобланади. Турли фазаларда ўсманинг контраст моддани йиғиш ва ювиш (wash out) динамикаси унинг табиатини очиб беради. Бироқ, замонавий онкологияда фақатгина инсон омилига таяниш етарли эмаслиги маълум бўлмоқда. Шу сабабли, МСКТ тасвирларини математик ва алгоритмик таҳлил қилувчи инновацион технологияларни татбиқ этиш зарурати туғилди [14].

Гепатоцеллюляр карсинома (ГСК) бутун дунё бўйлаб саратон сабабли ўлимларнинг асосий омилларидан бирidir. Касаллик кўпинча жигар сиррози фони остида ривожланади ва унинг ҳужайра микромуҳити иммун тизими билан мураккаб ўзаро алоқага киришади [10]. Беморларнинг омон қолиш даражаси ўсманинг эрта аниқланишига ва унинг хавфсиз ўсмалар (гемангиома, ФНГ) ҳамда бошқа хавфли ўсмалардан қанчалик тўғри дифференсация қилинишига боғлиқ.

Анъанавий диагностика муаммолари: Радиологлар томонидан МСКТ тасвирларини визуал тарзда таҳлил қилиш юқори даражадаги касбий тажрибани талаб этади. Бироқ, атипик хусусиятларга эга кичик ўсмалар (3 см гача бўлган) диагностикаси ўта мураккабдир. Масалан, кичик гемангиомалар артериал фазада кўпинча тўлиқ контрастланиб, ўзининг классик хусусиятини кўрсатмайди ва натижада улар гиперваскуляр хавфли ўсмаларга (ГСК) ўхшаб қолади [15, 17, 19]. Шунингдек, жигар ўсмалари атроф-муҳит, сиркад ритмлар (хронобиология) ва метаболик синдром таъсирида ўзгарувчан бўлиб боради, бу эса уларнинг МСКТдаги қон томир сигналларини ўзгартириши мумкин [5].

Сунъий интеллектнинг зарурати: Катта ҳажмдаги МСКТ маълумотларини қисқа вақт ичида ўрганиш ва пикселлар даражасидаги гетерогенликни аниқлаш инсон когнитив қобилиятларининг чегарасидан ташқаридадир. Сунъий интеллект (СИ) ва унга асосланган объектив диагностика тизимлари шифокорларнинг қарор қабул қилиш аниқлигини ошириш, "иккинчи фикр" сифатида ишлаш орқали амалий тиббиётда мутлақ долзарб аҳамият касб этмоқда [11, 14].

Обзор учун танланган адабиётлар таҳлили шуни кўрсатадики, МСКТ орқали жигар ўсмаларини таҳлил қилишда СИ бир нечта йўналишларда ривожланмоқда:

Спектрал ва Перфузион МСКТ тасвирлаш. СИ моделларига сифатли маълумот киритиш учун тасвирлаш усуллариининг ўзи ҳам такомиллашмоқда. В. Ли ва ҳаммуаллифлар спектрал компьютер томографияси орқали ГСКни гемангиома ва ФНГдан фарқлаш мумкинлигини кўрсатиб беришди [4]. Шунингдек, СТ перфузияси ёрдамида ўсманинг қон оқими ва артериал фракциясини ҳисоблаш хавфсиз ва хавфли ўсмаларни фарқлашда 88.9% сезгирликни таъминлайди [22].

Deep Learning (Чуқур ўқитиш) ва Конволюцион Нейрон Тармоқлари (СНН) Чуқур ўқитиш (ДЛ) инсон аралашувисиз тасвирлардан керакли белгиларни автоматик равишда ажратиб олиш қобилиятига эга. Катта қамровли тадқиқотларнинг бирида 814 нафар беморнинг МСКТ маълумотлари асосида *Inception v3* нейрон тармоғи модификацияланиб, жигар ўсмаларини 4 та гуруҳга ажратишга ўргатилди. Мустақил тест натижалари умумий аниқлик 96% ни ташкил қилди [16].

С. Алмотаири ва ҳамкасблари МСКТ тасвирларида ўсмани атрофдаги соғлом жигар тўқимасидан ажратиб олиш (сегментация) учун *Modified SegNet* моделини таклиф қилишди, бу ўсмаларни аниқ ажратишда юқори натижа кўрсатди [6]. Бошқа бир тадқиқотда эса, гибрид пре-траинед (олдиндан ўқитилган) моделлар ёрдамида жигар саратонини аниқлаш тизими ишлаб чиқилиб, у турли шовқинлар мавжуд бўлган реал клиник шароитларда ҳам ўзининг барқарорлигини исботлаган [1, 20].

Радиомика ва Текстур Таҳлили (Радиомисс). Радиомика — бу тиббий тасвирлардан очик кўз билан кўриб бўлмайдиган юзлаб рақамли хусусиятларни (текстура, интенсивлик, ҳажм, шакл) математик ажратиб олиш санъатидир [23]. А.Д. Даренская ўз шарҳида МРИ ва МСКТ текстур таҳлили ГСК гетерогенлигини баҳолашда энг истиқболли усул эканлигини таъкидлаган [9]. 3 фазали МСКТ тасвирларидан фойдаланилган машинали ўқитишга асосланган радиомика модели хавфли ва хавфсиз

ўсмаларни фарқлашда АУС кўрсаткичи 0.896 га етганини исботлади [24]. Хатто контрастсиз МСКТ тасвирлари орқали хавфли ва хавфсиз ўсмаларни фарқлаш имконини берувчи "радиомик имзо" логистик регрессия ёрдамида 87% аниқлик билан ишлаганлиги келтирилган [25].

Мультимодал ёндашув ва Клиник маълумотларни бирлаштириш. Замонавий СИ тизимлари фақат расм (тасвир) билан чекланиб қолмаяпти. Тадқиқотчилар МСКТ тасвирларини беморнинг клиник маълумотлари билан бирлаштирувчи "Deep Learning System" яратдилар, бу хатоларни минимал даражага туширади [18]. Машинали ўқитиш (МЎ) усуллари хавфсиз гемангиомаларнинг қайси ҳолларда тез ўсиши ва хавф туғдиришини прогнозловчи моделлар сифатида ҳам қўлланилмоқда [21]. Бунга К. Калита ва ҳаммуаллифлари таклиф этган муҳандислик ва биологик ўзгарувчиларни ҳисобловчи кўп мақсадли жигар саратони алгоритми ҳам мисол бўлади [7].

Хулоса. Ўтказилган жами 25 та халқаро ва маҳаллий адабиётлар таҳлили шуни кўрсатадики, сунъий интеллект технологиялари жигар ўсмаларининг МСКТ диагностикасида шунчаки экспериментал усулдан реал клиник амалиётнинг ажралмас қисмига айланиб бормоқда. Қуйидаги хулосаларни шакллантириш мумкин:

- Аниқлик ва Обьективлик: СНН ва гибрид ДЎ моделлар ёрдамида хавфли ва хавфсиз ўсмаларни фарқлаш сезgirlлиги 90-96% дан юқори бўлиб, бу мутахассислар хатоларини камайитишга ёрдам беради [1, 6, 16].

- Эрта диагностика: Текстур таҳлил ва радиомика инсон кўзи кўра олмайдиган пиксел даражасидаги маълумотларни ўрганиб, ўсмаларнинг энг қадимги ва атипик турларини аниқлай олади [9, 23, 24].

- Комплекс ёндашув: Келажакдаги диагностика стандартлари нафақат МСКТ тасвирига, балки патоморфологик ва клиник маълумотларни бириктирувчи мультимодал СИ тизимларига асосланади [8, 18].

Адабиётлар рўйхати:

1. Othman E., Mahmoud M., Dhahri H., et al. "Automatic Detection of Liver Cancer Using Hybrid Pre-Trained Models", Sensors, 2022.
2. Phillips M.J., Langer B., Stone R., et al. "Benign liver cell tumors Classification and ultra-structural pathology", Cancer, 1973.
3. Ha Yeonjung. "Diagnosis and Management of Benign Liver Tumors", Korean J Gastroenterol, 2025.
4. Li W., Li R., Zhao X., et al. "Differentiation of Hepatocellular Carcinoma from Hepatic Hemangioma and Focal Nodular Hyperplasia using Computed Tomographic Spectral Imaging", Journal of Clinical and Translational Hepatology, 2021.
5. Verdelho Machado M. "Hepatocellular Carcinoma Around the Clock", Current Oncology, 2026.
6. Almotairi S., Kareem G., Aouf M., et al. "Liver Tumor Segmentation in CT Scans Using Modified SegNet", Sensors, 2020.
7. Kalita K., Ramesh J.V.N., Cep R., et al. "Multi-objective liver cancer algorithm: A novel algorithm for solving engineering design problems", Heliyon, 2024.
8. Djumaniyazova N.S., Karimov R.X., Tajibayeva M.R. "Onkologik kasalliklarning patologik anatomiyasi va zamonaviy diagnostika usullari", RPAM, 2025.
9. Darenskaya A.D., Medvedeva B.M., Gevorkyan T.G., et al. "Texture Analysis of MR Imaging for Hepatocellular Cancer Diagnosis: Reality and Prospects (Literature Review)", Voprosy Onkologii, 2025.
10. Donne R., Lujambio A. "The Liver Cancer Immune Microenvironment: Therapeutic Implications for Hepatocellular Carcinoma", Hepatology, 2023.
11. "Artificial intelligence techniques in liver cancer", PMC, 2024.
12. "Artificial intelligence in imaging diagnosis of liver tumors: current status and future prospects", D-nb.info, 2025.
13. "Multiphase Computed Tomography Scan Findings for Artificial Intelligence Training in the Differentiation of Hepatocellular Carcinoma and Intrahepatic Cholangiocarcinoma", MDPI, 2025.
14. "Artificial Intelligence for Liver Cancer Diagnosis: Integrating Image Analysis, Algorithms, and Clinical Applications", InfoScience Trends, 2025.
15. "Imaging Diagnosis of Various Hepatocellular Carcinoma Subtypes and Its Hypervascular Mimics: Differential Diagnosis Based on Conventional Interpretation and Artificial Intelligence", Karger, 2023.
16. "Computerized diagnosis of liver tumors from CT scans using a deep neural network approach", PMC / PubMed, 2023.
17. Yasaka K., et al. "Deep Learning with Convolutional Neural Network for Differentiation of Liver Masses at Dynamic Contrast-enhanced CT: A Preliminary Study", Radiology, 2017.

18. "Deep Learning for Accurate Diagnosis of Liver Tumor Based on Magnetic Resonance Imaging and Clinical Data", *Frontiers in Oncology*, 2020.
19. "Discrimination of Small Hepatic Hemangiomas from Hypervascular Malignant Tumors Smaller than 3 cm with Three-Phase Helical CT", *Radiology*, 2001.
20. "Machine-Learning Based Hybrid-Feature Analysis for Liver Cancer Classification Using Fused (MR and CT) Images", *MDPI*, 2020.
21. "Identification of Parameters Associated with Hepatic Hemangioma Growth Patterns Using a Machine Learning Model: A Single-Centre Analysis", *Indian Journal of Surgery*, 2025.
22. "Role of Perfusion CT Differentiating Hemangiomas from Malignant Hepatic Lesions", *Clinical Imaging Science*, 2013.
23. "Focal Lesions of the Liver and Radiomics: What Do We Know?", *PMC*, 2023.
24. "Differentiation of malignant from benign focal liver lesions in triphase-enhanced CT using machine-learning-based radiomics", *PubMed*, 2025.
25. "A radiomics signature to identify malignant and benign liver tumors on plain CT images", *Journal of X-Ray Science and Technology*, 2020.

Иқтибос учун: Содиқов Ҳ.К., Насриддинов Б.З. Жигарнинг хавфли ва хавфсиз ўсмаларини МСКТ тасвирлари асосида дифференциал диагностика қилишда сунъий интеллектнинг аҳамияти // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси*. – 2026. – № 4(24). – Б. 23–26. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19414667>

HISTOLOGICAL AND MICROVASCULAR CHANGES IN THE UTERUS UNDER CHRONIC CARBON MONOXIDE EXPOSURE

Ruziyeva G.M., Djumayev K.Sh.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. Carbon monoxide (CO) is a toxic gas produced during incomplete combustion of carbon-containing materials and is considered one of the major environmental pollutants. Chronic exposure to carbon monoxide can lead to tissue hypoxia and structural alterations in various organs. However, the influence of long-term CO exposure on the microvascular system of the uterus remains poorly understood. The aim of this study was to investigate histological and microvascular changes in uterine tissues under chronic carbon monoxide exposure in experimental animals. The study was conducted on 40 female white laboratory rats divided into control and experimental groups exposed to different concentrations of CO. Histological and morphometric analyses were performed to evaluate structural alterations and vascular changes in uterine tissues. The results revealed significant microvascular dilation, increased vascular density, and degenerative changes in endometrial structures under chronic CO exposure. These findings suggest that prolonged exposure to carbon monoxide leads to significant alterations in uterine microcirculation and tissue organization, which may adversely affect reproductive function.

Keywords: carbon monoxide, uterus, morphology, hypoxia, experimental study

СУРУНКАЛИ ИС ГАЗИ ТАЪСИРИДА БАЧАДОННИНГ МИКРОТОМИР ВА ГИСТОЛОГИК ЎЗГАРИШЛАРИ

Рузиева Г.М., Джумаев К.Ш.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Ис газы (СО) ташиқи муҳитда кенг тарқалган токсик газлардан бири бўлиб, у ноқис ёнув жараёнида ҳосил бўлади. Унинг асосий патогенетик таъсири гемоглобин билан богланиб, тўқималарда гипоксия ривожланишига олиб келиши билан изоҳланади. Сурункали гипоксия турли орган ва тўқималарда морфологик ва функционал ўзгаришларга сабаб бўлади. Бироқ ис газининг бачадоннинг микроқон айланиш тизимида таъсири етарлича ўрганилмаган. Ушбу тадқиқотнинг мақсади экспериментал ҳайвонларда сурункали ис газы таъсири натижасида бачадонда юз берадиган гистологик ва микроциркулятор ўзгаришларни ўрганишдан иборат. Тадқиқот 40 та лаборатория каламушларида ўтказилди. Натижалар ис газы таъсирида микроқон томирлар кенгайиши, томирлар зичлигининг ошиши ва эндометрийда дегенератив ўзгаришлар юз беришини кўрсатди.

Калит сўзлар: ис газы, бачадон, морфология, гипоксия, экспериментал тадқиқот

ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ И МИКРОСОСУДИСТЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ МАТКИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ВОЗДЕЙСТВИИ УГАРНОГО ГАЗА

Рузиева Г.М., Джумаев К.Ш.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Угарный газ (СО) является одним из наиболее распространённых токсических газов окружающей среды, образующихся при неполном сгорании органических веществ. Хроническое воздействие угарного газа вызывает тканевую гипоксию и может приводить к структурным изменениям различных органов. Однако влияние длительного воздействия угарного газа на микрососудистую систему матки изучено недостаточно. Целью настоящего исследования являлось изучение гистологических и микрососудистых изменений тканей матки при хроническом воздействии угарного газа в эксперименте. Исследование проведено на 40 белых лабораторных крысах, разделённых на контрольную и экспериментальные группы. Для оценки структурных изменений применялись гистологические и морфометрические методы. Полученные результаты показали расширение микрососудов, увеличение сосудистой плотности и дегенеративные изменения эндометрия при хроническом воздействии угарного газа. Полученные данные свидетельствуют о значительном влиянии угарного газа на микрососудистую систему матки и возможном нарушении репродуктивной функции.

Ключевые слова: угарный газ, матка, морфология, гипоксия, экспериментальное исследование

Introduction. Environmental pollution has become one of the most important global health problems in recent decades. Among toxic environmental pollutants, carbon monoxide occupies a significant place due to its high toxicity and widespread presence in industrial and domestic environments[1].

Carbon monoxide binds strongly with hemoglobin, forming carboxyhemoglobin and significantly reducing oxygen delivery to tissues. As a result, prolonged exposure to carbon monoxide leads to chronic tissue hypoxia and metabolic disturbances[3,4].

The uterus is a highly vascularized organ with intensive microcirculation. Adequate blood supply is essential for maintaining normal reproductive function. Disturbances in uterine microcirculation may lead to structural damage, impaired implantation, and reduced fertility[2,5,6].

Despite numerous studies investigating carbon monoxide toxicity, its influence on uterine microvascular structures remains insufficiently explored.

The aim of this study was to investigate morphometric and histological changes in the uterus under chronic carbon monoxide exposure.

Materials and Methods. The present experimental study was carried out on 40 female white laboratory rats weighing 180–220 g and aged 8–10 weeks. All animals were kept under standard laboratory conditions with a temperature of 22–24°C, relative humidity of 50–60%, and a 12-hour light/dark cycle. The animals had free access to standard laboratory food and drinking water throughout the experiment.

The experimental procedures were conducted in accordance with international ethical guidelines for the use of laboratory animals.

The animals were randomly divided into four groups (n = 10 each): one control group and three experimental groups exposed to different concentrations of carbon monoxide.

Table 1

Experimental groups and exposure conditions

Procedure	Reagent	Duration
Fixation	10% formalin	24 h
Dehydration	Ethanol (70–100%)	12 h
Clearing	Xylene	2 h
Embedding	Paraffin	3 h
Section thickness	Microtome	5 µm
Staining	Hematoxylin–Eosin	standard protocol

Carbon monoxide exposure was performed in a specially designed chamber where the gas concentration was continuously monitored.

Tissue sampling. The end of the experimental period, the animals were anesthetized and euthanized according to ethical standards. The uterine tissues were carefully removed and washed with physiological saline.

The samples were fixed in 10% neutral buffered formalin for 24 hours.

Histological examination. After fixation, the tissues were processed using standard histological techniques. The samples were dehydrated in graded ethanol solutions, cleared in xylene, and embedded in paraffin.

Paraffin blocks were sectioned using a microtome at a thickness of 5 µm.

The sections were stained using Hematoxylin and Eosin (H&E).

Histological analysis was performed using a light microscope equipped with a digital imaging system.

Table 2

Histological processing protocol

Procedure	Reagent	Duration
Fixation	10% formalin	24 h
Dehydration	Ethanol (70–100%)	12 h
Clearing	Xylene	2 h
Embedding	Paraffin	3 h
Section thickness	Microtome	5 µm
Staining	Hematoxylin–Eosin	standard protocol

Results. Histological examination demonstrated progressive pathological changes in uterine tissues depending on the duration and concentration of carbon monoxide exposure. In the control group, the uterine wall showed normal histological architecture with well-organized endometrium, numerous uterine glands and compact smooth muscle bundles in the myometrium. Blood vessels were normally distributed without signs of congestion.

In experimental groups exposed to carbon monoxide, microvascular dilation and structural alterations were observed. In the 50 ppm group mild epithelial dystrophy and moderate vascular dilation were detected. In the 100 ppm group stromal edema and reduction in the number of uterine glands were observed. In the 200 ppm group pronounced vascular congestion, focal hemorrhages and thinning of the endometrial layer were noted.

Table 3

Morphometric parameters of the uterus (M ± m)

Parameter	Control	CO 50 ppm	CO 100 ppm	CO 200 ppm
Endometrial thickness (µm)	418 ± 17	392 ± 15	338 ± 14	280 ± 13
Myometrial thickness (µm)	515 ± 20	472 ± 18	428 ± 16	370 ± 15
Number of uterine glands	27 ± 2	23 ± 2	18 ± 1	13 ± 1
Vascular density	11 ± 1	14 ± 1	18 ± 1	23 ± 2

ANOVA Statistical Analysis. One-way ANOVA demonstrated statistically significant differences between the groups for the majority of morphometric indicators ($p < 0.05$). The most pronounced differences were observed between the control group and the group exposed to 200 ppm carbon monoxide.

Table 4.

ANOVA results for endometrial thickness

Source	SS	df	MS	F	p
Between groups	38210	3	12736	20.9	<0.001
Within groups	21460	36	596		
Total	59670	39			

Discussion. The obtained results indicate that chronic exposure to carbon monoxide leads to significant structural changes in uterine tissues. Carbon monoxide forms carboxyhemoglobin and reduces oxygen delivery to tissues, resulting in chronic hypoxia. The uterus is particularly sensitive to oxygen deficiency due to its high metabolic activity and extensive vascular network.

The reduction in endometrial thickness observed in the experimental groups may reflect suppression of proliferative processes in epithelial and stromal cells. Hypoxic conditions are known to inhibit cell division and activate apoptotic mechanisms, leading to structural thinning of tissues.

Another important finding was the reduction in the number of uterine glands. These glands play a key role in maintaining the secretory function of the endometrium and supporting implantation. Therefore, structural alterations of glandular components may negatively influence reproductive capacity.

Increased vascular density and dilation of microvessels observed in experimental animals can be interpreted as a compensatory mechanism aimed at improving oxygen supply under hypoxic conditions. However, prolonged vascular dilation and congestion may also contribute to inflammatory processes and further tissue damage.

Similar findings have been reported in previous experimental studies investigating the effects of environmental pollutants on reproductive organs. Chronic exposure to toxic gases and hypoxic conditions may disrupt normal tissue architecture and impair reproductive function.

Conclusion. Chronic carbon monoxide exposure causes significant histological and microvascular changes in uterine tissues. The main alterations include thinning of the endometrium, reduction of uterine glands and increase in vascular density. These structural changes may impair normal reproductive function and demonstrate the potential risks of environmental toxic gases for female reproductive health.

References:

1. Mahan V. L. Heme oxygenase/carbon monoxide system affects the placenta and preeclampsia //Medical Gas Research. – 2025. – Т. 15. – №. 2. – С. 276-287.
2. Itziou A. et al. Environmental pollution and oxidative stress: health effects during pregnancy: a review //Applied Sciences. – 2024. – Т. 14. – №. 21. – С. 9884.
3. Letafati A. et al. Emerging paradigms: unmasking the role of oxidative stress in HPV-induced carcinogenesis //Infectious agents and cancer. – 2024. – Т. 19. – №. 1. – С. 30.
4. Li Y. et al. Baicalein improves the symptoms of polycystic ovary syndrome by mitigating oxidative stress and ferroptosis in the ovary and gravid placenta //Phytomedicine. – 2024. – Т. 128. – С. 155423.
5. Lopez I. A. et al. Oxidative stress and the deleterious consequences to the rat cochlea after prenatal chronic mild exposure to carbon monoxide in air //Neuroscience. – 2008. – Т. 151. – №. 3. – С. 854-867.
6. Palmerini M. G. et al. Modulating morphological and redox/glycative alterations in the PCOS uterus: effects of carnitines in PCOS mice //Biomedicines. – 2023. – Т. 11. – №. 2. – С. 374.

For citation: Ruziyeva G.M., Djumayev K.Sh. Histological and microvascular changes in the uterus under chronic carbon monoxide exposure // Bulletin of Fundamental and Clinic Medicine. – 2026. – № 4(24). – P. 27–30. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19426339>

ИНГИБИТОРЫ АПФ И САРТАНЫ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ**Азимбегова С.Н.**

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (АПФ) и антагонисты рецепторов ангиотензина II (сартаны) являются ключевыми группами препаратов, применяемых в терапии артериальной гипертензии, хронической сердечной недостаточности и нефропатий. Несмотря на сходное влияние на ренин-ангиотензин-альдостероновую систему, данные группы отличаются по механизму действия, фармакокинетике, профилю безопасности и переносимости. В статье представлен углублённый сравнительный анализ ингибиторов АПФ и сартанов, включая их клиническую эффективность, побочные эффекты, особенности применения у различных категорий пациентов и место в современных рекомендациях.

Ключевые слова: ингибиторы АПФ, сартаны, РААС, артериальная гипертензия, клиническая фармакология.

ACE INHIBITORS AND SARTANS: A COMPARATIVE ANALYSIS IN CLINICAL PRACTICE**Azimbegova S.N.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitors and angiotensin II receptor blockers (ARBs) are essential drug classes used in the management of hypertension, heart failure, and renal diseases. Although both act on the renin-angiotensin-aldosterone system, they differ in mechanisms of action, pharmacokinetics, safety, and tolerability. This article provides an in-depth comparative analysis of ACE inhibitors and ARBs, including their clinical efficacy, adverse effects, and role in modern therapeutic guidelines.

Keywords: ACE inhibitors, ARBs, RAAS, hypertension, clinical pharmacology.

АПФ ИНГИБИТОРЛАР ВА САРТАНЛАР: КЛИНИК АМАЛИЁТДА ҚИЁСИЙ ТАХЛИЛ**Азимбегова С.Н.**

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. АПФ ингибиторлари ва ангиотензин III рецептор блокаторлари (сартанлар) артериал гипертензия, юрак йетишмовчилиги ва буйрак касалликларини даволашда муҳим аҳамиятга эга. Улар ренин-ангиотензин-альдостерон тизимида таъсир қилса-да, таъсир механизми, фармакокинетикаси ва хавфсизлик жиҳатидан фарқланади. Ушбу мақолада ушбу дори гуруҳларининг чуқур таққослама таҳлили келтирилган.

Калим сўзлар: АПФ ингибиторлари, сартаны, артериал гипертензия, клиник фармакология.

e-mail: azimbekovasitora1993@gmail.com

Введение. Сердечно-сосудистые заболевания занимают первое место среди причин смертности во всём мире[1]. Одним из центральных механизмов их развития является гиперактивация ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (РААС), приводящая к вазоконстрикции, задержке натрия и ремоделированию миокарда[2].

Ингибиторы АПФ и сартаны являются базовыми средствами, воздействующими на РААС, и широко применяются в клинической практике[3]. Однако выбор между этими группами остаётся предметом дискуссий, что обуславливает актуальность данного исследования.

Цель исследования. Провести углублённый сравнительный анализ ингибиторов АПФ и сартанов с позиции клинической фармакологии.

Материалы и методы. Проведён анализ:

- международных рекомендаций (ESC, АНА, NICE);
- рандомизированных клинических исследований;
- метаанализов;
- фармакологических справочников.

Использованы методы анализа, синтеза и сравнительной оценки.

Ренин-ангиотензин-альдостероновая система (РААС). РААС играет ключевую роль в регуляции артериального давления и водно-электролитного баланса.

Основные этапы:

- ренин превращает ангиотензиноген в ангиотензин I;
- АПФ превращает его в ангиотензин II;
- ангиотензин II вызывает вазоконстрикцию и секрецию альдостерона[4].

Механизм действия препаратов. Ингибиторы АПФ: - блокируют образование ангиотензина II; - снижают сосудистый тонус; - уменьшают секрецию альдостерона; - повышают уровень брадикинина[5]. Это приводит к дополнительному вазодилатирующему эффекту, но также объясняет развитие кашля.

Сартаны: - блокируют AT1-рецепторы; - предотвращают действие ангиотензина II независимо от пути его образования[6]. Таким образом, они обеспечивают более селективное воздействие.

Фармакокинетика. Ингибиторы АПФ:

- большинство являются пролекарствами (например, эналаприл)
- метаболизм в печени
- выведение почками

Сартаны:

- высокая биодоступность
- длительный период полувыведения
- двойной путь элиминации. Это делает сартаны более удобными в применении.

Клиническая эффективность. Обе группы:

- эффективно снижают артериальное давление
- уменьшают риск инсульта и инфаркта[7].

Ингибиторы АПФ:

- снижают смертность при ХСН
- улучшают прогноз после инфаркта

Сартаны:

- сопоставимы по эффективности
- предпочтительны при непереносимости

Побочные эффекты. Ингибиторы АПФ:

- сухой кашель (до 20%) [8]
- ангионевротический отёк
- гиперкалиемия

Сартаны:

- редко вызывают кашель
- низкий риск ангиоотёка
- хорошая переносимость

Применение у особых групп пациентов. Пожилые: предпочтение сартанам; Пациенты с диабетом: обе группы эффективны; ХСН: ингибиторы АПФ — первая линия; Беременность: противопоказаны обе группы [9].

Современные рекомендации. Согласно ESC и АНА: - ингибиторы АПФ — препараты первой линии[10]; - сартаны — альтернатива при непереносимости; - комбинация этих препаратов не рекомендуется из-за риска осложнений.

Фармакоэкономический аспект. Ингибиторы АПФ: - дешевле; - широко доступны. Сартаны: - дороже; - но лучше переносятся.

Результаты и обсуждение. Таким образом, проведённый анализ показывает, что:

- ингибиторы АПФ остаются препаратами с наиболее доказанной эффективностью;
- сартаны являются оптимальной альтернативой при непереносимости;
- обе группы играют ключевую роль в современной кардиологии.

Выбор между ними должен основываться на индивидуальных особенностях пациента, наличии сопутствующих заболеваний и переносимости терапии.

Выводы:

1. Обе группы эффективны в лечении сердечно-сосудистых заболеваний.
2. Ингибиторы АПФ имеют более доказанную базу.
3. Сартаны обладают лучшей переносимостью.
4. Выбор препарата должен быть индивидуализирован.
5. Клиническая фармакология играет ключевую роль в выборе терапии.

Список литературы

1. Всемирная организация здравоохранения. Сердечно-сосудистые заболевания : доклад. – Женева : ВОЗ, 2023.
2. European Society of Cardiology. 2023 ESC Guidelines for the management of arterial hypertension // *European Heart Journal*. – 2023. – Vol. 44, № 36. – P. 3726–3826.
3. American Heart Association. 2022 Guideline for the management of hypertension // *Circulation*. – 2022. – Vol. 145, № 3. – P. e1–e115.
4. Guyton A.C., Hall J.E. Textbook of Medical Physiology. – 14th ed. – Philadelphia : Elsevier, 2021. – 1152 p.
5. Katzung B.G., Trevor A.J. Basic and Clinical Pharmacology. – 15th ed. – New York : McGraw-Hill, 2021. – 1248 p.
6. Rang H.P., Dale M.M., Ritter J.M., Flower R.J. Rang & Dale's Pharmacology. – 9th ed. – London : Elsevier, 2020. – 808 p.
7. Yusuf S., Sleight P., Pogue J. et al. Effects of an angiotensin-converting-enzyme inhibitor in patients with high cardiovascular risk // *The Lancet*. – 2000. – Vol. 355, № 9200. – P. 253–259.
8. Bangalore S., Kumar S., Messerli F.H. Angiotensin-converting enzyme inhibitor associated cough // *BMJ*. – 2010. – Vol. 341. – P. c5227.
9. National Institute for Health and Care Excellence (NICE). Hypertension in adults: diagnosis and management. – London : NICE, 2019.
10. McMurray J.J.V., Packer M., Desai A.S. et al. Angiotensin-neprilysin inhibition versus enalapril in heart failure // *New England Journal of Medicine*. – 2014. – Vol. 371, № 11. – P. 993–1004.
11. Dahlof B., Devereux R.B., Kjeldsen S.E. et al. Cardiovascular morbidity and mortality in the Losartan Intervention For Endpoint reduction (LIFE) study // *The Lancet*. – 2002. – Vol. 359. – P. 995–1003.
12. Burnier M., Brunner H.R. Angiotensin II receptor antagonists // *The Lancet*. – 2000. – Vol. 355. – P. 637–645.
13. Whelton P.K., Carey R.M., Aronow W.S. et al. Guideline for prevention and management of high blood pressure // *Journal of the American College of Cardiology*. – 2018. – Vol. 71, № 19. – P. e127–e248.
14. Neal B., MacMahon S., Chapman N. Effects of ACE inhibitors on cardiovascular events // *The Lancet*. – 2000. – Vol. 355. – P. 1955–1964.
15. Weber M.A., Schiffrin E.L., White W.B. et al. Clinical practice guidelines for hypertension // *Journal of Clinical Hypertension*. – 2014. – Vol. 16, № 1. – P. 14–26.
16. Schmieder R.E., Hilgers K.F., Schlaich M.P. Renin-angiotensin system and cardiovascular risk // *The Lancet*. – 2007. – Vol. 369. – P. 1208–1219.
17. Parving H.H., Lehnert H., Brochner-Mortensen J. et al. The effect of irbesartan on diabetic nephropathy // *New England Journal of Medicine*. – 2001. – Vol. 345. – P. 870–878.
18. Lewis E.J., Hunsicker L.G., Clarke W.R. et al. Renoprotective effect of ACE inhibition // *New England Journal of Medicine*. – 2001. – Vol. 345. – P. 851–860.
19. Williams B., Mancia G., Spiering W. et al. ESC/ESH Guidelines for hypertension // *European Heart Journal*. – 2018. – Vol. 39. – P. 3021–3104.
20. Messerli F.H., Bangalore S., Bavishi C., Rimoldi S.F. Angiotensin-converting enzyme inhibitors in hypertension // *Journal of the American College of Cardiology*. – 2018. – Vol. 71. – P. 1474–1482.

Для цитирования: Азимбегова С.Н. Ингибиторы АПФ и сартаны: сравнительный анализ в клинической практике // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 4(24). – С. 31–33. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19426369>

УЧ ШОХЛИ НЕРВДАГИ НЕЙРОЖАРРОҲЛИК АРАЛАШУВЛАРИДАН КЕЙИНГИ КЎНГИЛ АЙНИШИ ВА ҚУСИШ ПРОФИЛАКТИКАСИНИ ОПТИМАЛЛАШТИРИШ

Қорёғдиев А.З., Ибрагимов Н.К.

Тошкент давлат тиббиёт университети, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. Операциядан кейинги кўнгил айланиши ва қусиш (ОКАҚ) анестезиология амалиётида, айниқса нейрожарроҳлик аралашувлари, жумладан, уч шоҳли нерв операциялари чоғида энг кўп учрайдиган ва клиник аҳамиятга эга бўлган асоратлардан бири бўлиб қолмоқда. Ушбу тоифадаги беморларда ОКАҚ учраш частотаси 50–70% га етади, бу эса нейробиологиянинг ўзига хос жиҳатлари, хусусан, тригеминал афферентлар, хеморецептор триггер зонаси ва вагал механизмлар фаоллашуви билан боғлиқдир. Ингаляцион анестетиклар ва опиоидлардан фойдаланиш, шунингдек, операция давомийлиги каби анестезиологик омиллар ҳам қўшимча роль ўйнайди. ОКАҚ патогенези кўп омилли хусусиятга эга бўлиб, марказий, периферик ва фармакологик механизмларнинг ўзаро таъсирини ўз ичига олади, бу эса ушбу асорат профилактикасига комплекс ёндашувни талаб этади. Замонавий тадқиқотлар пропופолга асосланган тотал вена ичи анестезияси (ТВИА) ҳамда комбинацияланган антиэметик терапия қўлланилиши ОКАҚ учраш частотаси ва яққоллигини сезиларли даражада камайтиришини кўрсатмоқда.

Калит сўзлар: ОКАҚ, уч шоҳли нерв, нейрожарроҳлик, анестезия, профилактика

OPTIMIZATION OF POSTOPERATIVE NAUSEA AND VOMITING PREVENTION FOLLOWING NEUROSURGICAL INTERVENTIONS ON THE TRIGEMINAL NERVE

Qoryogdiyev A.Z., Ibragimov N.K.

Tashkent State Medical University, Tashkent, Uzbekistan

Resume. Postoperative nausea and vomiting (PONV) remain among the most common and clinically significant complications in anesthesiology practice, particularly in neurosurgical interventions, including trigeminal nerve surgeries. The incidence of PONV in this category of patients reaches 50–70%, which is associated with specific neurophysiological features, including activation of trigeminal afferents, the chemoreceptor trigger zone, and vagal mechanisms. The use of inhalational anesthetics and opioids, as well as the duration of surgery, are additional anesthesiological risk factors. The pathogenesis of PONV is multifactorial, involving the interaction of central, peripheral, and pharmacological mechanisms, which necessitates a comprehensive approach to prevention. Modern studies demonstrate that the use of propofol-based total intravenous anesthesia (TIVA), along with combined antiemetic therapy, significantly reduces the incidence and severity of PONV.

Keywords: PONV, trigeminal nerve, neurosurgery, anesthesia, prevention.

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОФИЛАКТИКИ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ ТОШНОТЫ И РВОТЫ ПОСЛЕ НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ НА ТРОЙНИЧНОМ НЕРВЕ

Қорёғдиев А.З., Ибрагимов Н.К.

Ташкентский государственный медицинский университет, г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. Послеоперационная тошнота и рвота (ПОНР) остаются одними из наиболее распространённых и клинически значимых осложнений в практике анестезиологии, особенно при нейрохирургических вмешательствах, включая операции на тройничном нерве. Частота возникновения ПОНР у данной категории пациентов достигает 50–70%, что связано с особенностями нейробиологии, в частности активацией тригеминальных афферентов, хеморецепторной триггерной зоны и вагальных механизмов. Использование ингаляционных анестетиков и опиоидов, а также длительность операции являются дополнительными анестезиологическими факторами риска. Патогенез ПОНР носит многофакторный характер и включает взаимодействие центральных, периферических и фармакологических механизмов, что требует комплексного подхода к профилактике. Современные исследования показывают, что применение тотальной внутривенной анестезии (ТВВА) на основе пропופола, а также комбинированной антиэметической терапии значительно снижает частоту и выраженность ПОНР.

Ключевые слова: ПОНР, тройничный нерв, нейрохирургия, анестезия, профилактика

e-mail: akhtam1982434@gmail.com

Кириш. Анестезиология технологиялари ва фармакологик профилактика воситалари ривожда сезиларли ютуқларга эришилганига қарамай, операциядан кейинги кўнғил айниши ва қусиш (ОКАҚ) замонавий анестезиологиянинг энг кенг тарқалган ва клиник жиҳатдан муҳим муаммоларидан бири бўлиб қолмоқда [16,18]. Халқаро тадқиқотлар маълумотларига кўра, умумий жарроҳлик амалиётида ОКАҚ частотаси 20–30% ни ташкил этади, бироқ хавф даражаси юқори бўлган беморларда бу кўрсаткич 70–80% гача етиши мумкин [8,14]. Бундай беморлар қаторига нейрожарроҳлик амалиётларини, хусусан, бош миянинг орқа чуқурчаси ва уч шохли нервда операция ўтказиладиган шахслар киради.

Уч шохли нервдаги операцияларда ОКАҚ частотасининг юқорилиги ушбу соҳанинг анатомик-физиологик хусусиятлари билан боғлиқ. Уч шохли нерв (бош мия нервларининг V жуфтлиги) юзнинг сенсор иннервациясида асосий ўрин тутати ҳамда қусиш рефлекси шаклланишида иштирок этувчи марказий тузилмалар билан чамбарчас боғланган [11,13]. Жарроҳлик аралашуви вақтида сезувчи то-лалар таъсирланади, бу эса тригемино-вегетатив рефлексларнинг фаоллашишига ва узунчоқ миёдаги қусиш марказларига йўналган афферент импульсларнинг кучайишига олиб келади.

ОКАҚ патогенези мураккаб ва кўп омилли ҳисобланади. У ўз ичига хеморецептор триггер зонасининг (area postrema), вестибуляр аппаратнинг, ошқозон-ичак тракти вагус афферентларининг, шунингдек, по‘стлок тузилмаларининг фаоллашувини қамраб олади [9,10]. Қусиш марказига сигналларни узатишда серотонин (5-НТ₃), дофамин, гистамин ва Р моддаси каби нейромедиаторлар асосий ўринни эгаллайди. Уч шохли нервдаги жарроҳлик аралашувлари пайтида тригеминал афферентларнинг кўшимча рағбатлантирилиши ушбу нейромедиатор тизимларнинг фаоллашувини кучайтиради, бу эса ОКАҚ ривожланиш хавфини сезиларли даражада оширади [11].

ОКАҚнинг шаклланишида анестезиологик омиллар муҳим аҳамият касб этади. Ингаляцион анестетиклар ва опиоид аналгетиклар қусишнинг марказий механизмлари фаоллашувига ёрдам беради, серотонин ажралиб чиқишини кўпайтириб, ошқозон-ичак тракти моторикасини секинлаштиради [16,17,22]. Бундан ташқари, операциянинг узок давом этиши, гиповолемия ва гемодинамиканинг ўзгарувчанлиги ҳам ушбу асоратнинг намоён бўлиш даражасини кучайтириши мумкин.

Сўнгги йилларда патогенетик тамойилга асосланган операциядан кейинги кўнғил айниши ва қусиш (ОКАҚ) профилактикасининг замонавий ёндашувлари диққат марказида бўлиб келмоқда. Асосий йўналишлардан бири хеморецептор триггер зонасининг фаоллигини сусайтириш ҳисобига яққол антиэметик (қусишга қарши) таъсирга эга бўлган пропофол асосидаги тотал вена ичи анестезиясини (ТВИА) қўллашдир [23,24]. Бундан ташқари, ОКАҚ патогенезининг турли бўғинларига таъсир кўрсатувчи 5-НТ₃-рецепторлари антагонистлари ва глюкокортикостероидларни ўз ичига олган комбинацияланган антиэметик терапиянинг самарадорлиги исботланган [18,21,25].

Халқаро тавсиялар ва тўпланган тажрибаларга қарамасдан, нейрожарроҳлик аралашувлар чоғидаги ОКАҚ муаммоси ҳанузгача етарлича ҳал этилмаган. Бу ҳолат хавф омилларининг юқори ўзгарувчанлиги, ягона протоколларнинг мавжуд эмаслиги ва юқори хавф гуруҳидаги беморларда антиэметик препаратлар билан монотерапиянинг самара бермаслиги билан боғлиқдир [8,15]. Хусусан, уч шохли нервда ўтказиладиган операцияларда ОКАҚ ривожланишининг ўзига хос нейрофизиологик механизмлари профилактикага янада мақсадли ва комплекс ёндашувни талаб этади.

Шу тариқа, уч шохли нервдаги нейрожарроҳлик амалиётларидан кейинги кўнғил айниши ва қусишнинг (ОКАҚ) олдини олиш бўйича оптималлаштирилган, патогенетик жиҳатдан асосланган стратегияларни ишлаб чиқиш ва амалиётга татбиқ этиш замонавий анестезиологиянинг долзарб вазифаси ҳисобланади. Мазкур муаммонинг ечими нафақат асоратлар частотасини камайтириш, балки операциядан кейинги давр сифатини яхшилаш, беморнинг шифохонада ётиш муддатини қисқартириш ҳамда даволанишдан мамнуниятни ошириш имконини беради.

Материаллар ва усуллар. Мазкур тадқиқот кўп тармоқли шифохонанинг анестезиология ва реанимация бўлими негизида проспектив, рандомизацияланган, назоратли дизайн асосида ўтказилди. Кузатув даври 2023–2025-йилларни ўз ичига олди. Тадқиқот протоколи Хельсинки декларацияси тамойилларига мувофиқ бўлиб, маҳаллий этика қўмитаси томонидан тасдиқланди. Барча беморлар тадқиқотда иштирок этиш учун онгли равишда ихтиёрий розилик берганлигини имзо билан тасдиқлади.

Тадқиқотга уч шохли нерв невралгияси клиник тасдиқланган ва микротомирлар декомпрессияси амалиёти ўтказилган 120 нафар бемор жалб этилди. Тадқиқотга киритиш мезонлари қуйидагилардан иборат бўлди: ёши 18 дан 70 гача бўлиши, амалиётнинг режали тарзда ўтказилиши, жисмоний ҳолатининг ASA бўйича II–III даражага мос келиши ҳамда умумий анестезияга қарши кўрсатмаларнинг йўқлиги.

Тадқиқотдан чиқариб ташлаш мезонлари сифатида қуйидагилар белгиланди: яққол намоён бўлган гастроэнтерологик патологиянинг мавжудлиги, операциядан олдинги кўнгил айниши ёки қусиш, операциядан олдинги 24 соат ичида антиэметик препаратларни қабул қилганлик, оғир йўлдош соматик патология (ASA бўйича IV ва ундан юқори), такрорий нейрожаррохлик амалиётлари ва беморнинг иштирок этишдан воз кечиши.

Беморлар тасодифий сонлар генераторидан фойдаланган ҳолда оддий тасодифий танлаш усули билан рандомизация қилинди ва кейинчалик ҳар бири 60 кишидан иборат иккита тенг гуруҳга тақсимланди. Гуруҳлар жинси, ёши, тана вазни, операция давомийлиги ва анестезиологик хавф даражаси бўйича ўзаро мувофиқ эди.

Назорат гуруҳи ($n=60$) операциядан кейинги кўнгил айниши ва қусишнинг стандарт профилактикасини олди. Ушбу профилактика операция якунида 5-НТ₃ рецепторлари антагонисти (ондансетрон 4 мг)ни бир марта вена ичига юборишни ўз ичига олган. Анестезиологик таъминот аънавий клиник амалиётга [16,22] мувофиқ, ингаляцион анестетиклар (севофлуран) ва опиоид аналгетиклар (фентанил)ни биргаликда қўллашга асосланган комбинациялашган умумий анестезия ёрдамида ўтказилди.

Асосий гуруҳ ($n=60$) кўп компонентли ёндашувни ўз ичига олган ОКАҚнинг оптималлаштирилган ва патогенетик асосланган профилактикасини олди. Анестезиологик таъминот пропофолдан фойдаланилган ҳолда тотал вена ичи анестезияси (ТВИА) таъминоти асосида амалга оширилди. Анестезия индукцияси 2–2,5 мг/кг дозадаги пропофол билан, уни сақлаб туриш эса анестезия чуқурлигини назорат қилган ҳолда 4–8 мг/кг/соат тезликдаги узлуксиз инфузия орқали бажарилди. Аналгезия умумий дозаси минималлаштирилган ҳолда қисқа таъсирли опиоидлар ёрдамида таъминланди.

Асосий гуруҳда ОКАҚ (операциядан кейинги кўнгил айниши ва қусиш) профилактикаси антиэметик препаратларни мажмуавий қўллашни ўз ичига олди: операция бошида 4–8 мг ондансетрон ва 4–8 мг дексаметазон вена ичига юборилди. Ушбу ёндашув ОКАҚ ривожланишининг серотонинергик ва яллиғланиш механизмларини блоклашга қаратилган бўлиб, замонавий тавсияларга мос келади [18,21,25]. Шунингдек, айланиб юрувчи қон ҳажмини меъёрида сақлаш ва гиповолемиянинг олдини олиш мақсадида инфузион терапия оптималлаштирилди.

Беморлар мониторинги анестезиологик таъминот стандартларига мувофиқ олиб борилиб, электрокардиограмма, артериал қон босими, юрак уриш сони, кислород сатурацияси, капнография ҳамда анестезия чуқурлигини узлуксиз назорат қилишни қамраб олди. Операциядан кейинги даврда беморларнинг клиник ҳолати динамик назорат қилинди.

ОКАҚнинг яққоллик даражаси операциядан 2, 6, 12, 24 ва 48 соат ўтгач, динамикада стандартлаштирилган PONV шкаласи ёрдамида баҳоланди. Кўнгил айниши мавжудлиги ва частотаси, қусиш ҳолатлари, уларнинг оғирлик даражаси, шунингдек, қўшимча (“қутқарувчи”) антиэметик терапия қўллаш зарурати қайд этилди. ОКАҚнинг оғир шакли кузатув даврида икки ва ундан ортиқ қусиш ҳолати кузатилиши билан белгиланди.

Тадқиқотнинг асосий якуний нукталари қуйидагилар бўлди: ОКАҚ ривожланиш частотаси, клиник белгиларнинг яққоллиги, симптомларнинг давомийлиги ва қўшимча антиэметик терапияга бўлган эҳтиёж. Шунингдек, анестезиологик тактиканинг операциядан кейинги давр кечишига таъсири баҳоланди.

Маълумотларга статистик ишлов бериш дастурий таъминот (SPSS/Statistica) ёрдамида амалга оширилди. Микдорий маълумотлар ўртача қиймат ва стандарт оғиш ($M \pm SD$) кўринишида тақдим этилди. Микдорий кўрсаткичларни таққослаш учун Стюдентнинг t -мезони, категорияли маълумотларни таҳлил қилиш учун эса χ^2 -мезонидан фойдаланилди. Фарқлар $p < 0,05$ бўлганда статистик аҳамиятли деб топилди.

Натижалар. Ўтказилган проспектив рандомизацияланган тадқиқот натижасида операциядан кейинги кўнгил айниши ва қусиш (ОКАҚ) профилактикасининг оптималлаштирилган, патогенетик асосланган стратегияси уч шохли нервда нейрожаррохлик аралашувларни бошдан кечирган беморларда ушбу асоратнинг частотаси, яққоллиги ва давомийлигига сезиларли таъсир кўрсатиши аниқланди.

Дастлабки маълумотларнинг қиёсий тавсифи. Дастлабки демографик ва клиник кўрсаткичлар таҳлили гуруҳлар ўртасида статистик аҳамиятга молик фарқлар йўқлигини кўрсатди. Беморларнинг ўртача ёши назорат гуруҳида $45,8 \pm 11,4$ ёшни, асосий гуруҳда эса $44,2 \pm 10,9$ ёшни ташкил этди ($p > 0,05$). Аёлларнинг улуши мос равишда 63,3% ва 61,7% ни ташкил этди, бу аёлларнинг ОКАҚ ривожланишига мойиллиги юқорироқ экани ҳақидаги маълумотларга мос келади.

Оператив аралашувнинг ўртача давомийлиги назорат гуруҳида 142 ± 31 дақиқа, асосий гуруҳда эса 136 ± 28 дақиқа ташкил этди ($p > 0,05$), бу операция давомийлигининг якуний натижаларга таъсири ни истисно қилишга имконият беради.

ООКҚ частотаси. ООКҚ назорат гуруҳидаги 29 нафар (48,3%) беморда ва асосий гуруҳидаги 14 нафар (23,3%) беморда қайд этилди. Фарқлар статистик жиҳатдан аҳамиятли бўлди ($\chi^2=6,12$; $p=0,01$). Шундай қилиб, оптималлаштирилган профилактика стратегиясини қўллаш ООКҚ частотасини 25% га камайтириш имконини берди, бу ҳам статистик, ҳам клиник аҳамиятга эга. Шунинг таъкидлаш жоизки, гуруҳлар орасидаги энг катта фарқ ООКҚ ривожланиш хавфи максимал бўлган операциядан кейинги илк даврда (дастлабки 12 соатда) кузатилди.

ООКҚ оғирлик даражасининг таҳлили. Клиник кўринишлар структурасининг таҳлили ООКҚнинг оғир шакллари (кўп маротабали қусиш) назорат гуруҳида анча тез-тез учрашини кўрсатди.

- Назорат гуруҳи — 13 нафар бемор (21,7%)
- Асосий гуруҳ — 5 нафар бемор (8,3%) $p=0,02$

Енгил шакллари (якка ҳолдаги кўнгил айланиши) ҳам назорат гуруҳида кўпроқ кузатилди, асосий гуруҳда эса қисқа муддатли ва кучсиз намоён бўлган эпизодлар устунлик қилди. ООКҚ оғирлик даражасининг пасайиши комбинациялашган стратегия қўлланилганда патогенетик механизмлар самаралироқ назорат қилинганидан далолат беради.

Қўшимча терапияга эҳтиёж. Қўшимча антиэметик терапияга эҳтиёж қуйидаги беморларда қайд этилди:

- Назорат гуруҳи — 26 нафар бемор (43,3%)
- Асосий гуруҳда — 15 нафар бемор (25,0%) $p<0,01$

Мазкур кўрсаткичнинг 18,3 фоизга пасайиши асосий гуруҳда базавий профилактиканинг анча юқори самарадорлигини кўрсатади. Шунинг таъкидлаш жоизки, асосий гуруҳда “rescue-терапия” қўлланилиши эпизодик характерга эга бўлиб, кўпинча ўртача даражадаги кўнгил айланиши билан боғлиқ бўлган, назорат гуруҳида эса яққол ифодаланган қусиш билан кечган.

ООКҚ ривожланиш динамикаси. Вақтга оид хусусиятлар таҳлили қуйидагиларни аниқлади:

- Назорат гуруҳида ООКҚнинг энг юқори чўққиси операциядан 6–12 соат ўтгач кузатилди.
- Асосий гуруҳда эса 2–6 соатдан сўнг, аммо камроқ яққоллик билан намоён бўлди.

Симптомларнинг давомийлиги:

- Назорат гуруҳи — 24–48 соат
- Асосий гуруҳ — асосан 12–24 соат

Шундай қилиб, оптималлаштирилган стратегия нафақат ООКҚ частотасини камайтириш, балки симптомлар регрессиясини тезлаштириш имконини ҳам берди.

Операциядан кейинги даврга таъсири. Асосий гуруҳда қуйидагилар қайд этилди:

- умумий ҳолатнинг эртароқ тикланиши
- субъектив дискомфортнинг камайиши
- беморларнинг тезроқ фаоллашуви
- операциядан кейинги палатада ётиш муддатининг қисқариши

Бу ўзгаришлар ООКҚнинг оптималлаштирилган профилактикаси операциядан кейинги даврнинг умумий кечишига ижобий таъсир кўрсатишидан далолат беради.

Самарадорликни комплекс баҳолаш. Умумлаштирилган таҳлил ООКҚ профилактикасининг оптималлаштирилган стратегиясини қўллаш қуйидагиларни таъминлашини кўрсатди:

- ✓ ООКҚ частотасининг 25% га камайиши;
- ✓ оғир шаклларининг 2 баробардан ортиқ камайиши;
- ✓ қўшимча терапияга бўлган эҳтиёжнинг пасайиши;
- ✓ симптомлар давомийлигининг қисқариши;
- ✓ операциядан кейинги давр сифатининг яхшиланиши.

Муҳокама. Ушбу тадқиқот натижалари уч шохли нервдаги нейрохирургик амалиётлардан кейинги кўнгил айланиши ва қусиш (ОҚКҚ) беморларни периоперацион даврда парваришланишнинг энг муҳим муаммоларидан бири бўлиб қолаётганини тасдиқлайди. Назорат гуруҳида аниқланган ОҚКҚ частотаси (48,3%) замонавий тадқиқотлар маълумотларига мос келади: уларга кўра, краниотомия ва микроваскуляр декомпрессиядан сўнг беморларда бу кўрсаткич 40–70% оралиғида ўзгариб туради [8,11,14]. Бу ўрганилаётган танланмани репрезентатив ва реал клиник амалиётни акс эттирувчи деб ҳисоблаш имконини беради.

Ушбу тоифадаги беморларда ОҚКҚнинг юқори частотасини белгилайдиган асосий омил — бу уч шохли нервнинг нейроанатомик хусусиятлари билан боғлиқ бўлган ўзгача патогенездир. Жарроҳлик амалиёти вақтида V жуфт бош мия нервларининг афферент толаларининг таъсирланиши тригемино-вегетатив рефлексларнинг фаоллашишига ва узунчоқ мия тузилмаларига, жумладан,

кусиш маркази ҳамда хеморетсептор триггер зонасига импульсациянинг кучайишига олиб келади [11,13]. Умумий жарроҳлик беморларидан фарқли ўлароқ, нейрохирургик беморларда бу механизм яққолроқ намоён бўлади, бу эса ўз навбатида ОҚҚҚнинг юқори chastotаси ва оғирлик даражасини изоҳлайди.

POTRнинг мултифакториал табиатга эга эканлиги ҳам алоҳида аҳамият касб этади. Хеморетсептор триггер зонаси, вестибуляр аппарат, адашган нерв афферентлари ва по‘стлок тузилмаларининг фаоллашуви бир вақтнинг ўзида юз бериб, симптомларнинг яққоллигини ўзаро кучайтиради [9,10]. Шу боис патогенезнинг фақат битта бўғинига таъсир кўрсатадиган антиэметик препаратлар билан монотерапия қўллаш етарли даражада клиник самара бермайди ва бу назорат гуруҳининг натижаларда ҳам ўз исботини топган.

Тадқиқотда олинган маълумотлар мультимодал таъсир тамойилига асосланган POTR профилактикасининг оптималлаштирилган стратегияси юқори самарадорликка эга эканлигидан далолат беради.

POTR учраш chastotasининг 48,3 фоиздан 23,3 фоизгача ($p=0,01$) камайиши халқаро тадқиқотлар натижаларига мос келади. Уларда ҳам комбинациялашган ёндашувлар ушбу асорат хавфини 30–50 фоизга камайтириш имконини бериши кўрсатилган [18,21,25]. Бу эса танланган стратегиянинг асосли эканини ва замонавий клиник тавсияларга мувофиқлигини тасдиқлайди.

Оптималлаштирилган тактикнинг асосий унсурларидан бири пропофолга асосланган тўлиқ вена ичи анестезиясини (TIVA) қўллашдир. Маълумки, пропофол хеморетсептор триггер зонасининг фаоллигини сусайтириш ва серотонин ажралиб чиқишини камайтириш орқали сезиларли антиэметик (қушишга қарши) таъсир кўрсатади [23,24].

Ингалицион анестетиклардан фарқли ўлароқ, пропофол қушишнинг марказий механизмларини рағбатлантирмайди, бу эса уни ОАҚҚ хавфи юқори бўлган беморлар учун афзал танловга айлантиради.

Мазкур тадқиқотда TIVA усулидан фойдаланиш клиник белгиларнинг ҳам учраш chastotasини, ҳам оғирлик даражасини сезиларли даражада камайтиришга имконият берди.

Мажмуавий антиэметик терапия ҳам кам аҳамиятга эга бўлмаган таркибий қисм ҳисобланади. Ондансетрон (5-НТ₃-рецепторлар антагонисти) ва дексаметазон бирикмаси турли патогенетик бўғинларга, жумладан, серотонинергик ва яллиғланиш механизмларига таъсир кўрсатишни таъминлайди [21,25].

Ушбу препаратларнинг синергизми ОАҚҚ оғир шакллариининг учраш chastotasи сезиларли даражада (21,7 фоиздан 8,3 фоизгача; $p=0,02$) камайганини изоҳлайди, бу эса муҳим клиник аҳамият касб этади.

ОАҚҚ ривожланишида опиоидларнинг ўрни алоҳида эътиборга сазовордир. Маълумки, опиоид аналгетиклар қушиш марказини рағбатлантиради, ошқозон-ичак йўллари моторикасини секинлаштиради ва хеморетсептор триггер зонасининг сезувчанлигини оширади [17,22]. Мазкур тадқиқотда асосий гуруҳда опиоид юкламанинг чекланиши профилактик стратегиянинг муҳим унсури бўлиб, ОАҚҚ учраш chastotasининг камайишига салмоқли ҳисса қўшган бўлиши эҳтимолдан холи эмас.

ОҚҚР динамикаси таҳлили шунга кўрсатдики, асосий гуруҳда нафақат унинг частотаси пасайган, балки симптомлар давомийлиги ҳам қисқарган. Бу патогенетик механизмлар самаралироқ назорат қилинганини ва операциядан кейинги давр янада сўзлашувчи (силиқ) кечганини кўрсатади. Қўшимча антиэметик терапияга бўлган эҳтиёжнинг камайиши (43,3% дан 25,0% гача; $p<0,01$) ҳам таклиф этилган ёндашувнинг самарадорлигини тасдиқлайди.

Шуни таъкидлаш жоизки, ОҚҚР яққоллигининг камайиши нафақат симптоматик, балки прогностик аҳамиятга ҳам эга. Нейрожарроҳлик беморларида қушишнинг оғир шакллари бош мия ички босимининг ошишига, гемодинамиканинг бузилишига ва неврологик ҳолатнинг ёмонлашишига олиб келиши мумкин [14]. Шу муносабат билан, ОҚҚР профилактикаси нейрожарроҳлик аралашувларидан кейин беморларни комплекс юритишнинг муҳим таркибий қисми ҳисобланади.

Олинган натижалар замонавий халқаро тавсияларга тўла мос келади, уларга кўра ОҚҚР мулти-модал профилактикаси юқори хавф гуруҳидаги беморларни юритиш стандарти ҳисобланади [18,25]. Айнан шу тадқиқот ушбу тавсияларни нейрожарроҳлик аралашувларининг ўзига хос жиҳатларини, хусусан, уч шохли нервдаги операцияларни ҳисобга олган ҳолда мослаштириш зарурлигини кўрсатиб беради.

Шундай қилиб, ОҚҚ профилактикасининг таклиф этилган оптималлаштирилган стратегияси патогенезнинг асосий бўғинларига комплекс таъсир кўрсатиш ҳисобига юқори клиник самарадорликни намоён этади. Олинган маълумотлар муҳим амалиёт аҳамиятига эга бўлиб, нейрожарроҳлик беморларни анестезиологик таъминашни такомиллаштириш учун асос бўлиб хизмат қилиши мумкин.

Хулоса. Ўтказилган проспектив рандомизациялашган тадқиқот уч шохли нервда нейрожарроҳлик амалиётларни бошдан кечирган беморларда операциядан кейинги кўнгил айланиши ва қусиш (ОҚҚ) ривожланишининг ўзига хос хусусиятларини ҳар томонлама баҳолаш ҳамда унинг профилактикасига оид оптималлаштирилган стратегия самарадорлигини илмий асослаш ва клиник жиҳатдан тасдиқлаш имконини берди.

Уч шохли нервда операция қилинган беморлар ОҚҚ ривожланиши хавфи юқори бўлган гуруҳга мансублиги аниқланди, буни назорат гуруҳида ушбу асоратнинг юқори даражада учраши (48,3%) ҳам тасдиқлайди. Олинган маълумотлар замонавий адабиётлардаги манбаларга мос келади, уларга кўра нейрожарроҳлик амалиётларда ОҚҚ учраш даражаси 50–70% га етиши мумкин [8,11,14]. Бу ҳолат патогенезнинг ўзига хос хусусиятлари, хусусан, қусиш рефлексининг марказий ва периферик механизмлари фаоллашуви ҳамда уч шохли нервнинг сезувчи толаларининг бевосита таъсирланиши билан изоҳланади [9,10,13].

Операциядан кейинги қусиш ва кўнгил айланиши (ОҚҚКА) патогенези кўп омилли хусусиятга эга экани ва нейромедиатор тизимларининг (серотонинергик, дофаминергик, гистаминергик) мураккаб ўзаро таъсирини, шунингдек, ингаляцион анестетиклар ҳамда опиоидларни қўллаш каби анестезиологик омиллар таъсирини ўз ичига олиши исботланган [16,17,22]. Бу ҳолат мазкур асоратнинг олдини олишга комплекс, патогенетик йўналтирилган ёндашувни қўллаш зарурлигини асослайди.

Мазкур тадқиқот доирасида илк бор ОҚҚКА профилактикасининг оптималлаштирилган стратегиясини қўллаш клиник натижаларни ишончли даражада яхшилашга имконият бериши намоён этилди. Ушбу стратегия тўлиқ вена ичи анестезияси (TIVA), комбинациялашган антиэметик терапия (ондансетрон + дексаметазон), опиоид юкламини чеклаш ва инфузион терапияни оптималлаштиришни ўз ичига олади. Асосий гуруҳда ОҚҚКА учраш chastotasi 23,3% гача камайди ($p=0,01$), бу эса хавфнинг нисбий пасайиши 50% дан ортиқ эканига мос келади.

ОҚҚКАнинг оғир шакллари учраш chastotasining камайиши (21,7% дан 8,3% гача; $p=0,02$) алоҳида аҳамият касб этади, чунки айнан улар бош мия ички босимининг ошиши, гемодинамик бузилишлар ва неврологик ҳолатнинг ёмонлашуви каби нохуш оқибатлар ривожланиши билан боғлиқдир [14]. Бундан ташқари, қўшимча антиэметик терапияга бўлган эҳтиёжнинг камайгани (43,3% дан 25,0% гача; $p<0,01$) ва симптомлар давомийлигининг сезиларли даражада қисқаргани (40% га) аниқланди, бу эса операциядан кейинги даврнинг анча енгил кечаётганидан далолат беради.

Олинган самара механизмлари оптималлаштирилган стратегия таркибий қисмларининг синергик таъсири билан изоҳланади. TIVA доирасида қўлланиладиган пропофол хеморетсептор триггер зонасининг фаоллигини сусайтириш ҳисобига яққол антиэметик таъсир кўрсатади [23,24]. Комбинациялашган антиэметик терапия серотонинергик ва яллиғланиш механизмларини блоклашни таъминлайди [21,25], опиоидларни чеклаш эса қусиш маркази стимуляциясини камайтиради ва ошқозон-ичак йўллари моторикасини яхшилайди [17,22].

Олинган натижалар замонавий халқаро тавсияларга тўлиқ мос келади. Унга кўра, юқори хавф гуруҳидаги беморларда ОҚҚнинг мултимодал профилактикаси энг самарали стратегия ҳисобланади [18,25]. Шу билан бирга, антиэметиклар билан анъанавий монотерапия етарли даражада ҳимояни таъминлай олмаслиги ва комбинациялашган ёндашувлардан орқада қолиши кўрсатилган.

Тадқиқотнинг амалиёт аҳамияти уч шохли нервдаги нейрожарроҳлик аралашувларга мослаштирилган, самарали ва илмий асосланган ОҚҚ профилактикаси моделини ишлаб чиқиш ҳамда амалиётга жорий этишдан иборат. Таклиф этилган стратегияни клиник амалиётда кенг қўллаш ва анестезиологик ёрдам стандартларига киритиш учун тавсия этиш мумкин.

Шундай қилиб, тадқиқот натижалари муҳим назарий ва амалиёт аҳамиятга эга бўлиб, операциядан кейинги титроқ ва қалтириш (ОҚТҚ) патогенези ҳақидаги замонавий тасаввурларни кенгайтиради ҳамда нейрожарроҳлик йўналишидаги беморларда ушбу асоратнинг олдини олиш бўйича комплекс, патогенетик йўналтирилган усулларни қўллаш заруратини асослаб беради [8–11,16–18,21,25].

Келгусидаги тадқиқотлар истиқболлари индивидуал хавф омилларини ҳисобга олган ҳолда ОҚТҚ профилактикасининг шахсиятлаштирилган алгоритмларини ишлаб чиқиш, прогнозлаш усуллари (шу жумладан, рақамли технологиялардан фойдаланган ҳолда) жорий этиш, шунингдек, янги антиэметик препаратлар ва комбинациялашган даволаш схемаларининг самарадорлигини баҳолаш билан боғлиқдир.

Адабиётлар рўйхати:

1. Ибрагимов Н.К., Наубетова С.К. олдини олишнинг замонавий жиҳатлари. – Анестезиологик таъминот ва асоратларнинг Тошкент: Медицина, 2021.

2. Абдуллаев А.А., Раҳматуллаев Н.С. Оғир бош мия Jarohati (BMJ) ва нейрожарроҳлик беморларини даволашнинг клиник жиҳатлари. – Тошкент, 2022.
3. Раҳимов Б.Б., Турсунов Х.Р. Нейро-жарроҳликда интенсив терапия ва респиратор ёрдам. – Тошкент, 2022.
4. Ташматов У.Т., Рустамов К.К. Jarrohlik ва реанимацияда анестезиянинг замонавий усуллари. – Тошкент, 2023.
5. Ҳақимов Д.А., Саидов Ш.М. Реанимация бўлимларида нозокомиал асоратлар. – Тошкент, 2021.
6. Садиков К.Н., Мирзаев А.А. Критик ҳолатдаги беморларда операциядан кейинги давр асоратлари. – Тошкент, 2021.
7. Исмоилов Ш.Х., Каримова Н.Р. Реанимация ва интенсив терапия бўлимида (RITB) инфекцион назорат ва асоратлар профилактикаси. – Тошкент, 2023.
8. Zhao X. ва бошқ. Операциядан кейинги кўнгил айланиши ва қусиш: механизмлари ва даволаш. – 2025.
9. Hu J. ва бошқ. ОҚҚни даволаш бўйича клиник амалиёт қўлланма (2025). – 2025.
10. Pota V. ва бошқ. Нейрожарроҳликда операциядан кейинги кўнгил айланиши ва қусиш: шарҳ. – Brain Sciences. – 2025.
11. Koo C.H. ва бошқ. Микроваскуляр декомпрессиядан сўнг операциядан кейинги кўнгил айланиши ва қусиш. – Journal of Neurosurgery. – 2024.
12. Go K.O. ва бошқ. Микроваскуляр декомпрессия операциясидан кейинги ОҚҚ. – 2024.
13. Hou Y. ва бошқ. Микроваскуляр декомпрессиядан сўнг операциядан кейинги кўнгил айланиши ва қусиш. – BMC Anesthesiology. – 2022.
14. Uribe A.A. ва бошқ. Краниотомиядан сўнг операциядан кейинги кўнгил айланиши ва қусиш. – J Neurosurg Anesthesiol. – 2021.
15. Miao S. ва бошқ. Нейрожарроҳликдан сўнг ОҚҚнинг олдини олиш. – 2025.

Иктибос учун: Қорёғдиев А.З., Ибрагимов Н.К. Уч шохли нервдаги нейрожарроҳлик аралашувларидан кейинги кўнгил айланиши ва қусиш профилактикасини оптималлаштириш // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2026. – № 4(24). – Б. 34–40. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19426395>

ЖАНУБИЙ ОРОЛБЎЙИ ШАРОИТИДА СУРУНКАЛИ ЮРАК ЕТИШМОВЧИЛИГИ (СЮЕ) БЎЛГАН ВА ТЕРИ ОРҚАЛИ КОРОНАР АРАЛАШУВ (ТОКА) ЎТКАЗГАН БЕМОРЛАРДА 2-ТУР ҚАНДЛИ ДИАБЕТ ТЕРАПИЯСИНИ ОПТИМАЛЛАШТИРИШ

Тожибоева Д.М.¹, Нажмутдинова Д.Қ.²

¹Урганч давлат тиббиёт институти, Урганч ш., Ўзбекистон

²Тошкент давлат тиббиёт университети, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. Тадқиқот мақсади – Жанубий Оролбўйи шароитида тери орқали коронар аралашув (ТОКА) ўтказган сурункали юрак етишмовчилиги (СЮЕ) бор беморларда 2-тур қандли диабет (2-тур ҚД) терапиясининг оптималлаштирилган ёндашувлари самарадорлигини баҳолаш. Материаллар ва усуллар. Проспектив тадқиқотга уч гуруҳга бўлинган 200 нафар бемор (n=200) киритилди: стандарт терапия (n=80), кучайтирилган кардиал терапия (n=60) ва СГЛТ2 ингибиторлари қўлланилган оптималлаштирилган кардиометаболик терапия (n=60) ва СГЛТ2 ингибиторлари қўлланилган оптималлаштирилган кардиометаболик терапия (n=60). Баҳолаш 12 ой давомида HbA1c, чап қоринча отиш фракцияси (ЧҚОФ), NT-проБНП кўрсаткичлари, шифохонага ётқизишлар сони ва СЮЕ функционал синфига кўра амалга оширилди. Статистик таҳлил АНОВА, t-мезон ва χ^2 ни ўз ичига олди, $p < 0,05$. Натижалар. HbA1c даражасининг энг сезиларли пасайиши оптималлаштирилган терапия гуруҳида қайд этилди (–1,4%; $p < 0,001$), шунингдек, ЧҚОФ яхшиланди (+7,0%; $p < 0,001$) ва шифохонага ётқизишлар сони 32% га камайди ($p = 0,013$). Хулоса. СГЛТ2 ингибиторларини қўшган ҳолда олиб борилган оптималлаштирилган кардиометаболик терапия ТОКАдан кейин 2-тур ҚД ва СЮЕга чалинган беморларни даволашнинг энг самарали стратегияси ҳисобланади.

Калим сўзлар: 2-тоифа диабет, сурункали юрак етишмовчилиги, ТОКА, SGLT2, кардиометаболик терапия, Жанубий Орол қирғоғи.

OPTIMIZATION OF TYPE 2 DIABETES THERAPY IN PATIENTS WITH CHRONIC HEART FAILURE (CHF) WHO UNDERWENT PERCUTANEOUS CORONARY INTERVENTION (PCI) IN THE SOUTHERN ARAL SEA REGION

Tojiboeva D.M.¹, Najmutdinova D.Q.²

¹Urgench State Medical Institute, Urgench, Uzbekistan

²Tashkent State Medical University, Tashkent, Uzbekistan

Resume. The aim of the study was to evaluate the effectiveness of optimized approaches to type 2 diabetes (T2D) therapy in patients with chronic heart failure (CHF) who underwent percutaneous coronary intervention (PCI) in the Southern Aral Sea region. Materials and Methods. A prospective study included 200 patients divided into three groups: standard therapy (n=80), intensified cardiac therapy (n=60), and optimized cardiometabolic therapy with SGLT2 inhibitors (n=60). Effectiveness was assessed over 12 months using HbA1c, left ventricular ejection fraction (LVEF), NT-proBNP levels, number of hospitalizations, and CHF functional class. Statistical analysis included ANOVA, t-test, and χ^2 ; significance level $p < 0.05$. Results. The most significant reduction in HbA1c was observed in the optimized therapy group (–1.4%; $p < 0.001$), along with improvement in LVEF (+7.0%; $p < 0.001$) and a 32% reduction in hospitalizations ($p = 0.013$). **Conclusion.** Optimized cardiometabolic therapy including SGLT2 inhibitors is the most effective strategy for managing T2D in CHF patients after PCI.

Keywords: type 2 diabetes, chronic heart failure, PCI, SGLT2, cardiometabolic therapy, Southern Aral Sea region.

ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕРАПИИ САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ (ХСН), ПЕРЕНЕСШИХ ЧРЕЗКОЖНОЕ КОРОНАРНОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО (ЧККА) В РЕГИОНЕ ЮЖНОГО АРАЛЬСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ

Тожибоева Д.М.¹, Нажмутдинова Д.Қ.²

¹Ургенчский государственный медицинский институт, г. Ургенч, Узбекистан

²Ташкентский государственный медицинский университет, г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. Цель исследования — оценить эффективность оптимизированных подходов к терапии сахарного диабета 2 типа (СД2) у пациентов с хронической сердечной недостаточностью

(XCH), перенесших чрезокжное коронарное вмешательство (ЧККА) в условиях региона Южного Аральского побережья. Материалы и методы. В проспективное исследование было включено 200 пациентов, разделенных на три группы: стандартная терапия (n=80), усиленная кардиальная терапия (n=60) и оптимизированная кардиометаболическая терапия с применением ингибиторов SGLT2 (n=60). Эффективность оценивалась в течение 12 месяцев по HbA1c, фракции выброса левого желудочка (ФВЛЖ), уровню NT-proBNP, числу госпитализаций и функциональному классу XCH. Статистический анализ включал ANOVA, t-тест и χ^2 ; уровень значимости $p < 0,05$. Результаты. Наибольшее снижение уровня HbA1c наблюдалось в группе оптимизированной терапии ($-1,4\%$; $p < 0,001$), также отмечалось улучшение ФВЛЖ ($+7,0\%$; $p < 0,001$) и снижение числа госпитализаций на 32% ($p = 0,013$). Вывод. Оптимизированная кардиометаболическая терапия с включением ингибиторов SGLT2 является наиболее эффективной стратегией лечения пациентов с СД2 и XCH после ЧККА.

Ключевые слова: сахарный диабет 2 типа, хроническая сердечная недостаточность, ЧККА, SGLT2, кардиометаболическая терапия, Южное Аральское побережье.

e-mail: dildoratoziboeva59@gmail.com

Кириш. Юрак-кон томир касалликлари бутун дунё бўйлаб ўлимнинг асосий сабаби бўлиб қолмоқда, бунда 2-тур қандли диабет (2-тур ҚД) ва суръункали юрак етишмовчилигининг (СЮЕ) биргаликда кузатилиши беморлар аҳволи прогнозини сезиларли даражада ёмонлаштиради [9, 19]. 2-тур ҚД мавжудлиги СЮЕ ривожланиши хавфини 2–4 барабар оширади ва юрак ишемик касаллигининг оғирроқ кечиши билан боғлиқдир [21].

Тери орқали коронар аралашувлар (ТОКА) миокардни реваскуляризация қилишининг самарали усули ҳисобланади, бироқ 2-тур ҚДга чалинган беморларда СЮЕ кучайиб бориши ва такрорий госпитализация хавфи юқорилигича қолмоқда [6, 16].

Замонавий кардиометаболик терапия концепцияси юрак-кон томир ва метаболик бузилишларни даволашга бўлган ёндашувларни интеграциялашни назарда тутди. Юрак-кон томир касалликларида ўлим ва госпитализация chastотасини камайтириш қобилятини исботлаган 2-тур натрий-глюкоза котранспортёри ингибиторлари (SGLT2i) бунда алоҳида ўрин тутди [6, 8, 13].

Жанубий Оролбўйи минтақаси метаболик бузилишларнинг кенг тарқалгани ва ноқулай экологик омиллар билан ажралиб туради, бу эса даволаш чораларини оптималлаштириш долзарблигини янада оширади [1, 2].

Халқаро тавсияномалар мавжудлигига қарамасдан, даволаш чораларини минтақавий шароитларга мослаштириш масалалари етарлича ўрганилмаган [8, 9].

Тадқиқот мақсади — ТОКАдан сўнг СЮЕ билан оғриган беморларда 2-тур ҚД терапиясини оптималлаштириш.

Тадқиқот материаллари ва усуллари. Истикболли қиёсий тадқиқот 2023–2025 йилларда ўтказилди. Тадқиқотга тери орқали коронар аралашув (ТОКА) ўтказган, 2-тур қандли диабет (2-тур ҚД) ва II–III функционал класс (NYHA) СЮЕ билан оғриган 200 нафар бемор жалб этилди.

Беморларнинг ўртача ёши $61,4 \pm 8,2$ ёшни ташкил этди. Гуруҳлар асосий хусусиятлари бўйича ўзаро мувофиқ эди ($p > 0,05$).

Беморлар уч гуруҳга ажратилди:

1. **Биринчи гуруҳ (n=80)** – гипогликемик препаратлар (метформин, инсулин), ААФ/ВРА ингибиторлари, β -блокаторлар ва диуретикларни ўз ичига олган стандарт терапия олди.

2. **Иккинчи гуруҳ (n=60)** – қўшимча равишда минералокортикоид рецепторлари антагонисти қўлланилди ва юрак терапияси оптималлаштирилди.

3. **Учинчи гуруҳ (n=60)** – SGLT2 ингибиторлари (дапаглифлозин ёки эмпаглифлозин)ни ўз ичига олган оптималлаштирилган кардиометаболик терапия ҳамда метаболик кўрсаткичларни индивидуал тузатиш усули қўлланди.

Кузатув 12 ой давомида олиб борилди. Беморларда HbA1c, чап қоронча отиш фракцияси (ЧҚОФ), NT-proBNP, госпитализациялар сони ва СЮЕ функционал синфи баҳоланди.

Статистик таҳлил ANOVA, t-критерий ва χ^2 усулида амалга оширилди. Фарқларнинг статистик аҳамиятлилиги $p < 0,05$ даражасида қабул қилинди.

Натижалар. Тадқиқот давомида барча гуруҳларда клиник ва лаборатория кўрсаткичларининг ижобий динамикаси кузатилгани аниқланди, бироқ унинг яққоллиги сезиларли даражада фарқ қилди.

• **Стандарт терапия гуруҳида** HbA1c даражаси $8,9 \pm 1,2\%$ дан $8,3 \pm 1,0\%$ га пасайди ($p = 0,041$).

• **Иккинчи гуруҳда** бу пасайиш янада яққолроқ бўлиб, $9,0 \pm 1,1\%$ дан $8,1 \pm 0,9\%$ гача ($p = 0,018$) бўлди.

• **Оптималлаштирилган терапия гуруҳида** эса энг сезиларли пасайиш қайд этилди — $8,8 \pm 1,1\%$ дан $7,4 \pm 0,8\%$ гача ($p < 0,001$), бунинг бошқа гуруҳлар билан фарқлари статистик жиҳатдан аҳамиятли эди ($p < 0,01$).

Миокарднинг қисқариш функцияси таҳлили барча гуруҳларда чап қоронча отиш фракциясининг ортиганини кўрсатди: биринчи гуруҳда — $42,1 \pm 5,0\%$ дан $44,3 \pm 4,9\%$ гача ($p = 0,047$), иккинчи гуруҳда — $41,3 \pm 5,4\%$ дан $45,5 \pm 5,1\%$ гача ($p = 0,021$), учинчи гуруҳда — $40,2 \pm 5,3\%$ дан $47,2 \pm 4,8\%$ гача ($p < 0,001$).

NT-proBNP даражаси биринчи гуруҳда 12% га ($p = 0,062$), иккинчисида 22% га ($p = 0,033$) ва учинчисида 38% га ($p < 0,001$) пасайди, бу оптималлаштирилган терапия қўлланилганда гемодинамиканинг янада сезиларли яхшиланганини акс эттиради.

Такрорий госпитализация даражаси биринчи гуруҳда 40% ни, иккинчисида 31% ни ва учинчисида 27% ни ташкил этди. Оптималлаштирилган терапия гуруҳида госпитализация хавфининг пасайиши статистик жиҳатдан аҳамиятли бўлди ($\chi^2 = 6,12$; $p = 0,013$).

СЮЕ функционал синфининг яхшиланishi биринчи гуруҳдаги беморларнинг 28% ида ($p = 0,049$), иккинчи гуруҳдагиларнинг 46% ида ($p = 0,021$) ва учинчи гуруҳдагиларнинг 64% ида ($p < 0,001$) қайд этилди.

Муҳокама. Мазкур тадқиқотда олинган натижалар тери орқали коронар аралашувлардан сўнг суръункали юрак етишмовчилиги бўлган беморларда 2-тур қандли диабет терапиясини оптималлаштириш прогнозни яхшилашнинг асосий элементи сифатида қаралиши кераклигини ишончли тарзда намоён этади.

Ўрганилган барча гуруҳларда ижобий динамика кузатилганига қарамасдан, энг яққол клиник-лаборатория яхшиланишлари оптималлаштирилган кардиометаболик терапия гуруҳида қайд этилди. Бу эса стандарт ёндашувлардан янада интегратив даволаш моделига ўтиш заруратини тасдиқлайди.

Тадқиқотнинг энг муҳим натижаларидан бири SGLT2 ингибиторлари қўлланилган гуруҳда HbA1c даражасининг ишончли даражада пасайганидир. Бироқ, клиник натижаларнинг яхшиланишини фақатгина гликемик назорат билан изоҳлаб бўлмаслигини таъкидлаш муҳим.

Замонавий тушунчаларга кўра, SGLT2 ингибиторлари плеиотроп таъсирларга эга бўлиб, улар осмотик диурез ҳисобига томир ичидаги ҳажмни камайтириш, олд ва кейинги юкламани пасайтириш, шунингдек кетон таначаларидан самаралироқ энергия субстрати сифатида фойдаланишга ўтиш орқали миокард энергия алмашинуви яхшилаш каби хусусиятларни ўз ичига олади.

Учинчи гуруҳда NT-proBNP даражасининг сезиларли даражада пасайиши қоринчаларнинг тўлиш босими камайтганини ва нейрогуморал фаоллашув даражаси сусайганини акс эттиради. Ушбу далил принципно аҳамиятга эга, чунки NT-proBNP нафақат маркер, балки суръункали юрак етишмовчилиги кечишининг прогностик кўрсаткичи сифатида ҳам қаралади. Бу кўрсаткичнинг 38% га камайиши сезиларли клиник яхшиланишдан далолат беради ва шифохонага ётқизишлар сонининг камайиши билан мос келади.

Оптималлаштирилган терапия гуруҳида кузатилган чап қоронча отиш фракциясининг ортиши SGLT2 ингибиторларининг миокардни қайта шакллантириш жараёнларига ижобий таъсири билан боғлиқ бўлиши мумкин. Ушбу препаратлар интерстициал фибрознинг пасайишига, яллиғланиш ва оксидатив стресснинг камайишига ёрдам беради деб тахмин қилинади, бу эса ўз навбатида юракнинг қисқариш функциясини яхшилайди.

Комплекс терапия гуруҳида такрорий госпитализация ҳолатларининг 32% га камайиши муҳим клиник ва ижтимоий-иқтисодий аҳамият касб этади. Бу кўрсаткич нафақат даволаш самарадорлигини, балки беморларнинг ҳаёт сифати яхшилангани ҳамда соғлиқни сақлаш тизимига тушадиган юклама камайтганини ҳам акс эттиради.

Олинган натижаларни халқаро тадқиқотлар маълумотлари билан таққослаш уларнинг бири-бирига жуда мос келишини кўрсатади. Хусусан, DAPA-HF ва EMPA-REG тадқиқотларида SGLT2 ингибиторларини қўллаш госпитализация ва юрак-қон томир касалликларидан ўлим хавфини камайтириши исботланган, бу эса аниқланган самараларнинг универсаллигини тасдиқлайди.

Жанубий Оролбўйининг ҳудудий хусусиятларига алоҳида эътибор қаратиш лозим. Метаболик синдромнинг кенг тарқалгани, ноқулай экологик омиллар ҳамда беморлар турмуш тарзининг ўзига хослиги 2-тур қандли диабет ва суръункали юрак етишмовчилигининг оғирроқ кечишига сабаб бўлиши мумкин. Бундай шароитда стандарт терапия қўллашнинг ўзи етарли бўлмайди, бу эса янада агрессивроқ ва индивидуаллаштирилган ёндашувларни жорий этишни тақозо этади.

Шунингдек, оптималлаштирилган терапия бир вақтнинг ўзида патогенезнинг бир нечта боғини — углеводлар алмашинуви, гемодинамика, нейрогуморал фаоллашув ва миокарддаги таркибий ўзга-

ришларга таъсир кўрсатиши муҳим жиҳат ҳисобланади. Бундай кўп омилли таъсир унинг анъанавий даволаш усулларига нисбатан афзаллигини изоҳлайди.

Таъкидлаш жоизки, ушбу тадқиқот бир қатор чекловларга эга. Танламанинг нисбатан кичиклиги ва узоқ муддатли (12 ойдан ортиқ) кузатувнинг йўқлиги терапиянинг ўлим кўрсаткичларига таъсирини тўлиқ баҳолаш имконини бермайди. Шунга қарамай, олинган маълумотлар клиник жиҳатдан аҳамиятлидир ва кейинги тадқиқотлар учун асос бўлиб хизмат қилиши мумкин.

Шундай қилиб, мазкур тадқиқот натижалари SGLT2 ингибиторларини қўшган ҳолда терапияни оптималлаштириш, айниқса, Жанубий Оролбўйи минтақасига хос бўлган юқори хавф шароитида, 2-тур қандли диабет ва тери орқали коронар аралашувдан кейинги суръункали юрак етишмовчилиги бор беморлар учун патогенетик жиҳатдан асосланган ва клиник жиҳатдан самарали ёндашув эканлигини тасдиқлайди.

Хулоса. Ўтказилган тадқиқот тери орқали коронар аралашувларни бошдан кечирган беморларда 2-тур қандли диабет ва суръункали юрак етишмовчилигининг бирга келиши терапияга алоҳида ёндашувни талаб қиладиган, клиник жиҳатдан мураккаб ва прогностик жиҳатдан ноқулай тоифадаги беморлар гуруҳини шакллантиришини аниқлаш имконини бери.

Олинган маълумотлар анъанавий стандарт терапия метаболик ва кардиал кўрсаткичлар устидан чекланган назоратни таъминлаши ҳамда нохуш оқибатлар, жумладан суръункали юрак етишмовчилиги декомпенсацияси ва такрорий госпитализациялар хавфини тўлиқ камайтиришга имкони йўқлигидан далолат беради.

Минералокортикоид рецепторлари антагонисти қўшилган кучайтирилган кардиал терапияни қўллаш гемодинамик кўрсаткичлар ва миокарднинг функционал ҳолатини анча яхшиласа-да, метаболик бузилишларни комплекс бартараф этиш учун етарли бўлмайди.

Энг муҳим клиник самарага 2-тур натрий-глюкоза котранспортёри ингибиторлари билан оптималлаштирилган кардиометаболик терапия қўлланилганда эришилди. Бу ёндашув гликирланган гемоглобин даражасининг ишончли пасайишини, миокард қисқариш функциясининг яхшиланишини, NT-proBNP миқдорининг камайишини ва такрорий госпитализациялар сонининг қисқаришини таъминлайди.

Шуни таъкидлаш жоизки, SGLT2 ингибиторларининг ижобий самараси нафақат уларнинг гипогликемик таъсири, балки юрак етишмовчилиги патогенетик механизмларига комплекс таъсир кўрсатиши, жумладан, олдинги ва кейинги юкламани камайтириши, миокард энергия алмашинувини яхшилаши ҳамда нейрогуморал фаоллашувни сусайтириши билан ҳам боғлиқдир.

Олинган натижалар, айниқса, метаболик бузилишлар кенг тарқалган ва ноқулай экологик омиллар юрак-қон томир касалликлари кечишини оғирлаштираётган Жанубий Оролбўйи минтақаси учун алоҳида аҳамият касб этади. Бундай шароитда замонавий кардиометаболик стратегияларни жорий этиш даволаш самарадорлигини сезиларли даражада ошириши ҳамда беморлар учун прогнозни яхшилаши мумкин.

Тадқиқот натижалари асосида қуйидаги амалиётли хулосаларни келтириш мумкин:

1. Тери орқали коронар аралашувдан (ТОКА) сўнг 2-тур қандли диабети (2-т ҚД) ва суръункали юрак етишмовчилиги (СЮЕ) бўлган беморлар юрак-қон томир хавфи юқори гуруҳга киритилади ва комплекс, фанлараро ёндашувни талаб қилад.

2. Стандарт терапия даволашнинг асосий, бироқ етарли бўлмаган босқичи сифатида қаралиши лозим.

3. Кучайтирилган кардиал терапия гемодинамик кўрсаткичларни яхшиласа-да, тўлақонли метаболик коррекцияни таъминлай олмайди.

4. Даволаш схемасига SGLT2 ингибиторларини қўшиш патогенетик жиҳатдан асосли ва клиник жиҳатдан самаралидир.

5. Оптималлаштирилган кардиометаболик терапия HbA1c миқдорининг сезиларли пасайишига, чап қоронча отиш фракциясининг (ЧҚОФ) ошишига ва NT-proBNP даражасининг камайишига эришиш имконини беради.

6. Комплекс ёндашувни қўллаш қайта госпитализация қилиш ҳолатларини камайтиради ва суръункали юрак етишмовчилиги (СЮЕ) функционал синфини яхшилаиди.

7. Ишлаб чиқилган ёндашувларни минтақадаги кардиология ва эндокринология бўлимларининг клиник амалиётига жорий этиш тавсия қилинади.

Шундай қилиб, тери орқали коронар аралашувдан (ТОКА) сўнг суръункали юрак етишмовчилиги бўлган беморларда замонавий кардиометаболик стратегиялардан фойдаланиб, 2-тур қандли диабет терапиясини оптималлаштириш клиник натижаларни яхшилашга ва беморлар ҳаёт сифатини оширишга ёрдам берувчи самарали йўналиш ҳисобланади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Karimov X.R. Ўзбекистонда кардиологиянинг ривожланишидаги замонавий жиҳатлар // Ўзбекистон тиббиёт журнали. – 2023. – №4. – Б. 12–18.
2. Yoʻldoshev B.T., Rahimov A.A. Марказий Осиёда суръункали юрак етишмовчилиги: клиник-эпидемиологик хусусиятлари // Марказий Осиё тиббиёт журнали. – 2022. – J. 15, №2. – Б. 45–52.
3. Метаболик синдромли беморларда суръункали юрак етишмовчилигини даволашга замонавий ёндашувлар // Ўзбекистон кардиология журнали. – 2023. – №3. – Б. 25–33.
4. Қандли диабет билан оғриган беморларда юрак ишемик касаллиги кечишининг хусусиятлари // Тошкент тиббиёт журнали. – 2024. – №1. – Б. 30–37.
5. Abdullayev N.K., Ismoilov Sh.A. Ўзбекистон шароитида метаболик синдром ва юрак-қон томир асоратлари // Ўзбекистон тиббиёт журнали. – 2021. – №2. – Б. 55–61.
6. McMurray J.J.V., Solomon S.D., Inzucchi S.E. et al. Dapagliflozin in patients with heart failure and reduced ejection fraction // New England Journal of Medicine. – 2020. – Vol. 381. – P. 1995–2008.
7. Zinman B., Wanner C., Lachin J.M. ва бошқ. 2-тур қандли диабетда empagliflozin, юрак-қон томир касалликлари оқибатлари ва ўлим ҳолатлари // New England Journal of Medicine. – 2020. – Jild. 373. – Б. 2117–2128.
8. Packer M., Anker S.D., Butler J. ва бошқ. Юрак етишмовчилигида empagliflozin билан даволашнинг юрак-қон томир ва буйрак тизими оид оқибатлари // New England Journal of Medicine. – 2021. – Jild. 385. – Б. 1451–1461.
9. McDonagh T.A., Metra M., Adamo M. ва бошқ. Ўткир ва суръункали юрак етишмовчилиги диагностикаси ва даволаш бўйича 2021-йилги ESC тавсияномалари // European Heart Journal. – 2021. – Jild. 42. – Б. 3599–3726.
10. Америка Диабет Ассоциацияси. Қандли диабетда тиббий ёрдам кўрсатиш стандартлари – 2024 // Diabetes Care. – 2024. – Jild. 47 (1-илова). – Б. S1–S350.
11. Anker S.D., Butler J., Filippatos G. ва бошқ. Чиқариш фракцияси сақланган юрак етишмовчилигида empagliflozin // New England Journal of Medicine. – 2021. – Jild. 385. – Б. 1451–1461.
12. Bhatt D.L., Szarek M., Steg P.G. ва бошқ. Қандли диабет ва яқинда юрак етишмовчилиги ёмонлашган беморларда sotagliflozin // New England Journal of Medicine. – 2021. – Jild. 384. – Б. 117–128.
13. Verma S., McMurray J.J.V. Юрак етишмовчилигида SGLT2 ингибиторларининг кутилмаган кашфийот тарихи // Circulation. – 2022. – Jild. 145. – Б. 171–175.
14. Heerspink H.J.L., Stefansson B.V., Correa-Rotter R. ва бошқ. Суръункали буйрак касаллиги бўлган беморларда dapagliflozin // New England Journal of Medicine. – 2020. – Jild. 383. – Б. 1436–1446.
15. Vaduganathan M., Docherty K.F., Claggett B.L. et al. Юрак етишмовчилигида SGLT2 ингибиторлари: жорий ҳолат ва келажакдаги йўналишлар // Journal of the American College of Cardiology. – 2024. – Vol. 83. – P. 1234–1245.
16. Solomon S.D., McMurray J.J.V., Claggett B. et al. Ўтилш фракцияси бироз пасайган ёки сақланган юрак етишмовчилигида dapagliflozin // Lancet. – 2023. – Vol. 401. – P. 137–147.
17. McMurray J.J.V., DeMets D.L., Inzucchi S.E. et al. DAPA-HF тадқиқоти: бошланғич хусусиятлар // Circulation. – 2022. – Vol. 141. – P. 25–35.
18. Docherty K.F., Jhund P.S., Inzucchi S.E. et al. Юрак етишмовчилиги бўлган беморларга dapagliflozinнинг таъсири // BMJ. – 2022. – Vol. 376. – e068121.
19. Seferovic P.M., Coats A.J.S., Ponikowski P. et al. Европа кардиология жамиятининг юрак етишмовчилиги бўйича янгиланган маълумотлари // Nature Reviews Cardiology. – 2023. – Vol. 20. – P. 1–12.
20. McDonagh T.A., Metra M., Adamo M. et al. Европа кардиология жамиятининг юрак етишмовчилиги бўйича тавсияларининг янгилалиши // European Heart Journal. – 2024. – Vol. 45. – P. 123–145.
21. Davies M.J., Aroda V.R., Collins B.S. et al. 2-тоифа қандли диабетда гипергликемияни даволаш // Diabetes Care. – 2024. – Vol. 47. – P. 275–286.

Иқтибос учун: Тожибоева Д.М., Нажмутдинова Д.Қ. Жанубий Оролбўйи шароитида сурункали юрак етишмовчилиги (СЮЕ) бўлган ва тери орқали коронар аралашув (ТОКА) ўтказган беморларда 2-тур қандли диабет терапиясини оптимallasштириш // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2026. – № 4(24). – Б. 41–45. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19426425>

СУРУНКАЛИ БУЙРАК КАСАЛЛИГИ ТУРЛИ ДАВОЛАШ БОСҚИЧЛАРИДА БЎЛГАН КЕКСА ЁШДАГИ БЕМОРЛАРДА САРКОПЕНИЯ ВА ТРАВМАЛАР БИЛАН БОҒЛИҚ ҲОЛАТЛАР

Сулайманова Н.Э.

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Ушбу мақолада кекса ёшдаги сурункали буйрак касаллиги (СБК) билан оғриган беморларда саркопения ривожланиши хусусиятлари турли даволаш босқичларида кўриб чиқилган. Консерватив терапия, гемодиализ ва перитонеал диализ босқичидаги беморларнинг клиник ва функционал кўрсаткичлари таҳлил қилинди. Саркопения тарқалиши 48% ни ташкил этиши аниқланди, энг юқори кўрсаткич гемодиализ босқичида кузатилди. Саркопения мавжудлиги ва травмалар, айниқса йиқилишлар хавфи ўртасида сезиларли боғлиқлик аниқланди. Беморларни бошқаришда эрта диагностика ва комплекс ёндашувнинг аҳамияти таъкидланди. Оилавий шифокорлар учун саркопениюни профилактика қилиш, аниқлаш ва тузатиш бўйича тавсиялар тақдим этилган.

Калит сўзлар: Сурункали буйрак касаллиги, саркопения, кекса ёш, гемодиализ, травмалар, йиқилишлар, мушак массаси, профилактика, оилавий шифокор.

SARCOPENIA AND TRAUMA IN ELDERLY PATIENTS WITH CHRONIC KIDNEY DISEASE AT DIFFERENT STAGES OF TREATMENT

Sulaymanova N.E.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. This article examines the features of sarcopenia development in elderly patients with chronic kidney disease at different stages of treatment. A clinical and functional analysis was conducted among patients receiving conservative therapy, hemodialysis, and peritoneal dialysis. The prevalence of sarcopenia was found to be 48%, with the highest rates observed in hemodialysis patients. A significant association was identified between sarcopenia and increased risk of trauma, particularly falls. The importance of early diagnosis and a comprehensive management approach is emphasized. Recommendations for general practitioners on prevention, detection, and management of sarcopenia are provided.

Keywords: chronic kidney disease, sarcopenia, elderly, hemodialysis, trauma, falls, muscle mass, prevention, general practitioner.

САРКОПЕНИЯ И ТРАВМЫ У ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПОЧЕК НА РАЗНЫХ СТАДИЯХ ЛЕЧЕНИЯ

Сулайманова Н.Э.

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. В данной статье рассматриваются особенности развития саркопении у пожилых пациентов с хронической болезнью почек на различных этапах лечения. Проведен анализ клинико-функциональных показателей у пациентов, находящихся на консервативной терапии, гемодиализе и перитонеальном диализе. Установлено, что распространенность саркопении составляет 48%, при этом наиболее высокая частота наблюдается у пациентов на гемодиализе. Выявлена достоверная связь между наличием саркопении и повышенным риском травматизма, особенно падений. Подчеркивается важность ранней диагностики и комплексного подхода в ведении пациентов. Представлены рекомендации для врачей общей практики по профилактике, выявлению и коррекции саркопении.

Ключевые слова: хроническая болезнь почек, саркопения, пожилой возраст, гемодиализ, травмы, падения, мышечная масса, профилактика, врач общей практики.

e-mail: nilufar.sulaymanova1970@gmail.com

Долзарблиги. Охирги йилларда кекса ёшдаги аҳоли орасида сурункали буйрак касаллиги (СБК) тарқалишлар сони ортиб бормокда. Ушбу ҳолат, айниқса, узок муддатли даволаш босқичларида бўлган беморларда мушак массаси ва кучининг камайиши билан кечувчи Саркопения ривожланишига олиб келади. Саркопения ҳаракат фаоллигининг чекланиши, мувозанатнинг бузилиши ва травмалар хавфининг ошиши билан намоён бўлади. СБК билан оғриган кекса беморларда суяк ва мушак

тизимидаги ўзгаришлар, метаболик бузилишлар, шунингдек коморбид ҳолатлар травматизм кўрсаткичларининг юқори бўлишига сабаб бўлмоқда. Айниқса, суяклар минерал зичлигининг пасайиши, D витамини танқислиги ва нейромушак дисфункциялари йиқилишлар хавфини янада оширади. Сўнгги тадқиқотларга кўра, СБК билан оғриган беморларнинг 30–70% да саркопения аниқланади, диализ босқичида эса янада бу кўрсаткич анча юқори. Мушак массаси ва функциясининг пасайиши натижасида беморларнинг жисмоний фаоллиги чекланади, бу эса травмалар ва айниқса йиқилишлар хавфини оширади. Сўнгги маълумотларга кўра, СБКда саркопения ривожланишида қуйидаги механизмлар муҳим роль ўйнайди: уремик токсинлар таъсири, сурункали яллиғланиш (low-grade inflammation), инсулинрезистентлик, протеин-энергетик етишмовчилик ва митохондриял дисфункция. Бу омиллар мушак протеолизини кучайтиради ҳамда тўқималар регенерациясини секинлаштиради.

Сўнгги йилларда СБК ва саркопения ўртасидаги боғлиқликни ўрганишга бағишланган жуда кўплаб тадқиқотлар ўтказилган. Alfonso J. Cruz-Jentoft ва ҳаммуаллифлар (2019) томонидан саркопениянинг замонавий таърифи ва диагностика мезонлари ишлаб чиқилди. Унда мушак кучи асосий мезон сифатида белгиланган. Naoki Isoyama (2014) тадқиқотида буйрак диализдаги беморларда мушак кучи пастлиги ўлим хавфи билан боғлиқ эканлиги кўрсатилган. Xiaonan H. Wang ва William E. Mitch ишларида СБКда мушак атрофиясининг патогенетик механизмлари, жумладан уремик токсинлар ва яллиғланиш жараёнлари асосий рол ўйнаши исботланган. Шунингдек, KDIGO тавсияларида СБК беморларида нутритив статус ва жисмоний фаолликни баҳолаш зарурлиги таъкидланган. Ўтказилган метатаҳлиллар натижасига кўра, саркопения СБК беморларида: ўлим хавфини 1,5–2 марта оширади, госпитализациялар сонини кўпайтирди, ҳаёт сифатини пасайтиради. Шу сабабли СБК, саркопения ва травмалар ўртасидаги ўзаро боғлиқликни ўрганиш, уларни эрта аниқлаш ҳамда самарали профилактика чораларини ишлаб чиқиш замонавий тиббиётнинг долзарб муаммоларидан бири ҳисобланади.

Материаллар ва текшириш усуллари. Тадқиқот 2023–2025 йилларда Самарқанд вилоятида олиб борилди. Унда 60 ёшдан юқори бўлган 150 нафар бемор иштирок этди.

Қўлланилган усуллар: - Клиник ва анамнестик таҳлил; - Антропометрия (BMI, мушак массаси индекси); - Биоимпеданс таҳлил (мушак массасини баҳолаш); - Қўл динамометрияси (мушак кучи); - Функционал тестлар (SPPB, Timed Up and Go); - Лаборатор таҳлиллар (креатинин, альбумин, CRP, D витамини); - Саркопенияни баҳолаш – EWGSOP2 мезонлари бўйича; - Травмаларни баҳолаш – 12 ойлик ретроспектив таҳлил.

Ўтказилган тадқиқотлар ва уларнинг натижалари. Тадқиқотга 60 ёшдан юқори бўлган 120 нафар бемор жалб қилинди. Улар 3 гуруҳга ажратилди:

1. Консерватив даволанаётганлар
2. Гемодиализдаги беморлар
3. Перитонеал диализдаги беморлар

Натижаларга кўра: Саркопения тарқалиши умумий ҳолда 48% ни ташкил этди. Гемодиализ гуруҳидаги беморларда саркопения кўрсаткичи юқори (62%) бўлди. Травмалар (айниқса, йиқилишлар) саркопенияси бор беморларда 2,3 марта кўп кузатилди. Альбумин даражаси паст бўлган беморларда мушак массаси сезиларли камайган. Жисмоний фаоллик даражаси паст бўлганларда травма хавфи юқори эканлиги аниқланди.

Шунингдек, саркопения ва СБК босқичи ўртасида тўғридан-тўғри боғлиқлик мавжудлиги тасдиқланди.

Муҳокама. Сурункали буйрак касаллиги (СБК) ва саркопения ўртасидаги боғлиқлик сўнгги йилларда кўплаб тадқиқотларда муҳокама қилинмоқда. Бизнинг тадқиқотимизда 60 ёшдан юқори беморлар орасида саркопения тарқалиши 48% ни ташкил этди, гемодиализдаги беморларда эса бу кўрсаткич 62% гача юқори бўлди. Бу натижа Naoki Isoyama (2014) ва бoшqа тадқиқотлар билан мувофиқ келади, улар диализдаги беморларда мушак кучи пастлиги ва ўлим хавфи орасида сезиларли боғлиқликни кўрсатган.

Бизнинг тадқиқотимизда саркопенияли беморларда травмалар, айниқса йиқилишлар хавфи 2,3 марта кўпроқ бўлиши аниқланди. Бу натижа СБК билан саркопениянинг клиник аҳамиятини кўрсатади: мушак массаси ва функциясининг пасайиши фақат ҳаёт сифатини пасайтирмай, балки травматизм ва госпитализация хавфини ҳам сезиларли даражада оширади.

СБКда саркопения ривожланишини патогенетик жиҳатдан тушуниш учун уремик токсинлар, сурункали яллиғланиш (low-grade inflammation), инсулинрезистентлик, протеин-энергетик етишмовчилик ва митохондриял дисфункция каби механизмларни ҳисобга олиш лозим. Xiaonan H. Wang ва William E. Mitch (2020) тадқиқотлари шуни кўрсатадики, уремик токсинлар мушак протеолизини кучайтириб, регенерацияни секинлаштиради. Бу жараён диализдаги беморларда саркопениянинг юқори кўрсаткичларига асосий сабаб ҳисобланади.

Бизнинг натижаларда альбумин даражаси паст бўлган беморларда мушак массаси сезиларли камайгани кўриниб турибди. Бу натижа протеин-энергетик етишмовчилик ва нутритив статуснинг саркопения ривожланишига таъсирини тасдиқлайди. Шунингдек, жисмоний фаоллик даражаси паст бўлганларда травма хавфи юқори бўлгани кўрсатди, бу жисмоний фаолликни сақлаш ва реабилитациянинг аҳамиятини яна бир бор исботлайди.

Бизнинг тадқиқотимиз СБК босқичи ва саркопения ўртасида тўғридан-тўғри боғлиқликни тасдиқлади. Бу натижа KDIGO тавсиялари билан уйғун келади, уларда СБК беморларида нутритив статус ва жисмоний фаолликни баҳолашнинг муҳимлиги алоҳида таъкидланган.

Илмий аҳамият. Бизнинг тадқиқот СБК ва саркопения ўртасидаги боғлиқликни аниқлашда муҳим қадам ҳисобланади. Ҳосил қилинган маълумотлар, кекса ёшдаги беморларнинг ҳаёт сифатини яхшилаш ва травматизмни камайтириш учун оилавий шифокорлар учун асосий кўрсатмаларни тақдим этади. Саркопениянинг эрта диагностикаси ва комплекс интервенциялар асосида даволаш жараёни, кекса ёшдаги СБК беморларини интегратив усул билан бошқариш имконини беради.

Оилавий шифокорлар учун тавсиялар. Кекса ёшдаги СБК беморларини бошқаришда оилавий шифокорлар қуйидагиларга эътибор қаратишлари лозим:

- Саркопенияни эрта скрининг қилиш (мушак кучи ва вазни баҳолаш)
- Рационал овқатланишни таъминлаш (оксилга бой парҳез)
- Жисмоний машқларни тавсия этиш (индивидуал реабилитация дастурлари)
- Витамин D ва кальций танқислигини бартараф этиш
- Йиқилишларни олдини олиш чораларини кўриш (уй шароитини мослаштириш)
- Дори воситаларини оптималлаштириш (полипрагмазияни камайтириш)

Хулоса. Сурункали буйрак касаллиги турли босқичларида бўлган кекса ёшдаги беморларда саркопения кенг тарқалган бўлиб, у травмалар хавфини сезиларли оширади. Саркопенияни эрта аниқлаш ва комплекс ёндашув асосида даволаш беморларнинг ҳаёт сифатини яхшилаш ва асоратларни камайтиришда муҳим аҳамиятга эга.

Оилавий шифокорлар томонидан профилактика, эрта диагностика ва индивидуал ёндашувни таъминлаш ушбу муаммони ҳал этишда асосий ўрин тутати.

Адабиётлар рўйхати:

1. Cruz-Jentoft A.J., Bahat G., Bauer J. et al. Sarcopenia: revised European consensus on definition and diagnosis // *Age and Ageing*. – 2019. – Vol. 48(1). – P. 16–31.
2. KDIGO Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease // *Kidney International Supplements*. – 2013. – Vol. 3(1). – P. 1–150.
3. Isoyama N., Qureshi A.R., Avesani C.M. et al. Comparative associations of muscle mass and muscle strength with mortality in dialysis patients // *Clinical Journal of the American Society of Nephrology*. – 2014. – Vol. 9(10). – P. 1720–1728.
4. Beaudart C., Zaaria M., Pasleau F. et al. Health outcomes of sarcopenia: a systematic review and meta-analysis // *PLoS One*. – 2017. – Vol. 12(1).
5. Wang X.H., Mitch W.E. Mechanisms of muscle wasting in chronic kidney disease // *Nature Reviews Nephrology*. – 2014. – Vol. 10. – P. 504–516.
6. Fielding R.A., Vellas B., Evans W.J. et al. Sarcopenia: an undiagnosed condition in older adults // *Journal of the American Medical Association*. – 2011. – Vol. 305(1). – P. 25–32.
7. Rolland Y., Czerwinski S., Van Kan G.A. et al. Sarcopenia: its assessment, etiology, pathogenesis, consequences and future perspectives // *Journal of Nutrition Health and Aging*. – 2008. – Vol. 12(7). – P. 433–450.
8. Muscaritoli M., Anker S.D., Argilés J. et al. Consensus definition of sarcopenia, cachexia and pre-cachexia // *Clinical Nutrition*. – 2010. – Vol. 29(2). – P. 154–159.
9. Гадаев А. Г., Хусинова Ш. А., Сулайманова Н. Э. Саркопения при хронической болезни почек: распространенность, факторы риска, обоснование исследований // *Zamonaviy tibbiyot jurnali* (Журнал современной медицины). – 2025. – Т. 9. – №. 2. – С. 974–979.
10. Гадаев А. Г., Хусинова Ш. А., Сулайманова Н. Э. Surunkali buyrak kasalligida sarkopeniyaning uchrashi va uning turli holatlarda rivojlanish mexanizmlari (adabiyotlar tahlili) // *Журнал репродуктивного здоровья и уронефрологических исследований*. – Vol. №6. №2. 2025.

Иктибос учун: Сулайманова Н.Э. Сурункали буйрак касаллиги турли даволаш босқичларида бўлган кекса ёшдаги беморларда саркопения ва травмалар билан боғлиқ ҳолатлар // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси*. – 2026. – № 4(24). – Б. 46–48. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19426451>

ЮҚОРИ НАФАС ЙЎЛЛАРИНИНГ ИНФЕКЦИОН ЗАРАРЛАНИШЛАРИНИ ПЕДИАТРИЯ АМАЛИЁТИДА ДАВОЛАШ

Лутфуллаев Г.У., Қобилова Ш.Ш., Исматова Ж.Т., Авалбоев Т.Ш., Мингбоев А.А.

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Мақолада болаларда юқори нафас йўллариинг инфекциян касалликларини даволаш ва иммунореабилитация қилишида комплекс ёндашувни қўллаш асослаб берилган. 32 нафар беморда Тонзилгон® Н фитопрепаратини қўллаш самарадорлиги таҳлил қилинди. Препаратнинг кенг фармакологик таъсири унинг кўп компонентли ўсимлик таркиби билан изоҳланади. У макрофаглар ва гранулоцитларнинг фагоцитар фаоллигини оширишга ёрдам беради, бу эса патоген микроорганизмларни йўқ қилиш (элиминация) жараёнини тезлаштиради. Олинган натижалар илмий адабиётларда келтирилган бошқа тадқиқотлар маълумотлари билан мос келади. Болаларда оғиз-ҳалқумнинг яллиғланиш касалликларини даволашда ўсимлик асосидаги доривор препаратни ўз ичига олган комплекс ёндашув яллиғланиш жараёнининг кечилишига ижобий таъсир кўрсатади ҳамда организм резистентлигини оширишга ёрдам беради.

Калим сўзлар: болалар, иммуномодуляторлар, фитопрепаратлар, инфекциян зарарланишлар, А гуруҳи β-гемолитик стрептококк, *Chlamydophila pneumoniae*, *Mycoplasma pneumoniae*.

THERAPY OF INFECTIOUS LESIONS OF THE UPPER RESPIRATORY TRACT IN PEDIATRIC PRACTICE

Lutfullayev G.U., Kobilova Sh.Sh., Ismatova Zh.T., Avalboyev T.Sh., Mingboyev A.A.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. The article presents the rationale for the use of a comprehensive approach to the treatment and immunorehabilitation of infectious diseases of the upper respiratory tract in children. An analysis of the effectiveness of the herbal medicinal product Tonsilgon® N was conducted in 32 patients. The broad pharmacological effect of the drug is explained by its multicomponent herbal composition. It promotes the activation of the phagocytic activity of macrophages and granulocytes, which accelerates the elimination of pathogenic microorganisms. The obtained results are consistent with the data of other studies reported in the scientific literature. A comprehensive approach to the treatment of inflammatory diseases of the oropharynx in children, including a plant-based medicinal product, has a positive effect on the course of the inflammatory process and contributes to increased resistance of the organism.

Keywords: children, immunomodulators, herbal medicinal products, infectious lesions, group A β-hemolytic streptococcus, *Chlamydophila pneumoniae*, *Mycoplasma pneumoniae*.

ТЕРАПИЯ ИНФЕКЦИОННЫХ ПОРАЖЕНИЙ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ В ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

Лутфуллаев Г.У., Қобилова Ш.Ш., Исматова Ж.Т., Авалбоев Т.Ш., Мингбоев А.А.

Самарқандский государственный медицинский университет, г. Самарқанд, Узбекистан

Резюме. В статье рассматривается обоснование применения комплексного подхода к лечению и иммунореабилитации инфекционных заболеваний верхних дыхательных путей у детей. Проведён анализ эффективности применения фитопрепарата Тонзилгон® Н у 32 пациентов. Широкий спектр фармакологического действия препарата обусловлен его многокомпонентным растительным составом. Он способствует активации фагоцитарной активности макрофагов и гранулоцитов, что ускоряет процесс элиминации патогенных микроорганизмов. Полученные результаты согласуются с данными других исследований, представленных в научной литературе. Комплексный подход к лечению воспалительных заболеваний ротоглотки у детей с включением растительного лекарственного препарата оказывает положительное влияние на течение воспалительного процесса в ротоглотке и способствует повышению резистентности организма.

Ключевые слова: дети, иммуномодуляторы, фитопрепараты, инфекционные поражения, β-гемолитический стрептококк группы А, *Chlamydophila pneumoniae*, *Mycoplasma pneumoniae*.

Кириш. Эрта ёшдаги ва мактабгача ёшдаги болалар орасида респиратор касалликларнинг кенг тарқалиш сабаблари XX аср ўрталаридан бошлаб ўрганиб келинмоқда [1]. Тез-тез учрайдиган ўткир

респиратор инфекциялар организмнинг ҳам умумий, ҳам маҳаллий резистентлигини пасайтиради, юқори ва пастки нафас йўлларида яллиғланиш жараёнларининг қайталанувчи ва чўзилувчан кечишига олиб келади, бу эса ўз навбатида боланинг жисмоний ва психомотор ривожланишига салбий таъсир кўрсатиши мумкин [2,3].

Вирусли ва бактериал инфекцияларга юқори сезувчанлик, шунингдек нафас йўлларининг аллергик касалликлари шаклланиши кўп жиҳатдан иммун тизимининг етилимаганлиги, онадан ўтган пассив иммунитетнинг йўқолиши ва орттирилган иммун жавобнинг етарли даражада шаклланмаганлиги билан боғлиқ [4,5]. Мактабгача ёшдаги болаларнинг турли инфекцион агентлар билан тез-тез контактда бўлиши ҳам муҳим рол ўйнайди [6].

Болаларда ўткир респиратор инфекциядан кейин кўпинча узок муддатли ва барқарор иммунитет шаклланмайди, бошқа респиратор вирусларга нисбатан кросс-ҳимоя эса деярли мавжуд эмас [7]. Натижада бола йил давомида саккиз ва ундан ортиқ касаллик эпизодларини бошдан кечириши мумкин, бу эса тез-тез ва узок муддат касалланадиган болалар гуруҳининг шаклланишига олиб келади [8].

Организм қаршилигининг пасайишига олиб келувчи қўшимча омиллардан бири оғиз бўшлиғи микробиотасининг бузилишидир, бу патоген микроорганизмларнинг юқори нафас йўллари шиллик қаватининг эпителиал хужайраларига кириб боришини осонлаштиради ва яллиғланиш ҳамда дистрофик ўзгаришларни келтириб чиқаради [9].

Болалар орасида респиратор инфекциялар билан касалланишнинг ошиши дунё бўйлаб, мамлакатларнинг иқтисодий ривожланиш даражасидан қатъи назар кузатишмоқда. Шу сабабли тез-тез ва узок муддат касалланадиган болалар муаммоси замонавий педиатриянинг долзарб вазифаларидан бири бўлиб қолмоқда [1,10].

Одатда кўпчилик патоген микроорганизмлар юқори нафас йўлларида ушлаб қолинади ва баъзан фақат маҳаллий яллиғланиш реакцияларини келтириб чиқаради, шу билан бирга нафас тизимининг пастки бўлимлари мукоцилиар клиренснинг самарали ишлаши ва иммун механизмлар туфайли ҳимояланган ҳолда қолади. Бироқ ушбу ҳимоя механизмлари бузилганда, яллиғланиш жараёни пастки нафас йўлларида тарқалиши мумкин [2,11].

Болаларнинг тахминан учдан бир қисмида нафақат тез-тез, балки қайталанувчи юқори нафас йўллари касалликлари ҳам кузатилади, масалан: ўткир ринит, назофарингит, риносинусит, отит, ўткир ва сурункали тонзиллит, фарингит ҳамда тонзиллофарингит. Бундан ташқари, кўпинча икки ҳафтадан ортиқ давом этадиган чўзилувчан респиратор инфекциялар ҳам қайд этилади [3,12,13].

Ўткир респиратор инфекцияларнинг торпид (суст, чўзилувчан) кечиши аденоидит, синусит, трахеобронхит ва отит каби асоратлар ривожланиши билан мураккаблашиши мумкин [14]. Тез-тез касалланадиган болаларда касалликларнинг клиник кечиш хусусиятлари иммун ҳимоянинг специфик механизмларининг етилимаганлиги ва организмнинг носпецифик резистентлигининг пасайиши билан боғлиқ [5,15].

Қайталанувчи респиратор касалликларга эга ўсмирларда ЛОР-патология тахминан уч баробар кўп, аллергик касалликлар — икки баробар кўп, ошқозон-ичак трактининг сурункали касалликлари эса тахминан олти баробар кўп аниқланади [16]. Респиратор инфекциялар эпизодлари сонининг ортиши билан бирга сўлакнинг антиадгезия фаоллиги ҳам пасайиши кузатилади.

Сўнгги йилларда нафас йўллари ва оғиз бўшлиғи микробиомини, шунингдек унинг болаларда қайталанувчи ва сурункали нафас тизими касалликлари шаклланишидаги ролини ўрганишга катта эътибор қаратилмоқда. Тадқиқотлар натижалари шуни кўрсатадики, юқори нафас йўлларининг қайталанувчи касалликлари билан оғриган болаларда ротоглотка микробиотаси ва вирами таркибида ўзгаришлар кузатилади, жумладан патоген микроорганизмлар сонининг ортиши аниқланади [17,18].

Иммун жавобнинг бузилишлари иммунодефицит, аллергик ва аутоиммун касалликлар белгилари ривожланиши билан кечиши мумкин [4,15]. Экологик вазиятнинг ёмонлашуви, респиратор патогенларнинг хилма-хиллиги ва бошқа омиллар иккиламчи иммунодефицит шаклланишига ёрдам беради [10,16].

Бундай жараёнлар ёпиқ патологик айлананинг шаклланишига олиб келади, бу эса юқори нафас йўллари касалликлари, айниқса ўткир ҳолатлар ва сурункали тонзиллитнинг зўрайишлари тез-тез учрашига сабаб бўлади. Шу билан бирга, кўпинча антибактериал препаратлар асосиз равишда буюрилади [13,14,19].

Антибиотиклардан ортиқча фойдаланиш микроорганизмларнинг антибиотикларга чидамлилиги (антибиотикорезистентлик) ривожланишига, аллергик реакцияларнинг пайдо бўлишига, иммун ҳимоянинг янада пасайишига ва ЛОР аъзоларининг инфекцион касалликлари сурункалашишига олиб келиши мумкин [19,20].

Вирусли ва бактериал ўткир тонзиллофарингитнинг клиник белгилари кўп жиҳатдан ўхшаш бўлганлиги сабабли, лаборатор диагностикасиз касаллик этиологиясини аниқлаш қийин. Жиддий асоратлар ривожланиш хавфини ҳисобга олган ҳолда, А гуруҳи β-гемолитик стрептококкни аниқлаш алоҳида аҳамият касб этади.

Мазкур патологиянинг патогенезида ҳалқум бодомчасининг сурункали яллиғланиши муҳим рол ўйнайди, бу иммун механизмларининг ўзига хос хусусиятлари ва инфекциянинг персистенцияси билан қўллаб-қувватланади [14,15].

Сурункали тонзиллит кўплаб метатонзилляр асоратлар ва касалликларнинг ривожланишига олиб келиши, шунингдек мавжуд фон патологиясини янада оғирлаштириши мумкин. Сурункали тонзиллит ривожланишига организм реактивлигининг пасайиши, анатомик хусусиятлар ҳамда сурункали инфекция ўчоқларининг мавжудлиги сабаб бўлиши мумкин [14,15]. Ўткир ларингит билан оғриган беморларни даволаш ҳанузгача долзарб масала бўлиб қолмоқда. Шунга қарамай, тез-тез касалланадиган болалар орасида етакчи шакл ўткир назофарингит ҳисобланади [12].

Тез-тез касалланадиган болалар гуруҳига кирувчи болаларда касаллик кўпинча чўзилувчан тус олади, бу эса юқори антиген юкламасининг сақланиб қолишига ва касалликнинг қайта-қайта такрорланиш хавфининг ошишига олиб келади.

Яна бир муҳим муаммо — пародонт касалликлари бўлиб, улар оғиз бўшлиғи шиллиқ қаватидаги яллиғланиш ўзгаришларидан бошланади. Даволаш гигиена ва яллиғланишга қарши терапияни ўз ичига олади [9,18].

Ҳар қандай яллиғланиш жараёни ҳужайравий микромуҳитдаги ўзгаришлар билан кечади ва сурункали шаклга ўтиши мумкин. Сурункалашув адаптация механизмларининг бузилиши ва тўқималарнинг қайта тузилиши (ремоделланиши) билан боғлиқ [2,16].

Қайталанувчи инфекцияларни даволашда яллиғланиш реакциясини назорат қилиш муҳим рол ўйнайди. Консерватив даволаш организм резистентлигини ошириш ва иммун жавобни коррекция қилишга қаратилган.

Бироқ доривор воситаларнинг кенг спектри полипрагмазияга олиб келиши мумкин. Шунинг учун даволаш режимига риоя қилиш ва хавфсиз препаратлардан, жумладан ўсимлик асосидаги воситалардан фойдаланиш муҳим аҳамиятга эга [18,20].

Сўнгги йилларда табиий дори воситаларидан кенгроқ фойдаланиш тенденцияси кузатилмоқда. Комплекс ёндашув организмнинг ўзини ўзи бошқариш (ауторегуляция) жараёнларининг тикланишига ёрдам беради.

Бундай воситалар орасида иммуномодулятор ва яллиғланишга қарши таъсирга эга препаратлар алоҳида эътибор қозонмоқда [18,20].

Юқорида баён этилганлардан келиб чиқиб, юқори нафас йўллари касалликлари билан оғриган ҳар бир болани даволашда индивидуал ва комплекс ёндашувни қўллаш, шунингдек уларнинг қайталанганини олдини олиш зарурлиги яққол намоён бўлади.

Тадқиқот мақсади: юқори нафас йўллари инфекциялари билан оғриган болаларда комплекс терапия таркибида қўлланганда ўсимлик асосидаги Тонзилгон® Н препаратининг самарадорлиги ва чидамлилигини баҳолашдан иборат.

63 нафар бемор иштирокида проспектив, бир марказли тадқиқот ўтказилди. Асосий гуруҳга 32 нафар бола киритилди, уларга стандарт терапия билан бирга 14 кун давомида оғиз орқали қабул қилинадиган томчи ва таблеткалар кўринишидаги ўсимлик препарати Тонзилгон® Н буюрилди. Назорат гуруҳи эса фақат анъанавий яллиғланишга қарши терапия олган 31 нафар бемордан иборат бўлди.

Иштирокчиларнинг ёши 3–5 ёш ($4,3 \pm 0,37$) ва 6–12 ёш ($9,2 \pm 1,48$) оралиғида бўлиб, ўғил ва қиз болалар тенг тақсимланган эди. Беморлар қабул қилинганда инфекцион агентни аниқлаш амалга оширилди. Асосий гуруҳда А гуруҳи β-гемолитик стрептококк 7 (21,87%) нафар беморда аниқланган бўлса, назорат гуруҳида 6 (19,35%) нафар беморда қайд этилди. *Chlamydophila pneumoniae* ва *Mycoplasma pneumoniae* га қарши антитаналар асосий гуруҳнинг 9 (28,12%) нафар болаларида, назорат гуруҳининг эса 8 (25,8%) нафар беморида аниқланган; бундай ҳолларда тизимли антибактериал терапия буюрилган.

Умумий клиник текширув оториноларинголог кўриги ва физик кўрикни ўз ичига олди, танглай ёйлари ва ҳалқумнинг орқа деворидан олинган суртма намуналарини лаборатор текшириш, шунингдек умумий қон таҳлили ўтказилди. Даволаш самарадорлиги мезонлари сифатида 3-, 7-, 10- ва 14-кунларда касаллик клиник белгиларидаги камайиш, касалликнинг ўртача давомийлиги ҳамда алоҳида симптомларнинг давомийлиги баҳоланди.

Натижалар. Тадқиқот бошланишидан олдин асосий ва назорат гуруҳларида юқори нафас йўллари касалликларининг клиник белгилари бўйича статистик жиҳатдан аҳамиятли фарқлар аниқланмади ($p = 0,6125$).



1-расм. Ўрганилган гуруҳларда терапиянинг 3-кунига келиб клиник симптомларнинг динамикаси



2-расм. Ўрганилган гуруҳларда терапиянинг 7-кунига келиб клиник симптомларнинг динамикаси

Шунингдек, асосий гуруҳда ўткир респиратор инфекцияларнинг аввалги эпизодлари билан солиштирганда симптомларнинг умумий давомийлиги қисқаргани қайд этилди ($p = 0,0362$). Назорат гуруҳида эса симптомларнинг ўртача давомийлиги ўзгармаган ($p = 0,0715$).

Муҳокама. Мазкур ишда оғиз бўшлиғи касалликларининг турли шакллари дифференциал диагностика қилиш мезонлари ҳамда 3–12 ёшдаги болаларда Тонзилгон® Н препаратини қўллашга доир ўзимиз олиб борган тадқиқот натижалари келтирилган. Ушбу препаратнинг кенг фармакологик таъсири унинг кўп компонентли ўсимлик таркиби билан боғлиқ. Фаол моддалари макрофаглар ва гранулоцитларнинг фагоцитар фаоллигини стимуляция қилиб, патоген микроорганизмларнинг организмдан тезроқ чиқарилишига ёрдам беради. Бу маълумотлар ҳам биз ўтказган тадқиқот натижалари, ҳам илмий адабиётларда келтирилган маълумотлар билан тасдиқланади.

Олинган натижалар юқори нафас йўллари касалликлари симптомларининг мавжудлиги, уларнинг ифодаланганлик даражаси ва давомийлиги кўп жиҳатдан қўлланилаётган даволаш турига боғлиқлигини кўрсатди. Бундан ташқари, ушбу омиллар боланинг психоэмоционал ҳолати, организмнинг иммунологик резистентлик даражаси ҳамда ўсиш ва умумий ривожланиш жараёнларига ҳам таъсир кўрсатади.

Тонзилгон® Н препаратини стандарт комплекс терапияга киритиш касаллик клиник белгилари регрессининг тезроқ кечишига ёрдам берди. Симптомлар камайиши билан препаратни қабул қилиш тез-тезлиги қўллаш бўйича йўриқномага мувофиқ кунига уч мартагача камайтирилди.

Барча беморлар ўтказилаётган терапияга юқори даражада риоя қилишни кўрсатди. Препаратнинг кўтарувчанлигини баҳолаш болалар, уларнинг ота-оналари ва қонуний вакиллари фикрлари асо-

сида амалга оширилганда, дори воситаси яхши ўзлаштирилиши ва сезиларли ножўя реакциялар келтириб чиқармаслиги аниқланди.

Шундай қилиб, ўтказилган тадқиқот натижалари болаларда юқори нафас йўллари касалликларини даволашда Тонзилгон® Н препаратини анъанавий симптоматик терапия билан биргаликда қўллашнинг клиник самарадорлиги ва хавфсизлигини тасдиқлайди.

Хулосалар. Ўрганилган дори воситаси мактабгача ва мактаб ёшидаги болаларда яхши қўтарувчанлик ва қулай қўлланилиш хусусиятларини намоён этди. Ушбу воситани терапия таркибида қўллаш касаллик давомийлигини қисқартиришга ва симптомлар ифодаланишини камайтиришга ёрдам берди, айрим ҳолларда эса уларнинг назорат гуруҳига нисбатан тўлиқ йўқолишига олиб келди. Демак, комбинацияланган ўсимлик асосидаги Тонзилгон® Н препарати болаларда юқори нафас йўллари респиратор инфекцияларини даволашда хавфсиз ва самарали восита сифатида қаралиши мумкин.

Препаратнинг фармакологик хусусиятлари, қўллаш кўрсатмалари ҳамда қулай дори шаклини ҳисобга олган ҳолда, Тонзилгон® Нни инфекция табиатга эга юқори нафас йўлларининг яллиғланиш касалликларини даволашда устувор воситалардан бири сифатида кўриб чиқиш мақсадга мувофиқдир.

Бундан ташқари, ушбу препарат маҳаллий антисептик воситаларга муқобил бўлиши мумкин, чунки унинг қўлланилиши оғиз бўшлиғи микробиотасига зарар етказувчи таъсир кўрсатмайди.

Ўтказилган тадқиқот шуни кўрсатдики, Тонзилгон® Нни оғиз бўшлиғининг инфекция шикастланишларини комплекс терапияга киритиш асосли бўлиб, яққол клиник самарадорлик намоён этади. Унинг қўлланилиши касалликнинг зўрайиш даврида, хусусан сурункали тонзиллитда даволаш натижадорлигини ошириш ҳамда касалланиш мавсуми юқори бўлган даврларда профилактик курслар сифатида тавсия этилиши мумкин.

Адабиётлар рўйхати:

1. Вавилова В.П., Абрамов-Соммарийва Д., Стайнл Г., Воннеманн М., Рыжова Е.Г., Русова Т.В. и др. Клиническая эффективность и переносимость препарата Тонзилгон® N при лечении рецидивирующих инфекций верхних дыхательных путей у детей: неинтервенционное исследование в России. РМЖ. 2017;(5):350–358.
2. Владимирова Т.Ю., Фатенков О.В., Соколова С.Ю., Мартынова А.Б. Особенности ведения пациентов с хроническим тонзиллитом при коморбидных состояниях. Медицинский совет. 2023;17(19):165–171. <https://doi.org/10.21518/ms2023-343>.
3. Дронов И.А., Геппе Н.А., Колосова Н.Г., Великорецкая М.Д. Применение растительного лекарственного препарата комплексного действия в лечении рецидивирующего тонзиллофарингита у детей. Вопросы практической педиатрии. 2020;15(4):16–24. <https://doi.org/10.20953/1817-7646-2020-4-16-24>.
4. Дроздова М.В., Рязанцев С.В. Опыт применения препарата Тонзилгон N при лечении хронического тонзиллита у часто болеющих детей. Российская оториноларингология. 2016;(5):120–125. <https://doi.org/10.18692/1810-4800-2016-5-120-125>.
5. Лысенко И.М., Баркун Г.К., Журавлёва Л.Н., Федоришко Н.Н. Новые подходы в реабилитации группы часто и длительно болеющих детей: контроль и коррекция состояния сердечно-сосудистой системы и метаболических нарушений. Журнал Гродненского государственного медицинского университета. 2018;16(6):706–710. <https://doi.org/10.25298/2221-8785-2018-16-6-706-710>.
6. Пикуза О.И., Закирова А.М., Мороз Т.Б. Клиническая эффективность скринингового подхода к дифференцированному назначению антибактериальной терапии детям с острым тонзиллофарингитом. Казанский медицинский журнал. 2020;101(6):805–811. <https://doi.org/10.17816/KMJ2020-805>.
7. Пикуза О.И., Закирова А.М., Самороднова Е.А., Файзуллина Р.А., Волянюк Е.В. Клиническое значение интегральной регистрации маркеров эндотоксического иммунитета и колонизационной резистентности буккальных эпителиоцитов при рецидивирующем бронхите у подростков. Практическая медицина. 2024;22(2):96–103. <https://doi.org/10.32000/2072-1757-2024-2-96-103>.
8. Пикуза О.И., Файзуллина Р.А., Закирова А.М., Сулейманова З.Я., Рашитова Е.Л., Волянюк Е.В. Бактерицидные ресурсы нейтрофилов ротовой полости как маркер клинического течения воспалительных заболеваний органов дыхания у детей. Казанский медицинский журнал. 2020;101(5):740–748. <https://doi.org/10.17816/KMJ2020-740>.
9. Самсыгина Г.А., Выжлова Е.Н. Ещё раз о проблемах понятия «часто болеющие дети». Педиатрия. Журнал имени Г.Н. Сперанского. 2016;95(4):209–215.

10. Сафроненко Л.А., Лукашевич М.Г., Бутко И.Л. Динамика уровня профессиональной компетентности участковых педиатров в вопросах антибактериальной терапии. Клиническая микробиология и антимикробная химиотерапия. 2017;19(1):63–66.

11. Селкова Е.П., Оганесян А.С., Гудова Н.В., Ермилова Н.В. Комплексный подход к терапии острых респираторных вирусных инфекций. РМЖ. Медицинское обозрение. 2019;(3):10–12.

12. Свистушкин В.М., Волкова К.Б. Применение антисептических средств растительного происхождения при острых заболеваниях верхних дыхательных путей. Терапия. 2018;(1):72–76.

13. Харламова Ф.С., Шамшева О.В., Кладова О.В., Анжел А.Е., Денисова А.В. Иммуномодуляторы микробного происхождения в лечении и профилактике респираторных инфекций у часто и длительно болеющих детей. Лечащий врач. 2016;(12):48–50.

14. Шабалдин А.В., Шабалдина Е.В., Симбирцев А.С. Особенности микробиома верхних отделов респираторного тракта у детей с рецидивирующими респираторными заболеваниями. Инфекция и иммунитет. 2017;7(4):341–349.

15. Шабалдина Е.В., Ахтямов Д.Р., Гривцова С.В., Шелковников А.В., Апалко С.В., Шабалдин А.В. Эффективность растительного лекарственного препарата в лечении и иммунореабилитации детей раннего и дошкольного возрас-

та с повторяющимися острыми назофарингитами. Вопросы практической педиатрии. 2020;15(5):57–66.

16. Шабалдина Е.В., Шабалдин А.В. Современные представления о дисбиозе верхних дыхательных путей у детей. Фундаментальная и клиническая медицина. 2017;1(2):65–74.

17. Shumatova T.A., Katenkova E.Yu., Gerbert A.V., Smagina M.A., Belousova V.A. Klinicheskiy analiz primeneniya preparata Tonsilgon N u detey dlya lecheniya ostrykh respiratornykh infektsiy, soprovozhdayushchikhsya bolyu v gorle. Farmateka. 2016;(11):100–105.

18. Fokkens W.J., Lund V.J., Hopkins C., Hellings P.W., Kern R., Reitsma S. et al. European Position Paper on Rhinosinusitis and Nasal Polyps 2020. Rhinology. 2020;58(Suppl. 29):1–464. <https://doi.org/10.4193/Rhin20.600>.

19. Santee C.A., Nagalingam N.A., Faruqi A.A., DeMuri G.P., Gern J.E., Wald E.R. et al. Nasopharyngeal microbiota composition of children is related to the frequency of upper respiratory infection and acute sinusitis. Microbiome. 2016;4(1):34. <https://doi.org/10.1186/s40168-016-0179-9>.

20. Wronski S., Dannenmaier J., Schild S., Macke O., Müller L., Burmeister Y. et al. Engystol reduces onset of experimental respiratory syncytial virus-induced respiratory inflammation in mice by modulating macrophage phagocytic capacity. PLoS ONE. 2018;13(4):e0195822. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0195822>.

Иқтибос учун: Лутфуллаев Ғ.У., Қобилова Ш.Ш., Авалбоев Т.Ш., Мингбоев А.А. Юқори нафас йўлларининг инфекцияларини зарарланишларини педиатрия амалиётида даволаш // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2026. – № 4(24). – Б. 49–54. [doi: https://doi.org/10.5281/zenodo.19437882](https://doi.org/10.5281/zenodo.19437882)

МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ СТРУКТУРЫ И ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ МЕГАКАРИОЦИТОВ

Маматова М., Турсунбоева А., Курбанова М., Рахимова М.

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Успешная диагностика ряда заболеваний связана с применением и дальнейшим усовершенствованием точных методов определения количества мегакариоцитов в крови, костном мозге и других органах. Для оценки функционального состояния мегакариоцитов представляется перспективным использование способов прижизненного исследования этих клеток в культурах ткани с помощью фазово-контрастной и люминесцентной микроскопии.

Ключевые слова: Мегакариоциты, фазово-контрастный, люминесцентный, лейкоконцентрация.

METHODS FOR STUDYING THE STRUCTURE AND FUNCTIONAL STATE OF MEGAKARYOCYTES

Mamatova M., Tursunboeva A., Kurbanova M., Rakhimova M.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Successful diagnosis of a number of diseases is associated with the use and further refinement of precise methods for determining the number of megakaryocytes in the blood, bone marrow, and other organs. To assess the functional state of megakaryocytes, the use of intravital examination of these cells in tissue cultures using phase-contrast and fluorescence microscopy appears promising.

Key words: Megakaryocytes, phase-contrast, luminescent, leukocyte concentration.

МЕГАКАРИОЦИТЛАРНИНГ ТУЗИЛИШИ ВА ФУНКЦИОНАЛ ҲОЛАТИНИ ЎРГАНИШ УСУЛЛАРИ

Маматова М., Турсунбоева А., Курбанова М., Рахимова М.

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Бир қатор касалликларни муваффақиятли таъхислаш қон, суяк илғи ва бошқа органлардаги мегакариоцитлар сонини аниқлашнинг аниқ усуллари қўллаш ва янада такомиллаштириш билан боғлиқ. Мегакариоцитларнинг функционал ҳолатини баҳолаш учун фаза-контраст ва флуоресцент микроскопия ёрдамида тўқимадаларда ушбу ҳужайраларни *in vivo* ҳолатида текшириш мақсадга мувофиқ бўлади.

Калим сўзлар: Мегакариоцитлар, фазово-контрастли, люминесцентли, лейкоконцентрация.

e-mail: mamatova_muborak@g.mail.com

Введение. Поражение мегакариоцитарного ростка является существенным компонентом общего нарушения функции мегакариоцитарно-тромбоцитарного аппарата при болезни Верльгофа, лейкозах, лучевой болезни и ряде других заболеваний. Поэтому для исследователя и врача часто необходимо применение современных методов изучения мегакариоцитов, позволяющих получить наиболее полную информацию о количестве и функциональном состоянии этих клеток. Между тем обобщающие работы по методам исследования мегакариоцитов в отечественной и зарубежной литературе отсутствуют.

Цель исследования: определение количественных и функциональных изменений мегакариоцитов при некоторых патологических состояниях.

Материалы и методы исследования: Методы определения количества мегакариоцитов. Количество мегакариоцитов подсчитывают в периферической крови, костном мозгу и некоторых других органах (селезенка, легкие).

Периферическая кровь. Определение числа мегакариоцитов в крови стало возможным благодаря разработке методов лейкоконцентрации. В. А. Германов и С. А. Бобылев [1] предлагают помещать 10 мл венозной крови в пробирку, содержащую 10 капель 6% раствора трилона Б. Затем пробирку ставят в термостат при 37° на 45 мин. Пастеровской пипеткой переносят надосадочный слой в центрифужную пробирку и центрифугируют при 800 об/мин в течение 10 мин. Затем надосадочный слой

удаляют, осадок гомогенизируют и готовят из него тонкие мазки, которые окрашивают по Лейшману. В полученных препаратах можно видеть мегакариocyты или их фрагменты.

Многие исследователи считают, что мегакариocyты постоянно присутствуют в крови здоровых людей; их среднее количество в 1 мл крови равно у мужчин 7-12-8, у женщин -3-5-6. Некоторые различия в данных, полученных разными исследователями, видимо, в известной мере связаны с применением для лизиса эритроцитов при приготовлении лейкоконцентрата различных веществ: сапонина, стрептолизина, уксусной кислоты и т. д.. Количество мегакариocyтов в периферической крови резко возрастает при коллагенозах, остром воспалении и других заболеваниях [4, 5].

Костный мозг. Мегакариocyты костного мозга подсчитывают в мазках, срезах или в гемоцитометрах. Подсчет в мазках, окрашенных по Лейшману, Паппенгейму позволяет вычислить относительное содержание мегакариocyтов в популяции костномозговых клеток. Для этого идентифицируют 500, 1000 или более костномозговых клеток и отмечают количество мегакариocyтов, входящее в это число. Мегакариocyтарный индекс, по данным разных авторов, колеблется в пределах 0-0,42% [6], 0-0,2%, 0,26-1,20%, 0-0,08% [2,3]. Различия в полученных результатах объясняются в основном неравномерным распределением мегакариocyтов среди других клеточных элементов,

Более точным является прямой подсчет мегакариocyтов в гемоцитометрах [1, 7]. Пунктат костного мозга разводят в 10 раз 5% раствором уксусной кислоты, затем мегакариocyты подсчитывают во всех квадратах камеры Фукс - Розенталя. Результат определяют по формуле:

$$x = \frac{a \cdot 10}{3,2},$$

где x- количество мегакариocyтов в 1 мм³ пунктата, а - число сосчитанных в камере мегакариocyтов, 3,2-объем просмотренной взвеси (в мм³). Для получения более точных результатов необходимо просматривать 3-4 камеры. По данным, полученным с помощью этого метода, мегакариocyтарный индекс здоровых людей колеблется в пределах 0,015-0,035%, 0,009-0,123% [8, 9]. Подсчет общего количества мегакариocyтов на 1 мм³ костного мозга осложняется тем, что в каждом пункте степень разведения костного мозга синусоидальной жидкостью может быть различной. Число мегакариocyтов в 1 мм³ пунктата костного мозга здоровых людей колеблется в пределах 100-200, 66-125 [9]. При параллельном подсчете мегакариocyтарного индекса в мазках и в гемоцитометрах отмечают плохую корреляцию получаемых результатов [10].

В экспериментальных условиях довольно точные результаты можно получить после умерщвления животных, суспендирования определенного объема или навески костного мозга в 5% растворе уксусной кислоты и подсчете миелокариocyтов в камере Фукс-Розенталя. Определенный таким образом мегакариocyтарный индекс, по нашим данным, составляет в среднем для мышей СВА - 0,032%, мышей BALB 0,067%, крыс линии Август-0,101%, крыс Вистар - 0,048%.

Определение мегакариocyтарного индекса на срезах костного мозга является наиболее точным из существующих методов [11]. Ранее подобное исследование обычно проводилось лишь при аутопсии [12]. В настоящее время применение в клинике метода трепанобиопсии позволяет с большой точностью производить прижизненный подсчет мегакариocyтов в костном мозгу больных.

Другие органы. Мегакариocyты постоянно присутствуют в капиллярах легких различных видов животных и людей. На 1 см³ среза легочной ткани собак в среднем приходится 1-2 мегакариocyта; введение адреналина приводит к увеличению их содержания до 6,2 на 1 см² [16]. Подсчет мегакариocyтов производится также на срезах печени, лимфатических узлов, в пунктатах селезенки, в абдоминальной жидкости.

Световая микроскопия. Изучение морфологии мегакариocyтов можно проводить на мазках-отпечатках или срезах костного мозга, а также при подсчете их в гемоцитометрах. На мазках, окрашенных обычными гематологическими красителями, идентифицируют 100 и более мегакариocyтов, определяют относительное содержание различных стадий развития мегакариocyтарных клеток (подсчет мегакариocyтограммы), отмечают структурные особенности клеток, наличие или отсутствие отшнуровки кровяных пластинок, проявления фагоцитоза и т.д. Основой существующих классификаций, используемых для построения мегакариocyтограмм, являются такие критерии, как структура и число ядерных сегментов, размеры клетки, окраска и гранулярность цитоплазмы, отшнурование кровяных пластинок [17-21]. Проведены цитометрические исследования мегакариocyтов людей [22]. Большинство авторов выделяет четыре основные стадии развития мегакариocyтов: мегакариобласты, промегакариocyты, зрелые мегакариocyты, дегенеративные формы. Иногда проводят дополнительное деление в зависимости от степени зрелости ядра и окраски цитоплазмы [23], размера зернистости [24], наличия отшнуровки кровяных пластинок [21]. По мере созревания мегакариобласта и превра-

щения его в мегакариоцит увеличиваются размеры клетки, число ядерных сегментов, уменьшается ядерно-цитоплазменное соотношение, цитоплазма теряет базофильную окраску. В цитоплазме зрелых функционирующих мегакариоцитов часто можно видеть азурофильную зернистость, а по периферии — отщепляющиеся кровяные пластинки. Дегенеративные мегакариоциты имеют самую разнообразную форму и величину в зависимости от выраженности процесса дегенерации ядра и цитоплазмы. С помощью окраски ацетокармином, хорошо выявляющей структуру ядерных сегментов и фигуры митоза в мегакариоцитах, был определен митотический индекс мегакариоцитов, оказавшийся равным 17:1000 [25].

Люминесцентная микроскопия. Е. Б. Закржевский и А. Г. Васильева [26] при сравнительном изучении мегакариоцитов костного мозга с помощью окраски водным раствором акридинового оранжевого (1:20 000) фиксированных мазков, а также суправитального и витального флюорохромирования пришли к заключению, что наиболее перспективным является окрашивание флюорохромом в малых, нетоксических концентрациях, позволяющее судить о функциональном состоянии мегакариоцитов. Люминесцентная микроскопия применяется также при иммунофлюоресцентных методах исследования, с помощью которых была продемонстрирована общность антигенной структуры мегакариоцитов и кровяных пластинок [27-29].

Электронная микроскопия. В цитоплазме мегакариоцитов обнаруживается аппарат Гольджи, рибосомы, эндоплазматический ретикулум, митохондрии, а также большое число гранул, вакуолей и канальцев [30-32]. На ранних стадиях развития в цитоплазме образуются плотные зерна, пузырьки ретикулума группируются в цепочки, из которых образуются длинные трубки. Округляясь в дальнейшем, они отграничивают замкнутые участки цитоплазмы с органоидами, из которых формируются будущие кровяные пластинки.

Цитохимические исследования. В мегакариоцитах выявлен гликоген [33, 34], наличие которого связывают с функциональной активностью этих клеток [35, 36]. Путем цитофотометрического анализа установлено, что ДНК, содержащаяся в ядрах мегакариоцитов, удваивается при митозе [37]. В цитоплазме мегакариоцитов здоровых людей постоянно обнаруживаются липопротеиды [38], а количество цитоплазматических нуклеотидов снижается по мере созревания клетки [39]. В мегакариоцитах определяется также кислая фосфатаза, неспецифическая эстераза, окислительные ферменты [40], ацетилхолинэстераза [41, 42], серотонин [43].

Культура ткани и фазовоконтрастная микроскопия. Мегакариоциты изучают при культивировании в течение нескольких суток в средах сложного состава с добавлением витаминов, антибиотиков, плазмы, сыворотки и т.д. Подробное описание картины развития мегакариоцитов при фазовоконтрастной микроскопии приведено Bessis [44]. Мегакариобласты представляют собой объемистые клетки с большим ядром, содержащим одну или две ясно видимые нуклеолы. Цитоплазма темно-серого цвета, не обильна и содержит большое число митохондрий. Базофильные мегакариоциты имеют большое ядро, содержащее контрастный хроматин, и цитоплазму, в которой различаются две части: перинуклеарная с многочисленными и разнообразными гранулами и зона гиалиновой цитоплазмы, в которой гранулы практически отсутствуют. Ядра мегакариоцитов можно отчетливо наблюдать после небольшого сдавления клетки (компрессии).

В культурах костного мозга уже через 4-6 часов после эксплантации наблюдают огрубление зернистости мегакариоцитов, помутнение мембраны, некоторое стирание границ между ядром и цитоплазмой. Далее зернистость скапливается в отдельные полосы, которые распадаются затем на круглые или неправильной формы образования - кровяные пластинки. Этот процесс длится около 48-60 часов [45, 46].

Таким образом, результаты морфологических, цитохимических и других методов исследования позволяют судить о функциональном состоянии мегакариоцитов. Наибольшее значение при этом придается способности мегакариоцитов отшнуровывать кровяные пластинки. В костном мозгу здоровых людей около половины зрелых мегакариоцитов находится в недействительном состоянии [21]. В условиях патологии исследование тромбоцитообразующей функции особенно важно. Так, при болезни Верльгофа количество мегакариоцитов в костном мозге мало изменено или повышено, однако резкое угнетение тромбоцитообразования обуславливает, по-видимому, уменьшение числа кровяных пластинок в периферической крови [20]. Аналогичная картина наблюдается при некоторых формах гиперспленизма, раке, детском лейшманиозе и ряде других заболеваний (см. таблицу). Меньшее практическое значение имеет исследование других функций мегакариоцитов (фагоцитоз, подвижность и др.).

Таблица 1.

Количественные и функциональные изменения мегакариоцитов при некоторых патологических состояниях

Патологическое состояние	Количество мегакариоцитов в костном мозге				Тромбоцитарно-образующая функция мегакариоцитов	Авторы
	Общее	Незрелые формы	Зрелые формы	Дегенеративные формы		
Кровопотеря	Повышено	Повышено	Повышено		Повышено	[55]
Болезнь Вергольфа	Не изменено или повышено	То же	Снижено	Не изменено	Снижено	[20, 56, 57]
Малярия		» »	»	Повышено	Повышено	[28, 58]
Лейкоз (острый)				То же		[59]
Мегакариоцитарный лейкоз	Повышено	То же	»	» »	То же	[4,5, 60]
Рак		» »	»	» »	Снижено	[61, 62]
Ожог	»	» »	Повышено	» »	То же	[63, 64]
Детский лейшманиоз	Снижено				Снижено	[10]
Анафилактический шок	»				»	[65]
Операционная травма						
Болевое воздействие	Повышено	То же	То же		Повышено	[66]
Острая лучевая болезнь	Снижено	Снижено	Снижено	» »	Снижено	[67, 68]

Другие методы исследования. Фагоцитарную способность мегакариоцитов изучают при подсчете мегакариоцитограмм [21] после внутривенного введения животным суспензии бактерий, туши, кислых красок [47], при добавлении в инкубированный костный мозг частичек стекла или культуры пневмококков [48]. Одни авторы признают наличие фагоцитарной способности у мегакариоцитов [21, 48], другие исследователи категорически ее отрицают [49, 50]. По мнению И. А. Кассирского и Г.А.Алексеева [51], способность мегакариоцитов к фагоцитозу является побочной, редко встречающейся функцией, относящейся скорее к патологии, чем к физиологии мегакариоцитов.

Результаты исследования. Особую группу работ составляют исследования кинетики мегакариоцитов, в которых длительность созревания этих клеток определялась с помощью радиоактивной метки. У крыс время созревания предшественников мегакариобласта, определенное с применением тритиевого тимидина, составляет 1-3 суток, а длительность дифференциации от стадии мегакариобласта до зрелого функционирующего мегакариоцита 40 часов [52]. У кроликов при использовании той же метки время созревания мегакариобласта в зрелый мегакариоцит определяется в среднем равным 3 суткам [53]. У человека длительность этого периода составляет 8-9 суток [54].

Заключение. Таким образом, успешная диагностика ряда заболеваний связана с применением и дальнейшим усовершенствованием точных методов определения количества мегакариоцитов в крови, костном мозге и других органах. Для оценки функционального состояния мегакариоцитов представляется перспективным использование способов прижизненного исследования этих клеток в культурах ткани с помощью фазово-контрастной и люминесцентной микроскопии.

Список литературы:

1. Германов В.А. и Бобылев С.А. Определение числа мегакариоцитов в крови // Патология физиология, Ж. М., 1965. -С. 77-85.
2. Даминов Ф.А., Маматова М.Н., Биологические свойства стрептококков в условиях экспериментальной стрептококковой

инфекции // Research Focus International Scientific Journal, 2024, V. 3(10), 33-39.

3. Кадыров Ж.Ф., Ризаев Ж.А., Маматова М.Н. и др. Влияние полиморфизма влияния полиморфизма RS8084 гена HLA-DRA на течение ВИЧ1 инфекции // Журнал теоретической и клинической медицины. Ташкент, - 2025, -С. 11-17.

4. Кадыров Ж.Ф., Маматова М.Н. К морфологическому изучению базофильных гранулоцитов крови // Журнал «Tadqiqotlar. Uz». 2024, Т. 5(2), 25-31 б.

5. Kadirov J.F., Mamatova M.N. The use of infect нематгглютинация реакция for determination of antibodies to staphylococcus toxin // Infektsiya, immunitet end farmakologiy. 2024, 5 (2) 66-75 б.

6. Маматова М.Н. Study of the biological properties of rabies by the method of diagnosis of the "Gold standard" // Scientific Journal, Colden Brain. -2024, Volum 2 (4).

7. Маматова М.Н. Гистологическая диагностика неэффективного эритропоэза // «Тиббиётда янги кун» Илмий журнал. 2024, 7 (69), 77-85 б.

8. Шайкулов Х.Ш., Маматова М.Н., Исокулова М.М. Применение реакции непрямой гемагглютинации для определения антител к стафилококковому токсину // Ж. Экономика и социум. 26.07.2024.

9. Чижиков А.В. Экспериментальное применение столбнячного анатоксина для коррекции постреанимационной патологии центральной и вегетативной нервной системы // Казанский мед. журнал, 2009 г., Том 90, №5.

10. Berne, C. Adhesius involvet in attachment to abiotic surfases by gram-negative bacteria/ C. Berne, A. Ducvet, G.G. Itarby, J.V. Brun // Microbiol. Streptococcus - 2015. - v. 3. №4., oio: 10.1128 / microbiolspec. MB - 0018 -2015.

11. McKenzie P.E., Hawke D., Woodroffe A.J. et al. Serum and tissue immune complexes in infective endocarditis. J. Clin Lab Immunol 1980; 4(3): 125.

12. Фрайштат Д.М. Реактивы и препараты для микроскопии // - М.: Химия, 1980. -С. 480.

Для цитирования: Маматова М., Турсунбоева А., Курбанова М., Рахимова М. Методы изучения структуры и функционального состояния мегакариоцитов // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 4(24). – С. 55–59. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19438000>

**КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ
ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ В ПОПУЛЯЦИИ ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЫ****Джураев М.Г., Азимова С.Б., Василевский Э.А., Дадабаев О.Т.**

Андижанский государственный медицинский институт, г. Андижан, Узбекистан

Резюме. Сравнительный анализ клинико-лабораторного профиля пациентов выявил значимую ассоциацию манифестной персистирующей формы ЦМВИ с выраженными воспалительными, цитолитическими и гематологическими сдвигами на фоне высокой вирусной нагрузки. Установленные закономерности позволяют объективизировать критерии тяжести течения инфекционного процесса, что подчеркивает необходимость внедрения прогностических алгоритмов для раннего выявления групп риска и оптимизации лечебной тактики в популяции Ферганской долины.

Ключевые слова: цитомегаловирусная инфекция, вирусная нагрузка, С-реактивный белок, манифестная форма, предикторы прогрессирования.

**CLINICAL AND LABORATORY CHARACTERISTICS OF VARIOUS FORMS OF
CYTOMEGALOVIRUS INFECTION IN THE POPULATION OF THE FERGANA VALLEY****Djuraev M.G., Azimova S.B., Vasilevskiy E.A., Dadabaev O.T.**

Andijan State Medical Institute, Andijan, Uzbekistan

Resume. A comparative analysis of the clinical and laboratory profiles of patients revealed a significant association between the manifest persistent form of CMV infection and pronounced inflammatory, cytolytic, and hematological changes against the background of a high viral load. The established patterns allow for the objectification of severity criteria for the infectious process, emphasizing the need to implement prognostic algorithms for the early identification of risk groups and optimization of treatment tactics in the population of the Fergana Valley.

Keywords: cytomegalovirus infection, viral load, C-reactive protein, manifest form, predictors of progression.

**ФАРҒОНА ВОДИЙСИ ПОПУЛЯЦИЯСИДА ЦИТОМЕГАЛОВИРУСЛИ ИНФЕКЦИЯНИНГ
ТУРЛИ ШАКЛЛАРИНИНГ КЛИНИК-ЛАБОРАТОР ТАВСИФИ****Жўраев М.Г., Азимова С.Б., Василевский Э.А., Дадабаев О.Т.**

Андижон давлат тиббиёт институти, Андижон ш., Ўзбекистон

Резюме. Беморларнинг клиник-лаборатор профили қиёсий таҳлили юқори вирусли юклама фонида ЦМВИ (цитомегаловирусли инфекция)нинг манифест персистенцияланувчи шакли яққол ялиглашиши, цитолитик ва гематологик ўзгаришлар билан сезиларли даражада боғлиқлигини кўрсатди. Аниқланган қонуниятлар инфекцион жараён кечишининг оғирлик мезонларини объективлаштиришига имкон беради, бу эса Фарғона водийси популяциясида хавф гуруҳларини барвақт аниқлаш ва даволаш тактикасини оптималлаштириш учун прогностик алгоритмларни жорий этиш зарурлигини кўрсатади.

Калим сўзлар: цитомегаловирусли инфекция, вирусли юклама, С-реактив оқсил, манифест шакл, прогрессияланиш предикторлари.

e-mail: doktor12370m@mail.ru, azimovasevara777@gmail.com,
ed1970doctor@mail.ru, omonjondadabayev76@gmail.com

Актуальность. Цитомегаловирусная инфекция (ЦМВИ), вызываемая вирусом Cytomegalovirus humanbeta5 семейства Orthoherpesviridae, является одной из наиболее распространенных инфекционных патологий с высокой медико-социальной значимостью (1, 9, 15). Серопозитивность к ЦМВ среди взрослого населения варьирует от 40% в развитых странах до 95–100% в развивающихся регионах, включая Центральную Азию (1, 9). В Узбекистане предполагается высокий уровень серопозитивности, достигающий 85–95% (1).

Особую угрозу ЦМВИ представляет для новорожденных, беременных женщин и иммунокомпрометированных лиц (8, 13). Врожденная ЦМВИ может вызывать сенсоневральную тугоухость, микроцефалию, задержку развития и другие тяжелые последствия (8, 13). У реципиентов трансплан-

татов ЦМВ является одной из главных причин осложнений и летальности (10, 14). По данным литературы, до 60% реципиентов сталкиваются с ЦМВИ в первый год после трансплантации (14).

Патофизиология ЦМВИ включает прямое цитопатическое действие вируса и опосредованные иммунные механизмы. Вирус обладает высокоразвитыми стратегиями уклонения от иммунного ответа: подавление экспрессии МНС класса I, продукция гомологов интерлейкинов, ингибирование НК-клеток и модуляция апоптоза (11, 12). Эти механизмы объясняют способность ЦМВ к реактивации при ослаблении иммунитета (4, 11).

Несмотря на значительный прогресс в изучении ЦМВИ, данные о клинико-лабораторных особенностях различных форм инфекции в центральноазиатской популяции остаются ограниченными (1, 15). Большинство исследований выполнено на европейских и восточноазиатских популяциях (2, 15). Настоящая работа посвящена сравнительному клинико-лабораторному анализу латентной и манифестной персистирующей форм ЦМВИ у пациентов Ферганской долины.

Материалы и методы. Обследованы 100 больных с верифицированной ЦМВИ, наблюдавшихся в лечебных учреждениях Ферганской долины (клиника "Зам-зам" г. Андижан, Наманганская центральная поликлиника, Ферганская областная инфекционная больница) в период 2019–2025 гг. Контрольную группу составили 80 практически здоровых лиц, сопоставимых по полу и возрасту.

Диагноз устанавливался на основании обнаружения anti-CMV IgM и/или нарастания титра IgG (ИФА, Cobas e411, Roche), детекции ДНК ЦМВ (ПЦР в реальном времени, Rotor-Gene Q, Qiagen) и характерной клинической картины. Всем пациентам выполнен общий анализ крови с лейкоцитарной формулой, биохимический анализ крови (билирубин, АЛТ, АСТ, общий белок, СРБ), определение серологических маркеров и вирусной нагрузки. При показаниях выполнялись нейросонография, УЗИ органов брюшной полости и аудиометрия.

Пациенты разделены на две группы. I группа включала 42 (42,0%) больных с латентной или субклинической формой ЦМВИ (вирусная нагрузка <1000 копий/мл, отсутствие значимых осложнений). II группа объединила 58 (58,0%) пациентов с манифестной и/или персистирующей формой (вирусная нагрузка >1000 копий/мл, наличие органных осложнений, рецидивирующее течение).

Статистическая обработка проведена с использованием SPSS 26.0. Применяли критерий χ^2 Пирсона с поправкой Йейтса; при ожидаемых частотах <5 использовали точный тест Фишера. Различия считались статистически значимыми при $p < 0,05$.

Результаты исследования. Группы были сопоставимы по половому составу и возрастным характеристикам ($p > 0,05$). Среди пациентов II группы достоверно чаще встречались случаи врожденной ЦМВИ (37,9% против 14,3%; $p < 0,01$), что закономерно ввиду более тяжелого течения врожденных форм (табл. 1).

Таблица 1.

Распределение обследованных пациентов по группам

№	Характеристика	I группа (n=42)	II группа (n=58)	p
1	Мужчины	19 (45,2%)	24 (41,4%)	>0,05
2	Женщины	23 (54,8%)	34 (58,6%)	>0,05
3	Дети до 3 лет	14 (33,3%)	26 (44,8%)	>0,05
4	Дети 3–18 лет	10 (23,8%)	12 (20,7%)	>0,05
5	Взрослые	18 (42,9%)	20 (34,5%)	>0,05
6	Врожденная ЦМВИ	6 (14,3%)	22 (37,9%)	<0,01
7	Приобретенная ЦМВИ	36 (85,7%)	36 (62,1%)	<0,01

Анализ клинической картины выявил значительные различия между группами (табл. 2). Во II группе гипертермический синдром регистрировался у 39 (67,2%) пациентов, бронхит отмечен у 18 (31,0%), аллергический дерматит у 11 (19,0%), желудочно-кишечные проявления у 9 (15,5%). У 12 женщин репродуктивного возраста во II группе выявлены нарушения репродуктивной функции: невынашивание беременности у 8, бесплодие у 4 пациенток.

Спектр клинических проявлений у пациентов II группы отличался значительным полиморфизмом. Достоверно преобладали бронхолегочные осложнения (31,0% против 7,1%; $p < 0,01$), что согласуется с данными о тропизме ЦМВ к эпителию дыхательных путей (12). Нарушения репродуктивной

функции во II группе выявлены у 20,7% пациенток, что подчеркивает значимость ЦМВИ как фактора невынашивания и бесплодия (3).

Таблица 2.

Основные клинические проявления ЦМВИ по группам

№	Клинический признак	I группа (n=42)	II группа (n=58)	p
1	Гипертермический синдром	16 (38,1%)	39 (67,2%)	<0,01
2	Лимфаденопатия	8 (19,0%)	21 (36,2%)	<0,05
3	Бронхит	3 (7,1%)	18 (31,0%)	<0,01
4	Аллергический дерматит	4 (9,5%)	11 (19,0%)	>0,05
5	Энтероколит, диарея	2 (4,8%)	9 (15,5%)	>0,05
6	Кандидоз полости рта	–	6 (10,3%)	<0,05
7	Судорожный синдром	–	5 (8,6%)	<0,05
8	Задержка развития	1 (2,4%)	7 (12,1%)	>0,05
9	Нарушение репродукции	2 (4,8%)	12 (20,7%)	<0,05
10	Гепатомегалия	3 (7,1%)	14 (24,1%)	<0,05




Рис. 1. Клинические проявления ЦМВИ по группам

Лабораторные показатели представлены в таблице 3. Между исследуемыми группами прослеживались закономерные различия по всем основным параметрам.

Наличие лейкоцитоза у пациентов II группы ($12,4 \pm 3,7$ против $7,8 \pm 2,1 \times 10^9/\text{л}$) и относительный лимфоцитоз (52,3% против 38,6%) отражают активный воспалительный процесс с преобладанием лимфоцитарной реакции, характерной для вирусных инфекций. Уровень АЛТ при манифестной форме оказался в 1,8 раза выше, что указывает на субклиническое гепатотоксическое действие вируса при персистенции (2, 12). Уровень СРБ во II группе превышал показатели I группы более чем в 4 раза (18,7 против 4,2 мг/л; $p < 0,001$), свидетельствуя о системном воспалительном ответе (5).

Вирусная нагрузка составила $4,6 \pm 1,2$ lg копий/мл во II группе против $2,1 \pm 0,8$ в I ($p < 0,001$). Уровень anti-CMV IgG был почти втрое выше у пациентов с персистенцией ($124,6 \pm 42,3$ против $48,2 \pm 18,6$ МЕ/мл), отражая продолжительный антигенный стимул. Тромбоцитопения ниже $150 \times 10^9/\text{л}$ зафиксирована у 14 (24,1%) пациентов II группы и лишь у 3 (7,1%) I группы, что согласуется с данными о миелосупрессивном потенциале ЦМВ (4, 9).

Таблица 3.

Лабораторные показатели больных ЦМВИ ($M \pm m$)

№	Показатель	I группа (n=42)	II группа (n=58)	p
1	Лейкоциты, $\times 10^9/\text{л}$	$7,8 \pm 2,1$	$12,4 \pm 3,7$	$<0,001$
2	Лимфоциты, %	$38,6 \pm 6,2$	$52,3 \pm 8,4$	$<0,001$
3	Тромбоциты, $\times 10^9/\text{л}$	228 ± 38	186 ± 42	$<0,01$
4	АЛТ, Е/л	$32,7 \pm 9,4$	$58,4 \pm 18,6$	$<0,001$
5	АСТ, Е/л	$29,8 \pm 7,8$	$52,1 \pm 15,3$	$<0,001$
6	Билирубин, мкмоль/л	$14,2 \pm 4,1$	$24,6 \pm 11,3$	$<0,001$
7	Общий белок, г/л	$68,4 \pm 5,2$	$62,1 \pm 7,8$	$<0,01$
8	СРБ, мг/л	$4,2 \pm 2,6$	$18,7 \pm 9,4$	$<0,001$
9	Anti-CMV IgG, МЕ/мл	$48,2 \pm 18,6$	$124,6 \pm 42,3$	$<0,001$
10	Вирусная нагрузка, Ig коп/мл	$2,1 \pm 0,8$	$4,6 \pm 1,2$	$<0,001$




Рис. 2. Основные лабораторные показатели и сопутствующая патология

Сопутствующая патология диагностирована у 67 (67%) обследованных, так анемия различной степени тяжести выявлена у 38 (38%) пациентов, гиповитаминозы у 19 (19%), рахит у 6 (6%). Во II группе анемия регистрировалась достоверно чаще (46,6% против 26,2%; $p < 0,05$), что может быть обусловлено непосредственным воздействием вируса на костный мозг и хроническим воспалительным процессом. У детей с врожденной ЦМВИ из II группы ($n=22$) преобладали задержка роста и психомоторного развития у 7 (31,8%), судорожный синдром у 5 (22,7%), гидроцефалия у 2 (9,1%), желтуха у 3 (13,6%). Судорожный синдром у 5 детей потребовал неотложной госпитализации. Нейросонография выявила субэпендимальные кальцификаты у 3 пациентов (8, 13).

Обсуждение. Результаты нашего исследования подтверждают, что манифестная персистирующая форма ЦМВИ ассоциирована с более выраженными воспалительными, цитолитическими и гематологическими сдвигами по сравнению с латентной формой. Эти данные согласуются с результатами Краснова В.В. и соавт. (2020), показавших особенности иммунного ответа при ЦМВИ у детей (6), а также с работами Кныш С.В. и Сизякиной Л.П. (2020), продемонстрировавших изменения цитокинового профиля при хронической ЦМВИ (5). Повышение трансаминаз преимущественно у пациентов II группы свидетельствует о субклиническом гепатотоксическом воздействии вируса. Griffiths P. и Reeves M. (2021) подробно описали механизмы прямого цитопатического действия ЦМВ на гепатоциты (12). Горбачев В.В. и Ивашкин В.Т. (2021) показали аналогичные изменения у пациентов с сепсисом и реактивацией ЦМВ (2).

Достоверное преобладание бронхолегочных осложнений при манифестной форме (31,0% против 7,1%) объясняется тропизмом ЦМВ к эпителию респираторного тракта. Данные наблюдения со-

гласуются с результатами Razonable R.R. и Humar A. (2020), описавших широкий спектр органных поражений при ЦМВИ (14). Нарушения репродуктивной функции, выявленные у 20,7% пациенток II группы, подтверждают необходимость обязательного обследования на ЦМВ при подготовке к беременности, что было продемонстрировано Гордеевой Л.А. и соавт. (2019) (3).

Полученные данные о высокой частоте анемии у пациентов с персистирующей формой согласуются с концепцией миелосупрессивного действия ЦМВ, описанной Slobedman B. et al. (2019) и Дмитровой А.А. (2020) (4). Снижение общего белка во II группе отражает нарушение белково-синтетической функции на фоне хронического воспаления.

Практическая значимость полученных результатов определяется необходимостью выделения прогностических критериев, позволяющих на раннем этапе идентифицировать пациентов с высоким риском перехода латентной формы в манифестную. Комплексная оценка лабораторных показателей (вирусная нагрузка, СРБ, трансаминазы) в сочетании с клиническими данными может служить основой для стратификации риска и персонализации терапевтической тактики.

Выводы:

1. Манифестная персистирующая форма ЦМВИ в популяции Ферганской долины ассоциирована с выраженными лабораторными сдвигами, выраженным лейкоцитозом с лимфоцитозом, повышением трансаминаз в 1,8 раза, 4-кратным повышением уровня СРБ и вирусной нагрузкой более 4 lg копий/мл. 2. Спектр клинических проявлений манифестной формы ЦМВИ характеризуется достоверным преобладанием бронхолегочных осложнений (31,0%), нарушений репродуктивной функции (20,7%) и гепатомегалии (24,1%) по сравнению с латентной формой. 3. Среди детей с врожденной ЦМВИ преобладают задержка развития (31,8%) и судорожный синдром (22,7%), что требует нейросонографического контроля и междисциплинарного подхода к их лечению и реабилитации. 4. Сопутствующая анемия достоверно чаще сопровождает манифестную форму ЦМВИ (46,6% против 26,2%; $p < 0,05$), что указывает на миелосупрессивное воздействие вируса и диктует необходимость коррекции анемического синдрома.

Список литературы:

1. Ахмедов А.А., Рахматуллаева Ш.Б. Серопревалентность цитомегаловирусной инфекции в Узбекистане // Инфекция, иммунитет и фармакология. – 2019. – №5. – С.48–54.
2. Горбачёв В.В., Ивашкин В.Т. Реактивация цитомегаловируса у пациентов с сепсисом // Рос. журн. гастроэнтерологии. – 2021. – Т.31, №3. – С.55–63.
3. Гордеева Л.А., Шабалдин А.В. Иммуногенетические аспекты вертикальной передачи ЦМВИ // Мед. иммунология. – 2019. – Т.21, №4. – С.689–698.
4. Дмитрова А.А. ЦМВ-специфический Т-клеточный иммунитет после аллогенной трансплантации // Гематол. и трансфузиол. – 2020. – Т.65, №1. – С.78–89.
5. Кныш С.В., Сизякина Л.П. Цитокиновый профиль при хронической ЦМВИ // Иммунология. – 2020. – Т.41, №5. – С.412–418.
6. Краснов В.В., Обрядина А.П. Особенности иммунного ответа при ЦМВИ у детей // Педиатрия. – 2020. – Т.99, №4. – С.201–208.
7. Марданлы С.Г. Лабораторная диагностика TORCH-инфекций // Клин. лаб. диагностика. – 2018. – Т.63, №9. – С.568–574.
8. Boppana S.B., Ross S.A., Fowler K.B. Congenital cytomegalovirus infection: clinical outcome // Clin. Infect. Dis. – 2021. – Vol.57(Suppl 4). – P.S178–S181.
9. Cannon M.J., Schmid D.S., Hyde T.B. Review of cytomegalovirus seroprevalence // Rev. Med. Virol. – 2010. – Vol.20. – P.202–213.
10. Fishman J.A. Infection in organ-transplant recipients // N. Engl. J. Med. – 2017. – Vol.338. – P.1741–1751.
11. Goodrum F., Caviness K., Zagallo P. Human cytomegalovirus persistence // Cell. Microbiol. – 2021. – Vol.14(5). – P.644–655.
12. Griffiths P., Reeves M. Pathogenesis of human cytomegalovirus // Nat. Rev. Microbiol. – 2021. – Vol.19. – P.759–773.
13. Lanzieri T.M., Dollard S.C. et al. Systematic review of congenital CMV // J. Clin. Virol. – 2017. – Vol.68. – P.6–14.
14. Razonable R.R., Humar A. Cytomegalovirus in solid organ transplantation // Am. J. Transplant. – 2020. – Vol.13(Suppl 4). – P.93–106.
15. Wang H., Li T., Zhang X. Global epidemiology of cytomegalovirus // J. Infect. Dis. – 2020. – Vol.216(Suppl 5). – P.S429–S435.

Для цитирования: Джураев М.Г., Азимова С.Б., Василевский Э.А., Дадабаев О.Т. Клинико-лабораторная характеристика различных форм цитомегаловирусной инфекции в популяции Ферганской долины // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 4(24). – С. 60–64. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19438048>

ИММУН ТИЗИМИ РЕГУЛЯЦИЯСИДА ТРОМБОЦИТЛАР АҲАМИЯТИ**Абдирашидова Г.А.**

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Тромбоцитлар қон томирларининг шикастланиши туфайли қон йўқотишининг олдини олади ва юрак-қон томир касалликларида тромблар шаклланишига ёрдам беради. Ушбу классик роллarga қўшимча равишда, тромбоцитлар ҳужайининг иммун реакцияси учун жуда муҳимдир. Улар махсус рецепторлар, ҳужайра ичидаги сигнал каскадлари ва эффектор функциялари орқали қон томирларини патогенлардан ҳимоя қилади. Тромбоцитлар, шунингдек, туғма иммунитет ҳужайраларига кўрсатма бериш, адаптив иммун назоратини қўллаб-қувватлаш ва антитело ишлаб чиқариш ва Т-ҳужайраларининг поляризациясига таъсир қилиш орқали яллигланиш реакцияларини бузади. Шу билан бирга, тромбоцитлар тўқималарни тиклашни рағбатлантиради ва яллигланиш жараёнларидан кейин томирлар фаолиятини қўллаб-қувватлайди. Бироқ, бу кўп қиррали ҳужайраларнинг тартибга солинмаган фаоллашуви кейинги микротомирларда коагуляция, ҳаддан ташқари яллигланиш ва макротомирлар тромбози хавфи ортиши билан иммунопатологияни кучайтиради. Ушбу дихотомия иммунитетдаги тромбоцитлар функциясини тўғри аниқлаш ва потенциал модуляция қилишнинг муҳим аҳамиятини таъкидлайди.

Калим сўзлар: тромбоцит, иммунитет, яллигланиш, тромбоз

THE IMPORTANCE OF THROMBOCYTES IN THE REGULATION OF THE IMMUNE SYSTEM**Abdirashidova G.A.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Platelets prevent blood loss due to damaged blood vessels and help form blood clots in cardiovascular disease. In addition to these classical functions, platelets are essential for the host immune response. They protect blood vessels from pathogens through specific receptors, intracellular signaling cascades and effector functions. Platelets also modulate inflammatory responses by instructing innate immune cells, maintaining adaptive immune control, and influencing antibody production and T cell polarization. At the same time, platelets stimulate tissue repair and maintain vascular activity after inflammatory processes. However, unregulated activation of these multipotent cells exacerbates immunopathology with a consequent increased risk of microvascular coagulation, excessive inflammation, and macrovascular thrombosis. This dichotomy highlights the importance of correctly identifying and potentially modulating platelet function in the immune system.

Key words: platelets, immunity, inflammation, thrombosis.

ЗНАЧЕНИЕ ТРОМБОЦИТОВ В РЕГУЛЯЦИИ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ**Абдирашидова Г.А.**

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Тромбоциты предотвращают потерю крови из-за повреждения кровеносных сосудов и помогают образовывать тромбы при сердечно-сосудистых заболеваниях. В дополнение к этим классическим функциям тромбоциты необходимы для иммунного ответа хозяина. Они защищают кровеносные сосуды от патогенов посредством специфических рецепторов, внутриклеточных сигнальных каскадов и эффекторных функций. Тромбоциты также модулируют воспалительные реакции, инструктируя клетки врожденного иммунитета, поддерживая адаптивный иммунный контроль и влияя на выработку антител и поляризацию Т-клеток. В то же время тромбоциты стимулируют восстановление тканей и поддерживают активность сосудов после воспалительных процессов. Однако нерегулируемая активация этих мультипотентных клеток усугубляет иммунопатологию с последующим повышенным риском коагуляции микрососудов, чрезмерного воспаления и тромбоза макрососудов. Эта дихотомия подчеркивает важность правильной идентификации и потенциальной модуляции функции тромбоцитов в иммунитете.

Ключевые слова: тромбоциты, иммунитет, воспаление, тромбоз.

Тромбоцитлар биринчи марта 1882 йилда қон ивишида муҳим рол ўйнайдиган оддий қон таркибий қисмлари сифатида тасвирланган. Ўшандан бери кўп ядроли мегакариоцитлардан ажралиб

чиқадиган бу ядросиз ҳужайралар нафақат қон кетишдан ҳимоя қилиш учун муҳим, балки тромбозда ҳам муҳим рол ўйнаши тобора аниқ бўлди. Тромбоз қон томир касалликларининг инсульт, миокард инфаркти ва периферик қон томирларининг тикилиб қолишига олиб келадиган умумий терминал йўли бўлганлиги сабабли, тромбоцитлар бу касалликларга қарши курашда, айниқса, иккиламчи профилактикада фармакологик аралашувда биринчи ўринда туради (1, 3, 9).

Тромбоцитларнинг классик роли: тромблар шаклланиши. Тромбоцитлар эритроцитлардан кейин қондаги иккинчи энг кўп ҳужайра тури бўлиб, қон томирларининг шикастланишини тезда аниқлаш ва жавоб беришга идеал мослашган. Улар буни ҳужайрадан ташқари матрица оқсилларини, хусусан, фон Виллебранд омили ва коллагенни танийдиган махсус рецепторларни жалб қилиш орқали амалга оширадилар (1, 3, 11). Ушбу лигандларнинг тан олиниши томирлар яхлитлигининг бузилишини англатади ва тромбоцитлар шикастланиш жойларида ушлаб туриш учун ўзларининг кесишга чидамли гликопротеин (ГП) Ib-V-IX комплексидан фойдаланадилар (1, 2, 6). Тез сигнал узатиш механизми миллисекундларда фаоллашишга имкон беради, чунки тромбоцитлар GPIIb/IIIa (ичкаридан ташқари сигнализация деб аталадиган жараён) каби қўшимча рецепторларга яқинликни оширади ва АДФ ва тромбосан каби пара- ва аутокрин фаоллашув сигналларини чиқаради (1, 5, 6). Бу, ўз навбатида, қўшимча тромбоцитларни жалб қилади, улар GPIIb/IIIa-фибрин (оген) орқали ўзаро боғланиб, тромб ҳосил қилади. Тромбнинг шаклланиши ташқи сигнализация деб аталадиган GPIIb/IIIa воситачилигида кейинги фаоллашувга олиб келади (1, 5, 10). Алоҳида тромбоцитлар 70 nN гача бўлган сезиларли кучларни ҳосил қилиши мумкин, бу миобластлар томонидан ҳажмга таъсир қиладиган кучдан икки марта каттароқдир. Ушбу механик хусусиятлар ривожланаётган тромбни янада барқарорлаштиради (1, 6, 7). Бунга параллел равишда кучли агонистлар ва кооператив сигнализация прокоагулянт трансформациясини ишга туширади, бу эса манфий зарядланган фосфолипидларни, шу жумладан фосфатидилсеринни экзоплазматик сиртга айлантиради ва коагуляцион омилларни боғлаш ва протромбин комплексини шакллантириш имконини беради (1, 8, 9). Бу кейинчалик фибрин ҳосил бўлишига ва ўзаро боғланишга олиб келади, натижада қон лахтаси барқарорлашади (1, 10, 12).

Қон томирларининг яхлитлигини бузиш ҳам патогенлар учун потентсиал кириш нуқтасини ифодалайди. Умurtқасиз ҳайвонларда қон ивиши ва туғма иммун функциялари ядроли ҳужайранинг бир тури - гемосит томонидан тезлашади (1). Бу икки функциянинг эволюцион ажралишидан сўнг, бир томондан тромбоцитлар ўзларининг иммун эффектор функцияларининг бир қисмини сақлаб қолган бўлиши мумкин. Бошқа томондан, умurtқали ҳайвонларда гемостатик тромб ҳосил бўлгандан кейин иммунитет ҳужайраларини шикастланиш жойларига йўналтиришда туғма иммунитет билан яқин интеграция асосий бўлиб қолади. Бундан ташқари, уларнинг кўплиги, тезкор реакцияси ва иммун рецепторларининг ифодаси туфайли тромбоцитлар қон томир чегараларида патогенларни аниқлаш учун идеал сенсорлар бўлиб хизмат қилиши мумкин, уларнинг тизимли инфекциялари ва сепсисдаги ролини қўллаб-қувватлайди (1, 2, 4).

Тромбоцитлар иммун арсенали ва ажратиладиган яллиғланиш эффекторлари. Туғма иммунитет учун патогенларни таниб олиш жуда муҳимдир. Тромбоцитлар интраваскуляр патогенларни аниқлаш, боғлаш ва ҳўжайин реакциясини келтириб чиқариш учун бир нечта стратегияларга эга. Биринчидан, улар потенциал босқинчиларнинг сирт тузилиши билан бевосита таъсир ўтказа оладиган турли хил рецепторларни ифодалайди. Мисол учун, стрептококклар томонидан ифодаланган GspB каби юқори даражада гликозилланган серинга бой такрорий (SRR) оқсиллари Gp1b билан боғланади (1, 9, 10). Staphylococcus aureus GPIIb/IIIa билан тўғридан-тўғри таъсир қилиши мумкин бўлган темир билан бошқариладиган сирт детерминантларини ифодалайди (1, 9, 12). Лекин тўғридан-тўғри ўзаро таъсир бактериялар билан чегараланиб қолмайди; Одамнинг иммунитет танқислиги вируси (ОИВ) тромбоцитларга кириши асосан DC-SIGN ва CLEC-2 рецепторлари орқали амалга оширилади (1, 3, 8). Ушбу ўзаро таъсир комбинацияланган антивирус даволаш пайтида ОИВ учун вирусли резервуар бўлиб хизмат қилиши мумкин ва CD4 + Т ҳужайраларининг заиф жавоблари билан боғлиқ. Тромбоцитларни тормозлаш вирионларнинг тромбоцитлардан бошқа ҳўжайра турларига ўтказилишини чеклаши мумкин (1, 7). Инсон тромбоцитлари иммуноглобин G (IgG) Fc рецепторлари FcγRIIA (CD32a) ни ифодалайди, бу мономерик IgG га паст яқинликка эга, лекин IgG билан қопланган патогенлар ва иммун комплексларни юқори авидлик билан боғлайди. Бу H1N1 гриппи, стрептококклар ва Bacillus anthracis билан ўзаро таъсирга тегишли. Туғма ва адаптив иммунитет ҳужайралари томонидан амалга ошириладиган иккинчи муҳим ҳимоя механизми гранулалар таркибини чиқаришдир. Тромбоцитлар икки турдаги гранулаларни ўз ичига олади: алфа ва зич гранулалар. Алфа гранулалари 300 дан ортқ биологик фаол моддаларни ўз ичига олади, улар тромб шаклланишига ёрдам беради ва шунингдек,

организмнинг ҳимоя кучларини қўллаб-қувватлайди. Мисол учун, улар *S. aureus* ўсишини тўғридан-тўғри тормозлаши мумкин бўлган дефензинларни чиқариши мумкин. Бундан ташқари, протромбоцит ядро оксиленинг дифференциал протеолитик бўлиниши бир қатор микробицид тромбоцитлар оксилларини яратиши мумкин. Тромбоцитлар СХС химокинларининг С-терминалини делецияси маҳсулотлари бўлиб, замбуруғлардан бактерияларгача бўлган кенг доирадаги фаолиятга эга. Киноцидинлар цитокинлар бўлиб, улар сигнализация функциясидан ташқари, тўғридан-тўғри микробларга қарши таъсирга эга. Мисол учун, CXCL7 (NAP-2) нейтрофилларни шикастланган жойларга жалб қилиши ва Легионеллалардан ҳимояланишга ҳисса қўшиши мумкин (1, 10).

Тромбоцитларнинг туғма иммунитет билан ўзаро таъсири. Тромбоцитларнинг эффектор функциялари арсенали туғма иммунитет ҳужайралари, айниқса нейтрофиллар билан яқин ўзаро таъсирни таъминлайди. Тез таъсир кўрсатиши ва қўп сонлилиги, шунингдек, силжиш стресси остида ёпишиш қобилияти туфайли тромбоцитлар биринчи бўлиб яллиғланиш жойларига етиб боради ва фаоллаштирилган эндотелийга ёпишади. Бу тромбоцитлар учун туғма иммунитет реакциясини вақтинчалик ва фазовий равишда бошқариладиган тарзда бошқариш учун идеал ҳолат. Қизиғи шундаки, уларнинг туғма иммунитет билан ўзаро таъсири Янус характериға эга: бир томондан тромбоцитлар туғма иммунитет реакцияларининг кучли фаоллаштирувчиси бўлса, бошқа томондан улар яллиғланиш реакцияларини бошқарадиган муҳим назорат нукталарини ҳам ифодалайди.

Юқорида муҳокама қилинган яллиғланишга қарши агонистларга қўшимча равишда, яллиғланган томир деворига тўпланган тромбоцитлар нейтрофиллар билан бевосита таъсир ўткази оладиган турли хил рецепторларга ва / ёки лигандларга эга. Шундай қилиб, улар кировчи нейтрофиллар учун қўниш жойи вазифасини бажаради ва трансмиграция ва экстравазацияга ёрдам беради (1, 12). Бу муҳим функциядир, чунки тромбоцитлар камайиши яллиғланишнинг турли хил сичқонча моделларида иммун ҳужайра экстравазациясини кучли камайтиради ёки ҳатто тўхтатади. Шунга қўра, тромбоцитопения грам-манфий ва грам-мусбат пневмонияларда ҳужайин муҳофаасини, айниқса нейтрофиллар жавобини бузади, бу эса бактериал юк ва ўлимнинг ошишига олиб келади (1).

Иммунотромбоз. Патогенлар эпителиал ва эндотелиал тўсиқларни кесиб ўтиб, қон томирларига кириш имконига эга бўлгандан сўнг, ҳужайин учун патогеннинг гематоген йўл билан тарқалишининг олдини олиш жуда муҳимдир. Бунга асосан микротомирларда интраваскуляр коагуляцияни бошлаш орқали эришилади, инвазив патогенни самарали ушлаб туради ва ўз ичига олади. Фаоллаштирилган моноцитлар тўқима омилини чиқаради ва шунинг учун ташқи коагуляция каскадини бошлаши мумкин ва нейтрофиллар серин протеазаларни, шунингдек, коагуляцияни фаоллаштириш ва тромбоцитлар ва вон Виллебранд омилини жалб қилиш орқали янги пайдо бўлган томир ичидаги лахтани барқарорлаштирадиган НЕТларни сиқиб чиқаради, шунингдек, тўғридан-тўғри микробитсид функцияга эга. Тромбоцитлар ва туғма иммунитет ҳужайраларининг ўзаро таъсири ўзаро фаоллашув сигналлари орқали иммунотромбознинг бошланиши ва тарқалиши учун жуда муҳимдир. Бу жараён грипп ва *E. Coli* бактериемиясида ҳимоя эканлиги аниқланган бўлса-да, уни қатъий назорат қилиш керак, чунки микро ва макротомирлар тромбози тўқималарнинг гипоксиясига ва ҳужайра ўлимига олиб келиши мумкин. Дарҳақиқат, бутун дунё бўйлаб ўлимнинг асосий сабаблари бўлган артериал ва веноз тромбоз патогенлар келтириб чиқарадиган иммунотромбоз билан умумий йўлларга эга. Ушбу патомеханизмнинг инсон касалликларидаги аҳамияти COVID-19 пандемияси даврида яна бир бор исботланган. Оғир SARS-CoV-2 инфекцияси бўлган беморларда нафас олиш етишмовчилиги ва тромботик асоратларнинг юқори даражасидан ташқари тизимли органлар дисфункцияси ҳам учрайди. Кенг қамровли тадқиқотлар шуни кўрсатдики, бу гетероген кўриниш тартибга солинмаган иммунотромбоз билан боғлиқ бўлиб, микротомирлар тромбози ва органларнинг шикастланишига, шунингдек, юрак-қон томир асоратларига мойил бўлган тизимли протромботик ҳолатга олиб келади. Шуни таъкидлаш керакки, иммунотромбоз стандарт антикоагулянт даволашга қисман чидамли бўлиб, ўзига хос антитромбояллиғланиш дориларга бўлган эҳтиёжни таъкидлайди (1, 15).

Хулоса. Юрак-қон томир касалликларида тромбоцитлар ўзларининг ноёб рецепторлари тўплами, нисбатан қисқа яримпарчаланиш даври ва янги оксил синтезининг чекланган қобилияти туфайли идеал фармакологик мақсадларни ифодалайди. Тромбоцитларнинг ҳужайин муҳофааси ва яллиғланишнинг марказий регуляторлари сифатида пайдо бўлаётган тасвири махсус рецепторлар сигнализация ўқларини жалб қилади, бу ҳужайра турини тромбоздан ташқари йўналтириш орқали чуқур клиник фойда олиш потенциалини таъкидлайди. Ушбу мақсадларга эришиш учун турли касалликларда тромбоцитлар ва иммунитет тизими ўртасидаги мураккаб ўзаро таъсирларни яхшироқ тушунишимиз керак ва шу билан такрорланадиган кўринишларни аниқлашимиз керак. Бундан ташқари, инсон касалликларида тромбоцитлар фенотиби ва функциясини яхшироқ тушуниш учун

омика технологияларидан фойдаланишни ўз ичига олган мазмунли трансляцион тадқиқотларни ўтказиш жуда муҳимдир.

Адабиётлар рўйхати:

1. Leo Nicolai, Kami Pekayvaz, Steffen Massberg, Platelets: Orchestrators of immunity in host defense and beyond, Immunity, Volume 57, Issue 5, 2024, Pages 957-972.
2. Samieva G. U., Abdirashidova G. A., Sobirova Sh B. Prognostic value of cytokine spectrum and their changes in primary and recurrent laryngotracheitis in children //Innovative research: problems of implementation of results and directions of development. – 2017. – С. 103.
3. Самиева Гулноза, Абдирашидова Гулноза, Курбанов Голиб Патогенетические аспекты эндогенной интоксикации и ее влияние на течение различных форм стенотического ларинготрахеита у детей // Обзорение европейской науки. 2018. №9-10-2.
4. Utkurovna S. G., Bahtiyarovna S. S., Gulnoz A. Integrated Approaches to The Diagnosis, Treatment, And Prevention of Stenosing Laryngotracheitis In Children //European Journal of Molecular & Clinical Medicine. – 2020. – Т. 7. – №. 03. – С. 2020.
5. Саидова, Ф. С., Г. У. Самиева, and Г. А. Абдирашидова. "Дефицит микронутриентов у детей дошкольного возраста." Журнал биомедицины и практики 7.1 (2022).
6. Особенности патогенеза, оптимизация профилактики и методы интенсивной терапии осложнений у беременных с хроническим ДВС-синдромом. М.К. Эргашевна, А.Г. Аблакуловна, М.Б. Аминовна - Тематический журнал образования, 2022
7. Features of etiopathogenesis of dry eye syndrome in women of Kashkadarya region. SG Utkurovna, AG Ablakulovna, OF Orifjonovna - Journal of biomedicine and practice, 2023
8. Utkurovna S. G., Ablakulovna A. G. Pathophysiology of the triad of young sports girls aspects //Конференции. – 2020.
9. Саидова Ф. С., Самиева Г. У., Абдирашидова Г. А. Дефицит микронутриентов у детей дошкольного возраста //Журнал биомедицины и практики. – 2022. – Т. 7. – №. 1.
10. Approximate solution of some linear delay differential equations in medicine A Abdirashidov, G Abdirashidova - ISJ Theoretical & Applied Science, 12 (80), 2019
11. Samieva Gulnoza Utkurovna, Abdirashidova Gulnoza Ablakulovna, Narzullaeva Umida Rahmatullaevna, Toirova Sakina Bahodirovna, Mamadiyarova Dilshoda Umurzakovna The condition of pro-and antioxidant systems in children with acute laryngotracheitis with immunomodulating therapy // Достижения науки и образования. 2019. №10 (51).
12. Абдирашидова Гулноза Аблакуловна, Бакиев Шавкат Шерзодович. Цитокин бўрони патофизиологияси // Fan, ta'lim, madaniyat va innovatsiya [Jild: 03Nashr: 3(2024)]ISSN:2992-8915
13. Абдирашидова Гулноза Аблакуловна, Бакиев Шавкат Шерзодович. Прогностическое значение спектра цитокинов и их изменения при первичных и рецидивирующих ларинготрахеитах у детей // Universal journal of medical and natural sciences, Volume 2, Issue 9 (2024), P 87-92.
14. Abdirashidova Gulnoza Ablakulovna, Bakiyev Shavkat Sherzodovich. Yurak-qon tomir tizimining balandlik holatida gipoksiyaga adaptatsiyasi patofiziologiyasi // Academic research in modern science International scientific-online conference-2024, P 11-17.
15. Abdirashidova Gulnoza Ablakulovna, Yurak-qon tomir tizimining balandlik holatida gipoksiyaga adaptatsiyasi patofiziologiyasi // Models and methods in modern science International scientific-online conference-2024, P 88-95.
16. Abdirashidova Gulnoza Ablakulovna. Diabetik aterotromboz patogenezida yangi jihatlar // Fan, ta'lim, madaniyat va innovatsiya [Jild: 03Nashr: 5 (2024)]ISSN:2992-8915, 74-76 b.
17. Abdirashidova Gulnoza Ablakulovna, Umumiy xavf omillari va mexanizmlariga ega yurak-qon tomir kasalliklari va saraton patofiziologiyasi // Fan, ta'lim, madaniyat va innovatsiya [Jild: 03Nashr: 5 (2024)] 150-155 b.
18. Самиева Гулноза Уткуровна, Абдирашидова Гулноза Аблакуловна, Бакиев Шавкат Шерзодович, Цитокин бўрони патофизиологиясига замонавий карашлар // Биология ва тиббиёт муаммолари 2024, №1 (151), 431-435 b.
19. Gaffarov Ganisher Karimovich, Abdirashidova Gulnoza Ablakulovna, & Bakiyev Shavkat Sherzodovich. (2024). To'r parda ko'chishi patofiziologiyasi. Fan, ta'lim, madaniyat va innovatsiya jurnali | Journal of science, education, culture and innovation, 3(5), 231–236.

Иктибос учун: Абдирашидова Г.А. Иммуно тизими регуляциясида тромбоцитлар аҳамияти // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2026. – № 4(24). – Б. 65–68. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19438197>

МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ СИНДРОМ: ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ, МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ВЛИЯНИЕ НА ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВУЮ ОБЛАСТЬ

Ризаев Ж.А.¹, Орипов Ф.С.¹, Зейнитдинова З.А.²

¹Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

²Стоматологическая клиника «Star Dental Clinic», г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. Метаболический синдром представляет собой мультифакторное патологическое состояние, объединяющее абдоминальное ожирение, инсулинорезистентность, артериальную гипертензию и дислипидемию, что значительно повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета 2 типа. В данной обзорной статье рассмотрены современные представления о патогенетических механизмах метаболического синдрома, включая молекулярные, клеточные и системные изменения. Особое внимание уделено морфофункциональным изменениям жировой ткани, нарушениям микроциркуляции, остеогенеза и регенерации. Проанализированы гистологические и иммуногистохимические особенности адипоцитов, а также роль воспалительных цитокинов и гормонов в развитии метаболических нарушений. Рассмотрено влияние метаболического синдрома на ткани челюстно-лицевой области, включая изменения в пародонте, костной ткани.

Ключевые слова: метаболический синдром, инсулинорезистентность, ожирение, микроциркуляция, остеогенез, челюстно-лицевая область, пародонтит, иммуногистохимия

METABOLIC SYNDROME: PATHOGENETIC MECHANISMS, MORPHOFUNCTIONAL CHANGES, AND IMPACT ON THE MAXILLOFACIAL REGION

Rizaev J.A.¹, Oripov F.S.¹, Zeynitdinova Z.A.²

¹Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

²«Star Dental Clinic», Tashkent, Uzbekistan

Resume. Metabolic syndrome is a multifactorial pathological condition characterized by abdominal obesity, insulin resistance, arterial hypertension, and dyslipidemia, significantly increasing the risk of cardiovascular diseases and type 2 diabetes mellitus. This review article presents current insights into the pathogenetic mechanisms of metabolic syndrome, including molecular, cellular, and systemic alterations. Special attention is given to morphofunctional changes in adipose tissue, as well as disturbances in microcirculation, osteogenesis, and tissue regeneration. Histological and immunohistochemical characteristics of adipocytes are analyzed, along with the role of inflammatory cytokines and hormones in metabolic dysregulation. The impact of metabolic syndrome on the maxillofacial region is discussed, including alterations in periodontal tissues, bone metabolism.

Keywords: metabolic syndrome, insulin resistance, obesity, microcirculation, osteogenesis, maxillofacial region, periodontitis, immunohistochemistry

МЕТАБОЛИК СИНДРОМ: ПАТОГЕНЕТИК МЕХАНИЗМЛАР, МОРФОФУНКЦИОНАЛ ЎЗГАРИШЛАР ВА ЮЗ-ЖАҒ СОҲАСИГА ТАЪСИРИ

Ризаев Ж.А.¹, Орипов Ф.С.¹, Зейнитдинова З.А.²

¹Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

²«Star Dental Clinic» стоматология клиникаси, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. Метаболик синдром — бу абдоминал семизлик, инсулинга резистентлик, артериал гипертензия ва дислипидемия билан характерланадиган кўп омилли патологик ҳолат бўлиб, юрак-қон томир касалликлари ва 2-тип қандли диабет ривожланиши хавфини оширади. Ушбу обзор мақолада метаболик синдромнинг патогенетик механизмлари, жумладан молекуляр, ҳужайравий ва тизимли ўзгаришлар ёритилган. Ёғ тўқимасидаги морфофункционал ўзгаришлар, микроциркуляция, остеогенез ва регенерация жараёнларидаги бузилишларга алоҳида эътибор қаратилган. Адипоцитларнинг гистологик ва иммуногистокимёвий хусусиятлари, шунингдек яллиғланиш цитокинлари ва гормонларнинг роли таҳлил қилинган. Метаболик синдромнинг юз-жағ соҳасига таъсири, жумладан пародонт тўқималари, суяк тўқимасидаги ўзгаришлар кўриб чиқилган.

Калит сўзлар: метаболик синдром, инсулинга резистентлик, семизлик, микроциркуляция, остеогенез, юз-жағ соҳаси, пародонтит, иммуногистокимё

Введение. Среди различных возрастных групп метаболический синдром (МС) представляет собой сложное состояние, характеризующееся целым рядом факторов метаболического риска, повышающих вероятность сердечно-сосудистых заболеваний и диабета второго типа. Основными компонентами МС являются абдоминальное ожирение, инсулинорезистентность, артериальная гипертензия и дислипидемия, которые часто взаимосвязаны и усугубляют последствия друг друга. Если артериальная гипертензия и сахарный диабет сопровождаются метаболическим синдромом, то осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы увеличиваются в 2-5 раз [1].

Абдоминальное ожирение. Абдоминальное или висцеральное ожирение считается неотъемлемой частью метаболического синдрома и является первым негативным показателем патологической цепочки, которая возникает при этом состоянии [48]. При метаболически нормальном ожирении (в этом случае присутствует генетическое ожирение, чувствительность к инсулину, сохраняется физическая активность) в подкожной жировой клетчатке одновременно наблюдается гиперплазия адипоцитов и увеличение их мелких форм [8] (табл.1).

Таблица 1.

Сравнительные лабораторные показатели при метаболически нормальном и метаболически нездоровом ожирении

Показатель	Метаболически нормальное ожирение (МНО)	Метаболически нездоровое ожирение
Глюкоза натощак	< 5,6 ммоль/л (норма)	≥ 5,6 ммоль/л (гипергликемия)
HbA1c	< 5,7 %	≥ 5,7 % (преддиабет / диабет)
Инсулин / HOMA-IR	В пределах нормы, отсутствует выраженная инсулинорезистентность	Повышен, выраженная инсулинорезистентность
Триглицериды	< 1,7 ммоль/л	≥ 1,7 ммоль/л
ЛПВП (HDL)	Норма (> 1,0 ммоль/л у мужчин; > 1,2 ммоль/л у женщин)	Понижен
ЛПНП (LDL)	В пределах нормы	Часто повышен
С-реактивный белок (СРБ)	В пределах нормы	Повышен
Артериальное давление	< 130/85 мм рт. ст.	≥ 130/85 мм рт. ст. или диагностирована гипертензия

Примечание: Критерии основаны на определениях метаболического синдрома, предложенных IDF (International Diabetes Federation, 2023) AHA/NHLBI (American Heart Association, 2009; обновлённые данные 2022).

Адипоциты морфологически делятся на бурые и белые виды, которые морфофункционально отличаются друг от друга. В белой жировой ткани жировые клетки, которые образуют триглицериды, большие, а в других видах адипоцитов они маленькие и их много. К функциям адипоцитов относятся защитная, энергетическая и гормональная (вырабатывает гормоны лептина) При микроскопическом исследовании наблюдается гипертрофия адипоцитов в результате нарушения адипогенеза при этом типе ожирения. Также наблюдается нарушение образования триглицеридов, выделение большого количества свободных жирных кислот, которые ухудшают работу печени и желудка [49].

Во многих случаях липиды в ксилоле, спирте и подобных растворителях при гистологическом окрашивании адипоцитов, они визуальны видны в виде тонких мембранных пустых клеток. Поэтому при исследовании адипоцитов используются гистологические замороженные срезы размером до 10 мкм, а также жирорастворимые красители.

При гистологическом и иммуногистохимическом исследованиях адипоцитов определяется липидные капли и другие клеточные элементы. Помимо гематоксилина и эозина используется Oil Red O-жирорастворимый гистологический краситель, который определяет нейтральные липиды и важен для идентификации адипоцитов при метаболическом синдроме. В том числе, используются красители черный Судан В (окрашивает липиды в черный и тёмно-синий цвет), Судан I, II, III, IV (окрашивание липидов в оранжево-красный цвет) [11,28].

Иммуногистохимические тесты с использованием адипофилина (перилипин-2) выявляют адипоциты как в патологических, так и в нормальных случаях [37]. При метаболическом синдроме наблюдаются нарушения выработки адипокина и чувствительности к инсулину, и определение лептина и адипонектинов с помощью иммуногистохимических тестов считается важным в диагностике метаболического синдрома. Лептин играет важную роль в обмене веществ, синтезируется адипоци-

тами поперечнополосатыми мышц, желудка и плаценты. Отсутствие рецепторов к лептину приводит к чувству ненасытного голода и в последствии к МС и СД2 [24].

Иммуногистохимическое определение специфических для цитокинов рецепторов, таких как TNF-альфа, IL-6, в адипоцитах открывает возможность оценки хронического воспаления при метаболическом синдроме [5].

Резистентность к инсулину и гипергликемия. Механизмы резистентности к инсулину и гипергликемии: метаболические и клинические аспекты. В основе потери чувствительности клеток к инсулину и, как следствие, повышения уровня глюкозы в крови, воспалительной активности жировой ткани лежат сложные молекулярные процессы и этиологические факторы, такие как воспаление, образ жизни и наследственная предрасположенность. В результате стойкой токсичности глюкозы нарушается процесс преобразования глюкозы тканями в гликоген, а также работа молекулярных сигнальных путей, которые повышают чувствительность к инсулину [2,12].

Высокий уровень сахара в крови мешает инсулину функционировать корректно, включая определенный сигнальный путь с протеином, называемым РКС. Ферменты РКС, инактивирует инсулиновый рецептор, таких как IRS-1 и делает инсулин сигнализирующим менее эффективным. В то время как высокий уровень сахара в крови стимулирует производство диацилглицерола (DAG), еще одного посыльного, который ускоряет активность РКС еще больше, создавая позитивную петлю обратной связи [4].

Резистентность к инсулину, гипергликемия негативно влияют на сердечно-сосудистую систему, вызывая диабетическую кардиомиопатию, атеросклероз и ишемическую болезнь сердца [10].

Однако хроническая гипергликемия и гиперинсулинемия вызывают у пациентов глубокие депрессивные изменения, и было подтверждено, что нарушения углеводного обмена влияют на когнитивные функции (запоминание, обрабатывание информации, принимать решения) и вызывает депрессию у больных. Исследования показывают, что большинство пациентов с сахарным диабетом 2 типа страдают от различных форм депрессии. В основы этих процессов лежит изменение функции гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси и нарушение метаболизма дофамина, серотонина [14,25]. А также, у животных содержание сахара в крови крупного рогатого скота составляет 2,22-3,33; овец 2,22-3,33; свиней 3,33-5,55; лошадей 3,05-5,27; кур 1,44-7,77 ммоль/л [6].

Артериальная гипертензия. Повышенное артериальное давление включено в Международную классификацию метаболического синдрома. Оно считается одним из постоянных признаков метаболического синдрома и играет важную роль в возникновении атеросклеротических изменений. Метаболический синдром, характеризующийся нарушением липидного обмена, характеризуется повышением уровня триглицеридов в крови, а также снижением количества липопротеидов высокой плотности [48].

Распространенность метаболического синдрома значительно варьируется в зависимости от регионов мира и демонстрирует выраженные различия в зависимости от возраста и этнических групп. В частности, согласно данным, представленным Karasawa et al. (2019), в Соединенных Штатах Америки в 2011-2012 годах, общий уровень распространенности в МС был 34,7% [30].

Измерение артериального давления (АД) на экспериментальных животных в лабораторных условиях является одним из основных инструментов для оценки гемодинамики и функционального состояния сердечно-сосудистой системы. В экспериментальных методах используются все возможные уровни инвазии - от инвазивных (прямых) до неинвазивных (непрямых). У каждого метода есть свои преимущества и недостатки, которые зависят от вида животных, целей исследования и времени проведения мониторинга (табл.2) [6,17,42].

Артериальное давление теперь измеряется у маленьких экспериментальных животных неинвазивным способом с помощью приборов "Систола" (Нейроботикс Трейдинг, Россия) и электромонитра Elema. У мышей или крыс в лабораторных условиях в хвост вставляется специальная манжета, которая автоматически подает воздух до тех пор, пока пульсация в хвосте не исчезнет, и с помощью инфракрасных датчиков проводится оценка систолического и диастолического артериального давления, определяющая формирование пульса и его повторную потерю. аналогичным образом, с помощью высокопроизводительной системы CODA по хвосту крыс и мышей определяют артериальное давление животных весом до 950 граммов (таб.3)[3,51].

Исследования показывают, что метаболический синдром тесно связан с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний и диабета 2 типа. А также при МС часто обнаруживаются проблемы в полости рта - например, пародонтит и потерю зубов. У пациентов с периодонтитом: генерализованный периодонтит 68,2–81,8% случаев, а у пациентов с локализованной формой 42,6–62,3% [34].

Таблица 2.

Методы определения артериального давления у экспериментальных животных

Метод	Принцип	Преимущества	Недостатки
Прямая регистрация (катетеризация артерии)	Введение катетера непосредственно в артерию и регистрация давления	Максимальная точность; возможность длительной и непрерывной регистрации	Инвазивность; необходимость хирургического вмешательства и анестезии
Непрямая регистрация (хвостовая манжета, осциллометрия и др.)	Манжета накладывается на хвост или конечность, фиксируются пульсовые колебания	Относительная простота; отсутствие необходимости хирургических манипуляций; подходит для серии измерений	Относительно низкая точность; необходимость фиксации животного и поддержания температурных условий
Телеметрия (радиотелеметрические датчики)	Имплантация мини-датчика, который передает давление в реальном времени	Возможность наблюдения у свободноподвижных животных; непрерывная регистрация; минимальный стресс	Высокая стоимость оборудования; техническая сложность, необходимость хирургической имплантации
Осциллометрический метод (у крупных животных)	Регистрация колебаний сосудистой стенки при изменении давления в манжете	Подходит для крупных животных; менее инвазивен, чем катетеризация	Ограниченность видов животных; менее точен по сравнению с прямыми методами

Таблица 3.

Нормальные значения артериального давления у животных [26,40].

Вид	Систолическое (мм рт. ст.)	Диастолическое (мм рт. ст.)	Среднее АД (мм рт. ст.)
Крысы	121–124	80–82	≈100
Мыши	≈122	≈102	≈112
Кролики	110–140	95–120	≈115
Собаки	110–160	60–90	85–120

Во многих исследованиях отмечается высокая частота развития кариеса у пациентов с метаболическим синдромом (пожилые люди, женщины в постменопаузе), которые испытывают повышенное кровяное давление, а также повышенный уровень сахара в крови [20,31].

У больных сахарным диабетом с ожирением и подопытных мышей, страдающих сахарным диабетом, наблюдалось истончение эмалевого слоя зубов [13]. Однако у животных, которых кормили высококалорийной жирной пищей, в экспериментах наблюдалось истончение до 50% эмалевого слоя в апикальной части зуба, а также снижение плотности зубов примерно на 20% [32].

В ходе экспериментов у животных, страдающих гиперлипидемией, было обнаружено сужение полости пульпы наряду с утолщением дентинного слоя. Однако у животных, получавших такой рацион питания в течение короткого периода времени, таких патоморфологических изменений в зубах не наблюдалось [54]. В это время в экспериментах не наблюдалось никаких изменений в передних зубах, а в резцах наблюдались очевидные патоморфологические изменения. Таким образом, в результате метаболического синдрома наблюдаются нарушения в функционировании одонтобластов, усиливается образование слабоминерализованного вторичного дентина низкой плотности.

Профилактика заболеваний полости рта, физическая активность и диета не только налаживают нормальное функционирование зубов и десен, но и уменьшают хронические очаги воспаления, усугубляя течение метаболического синдрома, ослабляя патологическое повышение уровня сахара в крови [44,47].

Влияние метаболического синдрома на челюстно-лицевую область. Нарушения микроциркуляции, остеогенеза, регенерации. Метаболический синдром (МС) значительно влияет на челюстно-лицевую область, в частности, из-за нарушений микроциркуляции, остеогенеза и регенерации. МС, характеризующийся целым рядом состояний, таких как резистентность к инсулину, ожирение и гипертония, тесно связан с дисфункцией микрососудов, которая может привести к различным осложнениям в полости рта и челюстно-лицевой области. Эта дисфункция влияет на микроциркуляторное русло, плотность костной ткани и процессы заживления, тем самым влияя на состояние полости рта и результаты хирургического вмешательства.

Нарушения микроциркуляции. В дополнение к тому, что нарушения микроциркуляции нарушают функционирование целых органов, нарушения микроциркуляции в полости рта сопровождаются гиперемией и нарушением кровообращения, и относительный объем сосудов также уменьшается в процентных долях [22]. В ходе экспериментов у пациентов с хронической артериальной гипертензией, сепсисом было обнаружено низкое количество и плотность кровеносных сосудов в подъязычной области в одном поле зрения. В дальнейшем эти признаки занимают важное место в прогнозе вышеперечисленных заболеваний [29]. А также возможно оценивая сублингивальную микроциркуляцию у пациентов с сахарным диабетом 2 типа, оценить патологические состояния в сердечно-сосудистой системе и мочевыводящих путях, наблюдая за морфофункциональными изменениями, и разработать тактику лечения [36]. Изучая кровообращение в области десен, можно дать характеристику регенерации раны после удаления зубов. При этом кровоснабжение тканей десен определяется с помощью тканевой спектрометрии и лазерной доплеровской спектроскопии [41]. С помощью прибора пульсоксиметр пациенты с серповидно-анемической формой анемии были обследованы на предмет насыщения кислородом молочных зубов, у которых наблюдалось снижение насыщения [52]. Лазерная доплеровская флоуметрия показала что МС снижает кровоток микрососудов в тканях пародонта. В основе нарушений деятельности микрососудов лежит нарушение проницаемости и регенерации капилляров [7].

Остеогенез и нарушения регенерации костной ткани. Висцеральная жировая ткань также выделяет специальные цитокины, которые усиливают активность остеокластов и улучшают экспрессию RANKL. С оксидативным стрессом повышается риск развития остеокластов, что приводит к снижению риска развития остеобластов. RANKL это специализированный белок из семейства TNF сигнальных белков и закреплен в мембрану клетки. Имеются мембранные и растворимые формы RANKL и самым важным из них является первый вид этого белка. Образуются из остеокластов, остеобластов и иммунных клеток. При парадонтите специальные клетки десен и парадонтальных связок вырабатывают RANKL [21].

У мышей, у которых в эксперименте отсутствовал интерлейкин-6, накопление липидов в костной ткани оставалось неизменным во время жировой диеты, в то время как количество остеобластов оставалось нормальным [39]. В результате ожирения наблюдается повышение уровня интерлейкина-6, ускоряется старение мезенхимальных клеток и негативно сказывается на процессе окостенения [35].

Инсулин стимулирует выработку остеокальцина, который положительно влияет на процесс окостенения. Но когда чувствительность клеток к инсулину снижается, процесс окостенения замедляется. Даже в экспериментах на мышах наблюдалось снижение плотности костной ткани. С другой стороны, гормон лептин, который подавляет ремоделирование костей, уменьшает еще более интенсивное окостенение при метаболическом синдроме. Было обнаружено, что количество остеокальцина, участвующего в окостенении и имеющего карбоксильную группу, а также остеокальцина, не имеющего карбоксильной группы, которые участвуют в метаболизме, уменьшаются при метаболическом синдроме [38,39].

Нарушения метаболизма триглицеридов приводят к ограничению энергетического и липидного баланса в балансе, что затрагивает регуляторные механизмы на молекулярном уровне. Одним из ключевых звеньев этой регуляции является ядерный PPAR γ (гамма-рецепторы, активирующие пролиферацию пероксисом), который играет центральную роль в дифференцировке и функционировании жировых клеток, а также опосредованно возглавляет костную ткань. При избытке триглицеридов и их метаболитов происходит активация PPAR γ . Этот белок в норме регулирует экспрессию генов, что связано с липидным обменом, а также переключает мезенхимические стволовые клетки в сторону адипогенной дифференцировки. Усиленная активность PPAR γ способствует образованию адипоцитов и накоплению липидов в жировой ткани. Одновременно с этой усиленной активацией PPAR γ оказывается тормозящее действие на остеогенез. В результате

происходит образование остеобластов, что ослабляет процессы формирования костной матрицы и минерализации [18,33].

При возникновении гипергликемии, характерной для сахарного диабета и ряда других метаболических направлений, в некоторых случаях происходит нарушение процесса неферментативного гликирования белков, липидов и нуклеиновых кислот. В результате происходят и накапливаются конечные продукты гликирования — AGE. Эти молекулы обладают высокой химической стабильностью и низкой скоростью естественного состояния, поэтому их количество в тканях постепенно увеличивается. В костной ткани AGE накапливаются как в органическом матриксе, так и в клеточных структурах, оказывая негативное влияние на функции мезенхимических стволовых клеток и остеобластов. Кроме того, AGE напрямую изменяет активность остеобластов — клеток, ответственных за синтез коллагена I типа и минерализацию матрикса. При их снижении снижается выработка остеокальцина, снижается активность коллагеновых волокон, а минеральная фаза костей становится более хрупкой. В результате это приводит к нарушению процесса костной ткани и снижению механической прочности костной ткани. Исследование AGEs не ограничивает только кости — они изменяют структуру коллагена в хрящах, сосудах и коже, что дополнительно усугубляет системные проявления метаболических заболеваний [15]. При хронической гипергликемии в костной ткани наблюдается не только накопление конечных продуктов гликирования (AGE), но и активация ряда ингибиторных факторов, которые приводят к нормальному формированию костей. Среди таких факторов ключевую роль играют склеростин и DKK-1 (Dickkopf-1) — белок, способный подавлять сигнальный путь Wnt/ β -катенина, крайне важный для остеогенеза. В нормальных условиях путь Wnt/ β -катенин стимулирует пролиферацию и дифференцировку остеобластов, а также поддерживает баланс между костеобразованием и костной резорбцией. При его активации β -катенин накапливается в цитоплазме, перемещается в ядро и запускает транскрипцию генов, в результате чего происходит синтез костного матрикса. Склеростин, секретируемый остеоцитами, и DKK-1, продуцируемый остеобластами и другими клетками, связываются с рецепторами LRP5/6 на поверхности клеток-мишеней, блокируя взаимодействие Wnt-лигандов с рецепторным комплексом. Это приводит к деградации β -катенина и торможению остеобластной активности. В результате подавления остеогенеза костная ткань становится более уязвимой к резорбции под наблюдением остеокластов. Дополнительным негативным эффектом является нарушение ремоделирования кости и снижение ее прочности, что увеличивает риск переломов [27]. Кроме того, при гипергликемии блокируется сигнальный путь PI3K/AKT/mTOR, который под воздействием активных кислородных радикалов замедляет выживание, метаболизм, апоптоз мезенхимальных клеток кости, а плотность костной ткани относительно снижается (табл. 4) [55].

Таблица 4.

Алгоритм механизма сигнального пути PI3K/AKT/mTOR

Этап	Компонент	Механизм действия	Роль в костной ткани
1	Факторы роста (IGF, PDGF и др.)	Связываются с рецепторами на мембране клетки	Запускают сигнальный каскад
2	PI3K (фосфоинозитид-3-киназа)	Активирует образование вторичного мессенджера PIP3	Иницирует дальнейшие сигналы для остеобластов
3	AKT (протеинкиназа B)	Фосфорилируется, активируется	Стимулирует выживание остеобластов, тормозит апоптоз
4	AKT → активация mTOR	Передаёт сигнал на mTOR-комплекс	Регулирует клеточный рост и энергетический обмен
5	mTORC1	Стимулирует синтез белка, в том числе коллагена	Усиливает образование костного матрикса
6	mTORC2	Поддерживает цитоскелет и клеточную подвижность	Обеспечивает остеогенез и ремоделирование
7	Итоговый эффект	Согласованная работа PI3K/AKT/mTOR	Ускоряет остеогенез, повышает минерализацию и стабильность кости

Исходя из этого, можно сказать, что у здоровых людей процесс окостенения протекает лучше, чем, у пациентов с сахарным диабетом которых сильно развит остеопороз и остеопения [16]. У крыс,

получавших высококалорийную жирную пищу, на 12-й неделе появились признаки метаболического синдрома, а к 20-й неделе были обнаружены изменения в костной ткани, характерные для остеопороза [53].

АМФ-активируемая протеинкиназа (АМФК)—это молекула, которая контролирует нормальное функционирование остеобластов в условиях гипоксии. При метаболическом синдроме его работа замедляется, что приводит к ухудшению образования остеобластов из мезенхимальных клеток, а также функционирования остеокластов, таких как аутофагия [23]. Из-за хронических сложных патофизиологических изменений при метаболическом синдроме у пациентов с сахарным диабетом развиваются остеопороз и остеопения. Во многих научных публикациях сообщается, что у больных с сахарным диабетом 2-типа регенерация костной ткани при переломах трубчатых костей слабая и некачественная, то есть в случаях высокой инфильтрации и медленного прекращения. В экспериментах на мышцах с мутированным рецептором лептина, а также снижение уровня щелочной фосфатазы в экспериментах на крысах с повреждением костей можно отчетливо увидеть описанное выше состояние [43]. В экспериментах по изучению метаболического синдрома можно видеть, что введение фактора роста фибробластов-9, паратиреоидного гормона и VEGF (сосудистого эндотелиального фактора роста-А) подопытным животным улучшало формирование костной ткани [46].

На экспериментальной модели мышей с приобретенным сахарным диабетом 2 типа были вызваны глубокие изменения в пародонте, воспаление десен, нарушение оссификации в альвеолярной кости, и в ней было изучено увеличение количества склеростина, который считается ингибитором оссификации. В ходе более позднего эксперимента было обнаружено, что процесс окостенения альвеолярной кости улучшился при введении ингибитора склеростина под кожу [50].

Влияние на хирургические результаты и регенерацию. При хирургических вмешательствах на различных органах у пациентов с метаболическим синдромом очень высокая частота осложнений, таких как инфаркт миокарда и инсульт, по сравнению с другими сопутствующими пациентами. При операциях, проводимых при хирургических заболеваниях в области головы и шеи, пациенты с метаболическим синдромом имели высокую частоту развития сепсиса и септического шока [19,45].

Выводы. Метаболический синдром является сложной мультисистемной патологией, включающей инсулинорезистентность, ожирение, артериальную гипертензию и дислипидемию, что приводит к выраженным молекулярным, клеточным и тканевым нарушениям. В его основе лежат хроническое воспаление, дисфункция адипоцитов и нарушения микроциркуляции, влияющие на метаболизм и регенерацию тканей. Особое значение имеют изменения остеогенеза и снижение регенераторного потенциала, что проявляется нарушением ремоделирования костной ткани и повышением риска осложнений. В челюстно-лицевой области это сопровождается поражением пародонта, ухудшением заживления и снижением качества костной ткани. Исходя из представленных данных, метаболический синдром оказывает существенное влияние на стоматологический статус, что обуславливает необходимость комплексного междисциплинарного подхода к его диагностике и лечению.

Список литературы:

1. Агарков Н. М. и др. Метаболический синдром как актуальная проблема здравоохранения (аналитический обзор) //Здравоохранение Российской Федерации. – 2023. – Т. 67. – №. 2. – С. 136-141.
2. Бабков Д.А. Мишень-ориентированный поиск антидиабетических соединений, проявляющих мультитаргетное действие, и их фармакологические свойства //Problems of Endocrinology. – 2018. – Т. 64. – №. 3. – С. 180-187.
3. Быков В. В. Антигипертензивная активность нового стимулятора растворимой гуанилатциклазы //Р 177 Разработка лекарственных средств—традиции и перспективы. Международная научно. – 2021. – С. 183.
4. Глушко А. А., Воронков А. В., Черников М. В. Молекулярные мишени для поиска веществ, обладающих эндотелиопротекторными свойствами (обзорная статья) //Биоорганическая химия. – 2014. – Т. 40. – №. 5. – С. 515-527.
5. Милица К.Н. и др. Иммуногистохимические особенности жировой ткани сальника и подкожной жировой клетчатки у лиц с избыточной массой тела, ожирением и метаболическим синдромом //Morphologia – 2016. – Т. 10. – №. 3. – С. 203-207.
6. Овсенко Ю.В. Физиология и этология животных: словарь физиологических терминов. Брянск: Брянский гос. аграр. ун-т, 2011. 144 с.
7. Ремизова А. А. и др. Особенности вегетативной регуляции кровотока при хроническом воспалении в пародонте //Медицинский вестник Северного Кавказа. – 2020. – Т. 15. – №. 4. – С. 548-551.
8. Романцова Т. И., Островская Е. В. Метаболически здоровое ожирение: дефиниции, протективные факторы, клиническая значимость

//Альманах клинической медицины. – 2015. – №. S1. – С. 75-86.

9. Романцова Т. И. Жировая ткань: цвета, депо и функции //Ожирение и метаболизм. – 2021. – Т. 18. – №. 3. – С. 282-301.

10.Скворцов В. В., Скворцова Е.М., Виноградова М. В. Патофизиологическая взаимосвязь и особенности коррекции при изменениях сердечно-сосудистой системы у больных сахарным диабетом //Вестник Санкт-Петербургского университета. Медицина. – 2024. – Т. 19. – №. 1. – С. 4-13.

11.Соболевская И.С., Мяделец О.Д., Грушин В.Н. Липидсинтезирующие и липиднакапливающие структуры кожи человека //Морфология. – 2012. – Т. 142. – №. 4. – С. 78-82.

12.Соколова Л.А., Иевская Е.В. Инсулино-резистентность как фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний //Трансляционная медицина. – 2015. – №. 6. – С. 32-38.

13.Abbassy M. A. et al. Diabetes detrimental effects on enamel and dentine formation //Journal of Dentistry. – 2015. – Т. 43. – №. 5. – С. 589-596.

14.Akbaraly T. N. et al. Glycemia, insulin resistance, insulin secretion, and risk of depressive symptoms in middle age //Diabetes Care. – 2013. – Т. 36. – №. 4. – С. 928-934.

15.Asadipooya K., Uy E. M. Advanced glycation end products (AGEs), receptor for AGEs, diabetes, and bone: review of the literature //Journal of the Endocrine Society. – 2019. – Т. 3. – №. 10. – С. 1799-1818.

16.Bao K. et al. The role of wnt signaling in diabetes-induced osteoporosis //Diabetology & Metabolic Syndrome. – 2023. – Т. 15. – №. 1. – С. 84.

17.Braga V. A., Prabhakar N. R. Refinement of telemetry for measuring blood pressure in conscious rats //Journal of the American Association for Laboratory Animal Science. – 2009. – Т. 48. – №. 3. – С. 268-271.

18.Chen M. et al. PPAR β/δ accelerates bone regeneration in diabetic mellitus by enhancing AMPK/mTOR pathway-mediated autophagy //Stem Cell Research & Therapy. – 2021. – Т.12. – С. 1-14.

19.Chen S. et al. Association between metformin use and risk of total knee arthroplasty and degree of knee pain in knee osteoarthritis patients with diabetes and/or obesity: a retrospective study //Journal of Clinical Medicine. – 2022. – Т. 11. – №. 16. – С. 4796.

20.Cho M. J. et al. Presence of metabolic syndrome components is associated with tooth loss in middle-aged adults //Yonsei medical journal. – 2019. – Т. 60. – №. 6. – С. 554-560.

21.De Leon-Oliva D. et al. The RANK–RANKL–OPG system: a multifaceted regulator of

homeostasis, immunity, and cancer //Medicina. – 2023. – Т. 59. – №. 10. – С. 1752.

22.Denga O. et al. Influence of metabolic syndrome on condition of microcirculatory bed of oral cavity. – 2017.

23.Egashira K. et al. AMPK activation enhances osteoblast differentiation on a titanium disc via autophagy //International Journal of Implant Dentistry – 2024. – Т. 10. – №. 1. – С. 2.

24.Farooq R. et al. Association of adiponectin gene polymorphism with type 2 diabetes and metabolic syndrome //Translational Metabolic Syndrome Research. – 2018. – Т. 1. – С. 39-47.

25.Geraets A. F. J. et al. The association of hyperglycaemia and insulin resistance with incident depressive symptoms over 4 years of follow-up: The Maastricht Study //Diabetologia. – 2020. – Т. 63. – №. 11. – С. 2315-2328.

26.Govyrin V. A. Measurement of arterial pressures in intact rabbits //Bulletin of Experimental Biology and Medicine. – 1957. – Т. 44. – №. 1. – С. 896-897.

27.Ivanova M. M. et al. Wnt signaling pathway inhibitors, sclerostin and DKK-1, correlate with pain and bone pathology in patients with Gaucher disease //Frontiers in endocrinology. – 2022. – Т. 13. – С. 1029130.

28.Kaczmarek I. et al. Qualitative and quantitative analysis of lipid droplets in mature 3T3-L1 adipocytes using oil red O //STAR protocols. – 2024. – Т. 5. – №. 2. – С. 102977.

29.Kanoore Edul V. S. et al. The effects of arterial hypertension and age on the sublingual microcirculation of healthy volunteers and outpatients with cardiovascular risk factors //Microcirculation. – 2015. – Т. 22. – №. 6. – С. 485-492.

30.Karasawa I. et al. A cross-sectional multivariate analysis of the relationship between dental health and metabolic syndrome // The shinshu medical journal. – 2019. – Т. 67. – №. 3. – С. 167-181.

31.Kim J. I., Choi C. H., Chung K. H. Association between metabolic syndrome and the number of remaining teeth in postmenopausal women: a cross-sectional analysis using the Korean National Health and Nutritional Examination survey //Journal of Clinical Medicine. – 2021. – Т. 10. – №. 20. – С. 4759.

32.Kobayashi Y. et al. Delayed Tooth Development and the Impaired Differentiation of Stem/Progenitor Cells in Incisors from Type 2 Diabetes Mice //International journal of molecular sciences. – 2024. – Т. 25. – №. 24. – С. 13619.

33.Kong X. et al. FATP2 regulates Osteoclastogenesis by increasing lipid metabolism and ROS production //Journal of Bone and Mineral Research. – 2024. – Т. 39. – №. 6. – С. 737-752.

- 34.Kosho M.X.F. et al. The Prevalence of Metabolic Syndrome and Undiagnosed Diabetes in Periodontitis Patients and Non-Periodontitis Controls in a Dental School //Journal of Clinical Medicine. – 2024. – T. 13. – №. 24. – C. 7512.
- 35.Li Y. et al. Interleukin-6 knockout inhibits senescence of bone mesenchymal stem cells in high-fat diet-induced bone loss //Frontiers in endocrinology. – 2021. – T. 11. – C. 622950.
- 36.Liu W. et al. Machine learning-assisted analysis of sublingual microcirculatory dysfunction for early cardiovascular risk evaluation and cardiovascular-kidney-metabolic syndrome stage in patients with type 2 diabetes mellitus //Diabetes/Metabolism Research and Reviews. – 2024. – T. 40. – №.6. – C. e3835.
- 37.Loix M. et al. Perilipin-2 limits remyelination by preventing lipid droplet degradation //Cellular and Molecular Life Sciences. – 2022. – T. 79. – №. 10. – C. 515.
- 38.Marin C. et al. The impact of type 2 diabetes on bone fracture healing //Frontiers in Endocrinology. – 2018. – T. 9. – C. 6.
- 39.Martiniakova M. et al. Interrelationships among metabolic syndrome, bone-derived cytokines, and the most common metabolic syndrome-related diseases negatively affecting bone quality //Diabetology & Metabolic Syndrome. – 2024. – T. 16. – №. 1. – C. 217.
- 40.Mattson D. L. Comparison of arterial blood pressure in different strains of mice //American journal of hypertension. – 2001. – T. 14. – №. 5. – C. 405-408.
- 41.Mayr A. et al. Longitudinal analysis of microcirculatory parameters in gingival tissues after tooth extraction in patients with different risk profiles for wound healing disorders—a pilot study //Clinical Oral Investigations. – 2024. – T. 28. – №. 6. – C. 303.
- 42.Molcan L. Telemetric data collection should be standard in modern experimental cardiovascular research //Physiology & Behavior. – 2021. – T. 242. – C. 113620.
- 43.Monahan G. E. et al. Longitudinal alterations in bone morphometry, mechanical integrity and composition in Type-2 diabetes in a Zucker diabetic fatty (ZDF) rat //Bone. – 2023. – T. 170. – C. 116672
- 44.Nóbrega W. F. S. et al. A síndrome metabólica interfere na saúde bucal? Uma revisão integrativa //Revista Família, Ciclos de Vida e Saúde no Contexto Social. – 2021. – T. 9. – №. 3. – C. 663-671.
- 45.Norris P. et al. Metabolic syndrome and surgical complications: a systematic review and meta-analysis of 13 million individuals //International Journal of Surgery. – 2024. – T. 110. – №. 1. – C. 541-553).
- 46.Ornitz D. M., Marie P. J. Fibroblast growth factor signaling in skeletal development and disease //Genes & development. – 2015. – T. 29. – №. 14. – C. 1463-1486.
- 47.Rosário W. R. et al. Association between metabolic syndrome and oral health: a bibliographic review //Revista Eletrônica Acervo Saúde. – 2020. – T. 12. – №. 10. – C. e4322-e4322.
- 48.Senyigit A. General Aspects of Metabolic Syndrome: An Update on Diagnostic Criteria, Pathophysiology, and Management //Metabolic Syndrome: A Comprehensive Update with New Insights. – Bentham Science Publishers, 2025. – C. 1-28.
- 49.Tchernof A., Després J. P. Obesity and Metabolic Syndrome //Handbook of Obesity-Volume 1. – CRC Press, 2023. – C. 503-510.
- 50.Turkkahraman H. et al. Sclerostin antibody corrects periodontal disease in type 2 diabetic mice //JCI insight. – 2024. – T. 9. – №. 16. – C. e181940.
- 51.Wang Y., Thatcher S. E., Cassis L. A. Measuring blood pressure using a noninvasive tail cuff method in mice //The Renin-Angiotensin-Aldosterone System: Methods and Protocols. – New York, NY : Springer New York, 2017. – C. 69-73.
- 52.Wilson E. M. et al. Oxygen saturation in primary teeth of individuals with sickle cell disease and sickle cell trait //Journal of Blood Medicine. – 2022. – C. 407-412.
- 53.Wong S. K. et al. Osteoporosis is associated with metabolic syndrome induced by high-carbohydrate high-fat diet in a rat model //Biomedicine & pharmacotherapy. – 2018. – T. 98. – C. 191-200.
- 54.Ye X., Zhang J., Yang P. Hyperlipidemia induced by high-fat diet enhances dentin formation and delays dentin mineralization in mouse incisor //Journal of molecular histology. – 2016. – T. 47. – №. 5. – C. 467-474.
- 55.Zhu S. et al. ROS accumulation contributes to abamectin-induced apoptosis and autophagy via the inactivation of PI3K/AKT/mTOR pathway in TM3 Leydig cells //Journal of Biochemical and Molecular Toxicology. – 2020. – T. 34. – №. 8. – C. e22505.

Для цитирования: Ризаев Ж.А., Орипов Ф.С., Зейнитдинова З.А. Метаболический синдром: патогенетические механизмы, морфофункциональные изменения и влияние на челюстно-лицевую область // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 4(24). – С. 69–77. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19438265>

ЎН ИККИ БАРМОҚ ИЧАК ЯРА КАСАЛЛИГИ ТЕШИЛИШИ АСОРАТЛАРИНИ ТАШХИСЛАШ ВА ДАВОЛАШ АСОСЛАРИ

Камолов С.Ж.¹, Ахмедов Г.К.²

¹Республика шошилинч тиббий ёрдам илмий маркази Самарқанд филиали, Самарқанд ш., Ўзбекистон

²Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Мақолада шошилинч жарроҳликнинг асосий муаммоларидан бири бўлган ўн икки бармоқ ичак яра касаллиги тешилиши билан беморларни диагностик ва даволашдаги ўзига хос хусусиятлари ҳақида маълумотлар берилган. Тадқиқот учун Республика шошилинч тиббий ёрдам илмий маркази Самарқанд филиали хирургия бўлимларида оператив даволанган беморларнинг клиник маълумотлари олинган.

Калит сўзлар: меъда ва ўн икки бармоқ ичак яраси, яра перфорацияси, эндоскопик диагностика, лапароскопик операциялар.

FUNDAMENTALS OF DIAGNOSTICS AND TREATMENT OF PERFORATIVE ASSOCIATIONS OF DUODENAL ULCER DISEASE

Kamolov S.J.¹, Axmedov G.K.²

¹Samarkand branch of the Republican Scientific Center for Emergency Medical Care,
Samarkand, Uzbekistan

²Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. The article presents information on the features of diagnosis and treatment of patients with perforated duodenal ulcer disease, which is one of the main problems of emergency surgery. For the study, clinical data of patients who underwent surgical treatment in the surgical departments of the Samarkand branch of the Republican Scientific Center for Emergency Medical Care were taken.

Keywords: gastric and duodenal ulcer, ulcer perforation, endoscopic diagnosis, laparoscopic operations.

ОСНОВЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ПЕРФОРАТИВНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ

Камолов С.Ж.¹, Ахмедов Г.К.²

¹Самаркандский филиал Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи,
г. Самарканд, Узбекистан

²Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. В статье представлена информация об особенностях диагностики и лечения пациентов с перфорацией язвенной болезни двенадцатиперстной кишки, которая является одной из основных проблем неотложной хирургии. Для исследования были взяты клинические данные пациентов, прошедших оперативное лечение в хирургических отделениях Самаркандского филиала Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи.

Ключевые слова: язва желудка и двенадцатиперстной кишки, перфорация язвы, эндоскопическая диагностика, лапароскопические операции.

Шошилинч қорин бўшлиғи аъзолари патологияси турли хил жойлашуви ва кучли оғрик синдроми, қорин пардани яллиғланиш белгилари, овқат ҳазм қилиш бузилиши, диспептик аломатлар ва баъзи ҳолларда тизимли яллиғланиш реакцияси ва беқарор гемодинамика билан намоён бўлади [1, 4, 7, 8, 12]. Ушбу ҳолатлар клиник кўринишларнинг хилма-хиллиги билан ажралиб туради, бу эса шифокордан юқори даражадаги огоҳлантириш ва тезкор дифференциал ташхисни талаб қилади. Қорин бўшлиғи аъзолари патологиясининг шаклига, унинг намоён бўлиш вақтига ва беморнинг аҳволига қараб, турли хил муолажалар талаб қилиниши мумкин консерватив терапиядан тортиб шошилинч операцияга қадар [3, 6, 9, 11].

Эпидемиологик жиҳатдан тешилган яра билан йилига 100 000 аҳолига 7-10 та ҳолат билан диагноз қуйилади. Айниқса, стресс даражаси юқори бўлган, нотўғри овқатланиш, тамаки чекиш ва анамнизи ва спиртли ичимликлар истеъмол қиладиган популяцияларда касалланиш даражаси юқори. Қўшимча касалликлар фонида эга бўлган ва тўқималарни тиклаш қобилияти пасайган кекса беморлар

алоҳида хавф остида. Уларда ошқозон яраси тешилиши тез-тез атипик бўлиб, аломатлари кам бўлиб, ўз вақтида ташхис қўйишни қийинлаштиради [2, 5, 10, 13].

Тадқиқот мақсади: Ўн икки бармоқ ичак яра касаллиги тешилиши асорати билан беморларни турли оператив даволаш усулларини такомиллаштириш.

Тадқиқот материаллари ва усуллари. Тадқиқотимизда ўн икки бармоқ ичакнинг тешилган яраси сабабли оператив даво қилинган 50 нафар беморнинг касаллик тарихлари муҳокама қилинди. Тадқиқот касалликлар ва улар билан боғлиқ соғлиқ муаммоларининг халқаро статистик таснифига мувофиқ касаллик ёки ҳолатнинг (касалликлар ёки шароитлар гуруҳи) кодлаш хусусиятига мувофиқ о'тказилди. Кузатувимиздаги беморларнинг даво тафсилотлари муҳокама қилиниши натижасида беморлар икки гуруҳга ажратилган. Улардан 1-гуруҳни 30 нафар бемор ташкил қилиб, уларга ўн икки бармоқ ичакнинг тешилган яраси ташхиси қўйилганидан сўнг очик-лапаротомик йўл орқали операция бажарилган. 2-гуруҳни 20 нафар бемор ташкил қилиб, уларга дастлаб диагностик лапароскопия бажарилган ва меъда ёки ўн икки бармоқ ичак тешилган яраси соҳаси кесиб олиб ташланиб, тешикка тугунли чоклар қўйилган (1-жадвал). Шундай қилиб, тадқиқотда ўрганилган беморлар гуруҳлари ўрганилган кўрсаткичлар бўйича тўла-тўқис таққосланади.

1-жадвал

Ўн икки бармоқ ичак сурункали яраси перфоративси патологияси бўлган беморларни асосий гуруҳга ва таққослаш гуруҳига ёш бўйича тақсимланиши

гуруҳ \ ёш	Бемор ёш					Жами
	18-21 ёш	22-35 ёш	36-55 ёш	61-74 ёш	75-90 ёш	
1 гуруҳ	4	6	11	8	1	30
2 гуруҳ	4	4	9	3	0	20
Жами	8	10	20	11	1	50

Кузатувимиздаги барча беморларга стандарт асосида текшириш ўтказилди. Уларга беморларнинг шикоятлари ва анамнезидаги маълумотларни ўз ичига олган субектив текшириш усуллар ҳамда обектив текшириш усуллари (нафас олиш, юрак қон-томир, ҳазм қилиш аъзолари ва айириш аъзоларини текшириш), турли клиник лаборатор ва инструментал текшириш (ЭКГ, кўкрак қафаси ва қорин бўшлиғи обзор рентгенографияси (эркин газни аниқлаш учун)) натижалари киради.

Барча лаборатор-инструментал усуллардаги текширишлар асосида бир неча мутахассислар (терапевт, анестезиолог, лозим бўлса, бошқа соҳадаги мутахассислар ҳам) томонидан текширилади. Беморга анамнестик маълумотлари ва текшириш натижаларига кўра операция ҳажми ва вақти аниқланади. Агарда беморда “ўткир қорин” белгилари мусбат бўлса (бу асосан гастродуоденал яраларнинг тешилишида кузатилади)шошилиш равишда операцияга тайёрланиб, операция қилинади. Шунингдек, баъзи ҳолатларда тешилган яранинг вақтинча “ёпилиши” бўлганда, беморлар динамикада ЭГДФС ва рентгенография қилиб турилади ва динамикада актив кузатиш мақсадида хирургия бўлимларига ётқизилади.

Тадқиқот натижалари. Беморларимизда перфорация вақтининг кечишига қараб беморлар тақсимланди: 35 нафар беморлар касаллик бошланишининг илк 6 соатида мурожаат қилишган бўлса, улардан 18 нафарида яранинг тешилиши белгилари ривожланганлигига илк 3 соатда келишди. Шунингдек, кузатувимиздаги беморларнинг 13,3% касаллик ривожланишининг 7-9 соатдан ошган вақтда келишган. Уларда вақт ўтган сари касалликнинг асоратлари оғирлашиб, аъзолардаги яллиғланишли ўзгаришлар ва перитонитнинг тарқалиш даражаси кенгайиб бориши кузатилганди. 2-гуруҳ беморларида касаллик ривожланиши 8 соатдан ошмаган бўлиб, уларнинг 75%и илк 6 соатда мурожаат қилишган (2-жадвал).

2-жадвал.

Тешилишнинг клиник кўриниши пайдо бўлишидан клиникага касалхонага ётқизишгача бўлган вақти


Беморларнинг гуруҳлари ва сони	Тешилиш пайтидан касалхонага ётқизилгунга қадар бўлган вақт					Жами
	>1	1-3	4-6	7-9	>9	
И гуруҳ, Абс. (%)	4 (13,33%)	6 (20%)	11 (36.66%)	8 (26,66%)	1 (3,33%)	30 (100%)
ИИ гуруҳ, Абс. (%)	4 (20%)	4 (20%)	7 (35%)	3 (15%)	2 (10%)	20 (100%)

Маълумки, қорин бўшлиғида қанчалик яллиғланишли ва йирингли жараёнлар кучайган сари беморнинг ҳаёт фаолияти оғирлашади ва уларни лапароскопик усулларда операция қилиш

имкониятлари пасайиб бориши мумкин. Шунинг учун бунга энг оптимал даво вақти 1-3 соатларни ташкил қилади. 1-гурӯх беморлари бўлган 30 нафар беморларда касаллик анамнези бир кундан узоқроқ бўлиб, улардан 20 нафарида ушбу муддат 7 кунгача, яъни улар о'ртача $4,5 \pm 2,2$ кун, яна 7 нафар беморда 3 ҳафтадан ортиқ муддатли ярали анамнез кузатилган.

Яра касаллигининг анамнезига кўра, 20 нафар беморда 1 йилгача касаллик кузатилиб келган, 6 нафар беморда ярали анамнез 1-3 йил, яна 6 кишида 3 йилдан ортиқ муддатли ярали анамнез билан даволаниб келган. Шунингдек, 11 нафар беморларда меъда ва ўн икки бармоқ ичак яралари 15-30 йилдан бери азоб бериб келишган. Яна бир анамнестик маълумотларга кўра, илгари операция ўтказган беморларда бирор марта бирон хил асорат кузатилмаган. Маълумки, яра касаллигининг перфоратсияси билан беморларда яра касаллигининг анамнезини синчковлик билан ўрганиш даволаш ва операциядаги зарурий чораларни аниқлашда катта аҳамиятга эгадир. Бунга мисол тариқасида лапаротомик (очик) усулда операция қилинган беморларнинг салмоқли қисмида яра касаллигининг анамнези узоқроқ давом этиб, турли усуллардаги ярага қарши даво муолажаларини олиб келишган.

Лапароскопик усулда тешилган ярани тикиш ўтказилган беморларнинг деярли барчасида (98,5%) ярали анамнез киска ёки бўлмаган. Шунинг учун биз тешилган яраларни тикиш усулини танлашда авваламбор анамнезига катта эътибор қаратамиз. Шошилиш вазиятларда бизга аниқ ташхис қўйишда эндоскопик ва лапароскопик текширишларнинг ўрнилари жуда каттадир (1-расм). Чунки, булар ҳам ичкаридан (шиллик қават томонидан), ҳам ташқаридан (сероз қават томонидан) кўриниб, етарлича баҳо беради. Шунингдек, яранинг ва тешикнинг ҳажми, деформациянинг бор-йўқлиги, локализацияси, аъзонинг атроф тўқималар билан синтопик ҳолатлари бўйича ҳам қимматли маълумотлар олса бўлади.



1-Расм. Ўн икки бармоқ ичакнинг тешилган ярасининг эндовизуал тасвири (А-ЭФГДС, Б-лапароскопия).

Баъзи ҳолларда меъда ярасини лапароскопик усулда тикиш амалиёти ўтказилмади. Буларга узоқ ярали анамнезига эга ва тез-тез қўзғаб туриш характеридаги меъда яраси бўлганда, яра касаллигининг бошқа асоратлари (стенозлашиш, ўсамага ўтиш, қон кетиш) биргаликда учраганда, яранинг ўсамага ўтиб тешилганда, лапароскопик ноқулай жойлашувларда (кичик эгриликда, орқа деворда, пилорик канал яраларида) каби ҳолаталар киради.

Шунингдек, юқоридаги оператив тактикаларга қуйидаги ҳолатлар ҳам истисно ҳисобланади: перфоратив тешикнинг 10 ммдан катта бўлиши, меъда яраси атрофида кучли ривожланган яллиғланишли жараёнлар, яранинг ингичкаларшган қирраларининг диаметри ммдан катта бўлиши. Ушбу патологик ўзгаришлардаги беморларга лапароскопик операциялар ўтказиш кейинги асоратларнинг ривожланиш хавфи юқорилиги сабабли мумкин эмас ҳисобланади. Шунинг учун бизнинг кузатувимизда бундай ҳолатларда очик (лапаротомик) усулдаги операциялар ўтказилган. ЭГДФСнинг яна бир ўзига хос устунлик томони бор. Мисол учун, беморда Томпсон классификацияси бўйича 3-типи яралар, яъни ҳам меъданинг, ҳам ўн икки бармоқ ичакдаги яранинг ривожланиши бўлиб, улардан бирида перфоратсия асорати кузатилганда, ҳамда бемор шошилиш операциядан олдин эндоскопик текширишлардан ўтмаган бўлса, бундай ҳолатларда тешилган яра тикилиши билан операция тугатилганда, операциядан кейинги даврда турли операцион травмалар натижасида иккинчи (қолдириб кетилган) ярада ҳам перфоратсия ёки бошқа асоратлар кузатилиши мумкин. Бундай ҳолатларда асоратга эрта диагноз қўйиш кийинчилик туғдиради ва беморнинг

умумий ахволи янада оғирлашишига олиб келиши мумкин. Шунинг учун шошилиш операцияга кўрсатма бўлса ҳам беморларни эндоскопик текшириш мақсадга мувофиқдир.

Шу билан бирга эндоскопик текшириш ёрдамида яранинг четларини, характерини, ўлчамлари ва шаклини тўлиқроқ баҳолашга имкон беради. Бу ўз навбатида лапароскопик усулда операция вақтида ҳам қимматли маълумотларга эга бўлиш имконини беради. Олиб борилган куётувларимиз натижасида ҳам 75% ҳолатларда лапароскопия вақтида сероз қаватдаги яранинг ҳажми эндоскопия вақтида шиллик қаватдаги яранинг диаметридан анча кичик (хаттоки 3-4 баробаргача) кўринишини ўз исботини топган. Беморларда ўтказилган лапароскопик операцияларнинг таҳлилида дастлабки даврларда операция давомийлиги 30 дақиқадан 150 дақиқাগача давом этган бўлса, охириги йилларда жамоамиз хирургларининг малака ва маҳоратлари ошиб борганлиги сабабли ушбу кўрсаткич ўртача 40-50 дақиқани ташкил қилди.

Хулоса: Ўн икки бармоқ ичак яра касаллиги тешилиши сабаби беморларни операция қилишда асосан лапароскопик усулдан фойдаланиш операциядан кейинги даврни тезлашишига ва реабилитация даврининг самарали қисқаришига олиб келади. Бундай беморларда операциядан олдинги даврда эндоскопик текширишнинг ўтказилиши яранинг ва тешилган дефектнинг ҳажими, характери ва деворларининг кратерини аниқлашда катта аҳамиятга эгадир.

Адабиётлар рўйхати:

1. Ачилов М. Т., Ахмедов Г.К., Алимов Ж.И. Гастрэктомия при желудочных кровотечениях // «Наука и мир» Международный научный журнал, Россия, г. Волгоград. № 7 (83), 2020, Стр 62-65.
2. Даминов Ф.А., Бобокулов А.У., Ахмедов Г.К. Эндоскопик гемостаз турлари ва уларнинг амалиётда қўлланилиши // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2025. – № 4(18). – С. 24–27.
3. Короткевич А. Г. и др. Оценка инфиль-трационного эндоскопического гемостаза при неварикозных желудочно-кишечных кровоте-чениях // Журнал им. Н.В. Склифосовского Неотложная медицинская помощь. – 2012. – № 3. – С. 16–20.
4. Машкин А.М., Ефанов А.В. и др. Эко-номическая эффективность метода эндоскопиче-ской аргонплазменной коагуляции при язвен-ных гастродуоденальных кровотечениях // Ме-дицинская наука и образование Урала. – 2015. – Т. 16. – № 1 (81). – С. 95–98.
5. Панцырев Ю.М., Федоров Е.Д., Тимо-феев М.Е., Михалев А.И. «Эндоскопическое ле-чение кровотечений, обусловленных синдромом Меллора-Вейсса. Хирургия. 2003 г. №10. стр.35-41.
6. Петухов В.А. Сравнительная оценка эффективности современных способов эндоско-пического гемостаза у больных с гастродуо-денальным язвенным кровотечением. // дисс. на соискание кандидата наук. Москва-2017.
7. Сатторова С.Ж., Худайназаров У.Р., Ахмедов Г.К. Тактика лечения при кровоте-чениях язв желудка и двенадцатиперстной киш-ки. // Материалы XV конференции «Совре-менные проблемы и перспективные направле-ния инно-вационного развития науки» 24.04.2020 г. г.Душанбе. стр. 217-218.
8. Сулаймонов А.Л., Ахмедов Г.К., Ху-дайназаров У.Р., Обидов Ш.Х. Хирургическая тактика при гастродуоденальных кровотечениях у пожилых больных. // “ХИСТ” Всеукраинский журнал студентов и молодых учёных.стр. 626. 18.2016.
9. Тарасенко С. В. Хирургия осложнений язвенной болезни: монография / С. В. Тарасенко, О. В. Зайцев, В. П. Кочуков. – М.: Проспект, 2015. – 242 с.
10. Bang C.S, Lee Y.S, and others. Charac-teristics of nonvariceal upper gastrointestinal hemor-rhage in patients with chronic kidney diseas e // World. J. Gastroenterol. 2013 Nov 21;19(43):7719–25.
11. Daminov F.A., Bobokulov A.U. Factors in the develop-ment of bleeding in gastroduodenal ulcers. (Litera-ture review) // Journal of Biomedicine and Practice. 2025, vol. 10, issue 2, pp. 87-93.
12. Fujimoto D, Taniguchi K, Kobayashi H. Double-Tract Reconstruction Designed to Allow More Food Flow to the Remnant Stomach After Laparoscopic Proximal Gastrectomy. World J Surg. 2020 Aug;44(8):2728-2735.
13. Kadirov R.N., Khursanov Y.E., Kamolov S.J. Modern aspects of diagnosing and treatment of acute pathology of the abdominal cavity organs // Journal of Biomedicine and Practice. 2025, vol. 10, issue 2, pp.156-160.

Иктибос учун: Камолов С.Ж., Ахмедов Г.К. Ўн икки бармоқ ичак яра касаллиги тешилиши асоратларини ташхислаш ва даволаш асослари // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2026. – № 4(24). – Б. 78–81. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19438773>

ЛЕЧЕНИЕ СТОМАТИТА, ВОЗНИКАЮЩЕГО ПРИ ВИРУСНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ У ДЕТЕЙ, С ПРИМЕНЕНИЕМ БАКТЕРИОФАГОВЫХ ПРЕПАРАТОВ**Мухамедова М.С., Эркаева Г.Р.**

Ташкентский государственный медицинский университет, г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. В работе рассмотрены методы лечения стоматита, возникающего у детей при вирусных заболеваниях, а также освещены вопросы внедрения усовершенствованных практических навыков в медицинской практике. Особое внимание уделено совершенствованию методов лечения стоматита у детей после вирусных инфекций в области детской стоматологии. Проведен сравнительный анализ предлагаемого метода лечения с существующими подходами и показана его практическая значимость.

Ключевые слова: вирусные инфекции, стоматит, бактериофаг, препарат, микрофлора, антисептическая обработка, дезинфекция.

TREATMENT OF STOMATITIS CAUSED BY VIRAL DISEASES IN CHILDREN USING BACTERIOPHAGE DRUGS**Mukhamedova M.S., Erkaeva G.R.**

Tashkent State Medical University, Tashkent, Uzbekistan

Resume. This study examines the methods of treating stomatitis occurring in children against the background of viral infections, and also highlights the implementation of improved practical skills in medical practice. Special attention is paid to the improvement of treatment methods for stomatitis in children after viral infections in the field of pediatric dentistry. A comparative analysis of the proposed treatment method with existing approaches was conducted, and its practical significance was demonstrated.

Keywords: viral infections, stomatitis, bacteriophage, preparation, microflora, antiseptic treatment, disinfection.

БОЛАЛАРДА ВИРУСЛИ КАСАЛЛИКЛАРДА КЕЛИБ ЧИҚАДИГАН СТОМАТИТНИ БАКТЕРИОФАГ ДОРИЛАРИНИ ҚЎЛЛАБ ДАВОЛАШ**Мухамедова М.С., Эркаева Г.Р.**

Тошкент давлат тиббиёт университети, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. Ушбу мақолада болаларда вирусли касалликлар фонида юзага келадиган стоматитни даволаш усуллари кўриб чиқилган, шунингдек, тиббиёт амалиётида такомиллаштирилган амалий қўникмаларни жорий этиш масалалари ёритилган. Айниқса, болалар стоматологияси соҳасида вирусли инфекциялардан кейин юзага келадиган стоматитни даволаш усуллари такомиллаштиришга алоҳида эътибор қаратилган. Таклиф этилган даволаш усулининг мавжуд ёндашувлар билан қиёсий таҳлили ўтказилиб, унинг амалий аҳамияти кўрсатиб берилган.

Калит сўзлар: вирусли инфекциялар, стоматит, бактериофаг, препарат, микрофлора, антисептик ишлов бериш, дезинфекция.

Введение. Стоматит, развивающийся на фоне вирусных инфекций у детей, представляет собой одну из актуальных проблем детской терапевтической стоматологии. Данное состояние характеризуется воспалительным поражением слизистой оболочки полости рта, сопровождающимся образованием эрозий, афтозных элементов и выраженным болевым синдромом. Наиболее часто стоматит возникает после перенесённых острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ), герпесвирусных поражений и других инфекционных заболеваний, сопровождающихся снижением иммунологической реактивности организма.

У детей анатомо-физиологические особенности слизистой оболочки полости рта, а также незрелость иммунной системы способствуют более тяжёлому течению воспалительных процессов. Нарушение местного иммунитета и изменение микробного баланса создают благоприятные условия для присоединения вторичной бактериальной инфекции, что значительно усложняет клиническое течение стоматита и увеличивает сроки лечения.

Материалы и методы. Термин «бактериофаг» происходит от французских слов «bactérie» и «phage», что означает «пожиратель бактерий». Размер бактериофагов составляет 23–30 нм, они состоят из нуклеиновой кислоты и белка. Жизненный цикл бактериофага начинается с прикрепления к рецепторам бактериальной клетки и введения своего генетического материала внутрь клетки.

Бактериофаги являются естественными «хищниками» бактерий, в связи с чем рассматриваются как перспективные терапевтические средства. Благодаря высокой специфичности они способны селективно воздействовать на определённые виды бактерий и даже на отдельные штаммы.

В процессе своего действия бактериофаги вызывают лизис бактериальных клеток, что косвенно способствует стимуляции иммунной системы организма. Одним из ключевых преимуществ фаготерапии является возможность её индивидуализации для каждого пациента.

Бактериофаги безопасны для человека, поскольку представляют собой природные вирусы, эволюционировавшие совместно с бактериями на протяжении многих веков. Клинические исследования показали, что бактериофаги обладают низкой токсичностью.

В настоящее время эффективность бактериофагов подтверждена многочисленными научными данными. Они широко применяются при лечении внутрибольничных инфекций, инфекций мочевыводящих и половых путей, заболеваний органов дыхания, ожогов и ран, трофических язв, остеомиелита, а также инфекционных заболеваний кожи и слизистых оболочек, включая слизистую оболочку полости рта.

Настоящее исследование было проведено на базе кафедры профилактики стоматологических заболеваний Ташкентского государственного медицинского университета и включало клиническое наблюдение и лечение детей с признаками стоматита, развившегося на фоне вирусных инфекций.

В исследование были включены дети в возрасте от 3 до 12 лет с клинически подтверждённым стоматитом, возникшим после перенесённых вирусных заболеваний (ОРВИ, герпесвирусная инфекция и др.). Общее количество пациентов составило 40 человек. Все пациенты были разделены на две группы в зависимости от применяемой схемы лечения:

- **Основная группа (n=20)** – пациенты, получавшие комплексную терапию с включением бактериофагового препарата;
- **Контрольная группа (n=20)** – пациенты, получавшие стандартное лечение без применения бактериофагов.

Критериями включения в исследование являлись наличие клинических признаков стоматита (эрозии, афты, гиперемия слизистой оболочки, болевой синдром), а также наличие в анамнезе недавно перенесённой вирусной инфекции.

Критериями исключения являлись тяжёлые соматические заболевания, иммунодефицитные состояния, а также приём системных антибиотиков на момент исследования. Перед началом исследования от родителей или законных представителей всех пациентов было получено информированное согласие на участие в исследовании.

Всем пациентам проводилось комплексное клиническое обследование, включающее:

- сбор анамнеза (характер и длительность заболевания, наличие вирусной инфекции, жалобы пациента);
- визуальный осмотр полости рта с оценкой состояния слизистой оболочки;
- определение локализации и количества патологических элементов;
- оценка выраженности гиперемии и отёка;
- оценка болевого синдрома по визуально-аналоговой шкале (ВАШ).

Особое внимание уделялось состоянию гигиены полости рта и наличию факторов, способствующих развитию воспалительного процесса.

Лечение пациентов проводилось амбулаторно и включало комплексный подход, направленный на устранение воспалительного процесса, снижение болевого синдрома, ускорение регенерации и профилактику вторичной бактериальной инфекции.

Во всех группах проводилась местная обработка полости рта растворами антисептиков. Использовались растворы хлоргексидина 0,05% или мирамистина. Обработка осуществлялась 3–4 раза в сутки путём орошения или аппликаций с использованием стерильных тампонов.

При наличии клинических признаков вирусной этиологии заболевания назначался ацикловир в возрастных дозировках. Препарат применялся в виде мази или системной формы в зависимости от тяжести состояния пациента.

Для уменьшения болевого синдрома и воспаления применялись местные препараты в виде гелей (Камистад, Холисал). Обработка проводилась 2–3 раза в сутки после антисептической обработки.

С целью ускорения эпителизации слизистой оболочки применялась адгезивная паста Солкосерил. Препарат наносился на поражённые участки 2 раза в сутки после предварительной очистки слизистой оболочки. Всем пациентам назначались витаминно-минеральные комплексы, а также симптоматическая терапия (жаропонижающие, при необходимости). Рекомендовалась щадящая диета с исключением раздражающей пищи.

В основной группе дополнительно применялся бактериофаговый препарат в виде спрея или раствора. Препарат наносился на слизистую оболочку полости рта 2–3 раза в сутки после антисептической обработки. В случае использования раствора применялись аппликации: стерильный тампон, пропитанный бактериофагом, накладывался на поражённый участок на 5–10 минут. Длительность курса лечения составляла 5–7 дней в зависимости от клинической картины.

Полученные данные обрабатывались с использованием методов вариационной статистики. Рассчитывались средние значения (M), стандартные отклонения (SD). Для оценки достоверности различий между группами использовался критерий Стьюдента (t-критерий). Различия считались статистически значимыми при $p < 0,05$.

Обсуждение. Полученные в ходе исследования результаты свидетельствуют о высокой эффективности включения бактериофаговых препаратов в состав комплексной терапии стоматита у детей, развившегося на фоне вирусных инфекций. Выявлено, что применение бактериофагов способствует более быстрому купированию воспалительного процесса, снижению болевого синдрома и ускорению эпителизации поражённых участков слизистой оболочки полости рта.

Одним из ключевых факторов, определяющих тяжесть течения стоматита у детей, является присоединение вторичной бактериальной инфекции на фоне снижения местного иммунитета. В условиях вирусного поражения слизистой оболочки происходит нарушение барьерной функции эпителия и изменение микробиоценоза полости рта, что создаёт благоприятные условия для колонизации патогенными микроорганизмами. В этой связи традиционная терапия, включающая антисептические средства, не всегда обеспечивает селективный контроль патогенной микрофлоры, поскольку оказывает неспецифическое воздействие, затрагивая как патогенные, так и условно-патогенные и нормальные микроорганизмы.

В отличие от антисептиков, бактериофаги обладают высокой специфичностью действия, что позволяет им избирательно лизировать патогенные бактерии, не нарушая при этом нормальную микрофлору. Данный механизм имеет принципиальное значение, особенно в педиатрической практике, где сохранение микробного гомеостаза играет важную роль в процессах регенерации и местного иммунитета. Полученные данные подтверждают, что использование бактериофагов сопровождается снижением частоты вторичных бактериальных осложнений, что согласуется с современными представлениями о роли микробиоты в патогенезе воспалительных заболеваний полости рта.

Сравнительный анализ показал, что в основной группе наблюдалось статистически значимое сокращение сроков клинического выздоровления по сравнению с контрольной группой ($p < 0,05$). Более быстрое уменьшение болевого синдрома и ускорение эпителизации могут быть обусловлены как прямым антимикробным действием бактериофагов, так и их опосредованным влиянием на иммунные механизмы. Известно, что лизис бактерий под действием бактериофагов сопровождается высвобождением бактериальных антигенов, что может стимулировать местный иммунный ответ.

Особого внимания заслуживает высокая переносимость бактериофаговых препаратов у детей. В ходе исследования не было зарегистрировано клинически значимых побочных эффектов, что подтверждает их безопасность и целесообразность применения в педиатрической стоматологии. В отличие от некоторых антисептиков, бактериофаги не вызывают раздражения слизистой оболочки, не изменяют вкусовые ощущения и не оказывают негативного влияния на процессы регенерации.

Следует отметить, что полученные результаты согласуются с данными ряда отечественных и зарубежных исследований, в которых также подчёркивается перспективность применения бактериофагов при инфекционно-воспалительных заболеваниях различной локализации. Однако, несмотря на полученные положительные результаты, настоящее исследование имеет ряд ограничений. К ним относятся относительно небольшая выборка пациентов, отсутствие длительного наблюдения за отдалёнными результатами лечения, а также отсутствие микробиологической верификации состава микрофлоры до и после терапии.

Перспективным направлением дальнейших исследований является проведение рандомизированных контролируемых исследований с большей выборкой пациентов, а также изучение взаимодействия бактериофагов с микробиотой полости рта с использованием современных молекулярно-генетических методов. Кроме того, представляет интерес разработка персонализированных схем фототерапии с учётом индивидуального микробного профиля пациента.

Таблица №1

Критерий	Хлоргексидин (0,05%)	Бактериофаговый препарат
Фармакологическая группа	Антисептическое средство	Биологический антимикробный агент
Состав	Хлоргексидина биглюконат	Комплекс специфических бактериофагов
Механизм действия	Нарушает целостность клеточной мембраны микроорганизмов	Селективно инфицирует и лизирует патогенные бактерии
Спектр действия	Широкий	Узкоспецифический
Влияние на нормальную микрофлору	Может подавлять нормальную микрофлору	Не влияет на нормальную микрофлору
Риск развития резистентности	Возможен при длительном применении	Минимальный
Противовоспалительный эффект	Непрямой	Опосредованный (через элиминацию патогенов)
Влияние на регенерацию слизистой	При длительном применении может вызывать сухость	Не нарушает процессы регенерации
Способ применения	Полоскание, аппликации	Спрей, аппликации раствора
Кратность применения	3–4 раза в сутки	2–3 раза в сутки
Применение у детей	Требует осторожности (риск проглатывания)	Безопасен и удобен в применении
Побочные эффекты	Жжение, изменение вкуса, окрашивание эмали	Практически отсутствуют
Органолептические свойства	Горький вкус, специфический запах	Без запаха или слабый специфический вкус
Эффективность при стоматите	Эффективен для дезинфекции	Эффективен для селективного устранения вторичной инфекции и ускорения заживления
Клинический результат	Умеренное сокращение сроков лечения	Значительное сокращение сроков лечения и ускорение эпителизации

Заключение. Результаты проведённого исследования подтверждают, что включение бактериофаговых препаратов в состав комплексной терапии стоматита у детей, развившегося на фоне вирусных инфекций, является клинически обоснованным и эффективным подходом. Установлено, что применение бактериофагов способствует более быстрому купированию воспалительного процесса, снижению выраженности болевого синдрома и ускорению эпителизации поражённых участков слизистой оболочки полости рта.

Сравнительный анализ показал, что у пациентов, получавших бактериофаговую терапию, отмечалось статистически значимое сокращение сроков лечения по сравнению с традиционными методами. Кроме того, использование бактериофагов обеспечивало более эффективный контроль вторичной бактериальной инфекции без негативного влияния на нормальную микрофлору полости рта, что является важным преимуществом в педиатрической практике.

Список литературы:

1. Халилов И.Х., Абдуллаева Н.А., Каримова Д.С. Детская терапевтическая стоматология. – Ташкент: Delta Print Service, 2017. – 256 с.
2. Махсудов С.Н., Шукурова Г.Р. Детская стоматология. – Ташкент: Yangiyul Poligraph Service, 2008. – 180 с.
3. Кузьмина С.В. Детская стоматология. – М.: Медицина, 2015. – 320 с.
4. Боровский Е.В. Терапевтическая стоматология. – М.: Медицина, 2016. – 840 с.
5. Дмитриева Л.А. Терапевтическая стоматология детского возраста. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 368 с.
6. American Academy of Pediatric Dentistry. Guideline on Management of Oral Lesions in Children. – Chicago, 2020. – 45 p.
7. World Health Organization. Oral Health Surveys: Basic Methods. – Geneva, 2013. – 125 p.
8. Sulakvelidze A., Alavidze Z., Morris J.G. Bacteriophage therapy // Antimicrobial Agents and

Chemotherapy. – 2001. – Vol. 45, №3. – P. 649–659.

9. Abedon S.T., Kuhl S.J., Blasdel B.G., Kutter E.M. Phage treatment of human infections // Bacteriophage. – 2011. – Vol. 1, №2. – P. 66–85.

10. Łusiak-Szelachowska M., Weber-Dąbrowska B., Górski A. Bacteriophages and lysins in biofilm control // Virology Journal. – 2017. – Vol. 14. – P. 1–12.

11. Mills S., Shanahan F., Stanton C., Hill C., Coffey A., Ross R.P. Movers and shakers: influence of bacteriophages in shaping the mammalian gut microbiota // Gut Microbes. – 2013. – Vol. 4, №1. – P. 4–16.

12. Górski A., Międzybrodzki R., Weber-Dąbrowska B. Phage therapy: current status and perspectives // Medical Research Reviews. – 2020. – Vol. 40, №1. – P. 459–463.

Для цитирования: Мухамедова М.С., Эркаева Г.Р. Лечение стоматита, возникающего при вирусных заболеваниях у детей, с применением бактериофаговых препаратов // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 4(24). – С. 82–86. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19438905>

КИМЁВИЙ АДДИКТИВ БУЗИЛИШЛАРДА РЕАБИЛИТАЦИЯ ЖАРАЁНИДА ҚОН ВА СИЙДИК БИОКИМЁВИЙ КЎРСАТКИЧЛАРИНИНГ КОГНИТИВ ВА ПСИХОЭМОЦИОНАЛ БУЗИЛИШЛАР БИЛАН ЎЗАРО БОҒЛИҒИНИ ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ

Тураев Б.Т.

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Кимёвий аддиктив бузилишлар замонавий жамиятда когнитив ва психоэмоционал дисфункциялар билан боғлиқ бўлиб, уларни фақат субъектив клиник мезонлар орқали баҳолаш етарли эмас. Тадқиқотда 200 нафар иштирок этди. Қон ва сийдикдаги биокимёвий кўрсаткичлар, шу жумладан гепатик ферментлар (ALT, AST), глюкоза, креатинин ва урина кислотаси концентрациялари таҳлил қилинди. Когнитив функциялар МоСА тестлари орқали, психоэмоционал ҳолатлар Beck ва Spielberger-Ханін шкаллари орқали, ижтимоий функция ва ҳаёт сифати SAS-SR ва WHOQOL-BREF орқали баҳоланди. Натижалар асосий гуруҳда когнитив функциялар, психоэмоционал ва ижтимоий кўрсаткичларнинг сезиларли яхшиланганини кўрсатди, қон ва сийдик биокимёвий кўрсаткичлар эса улар билан статистик жиҳатдан аҳамиятли боғлиқликка эга бўлди. Бу натижалар кимёвий аддиктив бузилишларга чалинган беморларда комплекс мониторинг ва индивидуал реабилитация стратегияларини ишлаб чиқишнинг самарадорлигини тасдиқлайди.

Калит сўзлар: кимёвий аддиктив бузилишлар, когнитив функциялар, психоэмоционал дисфункциялар, биокимёвий маркерлар, интегратив мониторинг, комплекс реабилитация.

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN BLOOD AND URINE BIOCHEMICAL MARKERS AND COGNITIVE AND PSYCHOEMOTIONAL IMPAIRMENTS IN PATIENTS WITH CHEMICAL ADDICTION DURING REHABILITATION

Turaev B.T.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Chemical addiction in modern society is associated with cognitive and psychoemotional dysfunctions, and their assessment based solely on subjective clinical criteria is insufficient. The study included 200 participants. Biochemical markers in blood and urine, including liver enzymes (ALT, AST), glucose, creatinine, and uric acid, were analyzed. Cognitive functions were assessed using the MoCA test, psychoemotional status – with the Beck Depression Inventory and Spielberger-Xanin Anxiety Scale, and social function and quality of life - using SAS-SR and WHOQOL-BREF scales. Results showed a significant improvement in cognitive, psychoemotional, and social indicators in the main group, and the biochemical markers in blood and urine were statistically significantly associated with these changes. These findings confirm the effectiveness of comprehensive monitoring and the development of individualized rehabilitation strategies in patients with chemical addiction.

Keywords: chemical addiction, cognitive functions, psychoemotional dysfunctions, biochemical markers, integrative monitoring, comprehensive rehabilitation.

АНАЛИЗ ВЗАИМОСВЯЗИ БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРОВИ И МОЧИ С КОГНИТИВНЫМИ И ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ У ПАЦИЕНТОВ С ХИМИЧЕСКОЙ АДДИКЦИЕЙ В ПРОЦЕССЕ РЕАБИЛИТАЦИИ

Тураев Б.Т.

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Химическая аддикция в современном обществе связана с когнитивными и психоэмоциональными дисфункциями, и их оценка только по субъективным клиническим критериям является недостаточной. В исследовании приняли участие 200 человек. Были проанализированы биохимические показатели крови и мочи, включая печёночные ферменты (ALT, AST), глюкозу, креатинин и мочевую кислоту. Когнитивные функции оценивались с помощью теста МоСА, психоэмоциональное состояние - по шкалам Beck и Шпильбергера-Ханина, социальная функция и качество жизни - по шкалам SAS-SR и WHOQOL-BREF. Результаты показали значительное улучшение когнитивных, психоэмоциональных и социальных показателей в основной группе, при этом биохимические показатели крови и мочи были статистически значимо связаны с этими изменениями. Эти данные подтвер-

ждают эффективность комплексного мониторинга и разработки индивидуальных стратегий реабилитации у пациентов с химической аддикцией.

Ключевые слова: химическая аддикция, когнитивные функции, психоэмоциональные дисфункции, биохимические маркеры, интегративный мониторинг, комплексная реабилитация.

Кириш. Кимёвий аддиктив бузилишлар - турли психоактив моддаларга нисбатан рухий ва жисмоний қарамлик билан боғлиқ неврологик ва психоэмоционал ўзгаришлар йиғиндисидир [1]. Бундай бузилишлар нафақат шахсининг психика ва ҳуқ-атвориға салбий таъсир кўрсатади, балки ижтимоий фаоллик, оилавий ва меҳнат ҳаётида ҳам катта муаммолар келтириб чиқаради [2, 3]. Кимёвий аддиктив бузилишларнинг клиник кўриниши турлича бўлиб, рухий ва когнитив дисфункциялар, эмотив реакциялар ва ижтимоий мослашувнинг бузилиши билан намоён бўлади [4].

Сўнгги йилларда олиб борилган тадқиқотлар шуни кўрсатадики, кимёвий аддиктив бузилишларда когнитив функциялар - диққат, хотира, қарор қабул қилиш ва ижтимоий тажриба билан боғлиқ психоэмоционал ҳолатлар, организмдаги биокимёвий параметрлар билан яқин алоқадор [5, 6]. Хусусан, қон ва сийдикдаги метаболит маркерлар - глюкоза, гепатик ферментлар (ALT, AST), креатинин ва бошқа биохимик кўрсаткичлар когнитив пасайиш ва рухий дисфункциялар билан боғлиқлигини кўрсатган [7, 8]. Бу алоқа реабилитация жараёнида беморларнинг индивидуал эҳтиёжларини ҳисобга олиб, даволаш стратегияларини оптималлаштириш имконини беради.

Биокимёвий маркерлар ва когнитив ҳамда психоэмоционал ҳолатлар ўртасидаги боғлиқликни ўрганиш нафақат илмий аҳамиятга эга, балки клиник амалиётда ҳам муҳимдир. Бу маълумотлар орқали беморларнинг реабилитация жараёнидаги прогрессини назорат қилиш, даволаш самарадорлигини баҳолаш ва рехабилитация протоколларини оптималлаштириш мумкин [9]. Шунингдек, қон ва сийдикдаги биокимёвий кўрсаткичларни кузатиш когнитив ва психоэмоционал бузилишларни прогнозлаш, даволашнинг индивидуал йўналишини белгилашда асос бўлиб хизмат қилади [10].

Тадқиқот мақсади. Кимёвий аддиктив бузилишларга чалинган беморларда реабилитация жараёнида қон ва сийдик биокимёвий кўрсаткичлари ҳамда когнитив ва психоэмоционал бузилишлар ўртасидаги боғлиқликни таҳлил қилишдан иборат.

Материаллар ва усуллар. Тадқиқот Республика ихтисослаштирилган рухий саломатлик илмий-амалий тиббиёт марказининг наркология хизмати бўйича Самарқанд вилояти филиалида 2025-2026 йиллар оралиғида амалга оширилди. Тадқиқотда кимёвий аддиктив бузилишларга чалинган жами 200 нафар бемор иштирок этди, уларнинг асосий гуруҳи 140 нафардан иборат бўлиб, уларда реабилитация жараёнида биокимёвий ва когнитив-психоэмоционал кўрсаткичлар тўлиқ баҳоланди. Таqqoslash гуруҳи 60 нафардан иборат бўлиб, уларда стандарт клиник кузатувлар амалга оширилди.

Тадқиқотда қон ва сийдик биокимёвий кўрсаткичлари кенг қамровда таҳлил қилинди. Қонда глюкоза, гепатик ферментлар (ALT, AST), креатинин, урина кислотаси ва бошқа метаболит маркерлар ўрганилди. Сийдикда эса метаболит маркерлар концентрацияси, гомеостаз ҳолати ва биондикаторлар динамикаси таҳлил қилинди. Бу кўрсаткичлар беморларнинг физиологик ва биохимик ҳолатини комплекс баҳолаш имконини берди.

Когнитив функциялар МоСА (Montreal Cognitive Assessment) тестлари орқали баҳоланди, бу эса диққат, хотира, визуал-пространстволик қобилият, тил ва ижро функцияларини аниқлашда ёрдам берди. Психоэмоционал ҳолатлар Beck депрессия шкаласи, Spielberger–Xanin тревожлик шкаласи орқали баҳоланди. Шунингдек, ижтимоий функциялар ва ҳаёт сифати SAS-SR (Social Adjustment Scale – Self Report) ва WHOQOL-BREF (World Health Organization Quality of Life – Brief) воситалари орқали ўрганилди. Бу методлар беморларнинг реабилитация жараёнидаги когнитив, психоэмоционал ва ижтимоий ҳолатини комплекс баҳолаш имконини берди.

Тадқиқотнинг методологик асоси сифатида биокимёвий кўрсаткичлар билан когнитив ва психоэмоционал параметрлар ўртасидаги боғлиқликни аниқлаш назарда тутилди. Маълумотлар статистик жиҳатдан SPSS 27 дастури орқали ишланди. Тафовутлар Student t-тест, ANOVA ва корреляцион таҳлиллар орқали баҳоланди; $p < 0,05$ аҳамиятлилиқ даражаси деб қабул қилинди. Шунингдек, регрессия ва фактор таҳлиллари орқали биокимёвий маркерлар ва когнитив-психоэмоционал параметрлар ўртасидаги илмий жиҳатдан аҳамиятли боғлиқликлар аниқланди.

Натижалар. Тадқиқотда қатнашган 200 нафар кимёвий аддиктив бузилишларга чалинган беморлар орасида қон ва сийдик биокимёвий кўрсаткичлар ҳамда когнитив ва психоэмоционал ҳолатлар ўртасида сезиларли боғлиқликлар аниқланди. Асосий гуруҳда 140 нафар беморда гепатик ферментлар - ALT ва AST кўрсаткичлари нормадан юқори бўлиб, уларнинг ўртача қийматлари мос равишда $48,2 \pm 6,7$ U/L ва $42,5 \pm 5,9$ U/L ни ташкил қилди. Таqqoslash гуруҳида эса мазкур ферментлар

микдори нисбатан паст бўлиб, $\mu=32,1\pm4,5$ U/L ва $\mu=29,7\pm3,8$ U/L ни ташкил қилди, ва фарқ статистик жиҳатдан аҳамиятли эди ($p<0,01$). Бу натижа гепатотоксик таъсир ва спиртли ичимликлар ҳамда психоактив моддаларнинг узок муддатли истеъмоли оқибатида жигар функциясининг бузилиши билан боғлиқлигини кўрсатади. Қон глюкоза ва креатинин кўрсаткичлари ҳам асосий гуруҳда статистик жиҳатдан аҳамиятли даражада юқори эди ($p<0,05$), бу эса метаболик ва буйрак функцияларидаги дисфункцияларни англатади. Шу билан бирга, асосий гуруҳда қон глюкозаси кўплаб беморларда нормадан юқори бўлиб, организмда углевод алмашинувининг бузилишини кўрсатди. Креатинин кўрсаткичларининг юқорилиги эса буйракнинг фильтрация қобилятидаги пасайиш ёки моддалар алмашинуви билан боғлиқ эканлигини тасдиқлайди.

Сийдик таҳлиллари натижалари шуни кўрсатдики, метаболик маркерлар концентрацияси ва гомеостаз ҳолати когнитив ва психоэмоционал дисфункциялар билан сезиларли боғлиқликни намоён қилди. Асосий гуруҳда сийдикдаги метаболик маркерлар, жумладан глюкоза ($\mu=5,8\pm0,7$ ммоль/л), креатинин ($\mu=102,3\pm12,5$ мкмоль/л) ва урина кислотаси ($\mu=420,7\pm45,3$ мкмоль/л) концентрацияси нормадан юқори бўлиб, бу ҳолат когнитив функциялар пасайиши ва психоэмоционал нотинчликнинг юқори даражаси билан уйғунликда кузатилди. Ушбу натижа метаболик бузилишлар ва нейропсихологик дисфункциялар ўртасидаги функционал алоқани тасдиқлайди ва кимёвий аддиктив бузилишларга чалинган беморларда организмдаги гомеостазнинг бузилиши когнитив ва эмоционал ҳолатга тўғридан-тўғри таъсир қилиши мумкинлигини кўрсатади.

Когнитив функцияларни баҳолаш МоСА (Montreal Cognitive Assessment) тестлари орқали амалга оширилди. Асосий гуруҳда МоСА кўрсаткичи ўртача $21,4\pm3,2$ ни ташкил қилди, бу эса диққат ва хотиранинг пасайиши, визуал-пространстволик қобилят ва ижро функцияларида сезиларли камайишни кўрсатди. Беморлар орасида, айниқса, иш хотира ва назорат функцияларидаги пасайиш кузатилди, бу уларнинг кундалик фаолият ва ижтимоий муомалаларига салбий таъсир кўрсатиши мумкинлигини кўрсатди. Таққослаш гуруҳида МоСА кўрсаткичи $26,7\pm2,5$ ни ташкил қилди, бу асосий гуруҳ билан қиёслаганда статистик жиҳатдан аҳамиятли фарқни кўрсатди ($p<0,01$). Шу билан бирга, корреляцион таҳлиллар когнитив функцияларнинг пасайиши билан сийдик метаболик маркерлар концентрацияси ўртасида салбий боғлиқлик мавжудлигини кўрсатди, яъни метаболик дисфункциянинг юқори даражаси когнитив қобилиятларнинг пасайиши билан уйғунликда эди.

Психоэмоционал ҳолатлар Beck депрессия шкаласи ва Spielberger-Xanin хавотир шкаласи орқали комплекс баҳоланди. Асосий гуруҳда Beck шкаласи бўйича ўртача балл $19,6\pm4,1$ ни ташкил қилди, бу эса депрессиянинг ўртача даражасига тўғри келади. Шунингдек, Spielberger-Xanin шкаласи бўйича умумий балл $52,3\pm6,4$ ни ташкил этди, бу тревожликнинг юқори даражасини кўрсатди. Таққослаш гуруҳида эса ушбу кўрсаткичлар мос равишда $9,2\pm3,7$ ва $37,5\pm5,8$ бўлиб, асосий гуруҳ билан солиштирганда статистик жиҳатдан аҳамиятли фарқ борлиги аниқланди ($p<0,01$). Бу натижалар кимёвий аддиктив бузилишларга чалинган беморларда депрессия ва тревожликнинг юқори даражада бўлишини ҳамда уларнинг когнитив ва биокимёвий дисфункциялар билан уйғунлигини кўрсатади.

Ижтимоий функциялар SAS-SR (Social Adjustment Scale - Self Report) ва WHOQOL-BREF (World Health Organization Quality of Life - Brief) воситалари орқали баҳоланди. Асосий гуруҳда беморлар ижтимоий фаоллик ва ҳаёт сифатида паст кўрсаткичларга эга эканлиги аниқланди: SAS-SR бўйича $\mu=2,8\pm0,5$ ва WHOQOL-BREF бўйича $\mu=58,4\pm7,2$. Бу кўрсаткичлар беморларнинг ижтимоий мослашувида пасайиш ва ҳаёт сифатидаги тушишни намоён қилди. Таққослаш гуруҳида эса ижтимоий фаоллик ва ҳаёт сифати кўрсаткичлари юқори бўлиб, $\mu=1,7\pm0,4$ ва $\mu=74,3\pm6,5$ ни ташкил қилди ($p<0,01$), бу эса кимёвий аддиктив бузилишларга чалинмаган ёки енгил дисфункцияли беморларда ижтимоий интеграция ва ҳаёт сифати юқори эканлигини кўрсатади.

Корреляцион таҳлиллар шуни кўрсатдики, психоэмоционал дисфункциялар ва ижтимоий фаоллик кўрсаткичлари ўртасида сезиларли боғлиқлик мавжуд. Хусусан, юқори депрессия ва тревожлик даражаси беморларнинг ижтимоий мослашув ва ҳаёт сифати кўрсаткичларини сезиларли даражада пасайтирди ($r=-0,41-0,52$; $p<0,05$). Бу натижалар реабилитация жараёнида психоэмоционал ҳолатни барқарорлаштириш ва ижтимоий функцияларни тиклашнинг муҳимлигини кўрсатади.

Корреляцион таҳлиллар қон ва сийдик биокимёвий маркерлар билан когнитив ҳамда психоэмоционал кўрсаткичлар ўртасида сезиларли ва статистик жиҳатдан аҳамиятли боғлиқликни кўрсатди. Хусусан, гепатик ферментлар - ALT ва AST кўрсаткичлари билан МоСА (Montreal Cognitive Assessment) когнитив тестлари ўртасида салбий корреляция аниқланди ($r=-0,46$; $p<0,01$). Бу натижа шундан далолат берадики, ALT ва AST ферментларининг юқори даражада бўлиши когнитив функцияларнинг, хусусан диққат, хотира ва ижро функцияларининг пасайиши билан уйғунликда эди. Бу, ўз навбатида, кимёвий аддиктив бузилишларга чалинган беморларда жигар функциясининг бузилиши когнитив салоҳиятга салбий таъсир кўрсатишини кўрсатади.

Шунингдек, Beck депрессия шкаласи билан ALT ва AST кўрсаткичлари ўртасида позитив корреляция кузатилди ($r=0,42$; $p<0,01$). Бу эса юқори гепатик ферментлар даражаси билан депрессия симптомларининг кучайиши ўртасида боғлиқлик мавжудлигини кўрсатади. Таqqoslash гуруҳида бу корреляция анча паст бўлгани, асосий гуруҳдаги беморларда метаболик бузилишлар ва психоэмоционал нотинчликлар орасида яқин алоқа борлигини тасдиқлайди.

Сийдик метаболик маркерлари ҳам когнитив ва психоэмоционал дисфункциялар билан статистик жиҳатдан аҳамиятли боғлиқликни кўрсатди ($r=0,35-0,41$; $p<0,05$). Бу натижалар шуни кўрсатадики, организмдаги метаболик бузилишлар, жумладан сийдикдаги метаболик маркерлар концентрациясининг ошиши, когнитив қобилиятлар пасайиши ва психоэмоционал нотинчликларнинг ўсиши билан боғлиқ. Бу ҳолат метаболик ва нейропсихологик механизмлар ўртасидаги функционал алоқанинг мавжудлигини тасдиқлайди ва кимёвий аддиктив бузилишларда биокимёвий мониторингнинг аҳамиятини янада оширади.

Хулоса. Қон ва сийдик биокимёвий кўрсаткичлар когнитив ва психоэмоционал параметрлар билан сезиларли ва статистик жиҳатдан аҳамиятли боғлиқликка эга. Бу ҳолат кимёвий аддиктив бузилишларга чалинган беморларда метаболик ва нейропсихологик механизмлар ўртасидаги функционал алоқани аниқлаш имконини беради. Шу тариқа, қон ва сийдик биокимёвий кўрсаткичларнинг комплекс мониторинги реабилитация жараёнида аҳамиятли объект сифатида қўлланилиши мумкин. Ушбу маълумотлар асосида индивидуал терапевтик интервенциялар ишлаб чиқиш, когнитив ва психоэмоционал функцияларни оптимал барқарорлаштириш ҳамда реабилитация самарадорлигини ошириш имконияти мавжуд. Бундан ташқари, метаболик ва когнитив-психоэмоционал параметрларнинг интеграцияланган баҳоланиши реабилитация жараёнида беморларнинг индивидуал эҳтиёжлари ва физиологик ҳолатини ҳисобга олган тарзда стратегияларни ишлаб чиқишга ёрдам беради. Бу ёндашув на фақат реабилитациянинг самарадорлигини оширади, балки клиник амалиётда психологик ва биокимёвий мониторингни ҳам такомиллаштириш имконини яратади. Шу билан бирга, натижалар келгуси тадқиқотларда метаболик ва когнитив-психоэмоционал дисфункциялар ўртасидаги механизмларни чуқурроқ ўрганиш учун асосий илмий база сифатида хизмат қилиши мумкин.

Адабиётлар рўйхати:

1. Ellingson J. M. et al. The neurocognitive effects of cannabis across the lifespan //Current behavioral neuroscience reports. – 2021. – Т. 8. – №. 4. – С. 124-133.
2. Holdorovna I. M., Temirpulotovich T. B. Psychopathological features of long-term endogenous depressions //International Journal of Cognitive Neuroscience and Psychology. – 2024. – Т. 2. – №. 3. – С. 15-21.
3. Koob G. F. Neurobiology of opioid addiction: opponent process, hyperkatifeia, and negative reinforcement //Biological psychiatry. – 2020. – Т. 87. – №. 1. – С. 44-53.
4. Kuznetsov V. V. Medical rehabilitation of patients with addictive pathology //Neurology Bulletin. – 2015. – Т. 47. – №. 3. – С. 90-98.
5. Martinotti G. et al. Transcranial Magnetic Stimulation to treat Substance Use Disorders and Behavioral addictions: The state of the art //J. Ital. Soc. Psychiatry. – 2021. – Т. 7. – С. 40-46.
6. Merlo G., Sugden S. G. The power of lifestyle psychiatry: a new approach to mental health //American Journal of Lifestyle Medicine. – 2025. – Т. 19. – №. 7. – С. 1034-1044.
7. Pennington D. L. et al. The impact of exercise and virtual reality executive function training on cognition among heavy drinking veterans with traumatic brain injury: a pilot feasibility study //Frontiers in Behavioral Neuroscience. – 2022. – Т. 16. – С. 802711.
8. Rauschert C. et al. The use of psychoactive substances in Germany: Findings from the epidemiological survey of substance abuse 2021 //Deutsches Ärzteblatt International. – 2022. – Т. 119. – №. 31-32. – С. 527.
9. Sultanov S. et al. Depression and post-traumatic stress disorder in patients with alcoholism after the covid-19 pandemic //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. D11. – С. 420-429.
10. Temirpulotovich T. B. Clinical Pictures of Cognitive Dysfunctions Observed in Alcoholism //Journal of Medical Genetics and Clinical Biology. – 2025. – Т. 2. – №. 3. – С. 42-50.

Иқтибос учун: Тураев Б.Т. Кимёвий аддиктив бузилишларда реабилитация жараёнида қон ва сийдик биокимёвий кўрсаткичларининг когнитив ва психоэмоционал бузилишлар билан ўзаро боғлиғини таҳлил қилиш // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2026. – № 4(24). – Б. 87–90. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19439042>

КИШЕЧНАЯ МИКРОБИОТА КАК ФАКТОР ТРИГГЕРОВАНИЯ СИСТЕМНОГО ВОСПАЛЕНИЯ ПРИ РЕВМАТОИДНОМ АРТРИТЕ

Ахмедова Ш.У., Эгамбердиева Д.А.

Ташкентский государственный медицинский университет, г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. Ревматоидный артрит (РА) является хроническим аутоиммунным заболеванием, характеризующимся персистирующим воспалением суставов, формированием аутоантител и развитием системных проявлений. Распространённость заболевания составляет около 0,5–1% населения мира, причём пик заболеваемости приходится на трудоспособный возраст 35–64 лет. Несмотря на значительный прогресс в понимании иммунопатогенеза заболевания, точные механизмы инициации аутоиммунного процесса остаются предметом активных исследований. Современные представления рассматривают ревматоидный артрит как заболевание, возникающее в результате сложного взаимодействия генетической предрасположенности, факторов окружающей среды и нарушений иммунной регуляции.

Ключевые слова: ревматоид артрит, кишечная микробиота, функции кишечника, аутоиммунного воспаления

INTESTINAL MICROBIOTA AS A TRIGGERING FACTOR FOR SYSTEMIC INFLAMMATION IN RHEUMATOID ARTHRITIS

Ahmedova Sh.U., Egamberdieva D.A.

Tashkent State Medical University, Tashkent, Uzbekistan

Resume. Rheumatoid arthritis (RA) is a chronic autoimmune disease characterized by persistent joint inflammation, autoantibody formation, and the development of systemic manifestations. The disease affects approximately 0.5–1% of the global population, with peak incidence occurring in the working-age population of 35–64 years. Despite significant progress in understanding the immunopathogenesis of the disease, the precise mechanisms that initiate the autoimmune process remain a subject of active research. Current understanding views rheumatoid arthritis as a disease arising from a complex interaction of genetic predisposition, environmental factors, and immune dysregulation.

Key words: rheumatoid arthritis, intestinal microbiome, intestinal function, autoimmune inflammation

ИЧАК МИКРОБИОТАСИ РЕВМАТОИД АРТРИТ КАСАЛЛИГИДА ТИЗИМЛИ ЯЛЛИГЛАНИШНИНГ ТРИГГЕР ОМИЛИ СИФАТИДА

Ахмедова Ш.У., Эгамбердиева Д. А.

Тошкент давлат тиббиёт университети, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. Ревматоид артрит (РА) сурункали аутоиммун касаллик бўлиб доимий бўғимларнинг яллигланиши, аутоантителоларнинг шаклланиши ва тизимли кўринишларнинг ривожланиши билан тавсифланади. Касаллик дунё аҳолисининг тахминан 0,5-1 % да учраши аниқланган, энг юқори касаллиги 35-64 ёшли меҳнатга лаёқатли аҳолига тўғри келади. Касалликнинг иммунопатогенезини тушунишда сезиларли ютуқларга қарамай аутоиммун жараёни бошлайдиган аниқ механизмлар фаол тадқиқот мавзуси бўлиб қолмоқда. Ҳозирги тушунчалар ревматоид артритни ирсий мойиллик атроф муҳит омиллари ва иммун тизимининг мураккаб бузилишидан кейин келиб чиқадиган касаллик сифатида қарайди.

Калим сўзлар: ревматоид артрит, ичак микробиомаси, ичак функцияси, аутоиммун яллигланиши.

В последние годы особое внимание уделяется роли микробиоты кишечника как потенциально-го фактора, способного инициировать и поддерживать хроническое системное воспаление. Кишечный микробиом представляет собой сложную экосистему, включающую тысячи видов микроорганизмов, которые участвуют в формировании иммунного гомеостаза и регуляции метаболических процессов организма. Нарушение микробного баланса — дисбиоз — может приводить к активации иммунной системы и развитию аутоиммунных заболеваний[3].

У пациентов с ревматоидным артритом выявлены выраженные изменения состава кишечной микробиоты, включающие снижение количества симбиотических бактерий и увеличение условно-

патогенных микроорганизмов. Подобные изменения сопровождаются нарушением барьерной функции кишечника и усилением транслокации микробных компонентов в системный кровоток[8]. В связи с этим изучение роли кишечной микробиоты в патогенезе ревматоидного артрита представляет значительный научный и клинический интерес [2].

Роль кишечного микробиома в иммунной регуляции. Микробиота кишечника играет ключевую роль в формировании врождённого и адаптивного иммунитета. Комменсальные бактерии участвуют в регуляции дифференцировки иммунных клеток, поддерживают целостность слизистого барьера и контролируют баланс между провоспалительными и противовоспалительными механизмами[1,4,5].

Экспериментальные исследования показали, что изменение состава кишечной микрофлоры может приводить к активации Th17-клеточного ответа и повышению продукции провоспалительных цитокинов, таких как IL-6, IL-17 и TNF- α . Данный механизм рассматривается как один из ключевых факторов развития аутоиммунного воспаления при ревматоидном артрите[7,9].

В экспериментальных моделях артрита установлено, что колонизация кишечника определёнными видами бактерий может индуцировать развитие воспалительного артрита посредством активации Th17-клеток и усиления продукции провоспалительных медиаторов[15].

Изменения кишечной микробиоты при ревматоидном артрите. Клинические исследования показывают, что у пациентов с ревматоидным артритом наблюдается выраженная перестройка кишечного микробиома. Среди наиболее характерных изменений отмечают: снижение содержания бифидобактерий и бактероидов; уменьшение количества лактобактерий; увеличение условно-патогенных энтеробактерий; повышение частоты выявления клостридий и стафилококков. Подобные изменения микробиоценоза кишечника были выявлены у пациентов с ревматоидным артритом, особенно в пожилом возрасте[10,11,12].

Одновременно наблюдается увеличение количества кишечных палочек с изменёнными ферментативными свойствами и рост дрожжеподобных грибов рода *Candida*. Такие изменения свидетельствуют о нарушении симбиотических взаимоотношений микробных популяций и формировании дисбиотического состояния[18,19].

Микробные триггеры аутоиммунного воспаления. Одним из ключевых механизмов участия микробиоты в патогенезе ревматоидного артрита является активация иммунной системы под воздействием микробных антигенов[13,14,16].

Показано, что у пациентов с РА отмечается повышенный гуморальный иммунный ответ к различным микробным антигенам. В частности, обнаружено увеличение уровня антител к белкам микроорганизмов *Porphyromonas gingivalis*, *Mycobacterium avium paratuberculosis*, а также вирусу Эпштейна-Барр[17,20,21].

Такая реакция может быть связана с несколькими механизмами: молекулярная мимикрия; активация врождённого иммунитета; эпителиальное распространение; гиперцитруллинирование белков.

Особый интерес представляет способность некоторых бактерий индуцировать процессы цитруллинирования белков, что приводит к формированию аутоантигенов и продукции антицитруллиновых антител (АСРА)[22].

Перспективы терапевтической коррекции микробиоты. Учитывая важную роль кишечной микробиоты в развитии системного воспаления, одним из перспективных направлений лечения ревматоидного артрита рассматривается модификация микробиома [6].

В качестве возможных терапевтических подходов обсуждаются: применение пробиотиков; пребиотическая терапия; диетические вмешательства; трансплантация фекальной микробиоты.

Предполагается, что нормализация состава кишечной микробиоты может способствовать снижению активности воспалительного процесса и улучшению клинического течения заболевания[22].

Заключение. Современные исследования свидетельствуют о значительной роли кишечной микробиоты в патогенезе ревматоидного артрита. Дисбиотические изменения кишечного микробиома могут способствовать активации иммунной системы, формированию аутоантител и поддержанию хронического системного воспаления.

Изучение микробиоты открывает новые перспективы для понимания механизмов развития ревматоидного артрита и разработки инновационных методов диагностики и лечения заболевания.

Список литературы:

1. Балабанова Р.М., Каптаева А.К. Особенности клинической картины и лечения ревматоидного артрита в пожилом возрасте // *Consilium medicum*. 2006. Т. 8. № 12. С. 51-56.

2. Белов Б.С., Шубин С.В., Тарасова Г.М. и др. Ципрофлоксацин в ревматологии // Научно-практ. ревматол. 2003. № 2. С. 11.
3. Бондаренко В.М., Лиходед В.Г., Воробьев А.А. Иммунорегуляция численности грамотрицательной микрофлоры кишечника // Журн. микробиол. 2004. № 4. С. 90-93.
4. Бондаренко В.М., Рябиченко Е.В. Роль дисфункций кишечного барьера в поддержании хронического воспалительного процесса различной локализации // Журн. микробиол. 2010. № 1. С. 92-100.
5. Каратеев А.Е., Насонова В.А. Энтеропатия, индуцированная нестероидными противовоспалительными препаратами // Тер. арх. 2004. № 2. С. 79-82.
6. Катаева Л.В., Степанова К.Б., Степанова Т.Ф. и др. Возрастные особенности дисбиоза толстой кишки // Журн. микробиол. 2010. № 1. С. 76-80.
7. Конев Ю.В., Лазебник Л.Б. Метаболизм эндотоксина в организме и его роль в процессе инволюции // Клин. геронтол. 2009. № 1. С. 39-46.
8. Насонова В.А. Геронтологические проблемы ревматологии в XXI веке // Клин. геронтол. 2009. № 8-9. С. 3-6.
9. Olivieri I., Pipitone N.D., Angelo S. et al. Late-onset rheumatoid arthritis and late-onset spondyloarthritis // Clin. Exp. Rheumatol. 2009. № 27 (4 Suppl 55). P. 139-145.
10. Tlaskalová-Hogenová H., Štěpánková R., Hudcovic T. et al. Commensal bacteria (normal microflora), mucosal immunity and chronic inflammatory and autoimmune diseases // Immunol. Lett. 2004. № 93 (2-3). P. 97-108.
11. Vaahhtovuori J., Munnukka E., Korkeamäki M. et al. Fecal microbiota in early rheumatoid arthritis // J. Rheumatol. 2008. № 35 (8). P. 1477-1497.
12. Aas J.A., Paster B.J., Stokes L.N., Olsen I., Dewhirst F.E. Defining the Normal Bacterial Flora of the Oral Cavity // J Clin Microbiol. 2005. 43(11):5721-5732.
13. AIHW; Australian Institute of Health Welfare. Rheumatoid Arthritis. Available online: <https://www.aihw.gov.au/reports/chronic-musculoskeletalconditions/rheumatoid-arthritis> (accessed on 10 April 2021).
14. Ajeganova S., Huizinga T. Sustained remission in rheumatoid arthritis: latest evidence and clinical considerations // Ther Adv Musculoskelet Dis. 2017. 9(10):249-262.
15. Alghamdi M.A., Redwan E.M. Interplay of Microbiota and Citrullination in the Immunopathogenesis of Rheumatoid Arthritis // Probiotics Antimicrob Proteins. 2022. 14(1):99-113.
16. Araújo V.M.A., Melo I.M., Lima V. Relationship between Periodontitis and Rheumatoid Arthritis: Review of the Literature // Mediators Inflamm. 2015. 2015:1-15.
17. Äyräväinen L., Leirisalo-Repo M., Kuuliala A. et al. Periodontitis in early and chronic rheumatoid arthritis: a prospective follow-up study in Finnish population // BMJ Open. 2017. 7(1):e011916.
18. Beam A., Clinger E., Hao L. Effect of Diet and Dietary Components on the Composition of the Gut Microbiota // Nutrients. 2021. 13(8):2795.
19. Bello-Gualtero J.M., Lafaurie G.I., Hoyos L.X. et al. Periodontal Disease in Individuals With a Genetic Risk of Developing Arthritis and Early Rheumatoid Arthritis: A Cross-Sectional Study // J Periodontol. 2016. 87(4):346-356.
20. Cai Y., Zhang J., Liang J. et al. The Burden of Rheumatoid Arthritis: Findings from the 2019 Global Burden of Diseases Study and Forecasts for 2030 by Bayesian Age-Period-Cohort Analysis // J Clin Med. 2023. 12(4):1291.
21. Campbell C., Kandalgaonkar M.R., Golonka R.M., Yeoh B.S., Vijay-Kumar M., Saha P. Crosstalk between Gut Microbiota and Host Immunity: Impact on Inflammation and Immunotherapy // Biomedicines. 2023. 11(2):294.
22. Catrina A.I., Joshua V., Klareskog L., Malmström V. Mechanisms involved in triggering rheumatoid arthritis // Immunol Rev. 2016. 269(1):162-174.

Для цитирования: Ахмедова Ш.У., Эгамбердиева Д.А. Кишечная микробиота как фактор триггирования системного воспаления при ревматоидном артрите // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 4(24). – С. 91–93. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19439097>

КАЛАМУШЛАР ОШҚОЗОН ОСТИ БЕЗИНИНГ ПОСТНАТАЛ ОНТОГЕНЕЗ ДАВРИДАГИ МОРФОЛОГИК ПАРАМЕТРЛАРИНИНГ ДИНАМИК ЎЗГАРИШЛАРИ

Ахтамов А., Раджабов А.Б.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Ушбу тадқиқот лаборатор оқ зотсиз каламушларда постнатал онтогенезнинг турли босқичларида (1, 3, 9, 12 ва 15 ойлик) ошқозон ости безининг морфологик ва морфометрик хусусиятларини ўрганишга бағишланган. Натижаларга кўра, постнатал ривожланиш даврида ошқозон ости безининг экзокрин ва эндокрин қисмларида босқичма-босқич морфофункционал ўзгаришлар кузатилади. Эрта ёш давларида ацинар аппаратнинг ривожланиши ва секретор фаоллиги ошиши, кейинги босқичларда эса ацинусларнинг айрим морфометрик кўрсаткичлари бироз камайиши қайд этилди. Шу билан бирга Лангерганс оролчаларининг майдони ва эндокриноцитлар сони ёш ортиши билан босқичма-босқич ошиши аниқланди. Олинган натижалар постнатал онтогенезда ошқозон ости беzi структурасининг динамик қайта қурилиши ва экзокрин ҳамда эндокрин компонентлар ўртасидаги функционал мувозанат шаклланишини кўрсатади.

Калим сўзлар: ошқозон ости беzi, постнатал онтогенез, морфология, морфометрия, ацинус, Лангерганс оролчалари.

DYNAMIC CHANGES IN THE MORPHOLOGICAL PARAMETERS OF THE RAT PANCREAS DURING POSTNATAL ONTOGENESIS

Akhtamov A., Radjabov A., B.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Abstract. This study is devoted to the investigation of the morphological and morphometric characteristics of the pancreas in outbred laboratory white rats at different stages of postnatal ontogenesis (1, 3, 9, 12, and 15 months). According to the obtained results, stepwise morphofunctional changes occur in both the exocrine and endocrine components of the pancreas during postnatal development. In the early age periods, the development of the acinar apparatus and an increase in secretory activity were observed, whereas at later stages a certain decline in individual morphometric parameters of the acini was recorded. At the same time, it was established that the area of the islets of Langerhans and the number of endocrinocytes gradually increase with age. The findings indicate a dynamic structural remodeling of the pancreas during postnatal ontogenesis and the formation of a functional balance between the exocrine and endocrine components of the organ.

Key words: Pancreas, postnatal ontogenesis, morphology, morphometry, acinus, islets of Langerhans.

ДИНАМИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ КРЫС В ПОСТНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ ОНТОГЕНЕЗА

Ахтамов А., Раджабов А.Б.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Данное исследование посвящено изучению морфологических и морфометрических особенностей поджелудочной железы лабораторных беспородных белых крыс на различных этапах постнатального онтогенеза (1, 3, 9, 12 и 15 месяцев). Согласно полученным результатам, в процессе постнатального развития в экзокринной и эндокринной частях поджелудочной железы наблюдаются поэтапные морфофункциональные изменения. В ранние возрастные периоды отмечалось развитие ацинарного аппарата и повышение секреторной активности, тогда как на более поздних этапах фиксировалось некоторое снижение отдельных морфометрических показателей ацинусов. Вместе с тем было установлено, что площадь островков Лангерганса и количество эндокриноцитов постепенно увеличиваются с возрастом. Полученные результаты свидетельствуют о динамической перестройке структуры поджелудочной железы в постнатальном онтогенезе и формировании функционального баланса между экзокринным и эндокринным компонентами органа.

Ключевые слова: Поджелудочная железа, постнатальный онтогенез, морфология, морфометрия, ацинус, островки Лангерганса.

e-mail: azizbekakhtamov@mail.ru, radjabov.axtam@bsmi.uz

Кириш. Ошқозон ости беи морфoфункционал тузилиши жиҳатидан сутэмизувчилар овқат ҳазм қилиш тизимининг энг мураккаб органларидан бири бўлиб, ўзида экзокрин ва эндокрин компонентларни мужассамлаштиради [1, 11]. Ошқозон ости беи онтогенез жараёнида тўқима элементларининг дифференциацияси, ферментатив фаоллигининг ривожланиши ва метабoлик жараёнларнинг гормонал регуляциясининг шаклланиши билан боғлиқ мураккаб структуравий ва функционал ўзгаришларни бошдан кечиради [6, 13]. Постнатал ривожланиш даври айниқса муҳимдир, чунки бу даврда тўқиманинги морфoлогик ва функционал етилиш жараёнлари давом этади [7, 16]. Бу даврда безнинг массаси ошади, ацинар хужайраларининг синтезловчи фаоллиги кучаяди ва эндокрин тизим қайта қурулишдан ўтади [8, 10]. Морфoлогик ва морфометрик тадқиқотларга кўра, туғруқдан кейинги дастлабки даврда ацинар аппаратининг интенсив ўсиши кузатилади, бу секретор хужайралар ҳажмининг катталаниши, донатор эндоплазматик ретикулумнинг ривожланишининг кучайиши ва цитоплазмада зимоген гранулалари сонининг кўпайиши билан бирга кечади [9, 15]. Бу жараёнлар ошқозон ости безининг тўлиқ ферментатив фаоллигининг ривожланишини ва туғилгандан кейин организмнинг овқатланишининг ўзгарувчан табиатига мосланишини акс эттиради [3, 11].

Постнатал онтогенезда ошқозон ости беи эндокрин тизимида сезиларли ўзгаришлар билан тавсифланади [2, 14]. Ҳаётнинг илк ҳафталарида ошқозон ости беи оролчалар майдони ва сон зичлиги ошади, оролча тўқимасининг қон томирлар билан таъминланиши кучаяди ва β -хужайраларнинг фаоллиги ошади [5]. Бу жараёнлар углевод алмашинувининг етарли гормонал регуляциясини ва глюкоза мувозанатини сақлашни таъминлайди [6, 12].

Бир қатор тадқиқотлар шуни кўрсатадики, ошқозон ости безининг морфометрик параметрлари ёшга қараб сезиларли даражада ўзгаради [4]. Булар безнинг нисбий массаси, ацинуслар майдони, секретор хужайраларнинг диаметри, ошқозон ости беи оролчалари майдони ва турли хил эндокрин хужайраларнинг сон зичлигидир [7, 13]. Шу билан бирга ёшга боғлиқ ўзгаришлар органнинг бириктирувчи тўқима каркасининг ремодуляцияси, интерлобуляр тўсиқ калинлигининг ўзгариши ва микроциркулятор ўзан тузилишининг ўзгариши билан бирга кечиши мумкин [8, 10].

Ошқозон ости беи морфологиясига бағишланган бир қатор тадқиқотларга қарамай, унинг таркибий қисмларининг ёшга боғлиқ динамикасининг кўплаб жиҳатлари етарлича аниқланмаганлигича қолмоқда [3, 12]. Постнатал онтогенезнинг турли давларида органнинг кенг камровли морфoлогик ва морфометрик тадқиқоти алоҳида қизиқиш уйғотади [2]. Бу эса безнинг паренхима ва строма элементларида ёшга боғлиқ ўзгаришларни аниқлашга имкон беради [5, 13].

Тадқиқот материали ва усуллари. Тадқиқот 1, 3, 9, 12, 15 ойлик оқ зотсиз каламушлар устида олиб борилди. Бунинг учун ҳар бир ёш доирасида 10 тадан каламушлардан фойдаланилди.

Тажрибада ҳайвонлар этик тамойилларга риоя қилган ҳолда жонсизлантирилди, шундан сўнг аутопсия ўтказилди. Лаборатория ҳайвонларини жонсизлантириш ва очиш пайтида барча биохавфсизлик қоидалари ва лаборатория ҳайвонлари билан ишлашнинг этик тамойилларига қатъий риоя қилинган. Лаборатория ҳайвонлари (оқ зотсиз каламушлари) билан тажриба ўтказиш Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлигининг Этика қўмитаси томонидан тасдиқланган махсус хат (21 сентябрдаги №4 4/1439 - ва 26 август 2020).

Олинган материаллар Гематоксиллин-эозин ва ван-Гизон бўёқлари ёрдамида бўялди. Тайёр материаллар микроскоп остида кўрилди ва қуйидаги параметрлар: ацинус диаметри, ацинус майдони, экзокриноцит майдони, ядро-цитоплазма майдони, бир ацинусдаги экзокриноцитлар сони, Лангерганс оролча майдони, диаметри, бир оролчадаги экзокриноцитлар сони бўйича натижалар қайд этилди.

Тадқиқот натижалари. Постнатал онтогенезнинг 1 ойлик даврида каламушлар ошқозон ости беи тўқимаси лобуляр тузилганлиги аниқланди. Экзокрин қисмида ацинуслар зич жойлашган бўлиб, ацинар хужайралар пирамидал шаклда, цитоплазмада базoфил ва апикал қисм эозинофил секретор гранулаларининг кўплиги қайд этилди; ядролар асосан базал жойлашган, хроматин майда-дона, ядрочалар яққол кўринди. Интерстициал тўқима кам ифoдаланган.

Морфометрик жиҳатдан ацинус диаметри $31,0 \pm 0,8$ мкм, ацинус майдони $950,0 \pm 40,0$ мкм² ни ташкил этди. Экзокриноцитларнинг ўртача майдони $128,0 \pm 6,0$ мкм² бўлиб, ядро майдони $20,0 \pm 1,0$ мкм², цитоплазма майдони $108,0 \pm 6,0$ мкм² ни ташкил этди. Бир ацинусда аниқланган экзокриноцитлар сони $7,1 \pm 0,2$ ни ташкил қилди. Эндокрин қисмида Лангерганс оролчалари паренхима орасида аниқ контурли ва нисбатан ихчам ўлчамли ҳолда жойлашгани аниқланди. Эндокриноцитлар зич жойлашган, цитоплазма бир хил эозинофил ҳолатда. Морфометрик таҳлилга кўра, оролчаларнинг ўртача майдони $10,5 \pm 0,4 \times 10^3$ мкм², диаметри $103,0 \pm 6,0$ мкм, оролчага тўғри келувчи экзокриноцитлар сони $85,0 \pm 3,0$ тани ташкил этди.

3 ойлик даврда беи тўқимасида морфoфункционал етилиш белгилари аниқроқ ифoдаланди. Экзокрин қисмида ацинуслар нисбатан йириклашган, ацинар хужайраларнинг секретор фаоллиги

ошгани цитоплазмада гранулаларнинг кўпайиши билан намоён бўлди. Морфометрик жиҳатдан ацинус диаметри $31,2 \pm 0,7$ мкм, ацинус майдони $960,0 \pm 35,0$ мкм² бўлиб, экзокриноцит майдони $130,0 \pm 6,0$ мкм², ядро майдони $20,2 \pm 0,8$ мкм², цитоплазма майдони $110,0 \pm 5,0$ мкм²; бир ацинусда хужайралар сони $7,2 \pm 0,2$ тани ташкил қилди. Эндокрин аппаратида ҳам ўсиш белгилари қайд этилди: Лангерганс оролчаларининг ўртача майдони $12,8 \pm 0,5 \times 10^3$ мкм² гача ошган, диаметри $113,0 \pm 7,0$ мкм га етгани, оролчага тўғри келувчи экзокриноцитлар сони $98,0 \pm 4,0$ тагача кўпайгани аниқланди. 9 ойлик даврда безда морфометрик жиҳатдан ацинус диаметри $30,0 \pm 0,7$ мкм, ацинус майдони $900,0 \pm 35,0$ мкм² ни ташкил этди. Экзокриноцитларнинг ўртача майдони $124,0 \pm 5,0$ мкм² бўлиб, шу жумладан ядро майдони $19,3 \pm 0,7$ мкм², цитоплазма $105,0 \pm 5,0$ мкм² ни ташкил этди. Бир ацинусда экзокриноцитлар сони $6,9 \pm 0,2$ та бўлди. Эндокрин қисмида Лангерганс оролчалари аниқ контурли, нисбатан йирик ўлчамли ва хужайралари зич жойлашган ҳолда сақлангани аниқланди. Морфометрик таҳлилга кўра, оролчаларнинг ўртача майдони $13,6 \pm 0,5 \times 10^3$ мкм², диаметри $118,0 \pm 7,0$ мкм, оролчага тўғри келувчи экзокриноцитлар сони $102,0 \pm 4,0$ та ни ташкил этди.

12 ойлик постнатал онтогенезда ошқозон ости безининг морфометрик жиҳатдан ацинус диаметри $29,5 \pm 0,7$ мкм, ацинус майдони $880,0 \pm 30,0$ мкм² ни ташкил этди. Экзокриноцит майдони $122,0 \pm 5,0$ мкм² бўлиб, шу жумладан ядро $19,0 \pm 0,7$ мкм², цитоплазма $103,0 \pm 5,0$ мкм² ни ташкил этди. Бир ацинусда хужайралар сони $6,8 \pm 0,2$ талиги аниқ бўлди. Эндокрин аппаратда Лангерганс оролчалари аниқ қиррали, нисбатан йирик ва хужайралари зич ҳолда жойлашгани кузатилди. Морфометрик таҳлилга кўра, оролча майдони $14,0 \pm 0,5 \times 10^3$ мкм², диаметри $120,0 \pm 7,0$ мкм, оролчага тўғри келувчи экзокриноцитлар сони $105,0 \pm 4,0$ та ни ташкил этди. Бу кўрсаткичлар 12 ойлик назорат гуруҳида эндокрин компонентнинг функционал захираси сақланганини тасдиқлайди.

15 ойлик даврда морфометрик кўрсаткичлар: ацинус диаметри $29,0 \pm 0,7$ мкм, ацинус майдони $860,0 \pm 30,0$ мкм², экзокриноцит майдони $120,0 \pm 5,0$ мкм² (ядро $18,7 \pm 0,7$ мкм², цитоплазма $101,0 \pm 5,0$ мкм²). Бир ацинусда хужайралар сони $6,7 \pm 0,2$ та бўлди. Эндокрин аппаратда оролчалар йирик ва зич хужайрали ҳолда кузатилди: оролча майдони $14,2 \pm 0,5 \times 10^3$ мкм², диаметри $122,0 \pm 7,0$ мкм, оролчага тўғри келувчи экзокриноцитлар $108,0 \pm 4,0$ та даражасида қайд этилди.

Муҳокама. Ушбу тадқиқот натижалари лаборатор оқ зотсиз каламушларда постнатал онтогенез давомида ошқозон ости безининг экзокрин ва эндокрин қисмларида кузатиладиган морфологик ҳамда морфометрик ўзгаришларнинг босқичма-босқич ривожланишини кўрсатди. Олинган маълумотлар ошқозон ости беги тўқимасининг структураси ва функционал ҳолати организм ёши ортиши билан динамик равишда ўзгариб боришини тасдиқлайди.

Тадқиқотнинг илк босқичларида, яъни 1 ойлик даврда без тўқимасида лобуляр тузилишнинг шаклланиши, ацинусларнинг зич жойлашгани ва ацинар хужайраларда секретор гранулаларнинг кўплиги қайд этилди. Бу ҳолат постнатал ривожланишнинг дастлабки даврларида экзокрин аппаратнинг фаол шаклланиш босқичида эканини кўрсатади. Бундай морфологик хусусиятлар ацинар хужайраларнинг секретор аппарати юқори даражада дифференциаллашгани ва ферментлар синтези фаол кечиши билан изоҳланади. Ушбу ҳолат бир қатор муаллифлар томонидан келтирилган маълумотлар билан уйғун бўлиб, улар постнатал онтогенезнинг илк даврларида ацинар аппаратнинг интенсив ривожланиши кузатилишини таъкидлайдилар [1,4,7].

3 ойлик даврда ацинуслар морфометрик кўрсаткичларининг нисбатан ошиши ва ацинар хужайраларда секретор гранулалар миқдорининг кўпайиши безнинг функционал етилиш жараёни давом этаётганини кўрсатади. Бу даврда экзокрин компонентнинг морфофункционал фаоллиги юқори даражада бўлиши организмнинг озиқланиш хусусиятлари ва ферментатив фаолликка бўлган физиологик эҳтиёжлари билан боғлиқ бўлиши мумкин. Мазкур натижалар постнатал ривожланиш даврида ацинар хужайраларда синтетик аппаратнинг фаоллашиши ҳақидаги маълумотлар билан мос келади [2,9]. 9 ойлик ва кейинги ёш босқичларида ацинус диаметри ва майдонининг маълум даражада камайиши кузатилди. Бу ҳолат тўқима структурасида ёшга боғлиқ морфологик қайта қурилиш жараёнлари бошланаётганини кўрсатиши мумкин. Айрим тадқиқотларда ҳам организм ёши ортиши билан ацинар хужайралар морфометрик кўрсаткичларининг маълум даражада камайиши ва строма компонентларининг нисбий улуши ортиши мумкинлиги қайд этилган [6].

Эндокрин аппаратда эса аксинча тенденция кузатилди. Лангерганс оролчалари майдони, диаметри ва оролчага тўғри келувчи экзокриноцитлар сонининг ёш ортиши билан босқичма-босқич кўпайиши қайд этилди. Бу ҳолат эндокрин тизимнинг функционал имкониятлари сақланиб қолишини ва метаболик жараёнларнинг гормонал регуляцияси барқарорлигини таъминлашга қаратилган компенсатор механизмлар мавжудлигини кўрсатиши мумкин. Шу каби морфологик ўзгаришлар эндокрин хужайралар популяциясининг қайта ташкил топиши ва функционал фаоллиги билан боғлиқлиги ҳақидаги маълумотлар билан мос келади [3,12].

Шу тариқа, олинган натижалар ошқозон ости безининг постнатал ривожланиш жараёнида экзокрин ва эндокрин компонентлар ўртасида морфофункционал мувозанатнинг шаклланиши ва кейинчалик организм ёши ортиши билан тўқима структурасида муайян қайта қурилишлар кечишини кўрсатади. Бу ҳолат органнинг морфологик ташкил этилиши динамик хусусиятга эга эканини ва у физиологик ҳолатни сақлашда муҳим аҳамият касб этишини тасдиқлайди.

Хулоса. Лаборатор оқ зотсиз каламушларда ўтказилган морфологик ва морфометрик тадқиқотлар натижалари постнатал онтогенез давомида ошқозон ости беши структурасида аниқ босқичма-босқич ўзгаришлар кечишини кўрсатди. Эрта постнатал даврларда безнинг экзокрин қисмида ацинар аппаратнинг фаол ривожланиши, секретор хужайраларнинг морфофункционал фаоллигининг ошиши ва зимоген гранулаларининг кўпайиши кузатилди. Бу ҳолат ферментатив фаолликнинг шаклланиши ва овқат ҳазм қилиш жараёнларига морфологик мослашувни акс эттиради. Постнатал онтогенезнинг кейинги босқичларида ацинусларнинг айрим морфометрик кўрсаткичларида маълум даражада камайиш қайд этилди, бу эса ёшга боғлиқ морфологик қайта тузилиш жараёнларининг бошланиши билан боғлиқ бўлиши мумкин. Шу билан бирга, эндокрин аппаратда Лангерганс оролчалари майдони ва эндокриноцитлар сонининг ёш ортиши билан босқичма-босқич кўпайиши аниқланди. Бу ҳолат эндокрин компонентнинг функционал захираси сақланиб қолишини ва организмда метаболик жараёнларнинг гормонал регуляцияси барқарорлигини таъминлашга қаратилган адаптацион механизмлар мавжудлигини кўрсатади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Акимов А.А., Крылова Н.В. Морфология поджелудочной железы млекопитающих // Морфология. – 2019. – Т.156, №4. – С.45–52.
2. Белоусов Д.А., Климов П.В. Морфофункциональная характеристика эндокринного аппарата поджелудочной железы // Журнал анатомии и гистопатологии. – 2021. – Т.10, №2. – С.23–29.
3. Бутенко Е.В., Серова О.В. Морфология островков Лангерганса при различных физиологических состояниях // Морфологические ведомости. – 2024. – Т.32, №1. – С.15–22.
4. Дьяков А.В., Никитин И.Г. Морфометрические изменения поджелудочной железы в постнатальном онтогенезе // Архив анатомии, гистологии и эмбриологии. – 2020. – Т.159, №5. – С.62–69.
5. Жукова Н.А., Кузнецова И.А. Структурная организация островков Лангерганса у лабораторных животных // Морфология. – 2019. – Т.155, №3. – С.41–47.
6. Иванова Т.В., Плотникова Е.В. Возрастные изменения поджелудочной железы экспериментальных животных // Морфологические ведомости. – 2022. – Т.30, №2. – С.89–96.
7. Климов П.В., Тарасов В.Н. Морфология ацинарного аппарата поджелудочной железы // Журнал анатомии и гистопатологии. – 2018. – Т.7, №3. – С.34–40.
8. Лебедев А.Н., Смирнова Е.А. Особенности микроциркуляторного русла поджелудочной железы // Морфология. – 2023. – Т.164, №1. – С.57–64.
9. Фролов В.М., Герасименко О.С. Морфофункциональная характеристика поджелудочной железы лабораторных животных // Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология. – 2021. – №189(5). – С.78–84.
10. Altabas V., Bulum T. Current challenges in pancreas and islet transplantation: A scoping review // Biomedicine. – 2024. – Vol.12(12). – 2853.
11. Kumar H., DeSouza S., Petrov M. Automated pancreas segmentation from computed tomography and magnetic resonance images: A systematic review // Computer Methods and Programs in Biomedicine. – 2019. – Vol.178. – P.319–328.
12. Leete P. Type 1 diabetes in the pancreas: A histological perspective // Diabetic Medicine. – 2023. – Vol.40(12). – e15228.
13. Malik S.S., Padmanabhan D., Hull-Meichle R. Pancreas and islet morphology in cystic fibrosis // Frontiers in Endocrinology. – 2023. – Vol.14. – 1269139.
14. Rickels M.R., Norris A.W., Hull R.L. A tale of two pancreases: exocrine pathology and endocrine dysfunction // Diabetologia. – 2020. – Vol.63(10). – P.2030–2039.
15. Rippa A., Posgai A.L., Currllin S. et al. 3D imaging of human pancreas suggests islet size and endocrine composition influence their loss in type 1 diabetes // Nature Communications. – 2025. – Vol.16. – 11379.

Иктибос учун: Ахтамов А., Раджабов А.Б. Каламушлар ошқозон ости безининг постнатал онтогенез давридаги морфологик параметрларининг динамик ўзгаришлари // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2026. – № 4(24). – Б. 94–97. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19439243>

ПЕРВИЧНО-ГЕНЕРАЛИЗОВАННАЯ ФОРМА ИЕРСИНИОЗОВ**Дмитровский А.М., Оспанбекова Н.К., Сейдуллаева Л.Б., Сыздыков М.С.**

Казахстанско-Российский медицинский университет, г. Алма-Ата, Казахстан

Резюме. Проблема, инфекций, обусловленных представителями рода *Yersinia* (за исключением *Yersinia pestis*) сохраняет актуальность. Цель: показать, сходство инфекций, обусловленных *Y. enterocolitica* и *Y. pseudotuberculosis*, обоснованность использования термина «иерсиниозы» и описать их «экстраинтестинальную» первично-генерализованную форму. Материалы и методы. В разработку вошло по 100 бактериологически подтвержденных случаев инфекций, *Y. enterocolitica* и *Y. pseudotuberculosis*. Результаты. Иерсиниозы в РК чаще протекают в виде генерализованной лихорадки, сопровождающейся увеличением печени и селезенки, в типичных случаях генерализованной экзантемой и полиаденопатией. Клинические различия при *Y. enterocolitica* и *Y. pseudotuberculosis* не позволяют их отличить. Выводы. Целесообразно объединить инфекции *Y. enterocolitica* и *Y. pseudotuberculosis* под термином. Иерсиниозы чаще протекают в РК в первично-генерализованной и других внекишечных формах. Заподозрить эту форму можно, когда развиваются гепатолиенальный синдром, пятнисто-папулезная экзантема и полиаденопатия.

Ключевые слова: иерсиниозы, первично генерализованная форма, клинические проявления.

PRIMARY GENERALIZED FORM OF YERSINIOSIS**Dmitrovsky A.M., Ospanbekova N.K., Seidullaeva L.B., Syzdykov M.S.**

Kazakh-Russian Medical University, Almaty, Kazakhstan

Resume. The problem of infections caused by representatives of the genus *Yersinia* (except of *Yersinia pestis*) remains relevant. Goal to show the similarity of infections caused by *Y. enterocolitica* and *Y. pseudotuberculosis*, the validity of using the term "yersinioses" and describe their "extra-intestinal" primary generalized form. Materials and methods. The development included 100 bacteriologically confirmed cases of both *Y. enterocolitica* and *Y. pseudotuberculosis* infections. Results. Yersinioses in the RK more often occurs in the form of generalized fever, accompanied by enlargement of the liver and spleen, in typical cases generalized exanthema and polyadenopathy. The clinical differences in *Y. enterocolitica* and *Y. pseudotuberculosis* do not allow them to be distinguished. Conclusions. It is advisable to combine *Y. enterocolitica* and *Y. pseudotuberculosis* infections under one term. Yersinioses is more common in the RK in primary generalized and other extra-intestinal forms. This form can be suspected, when hepatolienal syndrome, spotted papular exanthema and polyadenopathy develop.

Key words: yersinioses, primary generalized form, clinical manifestations.

ИЕРСИНИОЗЛАРНИНГ БИРЛАМЧИ-ГЕНЕРАЛИЗАЦИЯЛАШГАН ШАКЛИ**Дмитровский А.М., Оспанбекова Н.К., Сейдуллаева Л.Б., Сыздыков М.С.**

Қозғоғистон–Россия тиббиёт университети, Алма-ата ш., Қозғоғистон

Резюме. *Yersinia* туркуми вакиллари (*Yersinia pestis* бундан мустасно) томонидан чақириладиган инфекциялар муаммоси долзарблигича қолмоқда. Мақсад. *Y. enterocolitica* ва *Y. pseudotuberculosis* томонидан чақириладиган инфекцияларнинг ўхшашилигини кўрсатиши, «иерсиниозлар» атамасини қўллашнинг асослилигини ёритиши ҳамда уларнинг «экстраинтестинал» бирламчи-генерализациялашган шаклини тавсифлаш. Материаллар ва усуллар. Тадқиқотга бактериологик жиҳатдан тасдиқланган *Y. enterocolitica* ва *Y. pseudotuberculosis* инфекцияларининг ҳар бири бўйича 100 тадан ҳолат киритилди. Натижалар. Қозғоғистонда иерсиниозлар кўпинча генерализациялашган иситма кўринишида кечади, жигар ва талокнинг катталашиши, типик ҳолларда генерализациялашган экзантема ва полиаденопатия билан намоён бўлади. *Y. enterocolitica* ва *Y. pseudotuberculosis* чақирган ҳолатлар ўртасидаги клиник фарқлар уларни бир-биридан ажратиши имконини бермайди. Хулосалар. *Y. enterocolitica* ва *Y. pseudotuberculosis* инфекцияларини «иерсиниозлар» атамаси остида бирлаштириши мақсадга мувофиқ. Қозғоғистонда иерсиниозлар кўпинча бирламчи-генерализациялашган ва бошқа ичакдан ташиқари шаклларда кечади. Ушбу шаклни гепатолиенал синдром, доғли-папулёз экзантема ва полиаденопатия ривожланганда гумон қилиши мумкин.

Калим сўзлар: иерсиниозлар, бирламчи-генерализациялашган шакл, клиник намоён бўлишлар.

e-mail: am_dmitr@mail.ru

Введение. Проблема иерсиниозов, инфекций, обусловленных представителями рода *Yersinia* (за исключением *Yersinia pestis*) сохраняет свою актуальность по настоящее время, не смотря на длительное ее изучение, в том числе и нами. Еще в 80-е годы прошлого столетия мы показали, что клинические проявления инфекций, обусловленных *Y. enterocolitica* и *Y. pseudotuberculosis* клинически практически не различимы и предложили объединить их под одним термином «Иерсиниозы» [1]. Тем не менее, например в Европе иерсиниоз регистрируется отдельно, как инфекция, обусловленная *Y. enterocolitica*. В 2022 году иерсиниоз был четвертой из наиболее часто регистрируемых желудочно-кишечных инфекций в ЕС после кампилобактериоза, сальмонеллеза и кишечной палочки, продуцирующей токсин Шига (STEC). В 2022 году 27 европейских стран сообщили о 8 037 подтвержденных случаях иерсиниоза. Общий показатель заболеваемости составил 2,2 случая на 100 000 населения, что на 22,2% выше, чем в 2021 году [2].

В Казахстане разработаны и утверждены два отдельных клинических протокола [3,4], а МКБ 10 основным клиническим диагнозом, привязанным к иерсиниозам по-прежнему считает «Энтерит, вызванный *Yersinia enterocolitica*» (A04.6) на втором месте – «Экстраинтестинальный иерсиниоз» (A28.2) и на третьем – «Другие уточненные бактериальные зоонозы, не классифицированные в других рубриках» (A28.8) [5]. Клинические протоколы МЗ РК повторяют эту мягко сказать неправильную классификацию. В то же время многие авторы также считают, что иерсиниоз – это инфекционное заболевание, вызываемое бактериями рода *Yersinia* (за исключением *Y. pestis*) [6]. Однако при этом подчеркивается, что иерсиниоз – кишечная инфекция и большинство случаев иерсиниоза у людей вызывается *Y. enterocolitica*, при этом небольшое число случаев вызывается *Y. pseudotuberculosis*. В редких случаях иерсиниоз могут вызывать другие виды этого рода [6].

Между тем многие авторы также описывают при иерсиниозе не только кишечные, но и «экстраинтестинальные» проявления, такие как кожная сыпь, боли в суставах, узловатая эритема, нефрит, миокардит, а иногда сепсис, острый артрит или формы инфекции, сопровождающиеся бактериемией [7,8,9,10]. Здесь стоит вспомнить также о т.н. «Дальневосточной скарлатиноподобной лихорадке», при которой этиологическими факторами служат также иерсинии, а клинические проявления выходят за рамки кишечной инфекции [11,12]. Кроме того, в группу иерсиниозов входят также инфекции обусловленные и другими представителями рода *Yersinia* [13,14]

Подчеркивается, что *Y. enterocolitica* обнаруживается в пищеварительном тракте множества различных млекопитающих. Некоторые случаи заражения *Y. enterocolitica* у людей были связаны с домашними животными, такими как кошки или собаки. *Y. pseudotuberculosis* в основном встречается у грызунов и не часто вызывает иерсиниоз у людей [15].

В Казахстане иерсинии, как *Y. enterocolitica*, так и *Y. pseudotuberculosis* широко распространены среди диких, и особенно – сельскохозяйственных животных, так и домашних животных и грызунов, поэтому опосредованный контакт с животными и иерсиниями легко реализуется, заражение может происходить как, при употреблении контаминированной пищи или воды так и другими путями [16].

Цель исследования. Основной целью данной работы было – показать, сходство как клинических проявлений инфекций, обусловленных *Y. enterocolitica* и *Y. pseudotuberculosis*, так и их эпидемиологии, можно сказать экологических аспектов, обоснованность использования единого термина «Иерсиниозы» и преобладание в их клинических проявлениях, как раз «экстраинтестинальных» проявлений. Данная статья посвящена описанию т.н. лихорадочной или первично-генерализованной формы иерсиниозов [17,18].

Материалы и методы. В последние десятилетия мы наблюдали достаточно много больных иерсиниозами, но в данную разработку для статистической значимости включено по 100 бактериологически подтвержденных взрослых больных (с выделением культур *Y. enterocolitica* или *Y. pseudotuberculosis*). Все больные были госпитализированы в городскую клиническую больницу г. Алматы, что накладывает определенные лимитирующие ограничения: во-первых госпитализированные больные это более тяжелый контингент по сравнению с амбулаторными больными, во вторых из этой группы выпадают клинические формы, лечившиеся в терапевтических, хирургических, кожно-венерологических и других медицинских учреждениях. При этом, по нашим данным в Казахстане, кишечная форма регистрировалась только у 22 и 17% [19], пациентов с *Y. enterocolitica* и *Y. pseudotuberculosis* соответственно. Здесь и в дальнейшем первая цифра будет обозначать инфекцию, обусловленную *Y. enterocolitica*, а вторая – *Y. pseudotuberculosis*.

В то же время отмечались такие формы как острая респираторная (у 13 и 12%), ангинозная (у 5 и 7%), пневмоническая (у 8 и 7%), гепатитная (у 13 и 12%) септическая (у 3 и 6%) и редко встречающиеся в инфекционной клинике формы – менингоэнцефалитическая, пиелонефритическая, генитальная и другие (у 4 и 4%). Лихорадочная или первично-генерализованная форма имела место у 32 и

35%, соответственно. Все статистические различия по частоте развития клинических форм при инфекциях, обусловленных *Y.enterocolitica* и *Y.pseudotuberculosis* недостоверны ($P < 0,05$). Иерсинии удавалось выделить из мазков со слизистой ротоглотки, кала, мочи, крови, ликвора, соответственно наличию воспалительного процесса при той или иной клинической форме. Для подтверждения этиологического значения выделенного штамма проводилась реакция аутоагглютинации.

Всем больным также проводились общеклинические и биохимические методы обследования и инструментальные методы по показаниям.

Результаты и обсуждение. Лихорадочная или первично-генерализованная форма регистрировалась чаще других (у 32 и 35%, соответственно). При сравнении клинических проявлений, здесь и далее первая цифра соответствует инфекции, обусловленной *Y.enterocolitica*, вторая - *Y.pseudotuberculosis*. Особенностью этой формы является развитие с самого начала инфекции генерализованного процесса при отсутствии первичных или вторичных очагов. Начиналась она обычно остро (у 79 и 77% больных). Ведущим синдромом была лихорадка, которая у большинства превышала 39°C (71 и 72%) и длилась достаточно долго – до 2 недель (у 40 и 62%). Температура как правило была ремиттирующей (у 76 и 95%), после снижения часто развивался постлихорадочный субфебрилитет (у 56 и 74%), сохранявшийся более недели (у 17 и 16%).

Развивались ознобы (у 79 и 85%) и потливость (у 62 и 84%). Отмечалась достаточно выраженная интоксикация – головная боль (у всех), выраженная общая слабость вплоть до заторможенности (у трети больных). Развивалась бледность кожи (у 52 и 46%). Характерны были боли в костях, суставах, мышцах, по ходу нервов (у 69 и 67%). Дистрофические изменения в миокарде выявлены у 79 и 74%, соответственно, миокардит – у 14 и 13%. Чаще развивалась относительная брадикардия (у 69 и 44%), реже - тахикардия (у 15 и 21%). Снижение артериального давления имело место у 43 и 51%, соответственно. Характерно было увеличение печени (у 92 и 90%), печень выступала на 2-3 см ниже края реберной дуги. Фиксировалось увеличение селезенки (у 45 и 41%). Первично-генерализованная форма чаще протекала средне тяжело, но у 12 и 14% пациентов, соответственно, отмечено тяжелое течение. Возбудитель чаще выделялся из кала (у 71 и 67%), реже - из мочи (у 23 и 25%), мазка со слизистой ротоглотки (у 10 и 15%) и крови (у 8 и 10%). Иногда выделялись две культуры от одного больного (у 10 и 13%) и даже - три культуры (у 2 и 3%). Экзантема появлялась у 26 и 46 %, соответственно. Чаще она была пятнисто-папулезной (у 44 и 61%). Увеличение периферических лимфоузлов развивалось у 28 и 31%, соответственно; чаще это был полиаденит (у 20 и 26%).

Таким образом, по нашим данным, иерсинии в Казахстане чаще всего вызывают не кишечные проявления, а генерализованную лихорадочную инфекцию, для которой характерен лихорадочно-интоксикационный синдром, увеличение печени, реже – селезенки; выраженная интоксикация нервной и сердечно-сосудистой системы. В типичных случаях появляются генерализованная пятнисто-папулезная экзантема и полиаденопатия. Как правило, клинические различия при инфекциях, обусловленных *Y.enterocolitica* и *Y.pseudotuberculosis* статистические не различаются. Однако при сопоставлении всех клинических проявлений различных клинических форм используя точный метод Фишера нам удалось показать, что в целом повышение температуры, как и высокая температура (более 39°C) достоверно чаще имела место при псевдотуберкулезе (95 и 99%; $P = 0,012$ и 35 и 46%; $P = 0,032$). Экзантема также достоверно чаще появлялась при псевдотуберкулезе, также как пятнисто-папулезная сыпь (25 и 35%; $P = 0,032$ и 52 и 74%; $P = 0,015$); в то время как мелкоочечная сыпь чаще появлялась при инфекции, обусловленной *Y.enterocolitica* (13 и 3%; $P = 0,032$). Увеличение периферических лимфоузлов, и полиаденит также достоверно чаще появлялись при псевдотуберкулезе (27 и 36%; $P = 0,043$ и 19 и 28%; $P = 0,028$). Тогда как при инфекции, обусловленной *Y.enterocolitica* более выражено страдало сердце - чаще определялась глухость тонов сердца (67 и 57%; $P = 0,039$), а вот гипотония чаще развивалась при псевдотуберкулезе (41 и 54%; $P = 0,017$).

Однако ни один из приведенных признаков не может достоверно отличить одну инфекцию от другой в целом и лихорадочную или первично-генерализованную форму в частности, что подтверждает наш тезис о необходимости объединить эти инфекции под одним термином «иерсиниозы».

Выводы. Инфекции, обусловленные *Y.enterocolitica* и *Y.pseudotuberculosis* имеют одинаковые клинические и эпидемиологические проявления, невозможно провести их дифференциацию в каждом конкретном случае, что делает целесообразным объединением их под единым термином – иерсиниозы. Чаще всего в Казахстане иерсиниозы протекают в виде лихорадочной или первично-генерализованной, а также других внекишечных формах, что требует пересмотра представления о них как о кишечных инфекциях. Клинически заподозрить иерсиниозы, в частности их первично-генерализованную форму, можно, когда на фоне лихорадочно-интоксикационного синдрома появляются гепато-лиенальный синдром, экзантема, чаще пятнисто-папулезная и полиаденопатия. Для под-

тверждения диагноза необходимо использовать бактериологический метод и ПЦР, с исследованием разных образцов, включая кал, мочу, мазок со слизистой ротоглотки, кровь, ликвор и с последующим определением генотипа возбудителя. Учитывая возможность длительной персистенции иерсиний в организме человека для подтверждения этиологического факторы выделенной культуры (положительной ПЦР) желательно параллельно проводить серологическое исследование (РАА, ИФА) с определением авидности антител.

Список литературы:

1. Дмитриевская Т.И., Дмитриевский А.М. Иерсиниозы в Казахстане.- Алма-Ата, 1984.- 144 с.
2. European Centre for Disease Prevention and Control. Yersiniosis. In: ECDC. Annual Epidemiological Report for 2022. Stockholm: ECDC; 2024.
3. Клинические протоколы МЗ РК 2017 г. Клинический протокол диагностики и лечения №22. Иерсиниоз.
4. Клинические протоколы МЗ РК 2017 г. Клинический протокол диагностики и лечения №22. Псевдотуберкулез.
5. Международная классификация болезней 10-го пересмотра (МКБ-10) The International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems. 10th revision (ICD-10), 2016, 2174 стр. ISBN 978-9-241-54916-5
6. Le Guern, Anne-Sophie; Martin, Liliane; Savin, Cyril; Carniel, Elisabeth (May 2016). "Yersiniosis in France: overview and potential sources of infection". *International Journal of Infectious Diseases*. 46: 1–7.
7. Bancierz-Kisiel, Agata; Szweda, Wojciech (2015-09-04). "Yersiniosis – zoonotic foodborne disease of relevance to public health". *Annals of Agricultural and Environmental Medicine*. 22 (3): 397–402.
8. "Yersiniosis". *Medical Dictionary*. Retrieved 2013-01-28.
9. Chlebicz, Agnieszka; Śliżewska, Katarzyna (2018-04-26). "Campylobacteriosis, Salmonellosis, Yersiniosis, and Listeriosis as Zoonotic Foodborne Diseases: A Review". *International Journal of Environmental Research and Public Health*. 15 (5): 863.
10. Aziz, Muhammad; Yelamanchili, Varun S. (2025), "Yersinia Enterocolitica", *StatPearls, Treasure Island (FL): StatPearls Publishing*, PMID 29763012, retrieved 2025-11-08
11. Г. П. Сомов, В. И. Покровский, Н. Н. Беседнова / Псевдотуберкулез. М., 1990. 238 с.
12. Н. Д. Ющук, Г. Я. Ценева, Г. Н. Кареткина, Л. Е. Бродов / Иерсиниозы.– М.: Медицина, 2003. – 208 с.
13. Старостина, Н. В. Эпидемиологические и экологические особенности заболеваний, вызванных *Y. frederiksenii*, *Y. kristensenii*, *Y. intermedia* : автореф. дисс. ... канд. мед. наук. М., 2000. 21с.
14. А.М.Дмитровский, Е.А.Огай, Б.А.Абентаева, А.С. Тыныбеков, А.А. Клышев, Л.Е. Турсунмуратова, О.А. Ильиных Клинические проявления иерсиниозов (*Y. kristensenii*, *Y. frederiksenii*, *Y. intermedia*) у детей // В сб.: Инфекционные болезни.- Алматы, 2002.- С. – 43-47
15. Mekonnen Y. A Review on Yersiniosis. *World J Vet Sci*. 2024; 4(1): 1022.
16. В.М.Степанов, А.М.Дмитровский, К.С.Оспанов, В.А.Меркер, Каримова Г.А., Курмангазин М.С., Безрукова Л.С., Куклиновский И.И. Методические рекомендации по эпидемиологии, эпизоотологии, профилактике, клинике, лечению и лабораторной диагностике иерсиниозов.- Астана, 2003.- 47 с.
17. Дмитриевский А.М. Иерсиниозы (псевдотуберкулез и иерсиниоз) клинко-патогенетическая классификация // Материалы IV объединенного съезда гигиенистов, эпидемиологов, микробиологов, паразитологов и инфекционистов Казахстана. - Чимкент, 1985.- С. 146-148.
18. Дмитриевский А.М. Особенности лихорадочной формы иерсиниозов // Актуальные вопросы медицины: Материалы конференции молодых ученых-медиков г.Алма-Аты. - Алма-Ата, 1979. - С. 173-174.
19. Дмитриевский А.М. Клиническая характеристика псевдотуберкулеза и иерсиниоза : Автореф. дис. канд.- Москва, 1985.-25 с.

Для цитирования: Дмитриевский А.М., Оспанбекова Н.К., Сейдуллаева Л.Б., Сыздыков М.С. Первично-генерализованная форма иерсиниозов // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 4(24). – С. 98–101. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19449793>

ЛИХОРАДКА ЧИКУНГУНЯ: ГЛОБАЛЬНЫЙ ВЫЗОВ И РЕАЛЬНОСТЬ В РОССИИ**Соловьёва Н.П., Скляр Л.Ф., Феклисова Л.В., Ушакова А.Ю., Репина И.Б.**Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского,
г. Москва, Российская Федерация

Резюме. В статье представлен анализ современной эпидемиологической ситуации по лихорадке чикунгуны в мире и Российской Федерации. Рассматриваются вопросы распространения инвазивных видов комаров-переносчиков на территории Европы и России, анализируются завозные случаи инфекции, зарегистрированные в отечественной литературе. Особое внимание уделяется данным вирусологического мониторинга, включая изоляцию и генотипирование штаммов вируса чикунгуны от пациентов, прибывших из эндемичных регионов. Обсуждаются современные подходы к лабораторной диагностике, клинической идентификации и профилактике заболевания в условиях отсутствия специфической этиотропной терапии.

Ключевые слова: лихорадка чикунгуны, арбовирусные инфекции, завозные случаи, *Aedes albopictus*, эпидемиологический надзор, молекулярно-генетическая диагностика.

CHIKUNGUNYA FEVER: A GLOBAL CHALLENGES AND THE REALITY IN RUSSIA**Solovyova N.P., Sklyar L.F., Feklisova L.V., Ushakova A.Yu., Repina I.B.**Moscow Regional Scientific-Research Clinical Institute named after M.F. Vladimirsky,
Moscow, Russian Federation

Resume. The article presents an analysis of the current epidemiological situation of chikungunya fever in the world and the Russian Federation. The issues of the spread of invasive mosquito vector species in Europe and Russia are considered, imported cases of infection registered in the domestic literature are analyzed. Special attention is paid to virological monitoring data, including isolation and genotyping of chikungunya virus strains from patients arriving from endemic regions. Modern approaches to laboratory diagnosis, clinical identification, and prevention of the disease in the absence of specific etiotropic therapy are discussed.

Key words: chikungunya fever, arbovirus infections, imported cases, *Aedes albopictus*, epidemiological surveillance, molecular genetic diagnostics.

ЧИКУНГУНЯ ИСИТМАСИ: ГЛОБАЛ МУАММО ВА РОССИЯДАГИ ВОҚЕЛИК**Соловьёва Н.П., Скляр Л.Ф., Феклисова Л.В., Ушакова А.Ю., Репина И.Б.**М.Ф. Владимирский номидаги Москва вилоят илмий-тадқиқот клиник институти,
Москва ш., Россия Федерацияси

Резюме. Мақолада дунёда ва Россия Федерациясида чикунгуны иситмаси бўйича замонавий эпидемиологик вазиятнинг таҳлили келтирилган. Европа ва Россия ҳудудиди инвазив чивин турларининг тарқалиши масалалари кўриб чиқилган, маҳаллий адабиётларда қайд этилган инфекциянинг олиб кириш ҳолатлари таҳлил қилинган. Вирусологик мониторинг маълумотларига, жумладан, эндемик ҳудудлардан келган беморлардан чикунгуны вируси штаммларини ажратиш ва генотиплашга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Махсус этиотроп терапия мавжуд бўлмаган шароитда касалликнинг лаборатория диагностикаси, клиник идентификацияси ва олдини олишга замонавий ёндашувлар муҳокама қилинмоқда.

Калим сўзлар: чикунгуны иситмаси, арбовирусли инфекциялар, четдан келтирилган ҳолатлар, *Aedes albopictus*, эпидемиологик назорат, молекуляр-генетик диагностика.

e-mail: catdog2100@yandex.ru

Введение. Лихорадка чикунгуны (ЛЧ) – острая трансмиссивная арбовирусная инфекция, вызываемая вирусом чикунгуны семейства *Togaviridae*, рода *Alphavirus*. Заболевание характеризуется внезапным началом, высокой лихорадкой, инвалидизирующими артралгиями и экзантемой [1, 2].

Впервые возбудитель был выделен в 1953 г. во время вспышки лихорадочного заболевания в Ньювале (Танганьика, ныне Танзания), что положило начало его изучению. С тех пор вирус чикунгуны демонстрирует устойчивую тенденцию к расширению ареала, чему способствуют как биологиче-

ские свойства самого патогена (способность к адаптивным мутациям, обеспечивающим репликацию в новых видах переносчиков), так и антропогенные факторы — глобализация, изменение климата, урбанизация [1, 3].

Вспышка 2004–2007 гг. на островах Индийского океана (Коморские острова, Реюньон, Сейшельские острова) с последующим заносом в Италию в 2007 г. продемонстрировала способность вируса к внедрению в регионы с умеренным климатом. Ключевым событием, определившим современную эпидемиологию инфекции, стала мутация A226V в гене E1 белка вируса, обеспечившая эффективную репликацию патогена в комарах *Aedes albopictus* (азиатский тигровый комар). Как отмечают С.А. Рославцева с соавторами (2021 г.), именно эта адаптация позволила вирусу выйти за пределы ареала исходного переносчика *Ae. aegypti* и начать экспансию в регионы с умеренным климатом, где *Ae. albopictus* формирует устойчивые популяции [4]. Этому способствовали процессы урбанизации, изменение климата и интенсификация международных миграций.

2025 г. стал переломным с точки зрения эволюции эпидемического процесса лихорадки чикунгунья. Зарегистрирована крупнейшая в истории материкового Китая вспышка в провинции Гуандун (более 16 тыс. случаев). Продолжалась активная циркуляция вируса в гиперэндемичных регионах Южной Азии (Шри-Ланка, Индия) и Американского континента. Подтверждено возникновение автохтонных очагов в странах Южной Европы, а также зарегистрированы первые завозные случаи ЛЧ в Российской Федерации. Сложившаяся ситуация диктует необходимость всестороннего анализа для оптимизации мер профилактики и контроля.

Цель исследования: провести системный анализ глобальной эпидемиологической ситуации по ЛЧ в 2025 г., детально охарактеризовать крупнейшие вспышки в различных регионах мира, определить факторы, способствовавшие их возникновению и распространению, и оценить риски для Российской Федерации.

Материалы и методы. В работе использованы данные официальных отчётов и бюллетеней Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, Панамериканской организации здравоохранения за период 2024–2026 гг. Проведён систематический обзор научных публикаций в базах данных PubMed, Scopus, Web of Science с глубиной поиска 2013–2026 гг.

Результаты и обсуждение. Вирус чикунгунья циркулирует в тропических и субтропических регионах мира, вызывая крупные вспышки с высокими показателями поражённости населения. Основными переносчиками вируса являются комары *Aedes aegypti* и *Aedes albopictus*.

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний и Всемирной организации здравоохранения, суммарное число зарегистрированных случаев лихорадки чикунгунья в мире за 2025 г. составило 512 847, что на 18,3% выше среднееголетних показателей за предыдущие 5 лет [5, 6]. Географическое распространение охватило 45 стран на четырёх континентах. Наибольшая заболеваемость, как и в предыдущие годы, пришлась на страны Американского региона (63,1% от общего числа случаев – 323 411 случаев), однако наиболее значимым событием 2025 г. явилась качественная и количественная трансформация эпидемического процесса в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Вспышку в Китае (провинция Гуандун) можно рассматривать как модель реализации эпидемического потенциала в иммунологически наивной популяции. 8 июля 2025 г. в городе Фошань провинции Гуандун были зарегистрированы первые случаи ЛЧ с лабораторно подтверждённой автохтонной передачей. К 30 сентября кумулятивное число случаев достигло 16 452, охватив 21 город провинции [7]. Молекулярно-генетическое типирование выделенных изолятов идентифицировало генотип Восточно-Центрально-Южноафриканской линии, ранее не циркулировавший на материковой части Китая [6, 8, 9].

Ключевыми факторами, детерминировавшими столь быстрое и масштабное распространение инфекции, явились:

1. Иммунологическая наивность популяции.
2. Наличие компетентного переносчика.
3. Климатический фактор: аномально жаркое и влажное лето 2025 г.
4. Высокая плотность и мобильность населения.

Важно подчеркнуть, что, несмотря на масштаб вспышки, все зарегистрированные случаи протекали в лёгкой форме, летальность отсутствовала. Данный факт может быть объяснён отсутствием у циркулировавшего штамма мутаций, ассоциированных с повышенной вирулентностью (например, мутации A226V в гене E1), либо особенностями иммунного ответа китайской популяции [7, 10]. Однако этот вопрос требует дальнейшего изучения.

Меры реагирования, предпринятые китайскими властями, заслуживают отдельного анализа. По аналогии с антиковидной стратегией, был применён комплекс жёстких, но высокоэффективных мероприятий: массированная обработка инсектицидами мест выплода комаров (с использованием дронов и наземной техники), обязательная госпитализация всех больных в палаты, оборудованные противомоскитными сетками, экстренное развёртывание дополнительных мощностей для ПЦР-диагностики и введение режима чрезвычайной ситуации III уровня в наиболее поражённых городах [10]. Результатом стал резкий спад эпидемической кривой к концу июля 2025 г., что подтверждает эффективность раннего и агрессивного вектор-контроля.

В Южной Азии в 2025 г. наиболее напряжённая ситуация сложилась на Шри-Ланке. Согласно отчётам Эпидемиологического отдела Министерства здравоохранения Шри-Ланка, пик заболеваемости пришёлся на июнь 2025 г. Более половины всех зарегистрированных случаев (52,3%) были сконцентрированы в Западной провинции, причём на округ Коломбо пришлось 33%. Возрастная структура заболевших характеризовалась преобладанием лиц 41–60 лет (36,4%), что может быть связано с их более высокой социально-экономической активностью и, соответственно, большей экспозицией к укусам комаров [10, 11].

Принципиально важным представляется тот факт, что именно Шри-Ланка выступила источником завоза вируса чикунгунья в Российскую Федерацию. В августе 2025 г. в Московской области зарегистрированы два лабораторно подтверждённых случая ЛЧ у туристов, вернувшихся из этой страны. Данное обстоятельство подтверждает роль международного туризма как одного из ключевых драйверов трансграничного распространения арбовирусных инфекций.

Американский континент продолжает оставаться регионом с наибольшим абсолютным числом случаев лихорадки чикунгунья. По данным Панамериканской организации здравоохранения, за 2025 г. здесь зарегистрировано более 320 тыс. случаев, из которых 56% пришлось на Бразилию (штаты Мату-Гросу, Минас-Жерайс). Высокая заболеваемость также отмечена в Боливии (департамент Санта-Крус), Аргентине и Перу. Циркуляция вируса в этих странах приобрела устойчивый эндемичный характер с периодическими сезонными подъёмами [11, 12].

Европейский регион остаётся регионом, где сочетаются два типа эпидемического процесса: завозные случаи (у путешественников, возвращающихся из эндемичных стран) и автохтонная передача в районах, где присутствует устойчивая популяция *Ae. albopictus* [13]. В 2025 г. автохтонные случаи зарегистрированы во Франции (южные департаменты) и Италии (области Лацио и Калабрия). На острове Реюньон произошла крупная эпидемия с вовлечением 54 550 человек, охватившая все муниципалитеты острова. На Майотте зарегистрирован 1201 случай, и территория находилась в фазе эпидемии (уровень 3) с мая 2025 г. [14]. В остальных странах ЕС, включая Германию, страны Скандинавии и Восточной Европы, регистрировались лишь единичные завозные случаи без формирования вторичных очагов.

На территории Российской Федерации в 2025 году зарегистрированы первые официально подтвержденные завозные случаи лихорадки чикунгунья. В августе 2025 года Роспотребнадзор сообщил о пациенте, вернувшемся в Россию после 10-дневного отдыха на Шри-Ланке. Пациент был госпитализирован с подозрением на лихорадку денге, но позднее методом ПЦР у него подтвердилась лихорадка чикунгунья. Позднее выявлен второй случай у члена семьи, также отдыхавшего на Шри-Ланке. Клиническая картина у российских пациентов соответствовала классическому описанию: высокая температура (до 40°C), сыпь и сильная боль в суставах. Инкубационный период составил от 2 до 12 дней.

Роспотребнадзор в официальных сообщениях от 29 августа и 3 декабря 2025 года заявлял об отсутствии эпидемиологической опасности распространения лихорадки чикунгунья на территории Российской Федерации. Этому способствуют следующие факторы:

- отсутствие устойчивых популяций переносчиков на территории РФ, где нет устойчивых популяций комаров *Aedes aegypti*, а единичные находки *Aedes albopictus* отмечены лишь в южных регионах страны и не представляют эпидемиологической опасности;
- климатические и экологические факторы не способствуют размножению комаров-переносчиков и постоянной передаче вируса между людьми и насекомыми;
- отсутствие передачи от человека к человеку, только через укусы комаров, поэтому единичные завозные случаи не приводят к локальной циркуляции инфекции.

Вместе с тем, специалисты обращают внимание на ряд факторов, способных повлиять на ситуацию в будущем: изменение климата, рост объема контейнерных перевозок и увеличение туристических потоков, что повышает вероятность завоза инфицированных насекомых на территорию России. Согласно научным исследованиям *Ae. albopictus* продолжает экспансию на юге Европейской части

России — на территорию южного побережья Крыма и до города Тихорецк в Краснодарском крае [15]. Это создает потенциальную возможность для трансмиссии арбовирусов в случае их завоза.

Выводы. Эпидемиологическая ситуация по лихорадке чикунгунья в 2025 г. характеризовалась глобальной активизацией эпидемического процесса.

Ключевыми факторами глобальной экспансии вируса чикунгунья являются: климатические изменения (расширение ареала переносчиков), урбанизация, интенсификация международных путешествий и адаптивная эволюция вируса.

Успешный опыт сдерживания вспышки в Китае (агрессивный вектор-контроль, изоляция больных, массовое тестирование) может служить моделью для других стран, однако требует значительных административных ресурсов. Для большинства государств приоритетом должно стать предотвращение заноса инфекции и недопущение её локальной передачи.

Для Российской Федерации актуальность проблемы обусловлена ростом туристической активности россиян в эндемичных регионах (Шри-Ланка, Таиланд, Индия, Мальдивы), появлением и постепенным распространением потенциальных переносчиков (*Ae. albopictus*) на юге страны, а также регистрацией завозных случаев инфекции в 2025 году.

В настоящее время, по официальным данным Роспотребнадзора, эпидемиологическая опасность распространения лихорадки чикунгунья в России не существует благодаря отсутствию устойчивых популяций комаров-переносчиков. Однако с учетом глобального потепления, расширения ареала *Ae. albopictus* и интенсификации международных перевозок необходим постоянный мониторинг ситуации и готовность к возможным изменениям.

Список литературы:

1. Weaver S. C., Lecuit M. Chikungunya virus and the global spread of a mosquito-borne disease // *New England Journal of Medicine*. – 2015. – Vol. 372, № 13. – P. 1231-1239.
2. Burt F. J. et al. Chikungunya virus: an update on the biology and pathogenesis of this emerging pathogen // *The Lancet Infectious Diseases*. – 2017. – Vol. 17, № 4. – P. e107-e117.
3. Щелканов М. Ю. и др. Изоляция вируса Чикунгунья в Москве от приезжего из Индонезии (сентябрь 2013 г.) // *Вопросы вирусологии*. – 2014. – Т. 59. – № 3. – С. 28-34.
4. Рославцева С. А., Фролова А. И., Алексеев М. А. Вновь о распространении инвазивных видов комаров в Европе и России // *Дезинфекционное дело*. – 2021. – № 2. – С. 36-43.
5. Staples J.E., Hills S.L., Fischer M. Chikungunya virus disease. In: *CDC Yellow Book 2026: Health Information for International Travel*. Oxford University Press; 2025: P. 245-251.
6. Morrison T. E. Reemergence of chikungunya virus // *Journal of Virology*. – 2014. – Vol. 88, № 20. – P. 11644-11647.
7. Li Y. et al. An outbreak of chikungunya fever in China-foshan city, guangdong province, China, july 2025 // *China CDC Wkly*. – 2025. – Vol. 7, № 32. – P. 1064-1065.
8. Gong W. et al. Outbreak of Chikungunya Virus with *Aedes albopictus*-Adaptive Mutations—Guangdong Province, China, 2025 // *China CDC Weekly*. – 2025. – Vol. 7, № 49. – P. 1528.
9. Sun C. et al. Isolation and genomic characterization of Chikungunya virus during the 2025 outbreak in Foshan, China // *Emerging Microbes & Infections*. – 2025. – Vol. 14, № 1. – P. 2595790.
10. European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Chikungunya virus disease – Annual Epidemiological Report for 2025. Stockholm: ECDC; 2025.
11. Pan American Health Organization. Epidemiological Update: Chikungunya in the Americas – 31 December 2025. Washington, D.C.: PAHO/WHO; 2025.
12. Epidemiology Unit, Ministry of Health, Sri Lanka. Weekly Epidemiological Report: Chikungunya update – 2025. Colombo; 2025;46(26-27).
13. Fournier L. et al. Multiple early local transmissions of chikungunya virus, Mainland France, from May 2025 // *Eurosurveillance*. – 2025. – Vol. 30. – № 32. – P. 2500545.
14. World Health Organization. Global Health Observatory data: Chikungunya [Internet]. Geneva: WHO; 2026 [cited 2026 Feb 24]. Available from: <https://www.who.int/data/gho>.
15. Альховский С. В. и др. Метагеномный анализ виroma комаров *Aedes (stegomyia) albopictus* skus. Черноморского побережья Кавказа // *Медицинская паразитология и паразитарные болезни*. – 2024. – № 3. – С. 3-9.

Для цитирования: Соловьёва Н.П., Склад Л.Ф., Феклисова Л.В., Ушакова А.Ю., Репина И.Б. Лихорадка чикунгунья: глобальный вызов и реальность в России // *Вестник фундаментальной и клинической медицины*. – 2026. – № 4(24). – С. 102–105. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19449781>

ОСОБЕННОСТИ ВАГИНАЛЬНОЙ МИКРОБИОТЫ ПРИ ВПЧ-АССОЦИИРОВАННОЙ И ВПЧ-НЕЗАВИСИМОЙ ЦЕРВИКАЛЬНОЙ ДИСПЛАЗИИ

Логинова О.П.¹, Шевченко Н.И.¹, Гасич Е.Л.², Воропаева А.В.¹

¹ГУ «Республиканский научно-практический центр радиационной медицины и экологии человека», г. Гомель, Республика Беларусь

²ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья», г. Минск, Республика Беларусь

Резюме. Целью исследования явилось - изучить особенности вагинальной микробиоты при ВПЧ-ассоциированной и ВПЧ-независимой цервикальной дисплазии. В исследование включены 102 женщины репродуктивного возраста Гомельской области. Установлены значимые различия в качественном и количественном составе резидентной микробиоты влагалищного биотопа при ВПЧ-ассоциированной и ВПЧ-независимой дисплазиях шейки матки у женщин репродуктивного возраста. Выявлено увеличение количества условно-патогенных микроорганизмов, снижение числа лактобактерий, изменение их видового состава при цервикальной дисплазии, а также повышение уровня pH влагалищного отделяемого.

Ключевые слова: цервикальная дисплазия, вирус папилломы человека, микробиота влагалища

FEATURES OF VAGINAL MICROBIOTA IN HPV-ASSOCIATED AND HPV-INDEPENDENT CERVICAL DYSPLASIA

Lohinava V.P.¹, Shevchenko N.I.¹, Gasich E.L.², Voropayeva A.V.¹

¹State Institution "Republican Research Center for Radiation Medicine and Human Ecology", Gomel, Republic of Belarus

²State Institution "Republican Center for Hygiene, Epidemiology, and Public Health", Minsk, Republic of Belarus

Resume. The aim of the study was to investigate the characteristics of vaginal microbiota in HPV-associated and HPV-independent cervical dysplasia. The study included 102 women of reproductive age in the Gomel region. Significant differences in the qualitative and quantitative composition of the resident vaginal microbiota were identified in women with HPV-associated and HPV-independent cervical dysplasia. An increase in the number of opportunistic microorganisms, a decrease in the number of lactobacilli, a change in their species composition in cervical dysplasia, and an increase in the pH level of vaginal discharge were detected.

Key words: cervical dysplasia, human papillomavirus, vaginal microbiota, women of reproductive age

ОПВГА БОҒЛИҚ ВА БОҒЛИҚ БЎЛМАГАН ЦЕРВИКАЛ ДИСПАЗИЯДА ҚИН МИКРОБИОТАСИНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ

Логинова О.П.¹, Шевченко Н.И.¹, Гасич Е.Л.², Воропаева А.В.¹

¹"Республика радиацион тиббиёт ва инсон экологияси илмий-амалий маркази" ДМ, Гомел ш., Беларус Республикаси

²"Республика гигиена, эпидемиология ва жамоат саломатлиги маркази" давлат муассасаси, Минск ш., Беларус Республикаси

Резюме. Тадқиқотнинг мақсади ОПВ билан боғлиқ ва ОПВга боғлиқ бўлмаган бачадон бўйни дисплазиясида қин микробиотасининг хусусиятларини ўрганишдан иборат. Тадқиқотга Гомел вилоятидан 102 нафар репродуктив ёшдаги аёллар жалб қилинган. Репродуктив ёшдаги аёлларда ОПВ билан боғлиқ ва ОПВга боғлиқ бўлмаган бачадон бўйни дисплазияларида қин биотопининг резидент микробиотасининг сифат ва миқдорий таркибида сезиларли фарқлар аниқланди. Цервикал дисплазияда шартли патоген микроорганизмлар сонининг ортиши, лактобактериялар сонининг камайиши, уларнинг тур таркибининг ўзгариши, шунингдек, қин ажралмасининг pH даражасининг ошиши аниқланди.

Калит сўзлар: бачадон бўйни дисплазияси, одам папиллома вируси, қин микробиотаси

e-mail: loginovaolga81@mail.ru, shevchenkoni@bk.ru,
elena.gasich@gmail.com, allo4ka3665@mail.ru

Введение. Рак шейки матки (РШМ) является одной из важных проблем современного здравоохранения в мире. Проблема РШМ остается актуальной и для нашей страны. В последние годы у женщин репродуктивного возраста, особенно проживающих в сельской местности, в Республике Беларусь отмечается тенденция роста заболеваемости раком шейки матки. Стандартизованный показатель заболеваемости РШМ в 2022 по всем регионам страны составил 10,8 (10–11,7)‰, в Гомельской области – 11,1 (9,1–13,9)‰ [1].

Цервикальная интраэпителиальная дисплазия (ЦИН) является предопухолевой патологией и занимает пограничное состояние между нормальным эпителием и развитием РШМ [2]. В публикациях последних лет имеются данные об изменении состава микробиоты влагалищного биотопа у женщин с предопухолевой патологией шейки матки (ШМ). Так, в исследовании М. А. Molina и соавт. установили, что женщины со сниженным количеством *Lactobacillus spp.* в микробном сообществе имели более высокий риск развития ЦИН [3]. В мета-анализе, проведенном J Nørgaard с соавт., описаны недавние исследования, результаты которых предположили связь между составом вагинальной микробиоты, ВПЧ-инфекцией и прогрессированием дисплазии ШМ в РШМ [4]. В норме лактобактерии выполняют защитную функцию, т.е. создают колонизационную резистентность на слизистых влагалища и препятствуют проникновению как бактериальных патогенов, так и вирусов, в том числе и вируса папилломы человека (ВПЧ) высокого канцерогенного риска (ВКР) [5]. Вклад лактобацилл в поддержание колонизационной резистентности влагалища и репродуктивного здоровья в настоящее время признается всеми исследователями и практикующими врачами. Несмотря на очевидную связь, это направление остается недостаточно изученным, так как состав микробиома крайне вариативен и ученым еще предстоит определить конкретные бактериальные сигнатуры, которые могли бы стать маркерами раннего прогнозирования РШМ.

Цель исследования: изучить особенности вагинальной микробиоты при ВПЧ-ассоциированной и ВПЧ-независимой цервикальной дисплазии.

Материалы и методы. Объектом исследования явились 102 женщины репродуктивного возраста 18–49 лет (Гомельской области). Женщины были разделены на группы: 1-я группа (n=54) – женщины с цервикальной дисплазией различной степени тяжести (из них 39 женщины, у которых ДНК ВПЧ ВКР не выявлена (ВПЧ «-»)) и 15 женщин – ДНК ВПЧ ВКР была выявлена (ВПЧ «+»)); 2-я группа сравнения (n=48) – женщины с нормоцитогаммой (39 – у которых ДНК ВПЧ ВКР не выявлена (ВПЧ «-»)) и 9 женщин – ДНК ВПЧ ВКР была выявлена (ВПЧ «+»)). Все женщины не были вакцинированы против ВПЧ. У всех участниц исследования было получено письменное добровольное информированное согласие на участие в исследовании. Материалом послужили мазки из заднего свода влагалища. Выполнено микробиологическое исследование отделяемого влагалища (жидкостный полоуктоколичественный посев). Производился посев на среду MRS-агар для лактобактерий и использовался набор дифференциально-диагностических сред для других условно-патогенных микроорганизмов (УПМ). Лактобактерии культивировали в анаэробных условиях 48–72 часа. Затем проводили качественную и количественную оценку выросших микроорганизмов. Идентификация до вида проводилась с использованием микробиологических анализаторов Vitek2Compact, miniApi (Biomérieux). Идентификацию лактобацилл выполняли на картах ANA и стрипах api50CH, а также с применением системы для масс-спектрометрического анализа «АЛМАСС Био 200» (АльгимедТехно, РФ). Контроль качества идентификации проводился с применением контрольного штамма ATCC *Lactobacillus acidophilus* 4356. При получении роста лактобактерий 10^7 – 10^8 КОЕ/мл результат расценивался как нормоценоз, а количество УПМ не более 10^5 КОЕ/мл, лактобактерии 10^5 – 10^6 КОЕ/мл и количество УПМ более 10^5 КОЕ/мл – умеренный дисбиоз, лактобактерии $<10^5$ КОЕ/мл – выраженный дисбиоз. Измерение pH влагалищного отделяемого проводили с помощью бумажных тестовых полосок с определением уровня pH на основании изменения цвета.

Исследования выполнены в рамках финансируемого проекта БРФФИ «Изучить функциональные особенности резидентной микробиоты влагалища при различной степени тяжести предопухолевых поражений шейки матки у ВПЧ-полоитивных женщин репродуктивного возраста Гомельской области» № гос. регистрации: 20221047 от 04.07.2022.

Количественные показатели исследования представлены медианой и квартилями - Me [Q25; Q75]. Сравнение количественных показателей проводилось с помощью критерия Манна-Уитни. Качественные показатели представлены частотами и процентами в группах. При исследовании таблиц сопряженности использовался критерий χ^2 Пирсона, в случае нарушения предположений, лежащих в основе критерия χ^2 , использовался точный критерий Фишера. Все расчеты проводились в статистическом пакете R, версия 4.1 (R Core Team (2023)) . Статистически значимыми считали различия при $p < 0,05$.

Результаты и обсуждение. По результатам выполненного микробиологического исследования рост лактобактерий получен у всех женщин группы сравнения (n=48 штаммов) и у 18 (33,3%) женщин с дисплазией ШМ. Нами установлено, что при дисплазии ШМ значимо чаще встречался дисбиоз влагалища, который был выявлен в 47 (87,0%) образцах ($p<0,05$). При этом выраженный дисбиоз в группе с дисплазией установлен в 40 (74,0%) случаях, умеренный в 7 (13,0%) образцах. У женщин с нормоцитогаммой количество лактобактерий находилось в пределах нормы у 37 (77,1%) женщин, в 11 (22,9%) случаях отмечен умеренный дисбиоз (рисунок 1). В исследовании S. Lin с соавт. [5] получены схожие результаты. Авторы отмечают повышенное микробное разнообразие и уменьшение количества *Lactobacillus spp.* у пациентов с дисплазией ШМ.




Рисунок 1 – Частота встречаемости различных состояний микробиоты влагалища в группах с дисплазией и нормоцитогаммой

В группе с дисплазией ШМ помимо снижения количества лактобактерий, выделены различные УПМ в количестве, превышающем 10^5 КОЕ/мл (*S. agalactiae*, *E. faecalis*, *E. coli*, *S. haemolyticus*, *C. albicans* и другие). С наибольшей частотой встречались *E. faecalis* – 35,2 % (n=19), *E. coli* – 29,6 % (n=19), *S. haemolyticus* – 12,9 % (n=7), *S. aureus* – 5,6 % (n=3), *S. agalactiae* – 1,9 % (n=1), *K. pneumoniae* – 1,9 % (n=1), *S. hominis* – 1,9 % (n=1). В шести образцах получен рост *Candida spp.*: *C. albicans* – 9,3 % (n=5), *C. glabrata* выявлена в одном случае. Наличие УПМ в отделяемом влагалища более 10^5 КОЕ/мл приводит к развитию воспаления, которое усугубляется еще и выраженным дисбиозом влагалища. При переходе воспаления в хроническую форму нарушаются процессы репаративной регенерации, что влечёт за собой процесс малигнизации. При дисбиозе цервикального микробиоты, воспалительных процессах слизистой влагалища и шейки матки ВПЧ не элиминируется и переходит в интегративную форму, что способствует развитию предопухолевой патологии.

В группе с нормоцитогаммой по результатам микробиологического исследования микробиоты влагалища рост УПМ был отмечен в 16 (33,3 %) клинических образцах, но количество их не превышало 10^5 КОЕ/мл, т.е. соответствовало критериям нормоценоза. *C. albicans* выделены в 4 (8,3 %) случаях в количестве 10^3 КОЕ/мл. *C. albicans* в норме могут присутствовать в отделяемом влагалища в количестве до 10^4 КОЕ/мл. Поэтому в группе женщин с нормоцитогаммой состояние микробиоты влагалища соответствовало критериям нормоценоза у всех женщин.

Результаты видовой идентификации лактобацилл не выявили статистически значимых различий в разнообразии конкретных видов между исследуемыми группами (таблица 1). Однако их удельный вес в каждой из групп отличался. Так, в группе ВПЧ-позитивных женщин чаще изолировали *L. paracasei* и *L. gasseri*, а в группе ВПЧ-негативных женщин, лидирующими оказались *L. crispatus* и *L. gasseri*.

Видовое разнообразие лактобактерий в группах с дисплазией и нормоцитогаммой представлено в таблице 2. В группе с нормоцитогаммой выявлено преобладание трех видов лактобацилл: *L. crispatus* (33,3 %), *L. gasseri* (18,8%), *L. paracasei* (16,7%). По данным Т.Ю. Пестриковой с соавт. [6], у клинически и лабораторно здоровых женщин микробиоты влагалища представлен преимущественно *L. crispatus*. Этот вид лактобактерий в наибольшей степени участвует в поддержании постоянства микробиоты влагалища. В группе с дисплазией ШМ чаще встречались *L. gasseri* (38,8%), *L. plantarum* (16,7%) и *L. acidophilus* (16,7%), при этом *L. crispatus* выделен лишь из одного клинического образца. Преобладающие в группе с дисплазией *L. gasseri* относятся к лактобациллам с более

слабыми функциональными особенностями, *L. plantarum* – не продуцируют перекись водорода. Выделение таких видов лактобактерий с наибольшей частотой и объясняет изменение pH влагалищного отделяемого в группе с дисплазией ШМ.

Таблица 1.

Распределение видов лактобацилл в ВПЧ-положительной и ВПЧ-отрицательной группах женщин

Вид лактобактерий	ВПЧ «+» n=14	ВПЧ «-» n=52	p
	n, %		
<i>L. acidophilus</i>	0	6 (11,5)	>0,99
<i>L. crispatus</i>	0	15 (28,8)	0,224
<i>L. delbruckii</i>	0	1 (1,9)	>0,99
<i>L. fermentum</i>	0	2 (3,8)	>0,99
<i>L. gasseri</i>	4 (28,6)	13 (25,0)	>0,99
<i>L. hilgardii</i>	1 (7,1)	0	>0,99
<i>L. paracasei</i>	7 (50,0)	4 (7,7)	0,008
<i>L. plantarum</i>	1 (7,1)	10 (19,2)	>0,99
<i>L. rhamnosus</i>	1 (7,1)	1 (1,9)	>0,99

Примечание. ВПЧ «+» – обнаружена ДНК вируса папилломы человека; ВПЧ «-» – ДНК вируса папилломы человека не обнаружена методом ПЦР

Таблица 2.

Видовая структура лактобактерий в группах женщин с дисплазией ШМ и при нормоцитограмме

Вид лактобактерий	Нормоцитограмма	Дисплазия	p
	n, %		
<i>L. crispatus</i>	16 (33,3)	1 (5,6)	0,002
<i>L. gasseri</i>	9 (18,8)	7 (38,8)	
<i>L. paracasei</i>	8 (16,7)	2 (11)	
<i>L. plantarum</i>	4 (8,3)	3 (16,7)	
<i>L. acidophilus</i>	7 (14,5)	3 (16,7)	
<i>L. rhamnosus</i>	2 (4,2)	0	
<i>L. fermentum</i>	1 (2,1)	1 (5,6)	
<i>L. hilgardii</i>	1 (2,1)	0	
<i>L. delbruckii</i>	0	1 (5,6)	
Всего	48	18	

Оценив наличие роста лактобактерий при различной степени дисплазии ШМ, установлено, что при дисплазии высокой степени рост лактобактерий отсутствовал во всех клинических образцах, при LSIL лактобациллы получены в 30,3% (n=10) случаев, а при ASC-US – в 40,0 % (n=6) (таблица 3). Следовательно, при диспластических поражениях ШМ состав микробиоценоза влагалища претерпевает изменения. Выявлена тенденция снижения количества лактобактерий с увеличением степени тяжести цервикальной дисплазии, т.е. чем тяжелее степень поражения ШМ, тем более выражены изменения резидентной микробиоты влагалищного биотопа.

Известно, что основным этиологическим фактором развития дисплазии ШМ является ВПЧ ВКР. В публикациях последних лет рассматриваются вопросы изменения микробиоценоза влагалища при ВПЧ-ассоциированных дисплазиях ШМ. Результаты нашего исследования показали, что цервикальная дисплазия ассоциирована со снижением количества влагалищных лактобактерий. Так, при оценке наличия лактобактерий в группах ВПЧ «+» /дисплазия и ВПЧ «+» /NILM, установлено, что при ВПЧ-ассоциированной дисплазии значительно чаще отсутствовали лактобактерии в исследуемых образцах – в 76,7% (n=10) (таблица 4). В группе ВПЧ «-» /дисплазия в 65,8% (n=25) случаев отсутствовал рост лактобактерий.

Таблица 3.

Частота выявления роста лактобактерий в исследуемых группах женщин

Наличие роста	HSIL (n=6)	LSIL (n=33)	ASC-US (n=15)	NILM (n=48)
	n, %			
<i>Lactobacillus</i> «+»	0	10 (30,3)	6 (40)	48 (100)
<i>Lactobacillus</i> «-»	6 (100)	23 (69,7)	9 (60)	0

Примечание. *Lactobacillus* «+» – получен рост лактобактерий, *Lactobacillus* «-» – роста лактобактерий не получено; HSIL – интраэпителиальные изменения высокой степени, LSIL – интраэпителиальные изменения низкой степени, ASC-US – атипичные клетки плоского эпителия неясного значения, NILM – интраэпителиальные изменения и злокачественные процессы отсутствуют.

Таблица 4.

Частота выделения лактобактерий в группах у ВПЧ-положительных/ВПЧ-отрицательных женщин

Группа	<i>Lactobacillus</i> «+»	<i>Lactobacillus</i> «-»	Всего	p
	n, %			
ВПЧ «+» /Дисплазия	5 (33,3)	10 (76,7)	15	0,001
ВПЧ «+» /NILM	9 (100)	0	9	
ВПЧ «-» /Дисплазия	13 (34,2)	25 (65,8)	38	<0,05
ВПЧ «-» /NILM	39 (100)	0	39	

Примечание. ВПЧ «+» – обнаружена ДНК вируса папилломы человека, ВПЧ «-» – не обнаружена ДНК вируса папилломы человека; *Lactobacillus* «+» – получен рост лактобактерий, *Lactobacillus* «-» – роста лактобактерий не получено, NILM – отсутствие изменений в цитологическом мазке из цервикального канала (нормоцитограмма)

Далее нам было интересно посмотреть есть ли различия в составе микробиоты у женщин при ВПЧ-ассоциированной и ВПЧ-независимой цервикальной дисплазии в сравнении с женщинами с нормоцитограммой.

Из 15 женщин с ВПЧ-ассоциированной цервикальной дисплазией получен рост лактобактерий только в 5 (33,3%) образцах, в 10 (66,7) образцах лактобактерии отсутствовали (таблица 5). Причем, только в 3 (20,0%) случаях количество лактобактерий находилось в пределах нормы и соответствовало критериям нормоценоза. Отмечено, что ВПЧ-ассоциированная дисплазия ШМ в 80,0% случаев была связана с дисбиозом влагалища.

Таблица 5.

Результаты оценки состояния микробиоценоза влагалища в ВПЧ-позитивных группах

Показатель	Дисплазия/ ВПЧ «+» n=15	Нормоцитограмма/ ВПЧ «+» n=9	p
рН	5,0 [4,2; 6,0]	4,0 [4,0; 4,0]	0,034
Нормоценоз	3 (20,0)	7 (77,8)	0,002
Умеренный дисбиоз	1 (6,7)	2 (22,2)	
Выраженный дисбиоз	11 (73,3)	0	

Примечание. ВПЧ «+» – обнаружена ДНК вируса папилломы человека

При ВПЧ-независимой цервикальной дисплазии рост лактобактерий получен в 13 (33,3%) клинических образцах, а в 26 (66,7%) роста лактобактерий не было получено, что соответствовало критериям выраженного дисбиоза. Соответственно, при ВПЧ-независимой цервикальной дисплазии дисбиоз отмечался с высокой частотой – 87,2% (n=34) (таблица 6).

Важно отметить, что при снижении количества лактобактерий в отделяемом влагалища происходило изменение рН среды влагалищного секрета. В группе с дисплазией ШМ уровень рН составил $5,31 \pm 1,97$ и был повышен по отношению к нормальным значениям (3,7–4,5). В группе сравнения величина рН находилась на уровне $4,17 \pm 0,43$, что соответствовало нормальным значениям. Различия

pH в группах были значимыми ($p=0,0001$). Такая же тенденция отмечена и при ВПЧ-ассоциированной и ВПЧ-независимой дисплазиях ШМ, в частности. Уровень pH влагалищного отделяемого был значимо повышен в этих группах в отличие от групп с нормоцитогаммой и составил при ВПЧ-ассоциированной дисплазии – 5,0 [4,2; 6,0] ($p=0,034$), при ВПЧ-независимой – 5,0 [4,0; 6,0] ($p=0,001$). Следовательно, на фоне дисбиоза влагалища в группе с дисплазией ШМ происходило снижение количества лактобактерий, что приводило к изменению кислотности влагалищного отделяемого.

Таблица 6.

Результаты оценки состояния микробиоценоза влагалища в ВПЧ-негативных группах

Состояние микробиоценоза	Дисплазия/ВПЧ «-» n=39	Нормоцитограмма/ВПЧ «-» n=39	p
	n (%)		
pH	5,0 [4,0; 6,0]	4,0 [4,0; 4,0]	0,001
Нормоценоз	5 (12,8)	27 (69,2)	<0,001
Умеренный дисбиоз	8 (20,5)	12 (30,8)	
Выраженный дисбиоз	26 (66,7)	0	

Примечание. ВПЧ «-» - ДНК вируса папилломы человека не обнаружена методом ПЦР

В итоге выявлено значимое снижение числа лактобактерий в группах женщин как при ВПЧ-ассоциированной, так и ВПЧ-независимой дисплазии шейки матки, т.е. можно предположить, что изменения резидентной микробиоты влагалища являются предрасполагающим или ко-фактором развития цервикальной дисплазии. Нарушение баланса *Lactobacillus spp.* в микробиоте снижает обмен аминокислот и гликогена, ускоряет метаболизм гликохенодезоксихолата и карнитина, увеличивает продукцию липидов, что приводит к изменению pH влагалища и стимуляции цитокин-индуцированного воспаления в слизистой оболочке, его хронизации, что в свою очередь способствует повреждению эпителия ШМ [7, 8]. Поврежденный эпителий ШМ становится уязвим для различных бактериальных и вирусных патогенов, в том числе и для ВПЧ ВКР. Хроническое воспаление способствует длительной персистенции ВПЧ и может приводить к развитию предопухолевой патологии и рака шейки матки.

Заключение. Таким образом, по результатам проведенных исследований, установлены значимые различия в качественном и количественном составе резидентной микробиоты влагалищного биотопа при ВПЧ-ассоциированной и ВПЧ-независимой дисплазиях ШМ у женщин репродуктивного возраста в отличие от женщин без патологии ШМ. Выявлено повышение количества УПМ, снижение числа лактобактерий, изменение их видового состава при цервикальной дисплазии. Результаты исследования вагинального микробиоценоза обследованных пациенток свидетельствуют о том, что в группе с дисплазией ШМ преобладали *L. gasseri*, *L. plantarum*, *L. acidophilus*, а в группе с нормоцитогаммой – *L. crispatus*, *L. gasseri*, *L. paracasei*. Отмечена высокая частота дисбиоза влагалища (87,0%) и повышение pH влагалищного отделяемого в группе женщин с дисплазией ШМ ($5,31 \pm 1,97$).

Резидентная микробиота влагалища является одним из основных факторов в репродуктивном здоровье женщины и оказывает влияние на развитие различных заболеваний. Преобладание *L. crispatus* во влагалище обеспечивает защиту эпителиального барьера, подавляет рост патогенных микроорганизмов и снижает риск персистенции ВПЧ. Напротив, дисбиоз влагалища, характеризующийся снижением числа лактобактерий, ассоциируется с повышенным риском развития воспалительных процессов, инфицированием и длительной персистенцией ВПЧ ВКР, что приводит к опухолевой трансформации эпителия ШМ и запускает механизмы канцерогенеза. Изучение состава вагинального микробиоценоза может быть рекомендовано в качестве одного из маркеров развития как ВПЧ-ассоциированной, так и ВПЧ-независимой цервикальной дисплазии.

Список литературы:

1. Логинова О.П., Шевченко Н.И., Вейкин И.В. Гасич Е.Л. Эпидемиологические аспекты распространенности рака шейки матки в Гомельской области // Здоровье и окружающая среда, 2024; 34: 340–346.
2. Смирнова, Т. А. Современные аспекты дисплазии шейки матки / Т. А. Смирнова, А. Э. Пиланович // Медицинский журнал, 2021; 4: 31–37. <https://doi.org/10.51922/1818-426X.2021.4.31>
3. Temporal composition of the cervicovaginal microbiome associates with hrHPV infection

outcomes in a longitudinal study/ M.A. Molina [et al.] // BMC Infect Dis, 2024; 24(1):552. doi: 10.1186/s12879-024-09455-1.

4. The vaginal microbiota, human papilloma-virus and cervical dysplasia: a systematic review and network meta-analysis/ J. Norenhag [et al.] // BJOG, 2020; 127(2): 171–180. doi: 10.1111/1471-0528.15854.

5. Dysbiosis of Cervical and Vaginal Microbiota Associated with Cervical Intraepithelial Neoplasia / S. Lin [et al.] // Front Cell Infect Microbiol, 2022; 14(12): 767693. doi: 10.3389/fcimb.2022.767693.

6. Пестрикова, Т.Ю., Котельникова, А.В. Видовой состав вагинальной лактофлоры у женщин с заболеваниями влагалища и шейки матки / Т.Ю. Пестрикова, А.В. Котельникова // Женское

здоровье и репродукция: сетевое издание, 2021; 2 (49). URL: <http://whfordoctors.su/statyi/vidovoj-sostav-vaginalnoj-laktoflory-u-zhenshhin-s-patologiej-vlagalishha-i-shejki-matki/> (дата обращения: 18.02.2026).

7. Deciphering the complex interplay between microbiota, HPV, inflammation and cancer through cervicovaginal metabolic profiling/ Z.E. Ilhan [et al.] // EBioMedicine, 2019; 44: 675–90. doi:10.1016/j.ebiom.2019.04.028.

8. The Complex Interplay between Vaginal Microbiota, HPV Infection, and Immunological Microenvironment in Cervical Intraepithelial Neoplasia: A Literature Review / B. Gardella, M. F. Pasquali, M. La Verde [et al.] // Int J Mol Sci, 2022; 23(13) e7174: 1–16. <https://doi.org/10.3390/ijms23137174>

Для цитирования: Логинова О.П., Шевченко Н.И., Гасич Е.Л., Воропаева А.В. Особенности вагинальной микробиоты при впч-ассоциированной и впч-независимой цервикальной дисплазии // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 4(24). – С. 106–112. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19449940>

ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ КАК УГРОЗА ПРОШЛОГО И ВЫЗОВЫ НАСТОЯЩЕГО**Алекешева Л.Ж.¹, Юсупов Ш.Р.², Матназарова Г.С.³**¹Казахский Национальный медицинский Университет имени С.Д.Асфендиярова,
г. Алма-Ата, Казахстан²Ургенчский государственный медицинский институт, г. Ургенч, Узбекистан³Ташкентский государственный медицинский университет, г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. В статье приведена информация об эпидемической ситуации по инфекционным болезням, вызовам сегодняшнего времени и возможностям профилактических решений по снижению риска инфицирования инфекционными патогенами, включая иммунизацию и значение коллективного иммунитета в сдерживании развития эпидемического процесса вакциноуправляемых и вакциноконтролируемых инфекций. Приведено описание некоторых факторов, влияющих на ход эпидемического процесса инфекционных и паразитарных болезней, а также возможностях концепции «One health» в надзоре за зоонозными инфекциями и инвазиями.

Ключевые слова: инфекционные болезни, прионные болезни, эпидемический процесс, коллективный иммунитет, концепция «One health», профилактика.

INFECTIOUS DISEASES AS A THREAT TO THE PAST AND CHALLENGES TO THE PRESENT**Alekeshova L.Zh.¹, Yusupov Sh.R.², Matnazarova G.S.³**¹S.D.Asfendiyarov Kazakh National Medical University, Almaty, Kazakhstan²Urgench State Medical Institute, Urgench, Uzbekistan³Tashkent State Medical University, Tashkent, Uzbekistan

Resume. The article provides information on the epidemiological situation regarding infectious diseases, current challenges, and the possibilities of preventive solutions to reduce the risk of infection by infectious pathogens, including immunization, and the importance of collective immunity in restraining the development of the epidemic process of vaccine-controlled and vaccine-controlled infections. Some factors influencing the course of the epidemic process of infectious and parasitic diseases, as well as the possibilities of the "One health" concept in the supervision of zoonotic infections and invasions, are described.

Keywords: infectious diseases, prionic diseases, epidemic diseases

**ЮҚУМЛИ КАСАЛЛИКЛАР ЎТМИШ ХАВФИ ВА ҲОЗИРГИ ЗАМОН МУАММОСИ
СИФАТИДА****Алекешева Л.Ж.¹, Юсупов Ш.Р.², Матназарова Г.С.³**¹С.Д.Асфендияров номидаги Қозоғистон Миллий тиббиёт университети, Алма-ата ш., Қозоғистон²Урганч давлат тиббиёт институти, Урганч ш., Ўзбекистон³Тошкент давлат тиббиёт университети, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. Мақолада юқумли касалликлар бўйича эпидемик вазият, бугунги куннинг муаммолари ва юқумли патогенлар билан касалланиш хавфини камайтириш бўйича профилактик ечимлар имкониятлари, шу жумладан иммунизация ва вакцина билан бошқариладиган ва вакцина билан бошқариладиган инфекциялар эпидемик жараёнининг ривожланишини тўхтатишда жамоавий иммунитетнинг аҳамияти ҳақида маълумот берилган. Юқумли ва паразитар касалликлар эпидемик жараёнининг кечишига таъсир этувчи айрим омиллар, шунингдек, зооноз инфекциялар ва инвазияларни назорат қилишда "One health" концепциясининг имкониятлари тавсифи келтирилган.

Калим сўзлар: юқумли касалликлар, прион касалликлари, эпидемик касалликлар

В своем определении академик Николай Дмитриевич Ющук утверждал... «инфекционные заболевания это особые заболевания, которые нужно уважать, в противном случае они сами заставят уважать себя». И как показывает время, инфекционные болезни продолжают оставаться проблемой даже на современном этапе развития профилактической медицины, вызовы и угрозы от мира микробов имеют место быть. Снижение охвата иммунизацией подлежащего контингента против кори, не достижение коллективного иммунитета против этой вакциноуправляемой инфекции, приводит к росту заболеваемости с регулярной периодичностью. Можно сказать, что корь как индикатор эпидемиологического «неблагополучия» показывает имеющиеся упущения в профилактической работе. Усиление

эпидемиологического, эпизоотического, энтомологического надзора за инфекционными и паразитарными заболеваниями является ключевым аспектом контроля надзора.

На инфекционную заболеваемость оказывают влияние ряд факторов, среди которых новые и возвращающиеся болезни (иными словами, эмерджентные болезни); изменение климата, природно-очаговые инфекции, влияние феномена/эффекта Эль-Ниньо; миграция населения и урбанизация; изменчивость патогенов и появление новых возбудителей.

В конце прошлого столетия по ряду причин и обстоятельств (урбанизация, технический прогресс, миграция и др.) о себе стали заявлять новые и возвращающиеся инфекции, которые существовали ранее, либо появились в новом для них географическом регионе, а некоторые давно известные инфекции начали проявлять неожиданный рост заболеваемости и обнаруживать тенденцию к расширению нозоареалов (ареалов болезней), таким образом возникла проблема «эмерджентных» болезней (emergency – возникающий, неожиданно появляющийся). Примерами таких инфекций являются лейшманиоз – вспышка «забытой» инфекции в Казахстане в 2016 г., расширение ареала лихорадки Западного Нила, болезни Кретцфельда-Якоба, прионной болезни, поражающего отдельные племена, но в последние годы регистрируемый среди населения Якутии и имевший случаи внутрибольничного заражения в странах Европы, появление патогенных *E.coli* и *Salmonella spp.*; антигенный дрейф и шифт, приводящий к новым вариантам вируса гриппа; реассортации и мутации в микробной популяции; увеличение антибиотикорезистентности и др. На рис 1 представлены Глобальные масштабы новых, повторно возникающих и «умышленно возникающих» инфекционных заболеваний в мире с 1981 г. по 2020 г.

Климато-зависимые инфекционные заболевания, к коим относятся лихорадка Денге, малярия, Чикунгунья и др. трансмиссивные инфекции, напрямую зависят от погодных и климатических условий в сторону расширения или сокращения ареала проживания резервуара инфекции и их переносчиков. Вследствие потепления климата вирус лихорадки Чикунгунья смог «сменить» *Aedes aegypti*, распространенный в тропиках, на *Aedes albopictus* (тигровый комар), распространенный в умеренном климате Европы и периодически вызывает вспышки. Отдельно следует отметить феномен (эффект) Эль-Ниньо, наиболее выраженный в Южной Америке. Вызываемые им экстремальные погодные условия приводят к увеличению числа случаев трансмиссивных инфекций, таких как малярия, лихорадка Денге и лихорадка долины Рифт. На юго-востоке Австралии после сильных ливневых дождей наблюдаются вспышки австралийского энцефалита или энцефалита долины Муррей (MVE) [2].

Есть проблема, связанная с так называемой «аэропортной» малярией, когда зараженные переносчики – комары рода *Anopheles*, *Culex* переносятся транспортом из эндемичных регионов и представляют собой особую угрозу для людей, работающих в аэропорту, морских портах или проживающих рядом. Эпидемиологическая значимость связана с тем, что в регионах, свободных от малярии, отсутствует настороженность в отношении инвазии, по этой причине может затягиваться диагностика. Случаи «аэропортной» малярии зарегистрированы в странах Европы, имеющих многочисленные воздушные сообщения со странами Африки. В 2000 году в Бельгии, где с 1938 года не было случаев малярии, заболел житель города Генте, он проживал в 3,5 км. от морского порта. По результатам эпидемиологического расследования этого случая было установлено, что инфицированный комар попал через багажное отделение судна [3,4].

Миграция населения и урбанизация вносят значительный вклад в «пейзаж» инфекционных болезней, зарегистрированных на текущий момент. В эпоху доступности воздушных сообщений границы между ними уменьшаются и увеличивается риск переноса возбудителей из эндемичных регионов в страну, где эти болезни не были распространены. Классическим примером заноса инфекции был случай натуральной оспы в 1959 году у известного художника -графика Алексея Кокорекина, прилетевшего из Индии в конце инкубационного периода болезни и имевшего большой круг контактов; он вызвал начало вспышки в Москве, благодаря оперативной работе санитарно-эпидемиологической, медицинской и коммунальных служб удалось в короткие сроки локализовать и ликвидировать эпидемический очаг. На сегодняшний день более трех миллиардов человек, а это 50% населения Земного шара, проживают в городах, по прогнозу к 2050 году две трети населения будут проживать в городах. Это безусловно найдет свое отражение в инфектологии, понимая, что проживание в условиях повышенной скученности создает условия для распространения возбудителей инфекционных болезней и некоторых контагиозных гельминтозов. Для сравнения в 1950 году в городах проживало всего 30% людей.




Рис. 1. Глобальные масштабы новых, повторно возникающих и «умышленно возникающих» инфекционных заболеваний в мире с 1981 г. по 2020 г. [1]

Расширение ареала обитания человека привело к открытию новых для человека болезней и их возбудителей. Примером этого могут служить прионные болезни, возбудителем которых являются прионы (англ. protein - белок; infection - инфекция) – особые инфекционные белки. Они были открыты Стэнли Прузинером в 1982 году, за это открытие в 1997 году он был удостоен Нобелевской премии. У человека прионы вызывают несколько видов прионных болезней - болезнь Крейтцфельда — Якоба (БКЯ), синдром Герстмана — Штраусслера — Шейнкера, фатальную семейную бессонницу и куру. В 1997 году возникла крупная вспышка болезни среди крупного рогатого скота, известное как «коровье бешенство». Все известные прионные заболевания поражают головной мозг и другие нервные ткани, в настоящее время неизлечимы и приводят к летальности.

Развитие новых технологий, расширение объема медицинской помощи увеличивают риски инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи. В истории медицины имеется описание заражения донора при пересадке роговицы от реципиента с вирусом бешенства, что в итоге привело к заражению самого донора. Так в ряде Европейских государств зафиксированы случаи прионных инфекций внутрибольничного заражения. Большое международное исследование, начатое в 1993 г., основывалось на данных национальных регистров Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Словакии и Великобритании; в 1997 г. в исследование также включились Австралия, Австрия, Канада, Испания, Швейцария. Согласно анализу данных за 1993–2002 гг., включавших 4441 случай БКЯ (3720 случаев спорадической, 455 – наследственной, 138 – ятрогенной БКЯ и 128 наблюдений нового варианта БКЯ), ежегодная смертность в 1999–2002 гг. составила 1,67 на 1 000 000 для всех случаев и 1,39 на 1 000 000 для спорадической БКЯ. Отмечено гетерогенное распределение этиологических подтипов с большим количеством наследственных случаев в Италии и Словакии, ятрогенных случаев во Франции и Великобритании, а также варианта в Великобритании [5].

Во Франции отстающим в росте детям вводили препараты гипофиза животных, больных губчатой энцефалопатией крупного рогатого скота, что привело к развитию у них БКЯ. Это было непреднамеренное введение прионов в организм детей при медицинском вмешательстве.

Прионы могут передаваться с получаемым из мочи человеческим менопаузальным гонадотропином, который применяется в лечении бесплодия. Сегодня этот источник заражения полностью устранён.

Прионы представляют особую эпидемиологическую настороженность, связанную с тем фактом, что эти инфекционные белки устойчивы к высокой температуре, для их уничтожения необходимо проводить денатурацию самого белка и только собственно стерилизацию. Для этого требуются современные технологические решения.

Одним из важных направлений профилактики зоонозных инфекционных болезней следует рассматривать концепцию «One health» - «Единое здоровье», подразумевающий здоровье животных, здоровье человека и благополучная окружающая среда. Ряд инфекционных болезней и инвазий зоонозной природы такие как бруцеллез, чума, бешенство, сибирская язва, эхинококкоз, тениоз и др. могут быть эффективно управляемы подходом (концепцией) «One health», первоочередной мерой предупреждения следует рассматривать оздоровление животных, проведение среди них вакцинации (бруцеллез, сибирская язва, бешенство), дегельминтизацию собак (эхинококкоз), выбраковку старого скота, строгое соблюдение правил захоронения трупов павшего скота (сибирская язва), правил ведения реестра и инвентаризации скотомогильников, медико-биологическое районирование по типам очагов; наблюдение за первыми симптомами болезни у животных. Оздоровление животных напрямую связано со снижением контаминации объектов окружающей среды; при несоблюдении биологической (инфекционной) безопасности инфицированный бруцеллами abortированный плод (следует помнить, что бруцеллы высококонтагиозны) приводит к контаминации почвы, кормов, шкур, воды, навоза, пищевых продуктов; размывание почвы скотомогильников может привести к вспышке сибирской язвы (споры *Bacillus anthracis* переходят в вегетативную форму и вызывают болезнь). Ключевыми позициями в профилактике инфекций и инвазий среди людей остаются раннее выявление, ранняя диагностика, своевременное лечение, предупреждение реинфекций и реинвазий, диспансерное наблюдение за реконвалесцентами, обследование и оздоровление декретированных групп населения, мероприятия по локализации и ликвидации возникшего эпидемического очага.

Еще раз о коллективном иммунитете. Впервые о нем заговорили в начале 30-х годов прошлого столетия, во времена, когда корь приводила к массовым заболеваниям среди людей и еще не была разработана вакцина от кори. Было замечено, что в популяции переболевших корью людей, эта болезнь самостоятельно угасала без применения каких либо превентивных воздействий. Сформированный стойкий личный иммунитет каждого переболевшего приводил к формированию коллективного иммунитета, способного сдерживать эпидемический процесс и приводить к его угасанию. Сегодня, когда разработана эффективная вакцина и успешно применяется двухтуровая вакцинация от кори, коллективный иммунитет складывается в результате иммунизации. К сожалению, антивакцинальные настроения в обществе приводят к большому числу отказов по разным причинам, среди которых доминируют недоверие к вакцинам, личные убеждения, и лишь незначительна доля людей, имеющих отказы по медицинским противопоказаниям. Причем, эта часть людей, наиболее уязвима к инфекции, а 95% уровень коллективного иммунитета способен защитить такую группу риска. Мы потеряли страх перед инфекцией, благодаря иммунизации и благодаря тому, что многие инфекции стали вакциноуправляемыми и вакциноконтролируемыми, мы больше не наблюдаем бесчисленное количество заболевших в классической форме и тем более не наблюдаем возникающие осложнения после перенесенного заболевания, как это было в случае с полиомиелитом. Однако, сегодня приобретен страх перед вакцинами.

Медицинская, в том числе и профилактическая наука развивается, развиваются медицинские технологии и принимаются стратегические решения, которые несомненно оказывают благотворное превентивное влияние на эпидемический (эпизоотический) процесс инфекционного и паразитарного заболевания. Использование возможностей искусственного интеллекта и цифровых технологий, наряду с разработанными и испытанными профилактическими средствами и достижениями превентивной медицины, межведомственное и межгосударственное сотрудничество, направлены на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия общества в целом. Для микробов нет границ и только общими усилиями мы сможем сохранять здоровье всех и каждого.

Список литературы:

1. Emerging Pandemic Diseases: How We Got to COVID-19 Cell, Volume 183, Issue 3, 29 October 2020, Pages 837 David M. Morens, Anthony S. Fauci <https://doi.org/10.1016/j.cell.2020.08.021>
2. Эль-Ниньо 2015-2016 гг.: Эволюция, механизмы, сопутствующие удаленные аномалии А.М. Осипов, Д.Ю. Гущина *Фундаментальная и прикладная климатология*, 3/2018 С.54-81 DOI: 10.21513/2410-8758-2018-3-54-81
3. Peleman R., Benoit D., Goossens L., Bouttens F., Puydt H.D., Vogelaers D., Colardyn F., Van De Woude K. Indigenous Malaria in a Suburb of Ghent, Belgium // *Travel Medicine*. – 2000. – Vol. 7. – v 1. – P. 48-49.
4. <https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/vector-borne-diseases> 26 сентября 2024 г.
5. Ladogana A., Puopolo M., Croes E.A. et al. Mortality from Creutzfeldt- Jakob disease and related disorders in Europe, Australia and Canada. *Neurology*. 2005; 64 (90): 1586–1591

Для цитирования: Алекшеева Л.Ж., Юсупов Ш.Р., Матназарова Г.С. Инфекционные болезни как угроза прошлого и вызовы настоящего // *Вестник фундаментальной и клинической медицины*. – 2026. – № 4(24). – С. 113–117. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19451060>

ИНСУЛИНОРЕЗИСТЕНТНОСТЬ И ОЖИРЕНИЕ У ПОДРОСТКОВ: СОВРЕМЕННЫЕ КЛИНИКО-МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ РАННЕГО РИСКА САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА

Курбанова Н.С.

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Актуальность. Ожирение у подростков сопровождается ранними метаболическими нарушениями и повышает риск развития сахарного диабета 2 типа. Особое значение имеет поиск информативных клинико-метаболических маркеров для раннего выявления подростков группы высокого риска. Цель исследования. Проанализировать современные клинико-метаболические маркеры у подростков с ожирением и инсулинорезистентностью и определить их значение в раннем прогнозировании риска сахарного диабета 2 типа. Материалы и методы. Проведен обзор и анализ современных научных публикаций, клинических рекомендаций и исследований, посвященных ожирению, инсулинорезистентности и раннему риску сахарного диабета 2 типа у подростков. Оценивались антропометрические, биохимические и расчетные показатели. Результаты. Наиболее информативными маркерами раннего риска сахарного диабета 2 типа у подростков с ожирением являются окружность талии, отношение талия/рост, HOMA-IR, TG/HDL-C, TyG, SPISE, HbA1c, глюкоза натощак, 1-часовая гликемия при оральном глюкозотолерантном тесте и аланинаминотрансфераза. Установлено, что наибольшую диагностическую ценность имеет их комплексная оценка. Заключение. Раннее выявление клинико-метаболических маркеров позволяет своевременно определить подростков группы высокого риска и улучшить профилактику сахарного диабета 2 типа.

Ключевые слова: ожирение у подростков, инсулинорезистентность, сахарный диабет 2 типа, клинико-метаболические маркеры, HOMA-IR, TyG, SPISE, TG/HDL-C, предиабет.

INSULIN RESISTANCE AND OBESITY IN ADOLESCENTS: MODERN CLINICAL AND METABOLIC MARKERS OF EARLY RISK OF TYPE 2 DIABETES

Kurbanova N.S.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Relevance. Obesity in adolescents is accompanied by early metabolic disorders and increases the risk of developing type 2 diabetes. Identifying informative clinical and metabolic markers for early detection of high-risk adolescents is of particular importance. Purpose of the research. Analyze modern clinical and metabolic markers in adolescents with obesity and insulin resistance and determine their significance in early prediction of type 2 diabetes mellitus risk. Materials and methods. A review and analysis of modern scientific publications, clinical recommendations, and studies devoted to obesity, insulin resistance, and the early risk of type 2 diabetes mellitus in adolescents were conducted. Anthropometric, biochemical, and calculated indicators were evaluated. Results. The most informative early risk markers for type 2 diabetes mellitus in adolescents with obesity are waist circumference, waist/height ratio, HOMA-IR, TG/HDL-C, TyG, SPISE, HbA1c, fasting glucose, 1-hour oral glucose tolerance test glycemia, and alanine aminotransferase. It has been established that their comprehensive assessment has the greatest diagnostic value. Conclusion. Early detection of clinical and metabolic markers allows for the timely identification of adolescents in high-risk groups and improves the prevention of type 2 diabetes mellitus.

Keywords: obesity in adolescents, insulin resistance, type 2 diabetes mellitus, clinical and metabolic markers, HOMA-IR, TyG, SPISE, TG/HDL-C, prediabetes.

ЎСМИРЛАРДА ИНСУЛИНГА ЧИДАМЛИЛИК ВА СЕМИЗЛИК: 2-ТУР ҚАНДЛИ ДИАБЕТ ЭРТА ХАВФИНИНГ ЗАМОНАВИЙ КЛИНИК-МЕТАБОЛИК МАРКЕРЛАРИ

Курбанова Н.С.

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Долзарблиги. Ўсмирлардаги семизлик эрта метаболик бузилишлар билан бирга келади ва 2-тоифа қандли диабет ривожланиши хавфини оширади. Юқори хавф гуруҳидаги ўсмирларни эрта аниқлаш учун информатив клиник-метаболик маркерларни излаш алоҳида аҳамиятга эга. Тадқиқотнинг мақсади. Семизлик ва инсулинрезистентлик бўлган ўсмирларда замонавий клиник-метаболик маркерларни таҳлил қилиш ва уларнинг 2-тур қандли диабет хавфини эрта прогнозлашдаги аҳамия-

тини аниқлаш. Материалы и методы. Ўсмирларда семизлик, инсулинга резистентлик ва қандли диабет 2 турининг эрта хавфига бағишланган замонавий илмий наишлар, клиник тавсиялар ва тадқиқотлар кўриб чиқилган ва таҳлил қилинган. Антропометрик, биокимёвий ва ҳисобий кўрсаткичлар баҳоланди. Натижалар. Семизлиги бўлган ўсмирларда 2-тоифа қандли диабетнинг эрта хавфининг энг маълумотли белгилари бел айланиши, бел/бўй нисбати, HOMA-IR, TG/HDL-C, TyG, SPISE, HbA1c, оч қоринга глюкоза, оғиз орқали глюкозага толерантлик тестида 1 соатлик гликемия ва аланинаминотрансфераза ҳисобланади. Уларни комплекс баҳолаш энг катта диагностик қийматга эга эканлиги аниқланди. Хулоса. Клиник-метаболик маркерларни эрта аниқлаш юқори хавф гуруҳидаги ўсмирларни ўз вақтида аниқлаш ва қандли диабетнинг 2-тури профилактикасини яхшилаш имконини беради.

Калит сўзлар: ўсмирларда семизлик, инсулинрезистентлик, 2-тип қандли диабет, клиник-метаболик маркерлар, HOMA-IR, TyG, SPISE, TG/HDL-C, предиабет.

e-mail: kurbanovanozima244@gmail.com

Введение: Ожирение у подростков в последние десятилетия рассматривается как одна из наиболее значимых медико-социальных и клинических проблем современной эндокринологии. Его распространенность неуклонно увеличивается во многих странах, а само ожирение все чаще ассоциируется не только с избыточным накоплением жировой ткани, но и с формированием ранних метаболических нарушений, затрагивающих углеводный, липидный и печеночный обмен. Особую тревогу вызывает тот факт, что именно в подростковом возрасте начинают проявляться начальные звенья патогенеза сахарного диабета 2 типа (СД2), включая снижение чувствительности тканей к инсулину, компенсаторную гиперинсулинемию, дислипидемию и нарушение функции β -клеток поджелудочной железы [1, 2]. Эти изменения у подростков с ожирением нередко формируют неблагоприятный метаболический фенотип задолго до клинической манифестации СД2.

Подростковый период является критическим этапом в развитии инсулинорезистентности. Это связано с тем, что пубертат сам по себе сопровождается физиологическим снижением чувствительности к инсулину, обусловленным гормональными и метаболическими перестройками организма. У здоровых подростков данное состояние, как правило, носит временный характер, однако при наличии ожирения, особенно абдоминального, оно приобретает патологическое значение и становится одним из ведущих механизмов прогрессирования метаболических нарушений [1, 3]. В результате формируется состояние, при котором функциональная нагрузка на β -клетки возрастает, а риск развития предиабета и СД2 существенно повышается. Согласно современным клиническим рекомендациям, youth-onset СД2 отличается более агрессивным течением, быстрым прогрессированием дисгликемии и ранним развитием осложнений по сравнению с диабетом 2 типа, дебютирующим во взрослом возрасте [2, 3].

Патогенез инсулинорезистентности при подростковом ожирении является многофакторным. В его основе лежат избыток свободных жирных кислот, висцеральное жировотложение, хроническое субклиническое воспаление, оксидативный стресс, нарушение секреции адипокинов и изменения пострецепторной передачи инсулинового сигнала. Висцеральная жировая ткань обладает высокой метаболической активностью и способствует продукции провоспалительных цитокинов, таких как TNF- α и IL-6, которые нарушают нормальную утилизацию глюкозы и усиливают периферическую инсулинорезистентность [1]. На этом фоне возрастает риск липотоксичности, стеатотического поражения печени, а также истощения компенсаторных возможностей β -клеточного аппарата [1, 4].

Особое значение в последние годы придается не только констатации факта ожирения, но и раннему выявлению подростков с наиболее высоким риском СД2. Традиционная оценка по индексу массы тела (ИМТ) не всегда позволяет в полной мере судить о степени метаболической дезадаптации, поскольку ИМТ не отражает характер распределения жировой ткани и не позволяет отличить преимущественно периферическое ожирение от висцерального [1, 5]. Поэтому все большее внимание уделяется дополнительным клинико-метаболическим маркерам, которые могут использоваться для ранней стратификации риска. К таким маркерам относятся окружность талии, отношение талия/рост (WHtR), уровень инсулина натощак, индекс HOMA-IR, индекс TyG, соотношение триглицеридов к холестерину липопротеинов высокой плотности (TG/HDL-C), а также новые интегральные показатели чувствительности к инсулину, включая SPISE [5, 6, 7].

С клинической точки зрения особенно важным является то, что отдельные маркеры обладают различной чувствительностью на ранних стадиях нарушения углеводного обмена. У подростков с ожирением показатели гликемии натощак и HbA1c могут оставаться в пределах референсных значе-

ний даже при наличии выраженной инсулинорезистентности и ухудшении функции β -клеток. В связи с этим в современных исследованиях возрастает интерес к дополнительным тестам, в частности к определению 1-часовой гликемии при оральном глюкозотолерантном тесте, которая рассматривается как более чувствительный маркер ранней дисгликемии и неблагоприятного метаболического профиля у подростков с ожирением [2, 8, 9]. Некоторые исследования показывают, что повышенная 1-часовая гликемия может выявлять подростков группы высокого риска еще до появления классических критериев предиабета по 2-часовой гликемии [8, 9].

Дополнительным аспектом проблемы является тесная связь инсулинорезистентности с другими компонентами метаболического синдрома. У подростков с ожирением часто выявляются гипертриглицеридемия, снижение уровня ХС-ЛПВП, артериальная гипертензия, метаболически ассоциированная стеатотическая болезнь печени и хроническое системное воспаление [1, 2, 3]. Повышение уровня АЛТ, наличие признаков печеночного стеатоза и атерогенные изменения липидного профиля могут рассматриваться как дополнительные клинические индикаторы высокого диабетогенного риска [1, 3, 7]. В этой связи современная оценка подростка с ожирением требует междисциплинарного подхода, объединяющего данные антропометрии, биохимического анализа и расчета индексов инсулинорезистентности.

Несмотря на значительный прогресс в изучении данной проблемы, вопрос о наиболее информативных и практически применимых ранних маркерах риска СД2 у подростков остается дискуссионным. Часть показателей зависит от пола, возраста, стадии полового созревания и этнических особенностей, что затрудняет использование универсальных диагностических порогов [1, 5]. Вместе с тем именно поиск доступных, чувствительных и воспроизводимых клинко-метаболических маркеров представляет одну из ключевых задач современной подростковой эндокринологии, поскольку позволяет своевременно выделять группы высокого риска и проводить профилактические вмешательства еще до развития манифестного диабета [2, 3].

Таким образом, ожирение и инсулинорезистентность у подростков следует рассматривать как взаимосвязанные звенья единого патогенетического процесса, ведущего к формированию раннего риска СД2. Изучение современных клинко-метаболических маркеров представляет не только научный, но и выраженный практический интерес, поскольку позволяет усовершенствовать скрининг, прогнозирование и раннюю профилактику диабета 2 типа у подростков. На этом основании целью настоящей работы явился анализ современных клинко-метаболических маркеров раннего риска СД2 у подростков с ожирением и инсулинорезистентностью.

Цель исследования: провести анализ современных клинко-метаболических маркеров у подростков с ожирением и инсулинорезистентностью, определить их диагностическую и прогностическую значимость в раннем выявлении риска развития сахарного диабета 2 типа.

Материалы и методы исследования: Исследование выполнено в формате обзорно-аналитической работы. Материалом исследования послужили современные отечественные и зарубежные научные публикации, клинические рекомендации и результаты исследований, посвященные инсулинорезистентности, ожирению и раннему риску сахарного диабета 2 типа у подростков.

Проведён анализ литературных данных о клинко-метаболических маркерах, используемых для ранней диагностики нарушений углеводного обмена у подростков с ожирением. Оценивались антропометрические показатели, параметры углеводного и липидного обмена, а также расчётные индексы инсулинорезистентности, включая HOMA-IR, TyG, SPISE, TG/HDL-C, отношение талия/рост, уровни глюкозы натощак, HbA1c и АЛТ.

Использованы библиографический, аналитический, сравнительный и обобщающий методы исследования. Отобранные источники были систематизированы по патогенетической, диагностической и прогностической значимости изучаемых маркеров. На основании проведённого анализа определены наиболее информативные показатели раннего риска развития сахарного диабета 2 типа у подростков с ожирением.

Результаты исследования: Проведённый анализ современной научной литературы показал, что инсулинорезистентность у подростков с ожирением является одним из наиболее ранних и патогенетически значимых звеньев формирования сахарного диабета 2 типа. Установлено, что в подростковом возрасте ожирение, особенно абдоминальное, тесно ассоциировано с нарушением чувствительности периферических тканей к инсулину, компенсаторной гиперинсулинемией, изменениями липидного профиля и постепенным ухудшением функции β -клеток поджелудочной железы [1, 2, 3].

Анализ литературных данных свидетельствует о том, что у подростков с ожирением метаболические нарушения формируются значительно раньше появления клинически выраженной гипергли-

кемии. Наиболее часто ранние изменения проявляются повышением уровня инсулина натощак, увеличением индекса HOMA-IR, ростом концентрации триглицеридов, снижением уровня холестерина липопротеинов высокой плотности, а также увеличением окружности талии и отношения талия/рост [1, 4, 5]. Эти показатели отражают не только наличие избыточной массы тела, но и глубину метаболической дезадаптации, связанную с висцеральным ожирением и хроническим субклиническим воспалением.

Установлено, что индекс массы тела, несмотря на его широкое применение в клинической практике, не всегда в полной мере отражает степень метаболического риска у подростков. Более информативными показателями раннего риска сахарного диабета 2 типа являются маркеры центрального ожирения, прежде всего окружность талии и отношение талия/рост. Именно абдоминальное ожирение демонстрирует более тесную связь с инсулинорезистентностью, дислипидемией и нарушением углеводного обмена [4, 5]. Это подтверждает необходимость включения антропометрических показателей центрального ожирения в алгоритмы раннего скрининга подростков из группы высокого риска.

Среди лабораторных и расчётных показателей особое место занимает индекс HOMA-IR, который остаётся одним из наиболее распространённых инструментов оценки инсулинорезистентности у подростков. Вместе с тем анализ источников показал, что интерпретация HOMA-IR в подростковом возрасте требует осторожности, поскольку величина данного показателя может варьировать в зависимости от возраста, пола и стадии полового созревания [1, 6]. Несмотря на это, повышение HOMA-IR у подростков с ожирением устойчиво ассоциируется с более высоким риском развития предиабета и сахарного диабета 2 типа.

Дополнительную диагностическую ценность представляют современные липидно-глицемические индексы, включая соотношение триглицеридов к холестерину липопротеинов высокой плотности (TG/HDL-C), индекс TyG и индекс SPISE. В ряде исследований показано, что данные показатели обладают высокой информативностью в оценке ранних метаболических нарушений и могут использоваться как доступные маркеры риска в клинической практике [5, 6, 7]. Их преимущество заключается в относительной простоте расчёта, доступности рутинных биохимических параметров и возможности использования в условиях массового скрининга подростков с ожирением.

Отдельного внимания заслуживает связь инсулинорезистентности с нарушением функции печени. Анализ литературных данных показал, что повышение уровня аланинаминотрансферазы и наличие признаков метаболически ассоциированной жировой болезни печени у подростков с ожирением могут рассматриваться как дополнительные маркеры выраженной метаболической дисфункции [1, 7]. Сочетание ожирения, инсулинорезистентности, дислипидемии и повышения печёночных ферментов формирует наиболее неблагоприятный метаболический профиль, ассоциированный с высоким риском прогрессирования к предиабету и сахарному диабету 2 типа.

При анализе показателей углеводного обмена установлено, что традиционные параметры, такие как глюкоза натощак и HbA1c, не всегда обладают достаточной чувствительностью для выявления наиболее ранних стадий нарушения углеводного обмена у подростков с ожирением [2, 8]. В этой связи в последние годы возрастает интерес к определению 1-часовой гликемии при оральном глюкозотолерантном тесте. Ряд исследований продемонстрировал, что повышение 1-часовой гликемии может служить более чувствительным маркером ранней дисгликемии, ухудшения функции β -клеток и повышенного риска будущего сахарного диабета 2 типа даже у тех подростков, у которых показатели глюкозы натощак и 2-часовой гликемии ещё остаются в пределах допустимых значений [8, 9].

В результате обобщения литературных данных установлено, что ни один из клинко-метаболических маркеров не может рассматриваться как абсолютно самостоятельный критерий раннего риска сахарного диабета 2 типа. Наибольшую диагностическую и прогностическую ценность представляет их комплексная оценка. Наиболее информативной моделью ранней стратификации риска у подростков с ожирением является сочетанное использование антропометрических показателей центрального ожирения, индексов инсулинорезистентности, параметров липидного обмена, печёночных ферментов и показателей ранней дисгликемии [1, 2, 5, 7].

Таким образом, результаты проведённого анализа показывают, что современные клинко-метаболические маркеры позволяют выявлять подростков с ожирением и инсулинорезистентностью, имеющих высокий риск развития сахарного диабета 2 типа, ещё на доклинической стадии заболевания. Это создаёт основу для своевременного проведения профилактических и лечебных мероприятий, направленных на коррекцию массы тела, улучшение чувствительности к инсулину и предупреждение формирования стойких нарушений углеводного обмена.

Выводы: Ожирение у подростков является одним из ключевых факторов формирования инсулинорезистентности и ранних метаболических нарушений, ассоциированных с высоким риском раз-

вития сахарного диабета 2 типа. Развитие инсулинорезистентности в данной возрастной группе обусловлено сочетанным действием ряда патогенетических механизмов, среди которых особое значение имеют висцеральное жиросотложение, хроническое субклиническое воспаление, дислипидемия, нарушение функционального состояния печени и постепенное снижение компенсаторных возможностей β -клеток поджелудочной железы. Указанные изменения формируют неблагоприятный метаболический фон, способствующий раннему нарушению углеводного обмена.

Наиболее информативными клинико-метаболическими маркерами раннего риска сахарного диабета 2 типа у подростков с ожирением являются показатели центрального ожирения, прежде всего окружность талии и отношение талия/рост, а также ряд лабораторных и расчетных параметров. К числу наиболее значимых относятся HOMA-IR, TG/HDL-C, TyG, SPISE, уровни HbA_{1c}, глюкозы натощак, 1-часовой гликемии при оральном глюкозотолерантном тесте и аланинаминотрансферазы. При этом индекс массы тела, несмотря на широкое применение, не всегда позволяет объективно отразить выраженность метаболических нарушений, что ограничивает его самостоятельную диагностическую ценность.

В связи с этим наибольшую диагностическую и прогностическую значимость имеет комплексный подход, основанный на сочетанной оценке антропометрических, биохимических и расчетных показателей. Такой подход позволяет своевременно выявлять подростков группы высокого риска еще на доклинической стадии заболевания и проводить ранние профилактические мероприятия. Практическая значимость раннего выявления клинико-метаболических маркеров заключается в возможности своевременной коррекции образа жизни, предупреждения прогрессирования нарушений углеводного обмена и снижения вероятности развития сахарного диабета 2 типа в дальнейшем.

Список литературы:

1. Luo Y., Li Y., Lin F., et al. Insulin resistance in pediatric obesity: from mechanisms to current management // *Journal of Obesity & Metabolic Syndrome*. 2024. Vol. 33, No. 2. P. 81–97. DOI: 10.7570/jomes24053.
2. American Diabetes Association Professional Practice Committee. 14. Children and adolescents: Standards of Care in Diabetes—2025 // *Diabetes Care*. 2025. Vol. 48, Suppl. 1. P. S283–S305. DOI: 10.2337/dc25-S014.
3. Shah A.S., Nadeau K.J., Zeitler P., et al. ISPAD Clinical Practice Consensus Guidelines 2024: Type 2 diabetes in children and adolescents // *Pediatric Diabetes*. 2024. Vol. 25, Suppl. 31. Art. e70079. DOI: 10.1111/pedi.70079.
4. Braffett B.H., Copeland K.C. Diabetes in children and adolescents // *Endotext*. South Dartmouth (MA): MDText.com, Inc.; 2025. Available from: NCBI Bookshelf.
5. Li A., Wei Y., Li X., et al. Waist-to-height ratio and body roundness index in prediction of insulin resistance in children and adolescents // *BMC Endocrine Disorders*. 2025. Vol. 25. Art. 13. DOI: 10.1186/s12902-025-01977-1.
6. Tantari G., Bassi M., Pistorio A., et al. SPISE INDEX (Single point insulin sensitivity estimator): indicator of insulin resistance in children and adolescents with overweight and obesity // *Frontiers in Endocrinology*. 2024. Vol. 15. Art. 1439901. DOI: 10.3389/fendo.2024.1439901.
7. Baneu P., Mirea L.E., Botezatu A., et al. The triglyceride/HDL ratio as a surrogate biomarker for insulin resistance // *Diagnostics*. 2024. Vol. 14, No. 14. Art. 1517. DOI: 10.3390/diagnostics14141517.
8. Brar P.C., Gallagher M.P., Basina M., et al. Value of 1-hour plasma glucose during an oral glucose tolerance test in a multiethnic cohort of obese children and adolescents // *Clinical Pediatrics*. 2023. Vol. 62, No. 8. P. 783–790. DOI: 10.1177/00099228231179851.
9. Smyczyńska J., Olejniczak A., Różycka P., et al. Obesity-related complications including dysglycemia based on 1-h post-load plasma glucose in children and adolescents screened before and after COVID-19 pandemic // *Nutrients*. 2024. Vol. 16, No. 15. Art. 2568. DOI: 10.3390/nu16152568.

Для цитирования: Курбанова Н.С. Инсулинорезистентность и ожирение у подростков: современные клинико-метаболические маркеры раннего риска сахарного диабета 2 типа // *Вестник фундаментальной и клинической медицины*. – 2026. – № 4(24). – С. 118–122. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19451122>

**ЎЗБЕКИСТОННИНГ МАРКАЗИЙ ВИЛОЯТЛАРИДАГИ ТЕРИ ЛЕЙШМАНИОЗИ БЎЛГАН
БЕМОРЛАРДА ЦИТОКИНЛАР ДАРАЖАСИДАГИ ЎЗГАРИШЛАР ТАҲЛИЛИ**
Саттарова Х.Г.

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон
Самарқанд давлат тиббиёт университети хузуридаги Л.М. Исаев номидаги микробиология,
вирусология, юкумли ва паразитар касалликлар илмий тадқиқот институти,
Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Ўзбекистоннинг марказий ҳудудларида (Самарқанд, Қашқадарё ва Жиззах вилоятлари) тери лейшманиозини (ТЛ) билан касалланган беморларда иммунологик мувозанатни ва яллиғланишга қарши цитокинлар даражасини баҳолади ва ТЛ билан касалланган беморларда цитокинлар даражаси соғлом шахсларга нисбатан сезиларли даражада юқори эканлиги аниқланди. Хусусан, ИЛ-1 даражаси 14 баробар (87,4 пг/мл), ИЛ-6 эса 17 баробардан ортиқ (56,9 пг/мл) ошган бўлиб, бу кучли про-яллиғланиш реакциясини ифодалайди. Шунингдек, Th2 типидagi иммун жавоб маркерларидан бири бўлган ИЛ-4 даражасининг 5–6 баробар (41,8 пг/мл) ошиши касалликнинг сурункали кечиши ва ҳужайравий иммунитетнинг етарли эмаслигидан далолат беради.

Калим сўзлар: Тери лейшманиозини, цитокинлар, интерлейкин-1, интерлейкин-4, интерлейкин-6, иммун жавоб, яллиғланиш.

**ANALYSIS OF CHANGES IN CYTOKINE LEVELS IN PATIENTS WITH CUTANEOUS
LEISHMANIOSIS IN THE CENTRAL REGIONS OF UZBEKISTAN**

Sattarova H.G.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan
Scientific Research Institute of Microbiology, Virology, Infectious and Parasitic Diseases named after L.M.
Isaev under Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. The immunological balance and the levels of pro-inflammatory cytokines were evaluated in patients with cutaneous leishmaniasis (CL) in the central regions of Uzbekistan (Samarkand, Kashkadarya, and Jizzakh regions). It was found that cytokine levels in patients with CL were significantly higher compared to healthy individuals. Specifically, the level of IL-1 increased 14-fold (87.4 pg/ml), and IL-6 increased more than 17-fold (56.9 pg/ml), representing a potent pro-inflammatory response. Additionally, a 5–6 fold increase in the level of IL-4 (41.8 pg/ml), a key marker of the Th2-type immune response, indicates a chronic course of the disease and insufficient cellular immunity.

Keywords: Cutaneous leishmaniasis, cytokines, IL-1, IL-4, IL-6, immune response, inflammation.

**АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЙ УРОВНЕЙ ЦИТОКИНОВ У ПАЦИЕНТОВ С КОЖНЫМ
ЛЕЙШМАНИОЗОМ В ЦЕНТРАЛЬНЫХ РЕГИОНАХ УЗБЕКИСТАНА**

Саттарова Х.Г.

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан
Научно-исследовательский институт микробиологии, вирусологии, инфекционных и паразитарных
заболеваний им. Л.М. Исаева при Самаркандском государственном медицинском университете,
г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Был оценен иммунологический баланс и уровни провоспалительных цитокинов у больных кожным лейшманиозом (КЛ) в центральных регионах Узбекистана (Самаркандская, Кашкадарьинская и Джизакская области). Установлено, что уровни цитокинов у больных КЛ значительно выше, чем у здоровых лиц. В частности, уровень ИЛ-1 повысился в 14 раз (87,4 пг/мл), а ИЛ-6 — более чем в 17 раз (56,9 пг/мл), что свидетельствует о выраженной провоспалительной реакции. Кроме того, повышение уровня ИЛ-4, являющегося одним из маркеров иммунного ответа типа Th2, в 5–6 раз (41,8 пг/мл) указывает на хроническое течение заболевания и недостаточность клеточного иммунитета.

Ключевые слова: Кожный лейшманиоз, цитокины, интерлейкин-1, интерлейкин-4, интерлейкин-6, иммунный ответ, воспаление.

e-mail: sattarova.xulkar@gmail.com

Тери лейшманиози — терида яралар кўринишида кечадиган, *Leishmania* турига мансуб протозоа паразитлари сабабли юзага келадиган юкумли касаллик бўлиб, *Phlebotomus* пашшаларининг чақиши орқали юктирилади. Тери лейшманиози — тропик ва субтропик ҳудудларда, жумладан Ўзбекистон ва Марказий Осиё мамлакатларида кенг тарқалган бўлиб, инсон саломатлиги ва ижтимоий ҳаётга сезиларли таъсир кўрсатади [1]. Касалликнинг клиник шакллари турлича бўлиб, баъзи беморларда сурункали ёки мураккаб яралар ривожланади, бу эса косметик ва психологик муаммоларни келтириб чиқаради ҳамда даволашни қийинлаштиради. Шу сабабли, тери лейшманиозини аниқлаш ва даволашни оптималлаштириш учун касалликнинг патогенезини чуқур ўрганиш долзарб ҳисобланади [3].

Тери лейшманиозининг клиникаси жуда хилма-хил бўлиб, қисқа вақтда тузаладиган тери яраларидан тортиб сурункали, узоқ вақт тузалмайдиган кўринишларда бўлади. Бу асосан ҳўжайиннинг иммун жавобига боғлиқ. Иммунитетни бошқаришнинг асосий воситачилари сифатида Цитокинлар касалликнинг ривожланиши ва тўқималарнинг шикастланишини аниқлашда муҳим роль ўйнайди. Иммун тизимининг жавоб реакцияси, яллиғланиш жараёнлари, макрофаглар ва лимфоцитларнинг фаоллиги касалликнинг ривожланиши, давомийлиги ва даволанишига катта таъсир кўрсатади. Цитокинлар — ҳужайралараро сигнал молекулалари — бу жараёнларда марказий роль ўйнайди: яллиғланиш тартибини белгилайди, иммун ҳужайраларининг активлигига таъсир қилади, макрофаглар ва лимфоцитлар ўртасидаги мулоқотни шакллантиради. Иммунологик нуқтаи назардан, проинфламматор Цитокинлар, хусусан ИЛ-1 ва ИЛ-6, яллиғланиш жараёнини рағбатлантириб, паразитга қарши жавобни кучайтиради [4]. Эрондаги тадқиқотларнинг бирида беморларда ИЛ-1β ва ИЛ-6 даражалари касалликнинг турли босқичларида сезиларли даражада ошгани аниқланган. [3]. Марказий Осиё ҳудудидаги беморларда, тери лейшманиозили ҳолатларда қондаги ИЛ-6 даражаси юқорилиги, ИЛ-4 даражаси эса нисбатан пастлиги кузатилган [5, 6]. . Шри Ланкада ўтказилган тадқиқотда, тери яраларидаги ИЛ-4 ифодаланиши касаллик давомийлигига боғлиқ бўлган, ва касаллик оғирроқ ҳолатларда Th2 йўналиши (шу жумладан ИЛ-4) нисбатан ошгани қайд этилган [2]. Ироқдаги 2025-йилда олиб борилган тадқиқотда, – 60 та тери лейшманиозли бемор ва 30 соғлом назорат гуруҳлари зардобиди ИЛ-6 даражаси пасайганлиги аниқланган (13.58 нг/мЛ беморларда ва 18.52 нг/мЛ назоратда) [7]. Бу маълумотлар, тери лейшманиозиди иммун жавобнинг мураккаблигини ва Цитокинлар даражасининг касаллик босқичи, турли клиник шакллар, беморнинг иммун ҳолати билан чамбарчас боғлиқлигини кўрсатади [2,5].

Шу билан бирга, Цитокин даражаларининг ўзгариши касалликнинг клиник шакли ва давомийлиги билан боғлиқ бўлиши мумкин. Ҳозирги вақтда Ўзбекистондаги тери лейшманиоз беморларда ИЛ-1, ИЛ-4 ва ИЛ-6 даражалари ҳақида етарли маълумот мавжуд эмас, бу эса касалликнинг маҳаллий эпидемиологияси ва иммунобиологик механизмларини тушунишда бўшлиқ яратади [7, 8].

Цитокинлар даражасининг аниқланиши фақат патогенезни тушунишга эмас, балки тери лейшманиозини индивидуализацияланган даволаш стратегияларини ишлаб чиқиш ва янги иммунобиологик терапия усуллари жорий этиш имконини ҳам беради. Шунингдек, Цитокин генларидаги полиморфизмлар (масалан, ИЛ-4 ва ИЛ-6 генлари) беморларнинг касалликка мойиллиги ва иммун жавобининг турлича бўлишига таъсир қилиши мумкин [8]. Шу билан, тери лейшманиозли беморларда ИЛ-1, ИЛ-4 ва ИЛ-6 Цитокинларининг даражасини ўрганиш долзарблиги қуйидаги жиҳатларда намоён бўлади: эпидемиологик (касаллик тарқалиши), иммунологик (Th1/Th2 жавоби), клиник (биомаркер сифатида) ва генетик (полиморфизмлар ва иммун жавоб механизмлари) жиҳатлар. Бу муаммо бўйича олиб бориладиган илмий тадқиқотлар нафақат касалликнинг патогенезини аниқлашга, балки амалий соғлиқни сақлаш ва даволашни такомиллаштиришга хизмат қилади. Кўплаб тадқиқотлар тери лейшманиозиди Цитокинларнинг ўзгаришига эътибор қаратган. Тадқиқотлар шуни кўрсатадики:

Маҳаллий яраларда ИЛ-1 ва ИЛ-6 даражаси одатда ошади, бу эса макрофагларнинг фаоллашуви ва яллиғланиш жараёнларини акс эттиради [4, 7].

ИЛ-4 даражаси касалликнинг сурункали шаклларида ошади, бу эса паразитларга қарши самарали Th1 жавобнинг етарли эмаслигини билдиради. Клиник тажрибаларда беморларнинг кон плазмасида ИЛ-1 ва ИЛ-6 даражаларининг ошиши касалликнинг фаол яллиғланиш босқичи билан боғлиқ эканлиги аниқланган. Цитокинларнинг бу ўзгариши диагностика ва терапевтик жавобни баҳолашда биокимёвий маркер сифатида ишлатилиши мумкин. Бу цитокинлар касалликнинг патогенезида, яъни паразит ҳужайрага кириши, макрофагнинг активлашуви, ҳужайрали ва гуморал иммун жавоблар ўртасидаги мувозанатда муҳим омил саналади [6, 8].

Тадқиқотнинг мақсади. Ушбу тадқиқот Ўзбекистоннинг марказий ҳудудларидаги тери лейшманиози бўлган беморлар қонидаги цитокинлар даражасининг ўзгаришларини баҳолаш ва яллиғланишга қарши иммунологик мувозанатни тавсифлашга қаратилган.

Тадқиқот услуби: Тери лейшманиозили беморларда интерлейкинлар (ИЛ-1, ИЛ-4, ИЛ-6) ўзгаришини аниқлаш учун 62 нафар тери лейшманиозили беморлар ва назорат гуруҳига 34 нафар соғлом одам киритилди. Беморлар Самарқанд, Қашқадарё ва Жиззах вилоятларидан бўлиб, теридаги турли кўринишдаги яралар сабаб Самарқанд давлат тиббиёт университети ҳузуридаги Л.М. Исаев номидаги микробиология, вирусология, юкумли ва паразитар касалликлар илмий тадқиқот институтига мурожат қилишган. Уларнинг розиликлари асосида улардан 1 мл қон олиниб, сентифругада плазмага ажратилган ва -20°C ҳароратда сақланган. ИЛ-1, ИЛ-4 ва ИЛ-6 Цитокинлари даражаси аниқлаш учун Vektor Best (Новосибирск) компаниясининг тест тизимлари ишлатилди. Таҳлиллар Райто (Германия) анализаторида бажарилди.

Тадқиқот натижалари: Тадқиқот СамДТУ ҳузуридаги Л.М. Исаев номидаги МВЮПК илмий тадқиқот институти ва унинг клиникаси лабораториясида тери лейшманиози билан зарарланган беморларда интерлейкинлар (ИЛ-1, ИЛ-4, ИЛ-6) ўзгаришини аниқлаш учун 2024 йилда тери лейшманиози ташхиси қўйилган 62 нафар беморлар ва 34 нафар соғлом назорат гуруҳи киритилди. Беморларнинг жинс бўйича тақсимооти: 24 нафар ўғил болалар ва 38 нафар қиз болалар. Ёш бўйича тақсимот: 1–5 ёш 17 нафар, 6–10 ёш 23 нафар, 11–15 ёш 9 нафар, 16–20 ёш 8 нафар, 21 ёшдан катталар 5 нафар. Касаллик давомийлиги 1 ойдан 5 ойгача бўлган. Назорат гуруҳи 34 нафар соғлом одамлардан иборат бўлиб, уларда яра ёки паразит мавжудлиги текширилиб, манфий натижа қайд этилган. Назорат гуруҳидаги ёш ва жинс бўйича тақсимот: 1–5 ёш 5 нафар, 6–10 ёш 18 нафар, 11–15 ёш 10 нафар, 16–20 ёш 1 нафар эди.

Тадқиқот объектларидан соғлом одамларда ва тери лейшманиози (ТЛ) билан касалланган беморлардан олинган қон зардоби намуналари иммунофермент таҳлиллар ёрданида текширилган. Интерлейкинларни (ИЛ-1, ИЛ-4, ИЛ-6) ўлчаш даражалари шуни кўрсатадики, учта Цитокинлар ҳам терил лейшманиози билан касалланган беморларда сезиларли даражада ошган (1-жадвал).

1-жадвал

Интерлейкинлар	Ўлчаш диапозони	Соғлом одамларда	Тери лейшманиози беморларда
ИЛ-1	0-300 пг/мл	6,13±0,09	87,4±0,02
ИЛ-4	0-100 пг/мл	7,65±0,05	41,8±0,14
ИЛ-6	0-250 пг/мл	3,3±0,12	56,9±0,07

Жадвалдан кўришиб турибдики, ИЛ-1 соғлом одамларда: 6,13 пг/мл, тери лейшманиозили беморларда: 87,4 пг/мл ни ташкил қилган. ИЛ-1 яллиғланиш жараёнининг эрта босқичида иштирок этадиган асосий про-яллиғланиш Цитокини ҳисобланади. ТЛ беморларда унинг даражаси соғломларга нисбатан деярли 14 баравар юқори. Бу касаллик пайтида кучли яллиғланиш реакцияси ривожланаётганини кўрсатади.

Th2 типдаги иммун жавоб билан боғлиқ Цитокин ҳисобланган ИЛ-4 соғлом одамларда: 7,65 пг/мл, тери лейшманиозили беморларда: 41,8 пг/мл даражани кўрсатган. Тери лейшманиозили беморларда ИЛ-4 даражасининг тахминан 5–6 баравар ошиши организмда Th2 йўлининг кучайганини, яъни ҳужайравий эмас, кўпроқ гуморал жавоб устувор бўлаётганини билдиради. Бу эса лейшманиоз патогенезида касаллик оғирлашишига ҳисса қўшиши мумкин.

Тери лейшманиози узоқ давом этадиган яллиғланишли касаллик бўлганлиги сабабли ИЛ-6 даражаси соғлом одамларда: 3,3 пг/мл, беморларда: 56,9 пг/мл да бўлган. ИЛ-6 ҳам про-яллиғланиш Цитокини ҳисобланади ва кўпинча ўткир фаза оксилларини фаоллаштиради. ТЛ беморларда даражаси 17 баравардан ортиқ ошган. Бу касаллик жараёни давомида кучли тизимли яллиғланиш мавжудлигини кўрсатади.

Учала Цитокиннинг бир вақтда сезиларли ошиши қуйидаги жараёнларни кўрсатади: кучли про-яллиғланиш реакцияси (ИЛ-1 ва ИЛ-6), паразитга жавобан организм яллиғланиш медиаторларини кўп ишлаб чиқармоқда. Бу жараён терининг шишиши, кизариши ва инфильтрация билан кечади. Шу билан бирга бу иккала Цитокинлар даражасининг ортиши даволанишга жавобни ҳам белгилайди. Th2 типдаги иммун жавобнинг кучайиши (ИЛ-4) эса самарасиз ҳужайравий ҳимоя натижасида паразит узоқ вақт тирик қолиши мумкин. Th1/Th2 мувозанатининг бузилиши тери лейшманиозининг сурункали кечишига олиб келади.

Хулоса. Олинган натижалар шуни кўрсатадики, тери лейшманиози беморларида ИЛ-1, ИЛ-4 ва ИЛ-6 даражалари соғлом одамларникига нисбатан сезиларли даражада юқори. Бу ўзгаришлар

касаллик патогенезида кучли яллиғланиш ва Th2 йўналишидаги иммун жавобнинг устуворлигини акс эттиради. Цитокинлар даражасининг бундай ошиши ТЛнинг клиник кўринишлари, тўқима шикастланиши ва касалликнинг давомийлиги билан бевосита боғлиқ бўлиши мумкин. Ушбу маълумотлар диагностика, касаллик оғирлигини баҳолаш ва даволаш стратегиясини танлашда муҳим илмий асос бўлиб хизмат қилади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Latifynia, A., et al. (2023). Inflammation and immune response dynamics in cutaneous leishmaniasis. *Journal of Infectious Diseases and Tropical Medicine*. (Тўлиқ номи базадан олинди).
2. Kariyawasam, K. K., et al. (2018). Assessment of intralesional cytokine profile of cutaneous leishmaniasis caused by *Leishmania donovani* in Sri Lanka. *BMC Infectious Diseases*. [BioMed Central].
3. Ibeas, J., et al. (2016). Pro- and anti-inflammatory cytokines in cutaneous leishmaniasis: a review. *International Journal of Dermatology / PMC*.
4. Maspi, N., et al. (2014). The role of IL-4 and IL-13 in cutaneous leishmaniasis: A review. PubMed, PMID: 24712411.
5. Castellucci, L., et al. (2006). IL6 -174 G/C promoter polymorphism influences susceptibility to mucosal but not localized cutaneous leishmaniasis in Brazil. *The Journal of Infectious Diseases*, 194(4), 519–527. [Oxford Academic].
6. Yalcin, S., et al. (2020). Association of cytokine gene polymorphisms with susceptibility to cutaneous leishmaniasis in a Turkish population. PubMed, PMID: 32456128.
7. WJARR (2024). Evaluation of IL-1 β and IL-6 levels in patients with various stages of cutaneous leishmaniasis. *World Journal of Advanced Research and Reviews*. [Электрон ресурс: wjarr.com].
8. EKB Journal Management System (2025). Comparative analysis of serum IL-6 levels in cutaneous leishmaniasis patients and healthy controls. Egyptian Knowledge Bank.

Иқтибос учун: Саттарова Х.Г. Ўзбекистоннинг марказий вилоятларидаги тери лейшманиози бўлган беморларда цитокинлар даражасидаги ўзгаришлар таҳлили // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси*. – 2026. – № 4(24). – Б. 123–126. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19453700>

ОПВ-МУСБАТ ВА ОПВ-МАНФИЙ БАЧАДОН БЎЙНИ ДИСПЛАЗИЯЛИ БЕМОРА АЁЛЛАРДА ҚИН МИКРОБИОЦЕНОЗИ

Бабаева А.И., Алиева Д.А.

Республика ихтисослаштирилган она ва бола саломатлиги илмий-амалий тиббиёт маркази,
Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. Бачадон бўйни дисплазияси (CIN1) ва қин микробиоценози ўртасидаги ўзаро боғлиқлик, шунингдек ОПВ персистенцияси билан дисбиотик ҳолатлар ўртасидаги ассоциациялар замонавий гинекологияда муҳим аҳамият касб этади. Тадқиқотда CIN1 таъхис қўйилган 120 нафар беморда қин микрофлорасининг сифат ва миқдор таркиби таҳлил қилинди ва улар ОПВ(+) ва ОПВ(-) гуруҳларига ажратилди. Урогенитал тракт биоценози фемофлор, уч нуқтадан суртма ва бактериологик экма орқали баҳоланди. Пробиотик таъсирга эга «биотерол» препарати 60 нафар беморда қўлланиб, 1 ойдан кейинги натижалар баҳоланди. Биотерол қабул қилинганидан сўнг 86,7% беморда патоген флоранинг 3–7 марта камайиши, яллиғланиш кўрсаткичларининг 3–5 марта пасайиши ва урогенитал биоценоз нормаллашув тенденцияси қайд этилди ($p < 0,001$). Қисман самарали гуруҳда (13,3%) патоген флорада ўртача камайиш кузатилган бўлса-да, *Candida spp.* сақланиб қолиши қўшимча даволаш талаб этилишини кўрсатди. Тадқиқот натижаларига кўра, CIN1 ва ОПВ персистенцияси фонида қин микрофлорасидаги дисбиоз дисплазиянинг давом этишига таъсир қилувчи омил сифатида намоён бўлади. Биотерол препарати қин биоценозини барқарорлаштиришида самарали экани аниқланди.

Калит сўзлар: бачадон бўйни дисплазияси (CIN1), қин микробиоценоз, одам папилломавируси (ОПВ), биотерол.

VAGINAL MICROBIOTIC ECOSYSTEM IN WOMEN WITH CERVICAL DYSPLASIA WITH HPV-POSITIVE AND HPV-NEGATIVE STATUS

Babaeva A.I., Alieva D.A.

Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Maternal and Child Health,
Tashkent, Uzbekistan

Resume. The relationship between cervical dysplasia (CIN1) and vaginal microbiocenosis, as well as the associations between dysbiotic conditions and HPV persistence, is of significant importance in modern gynecology. In this study, qualitative and quantitative characteristics of the vaginal microflora were analyzed in 120 patients diagnosed with CIN1, divided into HPV-positive and HPV-negative groups. The assessment of the urogenital biocenosis was performed using the Femoflor test, triple-site vaginal smears, and bacteriological culture. The probiotic drug "Bioterol" was administered to 60 patients, and the results were evaluated after 1 month. After the use of Bioterol, 86.7% of patients demonstrated a 3–7-fold reduction in pathogenic flora, a 3–5-fold decrease in inflammatory markers, and a tendency toward normalization of urogenital biocenosis ($p < 0.001$). In the partially effective group (13.3%), a moderate reduction in pathogenic flora was observed; however, the persistence of *Candida spp.* indicated the need for additional treatment. According to the study results, dysbiosis of the vaginal microflora in the presence of CIN1 and HPV persistence acts as a factor contributing to the continuation of dysplasia. It was established that Bioterol is an effective agent for stabilizing vaginal biocenosis.

Keywords: cervical dysplasia (CIN1), vaginal microbiocenosis, human papillomavirus (HPV), Bioterol.

ВАГИНАЛЬНЫЙ МИКРОБИОЦЕНОЗ У ЖЕНЩИН С ЦЕРВИКАЛЬНОЙ ДИСПЛАЗИЕЙ ПРИ ВПЧ-ПОЛОЖИТЕЛЬНОМ И ВПЧ-ОТРИЦАТЕЛЬНОМ СТАТУСЕ

Бабаева А.И., Алиева Д.А.

Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр здоровья матери и ребёнка, г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. Взаимосвязь между дисплазией шейки матки (CIN1) и состоянием вагинального микробиотического сообщества, а также ассоциации между дисбиотическими состояниями и персистенцией ВПЧ имеют важное значение в современной гинекологии. В исследовании были проанализированы качественные и количественные характеристики вагинальной микрофлоры у 120 пациенток с диагнозом CIN1, разделённых на группы ВПЧ(+) и ВПЧ(-). Оценка урогенитального биоценоза проводилась с

использованием метода «Фемофлор», мазков из трёх точек и бактериологического посева. Препарат «Биотерол», обладающий пробиотическим эффектом, был назначен 60 пациенткам, и результаты оценены через 1 месяц. После применения Биотерола у 86,7% пациенток отмечено снижение патогенной флоры в 3–7 раз, уменьшение показателей воспаления в 3–5 раз и тенденция к нормализации урогенитального биоценоза ($p < 0,001$). В частично эффективной группе (13,3%) наблюдалось умеренное снижение патогенной флоры, однако сохранение *Candida spp.* указывало на необходимость дополнительного лечения. По результатам исследования дисбиоз вагинальной микрофлоры на фоне CIN1 и персистенции ВПЧ проявляется как фактор, влияющий на продолжение дисплазии. Установлено, что препарат Биотерол является эффективным средством для стабилизации вагинального биоценоза.

Ключевые слова: дисплазия шейки матки (CIN1), вагинальный микробиоценоз, вирус папилломы человека (ВПЧ), Биотерол.

Долзарблик. Сурункали яллиғланиш жинсий йўл эпителийининг ўсма ва ўсма олди касалликлари ривожланишидаги этиологик омиллардан бири ҳисобланади [1, 2].

Ҳозирги вақтда бактериал вагиноз (БВ) билан одам папилломавирусининг (ОПВ) цервикал каналда персистенцияси ўртасида корреляция мавжудлиги аниқланган [3, 4]. Тадқиқотларда кўрсатилганидек, кин рН кўтарилиши бир нечта ОПВ турлари билан юқиш хавфини ва 35 ёшгача аёлларда LSIL ривожланиш эҳтимолини оширади [5]. Чет эл тадқиқотчилари маълумотларига кўра, БВ бачадон бўйни дисплазияси вужудга келишининг кофакторларидан бири саналади [6, 8]. Шу билан бирга, J.M. Klover ва ҳаммуаллифларининг маълумотларига кўра [9], бачадон бўйни дисплазияларда анаэроблар орасида энг кўп учрайдиган микроорганизм — *Gardnerella vaginalis* ҳисобланади.

Шартли-патоген бактериялар кин ва бачадон бўйнида юқори концентрацияга эришганда диспластик жараёни келтириб чиқариш ва қўллаб-қувватлаш қобилятига эга бўлгани учун [8, 10], CIN ва ОПВ персистенцияси шароитида кин микрофлорасини ўрганиш — цервикал эпителийининг ўсмага айланиш механизмларини тушунишда муҳим аҳамиятга эга [11, 12]. Кин микробиоценозининг асосий аҳамиятли иштирокчиларини сифат ва микдор жиҳатдан баҳолаш, бачадон бўйни дисплазиялари мавжуд беморларда деструктив даволашдан олдин аниқланган дисбиотик бузилишлар учун дифференциаланган терапия тактикасини ишлаб чиқишга замин яратади.

Тадқиқот мақсади. Бачадон бўйни дисплазияси (CIN1) ташхиси қўйилган беморларда кин микробиоценозининг сифат ва микдор таркибини ўрганиш.

Материал ва усуллар. Гистологик жиҳатдан тасдиқланган CIN 1 ташхиси қўйилган 120 нафар беморда клиник-лаборатория текшируви ўтказилди. Барча беморларда қуйидаги стандарт диагностика чоралари бажарилди: анамнез йиғиш, кин кўзгусида кўрик ва бимануал текширув, суюқлик цитологияси, ОПВ учун ПЦР таҳлили, кенгайтирилган кольпоскопия, бачадон бўйни биоптати гистологик текшируви, фемофлор таҳлили, уч нуктадан суртма олиш, бактериологик эзма экиш текшируви. Кин микробиоценозини ўрганиш учун материал қиннинг орқа-ёни деворидан, ОПВ аниқлаш учун эса цервикал каналдан олинди. Олинган материал 1 мл физиологик эритма билан тўлдирилган Эппендорф пробиркасига жойлаштирилди; материални сақлаш ва ташиш амалдаги меъёрий ҳужжатларга мувофиқ амалга оширилди.

ОПВ аниқлаш ПЦР-РВ усулидан фойдаланган ҳолда амалга оширилди.

Натижаларга кўра, икки гуруҳга ажратилди: 1 гуруҳ ОПВ(+) ва 2 гуруҳ CIN 1 ОПВ(-).

ОПВ натижаларига кўра пациентлар 2 гуруҳга ажратилди: - 1-группа – CIN 1 ОПВ-манфий бўлган 60 нафар беморлар; - 2-группа – CIN 1 ОПВ-мусбат бўлган 60 нафар беморлар.

Назорат гуруҳи – ПЦР-РВ бўйича ОПВ аниқланмаган ва бачадон бўйни визуал жиҳатдан ўзгармаган 96 нафар аёлдан иборат бўлиб, профилактик кўрик учун мурожаат қилган.

Асосий ва назорат гуруҳлари 21 ёшдан 49 ёшгача бўлган ёш бўйича солиштира бўлган. Барча иштирокчиларнинг ўртача ёши $28,3 \pm 6,35$ ёшни ташкил қилди.

Статистик таҳлил Олинган натижаларнинг статистик таҳлили Microsoft Word 2016 ва Microsoft Office Excel – 2023 электрон жадвал процессори ёрдамида амалга оширилди. Ўрганилаётган кўрсаткичнинг арфиметик ўрта қиймати (M), ўртача хатолиги (m) ва нисбий катталиклари (фоиз, %) ҳисоблаб чиқилди. Ўртача қийматларни таққослашда олинган натижаларнинг статистик аҳамиятлилиги Студент t-критерийси бўйича баҳоланди ва эҳтимолий хатолик даражаси p қиймати орқали аниқланди. Аҳамият даражаси $p < 0,05$ – аҳамиятли, $p < 0,005$ – жуда аҳамиятли, $p < 0,001$ – юқори аҳамиятли деб баҳоланди.

Натижалар ва муҳокама. Кин микробиоценоз тузилиши таҳлили фемофлор, уч нуктадан суртма олиш, бактериологик эзма экиш текширувлари гуруҳлар орасида биринчи ва қайта 1 ойдан

кейинги теширувларда сезиларли фарқлар мавжудлигини кўрсатди.

Қин микрофлорасини нормаллаштириш ва дисплазияни даволаш жараёнида инфекция ва яллиғланиш омилларни камайтириш мақсадида, пробиотик таъсирга эга препарат биотерол капсуласи таклиф этилган. Шунга кўра, асосий гуруҳ 60 нафар биотерол препаратини қабул қилишдан олдинги беморлар ҳамда қабул қилинган препаратнинг таъсир самарадорлиги юқори ва пастлигига қараб, 1 ва 2 гуруҳларга бўлинган: 1 гуруҳга препарат қабул қилингандан сўнг, таъсир самарадорлиги юқори 52(86,7%) нафар беморлар, 2 гуруҳни эса қолган 8(13,3%) нафар препаратни қабул қилинганидан сўнг, таъсир самарадорлиги паст беморлар ташкил этди.

Асосий гуруҳ ҳамда 1 ва 2 гуруҳ беморларида қайта текширувлар яъни, урогенитал тракт биоценозини фемофлор анализи, уч нуктадан суртма олиш, қиндан бактериологик экма экиш 1 ой ўтгач таққослаш амалга оширилди. 1-жадвалда қайта урогенитал тракт биоценозини фемофлор таҳлил натижалари келтирилган.

1-жадвал

Биотерол препарати қабул қилишдан олдин ва кейин урогенитал тракт биоценозини тадқиқ қилиш фемофлор таҳлили қиёсий тавсифи ($M \pm m$), %

Беморлар гурухи	Lactobacillus spp.		Gardnerella vaginalis		Candida spp.		Ureaplasma		Mycoplasma	
Биотерол препаратини қабул қилишдан олдин										
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Асосий гурух (n=60)	33	55,0±6,5	36	60,0±6,4	49	81,7±5,0	47	78,3±5,4	51	85,0±4,6
1 ойдан сўнг										
1 гурух препарат қабул қилгандан кейин ижобий самарали (n= 52)	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
	12	23,1±5,9 **^^^	10	19,2±5,5 ***^^	15	28,8±6,3 ***^^	8	15,4±5,1 ***^^	10	19,2±5,5 ***^^
2 гурух препарат қабул қилгандан кейин қисман самарали (n= 8)	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
	4	50,0±18,9 ***	4	50,0±18,9 ***	6	75,0±16,4 ***	5	62,5±18,3 ***	5	62,5±18,3 ***

Изоҳ: **-p<0,01, ***-p<0,001–назорат гуруҳи билан солиштирилган фарқлар ишончилиги; ^-p<0,05– 1 ва 2-гуруҳлар ўртасидаги фарқларнинг ишончилиги;

Асосий гуруҳ (n=60) беморларда биотерол қабул қилишдан олдин қин микробиоценозида дисбиозга хос патоген флоранинг юқори частотаси аниқланди: Gardnerella vaginalis – 36(60,0±6,4%), Candida spp. – 49(81,7±5,0%), Ureaplasma – 47(78,3±5,4%), Micoplasma – 51(85,0±4,6%). Шу билан бирга, нормобиота ва химоячи флора ҳисобланган Lactobacillus spp. даражаси паст бўлган – 33(55,0±6,5%). Препарат қабул қилинганидан 1 ой ўтгач, самарали жавоб қайтарган 1 гуруҳ (n=52)да патоген флора сезиларли даражада камайди: Gardnerella vaginalis – 10(19,2±5,5%), Candida spp. – 15(28,8±6,3%), Ureaplasma – 8(15,4±5,1%), Micoplasma – 10(19,2±5,5%). Бу кўрсаткичлар дастлабки ҳолатга нисбатан 3–5 марта камайган эканлиги аниқланди, p<0,001. Lactobacillus spp. сони эса 33(55,0%)дан 12(23,1±5,9%)гача тушган бўлса-да, бу ҳолат яллиғланиш пасайиши ва патоген флора йўқолиши билан боғлиқ бўлиб, тикланиш даврида нормобиотанинг кейинги ойлarda қайта ошиши кутилган ҳолат ҳисобланади, p<0,05. Қисман клиник самара кузатилган 2 гуруҳ (n=8)да патоген флоранинг камайиши етарли даражада эмас: Gardnerella vaginalis ва Lactobacillus spp.– 4(50,0±18,9%), Candida spp.–6(75,0±16,4%), Ureaplasma ва Micoplasma– 5(62,5±18,3%). Бу кўрсаткичлар биотеролнинг тўлиқ самарасига эришиш учун қўшимча курс ёки даволаш тактикасини қайта кўриб чиқиш зарурлигини кўрсатади, p<0,05.

Бундан ташқари, уч нуктадан олинган суртма текшируви натижалари таҳлил қилинди. Унга кўра, асосий гуруҳ (n=60) беморларда биотерол қабул қилишдан олдин яллиғланиш ва патоген флоринг юқори даражаси аниқланган эди. Лейкоцитлар кинда 56(93,3±3,2%), бачадон бўйнида 56(93,3±3,2%) ва уретрада 56(93,3±3,2%) ҳолатда қайд этилди. Эпителлий хужайралари кинда 48(80,0±5,2%), бачадон бўйнида 44(73,3±5,8%), уретрада 50(83,3±4,9%), шиллиқлар эса мос равишда 42(70,0±5,9%), 48(80,0±5,2%) ва 54(90,0±3,9%) ҳолатда топилди. Замбуруғлар кинда 55(91,7±3,6%), бачадон бўйнида 48(80,0±5,2%), уретрада 46(76,7±5,5%), трихомонадалар эса 16(26,7±5,8%), 18(30,0±5,9%) ва 3(5,0±2,8%) ҳолатда учради. Препарат қабул қилинганидан 1 ой ўтгач, самарали жавоб қайтарган 1 гуруҳ (n=52)да яллиғланиш белгилари кескин камайди: лейкоцитлар кинда 11(21,1±5,7%), бачадон бўйнида 5(9,6±4,1%), уретрада 13(25,0±6,1%)гача пасайди, p<0,001. Эпителлий хужайралари ва шиллиқлар кўрсаткичлари ҳам 3–4 баробар камайиб, кинда 14(26,9±5,2%) ва 9(17,3±5,3%) ни ташкил этди. Замбуруғлар кинда 15(28,8±6,3%), бачадон бўйнида 16(30,8±6,5%), уретрада 11(21,1±5,7%)га тушди. Трихомонадалар эса деярли 3 марта камайиб, кинда 6(11,5±4,5%), бачадон бўйнида 4(7,7±3,7%), уретрада 2(3,8±7,2%) ҳолатда учради, p<0,001.

Қисман самара кўрсатган 2 гуруҳда (n=8) ҳам муайян ижобий динамика кузатилди: лейкоцитлар кинда 4(50,0±18,9%), бачадон бўйнида 3(37,5±18,3%), уретрада 5(62,5±18,3%)га тушган. Эпителлий хужайралари ва шиллиқлар кўрсаткичлари 25–62% диапазонида камайди, аммо замбуруғлар юқори даражада сақланиб қолган: кинда 7(87,5±12,5%), бачадон бўйнида 6(75,0±16,4%), уретрада 5(62,5±18,3%). Трихомонадалар эса 1–2 ҳолатдан ортиқ учрамади.

Шунга биноан, биотерол препарати яллиғланиш белгиларини 3–5 мартага, патоген флорани эса 3–7 мартага камайтирган бўлиб, гуруҳлар ўртасидаги фарқ статистик жиҳатдан ишончли деб топилди, p<0,001–0,05. Асосий гуруҳ ҳамда 1 ва 2 гуруҳ беморлардан биотерол препарати қабул қилишдан олдин ва кейин қиндан бактериологик экма экиш таҳлили қиёсий тавсифи натижаларига кўра, биотерол препаратини қабул қилишдан олдин асосий гуруҳ аёлларининг аксариятида қин биоценози сезиларли даражада бузилган бўлиб, Streptococci 38(63,3±6,3%), Enterococci 42(70,0±5,9%), Staphylococci 32(53,3±6,5%), Enterobacteriaceae 35(58,3±6,4%) ва Candida 55(91,7±3,6%) ҳолатлари қайд этилган (жадвал 2.).

2-жадвал

Биотерол препарати қабул қилишдан олдин ва кейин қиндан бактериологик экма экиш таҳли-
ли қиёсий тавсифи (M±m), %

Беморлар гуруҳи	Streptococcic		Enterococci		Staphylococci		Enterobacteriaceae		Candida	
Биотерол препаратини қабул қилишдан олдин										
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Асосий гуруҳ (n=60)	38	63,3±6,3	42	70,0±5,9	32	53,3±6,5	35	58,3±6,4	55	91,7±3,6
1 ойдан сўнг										
1 гуруҳ препарат қабул қилгандан кейин ижобий самарали (n= 52)	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
	11	21,1±5,7 ***^	8	15,4±25,5 ***^	4	7,7±3,7 ***^	9	17,3±5,3 ***^	7	13,5±4,8 ***^
2 гуруҳ препарат қабул қилгандан кейин қисман самарали (n= 8)	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
	1	12,5±12,5 ***	3	37,5±18,3 ***	2	25,0±16,4 ***	3	37,5±18,3 ***	2	25,0±16,4 ***

Изоҳ:***-p<0,001–назорат гуруҳи билан солиштирилган фарқлар ишончлилиги; ^-p<0,05, ^-p<0,01– 1 ва 2-гуруҳлар ўртасидаги фарқларнинг ишончлилиги;

Препарат қабул қилинганидан 1 ой ўтгандан кейин микробиологик кўрсаткичларда кескин ижобий ўзгариш кузатилди. Асосий гуруҳнинг самарали жавоб берган 1 гуруҳида (n=52) Streptococci 11(21,1±5,7%), Enterococci 8(15,4±5,5%), Staphylococci 4(7,7±3,7%), Enterobacteriaceae 9(17,3±5,3%) ва Candida 7(13,5±4,8%) гача пасайди, p<0,001.

Кам самара кўрсатган 2 гуруҳда (n=8) ҳам микроорганизмлар частотасида моддий камайиш кузатилди: Streptococci 1(12,5±12,5%), Enterococci 3(37,5±18,3%), Staphylococci 2(25,0±16,4%), Enterobacteriaceae 3(37,5±18,3%) ва Candida 2(25,0±16,4%), p<0,05 ва p<0,01.

Умумий таҳлил натижаларига кўра, биотерол препарати қин микробиоценозидаги патоген флорани 3–7 баробар камайтирган, барча кўрсаткичлар бўйича аҳамиятли фарқ аниқланди, p<0,001.

Хулосалар:

1. CIN1 беморларида қин микробиоценозининг сезиларли даражада бузилганлиги, жумладан *Gardnerella vaginalis*, *Candida* spp., *Ureaplasma* ва *Mycoplasma* юқори частотада учраши аниқлик киритди.

2. ОПВ персистенцияси билан дисбиотик ҳолат ўртасида кучли боғлиқлик мавжуд бўлиб, бу дисплазия ривож ва сақланиб қолиши учун кофактор сифатида намоён бўлади.

3. Биотерол препарати патоген флорани 3–7 марта, яллиғланиш кўрсаткичларини эса 3–5 марта камайтириб, урогенитал биоценозни барқарорлаштиришда юқори самара кўрсатди (p<0,001).

4. Қисман самарали ҳолатларда қўшимча курс ёки даволаш тактикасын қайта кўриб чиқиш зарурлиги аниқланди, айниқса *Candida* spp. сақланиб қолган беморларда.

Адабиётлар рўйхати:

1. Brotman RM. Vaginal microbiome and sexually transmitted infections: an epidemiologic perspective. J Clin Invest. 2022.
2. Mitra A, et al. The vaginal microbiota, human papillomavirus infection and cervical intraepithelial neoplasia. Clin Microbiol Infect. 2021.
3. Laniewski P, et al. The microbiome and HPV persistence. Nat Rev Urol. 2020.
4. Clarke MA, et al. Vaginal microbiota and HPV natural history. Lancet Infect Dis. 2021.
5. Edwards VL, et al. Influence of vaginal pH on HPV infection risk. PLoS One. 2019.
6. Borgogna JLC, et al. Bacterial vaginosis as a co-factor in cervical neoplasia. Front Cell Infect Microbiol. 2020.
7. Ziklo N, et al. Microbiome and cervical cancer development. Int J Cancer. 2019.
8. Kwasniewski W, et al. Anaerobic bacteria and cervical dysplasia. BMC Infect Dis. 2018.
9. Klomp JM, et al. Anaerobes and Gardnerella vaginalis in cervical pathology. J Low Genit Tract Dis. 2017.
10. Petricevic L, et al. Probiotics and vaginal microbiome restoration. Arch Gynecol Obstet. 2016.
11. Киселёва Е.И., Спиридонова М.Г., Сухих Г.Т. Роль микробиоценоза влагалища в развитии патологии шейки матки. Акушерство и гинекология. – 2018. – №7. – С.34-40.
12. Савичева А.М., Мальцева Н.И., Беженарь В.Ф. Бактериальный вагиноз и ассоциированные инфекции: влияние на течение заболевания шейки матки. Журнал акушерства и женских болезней. – 2020. – Т.69, №4. – С.65-63.

Иктибос учун: Бабаева А.И., Алиева Д.А. ОПВ-мусбат ва ОПВ-манфий бачадон бўйни дисплазияли бемор аёлларда қин микробиоценози // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2026. – № 4(24). – Б. 127–131. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19453760>

ПУЛЬС-ТЕРАПИЯ ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОИДАМИ: КЛИНИКО-ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ**Азимбегова С.Н.**

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Пульс-терапия глюкокортикостероидами представляет собой методика внутривенного введения высоких доз глюкокортикостероидов (ГКС) короткими курсами с целью быстрого подавления выраженного воспалительного процесса. Данная стратегия широко используется при острых обострениях системных аутоиммунных заболеваний, тяжёлых формах ревматоидного артрита, системной красной волчанки, васкулитов и при тяжёлых обострениях бронхиальной астмы. В статье представлены фармакологические основы пульс-терапии, её клиническая эффективность, сравнительный анализ различных схем введения, особенности безопасности и современные рекомендации.

Ключевые слова: глюкокортикостероиды, пульс-терапия, аутоиммунные заболевания, ревматология, фармакология.

GLUCOCORTICOSTEROID PULSE THERAPY: A CLINICAL AND PHARMACOLOGIC ANALYSIS**Azimbegova S.N.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Pulse therapy with glucocorticosteroids involves the intravenous administration of high doses of corticosteroids in short courses to rapidly suppress severe inflammation. This approach is commonly used in acute exacerbations of systemic autoimmune diseases, severe rheumatoid arthritis, systemic lupus erythematosus, vasculitis, and severe asthma attacks. The article discusses the pharmacological basis of pulse therapy, clinical efficacy, comparative analysis of dosing regimens, safety considerations, and current guidelines.

Keywords: glucocorticosteroids, pulse therapy, autoimmune diseases, rheumatology, pharmacology.

ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОИД ПУЛЬС ТЕРАПИЯСИ: КЛИНИК ВА ФАРМАКОЛОГИК ТАҲЛИЛ**Азимбегова С.Н.**

Самарканд давлат тиббиёт университети, Самарканд ш., Ўзбекистон

Резюме. Глюкокортикостероидлар билан пулс-терапия – бу юқори дозаларда стероидларни қисқа курсларда томир ичига киритиши орқали оғир яллиғланиш жараёнларини тезда бостириши усулидир. Ушбу стратегия тизимли аутоиммун касалликларнинг оғир чиққан ҳолатлари, ревматоид артритнинг жиддий шакллари, системик қизил юғурик касаллиги, васкулитлар ва астма оғир хуружларини даволашда кенг қўлланилади. Мақолада пулс-терапиянинг фармакологик асослари, клиник самарадорлиги, турли дозалаш схемалари, хавфсизлик хусусиятлари ва замонавий тавсиялар келтирилган.

Калит сўзлар: глюкокортикостероидлар, пульс-терапия, аутоиммун касалликлар, ревматология, фармакология.

azimbekovasilitora1993@gmail.com

Введение. Историческое применение глюкокортикоидов насчитывается на сегодняшний день более полувека и является прорывом в лечении системных воспалительных заболеваний. Внутривенное введение высоких доз глюкокортикоидов (пульс-терапия) служит эффективным методом лечения при состояниях, требующих быстрой иммуносупрессии и противовоспалительного эффекта при таких ревматических заболеваниях, как системная красная волчанка, ревматоидный артрит, гломерулонефриты и системный васкулиты [9,10].

Глюкокортикостероиды (ГКС) — мощные противовоспалительные и иммунодепрессивные препараты, применяемые при широком спектре патологий [1].

Пульс-терапия была разработана для: - быстрого подавления системного воспаления; - минимизации длительного воздействия высоких доз пероральных ГКС; - снижения риска хронических осложнений [2].

Наиболее частые показания: - острые обострения системной красной волчанки; - тяжёлые формы ревматоидного артрита; - тяжёлые обострения бронхиальной астмы; - васкулиты и острые миозитные синдромы [3].

Цель исследования. Провести клинико-фармакологический анализ пульс-терапии ГКС, оценить эффективность, безопасность и оптимальные схемы введения.

Материалы и методы:

- Анализ рекомендаций EULAR, ACR, WHO;
- Систематический обзор рандомизированных и ретроспективных исследований;
- Сравнение различных схем пульс-терапии (метилпреднизолон, дексаметазон, гидрокортизон);
- Оценка клинических исходов: снижение активности заболевания, купирование воспаления, побочные эффекты [4].

Методы: сравнительный, аналитический, синтетический.

Фармакологические основы пульс-терапии: - Высокие дозы ГКС обеспечивают быстрое угнетение активности Т- и В-лимфоцитов; - Уменьшается продукция цитокинов (IL-1, IL-6, TNF-α); - Усиливается апоптоз активированных иммунных клеток [5].

Схемы применения: - метилпреднизолон 500–1000 мг/сут, внутривенно 3–5 дней; - дексаметазон 100–200 мг, внутривенно 3 дня; - гидрокортизон 1–2 г/сут в 2–3 введения.

Таблица №1

Сравнительная характеристика схем

Препарат	Доза	Курс	Основные преимущества	Ограничения
Метилпреднизолон	500–1000 мг/сут	3–5 дней	Хорошо изучен, быстро снижает воспаление	Кардиотоксичность, гипергликемия
Дексаметазон	100–200 мг/сут	3 дня	Сильный противовоспалительный эффект	Повышает риск психозов
Гидрокортизон	1–2 г/сут	2–3 дня	Быстрое купирование острых симптомов	Более слабое иммунодепрессивное действие

Результаты и обсуждение.

Эффективность: - Быстрое снижение активности заболевания и воспалительных маркеров (CRP, ESR); - Улучшение клинических симптомов уже после 1–2 введений.

Безопасность: - Основные побочные эффекты: гипергликемия, артериальная гипертензия, электролитные нарушения, психические реакции; - Риск осложнений увеличивается при комбинированной терапии с другими иммуносупрессорами.

Долгосрочные результаты: - Пульс-терапия позволяет уменьшить потребность в длительном приёме высоких доз пероральных ГКС; - Снижает риск хронических осложнений (остеопороз, катаракта).

Сравнение различных препаратов: - Метилпреднизолон остаётся стандартом для большинства аутоиммунных обострений; - Дексаметазон эффективен при тяжёлых системных реакциях, но требует контроля психических функций; - Гидрокортизон предпочтителен при необходимости быстро купировать шоковые состояния.

Клинические рекомендации: - Инициировать пульс-терапию при выраженной активности заболевания; - Контролировать глюкозу, давление, электролиты; - Использовать минимально эффективную дозу для достижения клинического эффекта[7].

Выводы. Пульс-терапия ГКС — эффективный метод быстрого подавления острого воспалительного процесса. Выбор препарата и дозы зависит от тяжести заболевания, сопутствующих патологий и риска побочных эффектов. Пульс-терапия снижает необходимость длительной высокодозной пероральной терапии. Необходим строгий мониторинг состояния пациента во время терапии. Дальнейшие исследования направлены на оптимизацию схем и снижение побочных эффектов.

Список литературы:

1. Furst D.E., et al. Pulse therapy with glucocorticosteroids in autoimmune diseases // *Arthritis Rheum.* – 1990. – Vol. 33. – P. 105–115.
2. Hochberg M.C., et al. Guidelines for glucocorticoid therapy in rheumatic diseases // *Ann Rheum Dis.* – 2019. – Vol. 78, № 5. – P. 557–570.
3. Buttgerit F., et al. Pulse therapy in systemic lupus erythematosus // *Clin Exp Rheumatol.* – 2005. – Vol. 23. – P. 113–120.
4. American College of Rheumatology. Glucocorticoid use in rheumatic disease guidelines. – 2021.
5. Strehl C., et al. Mechanisms of action of glucocorticoid pulse therapy // *Arthritis Res Ther.* – 2012. – Vol. 14. – P. 1–10.
6. Lightfoot R.W., et al. Vasculitis and pulse therapy: clinical outcomes // *J Rheumatol.* – 1997. – Vol. 24. – P. 1775–1782.
7. Buttgerit F., et al. Standardization of glucocorticoid pulse therapy // *Ann Rheum Dis.* – 2004. – Vol. 63. – P. 899–903.
8. Lauwerys B.R., et al. High-dose corticosteroid therapy in autoimmune diseases // *Autoimmun Rev.* – 2003. – Vol. 2. – P. 97–102.
9. Aringer M., et al. EULAR recommendations for systemic lupus erythematosus // *Ann Rheum Dis.* – 2019. – Vol. 78. – P. 736–745.
10. Van Vollenhoven R.F., et al. Long-term safety of pulse therapy // *Arthritis Care Res.* – 2010. – Vol. 62. – P. 318–326.
11. Saag K.G., et al. Glucocorticoid therapy: effects on bone and metabolism // *Arthritis Rheum.* – 1998. – Vol. 41. – P. 1120–1130.
12. Cupps T.R., Fauci A.S. Corticosteroid therapy: mechanisms and clinical considerations // *J Allergy Clin Immunol.* – 1982. – Vol. 69. – P. 101–115.
13. Hahnel C., et al. Monitoring safety of high-dose steroids // *Clin Exp Rheumatol.* – 2001. – Vol. 19. – P. 115–120.
14. Mok C.C., et al. Pulse methylprednisolone in lupus nephritis // *Nephrol Dial Transplant.* – 2000. – Vol. 15. – P. 1490–1495.
15. Lightfoot R.W., et al. Effectiveness of IV corticosteroids in vasculitis // *Arthritis Rheum.* – 1991. – Vol. 34. – P. 1343–1349.
16. Salmon J.E., et al. Immunologic mechanisms of glucocorticoids // *Curr Opin Rheumatol.* – 1998. – Vol. 10. – P. 363–371.
17. Curtis J.R., et al. Cardiovascular risks of pulse steroid therapy // *Arthritis Rheum.* – 2006. – Vol. 55. – P. 296–304.
18. Zonana-Nacach A., et al. Safety of high-dose IV corticosteroids // *Arthritis Rheum.* – 2000. – Vol. 43. – P. 1820–1829.
19. Fardet L., et al. Complications of corticosteroid therapy // *Rev Med Interne.* – 2007. – Vol. 28. – P. 201–210.
20. Strehl C., et al. Consensus on pulse therapy regimens // *Rheumatology (Oxford).* – 2013. – Vol. 52. – P. 1494–1502.

Для цитирования: Азимбегова С.Н. Пульс-терапия глюкокортикостероидами: клинико-фармакологический анализ // *Вестник фундаментальной и клинической медицины.* – 2026. – № 4(24). – С. 132–134. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19453831>

**САМАРҚАНД ВИЛОЯТИ ФУТБОЛ АКАДЕМИЯСИДА ТИЗЗА БЎҒИМИ ЖАРОХАТЛАРИ
МАВЖУД ФУТБОЛЧИЛАРДА РЕАБИЛИТАЦИЯ ДАСТУРИНИ БАХОЛАШ ВА
ТАКОМИЛЛАШТИРИШ**

Анваров А.А., Хайдарова С.Х.

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш, Ўзбекистон

***Резюме.** Ушбу тадқиқотда Самарқанд вилояти футбол академиясида тизза бўғими жароҳатлари мавжуд футболчиларда реабилитация дастурининг самарадорлиги баҳоланди ва уни такомиллаштириш йўллари ишлаб чиқилди. Тадқиқотда 12–18 ёшли 30 нафар футболчи иштирок этди. Уларда клиник ва функционал текиширув усуллари қўлланилди. Реабилитация дастури терапевтик жисмоний машқлар, физиотерапия, массаж ва замонавий тикланиш усуллари ўз ичига олди. Натижалар шунини кўрсатдики, комплекс ёндашув қўлланилганда оғриқ синдроми камайди, бўғим ҳаракатчанлиги ошди ва жисмоний иш қobiliяти тикланди. Тадқиқот натижалари реабилитация дастурини индивидуаллаштириш муҳим аҳамиятга эга эканлигини кўрсатди.*

***Калим сўзлар:** тизза бўғими, жароҳат, футболчилар, реабилитация, физиотерапия, тикланиш*

**ASSESSMENT AND IMPROVEMENT OF THE REHABILITATION PROGRAM FOR
FOOTBALL PLAYERS WITH KNEE JOINT INJURIES AT THE SAMARKAND REGION
FOOTBALL ACADEMY**

Anvarov A.A. , Khaydarova S.Kh.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

***Resume.** In this study, the effectiveness of the rehabilitation program for football players with knee joint injuries at the Samarkand Regional Football Academy was assessed, and ways to improve it were developed. 30 football players aged 12-18 participated in the study. Clinical and functional research methods were used in them. The rehabilitation program included therapeutic exercises, physiotherapy, massage, and modern recovery methods. The results showed that with a comprehensive approach, pain syndrome decreased, joint mobility increased, and physical work capacity was restored. The research results showed the importance of individualizing the rehabilitation program.*

***Keywords:** knee joint, injury, football players, rehabilitation, physiotherapy, recovery*

**ОЦЕНКА И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОГРАММЫ РЕАБИЛИТАЦИИ ФУТБОЛИСТОВ С
ТРАВМАМИ КОЛЕННОГО СУСТАВА В ФУТБОЛЬНОЙ АКАДЕМИИ САМАРКАНДСКОЙ
ОБЛАСТИ**

Анваров А.А. , Хайдарова С.Х.

Самаркандский государственный медицинский университет, г.Самарканд, Узбекистан

***Резюме.** В данном исследовании была оценена эффективность программы реабилитации футболистов с травмами коленного сустава в Самаркандской областной футбольной академии и разработаны пути ее совершенствования. В исследовании приняли участие 30 футболистов в возрасте 12-18 лет. Применялись клинко-функциональные методы исследования. Программа реабилитации включала в себя лечебную физкультуру, физиотерапию, массаж и современные методы восстановления. Результаты показали, что при применении комплексного подхода снижался болевой синдром, повышалась подвижность суставов и восстанавливалась физическая работоспособность. Результаты исследования показали важность индивидуализации программы реабилитации.*

***Ключевые слова:** коленный сустав, травма, футболисты, реабилитация, физиотерапия, восстановление*

e-mail : abdumannonanvarov@gmail.com

Кириш. Сўнгги йилларда футбол жаҳон миқёсида энг оммавий ва юқори интенсивликка эга спорт турларидан бирига айланди. Замонавий футболчилардан юқори тезлик, куч ва чидамлилиқ та-

лаб этилади, бу эса улар организмига, айниқса таянч-ҳаракат аппаратига катта юклама тушишига олиб келади [1].

Футбол ўйини давомида югуриш, кескин тўхташ, сакраш ва ҳаракат йўналишини ўзгартириш каби ҳаракатлар тизза бўғимига юқори механик таъсир кўрсатади. Шу сабабли ушбу бўғим футболчиларда энг кўп жароҳатланидиган анатомик структуралардан бири ҳисобланади [2].

Илмий тадқиқотларга кўра, футболчиларда кузатиладиган барча жароҳатларнинг 30–50 % и тизза бўғими билан боғлиқ [3]. Айниқса, олд крестсимон боғлам (ACL) жароҳатлари, мениск шикастланишлари ва боғлам аппарати жароҳатлари кенг тарқалган [4].

Ekstrand ва ҳамкорлари томонидан ўтказилган тадқиқотларда ҳар 1000 соатлик ўйин фаолиятига ўртача 6–9 та жароҳат тўғри келиши аниқланган [5]. Бу кўрсаткич футболнинг юқори травматик спорт тури эканлигини тасдиқлайди.

Брукнер ва Хан маълумотларига кўра, реабилитация жараёни етарли даражада ташкил этилмаган ҳолларда қайта жароҳатланиш хавфи 20–40 % гача ошади [6]. Шу сабабли тизза бўғими жароҳатларида самарали реабилитация дастурларини ишлаб чиқиш долзарб масалалардан бири ҳисобланади.

Замонавий спорт тиббиётида реабилитация жараёни нафақат анатомик тикланиш, балки функционал ҳолатни тўлиқ тиклаш, мушак кучини ошириш ва нейромушак назоратини яхшилашга қаратилган комплекс жараён сифатида қаралади [7].

Адабиётлар таҳлили. Сўнгги йилларда тизза бўғими жароҳатлари ва уларни реабилитация қилиш масалалари кенг ўрганилмоқда. Илмий манбалар таҳлили ушбу муаммони ҳал этишда комплекс ёндашув муҳим аҳамиятга эга эканлигини кўрсатади.

Ekstrand ва ҳамкорлари тадқиқотларига кўра, профессионал футболчиларда тизза бўғими жароҳатлари улуши 35–45 % ни ташкил этади [5]. Шунингдек, мушак ва боғлам жароҳатларининг 20–30 % и нотўғри реабилитация билан боғлиқ эканлиги қайд этилган [8].

Hewett тадқиқотларида нейромушак назоратининг бузилиши ACL жароҳатларининг асосий сабабларидан бири эканлиги аниқланган. Муаллиф маълумотларига кўра, махсус машқлар ушбу жароҳатлар хавфини 50–60 % гача камайтириш имконини беради [9].

Kisner ва Colby маълумотларига кўра, терапевтик жисмоний машқлар мушак кучини тиклашда 70–80 % самарадорликка эга [10]. Шу билан бирга, проприоцептив машқлар бўғим барқарорлигини яхшилайдди.

McArdle ва ҳамкорлари мушаклардаги энергетик жараёнлар бузилиши чарчоқ ва функционал пасайишга олиб келишини таъкидлайди [11]. Бу ҳолат бўғим барқарорлигини пасайтиради ва жароҳат хавфини оширади.

Platonov тадқиқотларида тикланиш жараёнларини етарли ташкил этмаслик спорт натижаларининг пасайишига ва жароҳатлар хавфининг ошишига олиб келиши кўрсатилган [12].

Issurin блок периодизация модели орқали машғулот ва тикланиш мувозанатини сақлаш муҳимлигини асослаб берган [13].

Halson тадқиқотларида машғулот юкласини мониторинг қилиш орқали чарчоқни назорат қилиш ва жароҳатларни олдини олиш мумкинлиги таъкидланган [14].

Bahr ва Engebretsen маълумотларига кўра, профилактик дастурлар қўлланилганда жароҳатлар сони 30–40 % га камайтирилади [15].

Meeusen ва ҳамкорлари ортиқча юклама марказий нерв тизимига таъсир қилиб, координация ва реакцияни пасайтиришини кўрсатган [16].

Armstrong тадқиқотларида гормонал ўзгаришлар тикланиш жараёнига салбий таъсир кўрсатиши қайд этилган [17].

Kremer ва Schwartz маълумотларига кўра, комплекс реабилитация дастурлари тикланиш муддатини 20–25 % га қисқартиради [18].

Сўнгги тадқиқотларда криотерапия ва кинезиотейпинг каби замонавий усуллар қўлланилиши оғриқни камайтириш ва функционал тикланишни тезлаштиришда самарали эканлиги кўрсатилган [19].

Шу тариқа, адабиётлар таҳлили шуни кўрсатадики, тизза бўғими жароҳатларида реабилитация жараёнини самарали ташкил этиш учун комплекс, босқичли ва индивидуал ёндашув талаб этилади.

Тадқиқот материаллари ва усуллари. Тадқиқотда 12–18 ёшли 30 нафар футболчи иштирок этди. Барча иштирокчиларда тизза бўғими жароҳатлари аниқланган.

Қўлланилган усуллар:

- Клиник кўрик
- Гониометрия

- VAS шкаласи
- Функционал тестлар
- Статистик таҳлил ($M \pm m$, %)

Реабилитация дастури. Реабилитация дастури 4 ҳафта давомида амалга оширилди ва қуйидагиларни ўз ичига олди:

1. ЛФК: изометрик ва динамик машқлар
2. Физиотерапия: УЗИ, электростимуляция
3. Массаж: миофасциал релиз
4. Қўшимча: криотерапия, кинезиотейпинг

Реабилитация самарадорлигини баҳолаш. Тадқиқот натижалари шуни кўрсатдики, қўлланилган комплекс реабилитация дастури футболчиларнинг функционал ҳолатига ижобий таъсир кўрсатди.

Таҳлил жараёнида асосий клиник ва функционал кўрсаткичлар баҳоланди.


1-жадвал

Реабилитация самарадорлиги кўрсаткичлари

Кўрсаткич	Даволашдан олдин ($M \pm m$)	Даволашдан кейин ($M \pm m$)	Ўзгариш (%)
Оғриқ (VAS)	7.5 ± 0.4	2.1 ± 0.3	↓ 72 %
Ҳаракат амплитудаси	60 ± 5 %	90 ± 4 %	↑ 50 %
Мушак кучи	3.0 ± 0.3 балл	4.5 ± 0.2 балл	↑ 40 %
Функционал тест	55 ± 6 %	85 ± 5 %	↑ 54 %

Олинган натижаларга қўра:


- оғриқ даражаси сезиларли камайди ($p < 0.05$)
- бўғим ҳаракатчанлиги тикланди
- мушак кучи ошди
- функционал ҳолат яхшиланди



1-расм. Реабилитация натижалари (олдин ва кейин)

Графикда кўриниб турибдики:

- оғриқ кескин пасайган
- функционал кўрсаткичлар барқарор ўсган
- реабилитация динамикаси ижобий



2-расм. Реабилитация самарадорлиги

Муҳокама. Олинган натижалар замонавий илмий тадқиқотлар билан мувофиқ келади. Тадқиқотда қўлланилган комплекс реабилитация дастури футболчиларда тизза бўғими функциясини тиклашда юқори самарадорликка эга эканлиги аниқланди.

Kisner ва Colby маълумотларида келтирилганидек, терапевтик машқлар мушак кучини тиклашда асосий омил ҳисобланади. Бизнинг тадқиқотда ҳам мушак кучи 40 % га ошгани ушбу маълумотларни тасдиқлайди.

Hewett тадқиқотларида нейромусхак машқлари ACL жароҳатларини камайтириши қайд этилган. Бизда ҳам функционал тест кўрсаткичларининг 50 % дан ортиқ яхшиланиши нейромусхак адаптациянинг самарали кечганини кўрсатади.

McArdle маълумотларига кўра, мушак чарчоқи ва метаболик ўзгаришлар тикланиш жараёнига таъсир қилади. Бизнинг тадқиқотда оғриқнинг 70 % га камайтириши ва функциянинг ошиши метаболик тикланиш жараёнига яхшиланганини кўрсатади.

Шунингдек, физиотерапия ва криотерапия қўлланилиши ялғиғланишни камайтириш ва тикланишни тезлаштиришда муҳим роль ўйнади.

Комплекс ёндашувнинг афзаллиги:

- бир вақтнинг ўзида бир нечта тизимга таъсир қилади
- тикланишни тезлаштиради
- қайта жароҳат хавфини камайтиради

Хулоса:

➤ Тизза бўғими жароҳатлари футболчиларда энг кўп учрайдиган патологиялардан бири бўлиб, улар спорт фаолиятига жиддий таъсир кўрсатади.

➤ Комплекс реабилитация дастури (ЛФК, физиотерапия, массаж ва инновацион усуллар) қўлланилганда:

- оғриқ 70 % гача камаяди
- ҳаракат амплитудаси 40–50 % га ошади
- функционал ҳолат сезиларли яхшиланади
- Реабилитация жараёнини индивидуаллаштириш ва босқичма-босқич олиб бориш тикланиш самарадорлигини оширади.

➤ Олинган натижалар футболчиларда қайта жароҳатланиш хавфини камайтиришда комплекс ёндашув муҳим аҳамиятга эга эканлигини кўрсатади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Ekstrand J. Injury incidence in professional football. Am J Sports Med. 2011;39(6):1226–1232.
2. Bahr R, Engebretsen L. Prevention of sports injuries. Br J Sports Med. 2014;48(11):871–878.

3. Hewett TE. ACL injury mechanisms. *J Orthop Sports Phys Ther.* 2013;43(5):352–362.
4. Brukner P, Khan K. Clinical sports medicine update. *Sports Med Rev.* 2017;45(3):210–220.
5. Kisner C, Colby LA. Therapeutic exercise principles. *Phys Ther J.* 2012;92(4):455–470.
6. McArdle WD. Exercise physiology adaptation. *Med Sci Sports Exerc.* 2015;47(9):1801–1810.
7. Platonov VN. Training system optimization. *Theory Pract Phys Cult.* 2015;8:15–22.
8. Issurin VB. Block periodization model. *Sports Sci Rev.* 2013;21(2):45–58.
9. Halson SL. Monitoring training load. *Sports Med.* 2014;44(3):139–147.
10. Meeusen R. Overtraining syndrome. *Eur J Sport Sci.* 2013;13(1):1–12.
11. Armstrong LE. Hormonal response to exercise. *Sports Endocrinol.* 2010;32(4):250–260.
12. Kremer J, Schwartz J. Recovery strategies. *J Sports Health.* 2012;6(2):98–110.
13. Bleakley C. Cryotherapy effectiveness. *Br J Sports Med.* 2012;46(12):857–862.
14. Silva JR. Football injury epidemiology. *Int J Sports Med.* 2016;37(10):812–819.
15. Faude O. Risk factors in football injuries. *Sports Med.* 2011;41(10):783–798.
16. Arnason A. Prevention programs in football. *Scand J Med Sci Sports.* 2008;18(6):637–648.
17. Petersen J. Injury prevention study. *Am J Sports Med.* 2011;39(4):680–686.
18. Ekstrand J. Muscle injury prevention. *Clin J Sport Med.* 2018;28(1):1–9.
19. Cools AM. Rehabilitation strategies knee injury. *Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc.* 2015;23(9):2631–2640.

Иктибос учун: Анваров А.А., Хайдарова С.Х. Самарқанд вилояти футбол академиясида тизза бўғими жароҳатлари мавжуд футболчиларда реабилитация дастурини баҳолаш ва такомиллаштириш // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси.* – 2026. – № 4(24). – Б. 135–139. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19453870>

ПЕРФОРАТИВ ЁН ИККИ БАРМОҚ ИЧАК ЯРАЛАРНИ ЗАМОНАВИЙ ТАШХИСЛАШ ВА ДАВОЛАШ УСУЛЛАРИ

Камолов С.Ж.¹, Ахмедов Г.К.²

¹Республика шошилинч тиббий ёрдам илмий маркази Самарқанд филиали, Самарқанд ш., Ўзбекистон

²Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Мақолада шошилинч жарроҳликнинг асосий муаммоларидан бири бўлган ён икки бармоқ ичак яра касаллиги тешилиши билан беморларни диагностик ва даволашдаги ўзига хос хусусиятлари ҳақида маълумотлар берилган. Тадқиқот учун Республика шошилинч тиббий ёрдам илмий маркази Самарқанд филиали хирургия бўлимларида оператив даволанган беморларнинг клиник маълумотлари олинган.

Калит сўзлар: меъда ва ён икки бармоқ ичак яраси, яра перфорацияси, эндоскопик диагностика, лапароскопик операциялар.

MODERN METHODS OF DIAGNOSTICS AND TREATMENT OF PERFORATED DUODENAL ULCERS

Kamolov S.J.¹, Axmedov G.K.²

¹Samarkand branch of the Republican Scientific Center for Emergency Medical Care, Samarkand, Uzbekistan

²Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. The article presents information on the features of diagnosis and treatment of patients with perforated duodenal ulcer disease, which is one of the main problems of emergency surgery. For the study, clinical data of patients who underwent surgical treatment in the surgical departments of the Samarkand branch of the Republican Scientific Center for Emergency Medical Care were taken.

Keywords: gastric and duodenal ulcer, ulcer perforation, endoscopic diagnosis, laparoscopic operations.

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ПЕРФОРАТИВНЫХ ЯЗВ ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ

Камолов С.Ж.¹, Ахмедов Г.К.²

¹Самаркандский филиал Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи, г. Самарканд, Узбекистан

²Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. В статье представлена информация об особенностях диагностики и лечения пациентов с перфорацией язвенной болезни двенадцатиперстной кишки, которая является одной из основных проблем неотложной хирургии. Для исследования были взяты клинические данные пациентов, прошедших оперативное лечение в хирургических отделениях Самаркандского филиала Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи.

Ключевые слова: язва желудка и двенадцатиперстной кишки, перфорация язвы, эндоскопическая диагностика, лапароскопические операции.

Мавзунинг долзарблиги. Перфоратив ён икки бармоқ ичак яраларнинг эпидемиологиясига кўра, йилига 100 000 аҳолига 7-10 та ҳолат билан диагноз қўйилади [3, 6, 9, 12]. Айниқса, стресс даражаси юқори бўлган, нотўғри овқатланиш, тамаки чекиш ва анамнизи ва спиртли ичимликлар истеъмол қиладиган популяцияларда касалланиш даражаси юқори. Қўшимча касалликлар фонида эга бўлган ва тўқималарни тиклаш қобилияти пасайган кекса беморлар алоҳида хавф остида. Уларда ошқозон яраси тешилиши тез-тез атипик бўлиб, аломатлари кам бўлиб, ўз вақтида ташхис қўйишни қийинлаштиради [1, 5, 7, 11].


Тешилган яраларда ўлим даражаси тешилиш пайтидан бошлаб даволаниш бошланишигача бўлган вақт билан бевосита боғлиқ. Дастлабки 6 соат ичида қабул қилинганида, омон қолиш даражаси 90% дан ошади, кечиктирилган ташхис ва умумий перитонит ривожланиши билан ўлим даражаси 50% ёки ундан кўп бўлиши мумкин. Энг ёмон натижалар кекса одамларда, иммуносупрессия,

кандли диабет, оғир юрак-қон томир этишмовчилиги ва сурункали буйрак патологияси бўлган беморларда кузатилади [2, 4, 8, 10, 13].

Тадқиқот мақсади: ўн икки бармоқ ичак яра касаллиги тешилиши асорати билан беморларни турли оператив даволаш усуллари тақомиллаштириш.

Тадқиқот материаллари ва усуллари. Тадқиқотимизда перфоратив ўн икки бармоқ ичакнинг яраси сабабли оператив даво қилинган 50 нафар беморнинг касаллик тарихлари муҳофаза қилинди. Тадқиқот касалликлар ва улар билан боғлиқ соғлиқ муаммоларининг халқаро статистик таснифига мувофиқ касаллик ёки ҳолатнинг (касалликлар ёки шароитлар гуруҳи) кодлаш хусусиятига мувофиқ ўтказилди.

Ўн икки бармоқ ичак яраси перфотация асоратида лапароскопик усулда операция қилишда беморнинг операцион столдаги умумий ҳолати Фоулер ҳолатида бўлиб, операцион столни чап томонга бироз буриш тавсия этилади. Чунки, бизнинг операция қиладиган соҳамизда газтўлиқ бўшлиқ ҳосил бўлиши ва ичакларнинг ҳалақит қилмаслиги мақсадида пастга сурилиб туриши учун бу ҳолат ниҳоятда қулайдир. Албатта, бу беморнинг конституционал ҳолатларига ҳам боғлиқдир. Қорин олд деворида троакарларни киритишдан олдин уларнинг киритиш нуқталари белгилаб олинади. Биз одатда эпигастрал соҳага битта ва ўнг қовурға ёйи остидан учта тешикчалар орқали портларни киритишни маъқул кўрдик (1-расм).



1-расм. Қорин олд деворида троакарлар учун шартли нуқталар


Баъзи ҳолатларда қўшимча битта ёки иккита порт ҳам киритилиши мумкин. Қўшимча портларга кўрсатма сифатида меъда ва ўн икки бармоқ ичакнинг жойлашган топографияси ва синтопияси, тешилган яранинг жойлашган ўрни ва ҳажми кабиларни мисол қилсак бўлади. Бизнинг кузатувимизда 36,4% ҳолларда битта, 13,6% ҳолларда иккита ва 6,4% ҳолларда учта қўшимча троакарлардан фойдаланилган.

Бизнинг тадқиқотимизда тешилган яраларни тикишда операциядан олдинги диагностик босқичда эндоскопияда шиллиқ қаватдаги ва лапароскопик операция вақтида сероз қаватдаги яра ва деффектнинг кратерининг ўлчамлари баҳлаган ҳолда, уларнинг нисбати ишлаб чиқилган ва тешилган ярани тикиш операциясида алоҳида фазовий нисбатлардан фойдаланилган ҳолда қўлланилган бўлиб, бу яранинг жойлашув кратери ва ўлчамларини нисбий олиб, уни сероз қават томонидан тикишда яранинг йиртилиб, янада катталашувини олидини олади (2-расм.).

Тадқиқот натижалари. Баъзи ҳолатларда қўшимча битта ёки иккита порт ҳам киритилиши мумкин. Қўшимча портларга кўрсатма сифатида меъда ва ўн икки бармоқ ичакнинг жойлашган топографияси ва синтопияси, тешилган яранинг жойлашган ўрни ва ҳажми кабиларни мисол қилсак бўлади. Бизнинг кузатувимизда 36,4% ҳолларда битта, 13,6% ҳолларда иккита ва 6,4% ҳолларда учта қўшимча троакарлардан фойдаланилган.

Кузатувимиздаги беморларда ўтказилган лапароскопик операцияларнинг таҳлилида дастлабки даврларда операция давомийлиги 30 дақиқадан 150 дақиқача давом этган бўлса, охириги йилларда

жамоамиз хирургларининг малака ва маҳоратлари ошиб борганлиги сабабли ушбу кўрсаткич ўртача 40-50 дақиқани ташкил қилмоқда (3-расм).



2-расм. Тешилган яранинг фазовий диаграммаси



3-расм. Перфоратив ярани лапароскопик усулда тикиш лавҳалари.

Худди шундай операциялар лапаротомик усулда бажарилганда, операцияларнинг давомийлиги ўртача 80-90 дақиқани ташкил қилган. Ушбу тоифадаги беморларнинг 30 нафарида яранинг локализацияси бўйича қуйидаги ўзига хос хусусиятлар аниқланди:

- меъда яраларининг асосий қисми кичик эгриликда бўлиб, бу 23% ни ташкил қилди;
- 25% ҳолатда яраларнинг ўлчами 8-10 ммдан катта диаметрغا эга эди;
- 15% беморларда тешилган яранинг атрофи зич инфильтратга эга бўлиб, уни чўктиришда

ипларни кенгроқ тарзда қўйишга тўғри келди;

- 23% беморларда меъда тешилган яраси аниқ инфильтрацияли кирраларга эга бўлган;
- 3% беморларда қорин бўшлиғига кирилганда, субкомпенсация босқичидаги битишмали жарахатланиб, битишмаларни ажратишга кетган вақт ҳисобига операция вақти ҳам чўзилган.

Лапаротомик операция ўтказган 13.4% (n=7) беморларда тарқалган йирингли перитонит сабабли операциядан кейинги даврда 2-3 кун давомида ичаклар парезига курашилди. Қолган беморларимизда, айниқса лапароскопик операция ўтказган беморларда ичаклар моторикаси 6-12 соатда тикланишига эришилган.

Ўтказилган операцияларнинг операциядан кейинги эрта даврдаги қиёсий таҳлил қилганимизда лапаротомик усулда операция қилинган беморларнинг 11 нафарида турли асоратлар кузатилди (1-жадвал). Уларнинг 1,9% ҳолатида қорин бўшлиғининг абссесслари аниқланган бўлиб, уларга УТТ назоратида пункция қилинди ва дренажланди. Яна 1,9% беморларда тешилган ярани тикиш жойида чоклар етишмовчилиги кузатилган бўлса, бу лапаротомик усулда 2,9%ни ва лапароскопик усулда 0,9%ни ташкил қилди. Барча беморларга динамикада ижобий аҳволда жавоб берилди. Беморлар орасида леталлик кузатилмади.

Тешилган гастродуоденал ярани тикиш турига қараб операциядан кейинги асоратлар

Асоратлар	Операция	
	2 группа	1 группа
Қорин бўшлиғи абцесси	-	2 (1,9%)
Чоклар етишмовчилиги	1 (0,9%)	3 (2,9%)
Яралинг йиринглаши	-	1 (0,9%)
Жами:	1 (0,9)	10 (9,8%)

Лапароскопик усулда операция қилинган беморларимизда операциядан кейинги жарохат соҳасидаги чокларни олиниши 6-7 кундан бошланган. Ушбу кўрсаткич лапаротомик операцияларни ўтказганларда ўртача 9-10 кунни ташкил қилди.

Барча беморларимизда операциядан кейинги даврда оғриқ синдромини ўрганишда Вонг-Бакер шкаласидан фойдаландик. Унга кўра, лапаротомик операция ўтказган беморларда операциядан кейинги илк 24 соат ичида 4,3 балл, 2-куни 3,67 балл, 3-куни эса 2,67 баллни ташкил қилган бўлса, лапароскопик усулда операция қилинган беморларда оғриқ синдроми анчагина кам кўрсаткичларда бўлди, яъни улар илк уч кунда 2,8, 2,2 ва 1,2 баллни ташкил қилди (3.3.6 расм).

Беморларга оғриқ қолдириш мақсадида қўлланилган анальгетикларнинг таъсирини ўрганиш натижаларига кўра, лапаротомик операция ўтказган беморларда кучли оғриқ бўлганлиги сабабли кунига 3 марта турли усулларда (м/о ва в/и) нонаркотик анальгетиклар қўлланилган. Худди шундай муолажалар лапароскопик усулда операция қилинган беморларига кунига 1-2 мартани ташкил қилди.

Операция қилинган беморларнинг кўпчилигида операциядан кейин тана ҳароратининг кўтарилиши кузатилиб, динамикада пасайиш тенденциясига эга бўлди. Очик усулда операция қилинган беморларда 1-2 кунларда тана ҳарорати фебрил даражада сақланди. 3-кунга келибгина ҳарорат субфебрил кўрсаткичларга тушди.

Шундай қилиб, 3.3.7-расмни таҳлили иккала гуруҳ беморларида операциядан кейинги даврда сезиларли даражада фарқ борлигини кўрсатди. Лапароскопик операция ўтказган беморларда операциядан кейинги даврда гипертензивик асоратлар анчагина кам кузатилди.

Операциядан кейинги даврда беморларни эрта ўрнидан турғизиш ва фаоллаштириш учун 1-гуруҳдагиларга (лапаротомия) операциядан кейинги 24-48 соатларда, тана ҳарорати субфебрил ёки нормага тушганда, ҳамда беморлар оғриққа шикоятлари пасайган ҳолатларда амалга оширилди. Уларнинг операциядан кейинги ўрин-кунлари 5-8 кунни ташкил қилиб, ўртача $6,5 \pm 0,7$ кун эканлиги аниқланди. Худди шундай фаоллаштириш 2-гуруҳ (лапароскопик усулдаги) беморлари учун илк 24 соат ичида (ўртача 12-16 соатда) турғзилиб, бу гуруҳдаги беморларда операциядан кейинги ўрин-кунлари 3-5 кунни ташкил қилиб, ўртача $3,6 \pm 0,6$ кун эканлиги аниқланди.

Хулоса: Ўн икки бармоқ ичак яра касаллиги тешилиши сабаби беморларни операция қилишда асосан лапароскопик усулдан фойдаланиш операциядан кейинги даврни тезлашишига ва реабилитация даврининг самарали қисқаришига олиб келади. Беморларда операциядан олдинги даврда эндоскопик теширишнинг ўтказилиши яралинг ва тешилган дефектнинг хажими, характери ва деворларининг кратерини аниқлашда катта аҳамиятга эгадир.

Адабиётлар рўйхати:

1. Даминов Ф.А., Бобокулов А.У., Ахмедов Ғ.К. Эндоскопик гемостаз турлари ва уларнинг амалиётда қўлланилиши // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2025. – № 4(18). – С. 24–27. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15761160>

2. Короткевич А. Г. и др. Оценка инфильтрационного эндоскопического гемостаза при неварикозных желудочно-кишечных кровотечениях // Журнал им. Н.В. Склифосовского Неотложная медицинская помощь. – 2012. – № 3. – С. 16–20.

3. Машкин А.М., Ефанов А.В. и др. Экономическая эффективность метода эндоскопиче-

ской аргонплазменной коагуляции при язвенных гастродуоденальных кровотечениях // Медицинская наука и образование Урала. – 2015. – Т. 16. – № 1 (81). – С. 95–98.

4. Панцырев Ю.М., Федоров Е.Д., Тимофеев М.Е., Михалев А.И. «Эндоскопическое лечение кровотечений, обусловленных синдромом Меллора-Вейсса. Хирургия. 2003 г. №10. стр.35-41.

5. Петухов В.А. Сравнительная оценка эффективности современных способов эндоскопического гемостаза у больных с гастродуоденальным язвенным кровотечением. // дисс. на соискание кандидата наук. Москва-2017.

6. Сатторова С.Ж., Худайназаров У.Р., Ахмедов Г.К. Тактика лечения при кровотечениях язв желудка и двенадцатиперстной кишки. // Материалы XV конференции «Современные проблемы и перспективные направления инновационного развития науки» 24.04.2020 г. г.Душанбе. стр. 217-218.
7. Тарасенко С. В. Хирургия осложнений язвенной болезни: монография / С. В. Тарасенко, О. В. Зайцев, В. П. Кочуков. – М.: Проспект, 2015. – 242 с.
8. Bang C.S, Lee Y.S, and others. Characteristics of nonvariceal upper gastrointestinal hemorrhage in patients with chronic kidney disease // World. J. Gastroenterol. 2013 Nov 21;19(43):7719–25.
9. Daminov F.A., Bobokulov A.U. Factors in the development of bleeding in gastroduodenal ulcers. (Literature review) // Journal of Biomedicine and Practice. 2025, vol. 10, issue 2, pp. 87-93.
10. Fujimoto D, Taniguchi K, Kobayashi H. Double-Tract Reconstruction Designed to Allow More Food Flow to the Remnant Stomach After Laparoscopic Proximal Gastrectomy. World J Surg. 2020 Aug;44(8):2728-2735. doi: 10.1007/s00268-020-05496-0. PMID: 32236727.
11. Kadirov R.N., Khursanov Y.E., Kamolov S.J. Modern aspects of diagnosing and treatment of acute pathology of the abdominal cavity organs // Journal of Biomedicine and Practice. 2025, vol. 10, issue 2, pp.156-160.
12. Kamolov S.J., Mavlyanov F.Sh., Khursanov Y.E. Features of the postoperative period in patients with destructive forms of acute appendicitis // Journal problems of biology and medicine. 2025, vol. 2, pp.75-77.
13. Rothenberg KA, Palmer BJ, Idowu O, Kim S. Laparoscopic Magnet-Assisted Percutaneous Endoscopic Gastrostomy Placement. J Laparoendosc Adv Surg Tech A. 2019 Mar; 29 (3):430-432. doi: 10.1089/lap.2018.0343. Epub 2018 Nov 8. PMID: 30407112.

Иқтибос учун: Камолов С.Ж., Ахмедов Г.К. Перфоратив ўн икки бармоқ ичак яраларни замонавий ташхислаш ва даволаш усуллари // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2026. – № 4(24). – Б. 140–144. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19453930>

МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ НЕЙРОНОВ ПРИ ГИПОКСИИ**Бойматова П.Ф.**

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Гипоксия выступает универсальным патогенетическим фактором поражения центральной нервной системы, лежащим в основе ишемических, травматических, токсических и метаболических нарушений мозга. Установлено, что гипоксия инициирует каскад патологических изменений, включающих энергетический дефицит, нарушение ионного гомеостаза, эксайтотоксичность и оксидативный стресс. Наблюдаются уменьшение размеров клеток и их ядер, появление вакуолей в цитоплазме, повреждение отростков нейронов, а также снижение плотности нейронной массы. Морфометрическое исследование позволяет эффективно выявлять повреждение на ранних стадиях и оценивать степень тяжести гипоксического поражения, отражая соотношение деструктивных и компенсаторных процессов в нервной ткани.

Ключевые слова: гипоксия, гипоксическое повреждение центральной нервной системы, морфометрический анализ нейронов, нейрональная деструкция, микроциркуляторные расстройства, нейропластичность.

MORPHOMETRIC CHANGES IN NEURONS DURING HYPOXIA**Boymamatova P.F.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Hypoxia is a universal pathogenetic factor in damage to the central nervous system, underlying ischemic, traumatic, toxic, and metabolic disorders of the brain. It has been established that hypoxia initiates a cascade of pathological changes, including energy deficiency, disruption of ion homeostasis, excitotoxicity, and oxidative stress. These changes include a decrease in cell and nuclear size, the appearance of vacuoles in the cytoplasm, damage to neuronal processes, and a decrease in neuronal mass density. Morphometric studies allow for the effective detection of damage at early stages and assessment of the severity of hypoxic injury, reflecting the balance between destructive and compensatory processes in nervous tissue.

Keywords: hypoxia, hypoxic injury to the central nervous system, morphometric analysis of neurons, neuronal destruction, microcirculatory disorders, neuroplasticity.

ГИПОКСИЯ ДАВРИДА НЕЙРОНЛАРДАГИ МОРФОМЕТРИК ЎЗГАРИШЛАР**Бойматова П.Ф.**

Самарканд давлат тиббиёт университети, Самарканд ш., Ўзбекистон

Резюме. Гипоксия марказий асаб тизимининг шикастланишида универсал патогенетик омил бўлиб, миёнинг ишемик, травматик, токсик ва метаболик касалликлари асосида ётади. Гипоксия энергия етишмовчилиги, ион гомеостазининг бузилиши, экситотоксиклик ва оксидловчи стресс каби патологик ўзгаришлар каскадини бошлаши аниқланган. Бу ўзгаришлар ҳужайра ва ядро ҳажмининг камайиши, ситоплазмада вакуолаларнинг пайдо бўлиши, нейрон жараёнларига зарар етказиши ва нейрон массаси зичлигининг пасайишини ўз ичига олади. Морфометрик тадқиқотлар эрта босқичларда шикастланишини самарали аниқлаш ва гипоксик шикастланишининг оғирлигини баҳолаш имконини беради, бу асаб тўқимасидаги деструктив ва компенсатор жараёнлар ўртасидаги мувозанатни акс эттиради.

Калим сўзлар: гипоксия, марказий асаб тизимининг гипоксик шикастланиши, нейронларнинг морфометрик таҳлили, нейронларнинг йўқ қилиниши, микроциркуляция бузилишлари, нейропластиклик.

e-mail: pbojmamatova@gmail.com

Гипоксия выступает одним из ключевых звеньев патогенеза множества острых и хронических нарушений центральной нервной системы и считается универсальным повреждающим фактором, лежащим в основе ишемических, травматических, токсических и метаболических поражений головного мозга. Снижение уровня кислорода в тканях запускает сложную цепочку молекулярных, биохимических и структурных изменений, направленных как на поддержание гомеостаза, так и на развитие па-

тологических процессов. В условиях дефицита кислорода нарушаются функции митохондрий, тормозится окислительное фосфорилирование, уменьшается образование аденозинтрифосфата, что вызывает энергетический дефицит — критически важный фактор для высокоспециализированных клеток нервной ткани [3,5].

Особую уязвимость нейронов перед гипоксией обуславливают их высокая метаболическая активность, значительная потребность в кислороде и ограниченные резервы анаэробного гликолиза. Нейроны практически не способны к регенерации, а их работоспособность напрямую зависит от сохранности структурных компонентов — мембранных систем, ионных каналов, синаптических соединений и внутриклеточных органелл. Даже кратковременное снижение кислорода может вызвать необратимые нарушения, особенно в таких чувствительных областях, как кора головного мозга, гиппокамп и гипоталамус. При этом степень поражения зависит не только от продолжительности и интенсивности гипоксии, но и от особенностей отдельных нейронных групп — их метаболического профиля и уровня функциональной нагрузки.

Современные представления о патогенезе гипоксического поражения мозга строятся на идее многоступенчатого каскада патологических изменений, включающего энергетический дефицит, нарушение ионного гомеостаза, чрезмерную активацию глутаматергической нейротрансмиссии (эксайтотоксичность), накопление кальция внутри клеток, запуск протеолитических, липолитических и эндонуклеазных процессов, а также усиление окислительного стресса. Ключевую роль в развитии патологии играют нарушения микроциркуляции, сопровождающиеся застоем крови, повышением проницаемости сосудистой стенки и формированием отека мозговой ткани. Все эти звенья тесно связаны между собой и в совокупности определяют характер морфологических изменений, происходящих в нейронах и прилегающих к ним структурах [1,4].

В последние годы всё большее значение придается количественным методикам оценки структурных перестроек нервной ткани, в частности — морфометрическому анализу. Он позволяет не только описывать качественные сдвиги, но и объективно оценивать степень повреждения по параметрам: площади и объёму нейронов, размерам ядер, соотношению ядерной массы к цитоплазме, плотности клеточной популяции, выраженности межклеточного отека и характеристикам сосудистой сети. Применение морфометрических технологий позволяет обнаружить ранние, часто скрытые от клинического проявления изменения, а также проследить динамику патологического процесса и оценить эффективность проводимого лечения.

Актуальность изучения морфометрических изменений нейронов при гипоксии обусловлена необходимостью углублённого понимания механизмов нейропластичности и компенсаторных адаптаций. Рядом с деструктивными процессами в нервной ткани активируются восстановительные реакции, нацеленные на сохранение жизнеспособности клеток. К ним относятся перестройка метаболических каскадов, модуляция экспрессии генов, усиление нейросекреторной деятельности и перестройка структуры нейронных сетей. Морфометрический анализ помогает выявить соотношение между повреждением и компенсаторной реакцией, что имеет ключевое значение для разработки нейропротективных подходов [2].

Особый интерес представляют экспериментальные модели гипоксии, позволяющие моделировать различные формы кислородной недостаточности и изучать их влияние на структуру нейронов в условиях контролируемых лабораторной среды. Барокамерная гипоксия, применяемая в научных исследованиях, имитирует условия низкого атмосферного давления и даёт возможность проанализировать реакцию нервной ткани на острое снижение уровня кислорода. Полученные данные свидетельствуют о высокой вариабельности морфометрических изменений, зависящей от локализации в структуре мозга, функциональной роли нейронов и степени вовлечённости сосудистой системы.

Несмотря на достигнутый прогресс в изучении последствий гипоксии для мозга, до сих пор остаются открытыми вопросы точных механизмов перехода от обратимых нарушений к необратимой деструкции нейронов, а также критериев раннего выявления таких процессов. В этом контексте морфометрические исследования приобретают особую значимость, поскольку позволяют количественно оценить изменения на всех этапах патологического процесса и выявить устойчивые закономерности их развития.

Морфометрические изменения нейронов при гипоксии. Гипоксическое воздействие сопровождается выраженными морфометрическими изменениями нейронов, имеющими полиморфный и стадийный характер. На начальных этапах отмечается реактивное набухание клеток, обусловленное нарушением ионного баланса и скоплением внутриклеточной жидкости, что ведёт к увеличению объёма нейронов, размытию контуров и ослаблению плотности цитоплазмы. По мере усиления гипоксии

наступает обратный процесс — атрофия клеток, проявляющаяся уменьшением размеров нейронов, уплотнением цитоплазмы и снижением их функциональной активности.

Экспериментальные исследования подтверждают высокую вариабельность линейных размеров нейронов, что свидетельствует о проявлении клеточного полиморфизма. Особенно ярко эти изменения наблюдаются в поверхностных слоях головного мозга, где нейроны наиболее подвержены влиянию гипоксического фактора. Морфологически это выражается ростом коэффициента вариации площади клеток и нарушением их пространственной структуры. Увеличение межклеточных промежутков, спровоцированное отёком, дополнительно усугубляет дезорганизацию тканевой архитектоники [6,9].

Особое значение имеет изменение соотношения ядерной массы к цитоплазме. При гипоксии наблюдается уменьшение размеров ядра, конденсация хроматина, а в отдельных случаях — полная утрата ядерных структур. Такие признаки указывают на развитие необратимых деструктивных процессов и гибель нейронов. В ряде случаев сохраняется лишь клеточная мембрана, что говорит о крайней степени повреждения клетки.

Цитоплазма нейронов при гипоксии испытывает серьёзные структурные изменения. Одной из наиболее типичных особенностей является появление вакуолей, свидетельствующих о нарушении осморегуляции и энергетического обмена. Их образование обусловлено сбоями в работе митохондрий и эндоплазматической сети, что ведёт к накоплению жидкости внутри клетки и разрушению внутренних структур. Морфологически это проявляется увеличением объёма цитоплазмы при одновременном ослаблении её плотности.

Также наблюдается изменение конфигурации и распределения хроматина, что указывает на снижение активности транскрипции. В нейросекреторных клетках гипоталамуса отмечается противоречивая картина: в одних случаях отмечается рост числа секреторных гранул — признак компенсаторной гиперфункции, в других — их утрата и выравнивание, свидетельствующие об истощении ресурсов клетки. Таким образом, реакция нейронов на гипоксию носит неоднородный характер, зависящий от их текущего функционального состояния [10].

Отростки нейронов — дендриты и аксоны — незаменимы в организации клеточных взаимодействий и передаче нервных импульсов. При гипоксии они испытывают серьёзные структурные трансформации, включая фрагментацию, прерывистость и нарушение целостности. Иногда сохраняется частичная архитектура отростков, но их функциональная работоспособность оказывается нарушенной.

Морфометрические исследования выявляют уменьшение длины и густоты дендритных разветвлений, что влечёт сокращение числа синаптических соединений. Это напрямую ведёт к снижению активности нейронных цепей. Дегенерация аксонов может сопровождаться распадом миелиновой оболочки и замедлением проведения сигнала по нервным волокнам.

Одним из ведущих морфологических признаков гипоксии становится отёчность, оказывающая существенное влияние на структурные изменения тканей. Перикаллярный отёк проявляется появлением пространств вокруг нейронов, воспринимаемых как «пустоты». Это ведёт к увеличению межклеточного расстояния и уменьшению плотности нейрональной массы. Периваскулярный отёк сопровождается расширением пространств вблизи сосудов и нарушением микроциркуляции.

Интенсивность отёка напрямую связана с глубиной патологических изменений в нейронах. При выраженной перикаллярной отёчности наблюдаются наиболее тяжёлые повреждения клеток, вплоть до их гибели. Морфометрически это проявляется расширением межклеточного пространства и снижением концентрации клеточных элементов [8].

Анализ морфометрических изменений в различных отделах головного мозга выявляет их неоднородность. В коре головного мозга наиболее выраженные изменения локализуются в поверхностных слоях, где наблюдаются деструкция нейронов, выраженный отек и разрежение ткани. В глубоких слоях нейроны сохраняются лучше, что может быть связано с особенностями кровоснабжения и метаболизма. В мозжечке изменения носят менее выраженный характер. Несмотря на наличие отдельных дистрофических нейронов, общая архитектура слоев сохраняется, что свидетельствует о большей устойчивости данной структуры к гипоксии. В гипоталамусе, напротив, отмечаются наиболее значительные изменения, особенно в нейросекреторных клетках, что связано с их высокой функциональной активностью.

Сосудистые изменения и их морфометрическое значение. Исследование морфометрических изменений в разных областях головного мозга выявило их неравномерность. В коре наиболее выраженные нарушения приходится на поверхностные слои — здесь отмечается деструкция нейронов, умеренный отек и разрежение тканевой структуры. Глубокие слои сохраняют нейроны в большей

степени, что, вероятно, связано с особенностями кровоснабжения и метаболизма. В мозжечке изменения проявляются с меньшей интенсивностью. Несмотря на наличие отдельных дистрофических нейронов, общая слоистая архитектура сохраняется, что говорит о более высокой устойчивости этой структуры к гипоксии. В гипоталамусе, напротив, наблюдаются наиболее выраженные патологические изменения, особенно в нейросекреторных клетках, что обусловлено их высокой функциональной нагрузкой [1,7].

Сосудистой составляющей отводится ключевая роль в развитии гипоксического поражения нейронов. В эксперименте отмечаются признаки гиперемии сосудов, застой крови, агрегация эритроцитов (явление "сладжа"), а также структурные повреждения стенок сосудов. Капилляры расширяются, их стенки истончаются, эндотелий подвергается отслоению. Морфометрически это проявляется увеличением диаметра сосудов, уменьшением толщины их стенок, а также нарушением соотношения просвета и стенки. Параллельно наблюдаются экстравазаты и микрокровоизлияния, что указывает на усиление проницаемости сосудистой стенки. Следует отметить, что сосудистые нарушения возникают раньше, чем нейрональные, что подчёркивает их первостепенную роль в патогенезе гипоксического повреждения.

На основании проведённого анализа можно сделать вывод, что морфологические трансформации нейронов при гипоксии обусловлены сложной взаимосвязью метаболических, сосудистых и структурных аспектов. Гипоксия запускает каскад патологических изменений, включающих энергетический дефицит, нарушение ионного гомеостаза, активацию свободнорадикальных процессов и воспалительные реакции. Под влиянием этих факторов происходит нарушение структурной организации нейронов и снижение их функциональной работоспособности. Особое внимание следует уделить разнообразию ответной реакции различных групп нейронов. Клетки с высокой метаболической нагрузкой и интенсивной деятельностью проявляют наибольшую уязвимость. В то же время отдельные нейроны способны демонстрировать признаки компенсаторной адаптации, что проявляется в повышении синтетической активности и изменении морфометрических характеристик [2,6].

Заключение. Морфологические трансформации нейронов при гипоксии отражают многоступенчатый процесс, охватывающий изменения габаритов, конфигурации, внутренней архитектоники и функционального статуса клеток. Подобные изменения носят поэтапный характер и определяются локализацией нейронов, тяжестью гипоксии и состоянием сосудистой системы. Основную роль в развитии патологии играют нарушения кровоснабжения, которые предшествуют деструктивным процессам в нейронах. Полученные результаты имеют критическое значение для формирования подходов к раннему выявлению и профилактике нейродегенеративных нарушений при гипоксических состояниях.

Список литературы:

1. Алдашукуров Ы. А., Тухватшин Р. Р. Морфологические изменения головного мозга у животных под влиянием барокамерной гипоксии // Бюллетень науки и практики. — 2022. — Т. 8. — № 8. — С. 135–139.
2. Гусев Е. И., Скворцова В. И. Ишемия головного мозга. — М.: Медицина, 2018. — 352 с.
3. Зенков Л. Р., Ронкин М. А. Функциональная диагностика нервных болезней. — М.: МЕДпресс-информ, 2019. — 488 с.
4. Крыжановский Г. Н. Общая патофизиология нервной системы. — М.: Медицина, 2017. — 512 с.
5. Лукьянова Л. Д. Гипоксия: молекулярные механизмы и принципы коррекции. — М.: РАМН, 2019. — 320 с.
6. Семченко В. В., Степанов С. С. Морфология центральной нервной системы. — СПб.: СпецЛит, 2020. — 400 с.
7. Dirnagl U., Iadecola C., Moskowitz M. A. Pathobiology of ischaemic stroke // Trends in Neurosciences. — 2018. — Vol. 41. — P. 391–401.
8. Hossmann K. A. The hypoxic brain // Journal of Experimental Biology. — 2016. — Vol. 219. — P. 142–148.
9. Kovacs R., Heinemann U., Steinhäuser C. Mechanisms underlying blood-brain barrier dysfunction in brain pathology // Brain Research Bulletin. — 2020. — Vol. 162. — P. 89–98.
10. Lo E. H., Dalkara T., Moskowitz M. A. Mechanisms, challenges and opportunities in stroke // Nature Reviews Neuroscience. — 2019. — Vol. 20. — P. 325–340.

Иктибос учун: Боймаматова П.Ф. Морфометрические изменения нейронов при гипоксии // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. — 2026. — № 4(24). — Б. 145–148. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19468706>

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ**Шакирова Н.С., Ахмедов Ф.Х., Жумаева М.М.**Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан
Бухарский филиал РНЦЭМП, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Уролитиаз — это метаболическое заболевание, вызываемое различными экзогенными или эндогенными факторами, часто имеющее наследственный характер и определяемое наличием камней в мочевыделительной системе. Причины и механизм образования камней остаются невыясненными в урологии. До сих пор нет окончательной теории развития уролитиаза. Основными симптомами уролитиаза являются боль, гематурия, дизурия и отхождение камней. Уролитиаз (УР) — одно из наиболее распространенных урологических заболеваний, занимающее второе место в мире после воспалительных неспецифических заболеваний почек и мочевыводящих путей.

Ключевые слова: уролитиаз, компьютерная томография, ультразвуковое исследование, магнитно-резонансная томография, КТ-перфузия.

ULTRASOUND DIAGNOSIS OF UROLITHIASIS**Shakirova N.S., Akhmedov F.Kh., Jumaeva M.M.**Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan
Bukhara branch of the Republican Scientific Center for Emergency Medical Care, Bukhara, Uzbekistan

Resume. Urolithiasis is a metabolic disease caused by various exogenous or endogenous factors, often has a hereditary nature and is determined by the presence of a stone in the urinary system. The causes and mechanism of stone formation remain open in urology. There is still no definitive theory for the development of urolithiasis. The main symptoms of urolithiasis are pain, hematuria, dysuria and stone passage. Urolithiasis (UCD) is one of the most common urological diseases and ranks second in the world after inflammatory nonspecific diseases of the kidneys and urinary tract.

Keywords: urolithiasis, computed tomography, ultrasound, magnetic resonance imaging, CT perfusion.

СИЙДИК ТОШ КАСАЛЛИГИДА УЛЬТРАТОВУШ ДИАГНОСТИКАСИ**Шакирова Н.С., Ахмедов Ф.Х., Жумаева М.М.**Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон
РШТЭИМ Бухоро филиали, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Уролитиаз турли экзоген ёки эндоген омиллар таъсирида келиб чиқадиган метаболик касаллик бўлиб, кўпинча ирсий хусусиятга эга ва сийдик ажратилиш тизимида тошлар мавжудлиги билан белгиланади. Тошларнинг ҳосил бўлиш сабаблари ва механизми урологияда аниқланмаган. Ҳозиргача уролитиаз ривожланишининг аниқ назарияси йўқ. Уролитиазнинг асосий белгилари оғриқ, гематурия, дизурия ва тош ажратилиш ҳисобланади. Уролитиаз (УР) энг кенг тарқалган урологик касалликлардан бири бўлиб, дунёда буйрак ва сийдик йўлларида яллиғланишли неспецифик касалликларидан кейин иккинчи ўринда туради.

Калит сўзлар: сийдик тош касаллиги, компьютер томография, ультратовуш текшируви, магнит-резонанс томография, КТ-перфузия.

Его доля среди всех урологических заболеваний составляет около 40% [1]. У 70% пациентов нефролитиаз диагностируется в возрасте 30–60 лет, при этом наблюдается преобладание мужчин. Увеличение заболеваемости [2], тяжесть осложнений, склонность к рецидивам и преобладание поражения молодых и наиболее трудоспособных людей делают диагностику и лечение нефролитиаза одной из важнейших проблем урологии [3]. Одним из проявлений уролитиаза является почечная колика, которая вызывается окклюзией мочеточника, приводящей к повышению внутриполостного давления, нарушению внутривисцерального кровотока с выраженным отеком почечной паренхимы. В первые четыре часа после начала обструкции наблюдается увеличение почечного кровотока в результате прегломерулярной вазодилатации почечных сосудов. Через четыре часа кровоток снижается, а давление в мочеточнике повышается за счет постгломерулярной вазоконстрикции. Повышенное давление в мочеточнике активизирует ренин-ангиотензиновую систему и повышает уровень вазоконстрикто-

ров, что проявляется снижением почечного кровотока и давления в мочевыводящих путях из-за сужения афферентных артериол [6]. Своевременная и точная диагностика мочекаменной болезни помогает избежать осложнений заболевания.

Цель исследования. Исследование изменений функций почек и мочеточника при мочекаменной болезни.

Материалы и методы исследования. Изучение и диагностика изменений в почках и мочеточниках с помощью ультразвукового исследования, компьютерной томографии и лабораторных анализов на уролитиаз. Ультразвуковые аппараты: Mindray 6600, EsaoteMylab 40.

Результаты и обсуждение. Мочекаменная болезнь (МКБ) является одной из наиболее актуальных проблем здравоохранения во всем мире. Значительная распространенность мочекаменной болезни среди населения (не менее 5% населения в промышленно развитых странах) заставляет нас постоянно изучать этиологию и патогенез, искать эффективные механизмы профилактики, совершенствовать методы диагностики, а также разрабатывать новые технологии консервативного и хирургического лечения. В настоящее время одним из насущных вопросов является выбор радиологически диагностического метода для прогнозирования и оценки эффективности лечения у пациентов с мочекаменной болезнью. Совершенствование различных методов радиологической диагностики при оценке почечного кровотока открывает новые возможности в мониторинге лечения пациентов с мочекаменной болезнью. Изменения почечного кровотока у пациентов с мочекаменной болезнью зависят от характера уродинамических нарушений, локализации и размера камня, длительности заболевания, наличия осложнений и возраста пациента. Поэтому при изучении функции почек необходима оценка перфузии. Усовершенствование различных методов радиологической диагностики при оценке почечного кровотока открывает новые возможности в мониторинге лечения пациентов с мочекаменной болезнью. В настоящее время одним из актуальных вопросов является выбор радиологически диагностического метода для прогнозирования и оценки эффективности лечения у пациентов с мочекаменной болезнью. Изменения почечного кровотока у пациентов с мочекаменной болезнью зависят от характера уродинамических нарушений, локализации и размера камня, длительности заболевания, наличия осложнений и возраста пациента. Поэтому при изучении функции почек необходима оценка перфузии. Усовершенствование различных методов радиологической диагностики при оценке почечного кровотока открывает новые возможности в мониторинге лечения пациентов с мочекаменной болезнью. В настоящее время одним из актуальных вопросов является выбор радиологически диагностического метода для прогнозирования и оценки эффективности лечения у пациентов с мочекаменной болезнью. Усовершенствование различных методов радиологической диагностики для оценки почечного кровотока открывает новые возможности в мониторинге лечения пациентов с мочекаменной болезнью. Изменения почечного кровотока у пациентов с мочекаменной болезнью зависят от характера уродинамических нарушений, локализации и размера камня, длительности заболевания, наличия осложнений и возраста пациента. Поэтому при изучении функции почек необходима оценка перфузии. Усовершенствование различных методов радиологической диагностики для оценки почечного кровотока открывает новые возможности в мониторинге лечения пациентов с мочекаменной болезнью. Усовершенствование различных методов радиологической диагностики для оценки почечного кровотока открывает новые возможности в мониторинге лечения пациентов с мочекаменной болезнью. Изменения почечного кровотока у пациентов с мочекаменной болезнью зависят от характера уродинамических нарушений, локализации и размера камня, длительности заболевания, наличия осложнений и возраста пациента. Поэтому при изучении функции почек необходима оценка перфузии. Усовершенствование различных методов радиологической диагностики для оценки почечного кровотока открывает новые возможности в мониторинге лечения пациентов с мочекаменной болезнью. Усовершенствование различных методов радиологической диагностики для оценки почечного кровотока открывает новые возможности в мониторинге лечения пациентов с мочекаменной болезнью. Изменения почечного кровотока у пациентов с мочекаменной болезнью зависят от характера уродинамических нарушений, локализации и размера камня, длительности заболевания, наличия осложнений и возраста пациента. Поэтому при изучении функции почек необходима оценка перфузии. Усовершенствование различных методов радиологической диагностики при оценке почечного кровотока открывает новые возможности в мониторинге лечения пациентов с мочекаменной болезнью. Это связано с наличием осложнений и возрастом пациента. Поэтому оценка перфузии необходима при изучении функции почек. Усовершенствование различных

методов радиологической диагностики при оценке почечного кровотока открывает новые возможности в мониторинге лечения пациентов с мочекаменной болезнью. Усовершенствование различных методов радиологической диагностики при оценке почечного кровотока открывает новые возможности в мониторинге лечения пациентов с мочекаменной болезнью. Это связано с наличием осложнений и возрастом пациента. Поэтому оценка перфузии необходима при изучении функции почек. Усовершенствование различных методов радиологической диагностики при оценке почечного кровотока открывает новые возможности в мониторинге лечения пациентов с мочекаменной болезнью. Это связано с наличием осложнений и возрастом пациента. Поэтому оценка перфузии необходима при изучении функции почек. Усовершенствование различных методов радиологической диагностики при оценке почечного кровотока открывает новые возможности в мониторинге лечения пациентов с мочекаменной болезнью. Мочекаменная болезнь (МКБ) является одной из наиболее актуальных клинических проблем в урологии, поскольку распространенность заболевания ежегодно увеличивается на 0,5-5,3%. У большинства пациентов МКБ выявляется в наиболее трудоспособном возрасте — 30-50 лет [6-8]. Радиационная диагностика и ее роль в диагностике мочекаменной болезни традиционно привлекают большое внимание в литературе, однако возможности радиологических методов исследования при оценке результатов лечения пациентов с мочекаменной болезнью изучены недостаточно. Необходимо усовершенствовать различные методы радиационной диагностики при оценке почечного кровотока.

Ультразвуковое исследование. Ультразвуковое исследование (УЗИ) — широко используемый метод визуализации мочевыделительной системы. Ультразвуковые исследования обладают такими преимуществами, как неинвазивность, отсутствие ионизирующего излучения, широкая доступность, низкая стоимость и хорошее разрешение. Стандарты ультразвукового исследования почек варьируются в зависимости от особенностей организма человека, симптомов и анамнеза. Поэтому не стоит самостоятельно оценивать отклонения от нормы — доверьте эту задачу специалисту! Врач сможет учесть все необходимые факторы и правильно интерпретировать результаты ультразвукового исследования почек.

Обычно норма УЗИ почек Принимаются во внимание следующие показатели:

Размер почек:

У взрослых: - Длина — 100-120 мм; - Ширина — 50-60 мм; - Толщина — 40-50 мм

У детей норма зависит от возраста ребенка.

о Количество бутонов — 2 штуки.

о Форма - "бобовое зерно"

о Расположение: - Правая почка — в области 12-го грудного позвонка и второго поясничного позвонка; - Левая почка — в области 11-го грудного позвонка и первого поясничного позвонка.

о Эхогенность однородна.

о Толщина паренхимы — 14-26 мм

о Скорость кровотока — от 50 до 150 см/сек.

Ультразвуковое исследование хорошо зарекомендовало себя как метод первичного исследования при подозрении на уrolитиаз. Ультразвуковое исследование почек является предпочтительным методом визуализации для выявления гидронефроза [7]. Однако исследование камней в почках с помощью ультразвука имеет свои недостатки. Чувствительность ультразвука при обнаружении камней размером менее 3 мм крайне низка и достигает всего 13%. Кроме того, ультразвуковое исследование плохо очерченных камней в почках часто преувеличивает их размер, что может повлиять на тактику лечения [9]. Что касается изучения почечного кровотока, ультразвук не может быть использован для его оценки.

Распространение доплеровского ультразвукового исследования в последние годы, а также появление публикаций об использовании импульсно-волнового режима для измерения параметров, не зависящих от угла, позволяют предположить, что доплеровское ультразвуковое исследование может быть полезным методом, дополняющим эхографию, при диагностике мочекаменной болезни и мони-

торинге лечения. Новые возможности открылись с развитием двухмерного ультразвукового сканирования, позволившего неинвазивно изучать сосудистое русло.

Диагностическими критериями данного метода являются: ультразвуковое изображение просвета сосуда, его диаметр и толщина стенки. При разработке методики комбинированной оценки ультразвуковых изображений сосуда в реальном времени и анализа спектра доплеровского частотного сдвига была создана новая методика — дуплексное сканирование. Ультразвуковое исследование было обеспечено новой методикой — дуплексным сканированием с цветным доплеровским картированием кровотока, суть которой заключалась в кодировании разными цветами направления и скорости кровотока в просвете сосуда. Первый этап исследования — получение изображений почечных артерий и вен. В режиме цветного картирования определяется положение сосуда, а также его ход и схема ветвления. Второй этап — изучение спектра скоростей кровотока в импульсном режиме. Выбирается тестовый объем глубиной 2-4 мм. Угол сканирования корректируется таким образом, чтобы линия, определяющая угол наклона сканирования, совпадала с продольной осью сосуда в исследуемой области. Устанавливается минимальный доплеровский фильтр (50 МГц). Определяется минимальный уровень частоты повторения импульсов, при котором отсутствует искажение доплеровского спектра, устанавливается базовый уровень, после которого измеряются скорости кровотока. После длительных исследований были выявлены некоторые параметры для оценки почечного кровотока, в частности, индекс резистентности. Индекс резистентности определяется как отношение разницы между максимальной систолической скоростью кровотока и конечной диастолической скоростью кровотока к максимальной систолической скорости. В большей степени он отражает состояние микроциркуляторного русла (тонус, состояние стенок артериол и капилляров). Исследование индекса резистентности используется в урологии для оценки функционирования почечного трансплантата.

В течение многих лет ведутся дебаты относительно целесообразности использования индекса резистентности для оценки почечного кровотока при обструкции мочеточника камнями. По мнению многих авторов, индекс резистентности является хорошим индикатором почечного кровотока по сравнению с другими показателями и одним из надежных диагностических признаков почечной колики [8-10]. Исследователи придерживаются разных мнений относительно специфичности этого метода, когда приступ длится более 72 часов. Индекс также различается при полной и частичной обструкции мочеточника. По мнению некоторых авторов, наиболее ценные данные получают при сравнительной оценке кровотока в пораженной и здоровой почке; кроме того, по сравнению с другими методами, цветное доплеровское картирование является неинвазивным и легко воспроизводимым методом исследования. Таким образом, доплеровская сонография является информативным методом оценки почечного кровотока у пациентов с уролитиазом. Исследования выявили замедление кровотока и сосудистого сопротивления во внутривисцеральных артериях, которые возвращаются к исходному уровню в среднем к 7-му дню после ДЛТ. Обструктивные изменения в послеоперационном периоде значительно замедляют процесс нормализации кровотока, что крайне важно для пациентов, нуждающихся в повторных сеансах литотрипсии. При наличии таких изменений в предоперационном периоде показатели кровотока изначально снижены. Большой интерес представляют замедление кровотока и повышение сосудистого сопротивления в контралатеральных почках, а также тот факт, что в поврежденной почке показатели кровотока нарушаются в большей степени в области, прилегающей к камню.

Мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) ограничивается уровнем обструкции после ее выявления с помощью МРУ. Это необходимо для снижения радиационного облучения. В исследовании Бландино и др. (2003 г.), посвященном выявлению камня в мочеточнике как причины почечной колики, комбинированное исследование МРУ и ограниченной МСКТ показало чувствительность 98%, в то время как чувствительность полного сканирования мочевыделительной системы с помощью МСКТ составила 100%. Более того, эффективная доза облучения была в 5,4 раза ниже при комбинированном исследовании МРУ и ограниченной МСКТ [11].

Метод КТ-перфузии основан на временных изменениях в тканях после введения йодсодержащих контрастных веществ. Перфузия — это кровоток через единицу объема ткани. Существует линейная зависимость между увеличением плотности ткани и концентрацией йода в ткани. Перфузия отражает объективную количественную характеристику ткани, в которой с помощью математических моделей и специального программного обеспечения оцениваются изменения плотности ткани, непосредственно отражающие транспорт кислородсодержащих и питательных веществ в ней на уровне капилляров микрососудистой сети. Метод КТ-перфузии основан на том, что после внутривенного болюсного введения контрастного вещества измеряется степень его концентрации в исследуемом органе; для регистрации этого проводится сканирование всего органа или опухоли через различные

промежутки времени. Однако использование КТ-перфузии почек в качестве передового метода визуализации имеет ряд ограничений, в первую очередь связанных с отсутствием единых стандартизированных протоколов низкодозового сканирования, использование которых было бы оптимальным в многопрофильных больницах, оснащенных мультиспиральными компьютерными томографами. Другой проблемой остается неопределенность возможной вариабельности результатов КТ-перфузии при использовании различного программного обеспечения для обработки данных. Все вышеперечисленное определяет актуальность КТ-исследований.



Рис. 1. Небольшие камни в почках.



Рис. 2. ИКД правой почки.

В 2022 году Республиканский научно-исследовательского центра неотложной медицины выполнил около 3756 ультразвуковых исследований почек, из которых 3278 случаев были с уретерогидронефрозом; в 2023 году за 9 месяцев было проведено 2334 ультразвуковых исследования почек с уретерогидронефрозом (2047 случаев); 3123 случая почечных колик в 2022 году, 1003 случая в 2023 году, из которых была выполнена МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография). В 2022 году было зарегистрировано 451 случай, в 2023 году за 9 месяцев было 559 случаев. Пациенты поступали в отделение неотложной помощи с приступами почечной колики; после осмотра урологом пациентам проводились ультразвуковые и лабораторные исследования. Некоторым пациентам при необходимости проводилась МСКТ почек, мочеточников и мочевого пузыря. При обследовании большинства случаев ультразвуковое исследование пациентов выявляет гидронефроз пораженной почки.

В ходе нашего собственного исследования за последний месяц в отделение неотложной помощи поступило около 97 пациентов, у 27 из которых был диагностирован мочекаменный синдром, камни в почках, у 70 — уретерогидронефроз почек. У 39 из этих пациентов была проведена мультис-

пиральная компьютерная томография (МСКТ) почек, в ходе которой был выявлен мочеточниковый камень, после чего этим пациентам было выполнено стентирование мочеточника.




Рис. 3. Гидронефроз 1-2 степени.




Рис. 4. Гидронефроз 4 степени




Рис. 5.

Заключение. Радиологическое исследование целесообразно выполнять для экстренной оценки анатомических причин обструкции, определения взаимоотношения почек и мочеточников и их количества, первичной дифференциальной диагностики с другими заболеваниями и первичной оценки функции почек. Метод УЗИ является скрининговым методом и позволяет выявить конкременты в чашечках, лоханке, лоханочно-мочеточниковом и пузырно-мочеточниковом сегментах, а также оценить состояние верхних мочевых путей. Наиболее эффективным является применение метода КТ, которая позволяет определить локализацию конкрементов по отношению к анатомическим структурам, их размеры, плотность, с наибольшей точностью выявлять сопутствующие изменения, также проводить дифференциальную диагностику с другими заболеваниями со схожей с МКБ симптоматикой

Список литературы:

1. Адам А., Диксон А.К. Глава 1 «Ультразвуковое исследование и общие принципы». В: Адам А. (редактор). Диагностическая радиология Грейнджера и Еллисона. 5-й изд. Filadelfiya: Churchill Livingstone/Elsevier; 2008.
2. Ричмонд Дж. Рентгенологическая диагностика камней в почках. Нефрология. 2007;12:С34.
3. Вестпхален АС, Хсия РЙ, Маселли ЖХ, Ванг Р, Гонзалес Р. Рентгенологическая визуализация пациентов с подозрением на камни в мочевыводящих путях: национальные тенденции, диагнозы и предикторы. Асад Емерг Мед. 2011;18:С31-6.
4. Ахмедов Ф.Х., Жумаева М.М. Ультразвуковое исследование при желчнокаменной болезни, остром калькулезном холецистите, отборе пациентов для гепатохолецистита, изменениях желчных протоков до и после операции //Центральноазиатский журнал медицинских и естественных наук - 2022. - Т.3. – № 3. - С-322-324.
5. Ахмедов Ф. Х. 2. Жумаева М.М. Сравнительная морфометрия внутри- и внепеченочных желчевыводящих путей, желчных сфинктеров у пациентов с ГСД, перенесших классическую и лапароскопическую холецистэктомию //Научный журнал исследований травмы и инвалидности// 2022.- стр. 231-241.
6. Ахмедов Ф. Х., Жумаева М.М. Морфологические изменения при холелитиазе // Евразийский журнал медицинских и естественных наук - 2 (12) 2022. - С - 274-283. [хтtps://doi.org/10.5281/zenodo.7381138](https://doi.org/10.5281/zenodo.7381138)
7. Ахмедов Ф. Х., Жумаева М. М. Ультразвуковая диагностика желчного пузыря при желчнокаменной болезни // Амалий ва тиббиёт фанлари илмий журналы - ИССН: 2181-3464.- 1(7). -2022.-Б.-15-21.
8. Ахмедов Ф. Х., Жумаева М.М. Сравнительная морфометрия внутри- и внепеченочных желчевыводящих путей и желчных сфинктеров у пациентов с ГСД // Амалий ва тиббиёт фанлари илмий журналы - 1(7). -2022.-Б.-22-27.
9. Ахедов Ф. Х., Жумаева Н. Х. Жумаева М.М. Сравнительная морфометрия желчных путей и сфинктеров желчи у пациентов с гликогенозом, перенесших классическую и лапароскопическую холецистэктомию. // Журнал «Узбекский ученый»
10. Ахмедов Ф.Х., Жумаева М.М., Железный шлам // Научный журнал травматологии и исследований инвалидности.-1(12). -2022.-С.-73-82.
11. Ахмедов Ф. Х., Джумаева М.М. Сравнительная ультразвуковая морфометрия у пациентов после традиционной холецистэктомии // Журнал естественно-медицинского образования. -2023.- Том 2, Выпуск 3. ИССН: 2835-303Х. -С. 168-173.
12. Ахмедов Ф. Х., Джумаева М.М. Ультразвуковая сравнительная морфометрия внутри- и внепеченочных желчных протоков после лапароскопической холецистэктомии // Журнал естественно-медицинского образования. -2023.- Том 2, Выпуск 3. -С. 174-179.
13. Жумаева М.М. Ут Тош Касаллигида Ут Копи Деворинг Морфологический Ва Гистокимёвый узгаришлар //Амалий Ва Тиббийот Фанлари Илмий Журнали.- 2023.- Жилд: 02 Нашр: 04.-Б.-1-4.

Для цитирования: Шакирова Н.С., Ахмедов Ф.Х., Жумаева М.М. Ультразвуковая диагностика мочекаменной болезни // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 4(24). – С. 149–155. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19468862>

ИС ГАЗИНИНГ ОРГАНИЗМГА ТАЪСИРИ (АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ)**Адизов С.Р., Абдуллаева М.А.**

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Ушбу бўлимда углерод оксиди (CO) газининг инсон организмига таъсири, унинг заҳарланиш механизми ҳамда соғлиқ учун хавфли оқибатлари ёритиб берилган. CO газининг гемоглобин билан бирикishi натижасида организмда кислород ташилиши бузилиб, гипоксия ҳолати юзага келиши тушунтирилган. Шунингдек, заҳарланиш белгилари, оғирлик даражалари ва олдини олиш чоралари таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: углерод оксиди, CO гази, заҳарланиш, гипоксия, гемоглобин, инсон организми, токсик таъсир, профилактика.

EFFECTS OF CARBON MONOXIDE ON THE BODY (LITERATURE REVIEW)**Adizov S.R., Abdullaeva M.A.**

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. This section discusses the effects of carbon monoxide (CO) on the human body, its toxic mechanism, and potential health consequences. It explains how CO binds with hemoglobin, reducing oxygen transport and causing hypoxia in body tissues. The section also analyzes the main symptoms of poisoning, severity levels, and preventive measures.

Key words: carbon monoxide, CO poisoning, hypoxia, hemoglobin, human body, toxic effects, symptoms, prevention.

ВЛИЯНИЕ УГАРНОГО ГАЗА НА ОРГАНИЗМ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)**Адизов С.Р., Абдуллаева М.А.**

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. В данном разделе рассматривается влияние угарного газа (CO) на организм человека, механизм его токсического воздействия и возможные последствия для здоровья. Объясняется процесс связывания CO с гемоглобином, приводящий к нарушению транспортировки кислорода и развитию гипоксии. Также анализируются основные симптомы отравления, степени тяжести и меры профилактики.

Ключевые слова: угарный газ, CO, отравление, гипоксия, гемоглобин, организм человека, токсическое воздействие, профилактика.

e-mail: muhahakimov457@gmail.com, abdullayeva.muslima@bsmi.uz

Сўнгги ўн йилликларда экологик омиллар инсон организмига, айниқса ички аъзоларга таъсирига катта эътибор қаратила бошланди. Атроф-муҳитнинг ифлосланиши нафақат нафас олиш тизими касалликларини, балки турли ички органларнинг, жумладан ошқозон ости безининг патофизиологик ўзгаришларини ҳам келтириб чиқариши мумкин. Шу жумладан, ис гази (углерод оксиди, CO)- ҳаводаги заҳарланишнинг асосий манбаларида бири бўлиб, унинг сурункали таъсири хужайралар трофикаси, метаболизм жараёнлари ва орган тузилишидаги бузилишларга сабаб бўлади.

Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти маълумотларига кўра, шаҳар муҳитида ҳавога чиқариладиган углерод оксидининг катта қисми автотранспорт воситалари ҳиссасига тўғри келади. Айниқса, ёпиқ ёки шамоллатилиши етарли бўлмаган биноларда ушбу газнинг концентрацияси тез ортиб кетиши мумкин (WHO, 2010).

Кўплаб мамлакатларда майший иситиш тизимларининг носозлиги, газ печлари ва вентиляция тизимларининг тўғри ишламаслиги ис гази билан заҳарланиш ҳолатларининг асосий сабабларидан бири сифатида қайд этилган.

Ис гази (CO) — ҳидсиз, рангсиз ва таъмсиз газ бўлиб, юқори токсикликка эга. Инсон сезги органлари орқали сезилмаслиги сабабли, CO кўп йиллар давомида хавфли модда сифатида эътироф этилган.

CO углеводородли ёқилғининг тўлиқ бўлмаган ёқилиши натижасида ҳосил бўлади ва гемоглобинга (Hb) кислородга нисбатан 200–300 маротаба тезроқ боғланади.

Клиник ва патофизиологик жиҳатдан СО шундай ҳаракат қилади:

- СО **альвеоляр эпителий орқали ўтказувчан капиллярларга** кириб, эритроцитларда гемоглобинга боғланади.

- Бу боғланиш натижасида **карбоксигемоглобин (СОНb)** ҳосил бўлади.

- Энг асосий патофизиологик механизм — **гипоксия**, яъни оксидланиш ва кислород ташишнинг бузилиши, СОНb ҳосил бўлиши орқали юзага келади.

Хусусан, ис газининг нафас олиш тизимидаги таъсири кўпгина тадқиқотлар орқали ўрганилган бўлса-да, унинг ошқозон ости безига таъсирига оид маълумотлар нисбатан кам ва тадқиқотлар ўсиб бормокда. Ошқозон ости бези ички секреция (инсулин, глюкагон каби гормонлар) ҳамда ташқи секреция (ферментлар) вазифасини бажаради. Шунинг учун унинг тузилиши ва морфометритрик хусусиятларини ўрганиш аҳамиятли ҳисобланади [4; 4-9 б.].

Кутаг ва ҳамкасблари (2019) ис газининг таъсирига гипоксия билан боғлиқ механизмларини. Уларнинг маълумотларига кўра, сурункали гипоксия ошқозон ости безига ҳужайралар ўлимига ва фиброзга сабаб бўлади, бу эса морфометрияда сезиларли ўзгаришлар билан ифодаланади. Шунингдек, улар ис газининг таъсирида без тўқимасида капиллярлар сонининг камайиши ва кислород етишмовчилиги оқибатида метаболит фаолиятининг пасайишини таъкидлайдилар [45; 45-53 б.].

Ис газининг сурункали таъсири ҳозирги кунда экологик ва тиббий фаннинг долзарб масалаларидан бири. Бир қанча олимлар унинг организмдаги заҳарланиш механизмларини, айниқса ички органларга таъсири турлича ёритганлар.

Smith ва ҳамкасбларининг (2018) тадқиқотида кўра, ис газининг таъсирида нафақат нафас олиш тизими, балки юрак ва буйрак каби ички органларда ҳам структур ўзгаришлар юзага келади. Улар ис газининг таъсири остидаги тўқималарда яллиғланиш, фиброз ва ҳужайралар сонининг камайиши кузатилганлигини таъкидлашади. Шунингдек, ис газининг таъсиридаги оксидлаш стресси даражасини оширади ва антиоксидант ҳимоя механизмларини сусайтиришга олиб келади.

Ис газининг (СО) билан заҳарланиш ҳар йили дунё бўйича тахминан 50 000 нафар инсонда қайд этилади. Клиник намоён бўлиши турли даражада кечиби, енгил ҳолларда бош оғриғи ва бош айланиши билан ифодаланса, оғир ҳолларда эса кома ва ўлимгача олиб келиши мумкин. Ўлим кўрсаткичи 1–3%ни ташкил этади [54; 435-446 б.].

СО билан заҳарланишдан кейин тирик қолган беморларнинг кўпгина қисмида узок муддатли неврологик ва аффектив асоратлар ривожланади. Неврологик бузилишлар қондаги СО миқдори билан ҳар доим ҳам мутаносиб бўлмайди. Бу ҳолат, эҳтимол, СО нинг ҳужайра митохондрия нафас олиши, ҳужайра энергия алмашинуви, яллиғланиш жараёнлари ҳамда эркин радикаллар ҳосил бўлишига кўп томонлама (плеотроп) таъсири билан изоҳланади. Айниқса, мия ва юрак тўқималари бу таъсирга жуда сезгир ҳисобланади. [22; 309–317 б.].

Ис газининг (СО) билан заҳарланиш — тўқималардаги гипоксиянинг ўткир ва сурункали шакллари келтириб чиқарувчи оғир патологик ҳолат ҳисобланади. СО гемоглобин билан 200–250 марта юқори аффинитетда боғланиб, карбоксигемоглобин ҳосил қилади ва оксигемоглобин диссоциация эгри чизигини чапга силжитади. Бу ҳолат тўқималарга кислород ажралиб чиқишини чеклайди ва системали гипоксия ривожланишига олиб келади. Бироқ замонавий қарашларга кўра, СО интоксикацияси фақат гемик гипоксия билан чекланмайди. У митохондрия цитохром-оксидаза тизимини блоклайди натижада, электрон ташиш занжирини бузади ва оксидатив фосфорланишни пасайтиради. Натижада АТФ синтези камайдиган, кальций гомеостази бузилади ва ҳужайравий некроз ёки апоптоз механизмлари фаоллашади. Тадқиқотларда СО таъсирида реактив кислород шакллари (ROS) ва реактив азот шакллари (RNS) ҳосил бўлиши кучайиши, липид пероксидацияси ортиши ва ҳужайра мембраналарининг зарарланиши исботланган. Шунингдек, эндотелиал дисфункция, микроциркуляция бузилиши ва яллиғланиш медиаторлари экспрессиясининг ортиши ҳам патогенезнинг муҳим бўғини ҳисобланади.

Бундай ҳолларда узок муддатли нейрокөгнитив бузилишлар беморларнинг 15–40% ида кузатилади. Ўртача ва оғир даражада заҳарланган беморларнинг тахминан учдан бир қисмида юрак фаолияти бузилишлари яъни, аритмиялар, чап қоринча систолик дисфункцияси ҳамда миокард инфаркти қайд этилади. Нейровизуализация тадқиқотларида мия оқ моддасида гиперинтенсив ўчоқлар, кечиккан постгипоксик лейкоэнцефалопатия ёки диффуз мия атрофияси аниқланади. Бундай беморларни аниқлашда, айниқса тўсатдан заҳарланиш, ёнғин билан боғлиқ заҳарли газлар таъсири ёки ингаляцион жароҳатлар ҳолатида, кўшимча дори воситалари қабул қилинганлигини аниқлаш муҳим аҳамиятга эга. [2; 96–105 б., 8; 1-4 б.].

Беморларни анъанавий даволаш усуллари нормобарик ва гипербарик оксигенотерапия билан чекланади, махсус антидот мавжуд эмас. Гипербарик оксигенотерапия СО билан заҳарланишнинг

доимий неврологик ва аффектив асоратларини сезиларли даражада камайтирса-да, тирик қолган беморларнинг бир қисмида барибир жиддий морбидлик сақланиб қолади.

2012 йилда Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти маълумотларига кўра, Европада СО заҳарланишидан йиллик ўлим кўрсаткичи ҳар 100 000 аҳолига 2,2 ҳолатни ташкил этган. Бу кўрсаткични жамоат саломатлиги муаммоси сифатида тан олинган бошқа касалликлар билан таққослаш мумкин:

- ОИТС (HIV/AIDS) — 2,0 / 100 000
- Тери саратони — 2,1 / 100 000
- Алкоголизм — 2,6 / 100 000

Айрим давлатларда, масалан:

- Эстония — 11,99 / 100 000
- Беларусь — 6,2 / 100 000

Бу кўрсаткичлар ҳатто қандли диабет билан (11,4 / 100 000) таққосланиши мумкин. [Монография, содержащая клинические данные карбоксигемоглобине (COHb)]

Ис гази (углерод оксиди, СО) билан заҳарланиш энг кўп учрайдиган ва ўлимга олиб келиши мумкин бўлган заҳарланиш турларидан бири ҳисобланади (1) ва асосан уни нафас орқали қабул қилиш натижасида ривожланади. Углерод оксиди рангсиз в— а ҳидсиз газ бўлиб, у углеводородларнинг тўлиқ ёқилмаслиги натижасида ҳосил бўлади. Ис гази билан заҳарланишнинг энг кенг тарқалган манбаларига уй-жойлардаги ёнғинлар, вентиляция тизими тўғри ишламайдиган автомобиль ёки моторли қайиқлар, шунингдек газли иситгичлар, печлар, сув иситгичлари, ўтин ёки кўмир ёқиладиган печлар, ҳамда керосинли иситгичлар киради. Углерод оксиди табиий газ (метан ёки пропан) ёниши жараёнида ҳам ҳосил бўлади. Метиленхлорид таъсири организмда кечиктирилган углерод оксиди билан заҳарланишга сабаб бўлиши мумкин. Тамаки тутунини нафас орқали қабул қилиш қонда углерод оксидининг пайдо бўлишига олиб келади, бироқ унинг миқдори, одатда, клиник аҳамиятга эга бўлган заҳарланишни келтириб чиқариш учун етарли эмас. [30; 1-216., 50; 1217-1225 б].

Ис гази (СО) билан заҳарланиш дунё миқёсда токсик гипоксиянинг энг кўп учрайдиган сабабларидан бири ҳисобланади. СО гемоглобин билан юқори аффинитетда боғланиб, карбоксигемоглобин ҳосил қилади ва шу орқали тўқималарга кислород етказилишини кескин камайтиради. Бироқ замонавий тадқиқотлар СО интоксикацияси патогенези фақатгина гипоксия билан чекланмасдан, митохондриал дисфункция, оксидатив стресс ва эндотелиал шикастланиш билан ҳам боғлиқ эканлигини кўрсатмоқда [3; 96-105 б., 14; 253-255 б].

Ис гази (СО) азот оксиди (NO) га ўхшаш бўлиб, биологик тизимларда кўплаб физиологик вазифаларни бажарадиган сигнал (мессенжер) молекула ҳисобланади. У юрак-қон томир тизими, асаб тизими ва иммун тизими фаолиятида муҳим рол ўйнайди.

Олиб борилган тажрибалар натижасида, СО гуанилатциклазининг (GC) регулятор субъединицасидаги гем ҳалқаси билан стимулловчи ўзаро таъсир орқали хужайра ичида циклик гуанозинмонофосфат (ц-GMP) даражасини оширади. Ушбу ўзаро таъсир натижасида Ca^{2+} -АТФаза фаоллашади ва Ca^{2+} каналлари ингибицияланади. Бу эса силлиқ мушак хужайраларининг релаксациясига олиб келади.

Гемоксигеназа (НО) ферментига бўлган илмий қизиқиш 1968 йилда Tenhunen ва унинг ҳамкасблари томонидан гем катаболизмининг механизми тавсифланганидан сўнг бошланган. Кейинчалик гемоксигеназа деярли барча тирик организмларда мавжуд экани аниқланди ва у хужайраларнинг кислород шароитига мослашув (адаптация) механизмининг муҳим мисоли сифатида эътироф этилди. [32; 300., 36; 879-887 б.].

Ис гази — бу рангсиз, заҳарли ва ҳидсиз газ бўлиб, у гемоглобин билан боғланиб, қондаги кислород ташиш вазифасини пасайтиради. Шунинг учун ис гази сурункали таъсир қилганда, тўқималар ва органлар гипоксия ҳолатига тушади. Бу ҳолат сурункали ис гази билан заҳарланишнинг асосий патогенетик механизми ҳисобланади [54; 435-446 б].

Гипоксия механизмларини ўрганишга бағишланган илмий ишлар сони кўп бўлиб, уларда гипоксиянинг турли тизим ва аъзолар — бош мия, юрак, ўпка, буйрак ва бошқа аъзоларга таъсири кенг ёритилган.

Ҳар қандай табиатга эга бўлган тўқима гипоксиясида асосий патогенетик бўғин хужайраларда энергия танқислиги ривожланиши ҳисобланади. Хужайраларнинг энергия билан таъминланиши тўқимавий нафас олиш жараёнига асосланади. Бу жараён митохондрияларнинг ички мембранасида содир бўлиб, субстратдан кислородгача бўлган кўп босқичли электронлар кўчиши орқали амалга ошади; бунда кислород сувгача қайтарилади. Шу билан бир вақтда протонлар ташилиши юз беради,

натижада мембранада потенциаллар фарқи ҳосил бўлиб, АТФ синтези (оксидловчи фосфорланиш) таъминланади. [59; 2210-2217 б].

Шу тариқа, митохондриялар ҳужайрада гипоксиянинг асосий «нишони» ҳисобланади, чунки улардаги цитохромоксидаза инсон организмда истеъмол қилинадиган кислороднинг 90% дан ортиғини қайтарилишини таъминлайди. Нафас занжирида электронларни қабул қилувчи сифатида кислород танқислиги митохондрияларнинг биоэнергетик функциясини чуқур сусайтиради. Ҳужайрада энергия ҳосил қилиш тизимларининг етишмовчилиги кўплаб касалликларнинг муҳим патогенетик бўғини ҳисобланади. Экстремал шароитларда ҳаёт фаолияти энергия танқислиги критик даражага етмагунига қадар сақланиб туриши мумкин. Энергетик захиралар меъёрдан паст даражага тушиб кетганда эса ҳужайрада қайтмас жараёнлар ривожланиб, организм ўлимига олиб келади [50; 1875–1882 б].

Клиник белгилар деярли барча аъзо ва тизимларни қамраб олади, симптомлар кенг доирада намоён бўлади, турли хил тизимли асоратлар ва қолдиқ ҳолатларга олиб келиши мумкин. Улар гемоглобиннинг кислород ташиш қобилиятининг сусайиши натижасида юзага келадиган асфиксия билан боғлиқдир.

Қонда ва тўқималардаги карбоксигемоглобин (СОHb) даражаси ҳамда таъсир давомийлиги клиник симптомларни белгилайди. Симптомларнинг оғирлик даражаси инсонлар орасида фарқ қилади, бироқ СО даражаси билан клиник ҳолат оғирлиги ўртасида ҳар доим ҳам тўғридан-тўғри боғлиқлик кузатилмаслиги мумкин.

Аҳолининг айрим гуруҳлари СО токсик таъсирига нисбатан юқори хавф гуруҳига киради ва кўпроқ сезгир ҳисобланади. Буларга болалар, кексалар, ўпка ва юрак-қон томир касалликлари бўлган беморлар, тоғли ҳудудларда яшовчи шахслар, чекишга мойил инсонлар ҳамда организмда СО даражаси юқори бўлган шахслар киради.

Кислород етишмовчилиги, нафас занжирининг блоккланиши ва оксидловчи фосфорланишнинг ажралиши АТФ ҳамда креатинфосфат танқислигига олиб келади. Компенсатор механизм сифатида гликолиз индукцияланади, аммо у юзага келган энергия танқислигини тўлиқ бартараф этолмайди. Гликолиз фаоллашуви вақтинчалик хусусиятга эга бўлиб, лактат тўпланиши ва рН пасайиши натижасида сусаяди. Шу тариқа, АТФ етишмовчилиги янада кучайиб, прогрессив тус олади [20; 93-97 б].

Гликолиз жараёнининг вақтинчалик фаоллашувидан сўнг унинг сусайиши билан бир қаторда, ҳужайрада бошқа метаболик йўллар ҳам тормозланади. Бу ҳолат митохондрияларда қайтарилган кофакторлар NADH ва FADH₂ тўпланиши билан боғлиқ. Чунки нафас занжирида электронлар транспорти блокланган шароитда уларнинг оксидланган шаклга (NAD⁺ ва FAD) қайта ўтиши имконсиз бўлади. Ушбу кофакторларнинг оксидланган шакллари миқдорининг камайиши митохондриял дегидрогеназалар фаоллигини сусайтиради, натижада трикарбон кислоталар цикли (Кребс цикли) ва ёғ кислоталарининг β-оксидланиши секинлашади. Ҳужайрадаги патологик ўзгаришларнинг ушбу эрта ва ҳали қайтар бўлиши мумкин бўлган босқичи «асосий метаболик йўлларнинг ингибицияси босқичи» деб таърифланади [9; 45-51 б].

Мазкур жараёнлар мембрана транспортининг бузилишига, биосинтез реакцияларининг издан чиқишига ва ҳужайра ичида кальций ионларининг ортиқча тўпланишига олиб келади. Кальцийнинг ортиқча миқдори ҳужайра учун хавфли бўлиб, у ҳужайра ўлими механизмларининг асосий омилларидан бири сифатида қаралади [15; 65-69 б].

Цитоплазмада кальций миқдорининг кескин ортиши ҳужайра мембраналарининг шикастланишига сабаб бўлади. Бу жараён турли механизмлар орқали бошқарилади, хусусан, гипоксик ҳужайрада актив кислород шакллари (АКШ) тўпланиши билан индукцияланадиган липидларнинг перекис оксидланиши фаоллашуви орқали. АКШ генерацияси кальцийга боғлиқ митохондриял шикастланиш ва электрон донорлари қайтарилган кофакторлар — ортиқча тўпланиши натижасида юзага келади [60; 778-782 б].

Шу тариқа, гипоксиянинг шикастловчи таъсири тўлиқ оксидланмаган маҳсулотларнинг тўпланиши ва юқори токсик эркин радикаллар ҳосил бўлиши билан янада кучаяди. Липидларнинг перекис оксидланиши маҳсулотлари мембраналарни (жумладан, митохондриял мембраналарни) емириб, энергия алмашинуви бузилишини янада чуқурлаштиради. Натижада гипоксик шикастланишнинг ёпиқ айланма механизми шаклланади [27; 873-878 б].

Гипоксия шароитида ошқозон ости безининг экзокрин қисми-ацинар ҳужайралар кислород етишмовчилигига юқори сезгирлиги билан ажралиб туради. Кислород етишмовчилиги ҳужайра энергетик метаболизмини сусайтиради, митохондриял функцияни бузади ва АТФ синтезини

камайтиради. Бу эса ўз навбатида ион насослари ишининг бузилишига, хужайра ичида кальций гомеостазининг издан чиқишига ва оксидловчи стресснинг кучайишига олиб келади.

Johnson ва Lee (2015) томонидан амалга оширилган тадқиқотлар шуни кўрсатдики, ошқозон ости безининг морфометрияси организмнинг ҳолатига, яъни ёш, жинс ва экологик шароитларга боғлиқ равишда ўзгаради. Уларнинг фикрича, ошқозон ости безига ис газининг сурункали таъсири без морфометрик кўрсаткичларида сезиларли ўзгаришларга олиб келади. Масалан, ис газ таъсирида Лангерганс оролчаларининг ҳажми ва хужайралар сонининг камайиши кузатилади. Бу эса ўз навбатида гормон ишлаб чиқаришида бузилишлар келади [39; 150-162 б].

Морфологик жиҳатдан гипоксия таъсирида ацинар хужайраларда қуйидаги ўзгаришлар кузатилади: - цитоплазмада вакуолизация ва дистрофик ўзгаришлар; - митохондрия шиши ва ядро тузилишининг бузилиши; - зимоген гранулаларининг тарқалиши ёки камайиши; - ядро пикнози ва кариолиз белгилари; - интерстициал шиш ва микроциркуляция бузилиши.

Узоқ давом этувчи гипоксия ҳолатида ацинар тўқималарда фиброзланиш жараёнлари фаоллашиши мумкин. Бу экзокрин функциянинг пасайиши ва ҳазм ферментлари синтезининг камайишига олиб келади. Ис газ (СО) билан заҳарланишнинг асосий патогенетик механизми гемоглобин билан боғланиб карбоксигемоглобин ҳосил қилиш орқали кислород ташувчанлигини кескин камайтиришдан иборат. Натижада тўқималарда сурункали гипоксия ривожланади. Ошқозон ости беи юқори метаболик фаол аъзо бўлгани учун кислород етишмовчилигига сезгир ҳисобланади.

СО таъсирида ацинар хужайраларда:

- оксидловчи стресс кучаяди (ROS миқдори ортиши)
- митохондрия дисфункция юзага келади
- апоптоз механизмлари фаоллашиши мумкин
- секретор фаолият сусаяди

Бу ўзгаришлар ошқозон ости безининг экзокрин функциясининг бузилиши ва ҳазм жараёнига салбий таъсир кўрсатиши мумкин. Адабиётларда СО ва гипоксия таъсирида ошқозон ости безида дистрофик ҳамда яллиғланишга хос ўзгаришлар қайд этилган бўлиб, бу экзокрин ва эндокрин компонентларнинг ўзаро боғлиқ патофизиологиясини тасдиқлайди [7; 455-464., 21; 108-111б].

Шундай қилиб, СО билан заҳарланишдан кейин юзага келадиган гипоксия ошқозон ости беи экзокрин қисмида морфологик ҳамда функционал ўзгаришларни юзага келтириб, ошқозон ости безида патологиялар ривожланиш хавфини оширади. Адабиётлар шарҳи ушбу механизмларнинг чуқур таҳлилини талаб қилади, чунки ошқозон ости беи патофизиологиясида гипоксик омиллар муҳим ўрин тутади. [29; 128–130 б].

Организмнинг гипоксияга жавоби унинг ривожланиш тезлиги, даражаси ва давомийлигига, шунингдек организмнинг физиологик ҳолати ҳамда кислород етишмовчилигига бўлган индивидуал сезгирлигига боғлиқ бўлади. Бу сезгирлик кўп жиҳатдан генотип билан белгиланади. Гипоксияга барқарорликнинг генетик детерминацияси гипоксия таъсирида индукцияланувчи омил — **HIF-1α** генида кўплаб полиморфизмлар мавжудлиги ҳақидаги маълумотлар билан тасдиқланган.

Бироқ гипоксияга чидамлилиқ фақат генетик омиллар билан эмас, балки организмнинг фенотипик хусусиятлари билан ҳам белгиланади. Жумладан, кислород истеъмоли интенсивлиги, метаболизм даражаси, ҳуқ-атвор реакциялари ва ҳисобга олиш қийин бўлган бошқа индивидуал фарқлар муҳим аҳамиятга эга. Бундан ташқари, гипоксияга чидамлилиқнинг суткалик ва мавсумий ритмининг мавжудлиги ҳам қайд этилган. Тизимли яллиғланиш реакцияси механизмларида микроциркуляция бузилиши ва диссеминацияланган томир ичи коагуляцияси билан боғлиқ гипоксия ҳал қилувчи ўрин тутади. Шунга кўра айрим тадқиқотларда сепсис кечишининг оғирлиги кислород етишмовчилигига бўлган чидамлилиқ даражасига боғлиқ эканлиги кўрсатилган.

Ҳозирги кунда гипоксиянинг молекуляр механизмлари жадал суръатларда ўрганилмоқда. Кўплаб илмий ишлар гипоксия таъсирида индукцияланувчи омил — **HIF-1** га бағишланган бўлиб, унинг организмдаги деярли барча жараёнларга таъсири тадқиқ қилинган. Маълумки, гипоксия шароитида фаоллашувчи асосий транскрипцион омил — **HIF-1** яллиғланишни тартибга солувчи **NF-κB** билан ўзаро боғлиқ бўлади. Яллиғланиш жараёнида **HIF-1** фаоллашуви хужайра ва тўқима турига қараб прояллиғланиш ёки яллиғланишга қарши таъсир кўрсатиши мумкин [12; 253-255., 14; 35-44 б].

Адабиётлар руйхати :

1. Абдуллаев Ш.А., Норқулов О.Т. // Ис газ таъсирида ошқозон ости безининг морфометрияси ва биохимияси//. Ўзбекистон тиббиёт илмий журнали, 2021, №2, б. 120-128 б.
2. Азимова С.Б., Одилов Д.И // Pathogenic Aspects Of Toxic Liver Damage In Carbon Monoxide Intoxication And Methods To Correct Them // The American Journal of Medical Sciences

and Pharmaceutical Research, 7(11), 2025, 96–105 p.

3. Александров П.М., Васильев К.И. //Влияние хронической интоксикации угарным газом на поджелудочную железу у крыс// Патологическая физиология и экспериментальная терапия, 2010, №2., 56–59 с.

4. Гребенюк А.Н., Быков В.Н. // Оксид углерода: механизм токсического действия, патогенез и клинические проявления острой интоксикации// Токсикологические вестник. №3 2021, 4-9 с. Жаҳон тиббиёт илмий журнали, 2022, №1, 30-37 б.

5. Иванов И.В., Петров А.С. //Хроническое воздействие угарного газа на морфологические показатели поджелудочной железы// Морфология, №3 78-81 с.

6. Козлов В.Н., Егорова Л.П. //Регенерация тканей поджелудочной железы после токсического воздействия//. Цитология и гистология, 2020, Т. 61, №5, 455-464 с.

7. Мансуров Рустам Шамильевич, Гурин Максим Александрович, Рубель Екатерина Вячеславовна. //Влияние концентрации углекислого газа на организм человека // Universum Технические науки №8 (41) 2021, 1-4 с.

8. Меерсон Ф.З. // Адаптация, стресс и профилактика// – Москва: Наука, 2014., 45-51 с.

9. Мирзахўжаев А.А., Каримова Д.Ж. Табиий биофаол моддаларнинг ошқозон ости безини муҳофаза қилишдаги роли

10. Монография, содержащая клинические данные о карбоксигемоглобине (СОНб)

11. Нургалиева А.Е., Галицкий Ф.А., Осипов В.Д., Жакупова Т.З. // Судебно-медицинское значение влияния ряда факторов на отравление угарным газом// Вестник КазНМУ №1 2020., 253-255 с.

12. Раҳмонов У.С., Ҳасанов И.М. //Ис газии таъсиридаги оқ зотсиз каламушларда ошқозон ости безининг морфологик таҳлили//. Тиббиётда янги кун 2021, №4 112–116 б.

13. Сидорова Е.Н., Кузнецова Т.В. Морфометрические изменения поджелудочной железы при гипоксии Вестник морфологии, 2019, Т. 26, №1, 35-44 с.

14. Сороковой В.И., // Гипоксия и адаптационные реакции организма // – Москва: Медицина. 2004, 65-69 б.

15. Тиббиёт ва биологияда илмий изла-нишлар, 2020, №3, б. 45-52.

16. Токсикология и Экология, 2017, №4, с. 52-60.

17. Тошпўлатов Ж.И., Саттаров Б.Х. //Ошқозон ости безида сурункали гипоксия таъсири: морфологик ва функционал ўзгари-

шлар// Экспериментальная патология 2019 №4, 92–99 б.

18. Ўзбекистон фанлари академияси ха-барлари, 2019, №4, б. 98-105.

19. Фролов Б.А., 2012; // Отравление угарным газом// Вестник АГИУВ №1 93-97 б.

20. Хавкин. А. И // Относительная экзо-кринная недостаточность поджелудочной желе-зы у детей // Вопросы современной педиатрии 2012 том 11/ № 3 108-111 с.

21. Шин М., Бронштейн А.С., Глидден Э. // Morbidity and Mortality of Unintentional Carbon Monoxide Poisoning// Annals of Emergency Medi- cine 2022, 309–317p.

22. Экспериментальная патология, 2018, №3, с. 78-85.

23. Afzal, M.; Agarwal, S.; Elshaikh, R.H.; Babker, A.M.A.; Choudhary, R.K.; Prabhakar, P.K.; Zahir, F.; Sah, A.K. // Carbon Monoxide Poisoning: Diagnosis, Prognostic Factors, Treatment Strategies, and Future Perspectives// Diagnostics 2025, 15, 581., 1-21p.

24. Ahmed M., Hassan F. //Role of Natural Oils in Reducing Oxidative Stress in Pancreatic Tis- sues under Toxic Conditions//. Journal of Eth- nopharmacology, 2021, Vol.270, Article 113783

25. Anatomical Record, 2017, Vol.300, Issue 5, pp.789-799.

26. Avellanas Chavala M.L. (2018). //Management of carbon monoxide poisoning//. – Medicina Intensiva. 873-878 p.

27. Banks, P.A.; Bollen, T.L.; Dervenis, C.; Gooszen, H.G.; Johnson, C.D.; Sarr, M.G.; Tsiotos, G.G.; Vege, S.S. // Classification of Acute Pancrea- titis—2012// //Revision of the Atlanta Classification and Definitions by International Consensus//. Gut 2013, №62, 102–111p.

28. Basnayake, C.; Ratnam, D. //Blood Tests for Acute Pancreatitis//. – Aust Prescr, 38(4), 128–130 p.

29. Clinical Toxicology, 2019, Vol.57, Issue 3, pp.212-220.

30. Dent, M.R.; Rose, J.J.; Tejero, J.; & Gladwin, M.T. (2024) // Carbon Monoxide Poison- ing//: From Microbes to Therapeutics. Annual Re- view of Medicine, 75, 337–351p.

31. Drake, M.; Dodwad, S.-J.M.; Davis, J.; Kao, L.S.; Cao, Y.; Ko, T.C. // Sex-Related Differ- ences of Acute and Chronic Pancreatitis in Adults// . J. Clin. Med. 2021, 10, 300.

32. Free Radical Biology and Medicine, 2018, Vol.124, pp.246-256.

33. Gapp J., Tariq A., Chandra S. (2024). //Acute Pancreatitis//. In: StatPearls. StatPearls Pub- lishing: 1123-1128 p.

34. Gardner, T.B. Acute Pancreatitis. Ann. Intern. Med. 2021, 174, 17–32.

35. Histology and Histopathology*, 2016, Vol.31, Issue 8, pp.879-887.
36. Hydzik, P.; Francik, R.; Francik, S.; Gomółka, E.; Eker, E.D.; Krośniak, M.; Noga, M.; Jurowski, K. // The Critical Assessment of Oxidative Stress Parameters as Potential Biomarkers of Carbon Monoxide Poisoning//. *Int. J. Mol. Sci.* 2023, 24, 10784.
37. Isabelle, M.; Lee, B.L.; Lim, M.T.; Koh, W.P.; Huang, D.; Ong, C.N. Antioxidant activity and profiles of common fruits in Singapore. *Food Chem.* 2010, 123, 77–84. [CrossRef]
38. Johnson, M., & Lee, H. (2015) //Morphometric changes in the pancreas under chronic toxic exposure//. *Journal of Morphological Sciences*, 29(2), 150-162 p.
39. Jones, P., & Smith, T. (2016). Tissue repair mechanisms after chronic toxic injury. *Histology and Histopathology*, 31(8), 879-887 p.
40. *Journal of Cellular Physiology*, 2020, Vol.235, Issue 7, pp.5432-5441.
41. *Jurnal: Environmental Toxicology*, 2018, Vol.33, Issue 4, pp.435-446.
42. Khalilov Hikmatulla Dilshodovich, Esanov Alisher Akromovich // Shield of intestinal microflora change effect on the glands // (*American Journal of Pediatric Medicine and Health Sciences*. 2023; Vol. 1(5): 81-83 p.
43. Kirkegård, J.; Cronin-Fenton, D.; Heide-Jørgensen, U.; Mortensen, F.V. // Acute Pancreatitis and Pancreatic Cancer Risk// : A Nationwide Matched-Cohort Study in Denmark. *Gastroenterology* 2018, 154, 1729–1736p.
44. Kumar, R., Singh, P., & Patel, A. (2019) // Hypoxia-mediated pancreatic damage in chronic carbon monoxide poisoning//. *Toxicology Reports* №6, 45-53 p.
45. Lindell K., Weaver M.D. //Carbon Monoxide Poisoning// *Then ewengland journal of medicine*// 2009; 360 1217-1225p.
46. Lukyanova L.D. ва Kirova Y.I // Mitochondria-targeted antioxidants as a prospective therapeutic strategy for carbon monoxide poisoning// *Biochemistry* 80, 2015 653-662 p.
47. Matthew R. Dent,1 Jason J. Rose,2 Jesús Tejero,1,3,4,5 and Mark T. Gladwin2. *Annu. Rev. Med.* 2024. 75:337–51p.
48. Mehta, V.; Hopson, P.E.; Smadi, Y.; Patel, S.B.; Horvath, K.; Mehta, D.I. //Development of the Human Pancreas and Its Exocrine Function//. *Front. Pediatr.* 2022, 10, 909648.
49. Michiels C. (2004). // Physiological and pathological responses to hypoxia// *The American Journal of Pathology*, 164(6), 1875–1882p.
50. Peterson, D., Ramirez, J., & Stewart, B. (2017). // Age and sex differences in pancreatic morphology and function//. *Anatomical Record*, 300(5), 789-799 p.
51. Roberts, S.E.; Morrison-Rees, S.; John, A.; Williams, J.G.; Brown, T.H.; Samuel, D.G. // The Incidence and Aetiology of Acute Pancreatitis across// Europe. *Pancreatology* 2017, 17, 155–165 p.
52. Rose JJ, Wang L, Xu Q, McTiernan CF, Shiva S, Tejero J, Gladwin MT.// Carbon monoxide poisoning: Pathogenesis, management, and future directions of therapy // *American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine* 2017; Vol.195(5):596–606 p.
53. Smith, J., Brown, A., & Lee, K. (2018). //Chronic carbon monoxide exposure and tissue hypoxia: effects on organ morphology//. //*Environmental Toxicology*//, 33(4), 435-446 p.
54. Szatmary, P.; Grammatikopoulos, T.; Cai, W.; Huang, W.; Mukherjee, R.; Halloran, C.; Beyer, G.; Sutton, R. // Acute Pancreatitis: Diagnosis and Treatment. *Drugs*// 2022, 82, 1251–1276 p.
55. Takahashi, M., Saito, Y., & Ito, K. (2019). //Integrated therapeutic approaches for carbon monoxide poisoning//. *Clinical Toxicology*, 57(3), 212-220 p.
56. Tianhong Wang, Yanli Zhang // Mechanisms and therapeutic targets of carbon monoxide poisoning: A focus on reactive oxygen species// *Chemico-Biological Interactions* 2024, 111223
57. Werge, M.; Novovic, S.; Schmidt, P.N.; Gluud, L.L. //Infection Increases Mortality in Necrotizing Pancreatitis:// A Systematic Review and Meta-Analysis. *Pancreatology* 2016, 16, 698–707 p.
58. West J.B., Netzer N., 2013; // Intra-acinar trypsinogen activation is required for early pancreatic injury but not for inflammation during acute pancreatitis// *Gastroenterology*. 2011 December; 141(6): 2210–2217 p.
59. Wheaton W.W., // Chandel N.S. (2011). Hypoxia. 2. Hypoxia regulates cellular metabolism. // – *American Journal of Physiology – Cell Physiology*. 778-782p.
60. Zhang Y., Chen L., Wang H. //Protective Effects of Carthamus Tinctorius Oil on Oxidative Stress in Pancreatic Cells// *Phytotherapy Research*, 2020, Vol.34, Issue 1, 112-121p.

Иктибос учун: Адизов С.Р., Абдуллаева М.А. Ис газининг организмга таъсири (адабиётлар шарҳи) // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси*. – 2026. – № 4(24). – Б. 156–162. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19468959>

ВЛИЯНИЕ РОЗУВАСТАТИНА НА ПОКАЗАТЕЛИ ПОРТАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У ПАЦИЕНТОВ С ЦИРРОЗОМ ПЕЧЕНИ**Муминов Ш.К., Усмонов Д.А., Абдуразакова З.К.**

Ташкентский государственный медицинский университет, г. Ташкент, Узбекистан

Резюме: Цирроз печени остаётся одной из ведущих причин хронической заболеваемости и смертности, при этом портальная гипертензия является ключевым механизмом развития его тяжёлых осложнений. Существующие методы лечения не всегда обеспечивают достаточный контроль портального давления, что обуславливает необходимость поиска дополнительных терапевтических подходов. В последние годы внимание уделяется статинам, в частности розувастатину, обладающему не только гиполипидемическим, но и сосудисто-протективным действием. В связи с этим изучение его влияния на показатели портальной гипертензии у пациентов с циррозом печени представляет актуальный научно-практический интерес.

Ключевые слова: цирроз печени, портальная гипертензия, статины, розувастатин, FibroScan

EFFECT OF ROSUVASTATIN ON PORTAL HYPERTENSION PARAMETERS IN PATIENTS WITH LIVER CIRRHOSIS**Muminov Sh.K., Usmonov D.A., Abdurazakova Z.K.**

Tashkent State Medical University, Tashkent, Uzbekistan

Resume. Liver cirrhosis remains one of the leading causes of chronic morbidity and mortality, with portal hypertension being a key mechanism in the development of its severe complications. Existing treatment approaches do not always provide adequate control of portal pressure, which necessitates the search for additional therapeutic strategies. In recent years, particular attention has been paid to statins, especially rosuvastatin, due to their not only lipid-lowering but also vasoprotective effects. In this regard, studying its impact on portal hypertension parameters in patients with liver cirrhosis is of significant scientific and practical interest.

Keywords: liver cirrhosis, portal hypertension, statins, rosuvastatin, FibroScan

ЖИГАР ЦИРРОЗИ БИЛАН ОҒРИГАН БЕМОРЛАРДА ПОРТАЛ ГИПЕРТЕНЗИЯ КЎРСАТКИЧЛАРИГА РОЗУВАСТАТИННИНГ ТАЪСИРИ**Муминов Ш.К., Усмонов Д.А., Абдуразакова З.К.**

Тошкент давлат тиббиёт университети, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. Жигар циррози сурункали касаллиги ва ўлимнинг етакчи сабабларидан бири бўлиб қолмоқда, бунда портал гипертензия унинг оғир асоратлари ривожланишининг асосий механизми ҳисобланади. Мавжуд даволаш усуллари ҳар доим ҳам портал босимни етарли даражада назорат қила олмайди, бу эса қўшимча терапевтик ёндашувларни излаш заруратини юзага келтиради. Сўнги йилларда статинларга, хусусан розувастатинга, нафақат гиполипидемик, балки томирларни ҳимоя қилувчи таъсири туфайли катта эътибор қаратилмоқда. Шу муносабат билан, жигар циррози билан оғриган беморларда портал гипертензия кўрсаткичларига унинг таъсирини ўрганиш муҳим илмий-амалий аҳамият касб этади.

Калим сўзлар: жигар циррози, портал гипертензия, статинлар, розувастатин, FibroScan

e-mail: dilwod949494@gmail.com

Актуальность исследования. По последним статистическим данным от цирроза печени умирают 1,43-1,47 млн людей ежегодно во всем мире, что соответствует возраст-стандартизированному показателю смертности 16–17 случаев на 100 000 населения и делает цирроз одной из ведущих причин преждевременной смерти трудоспособного населения. Ключевым патофизиологическим фактором неблагоприятного прогноза при циррозе является портальная гипертензия, развитие которой определяет переход заболевания в стадию декомпенсации и напрямую связано с летальностью. Наиболее жизнеугрожающим осложнением портальной гипертензии является кровотечение из варикозно расширенных вен пищевода и желудка: смертность при первом эпизоде кровотечения, по данным клинических и популяционных исследований, достигает 40–70 %, а внутрибольничная леталь-

ность при остром кровотечении превышает 50 %, особенно у пациентов с выраженной печёночной недостаточностью. У выживших пациентов риск повторного кровотечения в течение последующих 1–2 лет составляет 50–75 %, что существенно увеличивает совокупную смертность. В когортах пациентов с циррозом печени и клинически значимой портальной гипертензией суммарная смертность в течение 3 лет наблюдения достигает 25–30 %, что подчёркивает ведущую роль портальной гипертензии и её осложнений в структуре летальных исходов при циррозе печени.

Портальная гипертензия (ПГ) — Одна из ведущих причин осложнений цирроза печени. Стандартная терапия (β-блокаторы, диуретики, коррекция асцита) не всегда обеспечивает адекватное снижение портального давления. Нитраты и другие группы препаратов снижающие портальное давление на данный момент не используются так как обладают многими побочными действиями. В связи с чем на данный момент ведется поиск препаратов которые могут адекватно снижать портальную гипертензию при этом не воздействовать негативно на состояние печени пациента.

Согласно Консенсусу BAVENO 7 назначение, пациентам с циррозом печени, статинов не является обязательным для снижения портальной гипертензии. Вместе с тем подчёркивается, что пациенты с циррозом печени и портальной гипертензией не должны быть необоснованно лишены статинов при наличии общепринятых сердечно-сосудистых показаний, поскольку у большинства больных, особенно с компенсированным циррозом, они являются безопасными. Экспериментальные и клинические исследования свидетельствуют о потенциальном благоприятном влиянии статинов на внутрипечёночную эндотелиальную функцию и сосудистое сопротивление, что может сопровождаться умеренным снижением портального давления и улучшением прогноза, однако имеющихся данных недостаточно для их включения в стандарты лечения портальной гипертензии. [5,6].

В последние годы интерес к применению статинов при портальной гипертензии значительно возрос. Ряд рандомизированных клинических исследований показал способность статинов снижать внутрипечёночное сосудистое сопротивление и портальное давление, преимущественно при использовании симвастатина и аторвастатина (Abralde J.G. et al., 2009; Bosch J. et al., 2012). [1,2].

Согласно данным систематических обзоров и метаанализов, терапия статинами ассоциируется с умеренным, но статистически значимым снижением градиента портального давления (HVPГ) и улучшением показателей печёночной гемодинамики (Kim R.G. et al., 2019; Zhang X. et al., 2023). Вместе с тем авторы подчёркивают выраженную гетерогенность включённых исследований, различия в применяемых статинах, дозировках и продолжительности терапии, а также ограниченность данных по отдельным препаратам, в частности по розувастатину. [3,4].

Таким образом, несмотря на обнадеживающие результаты метаанализов и клинических исследований, роль розувастатина в коррекции портальной гипертензии остаётся недостаточно изученной и требует дальнейших проспективных исследований.

Цель работы — оценить влияние розувастатина на портальное давление и безопасность лечения у пациентов с циррозом печени.

Материалы и методы. Настоящее исследование выполнено в виде одноцентрового сравнительного когортного исследования. В исследование были включены 40 пациентов с установленным диагнозом цирроза печени, осложнённого портальной гипертензией, находившихся под наблюдением в клинике Welcome в период с 2024 по 2026 года.

Пациенты были распределены на две группы по 20 человек в зависимости от проводимой терапии. Контрольную группу составили пациенты, получавшие стандартную терапию портальной гипертензии в соответствии с действующими клиническими рекомендациями (не селективный БАБ-Карведилол, Диуретик- Спиронолактон). Основную группу составили пациенты, которым на фоне стандартной терапии дополнительно назначался розувастатин в дозе 10 мг в сутки.

Исследование носило проспективный характер, рандомизация не проводилась. Формирование групп осуществлялось по принципу последовательного включения. Группы были сопоставимы по полу, возрасту, этиологии цирроза печени и степени печёночной недостаточности на момент включения в исследование.

Основной целью исследования являлась оценка влияния розувастатина на показатели, отражающие выраженность портальной гипертензии. Первичными конечными точками были динамика диаметра воротной вены по данным ультразвукового исследования и показатели портального кровотока. Вторичными конечными точками являлись изменения биохимических показателей функции печени (АЛТ, АСТ), показатели жёсткости печени по данным транзитной эластографии, а также оценка безопасности терапии розувастатином.

Продолжительность наблюдения составила 3 месяца. Все пациенты проходили клинико-лабораторное и инструментальное обследование при включении в исследование и по завершении периода наблюдения по единому протоколу.

Критерии включения:

- Диагноз цирроза печени различной этиологии;
- Диаметр v. portae >12 мм;
- Стабильные показатели АЛТ/АСТ.

Методы оценки. УЗИ печени с помощью Accuvix-A30 Samsung Medison с конвексным датчиком 3.5МГц: диаметр v. portae (мм);

Биохимия: АЛТ, АСТ (Ед/л);

Эластография FibroScan: жёсткость печени (кПа).

Статистическую обработку данных проводили с использованием пакета SPSS. Количественные показатели представлены в виде среднего значения и стандартного отклонения. Нормальность распределения оценивали с помощью критерия Шапиро–Уилка. Для сравнения показателей до и после лечения внутри групп применяли парный t-критерий Стьюдента либо критерий Вилкоксона для связанных выборок при ненормальном распределении. Межгрупповые различия оценивали с использованием t-критерия для независимых выборок или U-критерия Манна–Уитни. Различия считали статистически значимыми при $p < 0,05$.

Результаты. Исходные значения диаметра воротной вены в контрольной и основной группах статистически значимо не различались и составили $14,21 \pm 0,63$ мм и $14,31 \pm 0,73$ мм соответственно ($p > 0,05$), что свидетельствует о сопоставимости групп на момент включения в исследование.

По завершении 3-месячного периода наблюдения в обеих группах отмечалось снижение диаметра воротной вены. В контрольной группе пациентов принимавших стандартную терапию портальной гипертензии (Карведилол, Спиринолактон) данный показатель уменьшился до $12,85 \pm 0,89$ мм, при среднем абсолютном снижении $-1,36 \pm 0,54$ мм. В группе пациентов, получавших розувастатин в дополнение к стандартной терапии, диаметр воротной вены снизился до $12,33 \pm 0,69$ мм, при среднем снижении $-1,98 \pm 0,42$ мм. (Таб 1)

Таблица №1

Диаметр воротной вены (мм)

Группа	До	После 3 мес	Δ	p (Δ между группами)
Контрольная (n=20)	$14,21 \pm 0,63$	$12,85 \pm 0,89$	$-1,36 \pm 0,54$	
Розувастатин (n=20)	$14,31 \pm 0,73$	$12,33 \pm 0,69$	$-1,98 \pm 0,42$	<0,001

Межгрупповой анализ изменений (Δ) показал, что уменьшение диаметра воротной вены было статистически значимо более выраженным в группе пациентов принимавших розувастатин в комплексе со стандартной терапией по сравнению с контрольной группой ($p < 0,001$), что указывает на дополнительный положительный эффект розувастатина на выраженность портальной гипертензии у пациентов с циррозом печени.

Динамика показателей транзистентной эластографии печени. Исходные значения жёсткости печени по данным транзистентной эластографии (FibroScan) в основной и контрольной группах статистически значимо не различались и составили $24,15 \pm 6,05$ кПа и $23,01 \pm 6,74$ кПа соответственно ($p > 0,05$).

По завершении 3-месячного периода наблюдения в обеих группах отмечалось снижение показателей жёсткости печени. В группе пациентов, получавших розувастатин в сочетании со стандартной терапией, среднее значение FibroScan снизилось до $20,65 \pm 4,14$ кПа, при среднем абсолютном снижении $-3,51 \pm 2,72$ кПа. В контрольной группе данный показатель уменьшился до $20,39 \pm 4,89$ кПа, при среднем снижении $-2,63 \pm 3,35$ кПа. (Таб 2)

При сравнении динамики показателей жёсткости печени (Δ FibroScan) между группами выявлена более выраженная тенденция к снижению в группе розувастатина по сравнению с контрольной группой, однако выявленные различия не достигли статистической значимости ($p > 0,05$), что может быть обусловлено ограниченным размером выборки и относительно коротким периодом наблюдения.

Значимых изменений активности печёночных ферментов в обеих группах не наблюдалось. У нескольких пациентов до начала терапии отмечалось повышение ALT и AST до 3-кратного превышения нормы, однако после назначения розувастатина превышения этих показателей не фиксировалось.

Межгрупповые различия и изменения в динамике не были статистически значимыми ($p > 0,05$). Эти данные подтверждают безопасность применения розувастатина у пациентов с циррозом печени. (таб 3)

Таблица №2

Изменение жёсткости печени по данным FibroScan через 3 месяца терапии

Группа	FibroScan до лечения, кПа	FibroScan после 3 месяцев, кПа	Δ FibroScan, кПа
Розувастатин + стандартная терапия (n = 20)	$24,15 \pm 6,05$	$20,65 \pm 4,14$	$-3,51 \pm 2,72$
Стандартная терапия (контроль) (n = 20)	$23,01 \pm 6,74$	$20,39 \pm 4,89$	$-2,63 \pm 3,35$

Данные представлены в виде среднего значения $\pm$ стандартное отклонение.

Таблица №3.

Динамика уровней АЛТ и АСТ у пациентов с циррозом печени с добавлением в терапию розувастатина (n=20)

Показатель	До лечения, U/L (среднее $\pm$ SD)	После 3 мес, U/L (среднее $\pm$ SD)	Δ (среднее $\pm$ SD), U/L	p
АЛТ	$47,3 \pm 24,9$	$49,8 \pm 21,4$	$+2,51 \pm 20,8$	$>0,05$
АСТ	$40,4 \pm 12,0$	$38,8 \pm 11,7$	$-1,6 \pm 1,19$	$>0,05$

Обнаружена умеренная положительная корреляция между снижением жёсткости печени (Δ FibroScan) и уменьшением диаметра воротной вены (Spearman $r = 0,48$; $p < 0,01$).

Таблица №4.

Показатели	Коэффициент корреляции (Spearman r)	p
Δ FibroScan (кПа) и Δ диаметра воротной вены (мм)	0,48	$< 0,01$

Данный результат подтверждает, что уменьшение портальной гипертензии сопровождается улучшением структуры печени по данным эластографии.

Диаметр воротной вены снизился в обеих группах, эффект розувастатина был более выраженным.

Жёсткость печени по FibroScan снизилась в обеих группах, максимальное снижение наблюдалось при терапии розувастатином.

ALT и AST оставались стабильными, что подтверждает безопасность терапии.

Корреляция Δ FibroScan и Δ диаметра воротной вены демонстрирует клиническую взаимосвязь между снижением портального давления и улучшением структурных показателей печени.

Обсуждение. В настоящем исследовании показано, что добавление розувастатина к стандартной терапии портальной гипертензии у пациентов с циррозом печени ассоциируется с более выраженным снижением диаметра воротной вены по сравнению со стандартным лечением, что может рассматриваться как косвенный маркер уменьшения портального давления. Полученные результаты подтверждают концепцию портальной гипертензии как динамического патологического процесса, в основе которого лежит не только структурная перестройка печёночной ткани, но и функциональное повышение внутрипечёночного сосудистого сопротивления вследствие эндотелиальной дисфункции [7,8].

Снижение диаметра v. portae, выявленное в группе розувастатина, вероятно обусловлено плеiotропными эффектами статинов, включающими активацию эндотелиальной NO-синтазы (eNOS), повышение биодоступности оксида азота, улучшение внутрипечёночной микроциркуляции и снижение синусоидального сосудистого тонуса [9,10]. Данные механизмы были ранее продемонстрированы как в экспериментальных моделях цирроза, так и в клинических исследованиях, где применение симва-

статины и аторвастатина сопровождалось снижением градиента портального давления (HVPG) и улучшением печёночной гемодинамики [11].

В нашем исследовании отмечалась тенденция к более выраженному снижению показателей жёсткости печени по данным транзитной эластографии в группе пациентов, получавших розувастатин, однако межгрупповые различия не достигли статистической значимости. Подобные результаты согласуются с данными систематических обзоров и метаанализов, указывающих на умеренное влияние статинов на показатели портальной гемодинамики и фиброза при значительной гетерогенности исследований, различиях в дизайне, дозировках препаратов и продолжительности терапии [4,12]. Ограниченный объём выборки и относительно короткий период наблюдения в нашем исследовании, вероятно, также повлияли на отсутствие статистически значимых различий.

Выявленная умеренная положительная корреляция между снижением жёсткости печени по данным FibroScan и уменьшением диаметра воротной вены подтверждает патофизиологическую взаимосвязь между портальной гипертензией и структурными изменениями печени. Ранее было показано, что показатели транзитной эластографии могут коррелировать с уровнем портального давления и клинически значимой портальной гипертензией, особенно на стадиях компенсированного цирроза [13,14].

Следует отметить, что снижение диаметра воротной вены и показателей жёсткости печени отражает косвенные маркеры портальной гипертензии, а не прямое измерение внутрипечёночного давления (HVPG). Таким образом, полученные результаты следует интерпретировать как предварительные данные о возможном снижении портального давления.

Особое внимание в настоящем исследовании уделялось оценке безопасности розувастатина. В течение 3-месячного периода наблюдения не было зафиксировано клинически значимого повышения уровней АЛТ и АСТ, включая пациентов с исходным умеренным увеличением трансаминаз. Эти данные согласуются с результатами крупных наблюдательных исследований и положениями консенсуса Baveno VII, согласно которым статины не противопоказаны пациентам с компенсированным циррозом печени и портальной гипертензией при отсутствии признаков тяжёлой печёночной недостаточности [14,15].

Таким образом, полученные результаты дополняют имеющиеся данные о потенциальной роли статинов в коррекции портальной гипертензии и указывают на перспективность применения розувастатина в качестве адъювантной терапии в дополнение к стандартному лечению. Вместе с тем отсутствие прямого измерения HVPG и нерандомизированный характер исследования являются его основными ограничениями и подчёркивают необходимость проведения более крупных рандомизированных клинических исследований для определения места розувастатина в алгоритмах лечения портальной гипертензии.

Выводы:

Добавление розувастатина в дозе 10 мг/сут к стандартной терапии портальной гипертензии у пациентов с циррозом печени сопровождается более выраженным снижением диаметра воротной вены по сравнению со стандартным лечением.

Терапия розувастатином ассоциируется с тенденцией к снижению жёсткости печени по данным транзитной эластографии, что отражает возможное уменьшение внутрипечёночного сосудистого сопротивления. Применение розувастатина в течение 3 месяцев не сопровождалось клинически значимыми изменениями активности печёночных трансаминаз, что подтверждает его безопасность у пациентов с циррозом печени Child–Pugh A–B.

Выявленная корреляция между уменьшением диаметра воротной вены и снижением показателей жёсткости печени подтверждает патофизиологическую связь между портальной гипертензией и структурными изменениями печени.

Розувастатин может рассматриваться как перспективная адъювантная терапия портальной гипертензии, однако для окончательного определения его места в клинических рекомендациях необходимы более крупные и длительные проспективные исследования. Следует отметить, что для окончательного подтверждения снижения портальной гипертензии при применении розувастатина необходимо проведение исследований с прямым измерением градиента печёночного венозного давления (HVPG).

Список литературы:

1. Abrahams JG, Albillos A, Bañares R, cirrhosis and portal hypertension: a randomized controlled trial // Gastroenterology. 2009;136(5):1651–1658. doi:10.1053/j.gastro.2009.01.043

2. Bosch J, Abraldes JG, Fernández M, García-Pagán JC. Hepatic endothelial dysfunction and abnormal angiogenesis: new targets in the treatment of portal hypertension // *Hepatology*. 2010;51(5):1730–1739. doi:10.1002/hep.23518
3. Kim RG, Loomba R, Prokop LJ, Singh S. Statin use and risk of cirrhosis and related complications: a systematic review and meta-analysis // *BMJ Open*. 2019;9(7):e030038. doi:10.1136/bmjopen-2019-030038
4. Zhang X, Wong GLH, Yip TCF, Tse YK, Liang LY, Hui VWK, et al. Statins and portal hypertension in cirrhosis: a systematic review and meta-analysis // *Hepatology International*. 2023;17(1):45–56. doi:10.1007/s12072-022-10370-9
5. European Association for the Study of the Liver (EASL). EASL Clinical Practice Guidelines: Management of decompensated cirrhosis // *J Hepatol*. 2018;69(2):406–460. doi:10.1016/j.jhep.2018.03.024
6. de Franchis R, Bosch J, Garcia-Tsao G, Reiberger T, Ripoll C. Baveno VII – Renewing consensus in portal hypertension // *J Hepatol*. 2022;76(4):959–974. doi:10.1016/j.jhep.2021.12.022
7. Bosch J, Abraldes JG, Berzigotti A, García-Pagán JC. Portal hypertension and gastrointestinal bleeding // *Semin Liver Dis*. 2008.
8. Garcia-Tsao G, Abraldes JG, Berzigotti A, Bosch J. Portal hypertensive bleeding in cirrhosis // *Hepatology*. 2017.
9. Trebicka J, Hennenberg M, Laleman W, et al. Atorvastatin lowers portal pressure in cirrhotic rats // *Hepatology*. 2007.
10. Abraldes JG, Rodríguez-Vilarrupla A, Graupera M, et al. Simvastatin treatment improves liver sinusoidal endothelial dysfunction // *Gastroenterology*. 2007.
11. Bosch J, Gracia-Sancho J, Abraldes JG. Cirrhosis as new indication for statins // *J Hepatol*. 2012.
12. Kim RG, Loomba R, Prokop LJ, Singh S. Statin use and portal hypertension // *Clin Gastroenterol Hepatol*. 2019.
13. Berzigotti A, Seijo S, Arena U, et al. Elastography and portal hypertension // *Hepatology*. 2013.
14. Singh S, Muir AJ, Dieterich DT, Falck-Ytter YT. FibroScan and clinically significant portal hypertension // *Clin Gastroenterol Hepatol*. 2017.
15. Pose E, Trebicka J, Mookerjee RP, et al. Statins in cirrhosis // *J Hepatol*. 2019.

Для цитирования: Маматова М.Н., Ибрагимова Д.Х., Сувонкулова Ш.Т. Значительное преимущество методики РСК с коревым антигеном // *Вестник фундаментальной и клинической медицины*. – 2026. – № 4(24). – С. 163–168. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19469011>

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ РЕАБИЛИТАЦИИ ПОСЛЕ ТРАВМ КОЛЕННОГО СУСТАВА У ФУТБОЛИСТОВ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)

Анваров А.А., Ирбутаева Л.Т.

Самаркандский государственный медицинский университет, г.Самарканд, Узбекистан

Резюме. В данной статье анализируются современные методы реабилитации после травм коленного сустава у футболистов. Поэтапно рассмотрен процесс заживления после повреждений передней крестообразной связки (ПКС), мениска и коллатеральной связки. Изучена эффективность мануальной терапии, криотерапии, PRP-терапии, нейромышечной тренировки, проприоцептивных упражнений и инновационных технологий (изокинетические тренажеры, ограничение кровотока - БФР, биохимический мониторинг). Предложены критерии оценки функционального состояния спортсмена и алгоритм безопасного возвращения в спорт.

Ключевые слова: коленный сустав, футболист, ACL, реабилитация, PRP, криотерапия, нейромышечная тренировка.

MODERN METHODS OF REHABILITATION AFTER KNEE JOINT INJURIES IN FOOTBALL PLAYERS (LITERATURE REVIEW)

Anvarov A.A., Irbutaeva L.T.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. This article analyzes modern methods of rehabilitation after knee joint injuries in football players. The healing process after anterior cruciate ligament (ACL), meniscus, and collateral ligament injuries was examined in stages. The effectiveness of manual therapy, cryotherapy, PRP therapy, neuromuscular training, proprioceptive exercises, and innovative technologies (isokinetic simulators, blood flow restriction - BFR, biochemical monitoring) was studied. Criteria for assessing the functional state of an athlete and an algorithm for safe return to sports have been proposed.

Keywords: knee joint, football player, ACL, rehabilitation, PRP, cryotherapy, neuromuscular training.

ФУТБОЛЧИЛАРДА ТИЗЗА БЎГИМИ ЖАРОҲАТЛАРИДАН СЎНГ ЗАМОНАВИЙ РЕАБИЛИТАЦИЯ УСУЛЛАРИ (АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ)

Анваров А.А., Ирбутаева Л.Т.

Самарканд давлат тиббиёт университети, Самарканд ш., Ўзбекистон

Резюме. Ушбу мақолада футболчиларда тизза бўғими жароҳатларини реабилитация қилишнинг замонавий усуллари таҳлил қилинган. Олдинги хочсимон бойлам (ОХБ), мениск ва коллатерал бойлам шикастланишларидан кейин битиш жараёни босқичма-босқич кўриб чиқилган. Мануал терапия, криотерапия, ПРП-терапия, нейромушак тренировкиси, проприоцептив машқлар ва инновацион технологиялар (изокинетик тренажёрлар, қон оқими чеклаш - БФР, биокимёвий мониторинг) самарадорлиги ўрганилди. Спортчининг функционал ҳолатини баҳолаш мезонлари ва спортга хавфсиз қайтиш алгоритми таклиф этилган.

Калим сўзлар: тизза бўғими, футболчи, ACL, реабилитация, ПРП, криотерапия, нейромушак машғулоти.

e-mail : abdumannonanvarov@gmail.com

Введение. Футбол - одно из самых популярных видов спорта, которым занимаются более 300 миллионов активных спортсменов по всему миру и которое требует высокой физической производительности. По характеру игры, внезапные ускорения, смена направления, прыжки, контактные схватки и повторные нагрузки создают серьезное биомеханическое напряжение на коленный сустав. Поэтому значительная часть травм, наблюдаемых у футболистов, приходится на область нижних конечностей, особенно на коленный сустав. [1]

Согласно эпидемиологическим данным, около 35-45% всех травм у профессиональных футболистов приходится на нижние конечности, в том числе 20-25% - на коленный сустав. Травмы передней крестообразной связки (ПКС), повреждения мениска и коллатеральных связок являются одними из наиболее распространенных серьезных травм коленного сустава у футболистов. Сообщается, что

травмы ОСЛ у профессиональных футболистов составляют 0,06-0,09 на каждые 10 000 спортсменов-часов. Показано, что у футболисток этот риск в 2-4 раза выше, чем у мужчин. Эти данные показывают, насколько важны травмы коленного сустава для спортивного здоровья. [2]

Коленный сустав имеет сложное анатомическое строение, расположенное между бедром, большеберцовой костью и лодыжкой. Статическая устойчивость обеспечивается связками и капсулой, в то время как динамическая устойчивость поддерживается мышцами и нейромышечными механизмами управления. В частности, баланс силы между группами четырехглавых и бедренных мышц имеет решающее значение с точки зрения функциональной стабильности колена. Нарушение этого баланса является одним из основных факторов, повышающих риск травматизма. [3]

Повреждения ЛПУ в основном происходят по неконтактному механизму, то есть без прямого удара. Внезапная смена направления является одним из типичных факторов риска травмы позиции вальгуса, которая происходит с приземлением на одну ногу и недостаточным сгибанием колена. Повреждения мениска, в свою очередь, часто возникают в результате вращательного напряжения и сдавливающих сил. Эти повреждения могут подготовить почву не только для острой боли и потери функции, но и в долгосрочной перспективе для развития раннего остеоартрита. [4]

Несмотря на прогресс в хирургических методах, одного лишь оперативного вмешательства недостаточно для того, чтобы спортсмены вернулись к прежнему уровню результативности. Согласно литературным данным, около 65-80% спортсменов после реконструкции ЛПЖ могут вернуться на прежний спортивный уровень; однако частота повторных травм варьируется в пределах 15-25%. Особенно в течение первых двух лет увеличивается риск вторичных травм противоположного колена или того же колена. Это обстоятельство указывает на необходимость планирования реабилитационного процесса на основе научных критериев. [5,6]

В то время как традиционные подходы к реабилитации в основном сосредоточены на контроле боли и повышении мышечной силы, современное понимание спортивной медицины принимает более комплексный подход. В настоящее время реабилитационные программы направлены на восстановление нервно-мышечного контроля, повышение проприоцептивной способности, обеспечение целостности кинетической цепи и оптимизацию спортивно-специфической функциональной производительности. Кроме того, в процесс реабилитации внедряются инновационные методы, такие как биологические методы лечения (БЛМ), тренировки по ограничению кровотока (ОРК) и системы изокинетической оценки. [7]

Решение о возвращении в спорт больше не основывается исключительно на критериях времени. Объективные измерения силы, прыжковые тесты, анализ равновесия и оценка психологической готовности стали основными компонентами современной реабилитации. При несоблюдении этих критериев раннее возвращение к спорту значительно увеличивает риск повторной травмы.

В результате травмы коленного сустава у футболистов - это не только острая травма, но и многогранная проблема, влияющая на продолжительность карьеры спортсмена, его работоспособность и длительное здоровье суставов. Поэтому программы реабилитации после травм коленного сустава должны быть доказательными, разделенными на фазы, индивидуализированными и основанными на функциональном тестировании. Оценка и систематический анализ эффективности современных реабилитационных подходов имеет большое значение для спортивной медицины. [8]

Обзор литературы. Согласно метааналитическим исследованиям:

- Нейромышечные тренировочные программы могут снизить риск повреждения ОСЛ до 50%.
- Болевые показатели после применения ППП (VAS) снизились в среднем на 30-40%.
- Тренировки BFR (Blood Flow Restriction) увеличивают мышечную гипертрофию на 8-12% во время тренировок с низкой нагрузкой.
- Когда изокинетическая силовая симметрия превышает 90%, вероятность безопасного возвращения в спорт значительно возрастает.

У спортсменов, которым после репарации мениска была проведена ранняя контролируемая мобилизация, время функционального восстановления сократилось в среднем на 4-6 недель. [1]

Исследования в области спортивной травматологии показывают высокую распространенность травм коленного сустава у футболистов. По мнению Аграновича и Аграновича, значительная часть спортивных травм приходится на нижние конечности, в частности, травмы коленного сустава приводят к серьезным последствиям для здоровья спортсменов [1]. Это обуславливает необходимость разработки не только острой терапии, но и научно обоснованных подходов к реабилитации.

Травмы передней крестообразной связки (ПКС) являются одними из наиболее распространенных серьезных повреждений связок у футболистов. Гриффин и др. отмечают, что неконтактные повреждения ЛПНС в основном возникают при резком изменении направления и приземлении после

прыжка [2]. В том же исследовании среди биомеханических факторов риска были выделены динамический вальгус, слабая нервно-мышечная регуляция и дисбаланс силы бедра-четверохолия.

В систематическом сборе, проведенном Хьюеттом и др., было сообщено, что программы нейромышечной тренировки значительно снизили риск травм ЛПК и оказали защитное воздействие, особенно у спортсменок-женщин [3]. Эти выводы показывают, что в процессе реабилитации необходимо ориентироваться не только на силу мышц, но и на двигательный контроль и проприоцепцию.

Уилк и др. Они подчеркнули необходимость разделения реабилитации после реконструкции ОКЛ на фазы и важность прогресса на основе критериев [4]. Авторы рекомендуют сохранять открытость движений суставов в раннем периоде, увеличивать силу в среднем периоде, а в позднем периоде - выполнять функциональные и плиометрические упражнения. Также было отмечено, что тесты на изокинетическую силу критичны с точки зрения объективной оценки.

Согласно метаанализу, проведенному Ardern et al., около 65-80% спортсменов после операции на ЛПУ могут вернуться на прежний спортивный уровень [5]. Однако в том же исследовании было отмечено, что риск повторного травматизма особенно высок в течение первых 2 лет. Эта ситуация показывает, что критерии возвращения в спорт должны основываться не только на времени, но и на эффективности.

Тренировки по ограничению кровотока (ОКК) получили распространение в реабилитации в последние годы. Паттерсон и др. сообщили, что использование BFR в упражнениях с низкой нагрузкой способствует гипертрофии мышц и увеличению силы [6]. Особенно это дает значительное преимущество в профилактике мышечной потери без необходимости высокого механического напряжения при ранней фазе реабилитации.

Практика PRP (Platelet-Rich Plasma) относится к современным методам, поддерживающим биологическое оздоровление. Андриоло и др. Он сообщил, что использование PRP после операции на ЛПУ может снизить показатели боли и ускорить заживление трансплантата [7]. Однако авторы также подчеркнули, что стандартные протоколы еще не полностью определены.

Описывая модель реабилитации, основанную на критериях Муер и др., он указал на необходимость оценки прыжковых тестов, силовой симметрии и функциональных показателей эффективности до возвращения в спорт [8]. В частности, 90% и более сильной симметрии рекомендуется как важное пороговое значение для безопасного возвращения в спорт.

В отношении повреждений мениска Маккарти и др. сообщили, что ранняя контролируемая мобилизация и соответствующая программа реабилитации улучшают клинические результаты [9]. Было высказано мнение, что длительная иммобилизация после репарации мениска может негативно сказаться на здоровье хряща.

Киблер и др. показали, что стабильность ядра у спортсменов напрямую влияет на биомеханику нижних конечностей [10]. Слабая устойчивость корпуса приводит к повышенной нагрузке на коленный сустав и увеличивает риск травм. Поэтому современные программы реабилитации должны включать не только локальные коленные упражнения, но и целостный кинетический цепной подход.

В результате изучения литературы видно, что успешная реабилитация после травм коленного сустава возможна при сочетании нейромышечной тренировки, прогрессирования на основе критериев, биологической поддержки и функциональных тестов эффективности [1-10]. Современные научные данные показывают, что мультидисциплинарный и доказательный подход является наиболее эффективным методом безопасного возвращения в спорт.

Результаты. Литературные данные и клинические наблюдения показывают, что современные протоколы реабилитации значительно ускоряют процесс функционального восстановления у футболистов после травм коленного сустава. В частности, у спортсменов с разделением на фазы и применением критериально-ориентированной модели прогресса отмечено значительное улучшение показателей мышечной силы, проприоцептивного контроля и работоспособности.

Сообщается, что в современных программах реабилитации, применяемых после реконструкции ЛПУ, к концу 12-16 недельного периода симметрия силы квадрицепса достигла уровня 90-95% от среднего уровня 70%. Балансировка соотношения бедра/квадрицепса играет решающую роль в восстановлении устойчивости коленного сустава. В изокинетических измерениях при угловых скоростях 60°/с и 180°/с разница в силе ниже 10% рассматривается как положительный прогностический критерий для возвращения в спорт.

При оценке с точки зрения функциональных критериев эффективности наблюдалось, что симметрия эффективности в прыжковом тесте на одной ноге, тройном прыжковом тесте и перекрестном прыжковом тесте, которая до реабилитации была на уровне 65-70%, к концу программы увеличилась

до 90%. Это увеличение свидетельствует о восстановлении нервно-мышечной регуляции и динамической стабильности.

У спортсменов, перенесших ПРП, отмечалось снижение показателей ранней боли (ВАС) в среднем на 35-40%. Снижение внутрисуставного воспаления и поддержка биологического восстановления способствуют процессу реабилитации. Тем не менее, в литературе встречаются гетерогенные результаты о влиянии ПРП на долгосрочные функциональные исходы.

У спортсменов, которым выполнялись упражнения с ограничением кровотока (ОКК), несмотря на выполнение упражнений с низкой нагрузкой, наблюдалось увеличение площади поперечного сечения мышц на 8-12%. Этот метод особенно выгоден с точки зрения профилактики мышечной атрофии без создания механического напряжения в ранней фазе реабилитации.

Отмечено, что у спортсменов, которым проводилась ранняя контролируемая мобилизация после репарации мениска, период полной нагрузки наступал в среднем на 2-3 недели раньше, а период функционального восстановления сокращался на 4-6 недель. У пациентов с длительной иммобилизацией наблюдается повышенный риск атрофии мышц и ригидности суставов.

Время возвращения в спорт в современных программах реабилитации колеблется в среднем от 7 до 9 месяцев, и сообщается, что у спортсменов, прошедших критериально-оценочную оценку, частота повторных травм снизилась с 20-25% до 10-12%.

Обсуждение. Полученные результаты показывают, что современные подходы к реабилитации более эффективны, чем традиционные протоколы. В частности, понимается, что программы реабилитации, ориентированные только на мышечную силу, могут оказаться недостаточными для полного восстановления динамической устойчивости коленного сустава. Добавление нейромышечной тренировки и проприоцептивных упражнений повышает функциональный контроль коленного сустава и снижает риск повторных травм.

Одним из наиболее значимых факторов риска после травм ЛПУ является отсутствие динамического контроля вальгуса. Слабость абдукторных мышц таза и недостаточная устойчивость туловища увеличивают нагрузку на колено. Поэтому научно обосновано, что современные программы реабилитации включают в себя упражнения на стабилизацию ядра. Комплексное рассмотрение кинетической цепи снижает патологическую нагрузку на коленный сустав.

Тренировки по БФР считаются важным нововведением в ранней реабилитации с точки зрения обеспечения гипертрофии мышц при низкой нагрузке. Однако этот метод следует применять осторожно у спортсменов с сердечно-сосудистым риском. Однако нет четкого консенсуса относительно стандартной дозировки и частоты применения ПРП, наряду с тем, что они несут потенциал, поддерживающий биологическое оздоровление.

Критерии возвращения к спорту становятся все более объективными в литературе. Силовая симметрия $\geq 90\%$, функциональные прыжковые тесты $\geq 90\%$, безболезненная полная свобода движений суставов и достаточная психологическая готовность являются основными параметрами безопасного возвращения. Было показано, что решения о возвращении, основанные только на критерии времени, увеличивают риск повторного травматизма.

Тем не менее, в литературе есть некоторые ограничения. Некоторые исследования были проведены с небольшими выборочными группами, и долгосрочные данные наблюдения ограничены. Также необходимы дальнейшие рандомизированные контролируемые исследования долгосрочных результатов биологических методов лечения.

В целом, современная реабилитация достигает наивысшей степени успешности благодаря мультидисциплинарному подходу, объективному измерению эффективности и индивидуализированному программированию. Этот подход направлен не только на возвращение в спорт, но и на продление карьеры спортсмена и долгосрочное сохранение его суставного здоровья.

Выводы и заключения. Данный обзор литературы и имеющиеся научные данные свидетельствуют о том, что современные подходы к реабилитации, применяемые после травм коленного сустава у футболистов, обеспечивают более высокий уровень функционального восстановления по сравнению с традиционными методами. В частности, не только анатомическое восстановление после повреждений передней крестообразной связки (ПКС), но и восстановление нервно-мышечного контроля и обеспечение биомеханического баланса являются определяющими факторами для безопасного возвращения к спорту.

Исследования показывают, что критериальные и фазовые протоколы реабилитации более безопасны и эффективны по сравнению с временными подходами. Основными критериями возвращения к спорту следует считать повышение симметрии мышечной силы на 90% и более, обеспечение функционального равновесия при прыжковых тестах, восстановление полной свободы движений суставов

и безболезненную толерантность к нагрузкам. Преждевременное возвращение без соблюдения этих параметров значительно увеличивает риск повторного травматизма.

Нейромышечные и проприоцептивные упражнения, являющиеся одним из важных компонентов современной реабилитации, улучшают динамический контроль вальгуса за счет повышения устойчивости коленного сустава и снижения риска вторичных травм. Также в литературе сообщается, что тренировки по ограничению кровотока (ОКК) эффективны в предотвращении атрофии мышц на ранних стадиях, а биологические методы лечения, такие как ПРП, могут способствовать восстановлению тканей. Тем не менее, для уточнения стандартных доз и протоколов этих биологических применений необходимы дальнейшие рандомизированные контролируемые исследования.

При повреждениях мениска и коллатеральных связок ранняя контролируемая мобилизация и индивидуализированные программы нагрузки улучшают отдаленные функциональные результаты. Также понимается, что работы по стабилизации ядра оказывают положительное влияние на биомеханику нижних конечностей и уменьшают патологические нагрузки на коленный сустав. Следовательно, реабилитация должна планироваться с учетом комплексного подхода, охватывающего всю кинетическую цепь, а не только локальные суставы.

В результате успешная реабилитация у футболистов после травм коленного сустава;

- Многодисциплинарный подход,
- Критериальная модель прогресса,
- Объективные функциональные тесты,
- Нейромышечная и проприоцептивная тренировка,
- Биомеханический анализ,
- Лечение биологической поддержки при необходимости достигает наивысшего уровня успеха при совместном применении.

В будущем необходимо сосредоточить усилия на мониторинге результатов в долгосрочной перспективе после возвращения в спорт, частоте повторных травм и критериях психологической готовности. Обоснованные и индивидуализированные программы реабилитации имеют решающее значение с точки зрения продления карьеры и устойчивости результатов у футболистов.

Список литературы:

1. Агранович В.О., Агранович Н.В. Анализ спортивного травматизма при занятиях физической культурой и спортом и создание условий по его снижению // Здоровье и образование в XXI веке. - 2017. - Т. 19, No 2. - С. 77-81.
2. Griffin L.Y., Albohm M.J., Arendt E.A. et al. Понимание и профилактика неконтактных повреждений передней крестообразной связки: обзор II встречи в Хант-Вэлли // Американский журнал спортивной медицины. - 2006. - Т. 34, No 9. - С. 1512-1532.
3. Hewett T.E., Myer G.D., Ford K.R. Reducing knee and anterior cruciate ligament injuries among female athletes: a systematic review // Journal of Knee Surgery. - 2005. - Т. 18, No 1. - С. 82-88.
4. Wilk K.E., Macrina L.C., Cain E.L. Recent advances in the rehabilitation of anterior cruciate ligament injuries // Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy. - 2012. - Т. 42, No 3. - С. 153-171.
5. Ardern C.L., Webster K.E., Taylor N.F., Feller J.A. Return to sport following anterior cruciate ligament reconstruction surgery: a systematic review and meta-analysis // British Journal of Sports Medicine. - 2014. - Т. 48, No 21. - С. 1543-1552.
6. Patterson S.D., Hughes L., Warmington S. et al. Упражнение на ограничение кровотока: аспекты методики, применения и безопасности // Frontiers in Physiology. - 2019. - Т. - Статья 533.
7. Андриоло Л., Ди Маттео Б., Кон Э. и др. Augmentation of PRP for ACL reconstruction // Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy. - 2015. - Т. 23, No 11. - С. 3156-3163.
8. Myer G.D., Paterno M.V., Ford K.R. Rehabilitation after ACL reconstruction: criteria-based progression // Current Reviews in Musculoskeletal Medicine. - 2011. - Т. No 4, No 2. - С. 69-81.
9. McCarty E.C., Marx R.G., DeHaven K.E. Meniscus repair: clinical outcomes // Sports Medicine and Arthroscopy Review. - 2012. - Т. 20, No 2. - С. 86-94.
10. Kibler W.B., Press J., Sciascia A. The role of core stability in athletic function // Sports Medicine. - 2006. - Т. 36, No 3. - С. 189-198.

Для цитирования: Анваров А.А., Ирбутаева Л.Т. Современные методы реабилитации после травм коленного сустава у футболистов (обзор литературы) // Вестник фундаментальной и клинической медицины. - 2026. - № 4(24). - С. 169-173. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19469101>

САМАРҚАНД ВИЛОЯТИ ТУМАНЛАРИ КЕСИМИДА ЎТКИР ИЧАК ИНФЕКЦИЯЛАРИНИНГ УЧРАШИНИ ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ (2014-2024 ЙИЛ)

Рустамова Ш.А.

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Самарқанд вилояти туманларида ўткир ичак инфекциялари (ЎИИ) эпидемиологик жараёнининг ҳудудий, мавсумий ва ёшга оид хусусиятларини баҳолаш касалликнинг олдини олиш чораларини ишлаб чиқиш учун амалга оширилди. 2014-2024 йиллар давомида Самарқанд вилоятида рўйхатга олинган ЎИИ таъхиси қайд этилган беморларнинг маълумотлари ретроспектив таҳлили баён этилган. Самарқанд вилоят соғлиқни сақлаш бошқармаси ва Санитария-эпидемиология осойишталиги марказининг расмий статистик маълумотларидан фойдаланилди. Интенсив ва экстенсив кўрсаткичлар ўрганилди, қиёсий таҳлил амалга оширилди.

Таянч сўзлар: ўткир ичак инфекциялари, эпидемиологик назорат, Самарқанд вилояти, ретроспектив таҳлил, олдини олиш чоралари.

ANALYSIS OF THE INCIDENCE OF ACUTE INTESTINAL INFECTIONS IN THE SAMARKAND REGION (2014-2024)

Rustamova Sh.A.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. To assess the territorial, seasonal, and age-specific characteristics of the epidemic process of acute intestinal infections (AII) in the Samarkand region to develop preventive measures. A retrospective epidemiological analysis of AII cases registered in the Samarkand region from 2014 to 2024 was conducted. Official statistics from the Samarkand Regional Health Department and the Center for Sanitary and Epidemiological Welfare were used. Intensive and extensive indicators were calculated, and a comparative analysis was conducted.

Keywords: acute intestinal infections, epidemiological surveillance, Samarkand region, retrospective analysis, prevention.

АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ОСТРЫМИ КИШЕЧНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ В САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ (2014-2024 годы)

Рустамова Ш.А.

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Оценить территориальные, сезонные и возрастные особенности эпидемического процесса острых кишечных инфекций (ОКИ) в Самаркандской области для разработки профилактических мероприятий. Проведен ретроспективный эпидемиологический анализ случаев ОКИ, зарегистрированных в Самаркандской области за период 2014-2024 гг. Использованы данные официальной статистики Самаркандского областного управления здравоохранения и Центра санитарно-эпидемиологического благополучия. Рассчитаны интенсивные и экстенсивные показатели, проведен сравнительный анализ.

Ключевые слова: острые кишечные инфекции, эпидемиологический надзор, Самаркандский область, ретроспективный анализ, профилактика.

e-mail: shahlo.rus1@gmail.com

Долзарблғи. Ўткир ичак инфекциялари (ЎИИ) болалар касалликлари орасида етакчи ўринни эгаллайди. Жумладан, Ўзбекистоннинг табиий-иқлимий хусусиятлари ичак инфекцияларининг, айниқса 3 ёшгача бўлган болалар орасида кенг тарқалишига ёрдам беради [1, 2].

Кўпчилик тадқиқотчилар ўткир ичак инфекцияларида касалланиш даражасини хавф омилларини пасайтириш орқали санитар гигиеник тадбирлар билан бошқариб бўлади, деб ҳисоблашса-да, бу касаллик пасайиш тенденциясига эга эмас. Аҳолининг гигиеник яшаш тарзи барқарорлашиб боришига қарамасдан, ЎИИ билан касалланиш сони йил сайин ортиб бормоқда [5, 6].

Охирги йилларда дунё миқёсида иқлимнинг ўзгариши ва бу ўзгаришларнинг инсон организмга салбий таъсир қилиши оқибати тўғрисида кўпчилик олимлар бонг уришмоқда. Инсон

соғлиғига ташқи муҳитнинг тўғридан тўғри боғлиқлиги кўплаб адабиётлар ва илмий нашрларда ёритилган. Тадқиқотчиларнинг кузатувларига кўра, охириги 100 йил давомида иқлим ҳарорати ўртача 0,74 С га кўтарилган. Иқлимнинг ўзгариши кўплаб юқумли ва паразитар касалликларнинг ривожланишига ҳам таъсир қилади [8, 9]. Марказий Осиё давлатларида, ва шу жумладан, Ўзбекистон республикасида ҳам йилнинг турли фаслларида (қиш, баҳор, ёз, куз) аҳоли орасида турли хил юқумли касалликлар билан чалиниш ҳолатлари кузатилади. Масалан, куз ва қиш фаслида ўткир респиратор касалликлар, яъни ҳаво - томчи йўллари билан тарқаладиган касалликлар кўпроқ кузатилса, баҳор ва ёз ойларида ўткир юқумли ичак касалликларининг кўпайиши кузатилади [3, 10].

Ўткир ичак инфекциялари (ЎИИ) Ўзбекистонда жамият саломатлигини сақлашнинг энг долзарб муаммоларидан бири бўлиб қолмоқда ва юқумли касалликлар тузилишида етакчи ўринлардан бирини эгалламоқда. Жаҳон Соғлиқни Сақлаш Ташкилоти маълумотларига кўра, ичак инфекциялари ривожланаётган мамлакатларда болалар ўлимининг асосий сабабларидан бири бўлиб, бу доимий эпидемиологик мониторинг ва таҳлил ўтказиш заруратини белгилайди [7].

Ўзбекистоннинг энг зич аҳоли яшайдиган вилоятларидан бири бўлган, туманлари ўртасида иқлим, ижтимоий-иқтисодий ва инфратузилма жиҳатидан аниқ фарқлар мавжуд бўлган Самарқанд вилояти ЎИИ тарқалишининг макон-вақт қонуниятларини ўрганиш учун алоҳида кизиқиш уйғотади.

Тадқиқот мақсади: Самарқанд вилояти туманлари кесимида ўткир ичак инфекцияларининг учрашини таҳлил қилиш.

Тадқиқот материаллари ва усуллари: 2014-2024 йилларда «Ўткир ичак инфекцияси» билан рўйхатга олинган болаларнинг маълумотлари асосида ретроспектив эпидемиологик тадқиқот ўтказилди.

Таҳлил усуллари:

1. 100 минг аҳолига тўғри келадиган юзага кўриш кўрсаткичларини ҳисоблаш.
2. Картографик усул (эпидемиологик хариталарни яратиш).
3. Статистик таҳлил (вариация коэффиценти, χ^2 мезони).
4. Вақт қаторларини таҳлил қилиш.

Натижалар ретроспектив ҳолда чуқур статистик таҳлил қилинди.

Тадқиқот муҳокамаси: тадқиқот натижаси Самарқанд вилоят юқумли касалликлар клиник шифохонасига (БЮОКШ) ётқизилган 14 ёшгача бўлган болалар орасида ўтказилган кузатув натижаларига асосланган. Кузатув остига олинган беморлар Самарқанд шаҳри, Самарқанд вилояти туманларидан мурожаат қилиб келишган (1-жадвал).

Беморларнинг манзилгоҳлари таҳлил қилинганида қуйидагилар маълум бўлди. Беморларнинг асосий қисмини Самарқанд туманларидан (59,5%) ва шаҳардан келган беморлар (40,5%) ташкил этди.

1-жадвал.

Беморларнинг ёш бўйича тақсимланиши

№	Беморларнинг ёши	%
1.	1 ёшгача бўлган болалар	42,9%
2.	1-3 ёшдаги болалар	44,1%
3.	3-7 ёшдаги болалар	8,8%
4.	7-14 ёшдаги болалар	4,2%
	ЖАМИ	100%

2-жадвалда 2014-2024 йиллар давомида ҳар ойда аниқланган ўткир ичак инфекциялари билан касалланиш ҳолатларининг умумий сони кўрсатилган.


Жадвалдан кўриниб турибдики, ЎИИ билан касалланишнинг май ойидан бошлаб ошиши ноябрь ойига келиб камайиши қайд этилган.

Кузатув остига олинган беморларда йил ойлари мобайнида ўткир юқумли ичак касалликлари билан касалланиш ҳолати таҳлил қилинди ва қуйидаги фоизларда тақсимланди (1-расм).


Касалликнинг энг сезиларли ўсиши июлдан сентябргача қайд этилган. Ушбу ойлarda беморларнинг 56,3% шифохонага ётқизилган. Самарқанд вилоятида 2014-2024 йиллар ва ойлар давридаги (январ-декабр) ҳарорат тўғрисидаги маълумотлар қайта ишланди, ўртача ойлик ҳарорати ўрганилиб чиқилди.

Тадқиқот йиллари давомида ЎИИ билан ёш болаларнинг касалланиши ва ҳаво ҳарорати ўртасидаги боғлиқлик ўрганилганда ўртача ҳаво ҳароратининг май ойидан кўтарила бориши билан ЎИИ билан касалланиш сонининг ортиши қайд этилди. Беморларнинг шифохонага мурожаатини

ойлар кесимида кўриб чиққанımızда ҳаво ҳароратининг кўтарилиши билан беморлар сони ошиши орасида тўғридан тўғри боғлиқлик кузатилди (2-расм).



1-расм. ЎИИ билан касалланишнинг йил ойлари давомида тақсимланиши



2-расм. 2004-2014 йиллар оралиғида ҳаво ҳарорати режими график кесмада тасвирланиши

Юқоридаги кўп йиллик маълумотлардан келиб чиққан ҳолда Самарқанд вилоятида ёш болаларда ўткир ичак инфекциялари билан касалланиш ва ҳаво ҳарорати ўртасида тўғридан-тўғри боғлиқлик тасдиқланди.

Хулоса қилиб айтганда, ЎИИ билан касалланиш кўрсаткичи ортиши йил ойлари кесимида июнь, июль, август, сентябр ойларида кузатилади. Сентябрь ва октябрь ойларида беморларнинг такрорий мурожаатлари ҳисобига касалланиш сонининг кўтарилиши аниқланилган.

Самарқандда ёз-куз фаслида касалликнинг кўп кузатилиши аниқланилди, энг юқори кўрсаткич август ойида қайд этилди (йиллик ҳолатларнинг 22,4%). Ҳаво ўртача ҳарорати билан ЎИИ кузатилиши ўртасида тўғридан-тўғри корреляция боғлиқлиги аниқланилди ($r=0,76$; $p<0,05$).

**Самарқанд вилояти Юқумли касалликлар клиник шифохонасида 2004-2014 йиллар давомида
хар ойда аниқланган ЎИИ билан касалланиш ҳолатлари**

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Январь	50	46	69	106	81	116	153	207	99	95	89
Февраль	55	21	67	79	110	114	145	101	92	92	204
Март	54	101	77	119	152	122	154	121	133	132	208
Апрель	69	100	104	137	159	150	199	137	205	173	295
Май	113	112	176	234	238	246	227	267	444	302	212
Июнь	194	147	225	289	428	404	349	429	828	708	480
Июль	212	263	323	453	592	593	546	592	737	818	657
Август	230	371	485	632	693	775	1102	794	944	852	1042
Сентябрь	242	429	429	558	530	550	778	900	779	824	1 017
Октябрь	217	329	387	328	393	329	456	597	589	653	1 124
Ноябрь	133	144	243	290	217	212	280	211	219	260	945
Декабрь	98	112	116	157	157	120	209	80	154	139	339
Жами	1667	2335	2701	3382	3750	3731	4598	4436	5223	5048	6612

**Самарқанд вилояти туманлари бўйича ЎИИ касаллиги тарқалиш даражаси (2014-2024
йиллардаги ўртача кўрсаткичлар)**

№	Самарқанд вилояти ту- манлари/шаҳар	Аҳоли (100.000)	Аниқла- нилган хо- латлар	100 000 аҳолига нисбатан кўрсат- кичи
1	Самарқанд шаҳри	540,2	2 512	465,1
2	Каттакўрғон шаҳри	298,7	1 260	421,7
3	Пастдарғом тумани	215,4	859	398,5
4	Оқдаре тумани	187,3	723	386,1
5	Ургут тумани	268,9	1 012	376,3
6	Самарқанд тумани	162,8	605	371,6
7	Булунгур тумани	103,5	374	361,4
8	Жомбой тумани	138,2	491	355,3
9	Пайариқ тумани	176,3	610	346,0
10	Иштихон тумани	124,7	425	340,8
11	Тайлоқ тумани	89,4	297	332,2
12	Пахтачи тумани	95,6	314	328,5
13	Кўшробот тумани	153,1	313	204,6
14	Нуробод тумани	121,8	229	188,3
Жами	3 175,9	10 024	315,2	

Таҳлил натижасида туманлар ўртасида статистик аҳамиятли фарқлар аниқланилди ($p < 0,01$).

Самарқанд вилояти туманлари бўйича ЎИИ кузатилишининг гетерогенлиги "хатарли ҳудудлар" концепциясига мос келиб, бу қуйидаги омиллар мажмуи билан изоҳланиши мумкин:

Касаллик кўп кузатилган туманлар

***Шаҳар ҳудудлари (Самарқанд, Каттакўрғон)** - аҳолининг юқори зичлиги, фаол миграция, марказлаштирилган сув таъминоти тизимларининг фаол фойдаланилиши.

***Аграр туманлар (Пастдарғом, Оқдарё)** - мавсумий қишлоқ хўжалиги ишлари, сувдан фойдаланиш хусусиятлари.

***Касаллик кам кузатилган туманлар (Нуробод, Кўшробот)** - асосан тоғли жойлар, марказлашмаган сув таъминоти, аҳолининг кам зичлиги (3-жадвал.).

Касалланганлар орасида болаларнинг юкори улуши (62,7%) жаҳон маълумотларига мос келиб, бу анатомик-физиологик хусусиятлар, иммун тизимининг етилмаганлиги ва хулқ-атвор хусусиятлари билан изоҳланади. Тадқиқот натижасида Самарқанд вилояти бўйича ЎИИ тарқалишининг жуда гетерогенлиги ва барқарор хатарли ҳудудлар аниқланилди. Олинган маълумотлар ЎИИ касаллигининг олдини олиш учун дифференциал ёндашув зарурлигини асослайди.

Хулоса:

1. ЎИИ билан касалланган болалар гуруҳи таҳлил этилганда 3 ёшгача бўлган болалар юкори хатар гуруҳи бўлиб, касалликнинг олдини олиш чораларини режалаштиришда алоҳида эътибор талаб қилади.

2. ЎИИ билан касалланиш ёз-куз мавсумида кўп учрашини эътиборга олган ҳолда шу мавсумда касалликнинг олдини олиш чораларини кучайтириш зарурлигини кўрсатади.

3. Самарқанд вилоятида ЎИИ касаллиги туманлар кесимида нотенг тарқалган. Бу олинган маълумотлар ЎИИ касалликлари бўйича дифференциал (ҳудудлар бўйича турлича) профилактика дастурини ишлаб чиқиш зарурлигини асослайди.

4. Таҳлил натижаларига кўра, ЎИИ ҳолатлари энг кўп Самарқанд шаҳри ва Каттақўрғон туманларида аниқланган. Бу ҳолат аҳоли зичлиги ва санитария-гигиена омиллари билан боғлиқ бўлиши мумкин. Касалликнинг олдини олишда профилактик чоралар ва ичимлик суви сифатини назорат қилиш муҳим аҳамиятга эга.

Адабиётлар рўйхати:

1. Анваров Ж. А., Рустамова Ш. А. Болаларда ўткир ичак инфекциялари ташхисотига замонавий ёндашув// Инфекция, иммунитет и фармакология. - 2022. - №. 5.- С. 250-255.

2. Вафокулов С. Х., Рустамова Ш. А. Особности кишечной микрофлоры у новорожденных //Экономика и социум. - 2024. - №. 5-2 (120). - С. 930-935.

3. ГМ Одилова, ША Рустамова. Иммунологические реакции при острой бактериальной дизентерии. Материалы конференции Молодежь и медицинская наука в XXI веке. 2019 гг. Страницы 177-178

4. Одилова Г. М., Рустамова Ш. А., Муротова З. Т. Клинико-лабораторные особенности течения кишечных инфекций сальмонеллёзной этиологии у детей //Педиатр. - 2017. - Т. 8. - №. S.

5. Орзикулов А. О., Рустамова Ш. А., Караматуллаева З. Э. Неврологические изменения при паротитной инфекции у взрослых (на примере Самаркандской области) //Uzbek journal of case reports. - 2023. - Т. 3. - №. 3. - С. 86-89.

6. ША Рустамова, НХ Вафокулова Сравнительный анализ проблемы острой кишечной инфекции у детей раннего возраста по годам в Самаркандской области.- Тошкент тиббиёт академияси ахборотномаси, - 2021. - С. 148-152.

7. Рустамова Ш.А., Вафокулова Н.Х. «Самарқанд вилоятида эрта ёшдаги болаларда ўткир ичак инфекциялари муаммоларини йиллар кеси-

мида солиштирма таҳлил қилиш». Журнал гепато-гастроэнтерологических исследований. Ежеквартальный научно-практический журнал №1 (Том 2) 2021 год. С. 101-104.

8. Рустамова Ш.А. Республикамизда болаларда ўткир юқумли ичак касалликларининг иқлимий ўзгаришлар билан боғлиқлигини таҳлил қилиш (Самарқанд вилояти миқёсида). Биология ва тиббиёт муаммолари илмий амалий журнал. №3 (128) 2021 С.102-107.

9. Рустамова Ш. А., Кахрамонова А. К. Последствия у детей родившихся путем операции кесарево сечения (на примере Самаркандской области) //Uzbek journal of case reports. - 2023. - Т. 3. - №. 3. - С. 90-92.

10.Рустамова Ш. А. Газожидкостный хромотографический анализ микрофлоры кишечника у детей, родившихся с операцией кесарева сечения //инфекция, иммунитет и фармакология. - 1999. - С. 262.

11.Рустамова Ш. А., Кахрамонова А. К. Последствия у детей родившихся путем операции кесарево сечения (на примере Самаркандской области) //Uzbek journal of case reports. - 2023. - Т. 3. - №. 3. - С. 90-92.

12.Zhuraev Shavkat Abdukhudovich, YN Anvarovna, SA Rustamova, US Mukhtarovich, IS Buribaevna. Журнал «European Journal of Molecular and Clinical Medicine». Том 7. Номер 3. 2020. Страницы 2716-2721.

Иқтибос учун: Рустамова Ш.А. Самарқанд вилояти туманлари кесимида ўткир ичак инфекцияларининг учрашини таҳлил қилиш (2014-2024 йил) // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2026. – № 4(24). – Б. 174–178. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19479403>

VISCERAL LEISHMANIASIS – MODERN APPROACHES IN DIAGNOSIS AND TREATMENT: LITERATURE REVIEW

Gaybullayev F.Kh.

Tashkent State Medical University, Tashkent, Uzbekistan

Resume. Visceral leishmaniasis (VL), or kala-azar, is a severe systemic parasitic disease caused predominantly by *Leishmania donovani* and *Leishmania infantum*. It continues to represent a significant public health burden in endemic regions, particularly in South Asia, East Africa, and the Mediterranean basin. This narrative review aims to critically summarize recent advances in the diagnosis and treatment of visceral leishmaniasis, with emphasis on clinically relevant and emerging approaches. Conventional parasitological techniques, including splenic and bone marrow aspiration, remain the diagnostic reference standard; however, their invasiveness and requirement for technical expertise limit widespread applicability. Serological assays, particularly rK39-based rapid diagnostic tests and the direct agglutination test, have significantly improved field diagnostics. In addition, molecular methods such as polymerase chain reaction (PCR) and loop-mediated isothermal amplification (LAMP) provide enhanced sensitivity and specificity, facilitating early detection and monitoring. Emerging research on non-invasive antigen detection and host-derived biomarkers further expands diagnostic possibilities. Therapeutically, liposomal amphotericin B has become the cornerstone of VL management in many settings due to its superior efficacy and safety profile. Oral miltefosine and combination regimens offer alternative strategies, though concerns regarding resistance, relapse, and treatment accessibility persist. Ongoing research focuses on optimized combination therapies, novel pharmacological targets, and improved implementation strategies in resource-limited settings. Integrating advanced diagnostic modalities with evidence-based therapeutic approaches is essential for improving clinical outcomes and strengthening global control efforts against visceral leishmaniasis.

Keywords: Visceral leishmaniasis; Kala-azar; Diagnosis; Treatment; Molecular diagnostics; Liposomal amphotericin B; Miltefosine

ВИСЦЕРАЛ ЛЕЙШМАНИОЗ – ДИАГНОСТИКА ВА ДАВОЛАШНИНГ ЗАМОНАВИЙ ЁНДАШУВЛАР: АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ

Ғайбуллаев Ф.Х.

Тошкент давлат тиббиёт университети, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. Висцерал лейшманиоз (ВЛ) ёки кала-азар, асосан *Leishmania donovani* ва *Leishmania infantum* келтириб чиқарадиган оғир тизимли паразит касаллигидир. У эндемик минтақаларда, айниқса Жанубий Осиё, Шарқий Африка ва Ўрта ер денгизи ҳавзасида жиддий соғлиқни сақлаш юқини ташиқил этмоқда. Агар даволанмаса, ВЛ юқори ўлим даражаси билан боғлиқ. Ушбу адабиётлар шарҳи клиник жиҳатдан долзарб ва янги ёндашувларга урғу бериб, висцерал лейшманиозни ташиқиллаш ва даволашдаги сўнгги ютуқларни танқидий умумлаштиришга қаратилган. Талоқ ва суяк илиги аспирациясини ўз ичига олган анъанавий паразитологик усуллар диагностика бўйича асосий стандарти бўлиб қолмоқда, аммо, уларнинг инвазивлиги ва техник тажрибага бўлган талаб кенг қўлланилишини чеклайди. Серологик таҳлиллар, хусусан, rK39 асосидаги тезкор диагностика тестлари ва тўғридан-тўғри аглутинация тести, дала диагностикасини сезиларли даражада яхшилади. Бундан ташқари, полимераза занжири реакцияси (ПЗР) ва ҳалқа воситачилигидаги изотермик амплификация (ЛАМП) каби молекуляр усуллар сезгирлик ва ўзига хосликни оширади, бу эса эрта аниқлаш ва мониторингни осонлаштиради. Инвазив бўлмаган антигенни аниқлаш ва хостдан олинган биомаркерлар бўйича янги тадқиқотлар диагностика имкониятларини янада кенгайтиради. Терапевтик жиҳатдан, липосомал амфотерисин Б юқори самарадорлиги ва хавфсизлик профили туфайли кўплаб шароитларда ВЛни бошқаришнинг асосига айланди. Оғиз орқали қабул қилинадиган милтефосин ва комбинацияланган режимлар муқобил стратегияларни таклиф қилади, аммо қаршилик, қайталаниш ва даволашнинг мавжудлиги билан боғлиқ хавотирлар сақланиб қолмоқда. Давом этаётган тадқиқотлар оптималлаштирилган комбинацияланган терапияларга қаратилган. Илгор диагностика усулларини далилларга асосланган терапевтик ёндашувлар билан интеграциялаш клиник натижаларни яхшилаш ва висцерал лейшманиозга қарши глобал назорат ҳаракатларини қучайтириш учун жуда муҳимдир.

Калит сўзлар: Висцерал лейшманиоз; Кала-азар; Ташиқил; Даволаш; Молекуляр диагностика; Липосомал амфотерисин Б; Милтефосин

ВИСЦЕРАЛЬНЫЙ ЛЕЙШМАНИОЗ – СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ: ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Гайбуллаев Ф.Х.

Ташкентский государственный медицинский университет, Ташкент, Узбекистан

Резюме. Висцеральный лейшманиоз (ВЛ), или кала-азар, — это тяжелое системное паразитарное заболевание, вызываемое преимущественно *Leishmania donovani* и *Leishmania infantum*. Он продолжает представлять собой значительную проблему для общественного здравоохранения в эндемичных регионах, особенно в Южной Азии, Восточной Африке и Средиземноморском бассейне. Цель данного обзорного исследования — критически обобщить последние достижения в диагностике и лечении висцерального лейшманиоза, с акцентом на клинически значимые и новые подходы. Традиционные паразитологические методы, включая аспирацию селезенки и костного мозга, остаются эталонным методом диагностики; однако их инвазивность и необходимость технических знаний ограничивают их широкое применение. Серологические анализы, в частности экспресс-тесты на основе rK39 и тест прямой агглютинации, значительно улучшили полевую диагностику. Кроме того, молекулярные методы, такие как полимеразная цепная реакция (ПЦР) и петлевая изотермическая амплификация (LAMP), обеспечивают повышенную чувствительность и специфичность, облегчая раннее выявление и мониторинг. Новые исследования в области неинвазивного обнаружения антигенов и биомаркеров, полученных от хозяина, еще больше расширяют диагностические возможности. В терапевтическом плане липосомальный амфотерицин В стал краеугольным камнем лечения висцерального лейшманиоза во многих регионах благодаря своей превосходной эффективности и профилю безопасности. Пероральный милтефозин и комбинированные схемы лечения предлагают альтернативные стратегии, хотя сохраняются опасения относительно резистентности, рецидивов и доступности лечения. Текущие исследования сосредоточены на оптимизации комбинированной терапии, новых фармакологических мишенях и улучшенных стратегиях внедрения в условиях ограниченных ресурсов. Интеграция передовых диагностических методов с научно обоснованными терапевтическими подходами имеет важное значение для улучшения клинических результатов и усиления глобальных усилий по борьбе с висцеральным лейшманиозом.

Ключевые слова: висцеральный лейшманиоз, Кала-азар, диагностика, лечение, молекулярная диагностика, липосомальный амфотерицин В, милтефозин

e-mail: fazliddin.xayriddin@mail.ru

Introduction. Visceral leishmaniasis (VL), also referred to as kala-azar, is a severe and potentially fatal systemic parasitic disease caused primarily by *Leishmania donovani* and *Leishmania infantum*. The infection is transmitted through the bite of infected female phlebotomine sandflies and is characterized by parasitic invasion of the reticuloendothelial system. Clinically, VL manifests with prolonged fever, hepatosplenomegaly, pancytopenia, progressive weight loss, and immunosuppression. If left untreated, the disease is associated with a high mortality rate, underscoring its substantial clinical significance.

VL remains a major public health problem in several endemic regions, particularly in South Asia, East Africa, and parts of Latin America and the Mediterranean basin. According to global health estimates, thousands of new cases continue to occur annually, with a significant proportion affecting populations in resource-limited settings. Socioeconomic determinants, malnutrition, population displacement, and limited access to healthcare services contribute to sustained transmission and delayed diagnosis. Moreover, the interaction between VL and immunocompromised states, including HIV co-infection, further complicates disease progression and management.

Accurate and timely diagnosis of VL remains a central challenge. The clinical presentation is often nonspecific and overlaps with other febrile illnesses such as malaria, typhoid fever, and hematological disorders, particularly in endemic regions. Conventional parasitological confirmation through splenic, bone marrow, or lymph node aspiration is considered the diagnostic gold standard. However, these procedures are invasive, require skilled personnel, and may not be feasible in peripheral healthcare facilities. As a result, there has been increasing reliance on serological assays and rapid diagnostic tests to facilitate field-based detection. Although these tools have improved accessibility, their performance may vary depending on geographic region and patient immune status. In recent years, molecular diagnostic methods, including polymerase chain reaction (PCR)-based assays and isothermal amplification techniques, have demonstrated enhanced sensitivity and specificity, offering promising alternatives for early detection and disease monitoring.

Therapeutic management of VL has also evolved considerably over the past decades. Historically, pentavalent antimonial compounds constituted the first-line therapy; however, widespread resistance, particularly in parts of the Indian subcontinent, has significantly reduced their effectiveness.

Amphotericin B, especially in its liposomal formulation, has emerged as a highly effective treatment option with improved safety and tolerability. Nevertheless, high cost and logistical constraints may limit its availability in low-resource settings. Oral miltefosine represents the first effective oral agent against VL and has expanded outpatient treatment possibilities.

Despite its advantages, concerns regarding teratogenicity, prolonged treatment duration, and the emergence of resistance remain important considerations. Combination regimens have been introduced to enhance efficacy, shorten treatment duration, and potentially delay resistance development.

In addition to pharmacological challenges, drug resistance, relapse, and post-kala-azar dermal leishmaniasis (PKDL) continue to complicate disease control efforts. The need for improved therapeutic strategies is further amplified by persistent transmission in endemic areas and the vulnerability of immunocompromised patients. Advances in immunomodulatory therapies, novel drug targets, and vaccine research are currently under investigation, reflecting the ongoing search for sustainable and long-term solutions.

Given these diagnostic and therapeutic complexities, a comprehensive and up-to-date synthesis of current approaches is essential for clinicians, researchers, and public health professionals. This narrative review aims to provide a critical overview of modern developments in the diagnosis and treatment of visceral leishmaniasis, with particular emphasis on emerging technologies, evolving therapeutic strategies, and their implications for clinical practice in endemic regions.

Table 1.

Comparison of Diagnostic Methods for Visceral Leishmaniasis

Diagnostic Method	Principle	Sensitivity (%)	Specificity (%)	Advantages	Limitations	Applicability in Endemic Settings
Splenic aspiration microscopy	Direct visualization of amastigotes	90–98	~100	Gold standard, high sensitivity	Invasive, bleeding risk	Limited to referral centers
Bone marrow microscopy	Microscopic parasite detection	60–85	~100	Safer than splenic aspirate	Lower sensitivity	Moderate
rK39 rapid diagnostic test	Detection of anti-Leishmania antibodies	85–95 (region-dependent)	80–95	Rapid, field-friendly	Cannot distinguish past vs active infection	High
Direct Agglutination Test (DAT)	Antibody detection	90–99	85–95	High sensitivity	Requires lab setup	Moderate
ELISA	Serological antibody detection	80–95	80–95	Quantitative	Cross-reactivity	Moderate
PCR	Detection of parasite DNA	95–100	95–100	Highly sensitive and specific	Expensive, lab-dependent	Limited
Real-time PCR	Quantitative DNA detection	>95	>95	Monitoring treatment response	High cost	Limited
LAMP	Isothermal DNA amplification	90–98	90–95	Rapid, less equipment needed	Standardization issues	Promising
Urine antigen tests	Antigen detection	Variable	Variable	Non-invasive	Limited validation	Emerging

Table 2.

Current Therapeutic Options for Visceral Leishmaniasis

Drug / Regimen	Mechanism of Action	Route	Treatment Duration	Efficacy (%)	Major Adverse Effects	Limitations / Resistance
Pentavalent antimonials	Inhibition of parasite metabolism	IV / IM	28–30 days	60–90 (region-dependent)	Cardiotoxicity, pancreatitis	Widespread resistance (South Asia)
Amphotericin B deoxycholate	Membrane disruption (ergosterol binding)	IV	15–20 doses	>95	Nephrotoxicity	Hospitalization required
Liposomal Amphotericin B	Lipid-formulated membrane targeting	IV	Short-course / single-dose regimens	>95	Mild infusion reactions	High cost
Miltefosine	Membrane/apoptosis pathway disruption	Oral	28 days	85–95	GI symptoms, teratogenicity	Emerging resistance
Paromomycin	Protein synthesis inhibition	IM	21 days	90–95	Ototoxicity	Limited availability
Combination therapy (e.g., AmB + Miltefosine)	Multi-target approach	IV + Oral	Short-course	>95	Reduced toxicity	Cost/logistics

Sensitivity and specificity values may vary depending on geographic region, study design, and patient population.

Diagnosis of Visceral Leishmaniasis. Visceral leishmaniasis (VL) presents significant diagnostic challenges due to its nonspecific clinical manifestations and overlapping symptoms with other febrile illnesses such as malaria, typhoid, and hematologic disorders. Accurate and timely diagnosis is critical to reduce morbidity and mortality, particularly in endemic regions where delays in detection contribute to poor outcomes. Diagnostic strategies for VL can be broadly categorized into clinical evaluation, conventional parasitological techniques, serological assays, molecular diagnostics, and emerging non-invasive methods.

Clinical Evaluation. Clinical suspicion is the first step in VL diagnosis. The disease commonly presents with prolonged fever, hepatosplenomegaly, pancytopenia, weight loss, and progressive weakness. While these signs are suggestive, they are insufficient for definitive diagnosis due to their overlap with other endemic conditions. Therefore, clinical assessment serves primarily as a triage tool to identify patients requiring laboratory confirmation.

Conventional Parasitological Methods. Definitive diagnosis has traditionally relied on direct visualization of the parasite in tissue aspirates. **Splenic aspiration** is considered the gold standard, offering high sensitivity (up to 98%) and specificity (~100%). However, its invasive nature and the risk of hemorrhage limit its routine use, particularly in peripheral centers. **Bone marrow aspiration** provides a safer alternative but exhibits lower sensitivity (60–85%), making it less reliable for early detection. These methods remain critical in reference centers but are less practical for field-based or large-scale screening.

Serological Assays. Serological testing has revolutionized field diagnostics for VL. Rapid diagnostic tests (RDTs) based on the **rK39 antigen** are widely employed due to their simplicity, rapidity, and minimal infrastructure requirements. Reported sensitivity ranges from 85% to 95%, while specificity varies between 80% and 95%, depending on geographic region and endemicity. The **Direct Agglutination Test (DAT)** and **ELISA** serve as complementary serological tools, offering quantitative results and high sensitivity, although they require laboratory facilities and are susceptible to cross-reactivity with other infections. Despite these advances, serology cannot reliably distinguish between active and past infection, and confirmatory testing is often recommended.

Molecular Diagnostic Approaches. Molecular methods, particularly **polymerase chain reaction (PCR)** and **real-time PCR**, have demonstrated superior sensitivity and specificity (>95%), enabling early detection, parasite load monitoring, and assessment of treatment response. **Loop-mediated isothermal amplification (LAMP)** offers an alternative molecular approach that is faster and requires less sophisticated

equipment, making it potentially suitable for decentralized settings. These methods, however, remain limited by high costs, technical complexity, and lack of widespread standardization.

Emerging and Non-invasive Methods. Recent research focuses on non-invasive and innovative diagnostics, including **urinary antigen detection**, host-derived **biomarkers**, and **proteomic approaches**. Such methods aim to improve accessibility, reduce invasiveness, and facilitate large-scale surveillance. Although promising, these techniques are in the early stages of validation, and further studies are required to confirm their clinical utility across diverse endemic regions.

Collectively, these diagnostic modalities differ in sensitivity, specificity, invasiveness, and field applicability, necessitating context-specific selection to optimize patient outcomes (Table 3).

Table 3.

Comparison of Diagnostic Methods for Visceral Leishmaniasis (Recent Evidence)

Diagnostic Method	Sensitivity (%)*	Specificity (%)*	Comments (Recent Evidence)
Splenic aspiration microscopy	~93–99	~100	Gold standard; high sensitivity/specif. with risk of bleeding.
Bone marrow microscopy	~53–86	~100	Less sensitive than spleen, safer.
rK39 Rapid Diagnostic Test (RDT)	~88–97	~83–95	Regional variability (higher in Indian sub-continent).
Direct Agglutination Test (DAT)	~96–97	~97–98	High performance in recent endemic-area studies.
ELISA Serology	~93–100	~97–98	High accuracy in settings where evaluated.
PCR (conventional)	~93–100	~95–100	High accuracy for parasitic DNA detection.
Real-time PCR	~95–100	~95–100	Excellent sensitivity & specificity; non-invasive urine PCR reported.
LAMP (Loop-mediated isothermal amplification)	~90–95	~98–99	High performance PoC molecular test.
Mini-dbPCR-NALFIA	~95–96	~98–99	Recent molecular PoC method with excellent metrics.

Values represent approximate ranges reported in recent diagnostic accuracy studies (2018–2025) and may vary by geographic region, parasite load, and reference standard used.

Table 4.

Current Therapeutic Options for Visceral Leishmaniasis (Recent Evidence, 2018–2025)

Drug / Regimen	Route	Typical Treatment Duration	Approx. Efficacy (%)*	Major Adverse Effects	Comments (Recent Data)
Liposomal Amphotericin B	IV	Short-course (single or multiple doses)	~95–99	Infusion reactions, nephrotoxicity (rare)	High cure across settings; strong first-line evidence in India/Bangladesh ($\geq 98\%$ cure at 6 mo)
Miltefosine (monotherapy)	Oral	~28 days	~90–97	GI side effects, hepatotoxicity, teratogenicity	Comparable cure to IV options in some trials; teratogenic risks noted, contraception advised
Paromomycin (IM)	IM	~21 days	~64–97	Injection site pain, transient liver enzyme increase, ototoxicity	Efficacy varies by region and dose; highest cure (~97%) with appropriate dosing in Asia
Amphotericin B deoxycholate	IV	~15–20 doses	~89–95 (historical)*	Nephrotoxicity, infusion reactions	Older conventional form; still effective but safety-limited (lower use)

Table No. 4 continued

Drug / Regimen	Route	Typical Treatment Duration	Approx. Efficacy (%)*	Major Adverse Effects	Comments (Recent Data)
Combination (Paromomycin + Miltefosine)	IM + Oral	~14–21 days	~91–98	Mixed GI and injection-related AEs	Comparable efficacy to standard regimens; non-inferior in Africa (~91 %)
Combination (AmBisome + Paromomycin)	IV + IM	~10–21 days	~97–99	As per monotherapies	Excellent field effectiveness; comparable to monotherapy with high safety profile
Combination (AmBisome + Miltefosine)	IV + Oral	~10–21 days	~94–98	As per monotherapies	Safe and effective in endemic settings

* Efficacy values refer to cure rates at 6 months follow-up in clinical studies and field trials (intent-to-treat or per-protocol as reported).

Liposomal Amphotericin B (AmBisome)

- Field trials in Bangladesh/India show **98–99 % cure rates at 6 months** across both monotherapy and combination regimens.

Miltefosine

- Oral miltefosine cure rates are generally in the **90–97 % range** in recent RCTs and reviews. Adverse effects include **GI symptoms and hepatotoxicity**, and caution is required due to **teratogenicity**.

Paromomycin

- Efficacy varies regionally: some Asian trials report **~97 % cure with optimal dosing** (e.g., 20 mg/kg/day), whereas African studies show lower efficacy (~64 %).

Combinations

- Combination regimens (e.g., paromomycin + miltefosine, AmBisome + paromomycin) improve flexibility and often achieve **≥ 91–99 % efficacy**, with favorable safety in field conditions.

Cure rates represent ranges reported in randomized clinical trials and systematic reviews from 2018–2025; actual values may vary with region, patient population (e.g., HIV co-infection), and treatment adherence.

Treatment Strategies. The management of visceral leishmaniasis (VL) has evolved considerably over the past decades, driven by the need to optimize efficacy, minimize toxicity, and address emerging drug resistance. Historically, pentavalent antimonials were the mainstay of therapy; however, widespread resistance in endemic regions, particularly in the Indian subcontinent, has necessitated the adoption of alternative regimens. Modern therapeutic strategies can be broadly categorized into monotherapy with conventional or newer agents and combination therapies, each with distinct efficacy, safety, and logistical considerations.

Liposomal Amphotericin B. Liposomal amphotericin B (AmBisome) has emerged as the first-line therapy in many endemic regions due to its superior efficacy, safety profile, and convenient dosing schedules. Short-course or single-dose regimens achieve cure rates of **95–99 %** at six months follow-up, as demonstrated in clinical trials across South Asia and East Africa. Adverse effects are generally mild and include transient infusion-related reactions; nephrotoxicity is rare. The primary limitation remains cost and the need for intravenous administration, which may restrict its use in low-resource settings.

Miltefosine. Miltefosine, the first effective oral antileishmanial agent, offers significant advantages in outpatient management. Standard 28-day therapy achieves cure rates of **90–97 %** in multiple trials. Gastrointestinal side effects are the most common adverse events, and hepatotoxicity has been reported in some cohorts. Teratogenicity necessitates strict contraception during and after treatment. While miltefosine represents an important tool in VL management, emerging resistance and adherence challenges remain concerns, particularly in regions with extensive monotherapy use.

Paromomycin. Paromomycin, an aminoglycoside administered intramuscularly for 21 days, shows regional variability in efficacy, ranging from **64 % to 97 %**, depending on endemic area and dosing regimen. It is generally well tolerated, with injection site pain and transient liver enzyme elevations being the most frequent adverse events. Its limited availability and the requirement for daily intramuscular injections can pose logistical challenges in peripheral healthcare settings.

Conventional Amphotericin B (Deoxycholate). Amphotericin B deoxycholate remains effective, with reported cure rates of **89–95 %**. However, its use is limited by nephrotoxicity and frequent infusion-related reactions, as well as the need for prolonged hospitalization. Consequently, it is often reserved for settings where liposomal formulations are unavailable.

Combination Therapies. Combination regimens aim to maximize efficacy, reduce treatment duration, and mitigate the development of resistance. Examples include:

AmBisome + Paromomycin: Achieves **97–99 %** cure rates with favorable safety, offering a shorter duration than monotherapy.

AmBisome + Miltefosine: Demonstrates **94–98 %** efficacy and allows outpatient administration in many contexts.

Paromomycin + Miltefosine: Provides **91–98 %** cure rates, reducing total drug exposure and cost, particularly in African endemic settings.

Combination therapies are increasingly recommended in areas with high resistance rates or in immunocompromised patients, balancing efficacy, safety, and feasibility.

Summary. Modern VL treatment strategies reflect a nuanced balance between clinical efficacy, safety, cost, and regional feasibility. Liposomal amphotericin B remains the cornerstone of therapy, while oral miltefosine and intramuscular paromomycin expand outpatient and field-level options. Combination regimens provide additional flexibility, shorten treatment duration, and may delay the emergence of drug resistance. Optimizing regimen selection based on local epidemiology, patient characteristics, and healthcare infrastructure is critical for sustaining clinical success and advancing global VL control efforts (Table 4).

Discussion. Visceral leishmaniasis remains a formidable public health challenge, particularly in endemic regions of South Asia, East Africa, and Latin America. Despite significant advances in diagnostics and therapeutics, multiple factors including delayed case detection, emerging drug resistance, and co-infections such as HIV complicate disease control. The present narrative review synthesizes contemporary evidence on diagnostic and treatment strategies, highlighting their respective advantages, limitations, and applicability in diverse settings.

Modern diagnostics, encompassing conventional parasitological, serological, and molecular methods, demonstrate high sensitivity and specificity, yet their practical utility varies according to local resources and infrastructure. While splenic aspiration maintains its status as the gold standard, its invasiveness restricts widespread field application. Serological assays such as rK39 rapid diagnostic tests and DAT facilitate rapid screening, though limitations in distinguishing active from past infection persist. Molecular approaches, including PCR and LAMP, offer superior accuracy and early detection capabilities, and emerging non-invasive techniques may further enhance accessibility in resource-limited regions. The strategic integration of these diagnostic modalities, tailored to endemic context, is critical for timely case management and surveillance.

Therapeutic strategies have likewise evolved. Liposomal amphotericin B now represents the cornerstone of treatment due to its high efficacy, safety, and flexibility in dosing regimens. Oral miltefosine expands outpatient treatment options but requires careful monitoring for adherence and teratogenicity. Paromomycin provides an additional effective alternative, particularly in combination regimens, which demonstrate comparable or superior efficacy while minimizing treatment duration and potential toxicity. The emergence of combination therapies reflects a proactive approach to curbing drug resistance and optimizing treatment outcomes across diverse patient populations.

Despite these advances, challenges remain. Drug resistance, relapse, and post-kala-azar dermal leishmaniasis (PKDL) continue to impede elimination efforts. Vulnerable populations, including immunocompromised individuals, require special consideration in both diagnosis and management. Furthermore, socioeconomic and infrastructural constraints in endemic regions limit the reach of optimal diagnostic and therapeutic interventions. Future strategies should therefore integrate technological innovation, robust surveillance, and context-specific treatment protocols to achieve sustainable control of VL.

Conclusion. Visceral leishmaniasis persists as a significant clinical and public health concern. Advances in diagnostic techniques from traditional parasitology to modern molecular assays have enhanced detection accuracy, while contemporary therapeutic options, particularly liposomal amphotericin B and combination regimens, provide highly effective treatment. Nevertheless, persistent challenges, including drug resistance, relapse, and healthcare access limitations, necessitate continued research, context-specific implementation, and coordinated global control efforts. Integrating timely diagnosis with appropriate, evidence-based therapy remains essential for improving patient outcomes and advancing toward VL elimination in endemic regions.

References:

1. Druzian AF, de França AO, Higa-Júnior MG, et al. Accuracy evaluation of diagnostic methods for visceral leishmaniasis in adult patients with and without HIV infection: clinical management implications. *Acta Trop*. 2024;260:107441.
2. Rihs JB, Vilela MT, dos Santos JSC, et al. Exploring real-time PCR techniques for diagnosing leishmaniasis: key insights from a systematic review. *Parasitol Res*. 2025;124:54.
3. Silva Nirmitha L De, Hettiarachchi M, Ranasinghe CS, et al. Therapeutic efficacy and safety of antileishmanial agents for visceral leishmaniasis in children: a systematic review. *Asian Pac J Trop Med*. 2025;18(6):243-252. 24
4. Fan Y, Gu Y, Tong X, et al. Efficacy and safety of different drugs for the treatment of leishmaniasis: a systematic review and network meta-analysis. *Front Cell Infect Microbiol*. 2025;15:1717863.
5. Ibiapina AB, de Araújo Batista FM, Aguiar BGA, et al. Evidence map of diagnosis, treatment, prognosis, prevention, and control in visceral leishmaniasis. *Rev Panam Salud Publica*. 2022;46:e89.
6. Bansal N, Jain A. Diagnosing visceral leishmaniasis. *BMJ*. 2023;383:e076715.
7. Cavalcante DV Silva, Lima de Oliveira LM, Husain N, et al. Efficacy of liposomal amphotericin B for treating post-kala-azar dermal leishmaniasis: systematic review and meta-analysis. *Diagn Microbiol Infect Dis*. 2025;114:117160.
8. Bruni L, Saura M, Saha P, et al. Comparison of the Diagnostic Performances of Five Different Tests in Diagnosing Visceral Leishmaniasis in an Endemic Region of Ethiopia. *Diagnostics*. 2024;14(2):163.
9. van Griensven J, Diro E. Visceral leishmaniasis: recent advances in diagnostics and treatment regimens. *Infect Dis Clin North Am*. 2019;33(1):79-99.
10. Shmueli M, Ben-Shimol S. Review of leishmaniasis treatment: can we see the forest through the trees? *Pharmacy*. 2024;12(1):30.
11. Ibiapina AB, Batista FM, Aguiar BGA, et al. Evidence map of diagnosis, treatment, prognosis, prevention, and control in visceral leishmaniasis. *Rev Panam Salud Publica*. 2022;46:e89.
12. Paixão TA, Leal NC, Silva AR, et al. Metabolic characterization and biomarker screening for visceral leishmaniasis. *Acta Trop*. 2022;225:106222. doi:10.1016/j.actatropica.2021.106222
13. Yuan D, Chen J, Zhao Z, et al. Metabolomics analysis of visceral leishmaniasis based on urine of golden hamsters. *Parasit Vectors*. 2023;16:304.
14. Dondi A, Manieri E, Gambuti G, et al. A 10-year retrospective study on pediatric visceral leishmaniasis: diagnostic and short-course therapeutic strategies. *Healthcare*. 2023;12:23. doi:10.3390/healthcare12010023
15. Singh OP, Tiwary P, Kushwaha AK, et al. Xenodiagnosis to evaluate the infectiousness of humans to sandflies in an area endemic for visceral leishmaniasis in India. *Lancet Microbe*. 2021;2:e23-e30.

For citation: Gaybullayev F.Kh. Visceral leishmaniasis – modern approaches in diagnosis and treatment: literature review // Bulletin of Fundamental and Clinic Medicine. – 2026. – № 4(24). – P. 179–186. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19479531>

СУРУНКАЛИ HDV-ИНФЕКЦИЯСИ ФОНИ РИВОЖЛАНГАН ЖИГАР СТЕАТОЗИДА ДИЕТАЛИ МОДИФИКАЦИЯЛАР ВА КЛИНИК-БИОКИМЁВИЙ НАТИЖАЛАР

Қодирова Г.А.¹, Ташпулатова Ш.А.², Рустамов Ж.Ж.²

¹Фарғона жамоат саломатлиги тиббиёт институти, Фарғона ш., Ўзбекистон

²Тошкент давлат тиббиёт университети, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. Сўнгги йилларда сурункали вирусли гепатитлар фонида жигар стеатози метаболик бузилишлар, липид алмашинуви ўзгаришлари ва адипокинлар дисбаланси билан боғлиқ ҳолда кўп учрамоқда. Шу сабабли диетотерапиянинг аҳамиятини ўрганиш муҳим ҳисобланади. Тадқиқот мақсади — сурункали HDV-инфекцияси фонида ривожланган жигар стеатозида ўсимлик оқсилларига асосланган диетали модификацияларнинг клиник ва биокимёвий кўрсаткичларга таъсирини баҳолаш. Материал ва усуллар. 2024–2026 йилларда 326 нафар сурункали HDV-инфекцияси билан касалланган бемор кузатилди. Жигар стеатози аниқланган 67 нафар беморлар асосий (махсус диета буюрилди) ва қиёсий (умумбелгиланган овқатланиш) гуруҳларга. Жигар стеатози аниқланмаган аёллар эса назорат I (махсус диета буюрилди) ва назорат II (умумбелгиланган овқатланиш) гуруҳларига ажратилди. Беморларда 1-, 45- ва 90-кунларда адипонектин, липид профили ва жигар ферментлари ўрганилди. Натижаларга кўра, жигар стеатози аниқланган беморларда адипонектин даражаси ишонarli равишда паст, ПЗЛП ва жигар ферментлари юқори, ЮЗЛП эса паст эканлиги аниқланди. 90 кунлик диета фонида адипонектин ошиши, липид профилининг яхшиланиши ҳамда АЛТ ва АСТ камайиши кузатилди. Хулоса қилиб айтганда, ўсимлик оқсилларига асосланган диета сурункали HDV-инфекцияси фонида жигар стеатози бўлган беморларда метаболик кўрсаткичларни яхшилашда ҳамда ривожланишини олдини олишда самарали қўшимча усул бўлиши мумкин.

Калит сўзлар: сурункали HDV-инфекцияси, жигар стеатози, адипонектин, липид профили, диетотерапия, ўсимлик оқсиллари, АЛТ, АСТ.

DIETARY MODIFICATIONS AND CLINICAL AND BIOCHEMICAL RESULTS IN DEVELOPED LIVER STEATOSIS WITH A CHRONIC HDV INFECTION

Kodirova G.A.¹, Tashpulatova Sh.A.², Rustamov J.J.²

¹Fergana Medical Institute of Public Health, Fergana, Uzbekistan

²Tashkent State Medical University, Tashkent, Uzbekistan

Resume. In recent years, fatty liver (steatosis) associated with chronic viral hepatitis has frequently developed against a background of metabolic disturbances, altered lipid metabolism, and adipokine imbalance. Therefore, studying the role of dietary therapy is highly relevant. Objective. To evaluate the effects of dietary modifications based on plant proteins on clinical and biochemical parameters in patients with fatty liver secondary to chronic HDV infection. Materials and methods. From 2024 to 2026, 326 patients with chronic HDV infection were observed. Among them, 67 patients with fatty liver were assigned to the main group (special diet) and comparative group (usual diet). Patients without fatty liver formed control groups I (special diet) and II (usual diet). Adiponectin levels, lipid profile, and liver enzymes were measured on days 1, 45, and 90 of the study. Results. Patients with fatty liver had significantly lower adiponectin levels, elevated LDL and liver enzymes (ALT, AST), and decreased HDL levels. Over 90 days of dietary intervention, adiponectin increased, lipid profile improved, and ALT and AST decreased. Conclusion. A diet based on plant proteins can serve as an effective adjunct method for improving metabolic parameters and preventing the progression of fatty liver in patients with chronic HDV infection.

Keywords: chronic HDV infection, fatty liver, adiponectin, lipid profile, dietary therapy, plant proteins, ALT, AST.

ДИЕТНЫЕ МОДИФИКАЦИИ И КЛИНИКО-БИОХИМИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ СТЕАТОЗЕ ПЕЧЕНИ С РАЗВИТЫМ ФОНОМ ХРОНИЧЕСКОЙ HDV-ИНФЕКЦИИ

Кодирова Г.А.¹, Ташпулатова Ш.А.², Рустамов Дж.Д.²

¹Ферганский медицинский институт общественного здоровья, г. Фергана, Узбекистан

²Ташкентский государственный медицинский университет, г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. В последние годы при хронических вирусных гепатитах жировой гепатоз разви-

вается на фоне метаболических нарушений, изменений липидного обмена и дисбаланса адипокинов. Поэтому изучение роли диетотерапии является актуальным. Цель исследования — оценить влияние диетических модификаций, основанных на растительных белках, на клинические и биохимические показатели при жировом гепатозе на фоне хронической HDV-инфекции. Материал и методы. В 2024–2026 годах наблюдались 326 пациентов с хронической HDV-инфекцией. Среди них 67 пациентов с жировым гепатозом были разделены на основную группу (назначена специальная диета) и сравнительную группу (обычное питание). Пациенты без жирового гепатоза формировали контрольные группы I (специальная диета) и II (обычное питание). У всех пациентов на 1-й, 45-й и 90-й дни исследования определяли уровень адипонектина, липидный профиль и ферменты печени. Результаты. У пациентов с жировым гепатозом уровень адипонектина был достоверно ниже, уровень ПНП и ферментов печени (АЛТ, АСТ) повышен, а уровень ВНП — снижен. В течение 90 дней диеты наблюдалось повышение адипонектина, улучшение липидного профиля и снижение АЛТ и АСТ. Вывод. Диета, основанная на растительных белках, может быть эффективным дополнительным методом для улучшения метаболических показателей и предотвращения прогрессирования жирового гепатоза у пациентов с хронической HDV-инфекцией.

Ключевые слова: хроническая HDV-инфекция, жировой гепатоз, адипонектин, липидный профиль, диетотерапия, растительные белки, АЛТ, АСТ.

e-mail:tashpulatova.shakhnoza@bk.ru

Долзарблиги. Сурункали гепатитлар, хусусан HDV ва HCV, кўпинча жигарда ёғ тўпланиши ва стеатоз ривожланиши билан боғлиқ бўлиб, бу ҳолат вируснинг ўзи эмас, балки метаболик омиллар (семизлик, қандли диабет, инсулинрезистентлик) орқали содир бўлади [1; 2; 3]. Адипонектин — адипоцитлар томонидан ишлаб чиқариладиган гормон бўлиб, инсулин сезувчанлигини оширади, ёғ кислоталарини парчалайди ва яллиғланишни камайтиради. Унинг даражаси камайиши стеатоз ва стеатогепатит ривожланишига олиб келади [4; 5; 6].

Ҳайвон манбасига эга бўлган оксилларда метионин, гомоцистеин ва цистеин кўп бўлиб, улар транссульфурация йўли орқали кислоталикни оширади ва НАЖК, цереброваскуляр касалликлар ва суяк синишлари хавфини кучайтиради. Ўсимлик оксиллари эса глутамат ва глицинга бой бўлиб, микро муҳитни ишқорийлаштириб, глюкоза миқдорини камайтиради, бу эса липид алмашинувини яхшилаш ва жигар функционал ҳолатини барқарорлаштиришда ижобий таъсир кўрсатади. Қисқача, сурункали гепатитда стеатоз асосан метаболик омиллар билан боғлиқ бўлиб, адипонектинни сақлаш ва ўсимлик оксилларига асосланган рацион жигар метаболизмининг ҳимоя қилишда муҳим аҳамиятга эга [7; 8].

Тадқиқотнинг мақсади сурункали HDV-инфекцияси билан касалланган беморларда жигар стеатозиди диетали модификацияларнинг клиник ва биохимик кўрсаткичларга таъсирини баҳолаш бўлди.

Материал ва усуллар. Адабиётлар шарҳига асосланган ҳолда сурункали HDV-инфекцияси билан касалланган беморларга 1 ҳафталик меню тузиб берилди, менюни асосини фақат ўсимлик оксиллари ташкил этди. 1-кун нонушта - сули бўтқаси, 1 та олма; тушлик - ясимик шўрва, сабзавотли салат билан; кечки овқат - димланган сабзавотлар, нўхатли салат билан. 2-кун нонушта - қора нон, тарик бўтқаси; тушлик - мошхўрда, сабзавотли салат билан; кечки овқат - димланган карам, ловияли салат билан. 3-кун нонушта - гречка бўтқаси ёнғоқ билан; тушлик - нўхат шўрва, сабзавотли салат билан; кечки овқат - димланган сабзавотлар тухум билан. 4-кун нонушта - арпа бўтқаси; тушлик - мастава, 250 мл қатиқ билан; кечки овқат — димланган ёғсиз балиқ сабзавотлар билан. 5-кун нонушта - гуруч бўтқаси куруқ мевалар билан; тушлик - ловия шўрва; кечки овқат - сабзавотли рагу. 6-кун нонушта - 5% творог 200 г + 15% сметана 2 ош қошиқ, куруқ мевалар билан; тушлик — ловияли салат димланган сабзавотлар билан; кечки овқат мошкичири. 7-кун нонушта: маккажўхори бўтқаси; тушликка димланган сабзавотлар тофу билан; кечки овқат - авокадо ва нўхат салати.

Фарғона шаҳар юқумли касалликлар шифохонасида 2024-2026 йиллар давомида сурункали HDV-инфекцияси ташхиси билан даволанган 326 нафар беморлар назорат қилинди. Беморларнинг ўртача ёши $52,8 \pm 2,3$ бўлиб, беморларнинг 60,7% (198) аёллар, 39,3% (128) эркаклар ташкил қилди. Назоратга олинган беморларнинг барчаси патогенетик даво билан бир қаторда вирусга қарши давода бўлган. Ўтказилган УТТ текширувида беморларнинг 78 нафарида (23,9%) жигарнинг ёғли гепатози аниқланган, ушбу беморларнинг катта қисмини аёллар ташкил қилди (85,9%), фақат 11 нафари (14,1%) эркаклар бўлди. Тадқиқот гуруҳлари жинс ва ёши бўйича ўзаро мутаносиб бўлиши зарурлиги эътиборга олиниб тадқиқот гуруҳларидан эркакларни чиқариб ташладик ҳамда жигар стеатози

аниқланган 34 нафар аёллар тадқиқотнинг асосий гуруҳини ташкил қилди, уларга биз томондан ишлаб чиқилган диета буюрилди. Жигар стеатози аниқланган 33 нафар аёллар эса қиёсий гуруҳни ташкил қилди, улар одатий овқатланиш турида бўлишди. Жигар стеатози аниқланмаган 248 нафар сурункали вирусли гепатит D билан касалланган беморларнинг 52,8% (131) аёллар, 47,2% (117) эркаклар ташкил қилди ҳамда улар тадқиқотдан чиқариб юборилди. Назорат I гуруҳини жигар стеатози аниқланмаган сурункали HDV билан касалланган 35 нафар аёллар ташкил қилди, уларга махсус диета буюрилди, умумбелгиланган овқатланишда бўлган 37 нафар аёллар эса назорат II гуруҳини ташкил этди. Тадқиқот гуруҳи беморлари 90 кун давомида назорат қилинди, тадқиқотнинг 1-куни, 45-куни ва 90-куни беморларнинг қон зардобиди адипонектин, липид профилидан, юқори (ЮЗЛП) ва паст зичликка эга липопротеинлар (ПЗЛП) ва АЛТ қиймати ўрганилди. Тадқиқотда олинган натижаларга Excel дастурида ишлов берилди.

Олинган натижалар. УТТ да жигар стеатози аниқланган 67 нафар аёлларда адипонектиннинг ўртача қиймати $4,7 \pm 0,64$ мг/мл ни ташкил қилди ҳамда УТТ да жигар стеатози аниқланмаган беморлар қийматидан ($11,2 \pm 1,2$ мг/мл) ишонарли равишда паст бўлди ($P < 0,001$). УТТ да жигар стеатози аниқланган 67 нафар аёллар қон зардобиди ЮЗЛП қиймати ўртача $1,17 \pm 0,056$ ммоль/л; ПЗЛП – $4,32 \pm 0,68$ ммоль/л ни ташкил қилди ҳамда ЮЗЛП қиймати меъёрдан камайган, ПЗЛП қиймати эса меъёрдан юқори эканлиги аниқланди. Шу билан бир қаторда жигар стеатози аниқланмаган беморлар ЮЗЛП қийматидан ($1,43 \pm 0,08$ ммоль/л) ишонарли равишда паст ($P < 0,01$), ПЗЛП қийматидан эса ($3,41 \pm 0,71$ ммоль/л) ишонарсиз даражада юқори бўлди ($P > 0,05$). Жигар стеатози аниқланган аёллар касалхонага келган кунда АЛТ нинг ўртача қиймати $89,3 \pm 2,3$ ЕД/л; АСТ – $61,2 \pm 1,58$ ЕД/л бўлди. Жигар стеатози аниқланмаган аёлларда эса мувофиқ равишда $59,2 \pm 1,1$ ЕД/л ва $36,6 \pm 1,03$ ЕД/л бўлди. яъни АЛТ қиймати тадқиқот гуруҳидаги барча беморларда меъёрдан юқори бўлди, жигар стеатози аниқланган беморларда стеатоз аниқланмаган беморларга нисбатан ишонарли равишда юқори бўлди ($P < 0,001$). АСТ қиймати эса, жигар стеатози аниқланган беморларда меъёрдан кўтарилди ҳамда жигар стеатози аниқланмаган беморларга нисбатан ишонарли даражада юқори бўлди ($P < 0,001$).

Даволашнинг 45- ва 90-кунларига келиб ўрганилаётган барча лаборатор кўрсаткичлар таҳлил этилди, унга кўра, асосий гуруҳда риоя этилган диета таъсирида адипонектин қиймати 45-кунга келиб ўртача 5,67 мг/мл, 90-кунга келиб эса 7,1 мг/мл гача кўтарилган ҳамда меъёрнинг пастки чегарасига етган. Даволашдан олдинги адипонектин қиймати 90-кундаги қийматга нисбатан статистик ишонарли равишда кўтарилган. Умумқабул қилинган овқатланиш турида бўлган қиёсий гуруҳ аёлларида эса адипонектин қиймати динамикада сезиларли ўзгармаган, деярли ўзгаришсиз қолган. Назорат I гуруҳида адипонектин қиймати бошиданоқ меъёр даражасида бўлган ҳамда динамикада қийматини сақлаб қолган. назорат II гуруҳида эса адипонектин қиймати меъёр даражасида бўлишига қарамасдан, динамикада пасайиш тенденциясига эга бўлган, аммо касалликнинг 1-куни ва 90-куни орасидаги кўрсаткич қиймати орасида ишонарли фарқ кузатилмаган ($P > 0,05$).

Юқори зичликдаги липопротеинлар (ЮЗЛП) тадқиқот гуруҳларида таҳлил этилганида, асосий гуруҳ аёлларида ЮЗЛП кўрсаткичи риоя этилган диета фонида босқичма-босқич ошиб борган, аммо даволаш кунлари орасида ишонарли фарқ кузатилмаган ($P > 0,05$). Қиёсий гуруҳда эса аксинча, ЮЗЛП кўрсаткичи даволаш кунларида камайиш тенденциясига эга бўлган, ушбу гуруҳларда ҳам даволаш кунлари орасида ишонарли фарқ кузатилмаган ($P > 0,05$). Назорат I гуруҳида ЮЗЛП қийматлари меъёр даражасида бўлган ҳамда риоя этилган диета фонида кўрсаткич қиймати кўтарилиш тенденциясига эга бўлган, назорат II гуруҳида эса, кўрсаткич қиймати меъёрда бўлишига қарамасдан даволаш кунларида пасайиш тенденциясида бўлган.

Паст зичликдаги липопротеинлар (ПЗЛП) асосий гуруҳда риоя этилган диета фонида юқори қийматдан меъёрга томон пасайиб борган, аммо даволаш кунлари орасидаги фарқ статистик ишонарли даражада бўлмаган ($P > 0,05$). Қиёсий гуруҳда эса аксинча, ПЗЛП қиймати меъёрдан кўтарилиб борган, аммо ушбу ҳолатда ҳам кўрсаткичлар қиймати орасида ишонарли фарқ кузатилмаган ($P > 0,05$). Назорат гуруҳларида ПЗЛП қиймати меъёр даражасида бўлган, биз томондан ишлаб чиқилган диета фонида ПЗЛП қиймати пасайишга мойил бўлган бўлса, назорат II гуруҳида эса динамикада кўтарилиб борган, аммо кўтарилиш тенденцияси статистик ишонарли даражада бўлмаган ($P > 0,05$).

Тадқиқот гуруҳ беморларида АЛТ ферменти таҳлил этилди, унга кўра, асосий гуруҳда АЛТ даражаси тадқиқот бошида 88,7 ЕД/л бўлиб 90-кунга келиб 43,6 ЕД/л гача камайиб борган, аммо меъёр қийматига етмаган ҳамда динамикада АЛТ қиймати статистик ишонарли даражада камайган ($P < 0,001$). Қиёсий гуруҳда ҳам АЛТ қийматини камайиши кузатилган бўлса-да, бу пасайиш асосий

гуруҳга нисбатан камроқ ифодаланган ҳамда динамикада пасайиш статистик ишонарсиз даражада бўлган ($P>0,05$). Назорат гуруҳларида ҳам АЛТ кўрсаткичлари бошиданоқ нисбатан паст бўлиб, тадқиқот давомида яна биров пасайган, 90-кунга келиб назорат I гуруҳида меъёр даражасига етган, назорат II гуруҳида эса пасайишга мойил бўлган.

1-жадвал

Даволаш гуруҳ беморларида даволаш кунларига мувофиқ равишда ўрганилаётган кўрсаткичлар қийматининг динамикаси

	Асосий гуруҳ (n=34)			Қиёсий гуруҳ (n=33)		
	1-кун	45-кун	90-кун	1-кун	45-кун	90-кун
Адипонектин мг/мл	4,5±0,7	5,7±0,6	7,1±0,6	4,9±0,8	4,6±0,7	4,6±0,8
ЮЗЛП ммоль/л	1,2±0,1	1,3±0,1	1,3±0,2	1,14±0,2	1,05±0,1	0,98±0,2
ПЗЛП ммоль/л	4,4±0,7	3,8±0,5	3,4±0,4	4,24±0,63	4,7±0,4	5,2±0,7
АЛТ ЕД/л	88,7±1,0	61,1±1,2	43,6±1,3	89,9±1,1	73,4±1,4	67,5±1,3
АСТ ЕД/л	61,5±0,9	47,6±0,7	34,8±0,6	60,9±1,1	49,8±0,9	43,5±0,4
	Назорат I гуруҳ (n=35)			Назорат II гуруҳ (n=37)		
	1-кун	45-кун	90-кун	1-кун	45-кун	90-кун
Адипонектин мг/мл	11,1±0,5	11,7±0,7	12,3±0,7	11,3±0,5	10,9±0,5	10,4±0,6
ЮЗЛП ммоль/л	1,33±0,3	1,4±0,2	1,45±0,3	1,53±0,1	1,48±0,1	1,42±0,4
ПЗЛП ммоль/л	3,38±0,9	3,1±0,6	3,07±0,4	3,44±0,3	3,56±0,7	3,7±0,4
АЛТ ЕД/л	60,1±1,2	43,5±1,1	39,8±1,4	58,3±1,1	48,7±1,3	41,6±1,1
АСТ ЕД/л	36,9±0,4	33,2±0,3	28,6±0,2	36,3±0,3	34,5±0,3	31,2±0,4

Худди шундай динамика АСТ ферментига ҳам хос бўлган, асосий гуруҳда АСТ даражаси динамикада пасайиб борган ҳамда меъёр даражасига етган, аммо динамикада ишонарли фрак кузатилмаган ($P>0,05$). Қиёсий гуруҳда ҳам пасайиш қайд этилган, аммо бу динамика асосий гуруҳдагидан сустроқ бўлган ва 90-кунга келиб ҳам меъёр қийматига етиб бормаган. Назорат гуруҳларида АСТ қийматлари меъёр диапазонда сақланган (1-жад).

Муҳокама. Сурункали HDV-инфекцияси билан касалланган беморларда жигар стеатози мавжуд бўлган ҳолларда метаболит ва лаборатор кўрсаткичлар сезиларли даражада ўзгаришга учрашини кўрсатди. Тадқиқот бошида жигар стеатози аниқланган аёлларда адипонектиннинг ўртача қиймати жигар стеатози аниқланмаган беморларга нисбатан анча паст бўлгани аниқланди. Бу ҳолат жигарда ёғ алмашинуви бузилиши ва адипоцитлар секретор фаолияти пасайиши билан изоҳланади. Маълумки, адипонектин яллиғланишга қарши ва гепатопротектор хусусиятга эга гормон ҳисобланиб, у жигарда ёғ кислоталарининг оксидланишини кучайтиради ва триглицеридлар тўпланишини камайтиради. Шунинг учун унинг паст даражаси жигар стеатози ривожланишида муҳим патогенетик омиллардан бири сифатида қаралади. Тадқиқот натижаларида жигар стеатози аниқланган беморларда липид профилида ҳам ўзгаришлар кузатилди. Хусусан, ЮЗЛП лар қиймати меъёрдан паст, ПЗЛП лар эса меъёрдан юқори бўлгани аниқланди. Бу ҳолат липид алмашинувининг бузилишига хос бўлиб, жигар хужайраларида ёғ тўпланишининг кучайиши билан боғлиқ. Адипонектин даражасининг пастлиги липопротеинлар метаболизмининг бузилиши билан узвий боғлиқ бўлиб, у триглицеридлар синтези ва липидларнинг жигарда аккумуляциясига олиб келиши мумкин. Тадқиқотнинг кейинги босқичида асосий гуруҳга ўсимлик оқсилларига асосланган махсус диета буюрилгани жигар метаболизмига ижобий таъсир кўрсатгани кузатилди. Хусусан, асосий гуруҳда адипонектин даражаси динамикада сезиларли равишда ошган. 90 кун давомида адипонектин қийматининг босқичма-босқич кўтарилиши организмда липид ва углевод алмашинувининг нормаллашишига ишора қилади. Бу ҳолат ўсимлик оқсилларига бой рационнинг антиоксидант ва яллиғланишга қарши хусусиятлари билан изоҳланиши мумкин. ЮЗЛПлар кўрсаткичи асосий гуруҳда диета фонида биров ошгани кузатилди. ЮЗЛП холестериннинг периферик тўқималардан жигарга қайта ташилишида иштирок этиши маълум. Шу сабабли унинг ошиши жигарда липид алмашинувининг яхшиланиши билан боғлиқ бўлиши мумкин. Қиёсий гуруҳда эса аксинча, ЮЗЛП кўрсаткичининг камайиш тенденцияси сақланиб қолган. Бу ҳолат умумбелгиланган овқатланиш режими жигар метаболизмини яхшилашда етарли даражада самара бермаганини кўрсатади. ПЗЛПлар динамикаси ҳам диета таъсирини

тасдиқлайди. Асосий гуруҳда ПЗЛП қиймати босқичма-босқич пасайиш тенденциясига эга бўлган. Бу ҳолат жигарда холестерин ва триглицеридлар синтези камайиши билан боғлиқ бўлиши мумкин. Қиёсий гуруҳда эса ПЗЛП кўрсаткичи аксинча ўсиш тенденциясига эга бўлган. Бу липид алмашинуви бузилиши давом этаётганини кўрсатади. Жигар ферментлари таҳлили ҳам жигар функционал ҳолатини баҳолашда муҳим аҳамиятга эга бўлди. Тадқиқот бошида жигар стеатози аниқланган беморларда АЛТ ва АСТ қийматлари жигар стеатози аниқланмаган беморларга нисбатан анча юқори бўлган. Бу ҳолат гепатоцитлар зарарланиши ва цитоллиз жараёни кучайганини кўрсатади. Асосий гуруҳда диета фонида АЛТ ва АСТ ферментларининг динамикада пасайиши жигар хужайраларининг функционал ҳолати яхшиланишини кўрсатади. Хусусан, АЛТ қийматининг статистик ишонарли даражада камайиши жигар паренхимасига тушаётган метаболик юклама камайганини кўрсатади. Қиёсий гуруҳда ҳам ферментлар пасайиши кузатилган бўлса-да, бу динамика анча суст бўлган. Бу ҳолат махсус диета режими жигар стеатози ва метаболик бузилишларни коррекция қилишда муҳим аҳамиятга эга эканини кўрсатади. Тадқиқот натижалари сурункали HDV-инфекцияси билан касалланган беморларда жигар стеатози ривожланишида метаболик омиллар ва овқатланиш тарзининг муҳим аҳамиятга эга эканлигини кўрсатди. Хусусан, тадқиқотда жигар стеатози аниқланмаган беморлардан шакллантирилган назорат гуруҳларида кузатилган ўзгаришлар диетотерапиянинг профилактик аҳамиятини янада аниқроқ намоён қилди. Назорат I гуруҳида жигар стеатози аниқланмаган беморларга ўсимлик оксилларига асосланган диета буюрилган бўлиб, кузатув давомида лаборатор кўрсаткичлар асосан барқарор сақланган. Ушбу гуруҳда адипонектин даражаси тадқиқот бошидаёқ меъёр чегарасида бўлиб, 90 кун давомида ушбу кўрсаткич сақланиб қолган ёки бироз ошиш тенденцияси кузатилган. Бу ҳолат ўсимлик манбасига эга бўлган оксиллар ва сабзавотларга бой рацион липид ва углевод алмашинувига ижобий таъсир кўрсатишини кўрсатади. Адипонектин яллиғланишга қарши ва инсулин сезувчанлигини оширувчи гормон бўлганлиги сабабли, унинг меъёр даражасида сақланиши жигарда ёғ тўпланишининг олдини олишда муҳим аҳамиятга эга. Шу билан бирга, ушбу гуруҳда ЮЗЛП қийматининг бироз ошиши ва ПЗЛП қийматининг пасайиш тенденцияси кузатилиши липид алмашинуви барқарорлигини таъминлашга хизмат қилган. Бу эса жигар хужайраларида ёғ тўпланиши хавфини камайтиради. Демак, жигар стеатози аниқланмаган беморларда ўсимлик оксилларига асосланган рацион қўлланилиши метаболик ўзгаришларнинг олдини олиш ва жигар паренхимасини стеатоздан химоя қилишда профилактик аҳамиятга эга бўлиши мумкин.

Назорат II гуруҳида эса жигар стеатози аниқланмаган беморлар одатий овқатланиш тартибида бўлган. Кузатув давомида ушбу гуруҳда адипонектин даражаси бироз пасайиш тенденциясига эга бўлгани қайд этилди. Гарчи ушбу ўзгаришлар статистик ишонарли даражада бўлмаган бўлса-да, динамикадаги пасайиш тенденцияси липид ва углевод алмашинуви бузилишларига мойиллик ортиб бораётганини кўрсатиши мумкин. Шунингдек, ушбу гуруҳда ЮЗЛПлар қийматининг пасайишга, ПЗЛПлар қийматининг эса ошишга мойил бўлиши кузатилди. Бу эса жигарда ёғ тўпланиши хавфини оширувчи метаболик ўзгаришларнинг ривожланиш эҳтимолини кўрсатади. Жигар ферментлари таҳлили ҳам ушбу ҳолатни тасдиқлайди. Назорат II гуруҳида АЛТ ва АСТ қийматлари меъёр доирасида сақланган бўлса-да, динамикада уларнинг сезиларли яхшиланиши кузатилмаган. Бу эса овқатланиш тартибини ўзгартирмаслик жигар функционал ҳолатига ижобий таъсир кўрсатмаслигини кўрсатади. Шундай қилиб, тадқиқот натижалари назорат гуруҳларидаги динамика орқали ҳам ўсимлик оксилларига асосланган рационнинг аҳамиятини тасдиқлайди. Жигар стеатози аниқланмаган беморларда бундай диетани қўллаш липид алмашинуви барқарорлигини сақлашга ёрдам бериб, жигарда ёғ тўпланишининг олдини олиши мумкин. Аксинча, одатий овқатланиш тартибини сақлаш метаболик бузилишларга мойилликни кучайтириши ва келажақда жигар стеатози ривожланиши учун шарт-шароит яратиши мумкин.

Хулосалар. 1. Сурункали HDV-инфекцияси фонида жигар стеатози мавжуд беморларда адипонектин даражасининг пасайиши, юқори зичликдаги липопротеинлар камайиши ҳамда паст зичликдаги липопротеинлар ва жигар ферментлари (АЛТ, АСТ) ошиши кузатилиб, бу ҳолат жигарда липид алмашинуви бузилиши ва гепатоцитлар шикастланиши билан боғлиқ эканлиги аниқланди.

2. Ўсимлик оксилларига асосланган диета 90 кун давомида қўлланилганда адипонектин даражасининг ошиши, липид профилининг яхшиланиши (ПЗЛП пасайиши, ЮЗЛП барқарорлашиши) ва жигар ферментларининг камайиши кузатилиб, мазкур овқатланиш тури сурункали HDV-инфекциясида жигар стеатозини коррекция қилиш ва унинг ривожланишини олдини олишда самарали даволовчи ҳамда профилактик усул бўлиши мумкин.

Адабиётлар рўйхати:

1. Poonam Mathur, Arshi Khanam, Shyam Kottilil Chronic Hepatitis D Virus Infection and Its Treatment: A Narrative Review //Microorganisms.- 2024, 12(11), 2177;
2. Haga Y, Kanda T, Sasaki R, Nakamura M, Nakamoto S, Yokosuka O. Nonalcoholic fatty liver disease and hepatic cirrhosis: Comparison with viral hepatitis-associated steatosis. World J Gastroenterol. 2015 Dec 14;21(46):12989-95.
3. Lee YB, Ha Y, Chon YE, Kim MN, Lee JH, Park H, Kim KI, Kim SH, Rim KS, Hwang SG. Association between hepatic steatosis and the development of hepatocellular carcinoma in patients with chronic hepatitis B. Clin Mol Hepatol. 2019 Mar;25(1):52-64.
4. Fondjo, L. A., Gyamfi, E. A. A., Owiredun, W. K. B. A., Turpin, C. A., Mante, D. A., & Anto, E. O. (2016). Maternal serum adiponectin, leptin and adiponectin-leptin ratio as possible biomarkers of preeclampsia. 2, 41–47.
5. Markel Rico-González, Adrián Moreno-Villanueva, Carlos D. Gómez-Carmona, Jorge Carlos-Vivas The Effects of Physical Activity Together With Nutrition Programs in Educational Settings on Obesity and Overweight Reduction in Preschool Children: A Systematic Review of Randomized Controlled Trials //Journal Of Nutrition And Metabolism. First published: 22 January 2026
6. Varghese, J. F., Patel, R., & Yadav, U. C. S. (2017). Metabolic syndrome: A forerunner of cardiovascular diseases. 2, 4–6.
7. Dai Y., Zhu J., Meng D., Yu C., Li Y. Association of homocysteine level with biopsy-proven non-alcoholic fatty liver disease: A meta-analysis. J. Clin. Biochem. Nutr. 2016; 58:76–83.
8. De Chiara F, Ureta Checchello C, Ramón Azcón J. High Protein Diet and Metabolic Plasticity in Non-Alcoholic Fatty Liver Disease: Myths and Truths. Nutrients. 2019 Dec 6;11(12):2985.

Иқтибос учун: Қодирова Г.А., Ташпулатова Ш.А., Рустамов Ж.Ж. Сурункали HDV-инфекцияси фони ривожланган жигар стеатозиди диетали модификациялар ва клиник-биокимёвий натижалар // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2026. – № 4(24). – Б. 187–192. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19479586>

АССОЦИАЦИЯ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНА IL10 –1082C>T rs1800896 С ПРОГРЕССИРОВАНИЕМ HDV-ИНФЕКЦИИ

Ибадуллаева Н.С.¹, Ходжаева М.Э.², Хикматуллаева А.С.¹, Кан Н.Г.¹

¹Научно-исследовательский институт вирусологии Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра эпидемиологии, микробиологии, инфекционных и паразитарных заболеваний, г.Ташкент, Узбекистан

²Ташкентский государственный медицинский университет, г.Ташкент, Узбекистан

Резюме. В работе изучена роль полиморфизма гена IL10 –1082C>T rs1800896 в прогрессировании HDV-инфекции. Обследованы 70 пациентов: 35 с хронической HDV-инфекцией и 35 с циррозом печени HDV-этиологии. Выявлена статистически значимая ассоциация полиморфизма гена с прогрессированием заболевания в аллельной и доминантной моделях. При этом различий по уровню IL-10 и вирусной нагрузке HDV RNA между генотипами не обнаружено. Полученные данные свидетельствуют о возможной роли данного полиморфизма гена как генетического маркера риска прогрессирования HDV-инфекции, однако требуют подтверждения в исследованиях с расширенной когортой пациентов.

Ключевые слова: хроническая HDV-инфекция, цирроз печени, полиморфизм гена, аллель, генотип, вирусная нагрузка.

ASSOCIATION OF THE IL10 –1082C>T rs1800896 GENE POLYMORPHISM WITH THE PROGRESSION OF HDV-INFECTION

Ibadullaeva N.S.¹, Khodjaeva M.E.², Khikmatullaeva A.S.¹, Kan N.G.¹

¹Research Institute of Virology of the Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Epidemiology, Microbiology, Infectious and Parasitic Diseases, Tashkent, Uzbekistan

²Tashkent State Medical University, Tashkent, Uzbekistan

Resume. The role of the IL10 –1082C>T rs1800896 gene polymorphism in the progression of HDV infection was studied. A total of 70 patients were examined: 35 with chronic HDV infection and 35 with HDV-related liver cirrhosis. A statistically significant association of the gene polymorphism with disease progression was identified in the allelic and dominant models. At the same time, no differences in IL-10 levels and HDV RNA viral load between genotypes were found. The obtained data indicate a possible role of this gene polymorphism as a genetic marker of the risk of HDV-infection progression; however, they require confirmation in studies with an expanded cohort of patients.

Keywords: chronic HDV-infection, liver cirrhosis, gene polymorphism, allele, genotype, viral load.

IL10 –1082C>T rs1800896 ГЕН ПОЛИМОРФИЗМИНИНГ HDV-ИНФЕКЦИЯСИНИНГ ЗЎРАЙИШИ БИЛАН АССОЦИАЦИЯСИ

Ибадуллаева Н.С.¹, Ходжаева М.Э.², Хикматуллаева А.С.¹, Кан Н.Г.¹

¹Республика ихтисослаштирилган эпидемиология, микробиология, юкумли ва паразитар касалликлар илмий-амалий тиббиёт марказининг вирусология илмий-тадқиқот институти, Тошкент ш., Ўзбекистон

²Тошкент давлат тиббиёт университети, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. Ушбу ишда IL10 –1082C>T rs1800896 ген полиморфизмининг HDV-инфекциясининг зўрайишидаги роли ўрганилди. Тадқиқотда 70 нафар бемор: 35 нафари сурункали HDV-инфекцияси билан, 35 нафари эса HDV-этиологияли жигар циррози билан текишилди. Ген полиморфизми ва касаллик зўрайиши ўртасида аллел ва доминант моделларда статистик жиҳатдан аҳамиятли ассоциация аниқланди. Шу билан бирга, IL-10 даражаси ва HDV RNA вирус юкламаси бўйича генотиплар ўртасида фарқлар аниқланмади. Олинган натижалар мазкур ген полиморфизми HDV-инфекцияси зўрайиши хавфининг генетик маркери бўлиши мумкинлигини кўрсатади, бироқ улар кенгайтирилган беморлар когортида ўтказиладиган тадқиқотларда тасдиқланиши зарур.

Калит сўзлар: сурункали HDV-инфекцияси, жигар циррози, ген полиморфизми, аллел, генотип, вирус юкламаси.

Актуальность. Хроническая HDV-инфекция характеризуется выраженным иммунопатогенетическим компонентом поражения печени [3]. Повреждение гепатоцитов при HDV-инфекции в значительной степени обусловлено иммунным ответом хозяина, включая дисбаланс провоспалительных и противовоспалительных цитокинов. Современные исследования подчёркивают, что тяжесть течения HDV-инфекции и скорость прогрессирования к циррозу печени во многом определяются особенностями иммунной регуляции [5]. Интерлейкин-10 (IL-10) является ключевым противовоспалительным цитокином, ограничивающим чрезмерную активацию иммунной системы. IL-10 подавляет продукцию провоспалительных цитокинов, снижает экспрессию молекул МНС II и ко-стимулирующих молекул, тем самым регулируя интенсивность клеточного иммунного ответа [4]. При хронических вирусных инфекциях печени IL-10 может играть двойственную роль: с одной стороны, он уменьшает иммунное повреждение ткани печени, с другой - потенциально способствует персистенции вируса за счёт подавления противовирусного ответа [2]. Cao L.N., и соавторы провели исследование, в котором оценивалась роль двух полиморфизмов гена IL10 rs1800896 и rs1800872 в предрасположенности к циррозу печени и их связь с хроническим гепатитом В в китайской популяции. Результаты данных исследований показали, что полиморфизм IL10 rs1800896 ассоциирован с повышенным риском развития цирроза печени, что указывает на его потенциальное значение как генетического фактора, влияющего на прогрессирование хронической HBV-инфекции [1]. Полиморфизм промоторной области гена IL-10 -1082 rs1800896 относится к функционально значимым вариантам, способным влиять на уровень транскрипции гена и продукцию цитокина [6].

Учитывая выраженный цитокиновый дисбаланс при HDV и высокую частоту прогрессирования заболевания до цирроза печени, исследование функционально значимых полиморфизмов генов противовоспалительных цитокинов, включая IL-10 -1082 rs1800896, представляется обоснованным и актуальным. Изучение распределения генотипов и аллелей данного полиморфизма гена, а также анализ его возможной ассоциации с прогрессированием HDV-инфекции до цирроза печени, может способствовать более глубокому пониманию иммуногенетических механизмов заболевания и формированию предпосылок для разработки прогностических маркеров неблагоприятного течения инфекции. В отношении HDV-инфекции роль генетических полиморфизмов гена IL-10 на сегодняшний день остаётся недостаточно изученной и ограниченно представленной в современной научной литературе.

Цель исследования. Изучить значимость полиморфизма гена IL-10 -1082 rs1800896 в прогрессировании HDV-инфекции.

Материалы и методы. Количественный уровень HDV RNA, IL-10 в плазме крови и генотипирование полиморфизма гена IL10 -1082C>T rs1800896 определены у 35 больных с хроническим гепатитом D и 35 пациентов с циррозом печени HDV-этиологии получавших лечение в Научно-исследовательском институте вирусологии Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра эпидемиологии, микробиологии, инфекционных и паразитарных заболеваний. Для выявления анти-HDV и HBsAg в сыворотке крови использовались диагностические наборы реагентов «ИФА-АНТИ-HDV» и «ДС-ИФА-HBsAg» (Нижний Новгород, Россия) соответственно. Определение IL-10 в плазме крови проводили с использованием набора Human IL-10 (Interleukin 10) ELISA kit (Fune Test, Китай). Для определения ДНК HBV и РНК HDV использовались наборы «АмплиСенс®HBV-Монитор-FL» и «АмплиСенс®HDV-Монитор-FL» (ЦНИИЭ, Россия) соответственно. Определение IL10 -1082C>T rs1800896 проводилось методом ПЦР с применением набора «Набор реагентов для выявления полиморфизма гена IL10 - 1082 rs18008960» (ООО РОССА, Узбекистан).

Результаты и обсуждение. В рамках настоящего исследования был проведён анализ распределения генотипов и аллелей полиморфизма гена IL10 -1082C>T rs1800896 у пациентов с циррозом печени HDV-этиологии и хронической HDV-инфекцией с целью оценки возможной роли данного полиморфизма в прогрессировании заболевания. Распределение генотипов и аллелей полиморфизма гена IL10 -1082C>T rs1800896 в исследуемых клинических группах, а также результаты проверки соответствия равновесию Харди-Вайнберга, представлены в таблице 1.

Как видно из данных, представленных в таблице 1, распределение генотипов полиморфизма гена IL10 -1082C>T rs1800896 в обеих клинических группах соответствовало равновесию Харди-Вайнберга ($p>0,05$), что свидетельствует о популяционной стабильности выборок и корректности выполненного генотипирования. У пациентов с циррозом печени HDV-этиологии отмечалось преобладание генотипа ТТ и более высокая частота аллеля Т, тогда как у пациентов с хронической HDV-инфекцией чаще выявлялись генотипы, содержащие аллель С.

Таблица 1

**Распределение частоты генотипов и аллелей полиморфизма гена
IL-10 -1082 rs1800896**

Группа	Генотип / аллель	О	Е (HWE)	χ^2	р
Цирроз печени HDV-этиологии (n=35)	ТТ	0,69 (n=24)	0,71 (n=24,9)	1,03	0,31
	ТС	0,31 (n=11)	0,27 (n=9,3)		
	СС	0,00 (n=0)	0,02 (n=0,8)		
	Аллель Т	0,84 (n=59)			
	Аллель С	0,16 (n=11)			
Хроническая HDV-инфекция (n=35)	ТТ	0,43 (n=15)	0,41 (n=14,3)	0,36	0,55
	ТС	0,43 (n=15)	0,46 (n=16,1)		
	СС	0,14 (n=5)	0,13 (n=4,6)		
	Аллель Т	0,64 (n=45)			
	Аллель С	0,36 (n=25)			

С целью оценки ассоциации полиморфизма гена IL10 -1082C>T rs1800896 с прогрессированием HDV-инфекции был выполнен анализ с использованием различных генетических моделей наследования. Результаты сравнения пациентов с циррозом печени HDV-этиологии и хронической HDV-инфекцией представлены в таблице 2.

Таблица 2

**Анализ генетических моделей наследования полиморфизма гена IL10 -1082C>T rs1800896
(цирроз печени HDV-этиологии по сравнению с хронической HDV-инфекцией)**

Модель	Сравнение	ОШ	95% ДИ	р-значение
Аллельная	С против Т	2,95	1,32-6,55	0,011
Доминантная	ТС+СС против ТТ	2,27	1,01-5,10	0,048
Рецессивная	СС против ТТ+ТС	-	-	0,054

Как показано в таблице 2, для полиморфизма гена IL10 -1082C>T rs1800896 была выявлена статистически значимая ассоциация с прогрессированием HDV-инфекции в аллельной и доминантной моделях наследования. Аллель С и генотипы, его содержащие, встречались достоверно чаще у пациентов с хронической HDV-инфекцией, тогда как у пациентов с циррозом печени HDV-этиологии преобладал генотип ТТ. В рецессивной модели наследования отмечалась тенденция к ассоциации, однако её интерпретация ограничена отсутствием гомозиготного генотипа СС в группе пациентов с циррозом печени HDV-этиологии. Полученные результаты указывают на возможную ассоциацию аллеля С полиморфизма гена IL10 -1082C>T rs1800896 с более благоприятным течением HDV-инфекции, тогда как генотип ТТ может быть связан с повышенным риском прогрессирования заболевания до цирроза печени. С учётом ограниченного объёма выборки данные следует рассматривать как предварительные и требующие подтверждения в дальнейших исследованиях.

В рамках настоящего исследования дополнительно была проведена оценка концентрации IL-10 в сыворотке крови методом ИФА у пациентов с циррозом печени HDV-этиологии и хронической HDV-инфекцией. Медианный уровень IL-10 в группе пациентов с циррозом печени составил 15 пг/мл (межквартильный размах 15–108 пг/мл), тогда как в группе хронической HDV-инфекции медиана также составила 15 пг/мл (межквартильный размах 15–51 пг/мл). Статистически значимых различий концентрации IL-10 между исследуемыми клиническими группами выявлено не было ($p>0,05$).

С целью оценки возможного влияния генетического варианта на продукцию цитокина был проведён анализ концентрации IL-10 в зависимости от генотипа IL10 -1082C>T rs1800896 отдельно в каждой клинической группе. В группе пациентов с циррозом печени сравнение уровня IL-10 между генотипами ТТ и ТС IL10 -1082C>T rs1800896 не выявило статистически значимых различий ($p>0,05$). В группе пациентов с хронической HDV-инфекцией различий концентрации IL-10 между генотипами ТТ, ТС и СС IL10 -1082C>T rs1800896 также выявлено не было ($p>0,05$). Дополнительно-

ный анализ в доминантной модели (носители аллеля С - ТС+СС против ТТ) также не продемонстрировал статистически значимых различий уровня IL-10. Следовательно, в рамках настоящего исследования ассоциация полиморфизма гена IL10 –1082C>T rs1800896 с концентрацией циркулирующего IL-10 подтверждена не была.

Для оценки возможной роли данного генетического варианта в регуляции вирусной репликации был проведён анализ уровня HDV RNA. Анализ проводился среди пациентов с определяемой вирусной нагрузкой. Медианное значение HDV RNA в группе пациентов с циррозом печени составило 4,59 log10 копий/мл, тогда как в группе хронической HDV-инфекции - 3,98 log10 копий/мл. Несмотря на тенденцию к более высоким значениям в группе пациентов с циррозом печени, статистически значимых различий выявлено не было ($p>0,05$). При анализе распределения HDV RNA в зависимости от генотипа IL10 –1082C>T rs1800896 статистически значимых различий между вариантами генотипов ни в одной из клинических групп выявлено не было ($p>0,05$). Корреляционный анализ также не выявил значимой взаимосвязи между уровнем IL-10 и HDV RNA ($p>0,05$).

Таким образом, полиморфизм гена IL10 –1082C>T rs1800896 продемонстрировал ассоциацию с прогрессированием HDV-инфекции до цирроза печени. В то же время уровень IL-10 в сыворотке крови, а также показатели вирусной нагрузки HDV не показали статистически значимой связи с генотипами данного полиморфизма гена. Полученные результаты позволяют предположить, что влияние IL10 –1082C>T rs1800896 может реализовываться преимущественно через механизмы иммунной регуляции, не находящие прямого отражения в сывороточной концентрации цитокина или уровне вирусной репликации. Вместе с тем ограниченный объём выборки обуславливает необходимость осторожной интерпретации полученных данных и требует их подтверждения в исследованиях с большим числом наблюдений.

Список литературы:

1. Cao LN, Cheng SL, Liu W. IL10 rs1800896 polymorphism is associated with liver cirrhosis and chronic hepatitis B. *Genet Mol Res.* 2016 Feb 22;15(1). doi: 10.4238/gmr.15017256.
2. Huang Y, Gao B. Role of cytokines in hepatitis B and hepatitis D virus infection. *J Hepatol.* 2018;69(6):1254–1266. doi:10.1016/j.jhep.2018.07.002.
3. Khanam A, Ameer A, Mathur P, Yurdaydin C, Kottlilil S. Host Immune Response in Chronic Hepatitis Delta: Implications for Pathogenesis and Therapy. *Pathogens.* 2025 Aug 21;14(8):828. doi: 10.3390/pathogens14080828.
4. Turner D.M., Williams D.M., Sankaran D., Lazarus M., et al. An investigation of polymorphism in the interleukin-10 gene promoter // *Eur J Immunogenet.* – 1997. - 4(1). – P. 1-8. doi: 10.1111/j.1365-2370.1997.tb00001.x
5. Urban S., Neumann-Haefelin C., Lampertico P. Hepatitis D virus in 2021: virology, immunology and new treatment approaches for a difficult-to-treat disease // *Gut.* – 2021. – Vol. 70(9). – P. 1782-1794. doi: 10.1136/gutjnl-2020-323888.

Для цитирования: Ибадуллаева Н.С., Ходжаева М.Э., Хикматуллаева А.С., Кан Н.Г. Ассоциация полиморфизма гена IL10 –1082C>T rs1800896 с прогрессированием HDV-инфекции // *Вестник фундаментальной и клинической медицины.* – 2026. – № 4(24). – С. 193–196. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19479639>

LISTERIA MONOCYTOGENES КАК ЭТИОЛОГИЧЕСКИЙ АГЕНТ МЕНИНГИТА: РАЗБОР КЛИНИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ**Киселева В.В., Хмелевской В.И., Евдокимова В.А.**ФГБОУ ВО Курский государственный медицинский университет Минздрава России,
г. Курск, Российская ФедерацияОБУЗ Областная клиническая инфекционная больница имени Н.А. Семашко,
г. Курск, Российская Федерация

Резюме. В РФ заболеваемость листериозом официально регистрируется с 1992 года. В среднем фиксируется не более 100 случаев заболевания в год. Цель исследования выявить особенности клинического течения менингита, вызванного *Listeria monocytogenes* и подчеркнуть важность ранней дифференциальной диагностики среди других бактериальных менингитов. Авторами представлено клиническое наблюдение листериозного менингита, подтвержденного обнаружением возбудителя методом ПЦР спинномозговой жидкости. Правильная дифференциальная диагностика менингита как вирусного, так и бактериального типа, с учетом характерных особенностей анализа цереброспинальной жидкости, играет ключевую роль. Знание особенностей клинических и лабораторных признаков листериоза и вовремя начатая терапия являются критически важными для повышения эффективности профилактики и лечения этого опасного заболевания.

Ключевые слова. Листериоз, листериозный менингит, инфекционные болезни.

LISTERIA MONOCYTOGENES AS AN ETIOLOGICAL AGENT OF MENINGITIS: ANALYSIS OF A CLINICAL CASE**Kiseleva V.V., Khmelevskoy V.I., Evdokimova V.A.**Kursk State Medical University of the Ministry of Health of Russia, Kursk, Russian Federation
N.A. Semashko Regional Clinical Infectious Diseases Hospital, Kursk, Russian Federation

Resume. In Russia, listeriosis has been officially recorded since 1992. On average, no more than 100 cases are recorded per year. The aim of this study was to identify the clinical features of meningitis caused by *Listeria monocytogenes* and to highlight the importance of early differential diagnosis among other bacterial meningitis types. The authors present a clinical case of listeriosis meningitis, confirmed by detection of the pathogen using PCR in cerebrospinal fluid. Accurate differential diagnosis of both viral and bacterial meningitis, taking into account the characteristic features of cerebrospinal fluid analysis, is crucial. Understanding the clinical and laboratory features of listeriosis and promptly initiating therapy are critical to improving the effectiveness of prevention and treatment of this dangerous disease.

Keywords: Listeriosis, listerial meningitis, infectious diseases.

LISTERIA MONOCYTOGENES МЕНИНГИТНИНГ ЭТИОЛОГИК АГЕНТИ СИФАТИДА: КЛИНИК ҲОЛАТ ТАҲЛИЛИ**Киселёва В.В., Хмелевской В.И., Евдокимова В.А.**Россия Федерацияси Соғлиқни сақлаш вазирлиги хузуридаги Курск давлат тиббиёт университети,
Курск ш., Россия Федерацияси

Н.А.Семашко номидаги Вилоят клиник юқумли касалликлар шифохонаси, Курск ш., Россия Федерацияси

Резюме. Россия Федерациясида листериоз билан касалланиш 1992 йилдан бошлаб расман рўйхатга олина бошланган. Ўртача ҳисобда бир йилда 100 тадан ортиқ бўлмаган касалланиш ҳолатлари қайд этилади. Тадқиқотнинг мақсади *Listeria monocytogenes* чақирган менингитнинг клиник кечилиш хусусиятларини аниқлаш ва уни бошқа бактериал менингитлардан эрта дифференциал таъхислашнинг аҳамиятини кўрсатишдан иборат. Муаллифлар томонидан орқа мия суюқлигини ПЗР усули орқали текшириш натижасида қўзғатувчи аниқланган листериоз менингитининг клиник кузатуви тақдим этилган. Менингитни вирусли ва бактериал турларидан тўғри дифференциал таъхислаш, шунингдек, цереброспинал суюқлик таҳлиliga хос хусусиятларни ҳисобга олиш муҳим аҳамиятга эга. Листериознинг клиник ва лаборатория белгилари хусусиятларини билиш ҳамда даволашни ўз вақтида бошлаш касалликнинг профилактикаси ва даволаш самарадорлигини оширишда аҳамиятли.

Калим сўзлар: листериоз, листериозли менингит, юқумли касалликлар.

Введение. По данным Роспотребнадзора в Российской Федерации заболеваемость листериозом в течение последних лет находится на уровне единичных случаев - 0,07 на 100 тысяч населения. Однако вспышки этой инфекции нередко регистрируются в других странах мира. [1]

В РФ заболеваемость листериозом официально регистрируется с 1992 года. В среднем фиксируется не более 100 случаев заболевания в год.

Кроме того, в динамике отмечено увеличение числа тяжелых форм заболевания, летальные исходы в среднем за 10 лет фиксируются в среднем в 20% случаев. Обращает на себя внимание то, что летальные исходы регистрируются преимущественно у заболевших лиц пожилого возраста, а также у лиц с иммунодефицитными состояниями [2].

Цель исследования - проанализировать клиническое течения случая острого бактериального менингита, вызванного *Listeria monocytogenes*, а так же обосновать необходимость ранней дифференциальной диагностики бактериальных менингитов.

Материалы и методы. В статье представлен случай острого бактериального менингита, вызванного *Listeria monocytogenes*, подтвержденный обнаружением возбудителя методом ПЦР в спинномозговой жидкости.

Результаты и обсуждение. Клинический случай. Пациент Е., 76 лет, проживающий в городе Курске, почувствовал себя больным 01.04.24 когда появились головная боль, повторная рвота, не приносящая облегчения, повышение температуры до 38С, повышение АД до 200 мм.рт.ст. 02.04.2024 состояние ухудшилось, появилось нарушение сознания, продуктивному контакту не доступен. Бригадой СМП доставлен в областную клиническую инфекционную больницу имени Н.А.Семашко с предварительным диагнозом: острый менингит. ДЭП. Гипертоническая болезнь.

Доставлен на каталке, госпитализирован в отделение реанимации в тяжелом состоянии, t тела 38,5С. Тяжесть состояния обусловлена отеком - набуханием вещества головного мозга на фоне острого менингита. Уровень сознания – сопор. Шкала Глазго – 9 баллов. Менингеальные симптомы резко положительные (Кернига, Брудзинского, выраженная ригидность затылочных мышц). Кожные покровы бледно-розовые. Аускультативно дыхание в легких ослабленное везикулярное, выслушиваются крепитирующие хрипы по задней поверхности грудной клетки с двух сторон. ЧДД 28-30 в минуту. ЧСС=110 в мин. Тоны сердца приглушены, ритмичные, АД 130/80 мм рт.ст., живот мягкий безболезненный. Печень, селезенка не увеличена. При поступлении в анализе периферической крови отмечался лейкоцитоз до $14,6 \times 10^9/\text{л}$ ($4,0-9,0 \times 10^9/\text{л}$), ускорение СОЭ до 10мм/ч (2-15 мм/ч) [Таблица 1].

Таблица 1.

Динамика показателей анализа периферической крови

Показатель	Референтные значения	Дата						
		02.04.24	04.04.24	06.04.24	08.04.24	09.04.24	10.04.24	12.04.24
Гемоглобин г/л	122-127	184	189	153	153	140	136	147
Эритроциты, $\times 10^{12}/\text{л}$	4,0-9,0	5,25	5,0	4,4	4,6	4,4	4,0	4,2
Лейкоциты, $\times 10^9/\text{л}$	4,0-9,0	14,6	15,7	11,7	9,1	7,0	10,2	14,4
Палочкоядерные, %	1-6	8	8	9	7	4	6	3
Сегментоядерные, %	47-72	82	82	69	66	72	73	80
Эозинофилы, %	0,5-5	1	0	2	3	4	2	1
Лимфоциты, %	19-37	8	8	19	22	18	17	15
Моноциты, %	3-11	1	2	2	2	2	2	1
Тромбоциты, $\times 10^9/\text{л}$	180-320	264	295	310	270	330	290	448
СОЭ, мм/ч	2-15	10	12	11	19	22	20	31

В биохимическом анализе – значительное увеличение СРБ до 124 мг/л (10 мг/л), повышение АЛТ до 57 Ед/л (40 Ед/л), АСТ до 115 Ед/л (40 Ед/л) [Таблица 2]. Прокальцитонин – 32,86 нг/мл (0-0,1 нг/мл).

Таблица 2.

Динамика показателей биохимического анализа крови

Показатель	Референтные значения	Дата						
		02.04.24	04.04.24	06.04.24	08.04.24	09.04.24	10.04.24	12.04.24
Общий белок, г/л	66-68	81,7	68,0	55	56	53,7	55	58,3
АЛТ, Ед/л	До 40	59	34					
АСТ, Ед/л	До 40	115	48					
СРБ, мг/л	До 10	124	190	156	136	136	109	146
Глюкоза, ммоль/л	3,9-6,4	9,5		7,0	6,3			
Мочевина, ммоль/л	2,5-8,3	12,3	21,7	21,1	13,0	11,8	13,5	12,8
Креатинин, ммоль/л	44-124	120	170	200	79	100	107	120
Na, ммоль/л	136-145	136	138	153	158	56	148	140
K, ммоль/л	3,6-5,5	4,9	4,6	3,4	3,8	3,7	4,5	4,0

Учитывая тяжесть состояния больного, клинические данные описанные выше, выполнена люмбальная пункция. В спинномозговой жидкости отмечался цитоз до 256 клеток в 1мм³ (2-5 в 1мм³), лимфоциты – 31% (95-97%), нейтрофилы- 69% (3-5%), повышение белка до 6280г/л (0,16—0,33 г/л), глюкоза- 1,1 ммоль/л (2,78—3,89 ммоль/л), хлориды 114 ммоль/л (120—128 ммоль/л), выпала грубая пленка [Таблица 3].

Таблица 3.

Динамика показателей СМЖ

Показатель	Референтные значения	Дата	
		03.04.24	11.04.24
Цвет	Бесцветная	Розовый	Желтый
Прозрачность	Прозрачная	Мутная	Слабо-мутная
Цитоз, кл.в мкл	2-5	256	285
Нейтрофилы, %	3-5	69	40
Лимфоциты, %	95-97	31	60
Белок, мг/л	0,16-0,33	6280	2870
Глюкоза, ммоль/л	2,78-3,89	1,1	3,6
Хлориды, ммоль/л	120-128	114	113
Пленка	Отсутствует	Грубая	Нежная

При проведении ПЦР исследования ликвора на менингококк, пневмококк, гемофильную палочку, ДНК к вирусу Эпштейна-Барр, цитомегаловирус, герпесвирус 6 типа, вирус простого герпеса получены отрицательные результаты.

Бактериологическое исследование СМЖ на менингококк, ДНК-метициллин-резистентный золотистый стафилококк, ДНК-метициллин-чувствительный золотистый стафилококк, ДНК-метициллин-резистентный коагулазонегативный золотистый стафилококк - отрицательно

Антитела к вирусам гепатитов В, С, ВИЧ – не обнаружены.

Мультиспиральная компьютерная томография головного мозга: картина очаговых изменений обоих полушарий головного мозга – очаги хронической ишемии; наружно-внутренняя заместительная гидроцефалия, без признаков гипертензии. Электрокардиография: синусовая аритмия.

05.04.2024 у больного отрицательная динамика. Состояние крайне тяжелое. Угнетение ЦНС по шкале Глазго 8-9 баллов. Уровень сознания – ступор (сопор – кома). Пациент переведен на ИВЛ. Температура 36,5 С. Судорог нет, мышечная гипотония. Аускультативно дыхание в легких ослаблен-

ное везикулярное, ЧСС 78 в мин. АД 90/60 мм рт. ст. Все последующие дни состояние больного крайне тяжелое без положительной динамики.

Учитывая отсутствие положительно динамики, отрицательные результаты ПЦР на вышеперечисленные возбудители, было решено произвести контрольное исследование ликвора и ПЦР диагностику на листериоз. Результаты : в СМЖ белок 2870мг/л (0,16—0,33 г/л), глюкоза 3,6 ммоль/л (2,78—3,89 ммоль/л), хлориды 113 ммоль/л (120—128 ммоль/л), цитоз 285 клеток в 1мм³ (2-5 в 1мм³), лимфоциты 60% (95-97%), нейтрофилы 40% (3-5%), выпала нежная пленка [Таблица 3]. При бактериологическом исследовании ликвора выделена ДНК листерии.

13.04.2024 состояние больного крайне тяжелое с отрицательной динамикой на фоне проводимой ИВЛ нарушения ритма (брадикардия, сменяющаяся тахикардией), снижение АД 60/30 мм рт. ст. без реакции на норадреналин. В 5:50 на фоне прогрессирующей брадикардии (55-42-30 в мин.) - асистолия. Тоны сердца не определяются, пульсации на центральных сосудах нет. На ЭКГ мониторе изолиния. Начаты реанимационные мероприятия: ИВЛ, непрямой массаж сердца, в/в введение адреналина. После 15 минут проведения реанимационных мероприятий эффекта нет. Продолжено СЛР в течение 30 минут, неэффективно. В 6:20 констатирована биологическая смерть.

По клиническим признакам листериозный менингит не отличается от бактериальных менингитов другой этиологии. СМЖ реже имеет нейтрофильный состав, но со значительным содержанием лимфоцитов (до 20-30%). Этот факт заслуживает особого внимания клиницистов, так как лимфоцитарный плеоцитоз обычно дает основания предполагать вирусную этиологию менингита и не назначать антибактериальную терапию, которая, безусловно, показана при менингите листериозной этиологии. Даже на фоне антибактериальной терапии часто развивается ОНГМ с дислокацией ствола. Летальность – до 90%.

Выводы. Листериоз остается актуальной проблемой здравоохранения. Правильная дифференциальная диагностика менингита как вирусного, так и бактериального типа, с учетом характерных особенностей цереброспинальной жидкости, особенно лимфоцитарного плеоцитоза при листериозе, играет ключевую роль. Ранняя и точная диагностика позволяет своевременно начать целенаправленное лечение, что особенно важно в свете сложностей, связанных с диагностикой и угрозой тяжелых последствий. Таким образом, знание особенности клинических и лабораторных признаков листериоза и вовремя начатая терапия являются критически важными для повышения эффективности профилактики и лечения этого опасного заболевания.

Список литературы:

1. Груздева О.А., Тартаковский И.С., Малеев В.В., Сайтгареев Р.Ш., Кормилицина В.Г., Шарапченко С.О., Кисиль О.В., Габриэлян Н.И. *Listeria monocytogenes* сегодня // Российский медицинский журнал. 2021. Т. 27, № 5. С. 491-500. DOI: <http://doi.org/10.17816/0869-2106-2021-27-5-491-500>
2. <https://sescao.ru/listeria-monocytogenes-segodnya/>

Для цитирования: Киселева В.В., Хмелевской В.И., Евдокимова В.А. *Listeria monocytogenes* как этиологический агент менингита: разбор клинического случая // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 4(24). – С. 197–200. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19479740>

**РОЛЬ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В СИСТЕМЕ ДОПРИЗЫВНОЙ ПОДГОТОВКИ:
АНАЛИЗ ГОТОВНОСТИ К РАБОТЕ С ПОДРОСТКАМИ И ВОСПРИЯТИЯ ИХ ЗДОРОВЬЯ**

Атоева М.А.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Целью исследования явилось оценка готовности педагогов общеобразовательных учреждений к работе в системе допризывной подготовки, их оценку состояния здоровья допризывной молодёжи, а также уровень их взаимодействия с медицинскими структурами. Установлено, что выявленные пробелы в подготовке педагогических кадров и недостаточное межведомственное взаимодействие указывают на необходимость системных мер по укреплению роли образования в системе допризывной подготовки подростков.

Ключевые слова: допризывная подготовка, педагоги, здоровье подростков, школьное здравоохранение.

**THE ROLE OF TEACHING STAFF IN THE PRE-CONSCRIPTION TRAINING SYSTEM:
ANALYSIS OF WILLINGNESS TO WORK WITH ADOLESCENTS AND PERCEPTION OF
THEIR HEALTH**

Atoeva M.A.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. The purpose of the study: to assess the readiness of teachers of educational institutions to work in the pre-conscription training system, their assessment of the health status of pre-conscription youth, as well as the level of their interaction with medical structures and military commissariats. The identified gaps in the training of teaching staff and insufficient interagency cooperation indicate the need for systematic measures to strengthen the role of education in the pre-conscription training system.

Keywords: pre-conscription training, teachers, adolescent health, school healthcare.

**ХАРБИЙ ЧАҚИРУВГАЧА ТАЙЁРГАРЛИК ТИЗИМИДА ПЕДАГОГЛАР ЎРНИ: ЎСМИРЛАР
БИЛАН ИШЛАШГА ТАЙЁРГАРЛИК ТАҲЛИЛИ ВА УЛАРНИНГ САЛОМАТЛИГИ**

Атоева М.А.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Тадқиқотдан қўзланган мақсад умумтаълим муассасалари ўқитувчиларининг чақирувгача бўлган тайёргарлик тизимида ишлашга тайёргарлигини баҳолаш, уларнинг чақирувгача бўлган ёшларнинг соғлиги ҳолати, тиббиёт тузилмалари билан ўзаро муносабатлари даражасини баҳолашдан иборат эди. Педагогик кадрлар тайёрлашда аниқланган камчиликлар ва идоралараро ҳамкорликнинг етарли даражада йўқлиги ўсмирларни чақирувгача бўлган тайёрлаш тизимида таълим-тарбия ролини кучайтириш бўйича тизимли чора-тадбирлар зарурлигини кўрсатиши аниқланди.

Калит сўзлар: чақирувдан олдинги тайёргарлик, ўқитувчилар, ўсмирлар саломатлиги, мактабда соғлиқни сақлаш.

e-mail: atoyeva.mashhura@bsmi.uz

Допризывная подготовка представляет собой комплекс мер, направленных на подготовку молодёжи к военной службе, включая физическую подготовку, патриотическое воспитание и формирование ответственного отношения к своему здоровью [1]. В условиях глобального ухудшения показателей здоровья подростков, констатируемого Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), роль системы допризывной подготовки приобретает особое значение для обеспечения обороноспособности государства [2].

Педагоги общеобразовательных учреждений играют ключевую роль в системе допризывной подготовки как постоянные наставники, оказывающие ежедневное влияние на формирование ценностных ориентаций и поведенческих установок допризывной молодёжи [3]. Международные исследования подчёркивают значимость подготовки педагогических кадров для эффективной реализации программ допризывной подготовки [4,5].

В Республике Узбекистан допризывная подготовка регулируется законодательством о воинской обязанности [1]. Однако вопросы подготовки педагогических кадров к работе с допризывниками и их взаимодействия с медицинскими структурами остаются недостаточно изученными.

Таким образом актуальность настоящего исследования обусловлена необходимостью получения объективных данных о готовности педагогических кадров к участию в допризывной подготовке для разработки научно обоснованных подходов к её совершенствованию.

Цель исследования: оценить готовность педагогов общеобразовательных учреждений к участию в системе допризывной подготовки, их оценку состояния здоровья допризывной молодёжи, а также уровень их взаимодействия с медицинскими структурами и военными комиссариатами.

Задачи исследования:

- Охарактеризовать структуру педагогических кадров по стажу работы с допризывниками и уровню их подготовки.
- Оценить восприятие педагогами состояния здоровья допризывной молодёжи и его динамики.
- Изучить уровень взаимодействия педагогов с медицинскими работниками в образовательных учреждениях.
- Выявить статистически значимые зависимости между характеристиками педагогов и их оценками состояния здоровья подростков.

Дизайн исследования. Проведено одноэтапное поперечное исследование (cross-sectional study) в период с ноября 2024 г. по январь 2025 г. среди педагогов общеобразовательных учреждений г. Бухары и Бухарской области, работающих с юношами 15–18 лет.

Критерии включения:

- работа в общеобразовательном учреждении с классами 9-11;
- непосредственный контакт с допризывниками (15-18 лет) в течение учебного года; добровольное согласие на участие в исследовании.

Критерии исключения:

- административные работники без педагогической нагрузки;
- отказ от заполнения анкеты.

Объём выборки рассчитан с использованием формулы для оценки доли при заданной точности [6]. Расчётный объём выборки составил 96 человек. Фактически в исследование включены 117 педагогов, что превышает расчётный объём.

Использована анкета, разработанная на основе методологии Европейского бюро ВОЗ для мониторинга здоровья школьников (HBSC) [7] и адаптированная для оценки готовности педагогов к работе с допризывниками. Анкета включала 19 вопросов, сгруппированных в 5 блоков:

- профессиональные характеристики педагога;
- оценка состояния здоровья подростков;
- медицинское обеспечение в школе;
- взаимодействие и наблюдения;
- мнения и предложения.

Статистический анализ выполнен с использованием пакета Python 3.10 (библиотеки pandas 2.0.3, scipy 1.11.1). Уровень статистической значимости принят за $p < 0.05$.

Описательная статистика для категориальных переменных включала определение абсолютных частот (n) и относительных частот (%); для порядковых переменных - медианы (Me), 25-й и 75-й перцентилей.

Для анализа ассоциаций между двумя категориальными переменными использован χ^2 -тест Пирсона. При ожидаемых частотах < 5 в более чем 20% ячеек применён точный тест Фишера. Для количественной оценки силы ассоциации рассчитаны отношения шансов (ОШ) с 95% доверительными интервалами (ДИ). Для анализа корреляций между порядковыми переменными применён коэффициент ранговой корреляции Спирмена (ρ).

Результаты анализа. Структура педагогических кадров. Выборка была представлена педагогами с различным стажем работы с допризывниками (табл.1). Наиболее многочисленными группами были педагоги со стажем 1-5 лет (21.8%) и 6 -10 лет (19.7%). Педагоги с большим стажем (21+ лет) составили 20.2% выборки.

Анализ уровня подготовки педагогов к работе с допризывниками выявил значительные проблемы в системе повышения квалификации.

Таблица 1.

Стаж работы педагогов с допризывниками 15-18 лет

Стаж работы	%
1-5 лет	21.8
6-10 лет	19.7
11-15 лет	14.5
16-20 лет	13.0
21-25 лет	10.9
26-30 лет	9.8
31-35 лет	7.8
36+ лет	2.6

Только 43.0% педагогов проходили обучение по физиологии подросткового возраста в течение последних 3 лет. 24.9% никогда не проходили такого обучения. 44.0% педагогов проходили обучение по медицинскому обеспечению военной подготовки в течение последних 3 лет. 29.5% никогда не проходили обучения по данной теме.

Таблица 2.

Частота повышения квалификации педагогов (5 - балльная шкала: 1 = никогда, 5 = регулярно)

Вид обучения	(никогда)	(давно)	(недавно)	Сумма кодов 4-5 (%)
Физиология подростков	(24.9%)	(32.1%)	(43.0%)	43.0%
Медицинское обеспечение военной подготовки	(29.5%)	(26.4%)	(44.0%)	44.0%

Статистически значимая зависимость выявлена между стажем работы педагога и частотой повышения квалификации по физиологии подростков ($\chi^2=14.28$, $p=0.006$). Педагоги из группы со стажем 1-10 лет в 2.3 раза чаще проходят обучение по данной теме по сравнению с коллегами из группы со стажем 21+ лет (ОШ=2.3, 95% ДИ: 1.3-4.1). Педагоги демонстрируют умеренно негативную оценку состояния здоровья допризывной молодёжи (табл.3).

Только 50.2% педагогов оценивают здоровье допризывников как «очень хорошее» или «хорошее». 21.2% оценивают его как «плохое» или «очень плохое». 31.6% педагогов отмечают ухудшение здоровья подростков за последние 3 года, 8.3% - улучшение.

Статистически значимая зависимость выявлена между стажем работы педагога и оценкой здоровья допризывников ($\chi^2=8.76$, $p=0.012$). Педагоги с большим стажем работы (≥ 15 лет) в 2.5 раза чаще оценивают здоровье допризывников как «плохое» или «очень плохое» по сравнению с менее опытными коллегами (ОШ=2.5, 95% ДИ: 1.2-5.1). Медицинское обеспечение в образовательных учреждениях требует улучшения (табл. 3). 82.4% педагогов подтвердили наличие медицинского работника в их школе. Однако только 68.9% отмечают активное участие медработника в санитарно-просветительской работе с подростками. 76.2% педагогов лично проводят беседы с подростками о здоровом образе жизни и профилактике вредных привычек.

Таблица 3.

Аспекты медицинского обеспечения в учебных заведениях

Показатель	Да	Нет	Затрудняюсь ответить
Медицинский работник в школе	(82.4%)	(12.4%)	(5.2%)
Участие медработника в профилактике	(68.9%)	(24.9%)	(6.2%)
Личное участие педагога в профилактике	(76.2%)	(18.7%)	(5.2%)

Статистически значимая зависимость выявлена между наличием активно работающего медперсонала и оценкой динамики здоровья подростков ($\chi^2=7.92$, $p=0.019$). В школах с активным медперсоналом педагоги реже отмечают ухудшение здоровья подростков за 3 года (24.3% против 41.7%).

Взаимодействие с военными структурами педагоги оценивают как недостаточное. Только 38.3% педагогов оценивают уровень сотрудничества с военкоматом как «высокий» или «очень высокий». 42.5% оценивают его как «средний», 19.2% - как «низкий» или «очень низкий».

Наблюдение буллинга/издевательств среди подростков подтвердили 64.8% педагогов. Конфликтные ситуации с подростками наблюдали 78.2% педагогов. Выявленные зависимости и корреляции раскрывают «тонкие» механизмы влияния факторов друг на друга.

Так корреляционный анализ Спирмена выявил следующие статистически значимые взаимосвязи ($p < 0.05$):

- Стаж работы ↔ Оценка здоровья: $\rho = +0.31$, $p = 0.003$. Чем больше стаж - тем хуже оценка здоровья допризывников.

- Обучение по физиологии ↔ Личное участие в профилактике: $\rho = +0.38$, $p < 0.001$. Педагоги, прошедшие обучение, чаще проводят профилактические беседы.

- Наличие медработника ↔ Оценка динамики здоровья: $\rho = -0.29$, $p = 0.007$. Наличие активного медперсонала ассоциировано с более позитивной оценкой динамики здоровья.

Заключение и выводы. Выявленная структура педагогических кадров характеризуется относительно молодым составом: 41.5% педагогов имеют стаж работы с допризывниками менее 10 лет. Данная тенденция может отражать общую ситуацию в системе образования региона, связанную с обновлением кадрового состава.

К негативным факторам можно отнести выявленный пробел в системе повышения квалификации: менее половины педагогов (56.0-57.0%) не проходили обучение по ключевым темам допризывной подготовки в течение последних 3 лет. Особенно тревожным является тот факт, что 24.9-29.5% педагогов никогда не проходили обучения по физиологии подросткового возраста и медицинскому обеспечению военной подготовки. В условиях быстрых изменений в подростковой среде недостаточная подготовка педагогов может ограничивать их эффективность в работе с допризывниками.

Консолидированная негативная оценка здоровья допризывников (21.2% оценивают как плохое/очень плохое, 31.6% отмечают ухудшение за 3 года) требует адекватной интерпретации. Выявленная зависимость между стажем работы педагога и негативной оценкой здоровья ($\chi^2 = 8.76$, $p = 0.012$) может отражать как объективное ухудшение здоровья подростков, так и более критичный взгляд опытных педагогов, обладающих глубокими знаниями возрастных нормативов. Для дифференциации этих факторов необходимы дальнейшие исследования с использованием объективных показателей здоровья подростков.

Положительным фактором является выявленная связь между наличием активно работающего медперсонала в школе и более позитивной оценкой динамики здоровья подростков ($\chi^2 = 7.92$, $p = 0.019$). Данный результат согласуется с данными исследований в других странах, демонстрирующих преимущества интеграции школьного здравоохранения и образовательного процесса для улучшения здоровья подростков [8].

Низкий уровень сотрудничества педагогов с военкоматом (только 38.3% оценивают его как высокий) указывает на необходимость усиления межведомственного взаимодействия. Отсутствие регулярного контакта между педагогами и военными структурами может негативно влиять на формирование у подростков достоверных представлений о военной службе.

Практические рекомендации. Полученные данные обуславливают необходимость разработки и внедрения обязательной программы повышения квалификации педагогов по вопросам допризывной подготовки с фокусом на физиологию подросткового возраста и медицинские аспекты военной службы.

Следует также усилить взаимодействие между образовательными учреждениями и военными комиссариатами путём организации регулярных совместных мероприятий и обмена информацией.

Требуется обеспечить систематическое участие школьных медицинских работников в профилактических программах с допризывниками и регулярное информирование педагогов о состоянии здоровья подростков, а также создать методические материалы для педагогов по вопросам допризывной подготовки с учётом возрастных особенностей подростков 15-18 лет [9,10].

Список литературы:

1. Закон Республики Узбекистан «О всеобщей воинской обязанности и военной службе» от 15 сентября 2021 г. № ЗРУ-714. Ташкент: Национальная база законодательства Республики Узбекистан.	Доступно по: https://lex.uz/ru/docs/5343084 .
2. World Health Organization. Health for the world's adolescents: a second chance in the second decade. Geneva: WHO; 2014. 78 p.	

3. Patton GC, Sawyer SM, Santelli JS, et al. Our future: a Lancet commission on adolescent health and wellbeing. *Lancet*. 2016;387(10036):2423–2478. doi:10.1016/S0140-6736(16)00579-1.
4. Inchley J, Currie D, Young T, et al., editors. Growing up unequal: gender and socioeconomic differences in young people's health and wellbeing. Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) study: international report from the 2013/2014 survey. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe; 2016. 292 p. (Health Policy for Children and Adolescents, No. 7).
5. Viner RM, Ozer EM, Denny S, et al. Adolescence and the social determinants of health. *Lancet*. 2012;379(9826):1641–1652. doi:10.1016/S0140-6736(12)60149-4.
6. Lwanga SK, Lemeshow S. Sample size determination in health studies: a practical manual. Geneva: World Health Organization; 1991. 48 p.
7. Currie C, Inchley J, Molcho M, et al. Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) Study Protocol: background, methodology and mandatory items. Edinburgh: CAHRU; 2014. 112 p. Available from: <https://www.hbsc.org/methods/>.
8. Langford R, Bonell C, Jones H, et al. The WHO Health Promoting School framework for improving the health and well-being of students and their academic achievement. *Cochrane Database Syst Rev*. 2014;(12):CD008958. doi:10.1002/14651858.CD008958.pub2.
9. Амлаев К.Р., Марков Р.А. Самооценка личного здоровья юношей СК // Кубанский научный медицинский вестник. – 2016. – № 3 (158). – С.10-15.
10. Марков Р.А., Амлаев К.Р. Состояние здоровья юношей допризывного возраста // Астраханский медицинский журнал. – 2016. – Т. 11. – № 3. – С. 44-53.

Для цитирования: Атоева М.А. Роль педагогических кадров в системе допризывной подготовки: анализ готовности к работе с подростками и восприятия их здоровья // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 4(24). – С. 201–205. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19480293>

I-ТИП ҚАНДЛИ ДИАБЕТДА СЕМИРИШ ПАТОФИЗИОЛОГИЯСИ**Абдирашидова Г.А., Жабборова Г.С.**

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Ҳозирги даврда семириш кўп факторли метаболик дисфункциялар билан тавсифланган паст даражадаги сурункали яллиғланиш касаллиги бўлиб, катталар ва болалар саломатлиги учун жиддий глобал таҳдиддир. Қандли диабетнинг I-типи озгин одамларнинг касаллиги деган фикр ҳозирда ўз аҳамиятини йўқотиб бормоқда. Ошиб бораётган эпидемиологик далиллар энди I-тип диабет ва кейин семиришнинг ривожланиши ёки аксинча боғлиқликини аниқлайди. I-тип диабетга хос бўлган семиришга олиб келувчи муҳитлар оқимининг таъсиридан ташиқари, биопсихосоциал зўриқишлар янада семириш эҳтимолини оширади. Семириш ва инсулинга қарамликнинг кучайиши ўртасидаги муносабатлар иллатли халқани ҳосил қилади. Ушбу аҳоли қатлами учун вазни бошқариш бўйича кўрсатмалар ва меъёрий тасдиқлар бўлмаса, тиббиёт ходимлари фойда ва хавф ўртасида нозик мувозанатни сақлашлари керак. Ушбу вазиятнинг оғирлиги ушбу мавзунини биринчи ўринга олиб чиқиш муҳимлигини таъкидлайди.

Калим сўзлар: қандли диабет, семириш, болалар, тана масса индекси

PATHOPHYSIOLOGY OF OBESITY IN TYPE I SUGAR DIABETES**Abdirashidova G.A., Jabborova G.S.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Currently, obesity is a low-grade chronic inflammatory disease characterized by multifactorial metabolic disorders, posing a serious global threat to the health of adults and children. The idea that type 1 diabetes mellitus is a disease of thin people is currently losing its significance. The increasing epidemiological data now reveal a link between the development of type 1 diabetes and obesity, or vice versa. In addition to the influence of environmental flow leading to obesity characteristic of type 1 diabetes, biopsychosocial tension increases the likelihood of further obesity. The relationship between obesity and increased insulin dependence forms a vicious circle. In the absence of guidelines and regulatory approvals for weight control for this segment of the population, healthcare workers must maintain a fine balance between benefits and risks. The severity of this situation underscores the importance of prioritizing this topic.

Keywords: diabetes mellitus, obesity, children, body mass index

ПАТОФИЗИОЛОГИЯ ОЖИРЕНИЯ ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ I ТИПА**Абдирашидова Г.А., Жабборова Г.С.**

Самарқандский государственный медицинский университет, г. Самарқанд, Узбекистан


Резюме. В настоящее время ожирение - это хроническое воспалительное заболевание низкой степени тяжести, характеризующееся многофакторными метаболическими дисфункциями, представляющее серьезную глобальную угрозу для здоровья взрослых и детей. Идея о том, что сахарный диабет I типа является заболеванием худых людей, в настоящее время теряет свое значение. Растущие эпидемиологические данные теперь выявляют связь между развитием диабета I типа и ожирением, или наоборот. Помимо влияния потока окружающей среды, приводящего к ожирению, характерному для диабета I типа, биопсихосоциальное напряжение увеличивает вероятность дальнейшего ожирения. Взаимосвязь между ожирением и повышенной зависимостью от инсулина образует порочный круг. При отсутствии руководств и нормативных утверждений по контролю веса для данного слоя населения медицинские работники должны поддерживать тонкий баланс между выгодой и риском. Тяжесть этой ситуации подчеркивает важность выдвижения этой темы на первый план.

Ключевые слова: сахарный диабет, ожирение, дети, индекс массы тела

Семизликнинг глобал тарқалиши 1975 йилдан бери қарийб уч баробар ошди ва 2019 йилда тахминан беш миллион одам диабет каби касалликлар туфайли вафот этди [WHO, 2023; Chong B, Jayabaskaran J, Kong G, 2023]. 1980 йилдан бери диабет касаллиги тўрт баробар кўпайиб, эрта ўлимнинг асосий сабабига айланди [NCD-RisC, 2016]. Қўшма Штатларда I-тип диабет (1TD)

катталардаги диабетнинг барча ҳолатларининг тахминан 5,6% ни ташкил қилади [Xu G, Liu B, Sun Y, 2018]. Тарихан, 1ТД озғин шахслар орасида устун бўлган фенотип сифатида тавсифланган, аммо ҳозирда аутоиммун жараёндан ташқари омиллар таъсир кўрсатиши аниқланди [Van der Schueren B, Ellis D, 2021]. 1ТД тарқалиши бутун дунё бўйлаб 2021 йилдаги 3,7 миллиондан 2040 йилда ~ 13,5–17,4 миллионгача ошиши кутилмоқда [Gregory GA, Robinson TI, 2022]. Семириш туфайли ошқозон ости беи β-хужайраларининг тез парчаланиши ижтимоий-иқтисодий ва диета ўзгаришлар тезлашиши шароитида яққол намоён бўлади. 2-тип диабет (2ТД) контекстида клиник ёрдам амалиётида трансформатив ўзгаришлар юз бермоқда, биринчи навбатда, 2ТДМ ва семиришни самарали ҳал қилиш учун инқилобий қадам сифатида икки марта вазн йўқотишни амалга оширишга қаратилган [Lingvay I, Sumithran P, 2022]. Бирок, 1ТД билан оғриган беморларда оптимал гликемик назоратга эришишда семиришни даволаш билан боғлиқ қийинчиликлар ва тавсияларнинг йўқлиги ютуқлар салмоғини камайтирди.

Семириш энергияга бой озиқ-овқатлар оқими ва ҳаракатсиз турмуш тарзига мойиллик билан тавсифланиб, айнан ҳаракатсиз турмуш тарзи семиришнинг кучайиши ортидаги ҳаракатлантирувчи куч сифатида кенг эътироф этилган [Swinburn BA, Sacks G, Hall KD, 2011]. Шунингдек, семиришнинг генетик, сиёсий (саноат таъсири, субоптимал тартибга солиш), ижтимоий-иқтисодий (масалан, тенгсизлик, озиқ-овқат хавфсизлиги йўқлиги) ва маданий (масалан, стигматизация, қўллаб-қувватлаш етишмаслиги) омиллар билан боғлиқлиги кенг таъкидланган [Swinburn BA, Sacks G, Hall KD, 2011]. 1ТД да семиришга ҳисса қўшадиган ўзгарувчилар 1-расмда умумлаштирилган.



1-расм. 1-тип қандли диабетда семиришнинг пайдо бўлиши

Биринчидан, 1ТД патогенезида семиришнинг етарли даражада тушунилмаганлиги сақланиб қолмоқда, бу эса самарали олдини олиш ва даволаш стратегияларига тўсқинлик қилиши мумкин. 1ТД ривожланиши турли йўллар бўйлаб содир бўлади, бу аутоиммун жараён ва инсулинга бўлган эҳтиёж билан боғлиқ ташқи стресс омилларининг ўзаро таъсири билан тавсифланади [Van der Schueren B, Ellis D, Faradji RN, 2021]. Бизнинг бу муносабатларни тушунишимиз асосан 2001 йилда таклиф қилинган “тезлаштирувчи гипотеза” га боғлиқ бўлиб, у болалик даврида ҳам 1ТД, ҳам 2ТД

бошланишининг асоси бўлган инсулин резистентлигининг умумий патогенезига тўғри бериши [Wilkin T., 2001]. Ушбу назария сўнгги йигирма йил ичида шубҳа остига олинмоқда, ҳам тасдиқланмоқда. Полшада ўтказилган ретроспектив тадқиқот ($n = 559$, ёши <14 ёш) семиришнинг ортиб бориши 1ТД билан касалланишнинг кўпайишини тушунтиради деган фикрни шубҳа остига қўйди, чунки вақт ўтиши билан ташхис қўйилган болалар орасида ТМЙнинг мос равишда ортиши кузатилмаган [Wasyl-Nawrot B, Wójcik M, Nazim J, 2020]. Бироқ, Полшада ўтказилган яна бир тадқиқот шуни кўрсатдики, 1ТД бошланишида юқори ТМЙ β -хужайраларнинг йўқолишини тезлаштиради ва С-пептид даражасидан мустақил равишда яллиғланиш ситокинларини оширади [Kurpiewska E, Cieżki S, 2023]. Препарат тадқиқотларда иммун бўлмаган диабетнинг юқори ёғли диетага асосланган сичқонча модели диабетнинг β -хужайра мўртлигидан келиб чиқиши мумкинлигини кўрсатди [Dooley J, Tian L, Schonefeldt S, 2016]. Бу мўртлик оролчалар ичида глюкоксиклиги ва липотоксиклигига олиб келиши мумкин, бу касалликнинг патофизиологиясига ёрдам беради [Wilkin T., 2001; Dooley J, Tian L, Schonefeldt S, 2016].

Мультиомика маълумотлари молекуляр сигнатуранинг ўзаро боғлиқлиги ҳақидаги тушунчани кенгайтирди. Метаболизм тадқиқотлар шуни кўрсатдики, 1ТД ва 2ТД ўртасида бири-бири билан кесишувчи метаболит йўллари бор, бу тармоқланган занжирли ва ароматик аминокислоталар, глутамин цикли, гликолиз ва триглицеридлар метаболизмининг кучайиши билан тасдиқланади [Izundegui DG, Nayor M., 2022]. Ёғ массаси ва семириш (FTO) гени 1ТД да семиришни башорат қилишда иштирок этади, бу унинг генетик тестдаги потенциал ролини кўрсатади [Corbin K.D., Driscoll K.A., 2018]. 1ТД (1b тури) бўлган аутоиммун бўлмаган беморлар орасида GWAS тадқиқоти ўн учта янги локусни аниқлади, улардан тўққизтаси семириш билан боғлиқ [Qu J, Qu H-Q, Bradfield JP, 2021]. Альфа-1,2-глюкозилтрансфераза (ALG10), калнейрон 1 (CALN1), EPH B4 рецепторлари (EPHB4), ядро омили IB (NFIB) ва тиоредоксин (TXN) бу локусларни ифодаловчи генлар қаторига киради [Qu J, Qu H-Q, Bradfield JP, 2021]. Аутоиммун (яъни, 1a-тур) диабетда потенциал конвергенция учун турли когорталарни ўрганиш қизиқарли бўлади. 21 та тадқиқотнинг мета-таҳлили шуни кўрсатдики, диабет ёки семириш билан оғриган биринчи даражали қариндошларда болалик даврида 1ТД ривожланишининг хавфи юқори бўлади. Оддий вазни она билан солиштирганда, семиз онанинг фарзандида болалик даврида 1ТД ривожланиш хавфи ортади, нисбий хавф (HX) 1,3 [Hidayat K, Zou SY, Shi BM., 2019]. Қизиги шундаки, 1ТД билан оғриган отадан болаларга 1ТД ни ўтиш хавфи онага қараганда 1,5 баробар юқори [Hidayat K, Zou SY, Shi BM., 2019]. Ота-оналарнинг таъсиридаги бу номуносабатлик, айниқса, инсон лейкоцитлар антигени ва инсулин резистентлигининг генетик ролини қўшимча ўрганишни талаб қилади. TEENDIAB когорти ($n = 610$) таҳлили шуни кўрсатдики, онасида 1ТД бўлган авлодлар диабетли бўлмаган оналар авлоди билан солиштирганда болалик даврида абдоминал семириш эҳтимоли икки баробар кўп бўлган. Бироқ, метаболизм профили сабаб-оқибат муносабатларини тушунтира олмади. Бироқ, онанинг 1ТД касаллиги болалик давридаги семириш хавфи юқорилиги билан боғлиқ бўлган икки томонлама ассоциация аниқланди [Pitchika A, Jolink M, Winkler C, 2018]. Умуман олганда, 1ТД ва семириш / 2ТД ўртасида боғлиқлик мавжудлиги аниқ; метаболик дисфункция аутоиммунитетнинг натижасими ёки аксинча, аниқлик киритишни талаб қилади.

Иккинчидан, семиришни даволаш 1ТД учун даволаш стандарти, интенсив инсулин терапияси билан асоратланади, бу парадоксал равишда килограмм ортишига олиб келади ва вазни назорат қилиш мақсадларига эришиш учун қийин дилемма яратади [Nathan D, Genuth S, Lachin J, 1993]. Бундай ҳодиса инсулин билан боғлиқ экзоген физиологик ўзгаришлар (масалан, инсулиннинг периферик ва жигарда тақсимланиши ва калорияларни сақлаш ўртасидаги номуносабатлик) ва гипогликемияни олдини олиш учун психологик мослашувлар ўртасидаги динамик ўзаро таъсирни ўз ичига олади [Conway B, Miller RG, 2010; Van der Schueren B, Ellis D, Faradji RN, 2021]. Гипогликемия кўркуви 1ТД билан яшовчи одамлар учун жисмоний машқлар қилиш учун қўшимча тўсиқ бўлиб, 1ТД билан касалланган катталарнинг катта қисми тавсия этилган даражаларга эриша олмайди [Beattie CS, Jesse A, Heinrich K., 2021]. Углеводларни ортиқча истеъмол қилишга ҳам худди шундай ташвиш сабаб бўлади. Ўз тенгдошлари билан солиштирганда, 1ТД бўлган ўсмирлар тенгдошларига қараганда овқатланиш бузилиши ва тартибсиз овқатланиш даражаси юқори бўлади [Young V, Eiser C, Johnson B, 2013]. Узоқ муддатли мажбуриятлар ва гипогликемия ҳақида доимий ташвиш озиқ-овқатга соғлом муносабатларни сақлаб қолишни қийинлаштириши мумкин. Натижада, семиришнинг ривожланиши инсулин резистентлигига олиб келади, бу эса кўпроқ инсулинни киритишни талаб қилади. Бу қийин вазият яратади, чунки инсулин дозасини ошириш килограмм ортишини янада ёмонлаштириши мумкин [Van der Schueren B, Ellis D, Faradji RN, 2021].

Учинчидан, 1ТД да саломатликдаги номуносабатлик ногиронликка мослаштирилган ҳаёт

йилларида (DALYs) ҳал қилинмаган бўшлиқлар билан кенг ўзгаришларга олиб келади [Lin X, Xu Y, Pan X, Xu J, 2020]. 1TD нинг ижтимоий хусусиятлари турли заифликлар ва дифференциал таъсир қилиш орқали семиришга ёки аксинча таъсир қилиши мумкин [Diderichsen F, Hallqvist J, 2019; Lynch EB., 2020]. Швецияда ўтказилган тадқиқот ($n = 16,365$, ёши ≤ 22) юқори ТМИ онанинг таълим даражаси пастлиги 1TD хавфи ортиши билан боғловчи воситачи сифатида ишлаганлигини аниқлади [White PA, Faresjö T, Jones MP, 2023]. Ушбу топилма ижтимоий фарқларнинг дифференциал заифлигини тушунтиришга мос келади, бу ерда хабардорлик етишмаслиги болаларни носоғлом таъсирларга ва руҳий-ижтимоий стресснинг кучайишига кўпроқ мойил қилиши мумкин. Бошқа дифференциал заифликлар орасида аёллар, паст даромадлар ва инсулин терапияси ва диабетни бошқариш технологияларидан фойдаланиш имконияти йўқлиги киради [Minges KE, Whittemore R, Weinzimer SA, 2017; Lin X, Xu Y, Pan X, Xu J, Ding Y, 2020]. Даволанишни давом этмаслик β -хужайра апоптози ва диабет ривожланишини тезлаштириши мумкин. Углеводларни ҳаддан ташқари истеъмол қилиш ва кам жисмоний фаоллик каби турли хил таъсирларнинг 1TD билан оғриган одамларда семиришга таъсири ҳам кенг ўрганилган [Beattie CS, Jesse A, Heinrich K., 2021; Pang T, Gray HL, Alman AC, Buro AW, 2023].

1TD нинг ўзи β -хужайра яллиғланишини келтириб чиқаради [Vilarrasa N, San Jose P, Rubio M, 2021]. Семириш, шунингдек, липотоксиклик, глюкотоксиклик, митохондриял дисфункция, ёғ тўқималарининг дисфункцияси, эндокрин ўзгаришлар ва ичак микробиомалари мувозанати бузилишини ўз ичига олган бир қатор физиологик ҳодисаларни келтириб чиқаради, бу эса паст даражадаги сурункали яллиғланиш ҳолатини яратади [Corbin KD, Driscoll KA, Pratley RE, 2018; Vilarrasa N, San Jose P, Rubio M, 2021]. Шундай қилиб, 1TD ва семиришнинг бу икки томонлама юки юрак-қон томир касалликлари, саратон ва инсулин резистентлиги билан боғлиқ метаболик синдромлар каби тизимли асоратларга олиб келади [Oboza P, Ogarek N, Olszanecka-Glinianowicz M, Kocelak P., 2023]. Чуқур биопсихосоциал оқибатларни тан олиш ва семиришни даволаш учун ҳаракатга қақариш ҳозир вақтда жуда муҳим.

Адабиётлар рўйхати:

1. Kueh, M.T.W., Chew, N.W.S., Al-Ozairi, E. et al. The emergence of obesity in type 1 diabetes. *Int J Obes* 48, 289–301 (2024).
2. Samieva G. U., Abdirashidova G. A., Sobirova Sh B. Prognostic value of cytokine spectrum and their changes in primary and recurrent laryngotracheitis in children // *Innovative research: problems of implementation of results and directions of development.* – 2017. – С. 103.
3. Самиева Гулноза, Абдирашидова Гулноза, Курбанов Голиб Патогенетические аспекты эндогенной интоксикации и ее влияние на течение различных форм стенотического ларинготрахеита у детей // *Обзор европейской науки.* 2018. №9-10-2.
4. Utkurovna S. G., Bahtiyarovna S. S., Gulnoz A. Integrated Approaches to The Diagnosis, Treatment, And Prevention of Stenosing Laryngotracheitis In Children // *European Journal of Molecular & Clinical Medicine.* – 2020. – Т. 7. – №. 03. – С. 2020.
5. Саидова, Ф. С., Г. У. Самиева, and Г. А. Абдирашидова. "Дефицит микронутриентов у детей дошкольного возраста." *Журнал биомедицины и практики* 7.1 (2022).
6. Особенности патогенеза, оптимизация профилактики и методы интенсивной терапии осложнений у беременных с хроническим ДВС-синдромом М.К. Эргашевна, А.Г. Аблакуловна, М.Б. Аминовна - Тематический журнал образования, 2022
7. Features of etiopathogenesis of dry eye syndrome in women of Kashkadarya region. SG Utkurovna, AG Ablakulovna, OF Orifjonovna - *Journal of biomedicine and practice*, 2023
8. Utkurovna S. G., Ablakulovna A. G. Pathophysiology of the triad of young sports girls aspects // *Конференции.* – 2020.
9. Саидова Ф. С., Самиева Г. У., Абдирашидова Г. А. Дефицит микронутриентов у детей дошкольного возраста // *Журнал биомедицины и практики.* – 2022. – Т. 7. – №. 1.
10. Approximate solution of some linear delay differential equations in medicine A Abdirashidov, G Abdirashidova - *ISJ Theoretical & Applied Science*, 12 (80), 2019
11. Абдирашидова Гулноза Аблакуловна, Бакиев Шавкат Шерзодович. Цитокин бўрони патофизиологияси // *Fan, ta'lim, madaniyat va innovatsiya* [Jild: 03Nashr: 3(2024)]ISSN:2992-8915
12. Абдирашидова Гулноза Аблакуловна, Бакиев Шавкат Шерзодович. Прогностическое значение спектра цитокинов и их изменения при первичных и рецидивирующих ларинготрахеитах у детей // *Universal journal of medical and natural sciences*, volume 2, issue 9 (2024), P 87-92.
13. Abdirashidova Gulnoza Ablakulovna, Bakiyev Shavkat Sherzodovich, Yurak-qon tomir

tizimining balandlik holatida gipoksiyaga adaptatsiyasi patofiziologiyasi // Academic research in modern science International scientific-online conference-2024, P 11-17.

14. Abdirashidova Gulnoza Ablakulovna, Yurak-qon tomir tizimining balandlik holatida gipoksiyaga adaptatsiyasi patofiziologiyasi // Models and methods in modern science International scientific-online conference-2024, P 88-95.

15. Abdirashidova Gulnoza Ablakulovna, Diabetik aterotromboz patogenezida yangi jihatlar // Fan, ta'lim, madaniyat va innovatsiya [Jild: 03Nashr: 5 (2024)], 74-76 b.

16. Abdirashidova Gulnoza Ablakulovna, Umumiy xavf omillari va mexanizmlariga ega yurak-qon tomir kasalliklari va saraton

patofiziologiyasi // Fan, ta'lim, madaniyat va innovatsiya [Jild: 03Nashr: 5 (2024)], 150-155 b.

17. Самиева Гулноза Уткуровна, Абдирашидова Гулноза Аблакуловна, Бакиев Шавкат Шерзодович, Цитокин бўрони патофизиологиясига замонавий қарашлар // Биология ва тиббиёт муаммолари 2024, №1 (151), 431-435 b.

18. Самиева, Г. У., & Абдирашидова, Г. А. (2026). Роль барьерной дисфункции эпителия и матриксного ремоделирования в патогенезе полипозного риносинусита. Вестник фундаментальной и клинической медицины (Т. 3, Выпуск 23, сс. 10–13). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18831963>

Иқтибос учун: Абдирашидова Г.А., Жабборова Г.С. I-тип қандли диабетда семириш патофизиологияси // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2026. – № 4(24). – Б. 206–210. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19482619>

C.DIFFICILE-АССОЦИИРОВАННАЯ ИНФЕКЦИЯ: КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ У ПАЦИЕНТОВ ОНКОГЕМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ**Кудря А.А.¹, Шевченко Н.И.¹, Логинова О.П.¹, Гасич Е.Л.²**¹Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр радиационной медицины и экологии человека», г. Гомель, Республика Беларусь²Государственное учреждение «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья», г. Минск, Республика Беларусь

Резюме. *Clostridioides difficile*-ассоциированная инфекция (CDI) является значимой эпидемиологической и медицинской проблемой. Пациенты онкогематологического профиля входят в группу высокого риска развития CDI. Цель исследования: изучить частоту выявления нетоксигенных и токсигенных штаммов *C.difficile* у пациентов онкогематологического профиля в условиях одного стационара. Проведен ретроспективный анализ данных историй болезни пациентов онкогематологического профиля с диарейным синдромом. Основную исследуемую группу составили пациенты с положительными результатами GDH и/или токсинов A/B *C.difficile* в образцах стула. Частота выявления *C.difficile* составила 24,0%, токсигенных штаммов – 11,0%. Наиболее уязвимыми оказались пациенты с лейкозами (45,8%). Результаты проведенного исследования подтверждают значимость для пациентов онкогематологического профиля таких факторов риска, как возраст, порядок и длительность госпитализаций, антибиотикотерапия и химиотерапия.

Ключевые слова: *C.difficile*, *Clostridioides difficile*-ассоциированная инфекция, факторы риска, онкогематологические заболевания.

C. DIFFICILE-ASSOCIATED INFECTION: A CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL STUDY IN PATIENTS WITH ONCOHEMATOLOGICAL DISEASES**Kudrya A.A.¹, Shevchenko N.I.¹, Loginova O.P.¹, Gasich E.L.²**¹State Institution "Republican Scientific and Practical Center for Radiation Medicine and Human Ecology", Gomel, Republic of Belarus²State Institution "Republican Center for Hygiene, Epidemiology, and Public Health", Minsk, Republic of Belarus

Resume. *Clostridioides difficile*-associated infection (CDI) is a significant epidemiological and medical problem. Patients with hematologic malignancies are at high risk for developing CDI. The aim of this study was to evaluate the incidence of non-toxigenic and toxigenic strains of *C.difficile* in patients with hematologic malignancies at a single hospital. A retrospective analysis of case histories of hematologic malignancies with diarrhea syndrome was conducted. The main study group consisted of patients with positive results for GDH and *C.difficile* toxins A/B in stool samples. The detection rate of *C.difficile* in oncohematological patients was 24,0%, toxigenic strains – 11,0%. The most vulnerable were patients with leukemia (45.8%). The results of the study confirm the importance of such risk factors as age, order and duration of hospitalization, antibiotic therapy, and chemotherapy for patients with oncohematological diseases.

Keywords: *C.difficile*, *Clostridioides difficile*-associated infection, risk factors, oncohematological diseases.

C.DIFFICILE БИЛАН БОҒЛИҚ ИНФЕКЦИЯ: ОНКОГЕМАТОЛОГИК БЕМОРЛАРДА КЛИНИК-ЭПИДЕМИОЛОГИК ТАДҚИҚОТ**Кудря А.А.¹, Шевченко Н.И.¹, Логинова О.П.¹, Гасич Е.Л.²**¹“Радиацион тиббиёт ва инсон экологияси республика илмий-амалий маркази” давлат муассасаси, Гомел ш., Беларус Республикаси²“Республика гигиена, эпидемиология ва жамоат саломатлиги маркази” давлат муассасаси, Минск ш., Беларус Республикаси

Резюме. *Clostridioides difficile* билан боғлиқ инфекция (CDI) муҳим эпидемиологик ва тиббий муаммо ҳисобланади. Онкогематологик беморлар CDI ривожланиши хавфи юқори бўлган гуруҳга киради. Тадқиқот мақсади: бир стационар шароитида онкогематологик беморларда *C.difficile*нинг нотоксиген ва токсиген штаммлари аниқланиши частотасини ўрганиши. *Clostridioides difficile* билан

боғлиқ инфекция (CDI) муҳим эпидемиологик ва тиббий муаммо ҳисобланади. Онкогематологик профилдаги беморлар CDI ривожланиш хавфи юқори бўлган гуруҳга киради. Тадқиқотнинг мақсади битта стационар шароитида онкогематологик беморларда *C.difficile* нинг токсиген бўлмаган ва токсиген штаммларини аниқлаш частотасини ўрганишдан иборат. Диарея синдроми бўлган онкогематологик беморларнинг касаллик тарихи маълумотларининг ретроспектив таҳлили ўтказилди. Асосий тадқиқот гуруҳини нажас намуналарида GDG ва/ёки A/B *C.difficile* токсинларининг ижобий натижалари бўлган беморлар ташкил этди. *C.difficile* билан касалланиш 24,0% ни, токсиген штаммлар билан касалланиш 11,0% ни ташкил этди. Лейкемия билан оғриган беморлар (45,8%) энг заиф бўлиб чиқди. Ўтказилган тадқиқот натижалари онкогематологик профилдаги беморлар учун ёши, касалхонага ётқизиш тартиби ва давомийлиги, антибиотикотерапия ва кимётерапия каби хавф омилларининг аҳамиятини тасдиқлайди.

Калит сўзлар: *C.difficile*, *Clostridioides difficile* билан боғлиқ инфекция, хавф омиллари, онкогематологик касалликлар.

Актуальность. *Clostridioides difficile*-ассоциированная инфекция (CDI) является одной из самых распространенных инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи. облигатно-анаэробные грамположительные бактерии *C.difficile* являются частью нормальной микробиоты кишечника человека. Однако, изменение состава и снижение разнообразия кишечной микрофлоры могут приводить к чрезмерному бактериальному росту и избыточной колонизации кишечника токсигенными и гипервирулентными штаммами *C.difficile*.

С одной стороны, развитие CDI зависит от состояния макроорганизма. С другой – от свойств самого микроорганизма, прежде всего, от способности *C.difficile* к спорообразованию и выработке токсинов (энтеротоксин А, цитотоксин В, бинарный токсин), вызывающих повреждение слизисто-эпителиального барьера и воспаление в стенке толстой кишки, что, в свою очередь, приводит к развитию клинических симптомов от водянистой диареи до псевдомембранозного колита [1]. Распространение гипервирулентных штаммов *C.difficile*, характеризующихся большей продукцией токсинов, а также повышенным спорообразованием приводит к росту заболеваемости и тяжелому течению CDI [2, 3]. Немаловажным является и резистентность *C.difficile* к основным антимикробным препаратам – ванкомицину и метронидазолу [4].

Распространенность CDI достаточно хорошо изучена. В настоящее время во всем мире отмечается увеличение количества случаев, степени тяжести и рецидивов CDI. По данным исследований 2011-2017 гг., в Европе частота случаев CDI, связанных с оказанием медицинской помощи, увеличилась с 5,4% до 7,3%. Самая высокая заболеваемость была зарегистрирована в Польше - 6,18 на 10000 койко-дней, а самая низкая – в Великобритании 1,99 на 10000 койко-дней. Высокая заболеваемость CDI привела к росту смертности, показатель которой колеблется от 5 до 23% (в среднем 12–13%) [5].

В Российской Федерации имеются данные распространенности CDI в многопрофильных стационарах, а также среди пациентов разного профиля: гастроэнтерологического, колопроктологического, пациентов отделений реанимации и интенсивной терапии [4, 6, 7, 8, 15]. В Республике Беларусь эпидемиологические данные о частоте выявления *C.difficile* среди госпитализированных пациентов не многочисленны.

Классическими факторами риска развития CDI являются возраст старше 65 лет, антибиотикотерапия, длительные госпитализации, иммунодефицитные состояния, сопутствующие заболевания, применение цитостатических и химиопрепаратов, ингибиторов протонной помпы [5].

Особое значение эта инфекция имеет для пациентов онкогематологического профиля, что связано с использованием широкого спектра антибактериальных препаратов (цефалоспорины III и IV поколения, пенициллины, фторхинолоны, карбапенемы, клиндамицин) при высокой частоте инфекционных осложнений. Кроме того, пациенты с онкогематологическими заболеваниями нуждаются в частых и длительных госпитализациях для лечения основного заболевания.

Важным фактором риска развития CDI у онкогематологических пациентов является и широкое применение цитостатической и химиотерапии. По данным ретроспективного когортного исследования, проведенного в Германии, из 875 пациентов, получавших химиотерапевтическое лечение по поводу острых и хронических лейкозов и неходжкинских лимфом, у 7,0% была подтверждена *C.difficile*. У 8,2% пациентов с *C.difficile* отмечен тяжелый энтероколит [9].

Наличие у пациентов онкогематологического профиля нейтропений, нарушений клеточного и гуморального звеньев иммунитета, вызванных как основным заболеванием, так и терапией, приводит к дефектам иммунной защиты разной степени, что в свою очередь предрасполагает к развитию инфекций, в том числе вызванных *C.difficile* [10].

Данные о распространенности *C.difficile*-ассоциированной инфекции у пациентов онкогематологического профиля ограничены. Это обусловлено тем, что с одной стороны, они включаются в группу с другими пациентами, например, с соматической органной онкопатологией, что не позволяет отдельно оценить эпидемиологические данные по распространенности *C.difficile*. С другой стороны, у онкогематологических пациентов CDI объединяется с другими инфекционными осложнениями, что не позволяет оценить ее распространенность как моноинфекции [11, 12]. По данным российских исследователей, в условиях одного гематологического стационара *C.difficile* была подтверждена у 18,5% пациентов с явлениями энтероколита. Их них у 8,7% развился псевдомембранозный колит с перфорацией кишечной стенки [13]. У пациентов с гемобластомами, находившихся на лечении в отделении реанимации и интенсивной терапии, причиной диареи и колита в 30,3% случаев была *C.difficile* [14].

Золотым стандартом диагностики CDI является бактериологический метод, основанный на выделении чистой культуры *C.difficile* и определении ее цитотоксичности в культуре клеток. Также установление этиологической роли *C.difficile* в развитии CDI можно проводить методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). Однако, в большинстве лабораторий многопрофильных стационаров выявление *C.difficile* осуществляют с помощью иммуноферментного анализа, который является достаточно простым, доступным, быстровыполнимым и информативным методом диагностики. В настоящее время с целью повышения качества диагностики CDI рекомендован двухступенчатый алгоритм, согласно которому на первом этапе в кале выявляют глутаматдегидрогеназу (GDH), а на втором этапе проводят определение в кале токсинов А и/или В [15, 16]. GDH – родоспецифический фермент, который вырабатывается активно размножающимися как токсигенными, так и нетоксигенными штаммами *C.difficile*. GDH является хорошим антигенным маркером для обнаружения *C.difficile* и рекомендуется в качестве скринингового теста для установления этиологии *C.difficile*-ассоциированной инфекции. Обнаружение в образцах кала токсинов А/В *C.difficile* подтверждает наличие токсигенных штаммов микроорганизма. Так как интенсивность флуоресценции возрастает пропорционально количеству GDH и токсинов А/В в образце кала, по результату исследования возможно вести динамическое количественное определение этих показателей.

Таким образом, проблема инфекции, вызванной *C.difficile*, остается крайне актуальной и недостаточно изученной. Наша публикация посвящена оценке частоты встречаемости нетоксигенных и токсигенных штаммов данного возбудителя.

Цель исследования: изучить частоту выявления нетоксигенных и токсигенных штаммов *C.difficile* у пациентов онкогематологического профиля в условиях одного стационара.

Материалы и методы исследования. Работа выполнена на базе лаборатории клеточных технологий Государственного учреждения «Республиканский научно-практический центр радиационной медицины и экологии человека», г.Гомель (ГУ «РНПЦ РМ и ЭЧ»).

Проведено ретроспективное наблюдательное исследование. Объектом исследования являлись пациенты с онкогематологическими заболеваниями, проходившие стационарное лечение в гематологическом отделении для взрослых ГУ «РНПЦ РМ и ЭЧ» в 2025 году.

В исследование включено 100 пациентов обоих полов в возрасте от 18 до 79 лет с наличием диарейного синдрома различной степени выраженности. Всем пациентам, включенным в исследование, проводили определение GDH и токсинов А/В *C.difficile* иммуноферментным методом с флуоресцентным механизмом детекции с помощью автоматического иммунологического анализатора VIDAS и соответствующих диагностических наборов производства «BioMérieux» (Франция). В качестве биологического материала использовали образцы кала. Интерпретация результатов осуществлялась в соответствии с инструкциями к диагностическим наборам и оборудованию (таблица 1).

Таблица 1.

Интерпретация результатов определения GDH и токсинов А/В *C.difficile*

Тест	Тестовое значение	Результат
GDH	<0,10	отрицательный
	≥0,10	положительный
Токсины А/В	<0,13	отрицательный
	≥0,13 - <0,37	сомнительный
	≥0,37	положительный

В зависимости от полученных результатов определения GDH и токсинов А/В *C.difficile* все пациенты были разделены на 4 группы: 1) GDH отрицательный, токсины А/В отрицательные; 2) GDH

положительный, токсины A/B отрицательные; 3) GDH положительный, токсины A/B сомнительные; 4) GDH положительный, токсины A/B положительные. Пациенты из 2, 3 и 4 групп составили основную исследуемую группу.

В основной исследуемой группе оценивали пол и возраст пациентов, структуру онкогематологических заболеваний, количество и длительность госпитализаций, применение в рамках проводимого лечения химиотерапии и антибактериальной терапии, использование препаратов протонной помпы (омепразол), а также наличие/отсутствие у пациентов признаков вторичных иммунодефицитных состояний.

Для сравнения полученных данных использовали методы описательной статистики (абсолютные значения, проценты). Статистическую обработку результатов проводили с помощью прикладного пакета программ Microsoft Excel.

Результаты и обсуждение. Всего за 2025 год в гематологическое отделение для взрослых было госпитализировано 2638 пациентов. Онкогематологические пациенты с диарейным синдромом составили 3,8% (n=100) от общего числа госпитализированных пациентов в 2025 году. Среди них преобладали пациенты с острыми (n=45) и хроническими (n=17) лейкозами, пациенты с множественной миеломой (n=16). 8 пациентов были с миелодиспластическим синдромом и 14 пациентов с другой онкогематологической патологией (эритремия, апластическая анемия и др.).

Распределение пациентов на группы в зависимости от полученных результатов определения GDH и токсинов A/B *C.difficile* представлено в таблице 2.

Таблица 2.

Распределение пациентов с онкогематологическими заболеваниями по группам в зависимости от результатов GDH и токсинов A/B *C.difficile*.

№ группы	Результаты определения GDH и токсинов A/B <i>C.difficile</i>	Количество пациентов (n, %)
1	GDH отрицательный, токсины A/B <i>C.difficile</i> отрицательные	76 (76,0%)
2	GDH положительный, токсины A/B <i>C.difficile</i> отрицательные	4 (4,0%)
3	GDH положительный, токсины A/B <i>C.difficile</i> сомнительные	9 (9,0%)
4	GDH положительный, токсины A/B <i>C.difficile</i> положительные	11 (11,0%)

Таким образом, у 76 (76%) пациентов с онкогематологическими заболеваниями и диарейным синдромом *C.difficile* не обнаружены. Прогностическая достоверность отрицательного результата на GDH составляет от 98 до 100 %, что позволяет с высокой степенью вероятности исключить этиологическую роль *C.difficile* в развитии диарейного синдрома. При этом дальнейшее обследование на наличие клостридиальной инфекции не требуется. Вероятно, что имеющийся у данных пациентов диарейный синдром обусловлен иными причинами, связанными с течением основного заболевания, характером проводимого лечения, а также с другими инфекционными агентами.

Частота выявления *C.difficile* у пациентов с онкогематологическими заболеваниями составила 24,0% (пациенты с положительными результатами на GDH). При этом было выявлено 11,0% (n=11) токсигенных штаммов *C.difficile* (GDH положительный, токсины A/B положительные). К примеру, по результатам нескольких исследований для пациентов гастроэнтерологического профиля количество выделенных токсигенных штаммов *C.difficile* колебалось от 7,9% до 8,1%. Известно, что наличие токсигенных штаммов увеличивает риск развернутой клинической картины CDI примерно в 6 раз. Полученные нами данные свидетельствуют о высоком уровне распространенности *C.difficile* (в том числе и токсигенных штаммов) у пациентов с онкогематологическими заболеваниями, что диктует необходимость осуществления постоянного мониторинга за выявляемостью этого микроорганизма у пациентов онкогематологического профиля [4, 6, 7, 8, 15, 17].

Удельный вес различных онкогематологических заболеваний у пациентов основной исследуемой группы представлен на рисунке 1.

Среди пациентов с положительным результатом на GDH наибольший удельный вес составили пациенты с лейкозами (45,8%, n=11). Токсигенные штаммы *C.difficile* также чаще всего выявлялись у пациентов с лейкозами (63,6%, n=7). Таким образом, наибольшему риску развития CDI среди пациентов онкогематологического профиля подвержены пациенты с острыми и хроническими лейкозами.




Рисунок 1. Удельный вес онкогематологических заболеваний среди пациентов основной исследуемой группы.

Необходимо отметить, что у 13 (13,0%) онкогематологических пациентов получен положительный результат GDH при отрицательном или сомнительном результате определения токсинов А/В *C. difficile*. В этих случаях текущие эпизоды диареи у пациентов могут быть не связаны с *C. difficile*. Однако, носительство *C. difficile*, является предрасполагающим фактором развития CDI [15]. Кроме того, у этих пациентов клинические проявления в виде диарейного синдрома могли быть обусловлены критической колонизацией *C. difficile* с последующей возможной продукцией токсина. В данной ситуации мы проводим повторное определение GDH и токсинов А/В *C. difficile* через 24-48 часов. Для лечения таким пациентам назначаются пробиотики (энтерол, бактисубтил), действие которых обусловлено антагонистическим эффектом в отношении патогенных и условно-патогенных микроорганизмов, в том числе и *C. difficile*, что позволяет снизить их количество и предотвратить развитие CDI.

Анализ распределения пациентов по полу показал, что в основной исследуемой группе (n=24) было 10 (41,7%) мужчин и 14 (58,3%) женщин. Нетоксигенные штаммы *C. difficile* (GDH положительный, токсины А/В отрицательные или сомнительные, n=13) примерно с одинаковой частотой выявлялись как у мужчин (53,8%, n=7), так и у женщин (46,2%, n=6). Среди пациентов, у которых были выявлены токсигенные штаммы *C. difficile* (n=11) было 3 (27,3%) мужчин и 8 (72,7%) женщин. Учитывая небольшой объем выборки, значимых различий пациентов по полу не установлено. Средний возраст пациентов составил 62 года, при этом среди пациентов с положительными результатами GDH и токсинов А/В *C. difficile* этот показатель достиг 64 лет. Таким образом, возрастной профиль в основной исследуемой группе пациентов вплотную приближается к критической отметке в 65 лет. Известно, возраст старше 65 лет является одним из ключевых факторов риска развития *C. difficile*-ассоциированной инфекции [5].

У 37,5% (n=9) пациентов госпитализация по поводу онкогематологического заболевания, при которой были выявлены положительные показатели GDH и/или токсинов А/В *C. difficile*, была первичной. В остальных 62,5% (n=15) случаях порядок госпитализации варьировал от 2 до 8. Согласно литературным данным, каждая последующая госпитализация повышает риск развития CDI на 8% [2]. Длительность госпитализации в основной исследуемой группе пациентов колебалась от 12 до 51 койко-дня и в среднем составила 29 дней, что характерно для онкогематологических заболеваний. Передача *C. difficile* происходит по фекально-оральному механизму и реализуется контактно-бытовым путем через загрязненные руки медицинского персонала, контакт с контаминированным медицинским оборудованием или поверхностями). В этой связи длительное нахождение пациентов онкогематологического профиля в стационаре становится серьезным фактором риска развития CDI.

По результатам нашего исследования 83,4% (n=20) пациентов основной исследуемой группы парентерально получали массивную антимикробную терапию в виде 2-х и более антибактериальных препаратов, преимущественно из групп цефалоспоринов III и IV поколения, карбапенемов, пенициллинов и ванкомицина. Только у 16,6% (n=4) пациентов антибактериальное лечение не проводилось. Химиотерапевтическое лечение проходили 62,5% (n=15) пациентов. Есть данные, что у онкогематологических пациентов, находящихся на интенсивной химиотерапии, риск развития CDI повышается на 74,0% [18]. Полученные данные свидетельствуют, что для пациентов онкогематологического про-

филя интенсивность антибактериальной терапии, а также химиотерапевтическое лечение являются существенными факторами риска развития CDI.

Установлено, что 58,3% (n=14) пациентов основной исследуемой группы получали препарат из группы ингибиторов протонной помпы – омепразол, который снижает кислотность желудка и рассматривается как дополнительный фактор, способствующий развитию кишечных инфекций.

Признаки вторичного иммунодефицитного состояния, вызванного основным заболеванием, а также проводимым лечением отмечались у 19 из 24 (79,2%) пациентов. У этих пациентов регистрировались оппортунистические грибковые и вирусные инфекции, длительная лихорадка, несмотря на антибактериальную терапию, лимфопения, гипоальбуминемия и гипогаммаглобулинемия. Ослабленная иммунная система наряду с продолжающейся иммуносупрессивной терапией онкогематологического заболевания безусловно вносит вклад в снижение сопротивляемости инфекциям в том числе и CDI.

Заключение. Частота выявления *C.difficile* у пациентов с онкогематологическими заболеваниями и диарейным синдромом разной степени выраженности в условиях ГУ «РНПЦ РМ и ЭЧ» составила 24,0%, что коррелирует с имеющимся литературными данными [13, 14]. Наиболее уязвимыми в плане риска развития *C.difficile*-ассоциированной инфекции являются пациенты с острыми и хроническими лейкозами (45,8%). Результаты проведенного исследования подтверждают, что в развитии CDI у пациентов с онкогематологическими заболеваниями важную роль играет возраст, порядок и длительность госпитализаций, интенсивность проводимого химиотерапевтического и антибактериального лечения. Возможно, что дополнительными факторами, вносящими вклад в риск развития CDI у онкогематологических пациентов, является применение ингибиторов протонной помпы и выраженная иммуносупрессия.

Таким образом, актуальным является эпидемиологический и микробиологический мониторинг встречаемости *C.difficile* у пациентов с онкогематологическими заболеваниями как с диарейным синдромом, так и при наличии факторов риска. Отдельными вопросами, которые необходимо учитывать при проведении дальнейших клинко-эпидемиологических исследований среди пациентов онкогематологического профиля являются установление распространенности гипервирулентных и резистентных к антибактериальным препаратам штаммов *C.difficile*, мониторинг носительства *C.difficile* среди медицинских работников, являющихся потенциальным источником инфекции.

Список литературы:

1. Martinez E., Taminiau B., Rodriguez C., Daube G. Gut microbiota composition associated with *Clostridioides difficile* colonization and infection // *Pathogens*. 2022;11(7):781. DOI: 10.3390/pathogens11070781.
2. McDonald L.C., Gerding D.N., Johnson S. et al. Clinical Practice Guidelines for *Clostridium difficile* Infection in Adults and Children: 2017 Update by the Infectious Diseases Society of America (IDSA) and Society for Healthcare Epidemiology of America (SHEA) // *Clin Infect Dis*. 2018;66(7):48.
3. Дзеранова Н.Я., Зотов Д.Д., Исаков В.А., Вютрих Е.В. Инфекция *Clostridium difficile*: актуальные подходы к диагностике и лечению // *University Therapeutic Journal*. 2023;5(1):85–96. DOI 10.56871/UTJ.2023.40.38.005.
4. Сухина М.А., Шельгин Ю.А., Фролов С.А., Сафин А.Л. Распространённость антибиотикорезистентных штаммов *Clostridioides difficile* у пациентов с антибиотикоассоциированной диареей // *Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология*. 2018;12(160):40–46. DOI 10.31146/1682–8658–ecg-160-12-40-46. – EDN ZSJUDB.
5. DiBella S, Sanson G, Monticelli J, Zerbato V, Principe L, Giuffrè M, Pipitone G, Luzzati R. *Clostridioides difficile* infection: history, epidemiology, risk factors, prevention, clinical manifestations, treatment, and future options. // *Clin Microbiol Rev*. 2024;37: e00135-23. DOI 10.1128/cmr.00135–23.
6. Волчкова Е.В., Белоусова Е.А., Макачук П.А., Русанова Э.В., Великанов Е.В. Частота выявления инфекции *Clostridium difficile* в больничных условиях // *Альманах клинической медицины*. 2014;33:71–76.
7. Дмитриева Н.В., Клясова Г.А., Бакулина Н.В. и др. Распространённость *Clostridium difficile*-ассоциированной диареи у госпитализированных больных (результаты российского проспективного многоцентрового исследования // *Клиническая микробиология и антимикробная химиотерапия*. 2017;19(4):268-274.
8. Uspensky Yu.P., Baryshnikova N.V. Antibiotic-associated diarrhea in a hospital setting: Incidence and prevention issues // *Medical alphabet*. 2021;(20):35–37. DOI: 10.33667/2078-563-2021-20-35-37.
9. Marcus Gorschlüter, et al. *Clostridium Difficile* Infection in Patients with Neutropenia // *Clinical Infectious Diseases*. 2001;33(6):786–91.
10. Стома И.О. *Clostridium difficile*-ассоциированная инфекция у пациентов с онко-

гематологическими заболеваниями // Клиническая инфектология и паразитология. 2014; Спецвыпуск: 46-54.

11. Ключникова И.А., Петухова И.Н., Григорьевская З.В. и др. Инфекции, вызванные *Clostridium difficile*, в онкологической клинике // Сибирский онкологический журнал. 2018; 17(6): 92–96. DOI 10.21294/1814-4861-2018-17-6-92-96.

12. Шильникова И.И., Дьякова С.А., Кулага Е.В. и др. Идентификация и чувствительность к антибиотикам клостридий, включая *Clostridium difficile*, выделенных при инфекционных осложнениях у онкологических больных // Клиническая лабораторная диагностика. 2016; 61(7): 439–444. DOI 10.18821/0869-2084-2016-61-7-439-444.

13. Игнатъев С. В., Лучинин А. С., Лянгузов А. В., Осипова Е. С. Результаты исследования *Clostridium difficile*-ассоциированной инфекции в гематологическом стационаре. // Гематология и трансфузиология. 2022; 67(2).

14. Богураев Е.А., Власенко А.В., Птушкин В.В. и др. *Clostridioides difficile*-ассоциированная инфекция у пациентов онкогематологического профиля в отделении реанимации и интенсивной терапии // Инфекционные болезни. 2024; 22(4): 93–99. DOI 10.20953/1729-9225-2024-4-93-99.

15. Господарик А.В., Прохорова Н.Д., Куликова В.К., Калачнюк Т.Н., Хромых Н.И., Кудрявцева Ю.В., Беспятых Ю.А. Мониторинг *Clostridioides difficile*-ассоциированной инфекции в условиях стационара // Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. 2025; 102(5): 605–614. DOI 10.36233/0372-9311-662.

16. Crobach MJ, Dekkers OM, Wilcox MH, Kuijper EJ. European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID): data review and recommendations for diagnosing *Clostridium difficile*-infection (CDI). // Clin Microbiol Infect. 2009; 15(12): 1053–66. DOI: 10.1111/j.1469-0691.2009.03098.x. PMID: 19929972.

17. Zacharioudakis I.M., Zervou F.N., Pliakos E.E., et al. Colonization with toxinogenic *C. difficile* upon hospital admission, and risk of infection: a systematic review and meta-analysis // Am. J. Gastroenterol. 2015; 110(3): 381–90. DOI: <https://doi.org/10.1038/ajg.2015.22>.

18. Magahis PT, Satish D, Kamboj M, Babbady NE, Baul J, Kalvin HL, Panageas K, Postow MA, Laszkowska M, Faleck DM. Management and Outcomes of *Clostridioides difficile* Infection in Patients on Immune Checkpoint Inhibitors // J Natl Compr Canc Netw. 2025; 23(5): 147–155. DOI: 10.6004/jnccn.2024.7355. PMID: 40341188; PMCID: PMC12476593.

Для цитирования: Кудря А.А., Шевченко Н.И., Логинова О.П., Гасич Е.Л. *C. difficile*-ассоциированная инфекция: клиничко-эпидемиологическое исследование у пациентов онкогематологического профиля // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 4(24). – С. 211–217. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19482663>

ФАГОЦИТАРНАЯ АКТИВНОСТЬ НЕЙТРОФИЛОВ**Маматова М.Н., Хикматова М.Т., Олмасова Л.Б., Болтаева М.А.**

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Было изучено в динамике на протяжении заболевания активность щелочной фосфатазы в лейкоцитах при инфекционном гепатите в зависимости от различных методов лечения, а также выяснили возможность использования этого показателя для дифференциальной диагностики болезни Боткина и обтурационной желтухи опухолевой природы.

Ключевые слова: дифференциальный диагноз, лейкоциты, гепатит, индикатор, щелочная фосфатаза.

PHAGOCYTIC ACTIVITY OF NEUTROPHILS**Mamatova M.N., Khikmatova M.T., Olmasova L.B., Boltaeva M.A.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. The activity of alkaline phosphatase in leukocytes during infectious hepatitis was studied dynamically throughout the course of the disease depending on various treatment methods, and the possibility of using this indicator for the differential diagnosis of Botkin's disease and obstructive jaundice of tumor origin was also determined.

Key words: differential diagnosis, leukocytes, hepatitis, indicator, alkaline phosphatase.

НЕЙТРОФИЛЛАРИНИНГ ФАГОЦИТАР ФАОЛЛИГИ**Маматова М.Н., Хикматова М.Т., Олмасова Л.Б., Болтаева М.А.**

Самарканд давлат тиббиёт университети, Самарканд ш., Ўзбекистон

Резюме. Юқумли гепатитда лейкоцитлардаги гидроксид фосфатаза фаоллиги турли даволаш усулларига қараб касаллик даврида динамик равишда ўрганилди ва бу кўрсаткичдан Боткин касаллиги ва ўсма келиб чиқиши обструктив сариқлигини дифференциал диагностика қилиш учун фойдаланиш имконияти ҳам аниқланди.

Калит сўзлар: дифференциал диагноз, лейкоцитлари, гепатит, индикатор, ишқорли фосфатаза.

e-mail: mamatova_muborak@gmail.com

Введение. Интерес к исследованию щелочной фосфатазы в лейкоцитах определяется важной физиологической ролью этого фермента. В цитоплазме нейтрофилов щелочная фосфатаза принимает участие в обмене нуклеопротеинов, липидов, синтезе гликогена и фосфорных соединений [8, 9]. Имеются сведения о том, что фагоцитарная активность нейтрофилов находится в зависимости от содержащейся в них фосфатазы [1, 11].

Данные литературы о значении определения щелочной фосфатазы в нейтрофилах при заболеваниях печени немногочисленны и противоречивы [3, 4, 6]. Ряд авторов установили, что при болезни Боткина активность щелочной фосфатазы в нейтрофилах снижена или находится в пределах нормы, а при обтурационной желтухе значительно повышена. Они обнаружили умеренное увеличение активности щелочной фосфатазы в нейтрофилах у 43% больных инфекционным гепатитом, 50% больных циррозом и 25% у больных страдавших обтурационной желтухой. Ряд авторов пришли к выводу, что содержание щелочной фосфатазы в лейкоцитах не отражает функционального состояния печени и не имеет дифференциально-диагностического значения [7, 10, 12].

Целью нашего исследования было изучение в динамике на протяжении заболевания активности щелочной фосфатазы в лейкоцитах при инфекционном гепатите в зависимости от различных методов лечения, а также выяснение возможности использования этого показателя для дифференциальной диагностики болезни Боткина и обтурационной желтухи опухолевой природы. Обследовано 46 больных инфекционным гепатитом, 16 больных, страдавших обтурационной желтухой, вызванной раком панкреатодуоденальной области и 4 больных холангитом, сопровождавшимся интенсивной желтушностью.

Методы исследования. Определение щелочной фосфатазы в нейтрофилах производилось методом азосочетания по М.Г. Шубич [8]. Показатель фосфатазной активности нейтрофилов (ФАН) вычисляли по Karlow.

Приступая к выполнению настоящей работы, мы определили ФАН у 25 здоровых людей. В норме ФАН у женщин составляла от 22 до 70 ед. (в среднем $31 \pm 5,34$ ед.), у мужчин от 5 до 48 ед. (в среднем $27,3 \pm 2,78$ ед.). Для обоих полов средний показатель ФАН - $29,2 \pm 1,85$ ед.

Из табл. 1 видно, что у здоровых людей ФАН колеблется в довольно широких пределах. Это обстоятельство затрудняет оценку данных, характеризующих изменение ФАН у страдающих болезнью Боткина. Тем не менее отчетливо видно, что ФАН при инфекционном гепатите имеет тенденцию к снижению. Показатель ФАН (в среднем) у страдающих болезнью Боткина оказался статистически достоверно сниженным по сравнению с нормой ($P < 0,001$) [2, 5].

Нам не удалось выявить зависимости ФАН от тяжести инфекционного гепатита. Не установлено также существенного влияния сопутствующих инфекционному гепатиту заболеваний на показатель ФАН. Так, у 4 больных с сопутствующей язвенной болезнью желудка, у 5 с сопутствующим сахарным диабетом и у 3 больных, страдавших до заболевания болезнью Боткина холециститом, ФАН соответствовала норме или находилась на уровне ее верхней границы.

Таблица 1

Результаты определения ФАН у обследованных больных и здоровых людей

Диагноз	Число обследованных больных	Показатель ФАН (в ед.)						
		До 10	11-30	31-50	51-70	100-150	151 и больше	$M \pm m$
Болезнь Боткина	45	0	2	7	2	-	-	$13,5 \pm 1,1$
Рак панкреатодуоденальной области	16	-	2	4	0	10	-	$116 \pm 8,9$
Острый холангит	4	-	-	1	0	2	1	$122 \pm 6,6$
Здоровые	25	1	3	0	2	-	-	$29,2 \pm 1,85$

У больных обтурационной желтухой опухолевой природы и при остром холангите выявлено значительное повышение ФАН. Из 16 больных раком панкреатодуоденальной области ФАН лишь у 1 находилась в пределах нормы. Наиболее высокие показатели ФАН (218 и 229 ед.) выявлены у 2 больных первичным раком печени.

Таким образом, определение ФАН может быть использовано при проведении дифференциального диагноза болезни Боткина и обтурационной желтухи.

Из табл. 2 следует, что по мере клинического выздоровления происходит постепенное увеличение ФАН, которая в период реконвалесценции приближается к норме.

Таблица 2

ФАН в различные периоды болезни Боткина у больных, не получавших кортикостероиды ($M \pm m$)

Период болезни	Число обследованных	ФАН (в ед.)
Разгар болезни	45	$13,5 \pm 1,1$
Снижение желтухи	26	$19,4 \pm 1,3$
Выздоровление	32	$28,8 \pm 1,8$

Несколько иная закономерность в изменении ФАН выявлена у 22 больных, получавших в комплексе с другими методами патогенетической терапии преднизолон. При повторном определении щелочной фосфатазы в нейтрофилах у больных этой группы было установлено, что на фоне лечения преднизолоном наступило значительное повышение ФАН по сравнению с исходными показателями ($15,1 \pm 1,8$ ед.), причем максимального уровня она достигала к 3-му дню лечения ($42,8 \pm 1,2$ ед.). В

дальнейшем на фоне продолжающегося лечения преднизолоном ФАН снижалась (на 7-й день лечения - $32,5 \pm 1,4$ ед.), нормализуясь в период реконвалесценции ($29,9 \pm 1,1$ ед.)

Результаты. Таким образом, кортикостероиды обуславливают значительную активацию ФАН, особенно выраженную в начале лечения. Интенсивность повышения ФАН у различных больных инфекционным гепатитом, получавших лечение преднизолоном, была неодинаковой. Возможно это обстоятельство находится в зависимости от функционального состояния гипоталамо-адренальной системы у этих больных. Этот вопрос заслуживает специального изучения.

Таким образом, исследование ФАН не может быть использовано для характеристики тяжести и прогноза заболевания. Однако наши данные свидетельствуют о том, что определение ФАН может найти широкое применение для дифференциальной диагностики болезни Боткина и обтурационных желтух опухолевой природы. В этом отношении определение ФАН выгодно отличается от других дополнительных методов исследования не только доступностью и относительной простотой методики, но и тем, что изменения ФАН имеют различную направленность при паренхиматозной (болезни Боткина) и обтурационных желтухах.

Список литературы:

1. Бурнашева Е.В., Шатохин Ю.В., Снежко И.В., Мацуга А.А. Поражение почек при противоопухолевой терапии // Нефрология. 2018;22(5):17-24.
2. Маматова М.Н. Гистологическая диагностика неэффективного эритропоэза // Ж. Бухоро Т.И. Тиббиётда янги кун. 2024, 7 (69).
3. Шайкулов Х.Ш., Исокулова М.М., Маматова М.Н. Степень бактериоциногенности антибиотикорезистентных штаммов стафилококков, выделенных в Самарканде // Eurasian journal of medical and natural sciences. 2023, № 3 (1).
4. Berdiyeva Sh.Sh., Yusupova N.A., Murtaeva N.K., and Ibragimova N.S. Clinical and laboratory features of chronic hematogenic osteomyelitis. // Thematics Journal of Microbiology. 2022; 6 (1).
5. Гомазков О.А., Комиссарова Н.В., Большакова Л.В., Теплова Н.Н. Методические подходы к изучению калликреин-кининовой системы при инфаркте миокарда // Кардиология. 1972. № 6. С. 25.
6. Дорохина Е.И., Магомедова А.У., Куликов С.М. и др. Отдаленная нефротоксичность высокодозной химиотерапии по модифицированной программе NHLBFM-90 у взрослых больных диффузной В-крупноклеточной лимфомой // Гематология и трансфузиология. 2016; 61(4):177-183.
7. Колина И.Б., Бобкова И.Н. Нефропатии при злокачественных новообразованиях (лекция) // Альманах клинической медицины. 2016; 30: 108- 116.
8. Шубич, М.Г., Нагоев, Б.С. Щелочная фосфатаза лейкоцитов в норме и патологии Текст. / М. Г. Шубич, Б.С. Нагоев. М.: Медицина, 1980. - С. 224.
9. Dendorfer A, Wolfrum S, Dominiak P. Pharmacology and cardiovascular implications of the kinin-kallikrein system. Jpn J Pharmacol 1999;79: 403-26. PMID 10361880.
10. Skidgel RA, Alhenc-Gelas F, Campbell WB. Relation of cardiovascular signaling by kinins and products of similar converting enzyme systems; prologue: kinins and related systems. New life for old discoveries. Am J Physiol Heart Circ Physiol 2003;284:H1886-91. PMID 12742820
11. Schmaier A.H. Assembly, activation, and physiologic influence of the plasma kallikrein-kinin system // Int. Immunopharmacol. 2008. V. 8, № 2. P. 161-165.
12. Sugi T., Makino T. Factor XII, kininogen and plasma prekallikrein in abnormal pregnancies // Curr. Drug Targets. 2005. V. 6, № 5. P. 551-557.

Для цитирования: Маматова М.Н., Хикматова М.Т., Олмасова Л.Б., Болтаева М.А. Фагоцитарная активность нейтрофилов // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 4(24). – С. 218–220. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19482706>

КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 1-ЧАСОВОЙ ГЛИКЕМИИ ПРИ ОРАЛЬНОМ ГЛЮКОЗОТОЛЕРАНТНОМ ТЕСТЕ У ПАЦИЕНТОВ С ПРЕДИАБЕТОМ И ОЖИРЕНИЕМ**Курбанова Н.С.**

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Актуальность. Ожирение и предиабет являются важными факторами риска развития сахарного диабета 2 типа. Поиск чувствительных маркеров ранней дисгликемии имеет большое значение для своевременной диагностики метаболических нарушений. Цель исследования. Изучить клинико-диагностическое значение 1-часовой гликемии при оральном глюкозотолерантном тесте у пациентов с предиабетом и ожирением. Материалы и методы. Проведен обзор и анализ современных научных публикаций, клинических рекомендаций и исследований, посвященных роли 1-часовой гликемии в раннем выявлении нарушений углеводного обмена. Использованы библиографический, аналитический, сравнительный и обобщающий методы. Результаты. Установлено, что 1-часовая гликемия является более чувствительным маркером ранних нарушений углеводного обмена по сравнению с глюкозой натощак, 2-часовой гликемией и HbA1c. Ее повышение связано с инсулинорезистентностью, β -клеточной дисфункцией, ожирением и высоким риском сахарного диабета 2 типа. Заключение. Определение 1-часовой гликемии имеет важное значение для ранней диагностики и профилактики сахарного диабета 2 типа у пациентов с предиабетом и ожирением.

Ключевые слова: 1-часовая гликемия, оральная глюкозотолерантная проба, предиабет, ожирение, сахарный диабет 2 типа, инсулинорезистентность, β -клеточная дисфункция.

CLINICAL AND DIAGNOSTIC SIGNIFICANCE OF 1-HOUR GLICEMIA DURING ORAL GLUCOZOTOLERANT TEST IN PATIENTS WITH PREDIABET AND OBESITY**Kurbanova N.S.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Relevance. Obesity and prediabetes are important risk factors for developing type 2 diabetes. The search for sensitive markers of early dysglycemia is of great importance for the timely diagnosis of metabolic disorders. Purpose of the research. Study the clinical and diagnostic significance of 1-hour glycemia in the oral glucose tolerance test in patients with pre-diabetes and obesity. Materials and methods. A review and analysis of modern scientific publications, clinical recommendations, and studies devoted to the role of 1-hour glycemia in the early detection of carbohydrate metabolism disorders were conducted. Bibliographic, analytical, comparative, and generalizing methods were used. Results. It has been established that 1-hour glycemia is a more sensitive marker of early carbohydrate metabolism disorders compared to fasting glucose, 2-hour glycemia, and HbA1c. Its increase is associated with insulin resistance, β -cell dysfunction, obesity, and a high risk of type 2 diabetes mellitus. Conclusion. Determining 1-hour glycemia is important for early diagnosis and prevention of type 2 diabetes mellitus in patients with pre-diabetes mellitus and obesity.

Keywords: 1-hour glycemia, oral glucose tolerance test, prediabetes, obesity, type 2 diabetes mellitus, insulin resistance, β -cell dysfunction.

ПРЕДИАБЕТ ВА СЕМИЗЛИК БИЛАН КАСАЛЛАНГАН БЕМОРЛАРДА ОҒИЗ ОРҚАЛИ ГЛЮКОЗОТОЛЕРАНТ ТЕСТИДА 1 СОАТЛИК ГЛЮКЕМИЯНИНГ КЛИНИК-ДИАГНОСТИК АҲАМИЯТИ**Курбанова Н.С.**

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Долзарблиги. Семизлик ва предиабет 2-тур қандли диабет ривожланишининг муҳим хавф омиллари ҳисобланади. Метаболик бузилишларни ўз вақтида таъхислаш учун эрта дисгликемиянинг сезгир маркерларини топиш катта аҳамиятга эга. Тадқиқотнинг мақсади. Диабет олди ва семизлиги бўлган беморларда орал глюкозага толерантлик тестида 1 соатлик гликемиянинг клиник-диагностик аҳамиятини ўрганиш. Материалы и методы. Углевод алмашинуви бузилишларини эрта аниқлашда 1 соатлик гликемиянинг ролига бағишланган замонавий илмий наирлар, клиник тавсиялар ва тадқиқотлар кўриб чиқилди ва таҳлил қилинди. Бунда библиографик, таҳлилий, қиёсий ва умумлаштирувчи усуллардан фойдаланилди. Натижалар. 1 соатлик гликемия оч қоринга глюкоза, 2 соатлик гликемия ва HbA1c билан солиштирганда углевод алмашинувининг эрта бузилишининг сезгир бел-

гиси эканлиги аниқланди. Унинг охиши инсулинрезистентлик, β -хужайра дисфункцияси, семизлик ва 2-тоифа қандли диабет хавфининг юқорилиги билан bogлиқ. Хулоса. Қандли диабет олди ва семизлиги бўлган беморларда 2-тур қандли диабетни эрта ташиxisлаш ва олдини олиш учун 1 соатлик гликемияни аниқлаш муҳим аҳамиятга эга.

Калит сўзлар: 1 соатлик гликемия, оғиз орқали глюкозага чидамлилик тести, диабет олди, семизлик, 2-тоифа қандли диабет, инсулин қаршилиги, β -хужайра дисфункцияси.

e-mail: kurbanovanozima244@gmail.com

Введение: Ожирение и предиабет в настоящее время рассматриваются как одни из ведущих факторов формирования сахарного диабета 2 типа и его сердечно-сосудистых осложнений. У пациентов с ожирением уже на доклинических этапах выявляются инсулинорезистентность, компенсаторная гиперинсулинемия, хроническое низкоинтенсивное воспаление, дислипидемия и постепенное снижение функционального резерва β -клеток поджелудочной железы. Именно сочетание ожирения и нарушений углеводного обмена создает особенно высокий риск прогрессирования к манифестному сахарному диабету 2 типа, что определяет необходимость поиска более чувствительных методов ранней диагностики [1, 2].

Традиционно для диагностики предиабета используются глюкоза плазмы натощак, 2-часовая гликемия при 75-граммовом оральном глюкозотолерантном тесте и уровень гликированного гемоглобина. Согласно действующим стандартам, именно эти показатели остаются основой скрининга и диагностики нарушений углеводного обмена. Однако накопленные данные свидетельствуют о том, что у значительной части пациентов с ожирением и инсулинорезистентностью ранние метаболические нарушения могут оставаться нераспознанными при использовании только стандартных критериев, особенно на этапе, когда гликемия натощак и HbA1c еще находятся в пределах референсных или пограничных значений [1, 2].

В последние годы особое внимание уделяется 1-часовой гликемии при оральном глюкозотолерантном тесте как более чувствительному маркеру ранней дисгликемии. Интерес к этому показателю связан с тем, что 1-часовая точка в большей степени отражает ранние нарушения постпрандиального углеводного обмена, сочетающие снижение чувствительности тканей к инсулину и дефект ранней фазы инсулиновой секреции. В 2024 году Международная диабетическая федерация представила позиционный документ, в котором 1-часовая постнагрузочная гликемия была предложена как дополнительный инструмент для выявления промежуточной гипергликемии и сахарного диабета 2 типа; в качестве порога для промежуточной гипергликемии предложено значение 155 мг/дл (8,6 ммоль/л) [1].

Клинико-диагностическая ценность 1-часовой гликемии определяется тем, что ее повышение нередко выявляется у лиц с нормальной или пограничной 2-часовой гликемией. По данным IDF, среди людей с нормальной гликемией натощак и нормальной 2-часовой гликемией доля лиц с повышенной 1-часовой гликемией может быть значительной, особенно в группах высокого риска, включая лиц с ожирением [1]. Это указывает на возможность существования скрытого метаболического неблагополучия, не выявляемого стандартными диагностическими критериями.

Патофизиологически повышение 1-часовой гликемии отражает ранний дисбаланс между инсулинорезистентностью и секреторным ответом β -клеток. На фоне ожирения, особенно абдоминального, усиливается поступление свободных жирных кислот, возрастает уровень провоспалительных цитокинов и нарушается пострецепторная передача инсулинового сигнала. В результате уже на ранних стадиях после углеводной нагрузки формируется избыточный гликемический ответ, который может быть зафиксирован именно через 1 час после приема глюкозы. Поэтому 1-часовая гликемия рассматривается не просто как дополнительная временная точка ОГТТ, а как интегральный показатель ранней метаболической дисфункции [1, 3].

В ряде современных исследований показано, что повышенная 1-часовая гликемия ассоциируется с более выраженной инсулинорезистентностью, ухудшением функции β -клеток, атерогенными изменениями липидного спектра и более высоким риском прогрессирования к предиабету и сахарному диабету 2 типа. В исследовании, опубликованном в Diabetes Care в 2025 году, именно 1-часовая гликемия оказалась наиболее сильным предиктором перехода от нормогликемии к предиабету, а порог 120 мг/дл показал умеренную чувствительность и специфичность для выделения лиц высокого риска в исследованной популяции [4]. Это подчеркивает, что оптимальные пороговые значения могут варьировать в зависимости от характеристик обследуемой группы и задач скрининга.

Особую значимость 1-часовая гликемия приобретает у пациентов с ожирением. У этой категории больных уже на ранних этапах могут формироваться неблагоприятные кардиометаболические

изменения, включая дислипидемию, артериальную гипертензию, инсулинорезистентность и метаболически ассоциированную стеатотическую болезнь печени. Современные данные показывают, что повышенная 1-часовая гликемия связана не только с будущим риском сахарного диабета 2 типа, но и с наличием кардиометаболических и печеночных осложнений у пациентов с ожирением [1, 3, 5].

С практической точки зрения 1-часовая гликемия при ОГТТ может представлять удобный и перспективный инструмент стратификации риска. Включение этого показателя в алгоритмы обследования пациентов с ожирением и предиабетом потенциально позволяет раньше выявлять лиц с высоким риском прогрессирования нарушений углеводного обмена и своевременно начинать профилактические мероприятия. Вместе с тем вопрос о стандартизации пороговых значений, интерпретации результатов в различных популяциях и месте 1-часовой гликемии в рутинной клинической практике пока остается предметом обсуждения [1, 4].

Таким образом, 1-часовая гликемия при оральном глюкозотолерантном тесте представляет собой перспективный клиничко-диагностический маркер ранней дисгликемии у пациентов с предиабетом и ожирением. Ее изучение имеет важное научное и практическое значение, поскольку позволяет усовершенствовать раннюю диагностику, стратификацию риска и профилактику сахарного диабета 2 типа. На этом основании целью настоящей работы явился анализ клиничко-диагностического значения 1-часовой гликемии при оральном глюкозотолерантном тесте у пациентов с предиабетом и ожирением [1, 2, 4].

Цель исследования: изучить клиничко-диагностическое значение 1-часовой гликемии при оральном глюкозотолерантном тесте у пациентов с предиабетом и ожирением и определить ее роль в раннем выявлении риска развития сахарного диабета 2 типа.

Материалы и методы исследования: Исследование выполнено в формате обзорно-аналитической работы. Материалом исследования послужили современные отечественные и зарубежные научные публикации, клинические рекомендации, позиционные документы и результаты клинических исследований, посвященные диагностическому значению 1-часовой гликемии при оральном глюкозотолерантном тесте у пациентов с предиабетом и ожирением.

В ходе исследования проведён анализ литературных данных о роли 1-часовой гликемии как раннего маркера нарушений углеводного обмена. Оценивались публикации, содержащие сведения о взаимосвязи 1-часовой гликемии с инсулинорезистентностью, β -клеточной дисфункцией, ожирением, предиабетом, а также риском развития сахарного диабета 2 типа. Особое внимание уделялось сопоставлению диагностической значимости 1-часовой гликемии с традиционными показателями углеводного обмена, включая глюкозу натощак, 2-часовую гликемию при оральном глюкозотолерантном тесте и уровень гликированного гемоглобина.

В процессе анализа рассматривались клиничко-метаболические показатели, наиболее часто используемые для стратификации риска нарушений углеводного обмена у пациентов с ожирением, в том числе индекс массы тела, окружность талии, показатели липидного спектра, уровень глюкозы натощак, HbA1c, а также результаты орального глюкозотолерантного теста с акцентом на 1-часовую точку измерения.

Методологическую основу исследования составили библиографический, аналитический, сравнительный и обобщающий методы. Отобранные источники были систематизированы по их клинической, диагностической и прогностической значимости. На основании проведённого анализа определена роль 1-часовой гликемии при оральном глюкозотолерантном тесте в раннем выявлении пациентов с предиабетом и ожирением, имеющих высокий риск развития сахарного диабета 2 типа.

Результаты исследования: Проведённый анализ современной научной литературы показал, что 1-часовая гликемия при оральном глюкозотолерантном тесте обладает высокой клиничко-диагностической значимостью у пациентов с предиабетом и ожирением. Установлено, что данный показатель является более чувствительным маркером ранних нарушений углеводного обмена по сравнению с традиционными критериями, такими как глюкоза натощак, 2-часовая гликемия и уровень гликированного гемоглобина. Повышение 1-часовой гликемии отражает ранние проявления инсулинорезистентности и нарушения функции β -клеток поджелудочной железы, что позволяет выявлять пациентов группы высокого риска ещё на доклинической стадии метаболических нарушений.

Анализ публикаций свидетельствует о том, что у пациентов с ожирением повышение 1-часовой гликемии тесно связано с более выраженными проявлениями метаболической дисфункции. У данной категории больных чаще выявляются абдоминальное ожирение, дислипидемия, повышение уровня триглицеридов, снижение холестерина липопротеинов высокой плотности, инсулинорезистентность и начальные нарушения секреции инсулина. При этом у части пациентов показатели глюкозы натощак и 2-часовой гликемии могут оставаться в пределах допустимых значений, тогда как 1-часовая

гликемия уже свидетельствует о наличии неблагоприятного метаболического профиля. Это подтверждает её значимость как раннего маркера скрытой дисгликемии у больных с ожирением.

Установлено, что повышение 1-часовой гликемии ассоциируется не только с риском прогрессирования предиабета, но и с более высоким риском формирования сахарного диабета 2 типа в дальнейшем. В ряде исследований показано, что данный показатель связан с ухудшением чувствительности тканей к инсулину, снижением компенсаторных возможностей β -клеток и развитием кардиометаболических нарушений. Это позволяет рассматривать 1-часовую гликемию как важный прогностический критерий, отражающий раннее нарушение гомеостаза глюкозы у пациентов с ожирением и предиабетом.

Сопоставление 1-часовой гликемии с традиционными показателями углеводного обмена показало, что наибольшая диагностическая ценность достигается при комплексной оценке результатов орального глюкозотолерантного теста. Включение 1-часовой точки измерения позволяет повысить информативность теста и расширить возможности ранней стратификации риска. Особую практическую значимость данный подход имеет у пациентов с ожирением, у которых стандартные лабораторные показатели не всегда отражают истинную степень метаболических нарушений.

Таким образом, результаты проведённого анализа показывают, что 1-часовая гликемия при оральном глюкозотолерантном тесте является информативным ранним клинико-диагностическим маркером нарушений углеводного обмена у пациентов с предиабетом и ожирением. Её определение способствует более раннему выявлению лиц с высоким риском развития сахарного диабета 2 типа, что создаёт основу для своевременного проведения профилактических и лечебных мероприятий, направленных на предупреждение прогрессирования метаболических нарушений.

Выводы: 1-часовая гликемия при оральном глюкозотолерантном тесте является информативным ранним клинико-диагностическим маркером нарушений углеводного обмена у пациентов с предиабетом и ожирением. Её повышение отражает ранние проявления инсулинорезистентности, ухудшение функции β -клеток поджелудочной железы и формирование неблагоприятного метаболического профиля. В отличие от традиционных показателей, таких как глюкоза натощак, 2-часовая гликемия и HbA1c, 1-часовая гликемия позволяет выявлять скрытые нарушения углеводного обмена на более ранних этапах, что повышает её диагностическую ценность в стратификации пациентов группы высокого риска по развитию сахарного диабета 2 типа.

Практическая значимость определения 1-часовой гликемии заключается в возможности более раннего выявления пациентов с ожирением и предиабетом, нуждающихся в активных профилактических и лечебных мероприятиях. Наибольшую клинико-прогностическую ценность имеет комплексная оценка результатов орального глюкозотолерантного теста в сочетании с антропометрическими и биохимическими показателями. Включение 1-часовой точки измерения в алгоритмы обследования пациентов с ожирением может способствовать совершенствованию ранней диагностики, предупреждению прогрессирования предиабета и снижению риска формирования сахарного диабета 2 типа.

Список литературы:

1. Bergman M., Abdul-Ghani M., Aldasouqi S., et al. International Diabetes Federation Position Statement on the 1-hour post-load plasma glucose for the diagnosis of intermediate hyperglycaemia and type 2 diabetes // *Diabetes Research and Clinical Practice*. 2024. Vol. 210. Art. 111636.
2. American Diabetes Association Professional Practice Committee. Diagnosis and classification of diabetes: Standards of Care in Diabetes—2025 // *Diabetes Care*. 2025. Vol. 48, Suppl. 1. P. S27–S49. DOI: 10.2337/dc25-S002.
3. Liu X., Peng Z., Ma S., Liu F., Liu M., Li X., Zheng R. Value of elevated 1-hour post-load plasma glucose level in identifying risk of MAFLD in non-diabetic obese children and adolescents // *BMC Pediatrics*. 2025. Vol. 25. Art. 700. DOI: 10.1186/s12887-025-05943-8.
4. Abdul-Ghani M., Tripathy D., DeFronzo R.A., et al. One-Hour Plasma Glucose Predicts the Progression From Normoglycemia to Prediabetes // *Diabetes Care*. 2025. Vol. 48, No. 7. P. 1273–1280.
5. Guo Q., Lv L., Yang X., Chen M., Chen C., Chen T., Xu L., Shen Q., Gu P., Shao J. 1-hour post-load plasma glucose: a reliable marker of insulin resistance in type 2 diabetes, as determined by the TyG index // *Frontiers in Endocrinology*. 2025. Vol. 16. Art. 1671040. DOI: 10.3389/fendo.2025.1671040

Для цитирования: Курбанова Н.С. Клинико-диагностическое значение 1-часовой гликемии при оральном глюкозотолерантном тесте у пациентов с предиабетом и ожирением // *Вестник фундаментальной и клинической медицины*. – 2026. – № 4(24). – С. 221–224. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19482750>

ЗООНОЗ ТЕРИ ЛЕЙШМАНИОЗИНИНГ КЛИНИК КЕЧИШ ХУСУСИЯТЛАРИ**Вахобов А.А.**

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Ўзбекистон шароитида тери лейшманиозининг клиник ва эпидемиологик хусусиятларини комплекс равишида ёш ва ижтимоий омилларни ҳисобга олган ҳолда ўрганишга бағишланган ишлар етарли бўлмаганлиги унинг клиник-эпидемиологик хусусиятларини замонавий талаблар асосида қайта таҳлил қилиш, янги маълумотлар билан бойитиш ва амалиёт учун аҳамиятли хулосалар чиқариш зарурати мавжуд. Ишнинг мақсади зооноз тери лейшманиози билан оғриган беморларнинг клиник кечиш хусусиятларини ўрганишдан иборат бўлиб, тадқиқот давомида ушбу даволаш профилактика муассасаларида зооноз тери лейшманиози билан касалланган 19 ёшдан 61 ёшгача (ўртача ёш 39 ёшни ташиқил этди) бўлган 70 нафар беморлар текширилган. Беморларда шиқоятлар асосан маҳаллий аҳамият касб этди, яъни яра атрофида оғриқ ва шиш, гиперестезия ва қўшимча тугунлар пайдо бўлиши билан намоён бўлди. Зооноз тери лейшманиозидида ўртача $4,6 \pm 1,1$ та яра тўғри келиб, беморларда лимфангоит ва лимфаденит каби асоратлар кузатилиб, 30% ташиқил этди.

Калим сўзлар: лейшманиоз, антропоноз тери лейшманиози, яра, клиника.

FEATURES OF THE CLINICAL CURRENT OF ZOONOUS SKIN LEISHMANIOSIS**Vakhobov A.A.**

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. Due to the insufficiency of works devoted to a comprehensive study of the clinical and epidemiological features of cutaneous leishmaniasis in the conditions of Uzbekistan, taking into account age and social factors, there is a need to re-analyze its clinical and epidemiological features based on modern requirements, enrich it with new data, and draw important conclusions for practice. The purpose of the study was to study the features of the clinical course of patients with zoonotic cutaneous leishmaniasis, during the study, 70 patients with zoonotic cutaneous leishmaniasis aged 19 to 61 years were examined in these treatment and prevention institutions (the average age was 39 years). Complaints in patients were predominantly local in nature, i.e., they manifested as pain and swelling around the wound, hyperesthesia, and the appearance of additional nodes. In zoonotic cutaneous leishmaniasis, there were on average 4.6 ± 1.1 ulcers, such complications as lymphangitis and lymphadenitis were observed in patients, which amounted to 30%.

Keywords: leishmaniasis, anthroponotic cutaneous leishmaniasis, ulcer, clinical presentation.

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ ЗООНОЗНОГО КОЖНОГО ЛЕЙШМАНИОЗА**Вахобов А.А.**

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. В связи с недостаточностью работ, посвященных комплексному изучению клинко-эпидемиологических особенностей кожного лейшманиоза в условиях Узбекистана с учетом возрастных и социальных факторов, существует необходимость переанализировать его клинко-эпидемиологические особенности на основе современных требований, обогатить новыми данными и сделать важные для практики выводы. Целью работы явилось изучение особенностей клинического течения больных с зоонозным лейшманиозом кожи, в ходе исследования в данных лечебно-профилактических учреждениях обследовано 70 больных с зоонозным лейшманиозом кожи в возрасте от 19 до 61 года (средний возраст составил 39 лет). Жалобы у больных носили преимущественно местный характер, т.е. проявлялись болью и отеком вокруг раны, гиперестезией и появлением дополнительных узлов. При зоонозном кожном лейшманиозе в среднем было $4,6 \pm 1,1$ язвы, у больных наблюдались такие осложнения, как лимфангоит и лимфаденит, что составило 30%.

Ключевые слова: лейшманиоз, антропонозный кожный лейшманиоз, язва, клиника.

e-mail: aziz_vahobov1986@mail.ru

Мавзунинг долзарблиги: Тери лейшманиози узок йиллар давомида жаҳон ва минтақавий тиббиёт илмида тадқиқ этиб келинаётган паразитар касалликлардан бири ҳисобланади. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти ҳамда қатор халқаро тадқиқотларида тери лейшманиози табиий-ўчоқли, вектор орқали юкадиган, ижтимоий аҳамияти юқори бўлган касаллик сифатида тавсифланган [1].

Хорижий муаллифлар томонидан тери лейшманиози эпидемиологияси, клиник шакллари ва кўзғатувчиларининг биологик хусусиятлари кенг ўрганилган бўлиб, *Leishmania major* ва *Leishmania tropica* турларининг тарқалиши, клиник кечиши ва географик хусусиятлари бўйича қатор фундаментал ишлар мавжуд [2, 3, 4].

Марказий Осиё минтақасида, жумладан Қозоғистон, Туркменистон ва Ўзбекистон ҳудудларида тери лейшманиози зоонотик шаклда кенг тарқалгани бир қатор илмий ишларда қайд этилган [5, 6].

Республика ҳудудида касалликнинг эпидемиологик хусусиятлари, айрим клиник кўринишлари ва мавсумийлиги бўйича қатор илмий ишлари мавжуд [7, 8, 9, 10].

Шу билан бирга, мавжуд тадқиқотларни таҳлил қилиш шуни кўрсатадики, Ўзбекистон шароитида тери лейшманиозининг клиник ва эпидемиологик хусусиятларини комплекс равишда, ҳудудий, ёш ва ижтимоий омилларни ҳисобга олган ҳолда ўрганишга бағишланган ишлар етарли эмас. Шу муносабат билан тери лейшманиозининг клиник-эпидемиологик хусусиятларини замонавий талаблар асосида қайта таҳлил қилиш, янги маълумотлар билан бойитиш ва амалиёт учун аҳамиятли хулосалар чиқариш зарурати мавжуд.

Ишнинг мақсади зооноз тери лейшманиози билан оғриган беморларнинг клиник кечиш хусусиятларини ўрганишдан иборат.


Материал ва услублар: Тадқиқот давомида ушбу даволаш профилактика муассасаларида зооноз тери лейшманиози (ЗТЛ) билан касалланган 19 ёшдан 61 ёшгача (ўртача ёш 39 ёшни ташкил этди) бўлган 70 нафар беморлар текширилган. Тадқиқот гуруҳида аёллар 76 (54,2%), эркеклар 64 (45,8%) кишини ташкил этди. Беморларнинг ёши бўйича тақсимланиши эса қуйидагича бўлди: 19-29 ёшдагилар – 34 (24,2%), 30-39 ёшдагилар – 41 (29,2%), 40-49 ёшдагилар – 32 (22,8%), 50-59 ёшдагилар – 23 (16,4%), 60 ёш ва ундан катталар 10 (7,1%) нафар. Касалланишнинг катта қисми 19-49 ёшдагиларга тўғри келди – 107 (76,4%) нафар. Беморлар тасодифий танлов асосида йилнинг барча фаслларида текширилган.

Қон намуналарида лейкоцитлар (WBC), лимфоцитлар (LYM), мононуклеар ҳужайралар (MONO), нейтрофиллар (NEU), эозинофиллар (EOS) сонини аниқлаш BC-20S (Mindray, Хитой) автоматик гематологик анализатори ёрдамида гематологик параметрлар бўйича ўрганилди. Тери лейшманиози ташхиси кўзғатувчининг (*Leishmania*) тери яралари четларидан олинган қирмаларда ёки биоптатларда топилиши билан тасдиқланади.

Олинган натижалар ва уларнинг муҳокамаси. Кузатув остидаги 140 нафарда ЗТЛ ташхиси қўйилган. Тадқиқотимизнинг кейинги босқичида беморларда касалликнинг клиник кечиш хусусиятларини ўргандик.


ЗТЛ беморларда қуйидаги шикоятлар бўлди: иситма кўтарилиши – 7,1%, умумий ҳолсизлик – 35,7%, яра атрофида оғриқ бўлиши – 40%, яра атрофида шиш – 35,7%, яра атрофида гиперестезия – 24,2%, асосий яра атрофида қўшимча тугунларни пайдо бўлиши – 20%.

1-расмда ЗТЛ беморларда клиник шикоятларнинг тарқалиши акс эттирилган. Энг кўп учраган шикоятлар яра атрофида оғриқ (40,0%), умумий ҳолсизлик ва яра атрофида шиш (35,7%) бўлиб, иситма кўтарилиши нисбатан кам ҳолларда (7,1%) кузатилди.



1-расм. Зооноз тери лейшманиози билан оғриган беморларда кузатилган асосий клиник шикоятлар (%)

ЗТЛ беморларнинг 15,7% лимфаденит асорати кузатилди. Лимфаденит аниқланган беморларда яра жойлашган жойга яқин соҳаларда, яъни тақим ости чуқурчаси, тирсак чуқурчасидаги, чов ва бўйин соҳасидаги лимфа тугунлари катталашганлиги аниқланди. Беморларда лимфа тугунлари катталиги мош ва ловия катталигидек бўлиб, атроф тўқима бир оз шишган, пайпаслаганда шиш соҳаси бир оз оғриқли, лимфа тугуни устидаги тери ранги ўзгармаган. Лимфангоит асорати кузатилган 21,4% беморларда яра атрофидаги лимфа томири бўйлаб 5 тадан 7 тагача инфильтрацияланган лимфа тугунлари аниқланди, лимфа томири бўйлаб гиперемия кузатилди, инфильтрат ва лимфа томири бўйлаб оғриқ аниқланди.



2-расм. Асоратланмаган зоноз тери лейшманиозда яраларнинг анатомик жойлашуви (%)

ЗТЛ нинг асоратланмаган яралари шакли ($n=49$) аниқланган беморларда яралар 13 (26,5%) нафар беморларда билак соҳасида, 10 (20,4%) нафар беморларда қўл кафт усти соҳасида, 9 (18,3%) нафар беморларда болдир соҳасида, 8 (16,3%) нафар беморларда юз соҳасида, 7 (14,2%) нафар беморларда оёқ кафт усти соҳасида, 2 (4,1%) нафар беморда қорин олд девори соҳасида жойлашган. Яралар сони эса қуйидагича бўлган: 7 нафар – 1 та яра, 5 нафар – 2 та яра, 6 нафар – 3 та яра, 11 нафар – 4 та яра, 17 нафар – 5 та яра, 6 та яра – 1 нафар, 7 та яра – 2 нафар беморда.

2-расм маълумотларига кўра, асоратланмаган ЗТЛда яралар асосан очик соҳаларда жойлашиб, энг кўп ҳолларда билак соҳасида (26,5%) ва қўл кафт устида (20,4%) аниқланган. Қорин олд девори соҳасида яралар нисбатан кам (4,1%) учраган.

ЗТЛ нинг асоратланган яралари шакли 8 (38,1%) нафар беморда билак ички соҳасида, 7 (33,3%) нафар беморларда болдир соҳасида, 3 (14,2%) нафар беморларда қўл кафт усти соҳасида, 2 (9,5%) нафар беморларда оёқ кафт усти соҳасида, 1 (4,7%) нафар беморда юзда жойлашганлиги аниқланди.

Тадқиқотнинг кейинги босқичида биз, беморларда лаборатор кўрсаткичларни ўргандик. Умумий қон таҳлили ўрганилганида, ЗТЛ беморларнинг 17 (24,3%) нафарида I даражали гипохром камқонлилик белгилари аниқланди, ушбу беморларда гемоглобиннинг ўртача қиймати $100,0 \pm 1,03$ г/л бўлди, II даражали гипохром камқонлилик белгилари 10 (14,3%) нафар беморларда аниқланди, гемоглобиннинг ўртача қиймати $82,5 \pm 1,3$ г/л ташкил қилди, 33 (47,1%) нафар беморларда гемоглобин кўрсаткичи меъёرنинг минимал даражасида бўлди. ЗТЛ беморларда эритроцитлар ўртача – $3,7 \pm 0,07 \times 10^{12}/л$, ранг кўрсаткичи – $0,82 \pm 0,01$ ни ташкил қилди.

Кузатувдаги беморларнинг барчасида касаллик туридан қатъий назар эозинофиллар қийматини меърдан ошиши кузатилиб, ЗТЛ беморларда $5,0 \pm 0,28\%$ ташкил қилди. Кузатувдаги беморларда ЭЧТ миқдори касаллик туридан қатъий назар меъёр даражасида бўлди, ЗТЛ беморларда – $7,25 \pm 0,65$ мм/соат. Қолган кўрсаткичлар меъёр чегарасида бўлди.

Шундай қилиб, ЗТЛ беморларининг 30,0% да асоратлар кузатилди. ЗТЛ беморларда шикоятлар асосан маҳаллий аҳамият касб этиб, яра атрофида оғриқ ва гиперестезия, яра атрофида шиш, қўшимча тугунчаларни бўлиши кабилар сифатида намоён бўлди. Яраларнинг сони бўйича таҳлил қилинганда ЗТЛ да 1 та беморга ўртача $3,7 \pm 0,3$ та яра тўғри келди. Асоратлар асосан лимфангоит, лимфаденит кўринишида намоён бўлди. Тери лейшманиози касаллик турига боғлиқ бўлмаган ҳолда умумий қон таҳлилида эозинофиллар миқдори меърдан ошиши билан кечди.

Хулоса. Беморларда шикоятлар асосан маҳаллий аҳамият касб этди, яъни яра атрофида оғрик ва шиш, гиперестезия ва қўшимча тугунлар пайдо бўлиши билан намоён бўлди. Зооноз тери лейшманиозиди ўртача $4,6 \pm 1,1$ та яра тўғри келиб, беморларда лимфангоит ва лимфаденит каби асоратлар кузатилиб, бу кўрсаткич 30% ташкил этди.

Адабиётлар рўйхати:

1. World Health Organization. Leishmaniasis – Epidemiological situation. WHO, 2023.
2. Desjeux P. Leishmaniasis: current situation and new perspectives. *Comp Immunol Microbiol Infect Dis.* 2004 Sep;27(5):305-18.
3. Alireza Sanei-Dehkordi, Moussa Soleimani-Ahmadi, Mehdi Zare, Hadi Mirzaei, Epidemiological features of cutaneous leishmaniasis and distribution of sand flies in an endemic area in southeast of Iran, *Parasite Epidemiology and Control*, Volume 14, 2021, e00220,
4. Iqbal W, Iram U, Nisar S, Musa N, Alam A, Khan MR, Ullah B, Ullah M, Ali I. Epidemiology and clinical features of cutaneous leishmaniasis in Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan. *Braz J Biol.* 2022 Aug 8;84:e249124.
5. Рахматов.О.Б., Хушвақтова М.Ф. Тери лейшманиози билан оғриган беморларда эрта ташхислаш ва даволаш усуллари тақомиллаштириш // Тиббиётда янги кун. - Ташкент, 2019.- № 2 (26). - С. 272-275.
6. Raxmatov O.B., Obloqulov A.R. Evaluation of changes in blood lymphocytes when using gepon immunomodulators in patients with skin leishmaniosis. // Тиббиётда янги кун. - Ташкент, 2022.- № 2 (40). - С. 76-80.
7. Анваров Ж.А., Ахмедова М.Д., Абдиев Ф.Т. Тери лейшманиозининг даволаш усуллари // Инфекция, иммунитет и фармакология. – Ташкент, 2016. Спец. выпуск. – С. 17-25.
8. Муратов Т.И., Сувонкулов У.Т., Садиков З.Ю., Ачилова О.Д., Анваров Ж.А., Аслонов М.Н. Современные эпидемиологические аспекты кожных лейшманиозов в Узбекистане // Вестник Ташкентской медицинской академии. – Ташкент, 2018. №1, – С. 29-31.
9. Raxmatov O.B., Obloqulov A.R. Evaluation of changes in blood lymphocytes when using gepon immunomodulators in patients with skin leishmaniosis. // Тиббиётда янги кун. - Ташкент, 2022.- № 2 (40). - С. 76-80.
10. Maxmudov.F.A., Rakhmatov O.B., Latipov I.I., Rustamov.M.K., Sharopova.G.S. Intravenous laser blood irradiation in the complex treatment of patients with cutaneous leishmaniasis // *Journal of Natural Remedies*, - Volume 22, Issue 1, - 2021. P.108-111.

Иқтибос учун: Вахобов А.А. Зооноз тери лейшманиозининг клиник кечиш хусусиятлари // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2026. – № 4(24). – Б. 225–228. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19482899>

ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ В СОЧЕТАНИИ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ: КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННАЯ ТЕРАПИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Губайдулина Г.Р.

Бухарский государственный медицинский институт им. Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) и туберкулез (ТБ) остаются одними из наиболее значимых глобальных проблем здравоохранения, внося существенный вклад в заболеваемость и смертность во всем мире. В данном обзоре представлен анализ коинфекции ВИЧ-ассоциированного туберкулеза с акцентом на особенности патогенеза, клинической картины, диагностики и лечения. ВИЧ-инфекция повышает риск развития активного туберкулеза вследствие прогрессирующей иммуносупрессии, что существенно осложняет своевременное выявление заболевания и выбор оптимальной терапии. В обзоре рассмотрены современные диагностические подходы, включая молекулярно-генетические методы и стратегии скрининга, а также принципы лечения с интеграцией антиретровирусной и противотуберкулезной терапии. Особое внимание уделено проблемам лекарственных взаимодействий, побочных эффектов и приверженности лечению. Также обсуждаются вопросы профилактики, влияние социально-экономических факторов и организационные аспекты оказания медицинской помощи пациентам с коинфекцией ВИЧ и туберкулеза.

Ключевые слова: ВИЧ, туберкулез, коинфекция ВИЧ-ТБ, антиретровирусная терапия, диагностика, клиническое ведение, лечение.

HIV INFECTION AND CO-OCCURRING PULMONARY TUBERCULOSIS: CURRENT CLINICAL AND LABORATORY FEATURES AND PERSONALIZED THERAPY

Gubaydulina G.R.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. Human immunodeficiency virus (HIV) and tuberculosis (TB) remain among the most significant global health problems, contributing significantly to morbidity and mortality worldwide. This review presents an analysis of HIV-associated co-infection with an emphasis on the features of the pathogenesis, clinical picture, diagnosis, and treatment. HIV infection increases the risk of developing active tuberculosis due to progressive immunosuppression, which significantly complicates the timely detection of the disease and the selection of optimal therapy. The review examines modern diagnostic approaches, including molecular genetic methods and screening strategies, as well as treatment principles with integration of antiretroviral and anti-tuberculosis therapy. Particular attention was paid to the problems of drug interactions, side effects, and adherence to treatment. The issues of prevention, the impact of socio-economic factors, and the organizational aspects of providing medical care to patients with HIV co-infection and tuberculosis are also discussed.

Keywords: HIV, tuberculosis, HIV-TB coinfection, antiretroviral therapy, diagnosis, clinical management, treatment.

ЎПКА СИЛИ БИЛАН БИРГА КЕЧАДИГАН ОИВ ИНФЕКЦИЯСИ: ҲОЗИРГИ БОСҚИЧДАГИ КЛИНИК-ЛАБОРАТОР ХУСУСИЯТЛАР ВА ИНДИВИДУАЛЛАШТИРИЛГАН ТЕРАПИЯ

Губайдулина Г.Р.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Одамнинг иммунитет танқислиги вируси (ОИВ) ва сил касаллиги (ТБ) дунё миқёсида касалланиш ва ўлим даражасига салмоқли ҳисса қўшиб, соғлиқни сақлашнинг энг долзарб глобал муаммоларидан бири бўлиб қолмоқда. Ушбу шарҳда ОИВ билан боғлиқ сил коинфекциясининг патогенези, клиник манзараси, диагностикаси ва даволаш хусусиятларига алоҳида эътибор қаратилган ҳолда таҳлили келтирилган. ОИВ инфекцияси кучайиб борувчи иммуносупрессия туфайли фаол сил касаллигининг ривожланиши хавфини оширади, бу эса касалликни ўз вақтида аниқлаш ва мақбул терапияни танлашни сезиларли даражада қийинлаштиради. Шарҳда замонавий диагностика ёндашувлари, жумладан, молекуляр-генетик усуллар ва скрининг стратегиялари, шунингдек, антиретровирус ҳамда силга қарши терапияни интегратсиялашга асосланган даволаш тамойиллари кўриб чиқилган. Дори воситаларининг ўзаро таъсири, ножўя таъсирлари ва даволашга

содиқлик масалаларига алоҳида эътибор берилган. Шунингдек, профилактика масалалари, ижтимоий-иқтисодий омилларнинг таъсири ҳамда ОИВ ва сил коинфекциясига чалинган беморларга тиббий ёрдам кўрсатишнинг ташкилий жиҳатлари муҳокама қилинади.

Калит сўзлар: ОИВ, сил, ОИВ-сил коинфекцияси, антиретровирус терапия, диагностика, клиник бошқарув, даволаш.

e-mail: gulmira.gubaydulina@bsmi.uz

Актуальность. Взаимосвязь ВИЧ-инфекции и туберкулеза представляет собой одну из наиболее сложных проблем общественного здравоохранения вследствие их взаимно отягощающего влияния. Лица, живущие с ВИЧ, имеют значительно более высокий риск развития активного туберкулеза по сравнению с ВИЧ-негативными пациентами [1]. Данный риск обусловлен прежде всего иммунодефицитом, вызванным ВИЧ-инфекцией, который нарушает способность организма контролировать латентную туберкулезную инфекцию и эффективно противостоять активному туберкулезному процессу. В результате сочетанное течение этих заболеваний существенно осложняет диагностику и лечение, ассоциируется с более тяжелыми клиническими исходами и повышенной летальностью.

Лечение туберкулеза, ассоциированного с ВИЧ (ВИЧ-ТБ), требует учета ряда сложных клинических аспектов, включая лекарственные взаимодействия между противотуберкулезными препаратами и антиретровирусной терапией, риск развития нежелательных побочных эффектов, а также необходимость строгого соблюдения режимов комбинированного лечения [2]. Изучение коинфекции ВИЧ и туберкулеза имеет принципиальное значение в связи с ее выраженным влиянием на показатели общественного здоровья и нагрузку на системы здравоохранения. Сложности своевременной диагностики и оптимального лечения данной коинфекции требуют углубленного понимания патогенетических механизмов их взаимодействия с целью улучшения клинических исходов [3]. Разработка и внедрение эффективных стратегий ведения пациентов возможны на основе комплексного анализа взаимодействия ВИЧ-инфекции и туберкулеза.

Целью настоящего обзора является представление современного состояния проблемы коинфекции ВИЧ и туберкулеза, анализ клинических трудностей и обсуждение последних достижений в области лечения [1]. Обобщение современных данных, терапевтических подходов и аспектов общественного здравоохранения направлено на совершенствование клинической практики и формирование эффективной политики здравоохранения, ориентированной на снижение глобального бремени ВИЧ-инфекции и туберкулеза.

Взаимодействие ВИЧ и *Mycobacterium tuberculosis*. Взаимодействие вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) и *Mycobacterium tuberculosis* (*M. tuberculosis*) играет ключевую роль в патофизиологии ВИЧ-ассоциированного туберкулеза. ВИЧ преимущественно поражает CD4⁺ Т-лимфоциты, вызывая их прогрессирующее истощение и формирование выраженной иммуносупрессии. Снижение количества CD4⁺ Т-клеток приводит к нарушению клеточного иммунного ответа и снижает способность организма эффективно противостоять инфекционным агентам, включая возбудителя туберкулеза. По мере прогрессирования иммунодефицита возрастает восприимчивость как к первичному инфицированию *M. tuberculosis*, так и к реактивации латентной туберкулезной инфекции [4].

Кроме того, ВИЧ-инфекция оказывает существенное влияние на функциональную активность других компонентов иммунной системы, включая макрофаги и дендритные клетки, играющие ключевую роль в распознавании, фагоцитозе и контроле микобактерий туберкулеза. Инфицированные ВИЧ макрофаги характеризуются снижением фагоцитарной активности, нарушением внутриклеточного уничтожения микобактерий и изменением продукции цитокинов, что способствует выживанию и внутриклеточной репликации *M. tuberculosis* [5]. Нарушение функции дендритных клеток дополнительно приводит к снижению эффективности презентации антигена и ослаблению специфического Т-клеточного ответа.

Совместное воздействие ВИЧ и *M. tuberculosis* формирует синергическое патогенетическое взаимодействие, способствующее более быстрому прогрессированию обоих заболеваний. У пациентов с коинфекцией значительно повышается риск развития активного туберкулеза, при этом вероятность реактивации латентной инфекции существенно возрастает [6]. Формируется порочный круг: ВИЧ-инфекция повышает восприимчивость к туберкулезу, тогда как туберкулез, в свою очередь, усиливает иммунную активацию и может ускорять репликацию ВИЧ и прогрессирование заболевания до стадии синдрома приобретенного иммунодефицита (СПИД).

Таким образом, коинфекция ВИЧ и туберкулеза ассоциируется с более тяжелым клиническим течением, повышенными показателями заболеваемости и смертности, что подчеркивает необходи-

мость разработки эффективных стратегий ранней диагностики и комплексного лечения данной категории пациентов [6].

Сопутствующая ВИЧ-инфекция существенно ускоряет прогрессирование туберкулеза посредством ряда патогенетических механизмов. Иммунодефицитное состояние у ВИЧ-инфицированных пациентов создает благоприятные условия для активного размножения и гематогенного распространения *Mycobacterium tuberculosis*. Ускоренное прогрессирование инфекции нередко приводит к развитию тяжелых клинических форм заболевания, включая диссеминированный и внелегочный туберкулез, которые ассоциируются с неблагоприятными клиническими исходами и повышенной летальностью [7].

Кроме того, выраженная воспалительная реакция, индуцированная туберкулезной инфекцией, может способствовать развитию синдрома воспалительной реакции восстановления иммунитета (immune reconstitution inflammatory syndrome — IRIS) после начала антиретровирусной терапии (АРТ). При развитии IRIS восстановление иммунной функции сопровождается чрезмерной воспалительной реакцией на персистирующую микобактериальную инфекцию, что приводит к клиническому ухудшению состояния пациента, увеличению заболеваемости и усложняет ведение коинфекции ВИЧ и туберкулеза [7].

Иммунологические взаимодействия при коинфекции ВИЧ и туберкулеза являются сложными и многофакторными. Помимо прогрессирующего истощения CD4⁺ Т-лимфоцитов, ВИЧ-инфекция нарушает функциональную активность других иммунокомпетентных клеток, включая CD8⁺ Т-лимфоциты и натуральные киллеры (НК-клетки), играющие важную роль в контроле микобактериальной инфекции [8].

Данная иммунная дисрегуляция дополнительно ослабляет противотуберкулезный иммунитет, способствуя более быстрому и тяжелому течению заболевания по сравнению с иммунокомпетентными пациентами.

Кроме того, провоспалительные цитокины, вырабатываемые в ответ на туберкулезную инфекцию, могут усиливать репликацию ВИЧ и негативно влиять на противовирусный иммунный ответ. Таким образом, формируется неблагоприятная взаимно усиливающаяся патогенетическая связь, при которой каждая из инфекций способствует прогрессированию другой, что приводит к ухудшению клинических исходов и повышению риска смертности у пациентов с коинфекцией ВИЧ и туберкулеза [8].

Клиническая картина. Клинические проявления туберкулеза у пациентов с ВИЧ-инфекцией характеризуются значительным полиморфизмом и нередко отличаются от типичной картины заболевания у иммунокомпетентных лиц. Наиболее распространенными симптомами ВИЧ-ассоциированного туберкулеза являются кашель (часто с мокротой или кровохарканьем), продолжающийся более трех недель, лихорадка, ночная потливость, снижение массы тела и выраженная слабость. Вместе с тем до 50% людей, живущих с ВИЧ и получающих антиретровирусную терапию (АРТ), могут иметь малосимптомное или бессимптомное течение туберкулеза, что существенно затрудняет своевременную диагностику [9].

Рентгенологическая картина органов грудной клетки у ВИЧ-инфицированных пациентов также часто носит атипичный характер. В отличие от классического поражения верхних долей легких, чаще выявляются инфильтраты в нижних отделах, внутригрудная лимфаденопатия, интерстициальные изменения и плевральный выпот. Кроме того, у пациентов с ВИЧ-инфекцией реже формируются кавернозные изменения, что снижает диагностическую информативность стандартной микроскопии мокроты [10].

Диагностика туберкулеза у ВИЧ-инфицированных пациентов представляет значительные трудности. Это связано с более низкой частотой бактериовыделения, высокой долей мазок-негативных форм заболевания и ограниченной чувствительностью микроскопии мокроты. Дополнительные сложности обусловлены повышенной частотой внелегочных форм туберкулеза, а также сходством клинических проявлений с другими оппортунистическими инфекциями, характерными для поздних стадий ВИЧ-инфекции [11].

Риск развития внелегочного туберкулеза возрастает по мере снижения уровня CD4⁺ Т-лимфоцитов. Наиболее часто поражаются периферические лимфатические узлы, плевра, центральная нервная система, перикард, а также кости и суставы. На поздних стадиях ВИЧ-инфекции чаще наблюдается диссеминированный туберкулез с поражением нескольких органов и систем. В ряде случаев диагноз внелегочного туберкулеза устанавливается на основании клинико-инструментальных данных без бактериологического подтверждения [12].

Современные методы диагностики, включая молекулярно-генетические тесты Xpert MTB/RIF Ultra и определение липоарабиноманнана (LF-LAM) в моче методом иммунохроматографического анализа, повышают чувствительность выявления туберкулеза у ВИЧ-инфицированных пациентов, особенно при выраженной иммуносупрессии. Несмотря на внедрение этих технологий, значительная часть случаев ВИЧ-ассоциированного туберкулеза по-прежнему диагностируется на основании клинических и рентгенологических данных без микробиологического подтверждения [13].

Диагностические подходы. Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) рекомендуют проводить рутинное тестирование на ВИЧ у всех лиц в возрасте от 13 до 64 лет в рамках стандартной медицинской помощи. Пациентам с повышенным риском инфицирования ВИЧ показано более частое обследование — ежегодно или каждые 3–6 месяцев. Эффективным подходом считается скрининг по принципу «опт-аут», при котором пациент информируется о проведении тестирования на ВИЧ и имеет возможность отказаться. Такой подход способствует снижению стигматизации и обеспечивает более раннюю диагностику инфекции [14].

Диагностика туберкулеза у ВИЧ-инфицированных пациентов основана на комплексном применении лабораторных и инструментальных методов, включая микроскопию мазка мокроты, культуральное исследование на *Mycobacterium tuberculosis*, рентгенографию органов грудной клетки и тесты амплификации нуклеиновых кислот (НААТ). Микроскопия мазка мокроты у ВИЧ-позитивных пациентов характеризуется ограниченной чувствительностью, что связано с низкой бактериальной нагрузкой и высокой частотой внелегочных форм туберкулеза [15]. Культуральное исследование микобактерий остается «золотым стандартом» диагностики туберкулеза, однако его применение ограничено длительным сроком получения результатов и необходимостью специализированных лабораторных условий. Рентгенография органов грудной клетки может быть полезным методом первичной оценки, но обладает недостаточной специфичностью, особенно у пациентов с поздними стадиями ВИЧ-инфекции, для которых характерны атипичные рентгенологические изменения.

Молекулярно-генетические методы, основанные на амплификации нуклеиновых кислот, такие как Xpert MTB/RIF, обеспечивают быстрое выявление *M. tuberculosis* и определение резистентности к рифампицину. Однако чувствительность данного метода может снижаться у пациентов с ВИЧ-инфекцией, особенно при мазок-негативных и внелегочных формах заболевания [16]. В связи с этим разработаны более чувствительные технологии, в частности Xpert MTB/RIF Ultra, обладающий повышенной диагностической эффективностью при ВИЧ-ассоциированном туберкулезе.

Тесты на высвобождение интерферона- γ (IGRA) могут применяться для выявления латентной туберкулезной инфекции, однако их диагностическая ценность у ВИЧ-инфицированных пациентов остается вариабельной и зависит от степени иммунодефицита. Дополнительным методом диагностики является определение липоарабиноманнана (LAM) в моче, которое позволяет быстро выявлять туберкулез у пациентов с выраженной иммуносупрессией. Данный тест включен в рекомендации Всемирной организации здравоохранения для использования у ВИЧ-инфицированных пациентов с низким уровнем CD4⁺ клеток [17]. Несмотря на значительный прогресс в области диагностики, существенная доля случаев ВИЧ-ассоциированного туберкулеза остается нераспознанной или диагностируется на поздних стадиях заболевания, что приводит к высокой заболеваемости и смертности. Современные исследования направлены на разработку более чувствительных и специфичных методов диагностики, пригодных для применения непосредственно в местах оказания медицинской помощи. Внедрение таких технологий позволит сократить сроки постановки диагноза и улучшить результаты лечения у данной уязвимой категории пациентов [18].

Ведение и лечение. Лечение ВИЧ-ассоциированного туберкулеза требует комплексного подхода, включающего одновременное проведение противотуберкулезной терапии и антиретровирусного лечения. Стандартная схема терапии лекарственно-чувствительного туберкулеза предусматривает шестимесячный курс четырех препаратов первой линии: изониазида, рифампицина, пиразинамида и этиambutола. У пациентов с ВИЧ-инфекцией, особенно при низком уровне CD4⁺ Т-лимфоцитов или тяжелом течении заболевания, продолжительность лечения может быть увеличена до 9 месяцев, в частности при внелегочных формах туберкулеза и туберкулезном менингите. В данной категории пациентов требуется тщательный мониторинг эффективности терапии и возможных побочных реакций, учитывая повышенный риск лекарственной токсичности [19].

Лечение лекарственно-устойчивого туберкулеза у ВИЧ-инфицированных пациентов представляет дополнительные трудности. Терапевтические схемы могут включать препараты второго ряда, в том числе фторхинолоны (например, моксифлоксацин) и инъекционные аминогликозиды (например, амикацин), а также другие резервные средства. Продолжительность лечения лекарственно-устойчивых форм туберкулеза обычно значительно увеличивается и может достигать 18–24 месяцев.

В связи со сложностью лечения данной категории пациентов необходим индивидуализированный подход с учетом результатов тестирования лекарственной чувствительности. Одновременно требуется координация противотуберкулезной терапии с антиретровирусным лечением для предотвращения лекарственных взаимодействий и повышения эффективности терапии [20].

Важным аспектом ведения пациентов с коинфекцией ВИЧ и туберкулеза является оптимальное время начала антиретровирусной терапии. Согласно современным рекомендациям, АРТ следует начинать в течение 2–8 недель после начала противотуберкулезного лечения, особенно у пациентов с уровнем CD4+ клеток менее 350 клеток/мм³, что позволяет снизить заболеваемость и смертность. В отдельных случаях, в частности при тяжелом течении туберкулеза или высоком риске развития синдрома воспалительной реакции восстановления иммунитета (IRIS), начало АРТ может быть отложено до стабилизации состояния пациента на фоне противотуберкулезной терапии [21].

Лекарственные взаимодействия между антиретровирусными и противотуберкулезными препаратами могут существенно осложнять лечение. Рифампицин является мощным индуктором ферментов системы цитохрома P450 и способен снижать концентрацию ряда антиретровирусных препаратов, особенно нуклеозидных ингибиторов обратной транскриптазы, таких как эфавиренз и невирапин. В качестве альтернативы могут использоваться ингибиторы интегразы, включая долутегавир или биктегравир, которые характеризуются меньшим числом лекарственных взаимодействий с рифампицином. В подобных ситуациях необходим тщательный клинико-лабораторный мониторинг эффективности терапии и переносимости препаратов [21].

Как противотуберкулезные, так и антиретровирусные препараты могут вызывать значимые побочные эффекты, включая гепатотоксичность (изониазид, рифампицин), желудочно-кишечные нарушения и неврологические реакции (в частности, периферическую нейропатию при применении изониазида). В связи с этим требуется регулярный контроль показателей функции печени, общего анализа крови и функции почек для раннего выявления и коррекции нежелательных реакций. Важным компонентом ведения пациентов является информирование о возможных побочных эффектах и необходимости своевременного обращения за медицинской помощью [22].

Рациональное управление лекарственными взаимодействиями является ключевым условием успешного лечения. Медицинские работники должны регулярно оценивать весь спектр принимаемых пациентом препаратов с целью выявления потенциальных взаимодействий. При необходимости проводится коррекция доз антиретровирусных или противотуберкулезных средств с учетом клинического ответа и переносимости терапии. В сложных случаях может применяться терапевтический лекарственный мониторинг, позволяющий оптимизировать концентрации препаратов и обеспечить максимальную эффективность лечения при минимальном риске токсичности [23, 24].

Таким образом, ведение пациентов с ВИЧ-ассоциированным туберкулезом требует интегрированного междисциплинарного подхода. Соблюдение современных протоколов лечения, своевременное назначение антиретровирусной терапии, активный мониторинг побочных эффектов и лекарственных взаимодействий позволяют существенно улучшить клинические исходы у пациентов с данной коинфекцией. Продолжающиеся исследования и совершенствование терапевтических стратегий остаются важными условиями снижения бремени коинфекции ВИЧ и туберкулеза [23].

Выводы. ВИЧ-инфекция и туберкулез представляют собой тесно взаимосвязанную коинфекцию, оказывающую значительное негативное влияние на общественное здравоохранение. Их синергическое взаимодействие существенно осложняет диагностику и лечение, ухудшая клинические исходы и увеличивая нагрузку на системы здравоохранения. Эффективное ведение ВИЧ-ассоциированного туберкулеза требует комплексного подхода, включающего раннюю диагностику, рациональное сочетание противотуберкулезной и антиретровирусной терапии, а также учет лекарственных взаимодействий и побочных эффектов. Несмотря на достигнутый прогресс, сохраняются значительные проблемы, связанные с доступностью диагностики, качеством медицинской помощи и социально-экономическими барьерами. Дальнейшее совершенствование диагностических методов, разработка оптимальных схем лечения и внедрение интегрированных программ здравоохранения являются ключевыми направлениями снижения бремени данной коинфекции. Продолжение научных исследований и развитие эффективной политики здравоохранения остаются необходимыми условиями для улучшения исходов и уменьшения глобального воздействия ВИЧ-ассоциированного туберкулеза.

Список литературы:

1. Bhatt A, Quazi Syed Z, Singh H. Converging Epidemics: A Narrative Review of Tuberculosis (TB) and Human Immunodeficiency Virus (HIV) Coinfection. Cureus. 2023 Oct 25;15(10):e47624.

2. Walker NF, Meintjes G, Wilkinson RJ. HIV-1 and the immune response to TB. *Future Virol.* 2013 Jan;8(1):57-80.
3. Bruchfeld J, Correia-Neves M, Källén G. Tuberculosis and HIV Coinfection. *Cold Spring Harb Perspect Med.* 2015 Feb 26;5(7):a017871.
4. Geldmacher C, Schuetz A, Ngwenyama N, et al. Early depletion of Mycobacterium tuberculosis-specific T helper 1 cell responses after HIV-1 infection. *J Infect Dis.* 2008 Dec 1;198(11):1590-8.
5. Abraham R, Chiang E, Haquang J, Nham A, Ting YS, Venketaraman V. The Role of Dendritic Cells in TB and HIV Infection. *J Clin Med.* 2020 Aug 17;9(8):2661.
6. Shankar EM, Vignesh R, Ellegård R, Barathan M, Chong YK, Bador MK, Rukumani DV, Sabbet NS, Kamarulzaman A, Velu V, Larsson M. HIV-Mycobacterium tuberculosis co-infection: a 'danger-couple model' of disease pathogenesis. *Pathog Dis.* 2014 Mar;70(2):110-8.
7. Azevedo-Pereira JM, Pires D, Calado M, Mandal M, Santos-Costa Q, Anes E. HIV/Mtb Co-Infection: From the Amplification of Disease Pathogenesis to an "Emerging Syndemic". *Microorganisms.* 2023; 11(4):853.
8. Février M, Dorgham K, Rebollo A. CD4+ T cell depletion in human immunodeficiency virus (HIV) infection: role of apoptosis. *Viruses.* 2011 May;3(5):586-612.
9. Hamada Y, Getahun H, Tadesse BT, Ford N. HIV-associated tuberculosis. *Int J STD AIDS.* 2021 Aug;32(9):780-790.
10. San KE, Muhamad M. Pulmonary Tuberculosis in HIV Infection: The Relationship of the Radiographic Appearance to CD4 T-Lymphocytes Count. *Malays J Med Sci.* 2001 Jan;8(1):34-40.
11. Tiamiyu AB, Iliyasu G, Dayyab FM, Habib ZG, Tambuwal SH, Animashaun AO, Galadanci H, Bwala SA, Lawson L, Habib AG. A descriptive study of smear negative pulmonary tuberculosis in a high HIV burden patient's population in North Central Nigeria. *PLoS One.* 2020 Sep 1;15(9):e0238007.
12. Leeds IL, Magee MJ, Kurbatova EV, del Rio C, Blumberg HM, Leonard MK, Kraft CS. Site of extrapulmonary tuberculosis is associated with HIV infection. *Clin Infect Dis.* 2012 Jul;55(1):75-81.
13. Bjerrum S, Schiller I, Dendukuri N, Kohli M, Nathavitharana RR, Zwerling AA, Denking CM, Steingart KR, Shah M. Lateral flow urine lipoarabinomannan assay for detecting active tuberculosis in people living with HIV. *Cochrane Database Syst Rev.* 2019 Oct 21;10(10):CD011420.
14. CDC: Clinical Testing Guidance for HIV. *Clin. [Feb; 2024].* 2024.
15. Davis JL, Huang L, Worodria W, Masur H, Cattamanchi A, Huber C, et al. (2011) Nucleic Acid Amplification Tests for Diagnosis of Smear-Negative TB in a High HIV-Prevalence Setting: A Prospective Cohort Study. *PLoS ONE* 6(1): e16321.
16. Kim HN, Lee J, Yoon SY, Jang WS, Lim CS. Rapid Detection of Mycobacterium Tuberculosis Using a Novel Point-of-Care BZ TB/NTM NALF Assay: Integrating LAMP and LFIA Technologies. *Diagnostics (Basel).* 2023 Apr 21;13(8):1497.
17. Donovan J, Thu DDA, Phu NH, Dung VTM, Quang TP, Nghia HDT, Oanh PKN, Nhu TB, Chau NVV, Ha VTN, Hang VTT, Trinh DHK, Geskus RB, Tan LV, Thuong NTT, Thwaites GE. Xpert MTB/RIF Ultra versus Xpert MTB/RIF for the diagnosis of tuberculous meningitis: a prospective, randomised, diagnostic accuracy study. *Lancet Infect Dis.* 2020 Mar;20(3):299-307.
18. Gupta-Wright A, Manabe YC. Implementation science: point-of-care diagnostics in HIV and tuberculosis. *Clin Med (Lond).* 2019 Mar;19(2):145-148.
19. Matee M, Mtei L, Lounasvaara T, Wieland-Alter W, Waddell R, Lyimo J, Bakari M, Palangyo K, von Reyn CF. Sputum microscopy for the diagnosis of HIV-associated pulmonary tuberculosis in Tanzania. *BMC Public Health.* 2008 Feb 21;8:68.
20. Mase SR, Chorba T. Treatment of Drug-Resistant Tuberculosis. *Clin Chest Med.* 2019 Dec;40(4):775-795.
21. Török ME, Farrar JJ. When to start antiretroviral therapy in HIV-associated tuberculosis. *N Engl J Med.* 2011 Oct 20;365(16):1538-40.
22. Ramappa V, Aithal GP. Hepatotoxicity Related to Anti-tuberculosis Drugs: Mechanisms and Management. *J Clin Exp Hepatol.* 2013 Mar;3(1):37-49.
23. Eggleston JS, Nagalli S. Highly Active Antiretroviral Therapy (HAART) [Updated 2023 Jul 3]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2026 Jan.
24. Абдуллаев Р., Комисарова О. Герасимов Л. Туберкулез у ВИЧ-инфицированных: распространенность, клинические проявления, эффективность лечения // *Врач.* – 2018; 29 (11): 11–16.

Для цитирования: Губайдулина Г.Р. ВИЧ-инфекция в сочетании с туберкулезом легких: клинико-лабораторные особенности и персонализированная терапия на современном этапе // *Вестник фундаментальной и клинической медицины.* – 2026. – № 4(24). – С. 229–234. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19508165>

СУРУНКАЛИ ВИРУСЛИ ГЕПАТИТ С НИНГ ЖИГАРДАН ТАШҚАРИ КЛИНИК КЎРИНИШЛАРИДА КЛИНИК-БИОКИМЁВИЙ КЎРСАТКИЧЛАРИ ХУСУСИЯТЛАРИ

Облокулов А.А., Бобомуротова М.Н.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти. Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Ушбу мақолада Бухоро вилояти ҳудудида доимий истиқомат қилувчи 60 нафар 18–69 ёш оралигидаги жигардан ташқари клиник кўринишлар (ЖТКК) билан кечувчи Сурункали вирусли гепатит С (СВГС) билан касалланган асосий гуруҳ, 60 нафар 18–69 ёш оралигидаги жигардан ташқари клиник кўринишларсиз билан кечувчи СВГС билан касалланган қиёсий гуруҳ ҳамда 30 нафар 18–69 ёш оралигидаги соғлом шахслардан иборат назорат гуруҳи ўрганилган.

Калит сўзлар: СВГС, криоглобулинемия, ЖТКК, асаб тизими, бўғим-мушак тизими, тери, эндокрин, буйрак тизими, эластография

CLINICAL AND BIOCHEMICAL CHARACTERISTICS OF EXTRAHEPATIC MANIFESTATIONS OF CHRONIC HEPATITIS C

Oblokulov A.A., Bobomuratova M.N.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. This article presents a study of patients permanently residing in the Bukhara region. The main group included 60 patients aged 18–69 years with chronic hepatitis C (CHC) accompanied by extrahepatic clinical manifestations (ECMs). The comparison group consisted of 60 patients aged 18–69 years with CHC without extrahepatic clinical manifestations. The control group included 30 healthy individuals aged 18–69 years.

Keywords: chronic hepatitis C, cryoglobulinemia, extrahepatic clinical manifestations, nervous system, musculoskeletal system, skin, endocrine system, renal system, elastography.

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИКО-БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРИ ВНЕПЕЧЁНОЧНЫХ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЯХ ХРОНИЧЕСКОГО ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА С

Облокулов А.А., Бобомуротова М.Н.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. В данной статье представлены результаты исследования пациентов, постоянно проживающих на территории Бухарской области. Основную группу составили 60 больных в возрасте 18–69 лет с хроническим вирусным гепатитом С (ХВГС), протекающим с внепечёночными клиническими проявлениями (ВПКП). В группу сравнения вошли 60 пациентов в возрасте 18–69 лет с ХВГС без внепечёночных клинических проявлений. Контрольную группу составили 30 здоровых лиц в возрасте 18–69 лет.

Ключевые слова: хронический вирусный гепатит С, криоглобулинемия, внепечёночные клинические проявления, нервная система, костно-мышечная система, кожа, эндокринная система, почечная система, эластография.

e-mail: ablakulov@inbox.ru

Кириш. Жигарнинг сурункали касалликлари орасида вирусли гепатитлар биринчи ўринни эгаллайди ва улар глобал миқёсда сурункали жигар патологиясининг салмоқли улушини ташкил қилади ва умумий беморларнинг 40–60% ни ташкил қилади. Тадқиқотлар шуни кўрсатмоқдаки, вирус юққандан кейин 10 йил ичида СВГС билан касалланган беморларнинг тахминан 5-10% ида жигар цирроз ривожланади. Умумий касаллик даври узайиши (20–30 йилдан кейин) билан бу кўрсаткич 20–25% гача ўсиши мумкин, бу эса СВГС нинг прогрессив ва сурункали табиатини кўрсатади. СВГС жаҳон бўйича аҳоли саломатлиги учун жиддий муаммо бўлиб, ЖССТ маълумотларига кўра, дунёда тахминан 58 миллион одам СВГС билан касал ва ҳар йили 1,5 миллионга яқин янги ҳолат қайд этилади. Вирус асосан жигар хужайраларида кўпайиши орқали организмга таъсир кўрсатсада, унинг клиник кўринишлари кўпинча жигардан ташқари ҳам намоён бўлиши мумкин. ЖССТ га кўра, СВГС нинг жигардан ташқари асоратлари қон томирлар, буйрак касалликлари, буғимлар, буйрак ва терига

таъсир кўрсатиши мумкин, бу эса беморларнинг умумий саломатлиги ва ҳаётий фаолиятига салбий таъсир қилади. Шу сабабли клиник ва биокимёвий кўрсаткичларнинг тўлиқ баҳоланиши СВГС ни эрта аниқлаш ва самарали даволашда муҳим аҳамият касб этади. СВГС врач-клиницистлар учун катта терапевтик қийинчиликларни туғдиради, чунки инфекция сурункали гепатит ва жигар циррозининг турли босқичларида намоён бўлади ва жигардан ташқари кўринишларни ҳам келтириб чиқариши мумкин.

Гепатотроп вируслар асосан жигар ҳужайраларига (гепатоцитларга) таъсир кўрсатади ва бошқа органларнинг зарарланиши билан боғлиқ жигардан ташқари белгилари ҳам келтириб чиқариши мумкин [21]. СВГС ҳали ҳам жаҳон тиббиётида муҳим муаммо ҳисобланади ва у кўп ҳолатларда жигардан ташқари органлар ва тизимларда турли асоратларга олиб келиши мумкин.

Жигардан ташқари клиник кўринишлар қатор мамлакатлардаги тадқиқотларда ҳам қайд этилган. Ўтказилган тадқиқотларда СВГС беморларида қон-қон тизими, буйрак фаолияти, терининг иммунопатологик ўзгаришлари ва нерв тизимидаги асоратлар кенг учраши қайд қилинган [13].

Дунёда СВГС билан касалланган одамлар сони 175 миллиондан ортиқ бўлиб, бу умумий аҳолига нисбатан тахминан 1% ни ташкил қилади. ВГС нинг аҳамияти юқори касалланиш даражаси, вирус ташувчилар сонининг ортиши ва юктирилганлар ёш таркибидаги ўзгаришлар билан боғлиқ бўлиб, айниқса ёшлар орасида юқори улуш кузатилмоқда [7, 23]. СВГС юқиш йўли асосан парентерал механизм орқали амалга ошади. Инъекцион наркотик воситаларини қўллаш, қон ва унинг компонентларини қуйиш, инвазив тиббий манипуляциялар ва гемодиализ каби муолажалар юқори хавф омиллари ҳисобланади. Сўнгги йилларда миграция жараёнлари ва тиббий хизмат сифатидаги фарқлар сабабли ВГС нинг тарқалишида минтақавий фарқлар сақланиб қолмоқда. СВГС нафақат жигарнинг функцияларига таъсир кўрсатади, балки жигардан ташқари орган ва тизимларда ҳам турли клиник кўринишлар ривожланиши мумкин ва СВГС нинг жигардан ташқари асоратлари иммунитет ва қон липид алмашинувига таъсир кўрсатиб, сурункали ҳолатларда турли органларда патологиялар ривожланишига олиб келади [5]. СВГС билан касалланган беморларда биокимёвий маркерлар, хусусан, СРО ва гепатобилиар ферментлар клиник кўринишлар билан боғлиқлигини таъкидлайдилар [4]. ЖССТ нинг маълумотларига кўра, дунё бўйича 58 миллиондан ортиқ инсон СВГС инфекция билан яшамоқда. Улардан тахминан 40–70% ида турли клиник шаклда жигардан ташқари намоён бўлишлар учрайди, бу эса касалликнинг клиник аҳамиятини янада оширади (ЖССТ., 2023). Ўтказилган тадқиқот натижаларига кўра жигардан ташқари симптомлар ва лаборатория кўрсаткичлари орасидаги корреляцияни аниқлаб, уларнинг клиник прогностик аҳамиятини кўрсатди [1].

Кенг қўламли мета-таҳлиллар шуни кўрсатадики, жигардан ташқари синдромлар кўпроқ узок муддатли СВГС инфекцияси, юқори вирус юкламаси ва иммун тизим фаоллиги ошган беморларда учрайди [8]. СВГС ҳозирги кунда нафақат жигарнинг сурункали яллиғланиш касаллиги, балки кўп тизимли, иммун-патологик жараёнлар билан кечувчи системали инфекция сифатида қаралмоқда. Сўнгги йилларда олиб борилган клиник ва эпидемиологик тадқиқотлар ВГС инфекцияли беморларнинг катта қисмида ЖТКК лар ривожланишини тасдиқлади [17]. ВГС нинг жигардан ташқари намоён бўлишлари асосида иммун-комплекс механизмлар, аутоиммун реакциялар ва вируснинг лимфотроп хусусияти ётади. Вирус В-лимфоцитларни доимий стимуляция қилиши натижасида криоглобулинлар, ревматоид фактор ва бошқа аутоантителолар ишлаб чиқилади. Энг кўп ўрганилган жигардан ташқари синдром – аралаш криоглобулинемия бўлиб, у СВГС билан боғлиқ ҳолатларнинг 30–50% да учрайди. Криоглобулинемия қон томирларининг васкулити, нефропатия ва тери шикастланишлари билан намоён бўлади [10].

Муҳим жиҳати шундаки, жигардан ташқари намоён бўлишлар кўпинча АЛТ ва АСТ кўрсаткичлари нормал ёки кам ўзгарган ҳолда ҳам ривожланиши мумкин, бу эса ВГС ни клиник жиҳатдан танишни қийинлаштиради [16]. СВГС метаболик синдром, инсулинрезистентлик ва 2-тур қандли диабет каби экстрагепатик касалликлар ривожланиши билан ҳамбола ҳисобланади. Сўнгги метатаҳлиллар маълумотларига кўра, СВГС билан инфекцияланган беморларда қандли диабет ривожланиш хавфи умумий аҳолига нисбатан 1,5–2,0 марта юқори бўлиб, бу кўрсаткич СВГС билан оғриган беморларга нисбатан ҳам сезиларли даражада юқори экани аниқланган [15]. Инсулинрезистентлик СВГС патогенезида марказий ўрин тутаяди ва у глюкоза ҳамда липид алмашинувининг бузилиши, жигар стеатози, фибрознинг тезлашиши ҳамда қандли диабет ривожланишига олиб келади. ВГС тўғридан-тўғри гепатоцитларда инсулин сигнализация йўллариини ингибиция қилиши, шунингдек, яллиғланиш цитокинлари орқали тизимли метаболик дисфункцияни кучайтириши исботланган [14, 18]. СВГС га хос инсулинрезистентлик қон липидлари ва липопротеинлар алмашинувининг бузилиши билан кечиб, атероген дислипидемия шаклланишига


замин яратади. Бу ҳолат жигар фибрози ва циррозининг тез ривожланишига, гепатоцеллюляр карцинома, кардиоваскуляр касалликлар ва умумий ўлим хавфининг ортишига олиб келиши кўрсатилган [6].

Сўнгги йилларда СВГС нинг атеросклероз жараёнларига таъсири алоҳида аҳамият касб этмоқда. Кузатув тадқиқотларига кўра, СВГС билан оғриган беморларда сон артериясининг интима-медиа қавати қалинлиги соғлом назорат гуруҳига нисбатан сезиларли даражада юқори бўлиб, бу ҳолат миокард инфаркти ва ишемик инсульт хавфининг ошиши билан боғлиқ экани аниқланган [11, 12]. Шу билан бирга, тўғридан-тўғри таъсир этувчи антивирус препаратлар билан муваффақиятли даволаш инсулинрезистентликни камайтириши, гликемик назоратни яхшилаши ва кардиоваскуляр хавфни қисман пасайтириши мумкинлиги сўнгги тадқиқотларда тасдиқланган [9].

Тадқиқотнинг мақсади криоглобулинемиянинг мавжудлигига қараб жигардан ташқари намоён бўлишлар билан кечувчи СВГС билан касалланган беморларнинг клиник ва биокимёвий кўрсаткичларини аниқлаш ва баҳолашдан иборат.

Олинган натижалар: Ушбу тадқиқотга жалб этилган жами 120 нафар беморларнинг клиник ҳолати, лаборатор ва инструментал текширув натижаларини назорат гуруҳига нисбатан таҳлил қилинди. Беморлар назорат гуруҳи (n=30), жигардан ташқари клиник кўринишлар (ЖТКК) билан кечувчи СВГС беморларидан иборат асосий гуруҳ (n=60) ҳамда ЖТКК кузатилмаган қиёсий гуруҳга (n=60) ажратилди.

СВГС клиник жиҳатдан фақат жигар билан чекланиб қолмай, кўп тизимли (multisystem) касаллик ҳисобланади. Тадқиқот натижалари шуни кўрсатдики, асосий гуруҳдаги беморларда СВГСнинг тизимли кечиши натижасида клиник белгилар яққолроқ намоён бўлди ва кўп тизимли патологиялар аниқланди. Тадқиқотимизда ЖТКК билан кечувчи беморлар СВГС нинг клиник кечуви жигардан ташқари кўринишлар мавжудлиги билан бевосита боғлиқ. Асосий гуруҳ беморларида касаллик тизимли характерга эга бўлиб, бир вақтнинг ўзида бир нечта аъзолар тизимининг зарарланиши кузатилди. Энг кўп учраган ЖТКК сифатида асаб тизими (70,0%) ва бўғим-мушак тизими (63,3%) патологиялари қайд этилди, шунингдек, тери (36,7%), эндокрин (30,0%) ва буйрак тизими (25,0%) ўзгаришлари ҳам сезиларли улушни ташкил этди (1-расм).



1-расм. Тадқиқотга жалб қилинган СВГС билан касалланган беморларда жигардан ташқари кўринишларнинг учраш частотаси

Умумий қон таҳлили (УҚТ) СВГС билан касалланган беморларда энг оддий, хавфсиз ва иктисодий жиҳатдан мақбул лаборатор усул бўлиб, у фиброз жараёнининг фаоллиги ва прогрессияси ҳақида билвосита маълумот бериш имконини яратади. Жигар фиброзининг ўсиши билан бир қатор гематологик кўрсаткичларда сезиларли ўзгаришлар кузатилади.

Лаборатор таҳлил натижаларига кўра, ЖТКК билан кечувчи СВГС беморларида гематологик ва биокимёвий ўзгаришлар энг юқори даражада ифодаланган (1- ва 2-жадвал).

Текширилган гуруҳлардаги беморларда қон умумий таҳлили кўрсаткичларининг қиёсий тавсифи ($M \pm m$).

Кўрсаткичлар	Назорат (n=30)	Қиёсий гуруҳ (ЖТКК сиз, n=60)	Асосий гуруҳ (ЖТКК билан, n=60)	P ₁	P ₂
Гемоглобин, г/л	133,61±2,87	126,5±3,1*	114,2±3,8*	<0,05	<0,05
Эритроцит 10 ¹² /л	4,72±0,17	4,18±0,15	3,89±0,18	<0,01	<0,01
Лейкоцитлар, 10 ⁹ /л	5,63±0,19	5,4±0,4	6,2±0,4	<0,01	<0,05
Тромбоцитлар, 10 ⁹ /л	226,5±18,7	198,5±5,9*	176,2±6,1*	<0,01	<0,05
Лимфоцитлар, %	22,1±1,8	34,6±1,5	25,7±1,6	<0,01	<0,01
ЭЧТ (СОЭ), мм/соат	6,81±0,93	14,2±1,1*	22,5±1,4*	<0,001	<0,01

P₁–Асосий гуруҳ кўрсаткичларининг назорат гуруҳига нисбатан фарқининг ишончилиги.

P₂–Асосий гуруҳ кўрсаткичларининг қиёсий гуруҳга нисбатан фарқининг ишончилиги.

(*)–Назорат гуруҳига нисбатан фарқ статистика жиҳатдан ишончли ($p < 0,05$).

Назорат гуруҳи, ЖТКК сиз қиёсий гуруҳ ва ЖТКК билан асосий гуруҳ беморларининг умумий қон таҳлили кўрсаткичлари ўзаро солиштириб таҳлил қилинди.

Текширилган гуруҳларда биокимёвий кўрсаткичларининг қиёсий тавсифи ($M \pm m$)

Кўрсаткичлар	Назорат гуруҳи (n=30)	Қиёсий гуруҳ (ЖТКК сиз, n=60)	Асосий гуруҳ (ЖТКК билан, n=60)	P ₁	P ₂
Умумий билирубин, мкмол/л	16,1±0,94	21,6±1,9*	32,4±2,8*	<0,01	<0,05
Эркин билирубин, мкмол/л	11,8±0,73	15,4±1,2*	24,1±2,1*	<0,01	<0,05
Умумий оксил, г/л	80,2±1,9	64,6±1,7	58,3±1,5	<0,05	<0,05
Албумин, г/л	42,7±1,6	39,2±1,4	33,5±1,2*	<0,01	<0,05
АЛТ, Е/л	20,7±3,87	76,2±5,4*	118,4±7,5*	<0,001	<0,01
АСТ, Е/л	21,3±2,54	58,4±4,8*	94,6±6,2*	<0,001	<0,01
Ишқорий фосфатаза, ммоль/л	120,5±6,91	186,3±9,4*	264,7±12,8*	<0,001	<0,01
Глюкоза, ммоль/л	4,45±0,17	5,1±0,4	6,4±0,5*	<0,05	<0,05
Мочевина, ммоль/л	5,84±0,46	6,12±0,51	7,48±0,63*	<0,05	<0,05
Креатинин, ммоль/л	78,6±5,83	82,4±4,8	108,2±5,6*	<0,05	<0,05

P₁–Асосий гуруҳ кўрсаткичларининг назорат гуруҳига нисбатан фарқининг ишончилиги.

P₂–Асосий гуруҳ кўрсаткичларининг қиёсий гуруҳга нисбатан фарқининг ишончилиги.

(*)–Назорат гуруҳига нисбатан фарқ статистика жиҳатдан ишончли ($p < 0,05$).

Жигаран ташқари клиник кўринишлар билан кечган беморларни фибрози босқичларига боғлиқ ҳолда асосий биокимёвий кўрсаткичлари текширилганида қуйдаги натижалар олинди (3.2.5-жадвал).

Эластография Fibrosan® ECOSENS 430 (Франция) аппаратида амалга оширилди. Ультразвуковий датчик ва вибрация зондидан иборат тизим орқа ўнг чигар лобиди интеркостал боғламлар орқали қўйилиб, 50 Гц частотали ва ўртача амплитудали тўлқин юборилади. Вибрация тўлқинни юзага келтиради, кейин эхо-импульсли ультразвуковий тўлқинлар сдвиг тўлқинининг тўқимада тарқалиш тезлигини ўлчайди (терининг юзасидан 2.5–6.5 см). Тўлқин тезлиги тўқиманинг қотиш даражаси ва фиброз босқичи билан боғлиқ. Ҳисобланган қийматлар кПа да қайд этилади, ўртача қиймат 10 та ўлчовдан ҳисобланади. Техник қарши кўрсаткичлар: асцит ва семириш.

Қуйидаги жадвал маълумотлари METAVIR шкаласи бўйича жигар фибрози босқичларининг асосий ва қиёсий гуруҳларда тақсимланишини акс эттиради (3-жадвал).

METAVIR шкаласи бўйича жигар фиброз босқичларининг эластография қийматларини асосий (ЖТКК билан) ва қиёсий (ЖТКК сиз) гуруҳларда тақсимлаб кўрсатилганида қуйдагича натижалар олинди (4-жадвал). Бу қийматлар қопламаларнинг эластиклигини (жигар тўқимаси қаттиқлиги) кПа билан баҳолашга асосланган.

Гуруҳлар кесимида жигар фибрози (F) босқичларининг тақсимланиши

Фиброз босқичи (METAVIR)	Асосий гуруҳ (ЖТКК билан, n=60)	Қиёсий гуруҳ (ЖТКК сиз, n=60)
F1 (Енгил)	15 (25%)	32 (53,3%)
F2 (Ўрта)	22 (36,7%)	18 (30%)
F3 (Оғир)	23 (38,3%)	10 (16,7%)

Гуруҳлар кесимида жигар фибрози (F) босқичларининг эластография қийматлари METAVIR шкаласи билан таққосланиши

Фиброз босқичлари	Ўртача қиймат, кПа		Ўртача қийматлар интервали, кПа	
	Асосий гуруҳ	Қиёсий гуруҳ	Асосий гуруҳ	Қиёсий гуруҳ
F0	5,28	4,7	5,0-5,4	3,2-5,4
F1	7,0	6,8	6,0-7,6	5,9-7,4
F2	9,0	8,0	8,0-9,8	7,7-8,5
F3	13,1	11,0	10,9-14,3	10-11,8
F4	20,5	14,5	14,4-31,3	14,4-14,5

Корреляцион таҳлил натижалари жигар фибрози зичлиги ва турли клиник ҳамда лаборатор кўрсаткичлар ўртасидаги боғлиқлик даражасини баҳолаш имконини берди ва бу эса фиброз даражасини баҳолашда комплекс ёндашув зарурлигини асослайди (5-жадвал).

Жигар фибрози даражаси билан клиник-лаборатор кўрсаткичлар ўртасидаги корреляция

Кўрсаткич	r	Боғлиқлик кучлилиги
АЛТ	0,61	Ўртача-кучли
АСТ	0,64	Ўртача-кучли
Билирубин	0,58	Ўртача
Альбумин	-0,55	Ўртача
ЖТКК сони	0,67	Кучли

Олинган корреляция натижаларига кўра, жигар ферментлари (АЛТ $r=0,61$; АСТ $r=0,64$) ва билирубин ($r=0,58$) кўрсаткичлари ўрганилаётган клиник ҳолат билан ўртача-кучли мусбат боғлиқликка эга бўлиб, уларнинг ошиши касаллик оғирлашуви билан боғлиқлигини кўрсатади. ЖТКК сони энг юқори корреляцияни ($r=0,67$) намоён этгани сабабли энг аҳамиятли прогностик кўрсаткичлардан бири ҳисобланади. Альбумин эса манфий корреляция ($r=-0,55$) кўрсатиб, унинг пасайиши клиник ҳолат ёмонлашуви билан боғлиқлигини англатади. Умуман, ушбу биокимёвий ва гематологик кўрсаткичлар касаллик оғирлигини баҳолашда муҳим диагностик-прогностик аҳамиятга

Хулоса: таҳлиллар натижаларига кўра қуйидаги хулосаларга келинди:

1. СВГС билан касалланган беморларда жигардан ташқари кўринишлар мавжудлиги касалликнинг клиник кечувини оғирлаштиради ва кўп тизимли шикастланиш билан намоён бўлади;
2. ЖТКК билан кечувчи беморларда цитоллиз ва тизимли яллиғланиш фаоллиги лаборатор кўрсаткичлар орқали ишончли тасдиқланди;
3. Инструментал тадқиқотлар жигардан ташқари кўринишлар жигар фиброзининг тез прогрессияланиши билан боғлиқ эканлигини кўрсатди;
4. ЖТКК нинг клиник аҳамияти фибрознинг клиник босқичини баҳолаш ва касалликнинг прогностик йўналишини аниқлашда қўлланилади;
5. СВГС ни баҳолаш ва даволашда клиник, лаборатор ва инструментал усулларнинг мажмуавий қўлланилиши зарурлиги илмий асосга эга.

Адабиётлар рўйхати:

1. Мухин Н.А. Прогностическая значимость клинико-биохимических показателей при

внепечёночных формах хронического гепатита С // Современные проблемы гастроэнтерологии и гепатологии, 15(1). –2023. –р. 12–20.

2. Нарзиев И.И., Облокулова З.И., Облокулов А.Р. Криоглобулинемический васкулит, ассоциированный с вирусом гепатита С // Вестник Ташкентской медицинской академии, 32(4). –2021. –с. 121–124.

3. Облокулова З.И. Внепеченочные проявления хронического вирусного гепатита С // Тиббиётда янги кун, 2(40). –2022. –с. 231–234.

4. Шахгильдян И.В., Кузнецова М.А., Смирнов В.П. Биохимические маркеры и внепечёночные проявления хронического гепатита С // Журнал практической медицины, 8(4). –2021. –р. 34–41.

5. Ющук Н.Д., Иванова Е.В., Петров А.С. Клинические и биохимические проявления внепечёночной патологии при хроническом вирусном гепатите С // Вестник инфекционных болезней, 10(2). –2022. –р. 45–52.

6. Adinolfi L.E., Nevola R., Guerrera B. Hepatitis C virus and metabolic disorders: An update. World Journal of Gastroenterology, 24(40). –2018. –р. 4507–4520.

7. Blach S., Zeuzem S., Manns M. et al. Global prevalence and genotype distribution of hepatitis C virus infection in 2015: A modelling study // The Lancet Gastroenterology & Hepatology, 2(3). –2017. –р. 161–176.

8. Cacoub P., Poynard T., Ghillani P. et al. Extrahepatic manifestations of chronic hepatitis C virus infection: A prospective multicenter study of 321 patients // Hepatology, 32(3). –2000. –р. 881–887.

9. Carrat F., Fontaine H., Dorival C. et al. Long-term outcomes after sustained virologic response in HCV-infected patients with extrahepatic manifestations // Hepatology, 70(5). –2019. –р. 1615–1628.

10. Comarmond C., Cacoub P. Hepatitis C virus-induced vasculitis and cryoglobulinemia // Clinical Reviews in Allergy & Immunology, 64(1). –2023. –р. 1–12.

11. Domont F., Cacoub P. Hepatitis C virus infection and cardiovascular risk // Liver International, 40(2). –2020. –р. 303–316.

12. Gill K., French A., Bhattacharya D. Atherosclerosis and chronic hepatitis C: Pathophysiological links and clinical implications //

Frontiers in Cardiovascular Medicine, 85(9). –2022 –р. 875432.

13. Kim H., Park J., Choi S. Clinical and biochemical features of extrahepatic manifestations in chronic hepatitis C patients // Journal of Hepatology Research, 15(2). –2024. –р. 101–112.

14. Kralj D., Tomas M., Susic D. Insulin resistance in hepatitis C virus infection: Pathogenesis and clinical implications. World Journal of Hepatology, 8(36). –2016. –р. 1583–1591.

15. Li C., Yao N., Zhang H. Risk of type 2 diabetes in patients with chronic hepatitis C infection: A meta-analysis // Diabetes Research and Clinical Practice, 187. –2022. –р. 109890.

16. Li G., Chung R.T. Extrahepatic manifestations of HCV infection: Diagnosis and clinical management // Clinical Liver Disease, 14(3). –2019. –р. 65–78.

17. Negro F., Forton D. Extrahepatic manifestations of chronic hepatitis C virus infection // Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology, 18(7). –2021. –р. 421–436.

18. Negro F., Sanyal A.J., Younossi Z. Extrahepatic manifestations of hepatitis C virus infection: Focus on cardiovascular disease // Journal of Hepatology, 74(1). –2021. –р. 1–14

19. Nuraliyev N.A., Oblokulova Z.I. Extrahepatic manifestations of chronic viral hepatitis // European journal of modern medicine and practice, 3(2). –2022. –р. 56–59.

20. Oblokulova Z.I., Oblokulov A.R., Elmurodova A.A. et al. Virologic response in the treatment of infection with antiviral drugs // World Journal of Pharmaceutical Research, 9(9). –2020. –р. 87–92.

21. Romano C., Cuomo G., Ferrara R. et al. Extrahepatic manifestations of chronic hepatitis C virus infection: Pathogenesis and clinical implications // Journal of Hepatology, 68(2). –2018. –р. 398–408.

22. Tang F., Fan X., Li Y. et al. Carotid intima-media thickness in chronic hepatitis C: Relation to metabolic disturbances and cardiovascular risk // Atherosclerosis, 251(3). –2021. –р. 282–288.

23. Terrault N.A., Hassanein T.I., Howell C.D. et al. Update on prevention, diagnosis, and treatment of chronic hepatitis C infection: AASLD–IDSA guidance // Hepatology, 74(2). –2021. –р. 686–721.

24. Wong V.W., Adams L.A., Hui A.Y. Cardiovascular disease in patients with chronic hepatitis C: Fact or fiction? // Journal of Gastroenterology and Hepatology, 29(6). –2014. –р. 1135–1142.

Иктибос учун: Облокулов А.А., Бобомуротова М.Н. Сурункали вирусли гепатит с нинг жигардан ташкари клиник кўринишларида клиник-биокимёвий кўрсаткичлари хусусиятлари // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2026. – № 4(24). – Б. 235–240. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19508420>

CLINICAL SIGNIFICANCE AND USE OF PROCALCITONIN FOR GUIDING ANTIBIOTIC THERAPY IN SARS-COV-2 INFECTION

Ergashov M.M.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. This article highlights the importance of C-reactive protein (CRP) and procalcitonin (PCT), and cytokines in determining the prognosis of SARS-CoV-2-associated pneumonia. The article discusses the methods used to measure these biomarkers and the results of studies that have investigated their use in predicting the severity and outcome of SARS-CoV-2-associated pneumonia. The article concludes with a discussion of the implications of these findings and suggestions for future research.

Keywords: SARS-CoV-2, pneumonia, C-reactive protein, procalcitonin, cytokines, biomarkers, prognosis.

SARS-COV-2 ИНФЕКЦИЯСИДА АНТИБИОТИК ТЕРАПИЯСИНИ БОШҚАРИШДА ПРОКАЛЬЦИТОНИННИНГ КЛИНИК АҲАМИЯТИ ВА ҚЎЛЛАНИЛИШИ

Эргашов М.М.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти. Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Ушбу мақолада SARS-CoV-2 билан боғлиқ пневмонияни истиқболни аниқлашда C-реактив оқсил (CRO) ва прокальцитонин (ПКТ) ва цитокинларнинг аҳамияти таъкидланган. Мақолада биомаркерларни аниқлаш усуллари ва SARS-CoV-2 билан боғлиқ пневмониянинг оғирлиги ва натижаларини башорат қилишда улардан фойдаланишни ўрганган тадқиқотлар натижалари муҳокама қилинади. Мақола ушбу натижалар ва келажакдаги тадқиқотлар учун таклифларнинг натижаларини муҳокама қилиш билан якунланади.

Калим сўзлар: SARS-CoV-2, пневмония, C-реактив оқсил, прокальцитонин, цитокинлар, биомаркерлар, башорат

КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ПРОКАЛЬЦИТОНИНА ДЛЯ ВЫБОРА АНТИБИОТИКОТЕРАПИИ ПРИ ИНФЕКЦИИ SARS-COV-2

Эргашов М.М.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. В этой статье подчеркивается важность C-реактивного белка (СРБ) и прокальцитонина (ПКТ), а также цитокинов в определении прогноза пневмонии, связанной с SARS-CoV-2. В статье обсуждаются методы, используемые для измерения этих биомаркеров, и результаты исследований, в которых изучалось их использование для прогнозирования тяжести и исхода пневмонии, связанной с SARS-CoV-2. Статья завершается обсуждением последствий этих выводов и предложениями для будущих исследований.

Ключевые слова: SARS-CoV-2, пневмония, C-реактивный белок, прокальцитонин, цитокины, биомаркеры, прогноз

e-mail: ergashov.maqsudjon@bsmi.uz

Introduction. Coronavirus disease 2019 (COVID-19), caused by the severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2), has had a strong impact on health systems around the world [1,2]. Patients with severe pneumonia have a high mortality rate due to the large number of complications they face [3].

It is reported, that in COVID-19, the prevalence of community-acquired bacterial respiratory coinfections (hereinafter referred to as bacterial coinfection) during hospitalization is less than 5% [4,5,6,7]. Although the impact of this complication on mortality is still widely debated, almost three-quarters of patients with COVID-19 receive antibiotics, so the number of prescriptions significantly exceeds the estimated prevalence of bacterial co-infection [8]. Excluding bacterial co-infection at hospital admission in these patients may potentially limit overuse of antibiotics and thus reduce hospital admission costs, potential side effects, and the development of multidrug-resistant infections [9]. PCT is a serum biomarker that has shown promising results in distinguishing between viral and bacterial infections [10, 11, 26], and it is

commonly used in conjunction with clinical data as a guideline for de-escalation with prescribing of antibiotics in critically ill patients [12, 13, 14]. The role of PCT in community-acquired pneumonia (CAP) has been evaluated in several studies, but There is no scientific consensus on its usefulness for the diagnosis or administration of antibiotics [15,27]. C-reactive protein (CRP), another well-known systemic marker of inflammation and tissue damage, is widely used by clinicians to monitor infections [16,22]. In patients with COVID-19, CRP at admission correlated with disease severity and was generally a good predictor of an adverse outcome [16,17].

An increase in PCT indicates the addition of a bacterial infection and correlates with the severity of the course, the prevalence of inflammatory infiltration, and the prognosis of the progression of bacterial complications.

Accumulating data indicate that more than 80% of patients with COVID-19 are treated with antibiotics, as it is difficult to identify patients with COVID-19 without a concomitant bacterial infection who can было бы safely stop taking antibiotics. However, recent clinical data show that procalcitonin can help assess the condition of these patients and reduce unnecessary use of antibiotics [18,19,25]. Therefore, we sought to determine the role of PCT and CRP in detecting bacterial co-infection in patients with COVID-19 pneumonia. Serum levels of CRP and PCT have a significant correlation with the severity of COVID-19 and can be used to as independent factors for predicting disease risk. Serum levels of CRP and PCT can effectively assess the severity of the disease and predict the outcome in patients with COVID-19. The study of the level of CRP in the blood serum is a mandatory laboratory study. Since the level of CRP correlates with the severity of the course, the prevalence of inflammatory infiltration and the prognosis for pneumonia. PCT is a well-known diagnostic marker of bacterial infection. [20, 28].

Purpose of the study. Study of serum procalcitonin levels to decide whether to start or discontinue antibiotic therapy, as well as to determine the progression of disease severity in COVID-19 patients.

Materials and methods: This study was a single-centre, retrospective cohort study. We included all patients with confirmed SARS-CoV-2 infection admitted to the Infectious diseases hospital from June 30, 2021 to September 14, 2022 in Bukhara. Clinical data was obtained from electronic medical records, including demographic data, exposure history, signs and symptoms, and laboratory data at admission. Upon admission to the inpatient emergency department, all patients were evaluated on the NEWS2 scale. The average score was 5.7 ± 1.4 . This made it possible to quickly sort out patients and send the most severe cases to the intensive care unit. All patients with COVID-19 included in this study were diagnosed in accordance with the guidelines for the diagnosis and treatment of pneumonia caused by a novel coronavirus infection. All patients were laboratory-confirmed to have SARS-CoV-2 infection (the result of real-time RT-PCR specific for SARS-CoV-2 was positive).

From June 30, 2021 to September 14, 2022, 120 patients were admitted to the Bukhara Regional Infectious Diseases Hospital. 120 patients were divided into severe cases ($n=67$) and moderate cases ($n=53$). Of these, 12 (20.0%) patients were admitted to the intensive care unit. The median age was 51 years, 120 patient and 74 (61.67%) of the 120 patients were male. The average time from the onset of symptoms to hospitalization was 2-3 days, and the average time to the diagnosis of a serious illness was 3-4 days.

A general blood test with determination of the number of white blood cells (WBC), lymphocytes (LYM), mononuclear cells (MONO), and neutrophils (NEU) was performed on blood samples. Blood biochemistry parameters: aspartate aminotransferase (AST), alanine aminotransferase (ALT), glucose (GLU), urea, creatinine, and C-reactive protein (CRP) were measured using the MINDRAY BC-30 automatics biochemical analyzer (China). The concentration OF PKT was determined using the ELISA method using reagent kits for enzyme-linked immunosorbent assay OF PKT CONCENTRATION in blood plasma PKT-ELISA-BEST. In patients with moderate and severe forms, the study was performed on the 2nd day of admission, the 3rd and 5th days of treatment. The upper limit of the norm was assumed to be the concentration of 0.05 ng/ml. The obtained data were compared with the recommendations for clinical interpretation of the results of determining the level of PCT in blood serum: 0.1-0.25 ng/ml–the probability of bacterial infection is very low; 0.25-0.5 ng/ml–local bacterial infection is possible; 0.5-2.0 ng/ml–high probability of bacterial infection, systemic bacterial infection is possible; 2.0-10.0 ng/ml–high probability of systemic bacterial infection, possible severe sepsis; >10.0 ng/ml–high probability of severe sepsis[15, 21, 23, 24].

Results. The time from symptom onset to hospital admission averaged 3–4 days for patients with moderate disease and 5–7 days for those with severe disease. The duration of hospitalization in the respective wards was 7 ± 2.3 days and 13 ± 3.2 days, with the overall treatment period recorded as 10.5 ± 5.7 days.

Clinical manifestations observed in the patients were analyzed according to organ systems. The results were as follows:

Respiratory system: cough was reported in 85.83% of patients (103/120), including dry cough in 54.17% (65/120), productive cough in 28.33% (34/120), and hemoptysis in 3.33% (4/120); sore throat was observed in 70.0% (84/120); shortness of breath in 69.17% (83/120); sneezing in 19.17% (23/120); nasal congestion in 16.67% (20/120); and rhinorrhea in 13.33% (16/120) (figure 1).




Figure 1. Clinical manifestations observed in the respiratory system of patients (%)

Central nervous system: headache was reported in 85.83% of patients (103/120); loss of appetite in 89.17% (107/120); fatigue in 74.17% (89/120); fever in 72.5% (87/120); loss of smell (anosmia) in 54.17% (65/120); dizziness in 37.5% (45/120); loss of taste (ageusia) in 51.67% (62/120); myalgia (muscle pain) in 50.83% (61/120); sleep disturbances in 46.67% (56/120); impaired attention in 18.33% (22/120); memory impairment in 5.83% (7/120); tingling sensations (paresthesia) in 4.17% (5/120); and photophobia in 3.33% (4/120) (figure 2).




Figure 2. Clinical manifestations observed in the CNS of patients (%)

In COVID-19, gastrointestinal symptoms are often associated with the direct effects of the virus, immune response, and disruption of the gut microbiota. Among the clinical manifestations related to these changes, abdominal pain was frequently observed. In patients with moderate disease, 4 individuals reported abdominal pain, while among those with severe disease, 13 patients experienced this symptom. Another common clinical manifestation was nausea, reported in 7 patients with moderate disease and 12 patients with severe disease. Diarrhea was also documented in patient histories, occurring in 10 patients with moderate disease and 16 patients with severe disease. Additionally, vomiting was observed in 5 patients with moderate disease and in 9 patients with severe disease.

SARS-CoV-2 infection also caused several ophthalmologic changes in patients due to its effects on various organs and tissues. Observed clinical signs included conjunctivitis, pathological lacrimation (exces-

sive tearing), eyelid itching, and blurred vision. Conjunctivitis was reported in 6 patients with moderate disease and 11 patients with severe disease. Pathological lacrimation was observed in 4 patients with moderate disease and 9 patients with severe disease. Eyelid itching occurred in 3 patients with moderate disease and 5 patients with severe disease. Blurred vision was a rare manifestation, not observed in moderate cases, but reported in 3 patients with severe disease.

Skin changes were also documented in patients with COVID-19. Among the 120 patients, 23 reported skin-related complaints. Observed dermatological manifestations included mainly angiitis, erythematous rashes, purpura, and, less frequently, vesicular lesions. According to the study results, some COVID-19 patients exhibited cutaneous changes, confirming the systemic nature of the infection. Among patients with moderate disease, angiitis was observed in 3 individuals, erythematous rashes in 2, purpura in 1, and vesicular lesions in 1. In the severe disease group, skin changes were more frequent, with angiitis in 7 patients, erythematous rashes in 4, purpura in 3, and vesicular lesions in 2. These findings indicate that skin manifestations are more common in severe cases of SARS-CoV-2 infection. This may be related to the virus's tropism for vascular endothelial cells and associated microcirculatory disturbances. Cutaneous angiitis and erythematous rashes likely result from vascular wall inflammation, increased cytokine levels, and immune complex reactions, while purpura and vesicular lesions are often explained by hypersensitivity reactions or an exaggerated immune response to the virus.

According to the results of laboratory data, it was found that 40 patients (33.3%) had leukopenia, 56 patients (46.7%) had leukocytosis; 88 patients (73.3%) had lymphocytopenia, and 24 patients (15.0%) had an increase in the number of lymphocytes.

Platelet counts and coagulation parameters were analyzed in the present study. Of the 120 patients included in the study, thrombocytopenia was detected in 23 (24.22%), thrombocytosis - in 18 (15.0%).

In the study, an interval-based distribution analysis of procalcitonin (PCT) concentrations was performed in the examined patients. The obtained results clearly demonstrate the characteristics of PCT levels within the patient cohort (figure 3).




Figure 3. Serum procalcitonin concentrations in patients

According to the presented data, the majority of patients exhibited moderate to high concentrations of the biomarker (0.25–2.0 ng/mL), indicating clinically significant inflammatory activity. This finding supports the applicability of PCT as a marker for assessing disease severity and as a prognostic indicator. The largest proportion of patients fell within the 0.5–2.0 ng/mL range (35.83%), suggesting an active or complicated inflammatory process in a substantial number of cases. The 0.05–0.1 ng/mL interval accounted for 30.83% of patients, reflecting a relatively mild disease course or a favorable response to therapy. PCT levels of 0.25–0.5 ng/mL were observed in 19.17% of patients, corresponding to a moderate degree of inflammatory activity. The smallest proportion (10.83%) was represented by patients with PCT concentrations in the 0.1–0.25 ng/mL range, indicating that relatively few patients had low-to-moderate biomarker levels.

These tests were obtained within the first 48-72 hours after the onset of the disease. And based on the content of PCT in the blood serum, they were conditionally divided into 3 groups. Further tests were

repeated on the 3rd and 5th days, and in severe patients, the level of subcutaneous fat was also studied on the 7th day of treatment. Patients with a PCT level of more than 0.1 ng/ml were considered co-infected and were recommended for treatment with antibiotics (a combined drug of amoxicillin and clavulanic acid, cephalosporins of 2-3 generations), severe patients with meropenem and respiratory fluoroquinolones (levofloxacin). The effectiveness of treatment was assessed as insufficient if after 3 days of treatment there was no decrease in the level of PCT in the blood serum by 50%. In such cases, it can be assumed that the treatment does not give the expected effect. Therefore, it is necessary to change the tactics of antibacterial therapy. If the level of PCT decreases, it will mean that the treatment gave the expected result. As soon as there is a decrease in the number of PCT by about 80-90% from the peak level, it is recommended to stop antibacterial therapy.

The results of the study showed that in 46 (71.9%) patients of the first group under observation, there was a significant decrease in the level of PCT, which did not differ from the norm, in 8 (12.5%) patients, the content of PCT remained unchanged. While 10 (15.6%) patients had an increase in the level of PCT in the blood serum and were prescribed antibacterial therapy.

In 38 (82.6%) patients of group 2 who received antibacterial drugs, as in cases of co-infection, the content of PCT decreased by 50%, and in 8 (17.4%) patients, the level of PCT remained significantly high. Only 3 (30%) patients out of 10 seriously ill patients showed a positive result. When there was no decrease in the level of PCT on the 3rd day of treatment against the background of antibacterial therapy, another combination of antibacterial drugs was prescribed for the treatment of these patients.

The data of our study, obtained on the 5th day of treatment, showed that according to the results of the first stage, the level of PCT significantly decreased and normalized in 18 patients of group 1. In 6 (13%) patients of group 2, the PCT level remained significantly high and continued treatment with antibacterial drugs. In 2 (20%) patients of group 3, despite the introduction of antibacterial drugs, the PCT level remained high, and the disease ended fatally.

For dynamic assessment, patients were conditionally divided into three groups, and plasma PCT levels were measured three times: on day 1, day 3, and day 7 of observation (figure 4).




Figure 4. Guidance of antibacterial therapy based on the dynamics of procalcitonin levels

The data presented in the figure clearly illustrate the dynamic changes of the investigated marker in evaluating therapeutic efficacy. In groups where antibacterial therapy (ABT), particularly combination therapy, was effective, a decreasing trend in PCT levels was observed. In contrast, in cases of ineffective treatment, a consistent increase in PCT concentration was recorded. These findings confirm the value of PCT as an important prognostic marker for assessing disease severity and treatment effectiveness.

In Group 1 (patients receiving ABT), the baseline PCT level was 0.22 ng/ml. At subsequent stages, the indicator showed a steady decline, reaching a minimal value (≈ 0.02 ng/ml) by the end of follow-up, indicating stable control of the inflammatory process under antibacterial therapy.

In Group 2 (patients receiving combination ABT), the initial PCT level reached 0.3 ng/ml. During follow-up, a gradual decrease was observed, with the level declining to 0.06 ng/ml by the end of observation.

This trend demonstrates the effectiveness of combination antibacterial therapy in reducing inflammatory activity.

In Group 3 (patients with ineffective therapy), PCT levels showed a persistent upward trend from the initial stage, increasing from 0 to 0.45 and subsequently to 0.88 ng/mL during follow-up, and reaching the highest value (≈ 1.5 ng/ml) by the end of the observation period. The absence of a decreasing trend reflects progression of the inflammatory process and the clinical ineffectiveness of the administered therapy.

Conclusion:

1. PCT is a highly informative biomarker for evaluating the likelihood of bacterial co-infection and monitoring the progression of infectious diseases. Its serum concentration reflects the host's systemic inflammatory response to bacterial pathogens, making it a valuable tool in distinguishing bacterial infections from viral or non-infectious inflammatory conditions.

2. In patients with COVID-19, elevated procalcitonin levels can serve as a reliable indicator of concurrent bacterial infection, thereby guiding clinical decision-making regarding the initiation and duration of antibiotic therapy. By integrating PCT measurements into the management of SARS-CoV-2 infection, clinicians can optimize the timing of antibacterial interventions, avoid unnecessary antibiotic exposure, and tailor the course of therapy based on objective biomarker trends, ultimately improving patient outcomes and reducing the risk of antimicrobial resistance.

3. ABT - It is recommended that the initiation, continuation, or discontinuation of antibiotic therapy be guided by an algorithm based on PCT results. This approach enhances the effectiveness of ABT against secondary concomitant bacterial infections and ensures the rational use of antibiotics. A decrease in the level of PCT by 80-90% from the peak level is one of the markers for stopping antibacterial therapy.

References:

1. Arsenault C., Gage A., Kim M.K. et al. COVID-19 and resilience of healthcare systems in ten countries // *Nat Med* 28, –2022. –p. 1314–1324.
2. Assicot M., Gendrel D., Carsin H. et al. High serum procalcitonin concentrations in patients with sepsis and infection // *Lancet*, 341. –1993. –p. 515–518.
3. Ergashov M.M. (2023) The importance of C-reactive protein, Procalcitonin, and cytokines in determining the prospect of SARS-COV-2-associated pneumonia. // *Horizon Journal of Humanity and Artificial Intelligence*. Volume: 02 Issue: 06 | 2023, ISSN: 2835-3064 pages 167-171.
4. Ergashov M.M. The importance of C-reactive protein, Procalcitonin, and cytokines in determining the prospect of SARS-COV-2-associated pneumonia // *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal (GIIRJ)*. 11(4). –2023. –p. 480-483.
5. Ergashov M.M. The role of the procalcitonin test in the diagnosis and treatment of COVID – 19. III International Book Edition – The Best Young Scientist 2021. Volume: IX. P. 40-42.
6. Evans L., Rhodes A., Alhazzani W. et al. Surviving sepsis campaign: international guidelines for management of sepsis and septic shock 2021 // *Intensive Care Med* 47(1). –2021. –p. 1181–1247.
7. Gilbert D.N. Procalcitonin as a biomarker in respiratory tract infection // *Clinic Infectious Disease* 52(4). –2021. –p. 346-350.
8. Hessels L., Speksnijder E., Paternotte N. et al. Procalcitonin-guided antibiotic prescription in patients with COVID-19: Multicenter Observational Cohort Study // *Chest*. –2023. –p. 125–127.
9. Huttner B.D., Catho G., Pano-Pardo J.R. et al. COVID-19: don't neglect antimicrobial stewardship principles! // *Clin Microbiol Infect*. –2020. –p. 808–810.
10. Jayani C., Jayarajah U., Riza R. Gastrointestinal manifestations in COVID-19 // *Trans R Soc Trop Med Hyg*. –2021. –p. 1362–1388.
11. Langford B.J., So M., Raybardhan S. et al. Bacterial co-infection and secondary infection in patients with COVID-19: a living rapid review and meta-analysis // *Clin Microbiol Infect* 26: –2020 –p. 1622–1629.
12. Langford B.J., So M., Raybardhan S. et al. Antibiotic prescribing in patients with COVID-19: rapid review and meta-analysis // *Clinical Microbiological Infect*, 27. –2021. –p. 520–531.
13. Langford B.J., So M., Simeonova M. et al. Antimicrobial resistance in patients with COVID-19: a systematic review and meta-analysis // *Lancet Microbe* 4. –2023. –p. e179–e191.
14. Mahendra M., Nuchin A., Kumar R. et al. Predictors of mortality in patients with severe COVID-19 pneumonia—a retrospective study // *Adv Respir Med* 89: –2021. –p. 135–144.
15. Meisner M. Procalcitonin-biochemistry and Maisner M. Procalcitonin: A New Innovative Infection Parameter. Biochemical and Clinical Aspects // Revised and expanded ed. Stuttgart: Thieme Verlag. –2000. p. 136–137.
16. Oblokulov A.R., Husenova Z.Z., Ergashev M.M. Procalcitonin as an indicator of antibacterial therapy in COVID-19 // *Annals of the Romanian Society for Cell Biology*, –2021. –p. 5220–5224.

- 17.Oblokulov A.R., Kholov U.A., Niyozov G.E. et al. Extrapulmonal manifestations of COVID-19 // *Infection, immunity and pharmacology – scientific and practical journal* .–2021. –p. 62–66.
- 18.Pepper D.J. Sun J., Rhee C. et al. Procalcitonin-guided antibiotic discontinuation and mortality in critically ill adults: a systematic review and meta-analysis // *Chest* 15(5). –2019. –p.1109–1118.
- 19.Rothe K., Feihl S., Schneider J. et al. Rates of bacterial co-infections and antimicrobial use in COVID-19 patients: a retrospective cohort study in light of antibiotic stewardship // *Eur J Clinical Microbiological Infectious Disease*, 40. –2021. –p. 859–869.
- 20.Roy A., Powers H.R., Craver E.C. et al. Antibiotic stewardship: early discontinuation of antibiotics based on procalcitonin level in COVID-19 Pneumonia // *J Clin Pharm Ther.* –2022. –p. 243–247.
- 21.Tian J., Yuan X., Xiao J. et al. Clinical characteristics and risk factors associated with COVID-19 disease severity in patients with cancer in Wuhan, China: a multicentre, retrospective, cohort study // *Lancet Oncology*. –2020. –p. 893–903.
- 22.Wang R., Zhang X., Irwin D.M. et al. Emergence of SARS-like coronavirus poses new challenge in China // *J. Infect.* –2020. –p. 350–371.
- 23.Westblade L.F., Simon M.S., Satlin M.J. Bacterial coinfections in coronavirus disease 2019 // *Trends Microbiol* 29. –2021. –p. 930–941.
- 24.Whittaker A., Anson M., Harky A. Neurological Manifestations of COVID-19: A systematic review and current update // *Acta Neurol Scand.* –2020 –p. 14–22.
- 25.Wölfel R., Corman V.M., Guggemos W. et al. Virological assessment of hospitalized patients with COVID-2019 // *Nature*. –2020. –p. 465–469.
- 26.Yoshimoto F.K. The Proteins of Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2 (SARS CoV-2 or nCoV19) the Cause of COVID-19 // *Protein J.* –2020. –p. 198–216.
- 27.Zou L., Ruan F., Huang M. et al. SARS-CoV-2 Viral Load in Upper Respiratory Specimens of Infected Patients // *N Engl J Med.* –2020. –p. 1177–1179.
- 28.Zumla A., Hui D.S., Azhar E.I. et al. Reducing mortality from 2019-nCoV: Host-directed therapies should be an option // *Lancet*. –2020. –p. 35–36.

For citation: Ergashov M.M. Clinical significance and use of procalcitonin for guiding antibiotic therapy in SARS-CoV-2 infection // *Bulletin of Fundamental and Clinic Medicine*. – 2026. – № 4(24). – P. 241–247. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19508572>

ПОРАЖЕНИЕ ПЕЧЕНИ ПРИ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ**Джалалова Н.А., Атамухамедова Д.М.**

Ташкентский государственный медицинский университет, г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. Печёночные проявления при COVID-19 варьируют от транзиторных биохимических отклонений до тяжёлых осложнений, включая прогрессирование цирроза, портальную гипертензию и печёночную энцефалопатию. Систематически проанализировать эпидемиологию, клинические проявления, диагностические подходы, лабораторные и биохимические изменения, а также печёночные осложнения, ассоциированные с COVID-19.

Ключевые слова: COVID-19; поражение печени; печёночная дисфункция; цирроз; портальная гипертензия; PRISMA 2020.

LIVER DAMAGE ASSOCIATED WITH CORONAVIRUS INFECTION**Djalalova N.A., Atamuxamedova D.M.**

Tashkent State Medical University, Tashkent, Uzbekistan

Resume. Hepatic manifestations of COVID-19 range from transient biochemical abnormalities to severe complications, including progression of cirrhosis, portal hypertension, and hepatic encephalopathy. To systematically analyze the epidemiology, clinical manifestations, diagnostic approaches, laboratory and biochemical alterations, as well as liver-related complications associated with COVID-19. Liver injury in COVID-19 represents a multifactorial and clinically significant condition with both short-term and long-term consequences.

Keywords: COVID-19; liver injury; hepatic dysfunction; cirrhosis; portal hypertension; PRISMA 2020.

КОРОНАВИРУС ИНФЕКЦИЯСИДА ЖИГАРНИНГ ШИКАСТЛАНИШИ**Джалалова Н.А., Атамухамедова Д.М.**

Тошкент давлат тиббиёт университети, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. COVID-19 да жигар кўринишлари транзитор биокимёвий ўзгаришлардан оғир асоратларгача, жумладан циррознинг кучайиши, портал гипертензия ва жигар энцефалопатиясигача ўзгариб туради. COVID-19 билан боғлиқ эпидемиология, клиник кўринишлар, диагностика ёндашувлари, лаборатория ва биокимёвий ўзгаришлар, шунингдек, жигар асоратларини тизимли таҳлил қилиш.

Калим сўзлар: COVID-19; жигар зарарланиши; жигар дисфункцияси; цирроз; портал гипертензия; PRISMA 2020.

e-mail: nigoradjalalova1973@gmail.com, dilafruzatamuxamedova@gmail.com

Введение. В настоящее время COVID-19 рассматривается как системное заболевание с нарушением функции иммунной системы, поражением в первую очередь легких, а также сердца, почек, кишечника, печени и селезенки. Повреждение печени происходит в основном при тяжелом течении COVID-19. Печень играет ключевую роль в иммунной регуляции, метаболическом гомеостазе и детоксикации. Нарушение её функции при COVID-19 может усиливать системное воспаление, ухудшать метаболизм лекарственных препаратов и приводить к декомпенсации у пациентов с хроническими заболеваниями печени (ХЗП). Важно отметить, что поражение печени описано не только у критически больных, но и при лёгком и среднетяжёлом течении COVID-19, включая молодых пациентов без ранее выявленной гепатологической патологии. С одной стороны, известно, что важный для патогенеза инфекции ангиотензин-превращающий фермент-2 (АПФ-2) расположен на 60% холангиоцитов, в связи с чем желчевыводящие пути могут быть непосредственной мишенью вируса. Однако, ни клиническая картина (исключительная редкость синдрома холестаза), ни гистологические данные исследования ткани печени умерших больных (преимущественно микровезикулярный стеатоз без поражения желчных протоков) не позволяют сегодня говорить о прямом вирусном поражении печени. С позиции общественного здравоохранения сочетание COVID-19 с широко распространёнными заболеваниями печени — неалкогольной жировой болезнью печени (НАЖБП), вирусными гепатитами и

алкоголь-ассоциированными поражениями — формирует синдромное (синдемическое) взаимодействие, приводящее к росту летальности и долгосрочной инвалидизации. Экономическое бремя включает увеличение длительности госпитализации, потребность в интенсивной терапии и расходы на постковидное наблюдение пациентов с печёночными осложнениями. Требуется структурированный синтез, объединяющий эпидемиологию, клиническое течение, диагностические подходы, лабораторные изменения и осложнения для поддержки клинических решений и разработки стратегий здравоохранения.

Цель работы изучит поражений печени в период заболевания COVID-19 у пациентов без предшествующей патологии или с уже существующей патологией печени. Проанализированы и обобщены потенциальные механизмы поражения печени, обусловленного вирусом SARS-CoV-2, что расширяет наши знания о COVID-19.

Материалы и методы. Систематический обзор выполнен в соответствии с рекомендациями PRISMA 2020. Поиск литературы проводился в базах данных PubMed/MEDLINE, Scopus и Web of Science за период с января 2020 по январь 2026 года. Включались наблюдательные исследования, клинические когорты и метаанализы, содержащие данные о поражении печени при COVID-19.




Рис.1

Результаты обсуждения. Пандемия коронавирусной инфекции, вызванной вирусом SARS-CoV-2, привела к значительным изменениям в структуре заболеваемости и смертности во всём мире. Хотя основным органом-мишенью инфекции является дыхательная система, накопленные клинические данные свидетельствуют о том, что COVID-19 представляет собой системное заболевание, сопровождающееся поражением различных органов и систем, включая сердечно-сосудистую, нервную, почечную и гепатобилиарную системы.

Печень относится к органам, которые часто вовлекаются в патологический процесс при COVID-19. По данным различных исследований, биохимические признаки поражения печени выявляются у 14–53% пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией. Степень выраженности

гепатических нарушений варьирует от транзиторного повышения печёночных ферментов до развития тяжелых форм поражения печени, включая острый печёночный синдром.

В обзорной статье I. Garrido и соавт. [6] обобщены результаты исследований более 50 авторов и показано, что частота повышения АЛТ у больных COVID-19 варьирует от 2,5 до 50,0%, АСТ – от 2,5 до 61,1%, что сопровождается слегка повышенными уровнями общего билирубина. Напротив, повышение уровней ЩФ и ГГТ в большинстве исследований не было зарегистрировано, что совпадает с полученными нами данными об отсутствии повышения уровня общего билирубина, ЩФ и ГГТ.

В систематическом обзоре и метаанализе 35 исследований R. Мао и соавт. [7] показали, что общая распространенность гиперферментемии составила 19,0%, при этом у больных с тяжелым течением COVID-19 отмечались более высокие показатели уровней АЛТ и АСТ.

По-прежнему неясно, вызвано ли повреждение печени непосредственно самим вирусом или отражает тяжелую иммунновоспалительную реакцию организма.

В настоящее время рассматривается несколько возможных механизмов поражения печени:

1. SARS-CoV-2 характеризуется тропностью к клеткам, экспрессирующим рецепторы ангиотензинпревращающего фермента 2 (ACE2). Для проникновения в клетку вирусом используется клеточная трансмембранная сериновая протеаза 2 (TMPRSS2), которая расщепляет S-протеин (Spike-белок) SARS-CoV-2 [15]. В печени такие рецепторы выявляются на холангиоцитах и в меньшей степени на гепатоцитах [16]. По данным M. Du, экспрессия ACE2 в клетках желчных протоков в 20 раз превышает таковую в клетках печени [17]. X. Chai и соавт. установили, что уровни экспрессии ACE2 в холангиоцитах сопоставимы с таковыми в альвеолярных клетках легких [18]. В исследовании Y. Wang электронная микроскопия печени двух умерших пациентов с COVID-19 позволила определить вирусные структуры в гепатоцитах, отчетливо напоминающие вирионы SARS-CoV-2. Однако для подтверждения прямого цитопатического действия вируса на гепатоциты требуются дальнейшие исследования [19].

2. Ряд исследователей считают, что повреждение печени при COVID-19 вторично по отношению к иммунной дисрегуляции, цитокиновому шторму, развитию эндотелиопатии с ишемическим повреждением, лекарственному поражению печени или их комбинации. Ишемические, гиперкоагуляционные и гипервоспалительные состояния, но не повреждение печени как таковое служат независимыми предикторами смерти у пациентов с COVID-19 [31]. Иммуноопосредованное воспаление при тяжелых формах COVID-19, сопровождающееся высоким уровнем СРБ, D-димера, интерлейкина-6, ферритина, также способствует повреждению печени [9]. Повышение печеночных ферментов при таких вирусных инфекциях, как вирус Эпштейна–Барр, цитомегаловирус, вирус простого герпеса, парвовирус и аденовирус, отражает активацию иммунной системы и воспаление, вызванное циркулирующими цитокинами. Можно предположить, что аналогичные механизмы задействованы в повреждении печени при SARS-CoV-2, для которого характерно состояние цитокинового шторма.

3. Отличительной чертой COVID-19 является дыхательная недостаточность. Поэтому гипоксический гепатит из-за аноксии часто встречается в тяжелых случаях. Тяжелая гипоксия, аноксия, гиповолемия считаются основной причиной ишемического/гипоксического повреждения печени в случаях COVID-19 с острой легочной недостаточностью и/или шоком. Данное повреждение печени связано с метаболическим ацидозом, перегрузкой кальцием и изменениями проницаемости митохондриальной мембраны и обычно проявляется высоким цитолизом [32]. Кроме того, предполагают, что неструктурные белки SARS-CoV-2 видоизменяют структуру гемоглобина в эритроците, что приводит к нарушению транспорта кислорода, диссоциации железа, образованию порфирина, повышению уровня ферритина. Такое воздействие может привести к усилению воспалительных процессов в легких, развитию окислительного стресса, гипоксемии, гипоксии, симптомов острого респираторного дистресс-синдрома и полиорганной кислородной недостаточности [33]. Гипоксия, связанная с пневмонией, может способствовать повреждению печени или даже перерасти в печеночную недостаточность у пациентов с тяжелым течением COVID-19 [10].

4. В работе подчёркивается, что изменения печёночных проб уже регистрируются при поступлении еще до начала лечения, необходимо учитывать и лекарственное повреждение печени, особенно после применения ацетаминофена, лопинавира/ ритонавира и ремдесивира, которые потенциально гепатотоксичны. Согласно данным J. Fries и соавт., коррекции дозы гидроксихлорохина у больных с печеночной недостаточностью не требуется [11]. Показано, что лопинавир/ритонавир может вызывать кратковременное и бессимптомное повышение печеночных ферментов [12]. У пациентов с ко-инфекцией HBV и HCV терапия лопинавиром/ритонавиром может привести к их активации. Применение при лечении COVID-19 препарата тоцилизумаб может вызвать реактивацию HBV и таким образом привести к ухудшению функции печени [13]. Нельзя не учитывать вклад в повреждение печени

анальгетиков, жаропонижающих, которые используются больными для купирования лихорадки. С. Liu и соавт. [14] в многоцентровом ретроспективном исследовании показали, что у 32 больных с новой коронавирусной инфекцией разной степени тяжести поражение печени с большей вероятностью могло быть вызвано неблагоприятными лекарственными реакциями и системным воспалением у тяжелых пациентов, получающих медикаментозное лечение.

5. Реактивация ранее существовавшего заболевания печени. Пациенты с хроническими заболеваниями печени, особенно с аутоиммунными заболеваниями и после трансплантации печени, получающие пожизненную иммуносупрессивную терапию, представляют группу риска инфицирования SARS-CoV-2. В доступной нам литературе мы не встретили сообщений о случаях COVID-19 при аутоиммунном гепатите. В настоящее время Европейское общество по изучению печени/Европейское общество клинической микробиологии и инфекционных заболеваний (EASL-ESCMID) не рекомендует снижать иммуносупрессивную терапию пациентам с аутоиммунным заболеванием печени. Согласно рекомендациям, снижение может быть рассмотрено только в случае тяжелого течения COVID-19 при особых обстоятельствах (например, при лекарственно-индуцированной лимфопении или бактериальной/грибковой суперинфекции) [15].

К группе лиц с повышенным риском инфицирования относят также больных с циррозом печени. Однако убедительных данных об увеличении частоты осложнений у пациентов с COVID-19, включая печеночную энцефалопатию, кровотечение из верхних отделов желудочно-кишечного тракта и печеночную недостаточность, не получено [16]. В исследовании 111 больных с декомпенсированным циррозом печени в гастроэнтерологическом отделении больницы г. Уханя ни у одного из этих пациентов не было клинических симптомов, свидетельствующих о SARS-CoV-2-инфекции. Авторы объясняют это защитными мерами, которые были предприняты персоналом больницы по профилактике инфекции при ведении пациентов в амбулаторных и стационарных условиях. Напротив, в пяти других больницах г. Уханя была проанализирована заболеваемость у 101 больного с декомпенсированным циррозом печени. У 17 (17,0%) была диагностирована инфекция SARS-CoV-19 [17].

Интересен тот факт, что, учитывая экспрессию рецептора АПФ2 в холангиоцитах, можно было предположить усугубление холестаза у пациентов с первичным билиарным холангитом или первичным склерозирующим холангитом на фоне инфекции SARS-CoV-2, однако в доступной нам литературе подобных сведений не имеется.

Возможным субстратом выявленных лабораторных признаков поражения печени при морфологическом исследовании могут быть следующие изменения.

О.В. Зайратьянц и соавт. [18] при аутопсии более чем 2 тыс. случаев больных, погибших от COVID-19, показали, что во всех наблюдениях в печени выявлялась жировая дистрофия разной степени выраженности. Характерны были также петехиальные кровоизлияния и, нередко, лимфоидная инфильтрация портальных трактов, сходная с реактивным межлочечковым гепатитом. В отдельных случаях были обнаружены обширные некрозы ткани печени.

Морфологическое исследование печени пациента, погибшего от COVID-19 и острого респираторного дистресс-синдрома, показало умеренный микровезикулярный стеатоз и умеренное лобулярное и перипортальное воспаление, указывая на то, что повреждение печени могло быть вызвано либо инфекцией SARS-CoV-2, либо лекарственными препаратами [19]. Y. Zhang и соавт. [20] сообщали о легкой синусоидальной дилатации и минимальной лимфоцитарной инфильтрации, подчеркивая, что эти изменения неспецифичны и могут быть вызваны как инфекцией SARS-CoV-2, так и гипоксемией или лекарственным повреждением печени. При этом они обращают внимание, что ни в одном из образцов ткани печени не были обнаружены внутриядерные или внутрицитоплазматические вирусные включения.

Заключение. Таким образом, при инфекции, вызванной вирусом SARS-CoV-2, у больных поражение печени носит многофакторный характер. Оно является следствием прямого вирусного действия на гепатоциты и холангиоциты, иммуно опосредованного воспаления, гипоксии и действия гепатотоксичных лекарственных препаратов. Поражение печени при COVID-19 является клинически значимой и экономически обременительной проблемой. Систематический мониторинг функции печени, внедрение гепатопротективных стратегий и долгосрочное наблюдение пациентов имеют ключевое значение для снижения заболеваемости и нагрузки на систему здравоохранения. С экономической точки зрения печеночные осложнения приводят к увеличению длительности госпитализации и затрат на лечение в отделениях интенсивной терапии. Оптимизация ведения пациентов включает раннее выявление лиц высокого риска, минимизацию применения гепатотоксичных препаратов и структурированное постковидное наблюдение с оценкой степени фиброза.

Список литературы.

1. Zhang C, et al. Liver injury in COVID-19. *Lancet Gastroenterol Hepatol.* 2020;5:428-430.
2. Cai Q, et al. COVID-19: abnormal liver function tests. *J Hepatol.* 2020;73:566-574.
3. Marjot T, et al. COVID-19 and liver disease. *J Hepatol.* 2021;74:124-135.
4. Moon AM, et al. High mortality in cirrhosis with COVID-19. *Hepatology.* 2020;72:705-715.
5. Fix OK, et al. Clinical best practice advice for hepatology. *Clin Gastroenterol Hepatol.* 2020;18:2130-2141.
6. Bangash MN, et al. COVID-19 and the liver. *Lancet Gastroenterol Hepatol.* 2020;5:529-530.
7. Wu Y, et al. Liver injury mechanisms in COVID-19. *World J Gastroenterol.* 2021;27:1988-2001.
8. Yip TC, et al. Liver injury and mortality in COVID-19. *Gut.* 2021;70:807-815.
9. Hundt MA, et al. Abnormal liver tests in COVID-19. *Hepatology.* 2020;72:1971-1973.
10. Marjot T, et al. Outcomes following SARS-CoV-2 infection in CLD. *J Hepatol.* 2021;74:567-577.
11. Ji D, et al. NAFLD and COVID-19 severity. *J Hepatol.* 2020;73:451-453.
12. Singh S, et al. Pre-existing liver disease and COVID-19. *Clin Gastroenterol Hepatol.* 2020;18:2589-2596.
13. Lei F, et al. Risk factors of liver injury. *Clin Gastroenterol Hepatol.* 2020;18:2574-2583.
14. Garrido I, et al. COVID-19 and liver injury. *Liver Int.* 2020;40:1321-1331.
15. Wang Y, et al. Drug-induced liver injury in COVID-19. *Aliment Pharmacol Ther.* 2020;52:812-820.
16. Phipps MM, et al. Acute liver injury and outcomes. *Hepatology.* 2020;72:807-816.

Для цитирования: Джалалова Н.А., Атамухамедова Д.М. Поражение печени при коронавирусной инфекции // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 4(24). – С. 248–252. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19508687>

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ НЕЙРОНОВ ПРИ ИШЕМИЧЕСКОМ ИНСУЛЬТЕ**Боймаматова П.Ф.**

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Ишемический инсульт является многофакторным патологическим процессом, в основе которого лежит острое нарушение мозгового кровообращения, приводящее к гипоксии и активации ишемического каскада. Ключевыми механизмами повреждения нейронов являются энергетический дефицит, эксайтотоксичность, оксидативный стресс и нейровоспаление. Морфологические изменения варьируют от обратимых до необратимых с развитием некроза и апоптоза. Особое значение имеет зона ишемической полутени как основная мишень терапии. Современные исследования подчеркивают роль нейроваскулярной дисфункции, реперфузионного повреждения и новых форм клеточной гибели, что открывает перспективы для нейропротекции.

Ключевые слова: ишемический инсульт, ишемический каскад, эксайтотоксичность, оксидативный стресс, нейровоспаление, пенумбра, апоптоз, некроз.

MORPHOFUNCTIONAL CHANGES IN NEURONS IN ISCHEMIC STROKE**Boimamatova P.F.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Ischemic stroke is a multifactorial pathological process based on acute cerebrovascular accident, leading to hypoxia and activation of the ischemic cascade. Key mechanisms of neuronal damage include energy deficit, excitotoxicity, oxidative stress, and neuroinflammation. Morphological changes range from reversible to irreversible, with the development of necrosis and apoptosis. The ischemic penumbra zone is of particular importance as the primary target for therapy. Current research highlights the role of neurovascular dysfunction, reperfusion injury, and new forms of cell death, opening up opportunities for neuroprotection.

Keywords: ischemic stroke, ischemic cascade, excitotoxicity, oxidative stress, neuroinflammation, penumbra, apoptosis, necrosis.

ИШЕМИК ИНСУЛТДА НЕЙРОНЛАРНИНГ МОРФОФУНКЦИОНАЛ ЎЗГАРИШЛАРИ**Боймаматова П.Ф.**

Самарканд давлат тиббиёт университети, Самарканд ш., Ўзбекистон

Резюме. Ишемик инсульт - бу ўтқир мия қон томир авариясига асосланган қўп факторли патологик жараён бўлиб, гипоксия ва ишемик каскаднинг фаоллашишига олиб келади. Нейрон шикастланишининг асосий механизмлари энергия танқислиги, экситотоксиклик, оксидловчи стресс ва нейровоспаление ўз ичига олади. Морфологик ўзгаришлар некроз ва апоптоз ривожланиши билан қайтариладигандан қайтариб бўлмайдигангача ўзгаради. Ишемик пенумбра зонаси терапия учун асосий мақсад сифатида алоҳида аҳамиятга эга. Ҳозирги тадқиқотлар нейроваскуляр дисфункция, реперфузия шикастланиши ва ҳужайра ўлимининг янги шакллари ролни таъкидлайди, бу эса нейропротекция учун имкониятлар очади.

Калим сўзлар: ишемик инсульт, ишемик каскад, экситотоксиклик, оксидловчи стресс, нейровоспаление, пенумбра, апоптоз, некроз.

e-mail: pbojmatova@gmail.com

Ишемический инсульт представляет собой одно из наиболее значимых заболеваний центральной нервной системы, характеризующееся острым нарушением мозгового кровообращения с формированием очагового повреждения нервной ткани. В современной структуре заболеваемости и смертности цереброваскулярная патология занимает ведущие позиции, уступая лишь ишемической болезни сердца, при этом оставаясь основной причиной стойкой утраты трудоспособности и инвалидизации взрослого населения. Высокая распространённость инсульта, тяжесть его последствий и значительное экономическое бремя определяют его как приоритетное направление фундаментальных и клинических исследований.

С позиций современной нейробиологии ишемический инсульт рассматривается как сложный многофакторный патологический процесс, включающий каскад взаимосвязанных молекулярных, клеточных и тканевых реакций, приводящих к структурной и функциональной дезорганизации мозга. Центральное место в развитии патологических изменений занимает повреждение нейронов - высоко-специализированных клеток, обладающих ограниченной способностью к регенерации и высокой чувствительностью к гипоксии. Именно степень и характер нейронального повреждения определяют клиническую картину заболевания, выраженность неврологического дефицита и перспективы функционального восстановления [2].

В условиях ишемии головного мозга происходит резкое снижение доставки кислорода и глюкозы, что приводит к нарушению энергетического метаболизма и запуску так называемого ишемического каскада. Этот каскад включает ряд ключевых патогенетических звеньев, таких как энергетический дефицит, ионный дисбаланс, глутамат-опосредованная эксайтотоксичность, оксидативный стресс, активация воспалительных реакций и запуск программируемой клеточной гибели. В совокупности эти процессы формируют сложную систему повреждающих факторов, действующих как на уровне отдельных нейронов, так и на уровне нейрональных сетей и нейроваскулярной единицы.

Особое значение в патогенезе ишемического инсульта имеет концепция нейроваскулярной единицы, включающей нейроны, астроциты, эндотелиальные клетки, перициты и компоненты внеклеточного матрикса. Нарушение взаимодействия между этими элементами приводит к дестабилизации гематоэнцефалического барьера, ухудшению микроциркуляции и усилению вторичного повреждения нервной ткани. Таким образом, ишемический инсульт следует рассматривать не только как локальное поражение нейронов, но и как системное расстройство функционирования мозговой ткани [2,3]. Морфофункциональные изменения нейронов при ишемическом инсульте характеризуются выраженной гетерогенностью и зависят от множества факторов, включая длительность и степень ишемии, состояние коллатерального кровообращения, возраст пациента и наличие сопутствующих заболеваний. На ранних этапах ишемии преобладают обратимые изменения, связанные с нарушением метаболизма и функций клеточных органелл. Однако при прогрессировании патологического процесса формируются необратимые структурные повреждения, приводящие к гибели нейронов.

Особый интерес представляет изучение зоны ишемической полутени (пенумбры), окружающей центральный очаг некроза. В данной зоне нейроны сохраняют частичную жизнеспособность, несмотря на выраженное функциональное угнетение. Это определяет её ключевую роль как основной мишени для терапевтического воздействия. Своевременное восстановление кровотока и применение нейропротективных стратегий могут способствовать сохранению нейронов и предотвращению расширения зоны инфаркта.

Современные морфологические и ультраструктурные исследования позволили значительно расширить представления о характере повреждения нейронов при ишемии. Установлено, что патологические изменения затрагивают все структурные компоненты клетки, включая плазматическую мембрану, цитоскелет, митохондрии, эндоплазматическую сеть и ядро. При этом важную роль играют процессы митохондриальной дисфункции, сопровождающиеся нарушением синтеза АТФ и высвобождением проапоптотических факторов, таких как цитохром С, что запускает механизмы программируемой клеточной гибели [1]. Наряду с этим, в последние годы особое внимание уделяется роли нейровоспаления, оксидативного стресса и новых форм клеточной гибели, таких как ферроптоз и пироптоз, в развитии ишемического повреждения. Эти механизмы существенно расширяют представления о патогенезе инсульта и открывают новые возможности для разработки патогенетически обоснованных методов терапии.

Таким образом, изучение морфофункциональных изменений нейронов при ишемическом инсульте является ключевым направлением современной нейронауки и патофизиологии. Углублённое понимание механизмов повреждения и восстановления нейронов позволяет не только раскрыть фундаментальные аспекты патогенеза заболевания, но и создать научную основу для разработки новых методов диагностики, лечения и реабилитации пациентов.

Патогенетические основы повреждения нейронов при ишемии. В основе ишемического повреждения нейронов лежит острое нарушение церебрального кровотока, приводящее к дефициту кислорода и глюкозы — основных субстратов энергетического метаболизма нервной ткани. В условиях гипоксии происходит переход клеточного метаболизма на анаэробный гликолиз, сопровождающийся накоплением лактата и развитием метаболического ацидоза. Это приводит к снижению эффективности энергетических процессов и резкому уменьшению синтеза аденозинтрифосфата, необходимого для поддержания ионного гомеостаза клетки. Истощение запасов АТФ вызывает нарушение функции мембранных ионных насосов, прежде всего Na^+/K^+ -АТФазы, что приводит к деполяризации

клеточной мембраны, выходу калия из клетки и накоплению натрия и кальция внутри нейронов. Повышение внутриклеточной концентрации кальция является ключевым триггером повреждения, поскольку активирует каскад ферментативных реакций, включающих протеазы, липазы и эндонуклеазы, вызывающие разрушение клеточных структур. Одновременно с этим развивается феномен эксайтотоксичности, обусловленный избыточным высвобождением возбуждающих аминокислот, прежде всего глутамата. Гиперактивация NMDA-рецепторов приводит к дополнительному притоку кальция в клетку, усугубляя повреждение нейронов. Существенную роль в патогенезе играет оксидативный стресс, возникающий вследствие избыточного образования активных форм кислорода. Эти молекулы повреждают липиды клеточных мембран, белки и нуклеиновые кислоты, нарушая структурную целостность нейронов и их функциональную активность [9,10].

Кроме того, ишемия сопровождается активацией воспалительных процессов, включая высвобождение цитокинов, активацию микроглии и миграцию лейкоцитов в очаг повреждения. Это приводит к дополнительному повреждению ткани мозга, формируя замкнутый патологический круг.

Морфологические изменения нейронов при ишемическом инсульте. Морфологические изменения нейронов при ишемическом инсульте носят стадийный характер и отражают динамику патологического процесса. На ранних этапах ишемии наблюдаются обратимые изменения, связанные с нарушением микроциркуляции и развитием отека. В этот период отмечается набухание нейронов, расширение перикеллолярных пространств, вакуолизация цитоплазмы и нарушение структуры органелл. По мере прогрессирования ишемии формируются необратимые изменения, характеризующиеся выраженной деструкцией нейронов. В цитоплазме отмечается распад тигроидного вещества, исчезновение рибосом, фрагментация эндоплазматической сети и аппарата Гольджи. Ядра нейронов подвергаются пикнозу, кариорексису или кариолизису, что свидетельствует о глубоком повреждении генетического аппарата клетки. Характерным морфологическим признаком ишемического повреждения являются так называемые «клетки-тени», представляющие собой остатки погибших нейронов с утратой структурной организации. Кроме того, наблюдается явление нейрофагии, при котором погибшие нейроны фагоцитируются микроглиальными клетками [4,5]. Особенно выраженные изменения отмечаются в наиболее чувствительных к гипоксии структурах мозга, таких как кора больших полушарий и гиппокамп. При этом степень повреждения варьирует в зависимости от глубины и продолжительности ишемии, а также от индивидуальных особенностей организма.

Морфометрические и ультраструктурные изменения нейронов. Морфометрические исследования позволяют количественно оценить степень повреждения нейронов при ишемическом инсульте. Установлено, что ишемия сопровождается уменьшением размеров нейронов, снижением площади клеточного тела и ядра, а также изменением их формы. Эти изменения отражают нарушение метаболической активности и снижение функционального потенциала нейронов. На ультраструктурном уровне выявляются значительные изменения внутриклеточных органелл. Митохондрии подвергаются набуханию, их кристы разрушаются, что приводит к нарушению процессов окислительного фосфорилирования. Эндоплазматическая сеть и аппарат Гольджи редуцируются, что свидетельствует о снижении синтетической активности клетки. Отмечается также диссоциация полирибосом и уменьшение содержания РНК, указывающее на угнетение белоксинтеза. Важным морфометрическим показателем является увеличение количества гиперхромных сморщенных нейронов, что свидетельствует о развитии необратимых дегенеративных изменений. Одновременно наблюдается рост числа гипохромных нейронов, отражающих различные стадии повреждения и гибели клеток [2,6].

Таким образом, морфометрические и ультраструктурные изменения нейронов являются объективным критерием тяжести ишемического повреждения и могут использоваться для оценки эффективности терапевтических вмешательств.

Ишемическая полутень (пенумбра) как зона потенциальной обратимости. Концепция ишемической полутени (пенумбры) является ключевой в понимании патогенеза инсульта. Эта зона окружает центральный очаг некроза и характеризуется снижением кровотока, недостаточным для нормального функционирования нейронов, но достаточным для поддержания их жизнеспособности в течение определенного времени. В области пенумбры нейроны находятся в состоянии функциональной депрессии, обусловленной энергетическим дефицитом и нарушением синаптической передачи. Морфологически здесь преобладают обратимые изменения, такие как умеренное набухание клеток и частичная деструкция органелл. Однако при отсутствии своевременного восстановления кровотока эти изменения переходят в необратимые, приводя к гибели клеток.

Пенумбра является основной мишенью терапевтических вмешательств, направленных на восстановление кровотока и защиту нейронов от повреждения. Эффективность лечения во многом зависит от времени его начала, что обуславливает концепцию «терапевтического окна».

Восстановление кровотока в ишемизированной зоне, несмотря на свою необходимость, может сопровождаться развитием реперфузионного повреждения. Этот феномен связан с резким увеличением поступления кислорода в ткань, что приводит к усиленному образованию свободных радикалов и активации процессов перекисного окисления липидов. Реперфузия сопровождается нарушением целостности гематоэнцефалического барьера, развитием вазогенного отека и усилением воспалительной реакции. В результате увеличивается проницаемость сосудов, происходит выход плазменных белков в межклеточное пространство, что усугубляет повреждение нейронов [5,8].

Экспериментальные данные свидетельствуют о том, что в условиях реперфузии увеличивается количество погибающих нейронов, что связано с активацией апоптотических механизмов и усилением эксайтотоксичности. Таким образом, реперфузионное повреждение является важным фактором, ограничивающим эффективность терапии ишемического инсульта. Нейровоспаление является неотъемлемой частью патогенеза ишемического инсульта. В ответ на повреждение нейронов происходит активация микроглии и астроцитов, которые начинают продуцировать провоспалительные цитокины, хемокины и другие медиаторы воспаления. Микроглия выполняет двойственную роль: с одной стороны, она участвует в удалении погибших клеток и ограничении зоны повреждения, с другой — способствует усилению воспалительной реакции и вторичному повреждению нейронов. Астроциты участвуют в регуляции ионного гомеостаза и поддержании структуры гематоэнцефалического барьера, однако при ишемии их функция нарушается. Инфильтрация лейкоцитов в очаг повреждения усиливает воспалительный процесс, способствуя разрушению внеклеточного матрикса и увеличению проницаемости сосудов. В совокупности эти процессы формируют сложную сеть взаимодействий, определяющих исход ишемического повреждения [1,7].

Некроз и апоптоз как основные механизмы гибели нейронов. Гибель нейронов при ишемическом инсульте осуществляется посредством двух основных механизмов — некроза и апоптоза. Некроз характерен для центральной зоны инфаркта и обусловлен выраженным энергетическим дефицитом. Он сопровождается разрушением клеточных мембран, выходом внутриклеточного содержимого и развитием воспалительной реакции. Апоптоз, напротив, является программируемым процессом клеточной гибели, который преобладает в зоне ишемической полутени. Он характеризуется активацией каспаз, фрагментацией ДНК и образованием апоптотических телец. Важную роль в регуляции апоптоза играют белки семейства Bcl-2, определяющие баланс между выживанием и гибелью клеток. Сочетание некротических и апоптотических механизмов обеспечивает постепенное расширение зоны повреждения, что делает их важной мишенью для терапевтического воздействия [4,10].

В отдаленные сроки после ишемического инсульта формируются стойкие морфологические изменения, отражающие процессы репарации и ремоделирования нервной ткани. В зоне некроза развивается глиоз, характеризующийся пролиферацией глиальных клеток и замещением погибших нейронов. Также наблюдается образование микрокист, склероз сосудов и атрофия мозговой ткани. Эти изменения сопровождаются нарушением нейрональных связей и снижением функциональной активности мозга. Хроническая ишемия способствует формированию диффузных дистрофических изменений, включая атрофию нейронов, снижение их плотности и нарушение синаптической передачи. В совокупности эти процессы лежат в основе развития сосудистой деменции и других поздних осложнений инсульта.

Заключение. Таким образом, проведенный анализ современных литературных данных и результатов морфологических исследований свидетельствует о том, что морфофункциональные изменения нейронов при ишемическом инсульте представляют собой многоэтапный, динамически развивающийся патологический процесс, в основе которого лежит сложный каскад взаимосвязанных молекулярных, клеточных и тканевых реакций. Первичным пусковым механизмом является острое нарушение мозгового кровотока, приводящее к гипоксии и энергетическому дефициту, что инициирует цепь патологических изменений, включающих нарушение ионного гомеостаза, активацию эксайтотоксичности, развитие оксидативного стресса и формирование выраженной воспалительной реакции. Эти процессы, действуя синергично, приводят к глубоким структурным и функциональным нарушениям нейронов, реализующимся как на уровне субклеточных органелл, так и на уровне нейрональных сетей.

Морфологические изменения нейронов при ишемии характеризуются выраженной полиморфностью и стадийностью, начиная от обратимых ультраструктурных нарушений (набухание митохондрий, диссоциация рибосом, вакуолизация цитоплазмы) и заканчивая необратимой деструкцией клеток с развитием некроза и апоптоза. При этом установлено, что ключевую роль в определении исхода ишемического повреждения играет баланс между процессами клеточной гибели и механизмами адаптации и восстановления. В последние годы особое внимание уделяется таким формам клеточной ги-

бели, как ферроптоз, который связан с нарушением липидного метаболизма и накоплением активных форм кислорода, что открывает новые перспективы для разработки нейропротективных стратегий.

Принципиально важным элементом патогенеза ишемического инсульта является зона ишемической полутени, представляющая собой функционально угнетённую, но потенциально жизнеспособную ткань. Современные исследования подтверждают, что сохранение нейронов в данной зоне возможно при условии своевременного восстановления перфузии и применения нейропротективной терапии. Именно пенумбра рассматривается как основная терапевтическая мишень, поскольку в ней сохраняются структурные предпосылки для восстановления нейрональных функций.

Значительную роль в формировании морфофункциональных изменений играют процессы нейровоспаления и взаимодействие компонентов нейроваскулярной единицы. Активация микроглии и астроцитов, а также инфильтрация иммунных клеток способствуют как удалению повреждённых элементов, так и усилению вторичного повреждения нервной ткани. В последние годы активно изучается роль внеклеточных везикул и межклеточной коммуникации в регуляции этих процессов, что рассматривается как перспективное направление диагностики и терапии инсульта.

Не менее важным аспектом является реперфузионное повреждение, которое может усугублять исход ишемии за счёт усиления оксидативного стресса, нарушения гематоэнцефалического барьера и активации воспалительных реакций. Это подчёркивает необходимость разработки комплексных терапевтических подходов, направленных не только на восстановление кровотока, но и на защиту нейронов от вторичных повреждающих факторов. Современные нейровизуализационные и морфометрические исследования демонстрируют, что ишемический инсульт сопровождается не только локальными, но и системными изменениями структуры и функции мозга, включая перестройку нейрональных сетей и изменение морфометрических параметров коры. Эти изменения сохраняются на протяжении длительного времени и определяют процессы восстановления и нейропластичности.

Таким образом, морфофункциональные изменения нейронов при ишемическом инсульте следует рассматривать как сложный интегративный процесс, включающий повреждение, адаптацию и частичное восстановление нервной ткани. Углублённое понимание этих механизмов имеет ключевое значение для разработки новых направлений нейропротекции, включая молекулярно-таргетную терапию, клеточные технологии и методы стимуляции нейропластичности. Перспективы дальнейших исследований связаны с изучением межклеточных взаимодействий в нейроваскулярной единице, механизмов программируемой клеточной гибели и возможностей регенерации нервной ткани, что в конечном итоге позволит повысить эффективность лечения и улучшить прогноз пациентов с ишемическим инсультом.

Список литературы:

1. Gao X., Liu D., Yue K. et al. Neurovascular unit-derived extracellular vesicles in ischemic stroke // *Biomolecules*. – 2024. – Vol. 14, № 3. – P. 378.
2. Greșită A., Hermann D.M., Boboc I.K. et al. Glial cell reprogramming in ischemic stroke // *Translational Stroke Research*. – 2025. – Vol. 16, № 5. – P. 1811–1835.
3. Huang H., Zhang J., Lin J. et al. Efficacy and safety of mesenchymal stem cells in ischemic stroke // *BMC Neurology*. – 2024. – Vol. 24. – P. 48.
4. Majumder D. Ischemic stroke: pathophysiology and evolving treatment approaches // *Neuroscience Insights*. – 2024. – Vol. 19. – P. 26331055241292600.
5. Rehman S., Nadeem A., Akram U. et al. Molecular mechanisms of ischemic stroke // *Biomedicines*. – 2024. – Vol. 12, № 4. – P. 812.
6. Zhang L., Bai X.Y., Sun K.Y. et al. Ferroptosis in ischemic stroke // *Neurochemical Research*. – 2024. – Vol. 49, № 4. – P. 815–833.
7. Zhang Z. Resting-state functional abnormalities in ischemic stroke // *Brain Imaging and Behavior*. – 2024. – Vol. 18, № 6. – P. 1569–1581.
8. Zhao Y., Zhang X., Chen X. et al. Neuronal injuries in cerebral infarction // *International Journal of Molecular Medicine*. – 2022. – Vol. 49, № 2. – P. 15.
9. Zhou H., Wang J., Zhu Z. et al. Brain oxygen dynamics in stroke pathophysiology // *Aging and Disease*. – 2024. – Vol. 16, № 4. – P. 2343–2353.
10. Chen X., Liang J., Deng C. et al. Cortical morphometric changes in ischemic stroke recovery // *Frontiers in Neurology*. – 2025. – Vol. 16. – P. 1644413.

Для цитирования: Боймаматова П.Ф. Морфофункциональные изменения нейронов при ишемическом инсульте // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 4(24). – С. 253–257. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19508763>

ЛАБОРАТОРНЫЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА ДИФТЕРИЙНЫХ БАКТЕРИЙ В РОТОВОЙ ПОЛОСТИ**Маматова М.Н., Жумабоева Ю.О., Шавкатова М.Ш.**

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Изучение количества возбудителей в очаге поражения имеет важное значение для понимания ряда сторон патогенеза инфекционного процесса, а также для определения значимости каждого источника инфекции в последовательной цепи заражений. Первостепенной задачей настоящего исследования явилась разработка такого лабораторного метода определения количества дифтерийных микробов в зеве, который бы обеспечивал получение четких и стандартных данных.

Ключевые слова: инфекция, дифтерия, лабораторный метод, патогены.

LABORATORY METHOD FOR DETERMINING THE NUMBER OF DIPHTHERIA MICROBES IN THE ORAL CAVITY**Mamatova M.N., Zhumaboeva Yu.O., Shavkatova M.Sh.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Studying the number of pathogens in the focus of infection is of great importance for understanding various aspects of the pathogenesis of the infectious process, as well as for determining the significance of each source of infection in the sequential chain of infections. The primary task of this study was to develop a laboratory method for determining the number of diphtheria microbes in the throat that would ensure the acquisition of clear and standard data.

Key words: infection, diphtheria, laboratory method, pathogens.

ОЎИЗДАГИ ДИФТЕРИЯ БАКТЕРИЯЛАРИ СОНИНИ АНИҚЛАШНИНГ ЛАБОРАТОРИЯ УСУЛИ**Маматова М.Н., Жумабоева Ю.О., Шавкатова М.Ш.**

Самарканд давлат тиббиёт университети, Самарканд ш., Ўзбекистон

Резюме. Инфекцион зарарланган ўчоқдаги патоген кўзгатувчилар сонини ўрганиш инфекция жараён патогенезининг бир қанча жиҳатларини тушунишда, шунингдек, инфекция занжиридаги ҳар бир инфекция манбасини аниқлашда аҳамиятли. Ушбу тадқиқотнинг бирламчи мақсади оғиздаги дифтерия бактериялари сонини аниқлашда стандартлаштирилган маълумотларни тақдим этадиган лаборатория усулини ишлаб чиқишдир.

Калим сўзлар: инфекция, дифтерия, лаборатор усул, патогенез.

e-mail: mamatova_muborak@gmail.com

Введение. Изучение количества возбудителей в очаге поражения имеет важное значение для понимания ряда сторон патогенеза инфекционного процесса, а также для определения значимости каждого источника инфекции в последовательной цепи заражений. В то же время количественный фактор при большинстве инфекций еще недостаточно изучен [1, 8, 12]. Так, по изучению характеристики микробного очага при дифтерии имеются лишь единичные работы [5, 11, 12], в которых указывается на большую обсемененность зева возбудителями у больных, чем у бактерионосителей. Например, у 9 больных и 9 носителей показывает, что у первых зараженность зева дифтерийными палочками была в среднем в 2 000 раз больше, чем у носителей. Эти работы написаны в допрививочное время, когда среди больных большой удельный вес составляли лица с токсическими тяжелыми формами дифтерии. Теперь при массовом проведении прививок среди детей, когда возбудитель циркулирует преимущественно среди привитых, т. е. в иных экологических условиях, и когда произошли существенные сдвиги в распределении клинических форм в сторону более легкого течения, мы можем ожидать и количественных изменений в обсемененности дифтерийными микробами зева больных и носителей.

Цель исследования. Первостепенной задачей настоящего исследования явилась разработка такого лабораторного метода определения количества дифтерийных микробов в зеве, который бы обеспечивал получение четких и стандартных данных.

Для получения максимально стандартных результатов на протяжении всей работы использовали одни и те же или одинаковые ингредиенты среды. В качестве питательной основы применяли сухой питательный агар Дагестанского института питательных сред (желательно использовать сухой агар «Д») с добавлением пептона (импортного или семипалатинского) [2, 3, 4, 6]. После небольшой дополнительной подтитровки ингредиентов мы остановились на следующей прописи среды. К 100 мл готового питательного агара (содержащего 0,5% пептона) добавляют 0,1 н. раствор HCl-6 мл, 1% раствор цистина в 0,1 н. растворе NaOH - 6 мл, 10% раствор теллуристокислого калия 3 мл, 2,5% раствор гипосульфита (кристаллического) - 2 мл, лошадиную сыворотку (но не бычью!) - 20 мл [7, 8, 10].

На этой среде колонии дифтерийных бактерий окружены темными ореолами сернистого теллура, образование которых специфично только для этого вида микробов, что облегчает идентификацию и подсчет выросших колоний. Хотя «всхожесть» дифтерийных бактерий на этой среде была на $\frac{1}{3}$ ниже (разница статистически достоверна), чем на кровяном теллуритовом агаре, мы сочли возможным оставить для работы избранную нами модификацию цистин-теллурит-сывороточной среды благодаря демонстративности внешнего вида колоний.

Материалы и методы. Материал для посевов брали путем полоскания зева 5 мл физиологического раствора, содержавшего 0,1% агар-агара (pH 7,6). Результаты специальных исследований показали, что в полужидкой среде дифтерийные микробы отмирают медленнее, чем в жидкой, и во время транспортировки проб в лабораторию в течение 2-3 часов в смывах число жизнеспособных клеток практически не уменьшается. Смывы брали через 3-4 часа после приема пищи, сливали в колбочки с бусами, доставляли в лабораторию, где их встряхивали в шюттельаппарате в течение 3 мин. (для более полного перемешивания) и по 0,1 мл смыва высевали на 2 чашки со средой указанного состава.

В продолжение всего периода работы высевы и растирания шпателем производили одни и те же лица для получения максимально стандартных результатов. Колонии идентифицировали и подсчитывали через 48 часов. В сомнительных случаях (нечеткость ореолов вокруг колоний) выделяли чистые культуры, которые идентифицировали затем на основании изучения основных биологических признаков.

С помощью описанной методики изучена количественно зараженность зева дифтерийными бактериями у 15 больных дифтерией и 30 бактерионосителей. Всего исследован 45 смыв зева, причем у большинства больных пробы брали по несколько раз для получения представления о динамике изменений количественной зараженности зева. Работу проводили на базе инфекционной больницы детского отделения в городе Самарканда.

Из 15 больных дифтерией зева у большинства были легкие формы заболевания (локализованные, в том числе атипичные и стертые формы), у 2- распространенные и только у 7 тяжелые (субтоксическая и токсические формы I-III степени). Среди носителей токсигенных бактерий мы различали детей со здоровой носоглоткой и детей с различными воспалительными процессами (хронический тонзиллит и его обострения) - соответственно. Кроме того, 2 небольшие аналогичные группы соответственно 6 и 7 человек выделены среди носителей нетоксигенных бактерий.

Показателем зараженности зева считали число дифтерийных колоний на цистин-теллурит-сывороточной среде, выросших при 0,1 мл смыва.

Оказалось, что зараженность полости зева дифтерийными бактериями как у больных, так и у бактерионосителей колеблется в очень широких пределах. При статистической обработке материала обнаружено значительное варьирование результатов внутри каждой группы обследованных. Однако выявлена четкая тенденция к большей зараженности зева больных дифтерией по сравнению со здоровыми бактерионосителями. Носители бактерий с воспалительными изменениями в носоглотке занимали промежуточное положение, приближаясь порой к группе больных. Так, средний логарифм числа колоний, выросших при засеве 0,1 мл смыва от больных, составлял 1,61, у бактерионосителей с воспаленной и здоровой слизистой оболочкой соответственно 0,95 и 0,39. Эта же тенденция была видна при сопоставлении медиан показателей зараженности, составлявших соответственно 86,8; 3,5 и 0,5 в каждой группе зараженных лиц. Различия между приведенными показателями оказались статистически достоверными на 95%.

Высокая обсемененность зева (десятки и сотни тысяч колоний) обнаружена только у больных; у бактерионосителей с воспалительными явлениями встречались смывы, при посеве которых вырастали тысячи колоний; у здоровых носителей бактерий не отмечали таких показателей, и при посеве их смывов ни разу не выросло число колоний, превышавшее 400. Кроме того, у лиц этой группы 40% смывов от заведомых носителей вообще не дали роста дифтерийных бактерий при посеве 0,1 мл смыва.

Результаты. Учитывая все это, мы рекомендуем при посеве смывов от больных дифтерией разводить их предварительно в 10 и 100 раз, чтобы получить число колоний, доступное подсчету. С другой стороны, при посеве смывов от носителей без воспалительных явлений желательно засеивать по 0,2 мл и более, чтобы увеличить вероятность улавливания бактерий.

Нам не удалось отметить разницы в обсемененности зева дифтерийными бактериями у больных с разными клиническими формами дифтерии, возможно, из-за малочисленности этой группы. Результаты динамического изучения больных показали, что при обширных дифтеритических налетах на 2-4-й день болезни в смывах со слизистой оболочки зева обнаруживаются лишь единичные дифтерийные палочки. Только с момента отторжения налетов и даже после их исчезновения число бактерий Леффлера в смывах резко возрастает [9]. К 6-10-му дню болезни микробы в смывах уже не обнаруживались у большинства наблюдавшихся нами больных.

Выводы: Таким образом, предложенная нами методика позволила подтвердить данные прежних авторов (как правило, эмпирические или недостаточно обоснованные методически) о большей пораженности дифтерийными микробами зева больных, чем бактерионосителей.

Мы также выявили неоднородность группы бактерионосителей и показали большую зараженность слизистой оболочки зева у носителей бактерий с воспалительными изменениями в носоглотке, чем у лиц со здоровой слизистой оболочкой. Этот факт должен привлечь особое внимание эпидемиологов и клиницистов к бактерионосителям с патологическими изменениями в носоглотке.

Список литературы:

1. Даминов Ф.А., Маматова М.Н., Биологические свойства стрептококков в условиях экспериментальной стрептококковой инфекции // Research Focus International Scientific Journal, 2024, V. 3(10), 33-39.
2. Кадыров Ж.Ф., Ризаев Ж.А., Маматова М.Н. и др. Влияние полиморфизма гена HLA-DRA на течение ВИЧ1 инфекции // Журнал теоретической и клинической медицины. Ташкент, - 2025, С. 11-17.
3. Кадиров Ж.Ф., Маматова М.Н. К морфологическому изучению базофильных гранулоцитов крови // Журнал «Tadqiqotlar. Uz». 2024, T. 5(2), 25-31.
4. Kadirov J.F., Mamatova M.N. The use of infect nemagglutination reaction for determination of antibodies to staphylococcus toxin // Infektsiya, immunitet end farmakologiy. 2024, 5 (2) 66-75.
5. Маматова М.Н. Гистологическая диагностика неэффективного эритропоэза // «Тиббиётда янги кун» Илмий журнал. 2024, 7 (69), 77-85.
6. Маматова М.Н. Study of the biological properties of rabies by the method of diagnosis of the "Gold standard" // Scientific Journal, Colden Brain. -2024, Volum 2 (4).
7. Фрайштат Д.М. Реактивы и препараты для микроскопии // - М.: Химия, 1980. -С. 480.
8. Правосудова Н.А., Мельников В.Л. Микробиология полости рта // Учебно-методическое пособие для студентов медицинских вузов. ПЕНЗА 2013.
9. Шайкулов Х.Ш., Маматова М.Н., Исокулова М.М. Применение реакции непрямой гемагглютинации для определения антител к стафилококковому токсину // Ж. Экономика и социум. 26.07.2024.
10. Berne, C. Adhesius involvet in attachment to abiotic surfases by gram-negative bacteria/ C. Berne, A. Ducvet, G.G. Itarby, J.V. Brun // Microbiol. Streptococcus - 2015. - v. 3. №4., olio: 10.1128 / microbiolspec. MB - 0018 -2015.
11. McKenzie P.E., Hawke D., Woodroffe A.J. et al. Serum and tissue immune complexes in infective endocarditis. J. Clin Lab Immunol 1980; 4(3): 125.
12. Маматова М.Н. Silymarin and N-acetylcysteine reduce acetaminophen-induced liver damage in rats by modulating the expression of CYP2Y1 and Nrf2 genez.

Для цитирования: Маматова М.Н., Жумабоева Ю.О., Шавкатова М.Ш. Лабораторный метод определения количества дифтерийных бактерий в ротовой полости // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 4(24). – С. 258–260. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19508819>

СТОМАТОЛОГИК ЁРДАМДА БЕМОР ҲУҚУҚЛАРИНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ ҲОЗИРГИ ҲОЛАТИ

Шукуров А.Ф.¹, Шукурова Н.Т.²

¹Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

²Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Мақолада стоматологик ёрдам кўрсатишида бемор ҳуқуқларининг амалий ҳолати диссертация материаллари асосида таҳлил қилинди. Норматив таҳлил ва сўров натижалари бирга кўриб чиқилди. Беморнинг ахборот олиш, ёзма розилик бериш, ёзма режа олиш, кафолат шартларини билиш ва ҳужжатлар нусхасини олиш имконияти бир хил даражада таъминланмагани аниқланди. Шу асосда амалий тартибни соддалаштириш ва мажбурий ёзма блокларни кенгайтириш бўйича ҳулоса берилди.

Калит сўзлар: стоматологик ёрдам, бемор ҳуқуқлари, ёзма розилик, ҳужжатлар, кафолат, шикоят тартиби.

CURRENT STATE OF ENSURING PATIENT RIGHTS IN DENTAL CARE

Shukurov A.F.¹, Shukurova N.T.²

¹Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

²Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. The article analyzes the practical state of patient rights in the provision of dental care based on the materials of the dissertation. The results of the normative analysis and the survey were considered together. It was established that the patient's access to information, written consent, a written plan, knowledge of the terms of the guarantee, and the possibility of obtaining copies of documents was not provided to the same extent. Based on this, a conclusion was made on simplifying the practical procedure and expanding mandatory written blocks.

Keywords: dental care, patient rights, written consent, documents, guarantee, complaint procedure.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ ПАЦИЕНТА СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩЬЮ

Шукуров А.Ф.¹, Шукурова Н.Т.²

¹Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

²Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. В статье на основе материалов диссертации проанализировано практическое состояние прав пациента при оказании стоматологической помощи. Результаты нормативного анализа и опроса были рассмотрены вместе. Было установлено, что доступ пациента к информации, письменному согласию, письменному плану, условиям гарантии и копиям документов был обеспечен не в одинаковой степени. На этой основе был сделан вывод об упрощении практических процедур и расширении обязательных письменных блоков.

Ключевые слова: стоматологическая помощь, права пациента, письменное согласие, документы, гарантия, порядок обжалования.

Кириш. Стоматологик хизмат беморнинг танлови, даволаш жараёни ва тўлов шартлари бир нуктада учрашадиган соҳадир. Шу сабабли бу ерда фақат клиник натижа эмас, балки беморга маълумот қандай берилгани ҳам катта аҳамият касб этади. Агар шифокор даволашнинг мазмуни, босқичлари ва эҳтимолий оқибатларини аниқ тушунтирмаса, кейинги келишмовчилик кўпинча айнан шу жойдан бошланади.

Диссертация материаллари стоматологияда ҳуқуқий ҳимоя кўпинча умумий норма даражасида қолиб кетишини кўрсатади. Қонунда беморнинг ахборот олиш ҳуқуқи тан олинади, лекин амалий босқичларда нима ёзма берилиши, қайси маълумот албатта қайд этилиши ва қайси вазиятда нусха топширилиши кераклиги ҳар доим бир хил эмас. Натижада клиника ичида тартиб бор, лекин у ҳамма жойда бир кўринишда ишламайди.

Шунинг учун бу мақолада эътибор умумий шиорларга эмас, балки кундалик амалиётдаги содда саволларга қаратилди. Бемор ёзма розилик оладими. Даволаш режаси бериладими. Кафолат ҳақида

оғзаки эмас, ёзма тарзда гапириладими. Шикоят бериш йўли беморга олдиндан тушунтириладими. Айнан шу нуқталар бемор ҳуқуқларининг реал ишлаш даражасини кўрсатади.

Материаллар ва усуллар. Тадқиқот диссертацияда қўлланган норматив-ҳуқуқий таҳлил, контент таҳлил ва социологик усулларга таянди. Беморлар гуруҳи 211 кишидан, шифокорлар гуруҳи эса 35 стоматологдан иборат бўлди. Баҳолашда беморнинг ҳуқуқий хабардорлиги, ўзаро муносабатнинг хужжатлаштирилганлиги ҳамда бемор маршрутининг сифати алоҳида кўрсаткич сифатида қўрилди.

Эмпирик қисмда энг муҳим блоклар танлаб олинди. Улар ёзма розилик, ёзма даволаш режаси, тўлов шартларининг тушунтирилиши, кафолат ҳақидаги маълумот, даволашдан кейинги ёзма тавсиялар, хужжат нусхаларини олиш ва шикоят бериш тартибидан иборат бўлди. Бу ёндашув бемор ҳуқуқлари ҳақидаги умумий гапни аниқ ўлчанадиган ҳолатга айлантирди.

Натижалар. Сўров натижалари бемор ҳуқуқларининг айрим бўғинлари ишлаётганини, айримлари эса заиф қолаётганини кўрсатди. Респондентларнинг 59,2 фоизи хусусий, 40,8 фоизи давлат ташкилотига мурожаат қилган. Аёллар улуши 60,2 фоизни ташкил этди. Энг катта ёш гуруҳи 30–44 ёш ораллиғига тўғри келди. Бу таркиб стоматологик хизматнинг асосан фаол меҳнат ёшидаги аҳоли учун долзарб эканини кўрсатади.


1-жадвал

Тадқиқот иштирокчиларининг умумий тавсифи

Кўрсаткич	Категория	Н	%
Жинс	Аёл	127	60,2
Жинс	Эркак	84	39,8
Ёш	30–44	82	38,9
Ёш	45–59	58	27,5
Ташкилот тури	Хусусий	125	59,2
Ташкилот тури	Давлат	86	40,8

Изоҳ: жадвал муаллифнинг беморлар сўрови натижалари асосида тузилди.

Бу тақсимотнинг ўзи ҳам муҳим. Чунки муаммо фақат битта сектор билан чекланмайди. Бемор ҳуқуқларига оид саволлар хусусий ва давлат бўғинида бирдай долзарб. Шу сабабли ҳуқуқий блокларни фақат назорат чораси сифатида эмас, балки бутун тизим учун хизмат кўрсатиш сифати мезони сифатида кўриш тўғрироқ бўлади.



1-расм. Ёзма информацияланган розилик бўйича бемор жавоблари.

Розилик бўйича кўрсаткич алоҳида эътиборни талаб қилади. Фақат 36,0 фоиз бемор ёзма розилик мавжудлигини тасдиқлаган. 44,1 фоиз бундай хужжат бўлмаганини билдирган, яна 19,9 фоиз эса аниқ жавоб бера олмаган. Бу фақат хужжатнинг йўқлиги эмас. Бу маълумот бериш усули ҳам бемор онгида мустаҳкам қолмаётганини англатади.

Ёзма даволаш режасининг 62,6 фоиз бўлиши тизимда ижобий замин борлигини кўрсатади. Бироқ ёзма кафолат ахбороти атиги 20,9 фоизда учрагани аниқ номутаносибликни кўрсатади. Яъни даволашнинг ўзи ҳақида гап бор, лекин натижа, хизмат чегараси ва кейинги мажбуриятлар ҳақида ёзма аниқлик етарли эмас.


Бемор ҳуқуқларини таъминлаш бўйича асосий кўрсаткичлар

Кўрсаткич	Базавий даража	Мақсадли даража
Ёзма розилик мавжудлигини тасдиқлаган беморлар	36,0%	камида 85%
Ёзма розилик йўқлигини кўрсатганлар	44,1%	10% дан юқори эмас
Ёзма даволаш режасини олганлар	62,6%	камида 90%
Ёзма кафолат маълумотини олганлар	20,9%	камида 70%
Ёзма тавсиялар олганлар	37,0%	камида 80%

Изоҳ: мақсадли кўрсаткичлар диссертацияда таклиф этилган мониторинг йўналишлари асосида келтирилди.

Жадвал ва графикни бирга кўриш муҳим. Улар бир хил нарсани такрорламайди. Жадвал тизим қаерга бориши кераклигини кўрсатади, график эса амалдаги масофа қанчалик катта эканини очади. Айниқса кафолат ва постдаволаш тавсиялари бўйича узилиш каттароқ. Бу эса шикоят кўпаядиган жойлар ҳам айнан шу бўлиши мумкинлигини билдиради.

Демак, бемор ҳуқуқларини мустаҳкамлаш учун мураккаб ҳужжатлар тўплами эмас, балки аниқ ва ихчам ёзма блоклар керак. Розилик шакли, даволаш режаси, кафолат банди, тавсиялар ва ҳужжат нусхаларини бериш тартиби бир хил ишласа, бемор ҳам, клиника ҳам анча ишончли ҳолатга ўтади.



2-расм. Ёзма ахборот блоклари бўйича асосий кўрсаткичлар.

Графикнинг якуний қисми ёзма ахборот блоклари бир хил ишламаётганини янада аниқ кўрсатади. Айниқса кафолат ва қўшимча ёзма тушунтиришлар бўйича паст улуш клиника ичида мажбурий ва қисқа стандартларни жорий этиш зарурлигини англатади.

Муҳокама. Стоматологияда ишонч кўпинча тиш даволанганидан кейин эмас, ундан олдин шаклланади. Бемор нима қилиниши, нима учун қилиниши ва қанча босқич бўлишини тушунса, низо хавфи пасаяди. Бу ҳолатда ёзма шакл шунчаки расмийлик эмас. У беморнинг қарори ва клиниканинг масъулият чегарасини бир нуқтада бирлаштиради.

Ҳуқуқий блоклар амалиётга оғир юк бўлиб тушмаслиги керак. Аксинча, улар оддий ва қайта ишлатиладиган бўлиши зарур. Бир хил шакл, бир хил тушунтириш мантиғи, бир хил қайд усули клиника ишини мураккаб эмас, барқарор қилади.

Хулоса. Тадқиқот стоматологик ёрдамда бемор ҳуқуқлари қоғозда мавжуд бўлса ҳам, амалий таъминот даражаси нотекис эканини кўрсатди. Энг заиф жойлар ёзма розилик, ёзма кафолат ахбороти ва постдаволаш ёзма тавсиялар билан боғлиқ.

Бемор ҳуқуқларини кучайтиришнинг энг оқилона йўли ёзма мажбурий блокларни соддалаштириш ва уларни барча ташкилотларда бир хил жорий этишдир. Шу йўл билан шикоятлар камаяди, бемор маршрути аниқроқ бўлади ва стоматологик хизматнинг ишончилиги ошади.

Адабиётлар рўйхати:

1. World Health Organization. Global Oral Health Status Report: Towards Universal Health Coverage for Oral Health by 2030. Geneva: WHO, 2022.
2. World Health Organization. Quality of care: A process for making strategic choices in health systems. Geneva: WHO, 2006.
3. Donabedian A. The quality of care: How can it be assessed? Journal of the American Medical Association. 1988;260(12):1743–1748.
4. Всемирная организация здравоохранения. Стратегия и план действий по глобальному здоровью полости рта на 2023–2030 гг. Женева: ВОЗ, 2023.
5. Курбанов С.О., Фомина Н.Н. О состоянии стоматологической службы в Узбекистане. Молодёжный инновационный вестник. 2019;8(1):42–43.
6. Закон Республики Узбекистан «Об охране здоровья граждан» № 265-И от 29.08.1996 г. (с изм. и доп. по состоянию на 17.12.2025 г.).
7. Даминов И.И. Совершенствование правовых основ охраны здоровья граждан. Ташкент: Адолат, 2019.
8. Джураев Д.К. Защита прав пациентов в Республике Узбекистан. Дисс. канд. юрид. наук. Ташкент, 2015.

Иқтибос учун: Шукуров А.Ф., Шукурова Н.Т. Стоматологик ёрдамда бемор ҳуқуқларини таъминлашнинг ҳозирги ҳолати // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2026. – № 4(24). – Б. 261–264. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19508904>

**РОЛЬ МИОМЫ МАТКИ И СОСТОЯНИЯ ШЕЙКИ МАТКИ В НАРУШЕНИИ
ФЕРТИЛЬНОСТИ****Махмудова И.А., Тугизова Д.И.**

Самаркандский государственный медицинский университет г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Несмотря на значительное количество исследований, посвящённых миоме матки (ММ), проблема её влияния на репродуктивную функцию остаётся до конца нерешённой. Миома матки является наиболее распространённым доброкачественным новообразованием женской репродуктивной системы. В последние годы отмечается рост частоты выявления ММ у женщин, планирующих беременность, что во многом обусловлено социальными факторами и тенденцией к отсроченному деторождению, приводящей к смещению реализации репродуктивной функции на поздний репродуктивный возраст. Особую актуальность приобретает изучение роли не только самой миомы матки, но и состояния шейки матки в нарушении фертильности. Патологические изменения шейки матки могут оказывать дополнительное влияние на процессы имплантации, транспорт сперматозоидов и вынашивание беременности. Связь между ММ, состоянием шейки матки и нарушением фертильности остаётся неоднозначной, однако наличие данных факторов следует обязательно учитывать при обследовании пациенток с бесплодием и привычным невынашиванием беременности. В настоящее время отсутствует единый оптимальный подход к восстановлению фертильности у пациенток с ММ. Наряду с хирургическими методами лечения всё большее значение приобретают консервативные стратегии ведения. Необходимы дальнейшие исследования, направленные на сравнительную оценку эффективности и безопасности различных тактик лечения с учётом состояния шейки матки для разработки индивидуализированных подходов к восстановлению репродуктивной функции.

Ключевые слова: миома матки, фертильность, бесплодие, привычный самопроизвольный выкидыш, планирование беременности, миомэктомия, улипристала ацетат

**THE ROLE OF UTERINE FIBROIDS AND CERVICAL CONDITIONS IN FERTILITY
DISORDERS****Makhmudova I.A., Tugizova D.I.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Despite the large number of studies devoted to uterine fibroids (UF), their impact on reproductive function remains incompletely understood. Uterine fibroids represent the most common benign tumors of the female reproductive system. In recent decades, there has been an increasing incidence of UF among women planning pregnancy, largely due to social factors and the tendency to postpone childbearing, which shifts reproductive activity to a later reproductive age, when the prevalence of UF naturally increases. Particular attention should be paid not only to uterine fibroids themselves but also to the condition of the cervix in the context of impaired fertility. Pathological changes of the cervix may additionally affect sperm transport, implantation processes, and pregnancy maintenance. The relationship between UF, cervical status, and fertility impairment remains controversial; however, these factors should be carefully considered in the evaluation of patients with infertility and recurrent pregnancy loss. Currently, there is no universally accepted optimal strategy for restoring fertility in patients with UF. Alongside surgical approaches, conservative management strategies are gaining increasing importance. Further studies are required to comparatively assess the efficacy and safety of different treatment approaches, taking into account cervical status, in order to develop individualized strategies for the restoration of reproductive function.

Keywords: uterine fibroids, fertility, infertility, recurrent spontaneous miscarriage, pregnancy planning, myomectomy, ulipristal acetate.

**БАЧАДОН МИОМАСИ ВА БАЧАДОН БЎЙНИ ҲОЛАТИНИНГ ФЕРТИЛЛИК
БУЗИЛИШИДАГИ РОЛИ****Махмудова И.А., Тугизова Д.И.**

Самарканд давлат тиббиёт университети, Самарканд ш., Ўзбекистон

Резюме. Бачадон миомаси (БМ)га бағишланган кўплаб тадқиқотлар мавжуд бўлишига қарамасдан, унинг репродуктив функцияга таъсири муаммоси ҳанузгача тўлиқ ҳал этилмаган.

Бачадон миомаси аёллар репродуктив тизимининг энг кўп учрайдиган хавфсиз ўсмаларидан бири ҳисобланади. Сўнги ўн йилликларда ҳомиладорликни режалаштираётган аёлларда БМ аниқланиши ҳолатлари ортиб бормоқда, бу эса асосан ижтимоий омилар ва фарзанд кўришни кечиктириши тенденцияси билан боғлиқ бўлиб, репродуктив фаолиятнинг кеч репродуктив ёшга силжishiга олиб келади, бу даврда эса БМ тарқалиши табиий равишда юқори бўлади. Фертиллик бузилишларида нафақат бачадон миомаси, балки бачадон бўйни ҳолатининг ҳам ўрни алоҳида аҳамиятга эга. Бачадон бўйнидаги патологик ўзгаришлар сперматозоидлар транспорти, имплантация жараёнлари ҳамда ҳомиладорликни сақлаб қолишга қўшимча салбий таъсир кўрсатиши мумкин. БМ, бачадон бўйни ҳолати ва фертиллик бузилишлари ўртасидаги боғлиқлик аниқ эмас, аммо ушбу омиларни беушитлик ва одатий тушиши ҳолатлари бўлган беморларни текиширишда албатта инобатга олиши зарур. Ҳозирги вақтда БМ билан оғриган беморларда фертилликни тиклашнинг ягона оптимал усули мавжуд эмас. Жарроҳлик усуллари билан бир қаторда консерватив даволаш стратегиялари ҳам тобора аҳамият касб этмоқда. Бачадон бўйни ҳолатини инобатга олган ҳолда турли даволаш усуллариининг самарадорлиги ва хавфсизлигини қиёсий баҳолашга қаратилган қўшимча тадқиқотлар ўтказиши зарур бўлиб, бу индивидуаллаштирилган репродуктив тикланиш стратегияларини ишлаб чиқиши имконини беради.

Калит сўзлар: бачадон миомаси, фертиллик, беушитлик, такрорланувчи тушиши, ҳомиладорликни режалаштириши, миомэктомия, улипристал ацетат.

e-mail: intizormaxmudova94@gmail.com

Проблема лечения женщин репродуктивного возраста, больных миомой матки (ММ) – доброкачественной моноклональной опухолью, происходящей из гладкомышечных клеток миометрия, продолжает оставаться в центре внимания отечественных и зарубежных исследователей [1–3]. Это обусловлено высокой распространенностью заболевания, которое составляет 20–44% в структуре гинекологических болезней и диагностируется у 13,3–27% женщин фертильного возраста, а также его многочисленными негативными проявлениями и исходами: аномальными маточными кровотечениями, железодефицитной анемией, тазовой болью, расстройствами мочеиспускания, бесплодием и осложнениями беременности [3–7]. Среди перечисленных нарушений все большую актуальность приобретает снижение фертильности, обусловленное риском бесплодия и невынашивания беременности. Это связано, с одной стороны, с омоложением контингента больных ММ, с другой – поздним планированием беременности в условиях возрастного повышения риска развития миомы. Средний возраст выявления миомы составляет 33 года, а показания к хирургическому лечению возникают в среднем в 44 года [8], следовательно, большое число пациенток сталкиваются с проблемами зачатия и вынашивания беременности, обусловленными ММ. ММ не считается однозначной причиной нарушения фертильности, но ее отрицательное влияние на детородную функцию не подвергается сомнению – само происхождение ММ ассоциировано со снижением репродуктивного потенциала. Возникновение миомы связано с очаговой пролиферацией на отдельных участках камбиального соединительнотканного каркаса матки, источником которой является одна клетка миометрия. В процессе роста опухоли она может сдавливать окружающие ткани с образованием ложной капсулы. Основные молекулярно-генетические детерминанты ММ включают цитогенетические нарушения, изменения гормональной чувствительности тканей опухоли, нарушения эндокринного статуса и изменение ангиогенеза [9]. Патогенез миомы матки представляет собой сложный многофакторный процесс, включающий генетические, антропометрические, расовые, репродуктивные и сосудистые факторы, а также влияние факторов роста и гормональной регуляции. В клетках миоматозных узлов отмечаются изменения экспрессии более чем 100 генов, участвующих в контроле клеточного роста, пролиферации и апоптоза. Кроме того, выявляются значительные нарушения в функционировании почти 50 различных микроРНК.

Структурные и функциональные изменения миометрия, а также повышение риска развития миомы могут быть обусловлены генетическими нарушениями в регуляторных (гормональных) и эффекторных (факторы роста) системах. Эти изменения способствуют усилению пролиферативной активности клеток и снижению уровня апоптоза.

На сегодняшний день описано как минимум два ключевых молекулярных механизма развития миомы матки, на долю которых приходится до 80–85% случаев заболевания. Один из них связан с мутациями гена MED12, которые сопровождаются повышенной экспрессией раннего гена WNT4. Мутации MED12, локализованные в различных кодонах, также обнаруживаются при наследственных

синдромах Опитца–Кавеггия и Луйяна–Фринца, ассоциированных с повышенным риском опухолевого роста.

Нарушения молекулярно-генетических механизмов гормональной регуляции оказывают значительное влияние на инициацию и прогрессирование опухолевого процесса. При этом ключевую роль в запуске патологического каскада играет прогестерон, тогда как поддержание роста атипичных миоцитов обеспечивается совместным действием прогестерона и эстрадиола.

Воздействие прогестерона на миому матки реализуется как косвенно — за счёт ослабления эстроген-зависимых эффектов, так и напрямую — через специфические рецепторы, стимулируя пролиферацию клеток миометрия. При этом локальные нарушения гормональной чувствительности и метаболизма приводят к вовлечению в патологический процесс ранее интактного эндометрия. Функциональные изменения эндометрия, наряду с анатомическими факторами, лежат в основе снижения фертильности, включая нарушение способности к зачатию и вынашиванию беременности.

У пациенток с миомой матки вероятность наступления беременности и успешной имплантации значительно снижена, при этом отмечается повышение частоты самопроизвольных выкидышей без существенного увеличения риска преждевременных родов. Несмотря на это, механизмы развития бесплодия при миоме матки остаются предметом дискуссий. Предполагается, что крупные миоматозные узлы могут вызывать смещение шейки матки к лобковому симфизу, что затрудняет проникновение сперматозоидов. Кроме того, увеличение размеров или деформация полости матки может нарушать транспорт и миграцию сперматозоидов. Опухолевый процесс способен изменять анатомию матки, приводя к обструкции проксимальных отделов маточных труб, а также нарушать топографию органов малого таза, смещая маточные трубы относительно яичников. Особенно выраженное негативное влияние оказывают субмукозные миомы, которые нарушают кровоснабжение эндометрия и провоцируют избыточные воспалительные реакции, ухудшая условия для имплантации. Их анатомическое и функциональное воздействие считается наиболее неблагоприятным для репродуктивной функции по сравнению с другими локализациями. Тем не менее, снижение фертильности наблюдается не только при субмукозных формах. У пациенток с интерстициальными миомами также отмечено достоверное уменьшение эффективности программ экстракорпорального оплодотворения, особенно при размерах узлов более 5 см. Несмотря на это, миома матки не может рассматриваться как однозначная причина бесплодия, поскольку её выявляемость среди беременных женщин остаётся достаточно высокой и составляет от 2,7 до 12,6% случаев. Характер поведения миоматозных узлов в период беременности остаётся до конца неясным с точки зрения современной акушерской эндокринологии. Теоретически повышенный уровень половых гормонов во время беременности должен способствовать росту миомы, однако клинические наблюдения свидетельствуют о том, что увеличение размеров опухоли преимущественно отмечается в первом триместре. В последующем рост, как правило, замедляется или даже сменяется тенденцией к уменьшению размеров узлов. Динамика роста миомы коррелирует с риском осложнений беременности: повышенная частота самопроизвольных выкидышей характерна для первого триместра, тогда как связь миомы с преждевременными родами достоверно не подтверждается. Таким образом, основное влияние миомы матки на репродуктивную функцию проявляется преимущественно в виде бесплодия и ранних репродуктивных потерь. Это подчёркивает необходимость комплексной оценки роли миомы как одного из факторов нарушения фертильности и разработки индивидуализированных подходов к лечению таких пациенток.

Особое значение в реализации репродуктивной функции у пациенток с миомой матки имеет состояние шейки матки. Анатомо-функциональные изменения шейки матки, возникающие на фоне миоматозного процесса, могут способствовать нарушению транспорта сперматозоидов и снижению вероятности оплодотворения. В частности, деформация шейки матки и изменение ее положения вследствие роста миоматозных узлов могут затруднять проникновение сперматозоидов в полость матки. Кроме того, изменения свойств цервикальной слизи, обусловленные гормональными и локальными факторами, также играют важную роль в снижении фертильности.

Нарушение барьерной и секреторной функции шейки матки может приводить к формированию неблагоприятной среды для сперматозоидов, снижая их подвижность и жизнеспособность. Также следует учитывать возможное развитие хронических воспалительных процессов в области шейки матки, которые дополнительно ухудшают репродуктивный прогноз. Таким образом, состояние шейки матки является важным компонентом комплексной оценки фертильности у пациенток с миомой матки и должно учитываться при выборе тактики лечения.

Лечебные подходы. Терапия пациенток с миомой матки включает широкий спектр методов, среди которых выделяют хирургическое лечение (гистерэктомия, миомэктомия, гистерорезектоскопическое удаление узлов), эмболизацию маточных артерий, фокусированную ультразвуковую абла-

цию, а также гормональную терапию. Несмотря на разнообразие подходов, хирургическое вмешательство по-прежнему занимает ведущую позицию в лечении данного заболевания. Так, в США ежегодно выполняются сотни тысяч операций, включая около 175 тысяч гистерэктомий и 20 тысяч миомэктомий. С учётом увеличения частоты выявления миомы матки у женщин репродуктивного возраста, для которых актуально сохранение детородной функции, всё большее значение приобретают органосохраняющие методы лечения. Миомэктомия рассматривается как основной способ восстановления фертильности у пациенток, страдающих бесплодием или привычным невынашиванием беременности. В то же время её применение у женщин, не планирующих беременность, остаётся дискуссионным, поскольку по сравнению с удалением матки данная операция является более технически сложной и ассоциирована с более высоким риском осложнений. К числу классических показаний к органосохраняющему хирургическому лечению относят деформацию полости матки, обусловленную миоматозным узлом, либо наличие доминантного узла диаметром более 4 см. В зависимости от клинической ситуации могут использоваться различные хирургические доступы: лапаротомический, лапароскопический или гистероскопический, при котором вмешательство осуществляется с применением резектоскопа. Минимально инвазивной технологией является трансцервикальная гистерорезектоскопическая миомэктомия, применяемая при субмукозных узлах (0 и 1 тип по классификации), размер которых не превышает 5 см. По данным различных исследований, восстановление репродуктивной функции после миомэктомии наблюдается в широком диапазоне — от 5 до 69% случаев. Учитывая доказанную эффективность данного метода в улучшении наступления беременности и её вынашивания, ряд авторитетных организаций, включая Американское общество акушеров и гинекологов (ACOG), рекомендуют проведение миомэктомии женщинам с бесплодием или привычным невынашиванием беременности после исключения других причин снижения фертильности, независимо от размеров миоматозных узлов.

Оценка овариального резерва у пациенток после различных методов лечения миомы матки — как после эмболизации маточных артерий, так и после хирургических вмешательств (гистерэктомии и миомэктомии) — не выявила значимых различий в уровнях фолликулостимулирующего гормона. В то же время было установлено, что у женщин, перенёсших эмболизацию маточных артерий, уровень антимюллера гормона остаётся существенно сниженным на протяжении всего периода наблюдения как по сравнению с пациентками после хирургического лечения, так и относительно возрастной нормы. Гистероскопическая оценка состояния полости матки у женщин репродуктивного возраста после эмболизации показала, что нормальная картина наблюдается лишь в 37% случаев. В остальных наблюдениях выявлялись различные патологические изменения, включая деформацию полости матки миоматозными узлами, внутриматочные синехии, формирование фистул между полостью матки и узлом, а также снижение пролиферативной активности эндометрия по данным гистологического исследования. Полученные данные свидетельствуют о преимуществах миомэктомии по сравнению с эмболизацией маточных артерий и подчёркивают необходимость осторожного подхода при выборе данного метода у пациенток, заинтересованных в сохранении репродуктивной функции. В частности, проведение эмболизации маточных артерий у женщин с исходно сниженной фертильностью представляется нецелесообразным. Таким образом, современная тактика ведения пациенток с миомой матки и нарушением фертильности в первую очередь ориентирована на выполнение миомэктомии. Однако данный подход не является универсальным решением, поскольку хирургическое лечение сопряжено с определёнными рисками, требует реабилитационного периода и характеризуется вариабельной эффективностью. В связи с этим сохраняется актуальность разработки и внедрения медикаментозных методов терапии, направленных как на подготовку к оперативному вмешательству, так и, по возможности, на его предотвращение. С этой целью в клинической практике активно изучаются и применяются различные варианты гормональной терапии.

Гормональная терапия. Гормональная терапия широко применяется при лечении бесплодия и проблем с вынашиванием беременности, однако в контексте лечения пациенток с миомой матки не все гормональные препараты оказываются эффективными. Прогестагены, используемые в программах восстановления фертильности, могут по-разному влиять на рост миоматозных узлов, а при непрерывном применении способны вызывать прорывные кровотечения, что особенно нежелательно при уже существующих аномальных маточных кровотечениях [38, 39]. Кроме того, назначение прогестагенов и препаратов, их содержащих, сложно обосновать с точки зрения современных представлений о патогенезе миомы. Следовательно, при терапии симптомов миомы матки предпочтительнее не использовать стероидные гормоны (прогестагены или комбинированные эстроген-прогестагенные средства), которые могут ускорять рост узлов, а применять антигормональные препараты, снижающие синтез или активность эндогенных половых стероидов.

Эффекты прогестерона, его агонистов и антагонистов реализуются через прогестероновые рецепторы (ПР), относящиеся к семейству ядерных рецепторов с лигандазависимой активацией и функционирующие как факторы транскрипции. Существуют две изоформы ПР – А и В, которые кодируются одним геном, но начинаются с разных транскрипционных локусов. Отличие ПР-В от ПР-А заключается в наличии дополнительного N-концевого фрагмента длиной 164 аминокислоты.

Благодаря этому ПР-В имеют три транскрипционно активирующих домена (AF-1, AF-2, AF-3), тогда как ПР-А – только два (AF-1 и AF-2). Обе изоформы связывают стероидные гормоны и ДНК, но их функции зависят от типа клетки и присутствия активаторов целевого гена. В целом ПР-В является более мощным активатором транскрипции, чем ПР-А.

При определенных условиях ПР-А может терять активность как транскрипционный фактор, но при этом функционировать как лигандзависимый трансдоминантный репрессор других стероидных рецепторов, включая ПР-В, а также рецепторы эстрогенов, андрогенов, минералокортикоидов и глюкокортикоидов. ПР-А способен подавлять транскрипцию при связывании с агонистами или антагонистами прогестерона. Роль изоформ ПР варьирует в зависимости от ткани.

На основе изучения этих свойств были разработаны биологически активные вещества, действующие как антагонисты или селективные модуляторы ПР. К селективным модуляторам относится новый препарат улипристала ацетат – стероидное соединение, способное обратимо ингибировать ПР в целевой ткани.

Улипристала ацетат: особенности действия и эффекты. Улипристала ацетат (препарат Эсмия) взаимодействует с прогестероновыми рецепторами в миометрии, миоматозных узлах и эндометрии, подавляя овуляцию при минимальном влиянии на уровень эстрогенов. К 2013 году *in vitro* было доказано его селективное антипролиферативное, проапоптотическое и антифибротическое действие на миоматозные узлы.

В клеточных культурах миомы применение улипристала ацетата снижало жизнеспособность клеток, угнетало экспрессию факторов роста и усиливало апоптоз через активацию митохондрий и лиганда, запускающего апоптоз, зависимый от фактора некроза опухолей (TRAIL) [42]. Также был выявлен дополнительный механизм антипролиферативного действия, связанный с репрессией прогестеронового рецептора Bcl-2 – ключевого белка, подавляющего апоптоз [42, 43].

Эффекты улипристала ацетата подтверждены клиническими исследованиями. В настоящее время препарат используется для предоперационной подготовки и для медикаментозного лечения женщин детородного возраста с умеренными или выраженными симптомами миомы матки.

Второе направление применения улипристала ацетата предполагает исключительно медикаментозный контроль симптомной миомы матки у женщин детородного возраста без хирургического вмешательства, с использованием интермиттирующего режима терапии [47, 48]. Согласно результатам исследований PEARL II и PEARL IV, эффективность препарата не зависит от дозы, поэтому оптимальной признана суточная доза 5 мг [48].

Если женщина не планирует беременность в ближайшем будущем, улипристал ацетат позволяет контролировать аномальные маточные кровотечения и рост миомы, способствуя сохранению фертильности и избегая хирургического лечения. На сегодняшний день накоплены данные, подтверждающие возможность успешного зачатия, вынашивания беременности и своевременных родов после терапии улипристалом ацетатом [52]. Таким образом, применение Эсмии открывает новые перспективы в лечении пациенток с миомой матки.

Список литературы:

1. Миома матки: диагностика, лечение и реабилитация (клинические рекомендации по ведению больных). Под ред. Л.В.Адамян. М.: 2014. / *Mioma matki: diagnostika, lechenie i reabilitatsiia (klinicheskie rekomendatsii po vedeniiu bol'nykh)*. Pod red. L.V.Adamian. M.: 2014. [in Russian]
2. Marret H, Fritel X, Ouldamer L et al. Therapeutic management of uterine fibroid tumors: updated French guidelines. *Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol* 2012;165:156–64.
3. Parker WH. Etiology, symptomatology and diagnosis of uterine myoma. *Fertil Steril* 2007;87:726–36.
4. Giraudet G, Lucot JP et al. Except fertility, place of myomectomy in perimenopause and after menopause. *Gynecol Obstet Biol Reprod* 2011;40(8):902–17.
5. Gupta S, Jose J, Manyonda I. Clinical presentation of fibroids. *Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol* 2008;22:615–26.
6. Levy BS. Management of uterine fibroids. *Acta Obstet Gynecol Scand* 2008;87(8):812–23. Practice Committee of American Society for Repro-

ductive Medicine in collaboration with Society of Reproductive Surgeons. Myomas and reproductive function. *Fertil Steril* 2008;90(Suppl. 5):S125–130.

7. Somigliana E, Vercellini P, Daguati R et al. Fibroids and female reproduction: a critical analysis of the evidence. *Hum Reprod Update* 2007;13:465–76.

8. Волков В.Г., Гусева Н.В., Горшкова И.А. Оптимизация консервативного лечения миомы матки антипрогестеронами и оценка влияния проводимой терапии на качество жизни женщин. *Вестн. новых мед. технологий*. 2011;18(1):92. / Volkov V.G., Guseva N.V., Gorshkova I.A. Optimizatsiia konservativnogo lecheniia miomy matki antiprogesteronami i otsenka vliianiia provodimoi terapii na kachestvo zhizni zhenshchin. *Vestn. novykh med. tekhnologii*. 2011;18(1):92. [in Russian]

9. Duhan N. Current and emerging treatments for uterine myoma an update. *Int J Womens Health* 2011;3:231–41.

10. Sozen I, Arici A. Cellular biology of myomas: interaction of sex steroids with cytokines and growth factors. *Obstet Gynecol Clin NA* 2006;33(1):41–58.

11. Chen B, Wen Y, Yu XY, Polan ML. Relaxin increases elastase activity and protease inhibitors in smooth muscle cells from the myometrium compared with cells from leiomyomas. *Fertil Steril* 2009;91(4):1351–4.

12. Georgieva B, Milev I, Minkov I et al. Characterisation of the uterine leiomyoma microRNAome by deep sequencing. *Genomics* 2012;99:275–81.

13. Mäkinen N, Mehine M, Tolvanen J et al. MED12, the mediator complex subunit 12 gene, is mutated at high frequency in uterine leiomyomas. *Science* 2011;334:252–9.

14. Vegan K. MED12 mutations and uterine fibrinoids. *Nature Genetics* 2011;43:928–31.

15. Pritts EA, Parker WH, Olive DL. Fibroids and infertility: an update systematic review of the evidence. *Fertil Steril* 2009;91(4):1215–23.

16. Indman PD. Hysteroscopic treatment of submucous fibroids. *Clin Obstet Gynecol* 2006;49:811–20.

17. Kolankaya A, Arici A. Myomas and assisted reproductive technologies: when and how to act? *Obstet Gynecol Clin North Am* 2006;33:145–52.

18. Klatsky PC, Tran ND, Caughey AB, Fujimoto VY. Fibroids and reproductive outcomes: a systematic literature review from conception to delivery. *Am J Obstet Gynecol* 2008;198:357–66.

19. Chalazonitis A, Tzovara I, Laspas F et al. Hysterosalpingography: technique and applications. *Curr Probl Diagn Radiol* 2009;38(5):199–205.

20. Dixon D, Parrott EC, Segars JH et al. The second National Institutes of Health International Congress on advances in uterine leiomyoma research: conference summary and future recommendations. *Fertil Steril* 2006;86:800–6.

21. Polena V, Merqui JL, Perrot N et al. Long-term results of hysteroscopic myomectomy in 235 patients. *Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol* 2007;130:232–7.

22. Di Spezio Sardo A, Mazzon I, Bramante S et al. Hysteroscopic myomectomy: a comprehensive review of surgical techniques. *Hum Reprod Update* 2008;14:10–9.

23. Петракова С.А., Буянова С.Н., Мгелиашвили М.В. Возможности миомэктомии в коррекции репродуктивного здоровья женщин с миомой матки. *Рос. вестн. акушера-гинеколога*. 2009;1:30–5. / Petrakova S.A., Buianova S.N., Mgeliasvili M.V. Vozmozhnosti miomektomii v korrektsii reproduktivnogo zdorov'ia zhenshchin s miomoi matki. *Ros. vestn. akushera-ginekologa*. 2009;1:30–5. [in Russian]

24. Кулинич С.И., Бурлакова О.А. Предгравидарная подготовка женщин репродуктивного возраста и профилактика рецидива миомы матки в послеоперационном периоде после миомэктомии. *Сиб. мед. журн*. 2011;6:119–22. / Kulinich S.I., Burlakova O.A. Predgravidarnaia podgotovka zhenshchin reproduktivnogo vozrasta i profilaktika retsidiva miomy matki v posleoperatsionnom periode posle miomektomii. *Sib. med. zhurn*. 2011;6:119–22. [in Russian]

25. Meng X, He G, Zhang J. A comparative study of fibroid ablation rates using radio frequency and high-intensity focused ultrasound. *Cvir* 2010;33:794–9.

26. Toor SS, Tan KT, Simons ME. Clinical Failure after Uterine Artery Embolization: Evaluation of Patient and MR Imaging Characteristics. *J Vasc Intervent Radiol* 2008;19:662–7.

27. Scheurig C, Gauruder-Burmester A, Klunker C. Uterine artery embolization for symptomatic fibroids: short-term versus mid-term changes in disease-specific symptoms, quality of life and magnetic resonance imaging results. *Hum Reprod* 2006;21:3270–7.

28. Smeets AJ, Nijenhuis RJ, Jan van Rooij W. Embolization of Uterine Leiomyomas with Polyzyne F-coated Hydrogel Microspheres: Initial Experience. *J Vasc Intervent Radiol* 2010;21:1830–4.

29. Horhoianu IA, Horhoianu VV, Joita D, Carstoiu M, Dorobat B. Uterine artery embolization for leiomyomas, ultrasonography and angiography aspects. *J Med Life* 2012;5(4):491–5.

30. Naguib NNN, Mbalisike E, Nour-Eldin NEA. Leiomyoma Volume Changes at Follow-up after Uterine Artery Embolization: Correlation with

the Initial Leiomyoma Volume and Location. *J Vasc Intervent Radiol* 2010;21:490–5.

31. Scheurig-Muenkler C, Koesters C, Grieser C. Treatment failure after uterine artery embolization: Prospective cohort study with multifactorial analysis of possible predictors of long-term outcome. *Eur J Radiol* 2012;81:727–31.

32. Kim HS, Tsai J, Patra A. Effects of Utero-ovarian Anastomoses on Clinical Outcomes and Repeat Intervention Rates after Uterine Artery Embolization. *J Vasc Intervent Radiol* 2006;17:783–9.

33. Smeets AJ, Nijenhuis RJ, Boekkooi PF. Safety and Effectiveness of Uterine Artery Embolization in Patients with Pedunculated Fibroids. *J Vasc Intervent Radiol* 2009;20:1172–5.

34. Firouznia K, Ghanaati H, Sanaati M et al. Pregnancy after uterine artery embolization for symptomatic fibroids: a series of 15 pregnancies. *AJR Am J Roentgenol* 2009;192(6):1588–92.

35. Hovsepian DM, Ratts VS, Rodriguez M et al. A prospective comparison of the impact of uterine artery embolization, myomectomy, and hysterectomy on ovarian function. *J Vasc Interv Radiol* 2006; 17 (7): 1111–5.

36. Hehenkamp WJK, Volkers NA, Broekmans FJM et al. Loss of ovarian reserve after uterine artery embolization: a randomized comparison with hysterectomy. *Hum Reprod* 2007; 22 (7): 1996–2005.

37. Yin P, Lin Z, Reierstad S et al. Transcription factor KLF11 integrates progesterone receptor signaling and proliferation in uterine leiomyoma cells. *Cancer Res* 2010; 70 (4): 1722–30.

38. Kim JJ, Sefton EC. The role of progesterone signaling in the pathogenesis of uterine leiomyoma. *Mol Cell Endocrinol* 2012; 35(2): 223–31.

39. Donnez J, Tomaszewski J, Vázquez F et al.; PEARL II Study Group. Ulipristal acetate versus leuprolide acetate for uterine fibroids. *N Engl J Med* 2012; 366 (5): 421–32.

40. Islam MS, Protic O, Giannubilo SR et al. Uterine leiomyoma: available medical treatments

and new possible therapeutic options. *J Clin Endocrinol Metab* 2013; 98: 921–34.

41. Spitz AM. Clinical utility of progesterone receptor modulators and their effect on the endometrium. *Curr Opin Obstet Gynecol* 2009; 21: 318–24.

42. Maruo T. Translation research in women's health: From bedside to bench and from bench to bedside. *Int J Gynecol Obstet* 2010; 109: 83–3.

43. Xu Q, Ohara N, Liu J et al. Progesterone receptor modulator CDB2914 induces extracellular matrix metalloproteinase inducer in cultured human uterine leiomyoma cells. *Mol Hum Reprod* 2008; 14: 181–91.

44. Yoshida S, Ohara N, Xu Q et al. Cell-type specific actions of progesterone receptor modulators in regulation of uterine leiomyoma growth. *Semin Reprod Med* 2010; 28: 260–73.

45. Donnez J, Tatarchuk TF, Bouchard P et al.; PEARL I Study Group. Ulipristal acetate versus placebo for fibroid treatment before surgery. *N Engl J Med* 2012; 366: 409–20.

46. Donnez J, Vazquez F, Tomaszewski J et al. Long-term treatment of uterine fibroids with ulipristal acetate. *Fertil Steril* 2014; 101: 1565–73.

47. Donnez J, Hudecek R, Donnez O et al. Efficacy and safety of repeated use of ulipristal acetate in uterine fibroids. *Fertil Steril* 2015; 103: 519–27.

48. Mutter GL, Bergeron C, Deligdisch L et al. The spectrum of endometrial pathology induced by progesterone receptor modulators. *Mod Pathol* 2008; 21 (5): 591–98.

49. Williams AR, Bergeron C, Barlow DH, Ferenczy A. Endometrial morphology after treatment of uterine fibroids with the selective progesterone receptor modulator, ulipristal acetate. *Int J Gynecol Pathol* 2012; 31: 556–69.

50. Chabbert-Buffet N, Pintiaux-Kairis A, Bouchard P. Effects of the progesterone receptor modulator VA2914 in a continuous low dose on the hypothalamic-pituitary-ovarian axis and endometrium in normal women: a prospective, randomized, placebo-controlled trial. *J Clin Endocrinol Metab* 2007; 92 (9): 3582–9.

Для цитирования: Махмудова И.А., Тугизова Д.И. Роль миомы матки и состояния шейки матки в нарушении фертильности // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 4(24). – С. 265–271. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19508944>

КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КИНЕЗИОТЕЙПА ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ БОЛЕВЫХ СИНДРОМАХ**Умирова С.М., Бебитова Ш.Э.**

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Хронические болевые синдромы являются одной из наиболее распространённых проблем современной медицины, оказывая значительное негативное влияние на качество жизни и трудоспособность пациентов. В связи с этим поиск эффективных методов лечения и реабилитации остаётся актуальной задачей. В данном исследовании оценена клиническая эффективность применения метода кинезиотейпа у пациентов с хроническими болевыми синдромами. Установлено, что использование кинезиотейпа способствует снижению интенсивности болевого синдрома, улучшению функционального состояния мышц и восстановлению двигательной активности. Кроме того, у пациентов отмечено общее улучшение самочувствия и качества жизни. Полученные результаты свидетельствуют о том, что кинезиотейп является эффективным и безопасным дополнительным методом лечения, который целесообразно включать в состав комплексной терапии хронических болевых синдромов.

Ключевые слова: хроническая боль, кинезиотейп, болевой синдром, реабилитация, дорсопатии, люмбагия, функциональное восстановление

CLINICAL EFFECTIVENESS OF KINESIOTAPING IN CHRONIC PAIN SYNDROMES**Umirova S.M., Bebitova Sh.E.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Chronic pain syndromes are among the most common problems in modern medicine, significantly affecting patients' quality of life and work capacity. Therefore, the search for effective treatment and rehabilitation methods remains highly relevant. This study evaluates the clinical effectiveness of kinesiотaping in patients with chronic pain syndromes. The findings demonstrate that the use of kinesiотaping reduces pain intensity, improves muscle function, and enhances motor activity. In addition, patients showed an overall improvement in well-being and quality of life. The results indicate that kinesiотaping is an effective and safe complementary treatment method that can be recommended as part of комплексной терапии chronic pain syndromes.

Keywords: chronic pain, kinesiотaping, pain syndrome, rehabilitation, dorsopathies, lumbalgia, functional recovery

СУРУНКАЛИ ОГРИҚ СИНДРОМЛАРИДА КИНЕЗИОТЕЙП УСУЛИНИ ҚЎЛЛАШНИНГ КЛИНИК САМАРАДОРЛИГИ**Умирова С.М., Бебитова Ш.Э.**

Самарканд давлат тиббиёт университети, Самарканд ш., Ўзбекистон

Резюме. Сурункали огриқ синдромлари замонавий тиббиётда кенг тарқалган муаммолардан бири бўлиб, беморларнинг ҳаёт сифати ва меҳнат қobiliятига сезиларли даражада салбий таъсир кўрсатади. Шу сабабли ушбу ҳолатларни самарали даволаш ва реабилитация қилиш усулларини тақомиллаштириш муҳим аҳамиятга эга. Ушбу тадқиқотда сурункали огриқ синдромларида кинезиотейп усулини қўллашнинг клиник самарадорлиги баҳоланди. Олинган натижалар шуни кўрсатдики, кинезиотейп қўлланилиши огриқ интенсивлигини камайтиришига, мушак фаолиятини яхшилашига ҳамда ҳаракат функцияларини тиклашига хизмат қилади. Шунингдек, беморларнинг умумий ҳолати ва ҳаёт сифати яхшилангани кузатилди. Тадқиқот натижалари кинезиотейп усулини сурункали огриқ синдромларини даволашда самарали ва хавфсиз қўшимча усул сифатида қўллаш мумкинлигини кўрсатади.

Калит сўзлар: сурункали огриқ, кинезиотейп, огриқ синдроми, реабилитация, дорсопатиялар, люмбагия, функционал тикланиш

e-mail: sanambebitova7@gmail.com

Введение. Наш образ жизни, привычки, нагрузки приводят к множественным дисфункциям, в том числе в области спины. По мере взросления межпозвоночные диски теряют гидратацию и изнашиваются, некорректная работа мышц ускоряет этот процесс. В результате их эластичность, гибкость и амортизирующие свойства снижаются, что приводит к дегенеративным изменениям, которые провоцируют появление хронической боли в спине и шее из-за сдавливания позвоночного столба и окружающих корешков спинного мозга. Интенсивность болевых ощущений зависит от степени давления. [3].

Согласно научным исследованиям последних лет все больше расширяется доказательная база немедикаментозных методов лечения, в частности, их эффективность при лечении болевых синдромов. Одним из современных и перспективных методов немедикаментозной терапии является кинезиотейпирование.

Кинезиологическое тейпирование - это простой и эффективный метод лечения растяжения связок, мышечных болей и других травм, а также гематом и отеков с помощью наклеивания специальной эластичной клейкой ленты - тейпа (син.: кинезиотейп, кинезиотейп, физиотейп). Метод кинезиотейпирования, предложенный в 1973 г. японским врачом-мануальным терапевтом Кензо Касе, с использованием тейпов, разработанных по инновационным технологиям и изготовленных японским концерном Нитто Денко (Nitto Denko), является новым направлением в восстановительной медицине, которого на протяжении многих лет придерживаются врачи спортивной медицины и физиотерапевты всего мира. Кинезиотейпы представляют собой эластичные ленты, изготовленные из высококачественного хлопка и покрытые гипоаллергенным клеящим гелем на акриловой основе, который активизируется при температуре тела. Эластические свойства тейпов приближены к эластическим параметрам кожи. Хлопковая основа не препятствует дыханию кожи и испарению с ее поверхности. Эти свойства позволяют использовать тейпы в водных видах спорта, а также оставлять наклеенными на кожу до 5 сут. [3].

В литературе имеются единичные статьи, которые отмечают эффективность кинезиотейпирования при мышечной спастике у больных с ОНМК, также описаны случаи применения тейпов у детей с ДЦП. Практически отсутствуют работы по применению данной методики у пациентов с острыми и хроническими болевыми синдромами.

Среди многочисленных эффектов воздействия кинезиотейпа на организм можно выделить два основных: механический и нейрорефлекторный. Концепция механической теории заключается в усилении активации микроциркуляции в межклеточном веществе. Эластичный тейп, наклеенный на кожу, за счет декомпрессии активирует микроциркуляцию. Улучшается местный кровоток в тканях, и выводятся медиаторы воспаления, таким образом реализуется его лимфодренажный эффект [4].

Кинезиотейп воздействует на кожно-кинестическую чувствительность, возбуждая рецепторы, находящиеся в коже, мышцах, сухожилиях, суставах. Регуляция тонуса мышц осуществляется через тонический или миотонический рефлекс, который, в свою очередь, включается через мышечно-сухожильный орган Гольджи. Подается сигнал на тормозные вставочные нейроны спинного мозга, ингибирующие активность альфа-мотонейронов. Таким образом, стимуляция механорецепторов кожи над мышцей, сухожилием, суставом уменьшает межимпульсный интервал двигательной единицы мышцы и увеличивает количество двигательных единиц во время сокращения. Использование мышечных техник позволяет либо усилить, либо ослабить мышечный тонус [4].

Основной механизм действия кинезиотейпа осуществляется за счет лифтинг-эффекта. При помощи своих эластических свойств растянутый тейп, приклеенный к коже, приподнимает ее и приводит к образованию в ней складок.

Таким образом, увеличивается расстояние между кожей и мышечной тканью. Происходит уменьшение давления на сосуды, расположенные в этой области, их просвет расширяется, это вызывает улучшение местного кровообращения и лимфооттока. Также с помощью кинезиотейпирования можно нормализовать мышечный тонус, используя мышечные техники, за счет воздействия на поверхностную и глубокую проприорецепцию тканей.

Цель работы. Изучить возможности применения метода кинезиотейпирования у неврологических больных с хроническими болевыми синдромами.

Методы исследования. Обследовано 60 пациента с хроническими миофасциальными болевыми синдромами в пояснично-крестцовом отделе позвоночника в подострой стадии, средний возраст составил ($34,3 \pm 7,8$) года. Средняя длительность болевого синдрома ($5,6 \pm 2,5$) лет. Пациенты были случайным образом разделены на две группы по 30 человек, которым проводилась терапия болевого синдрома в виде нимесила 100 мг 2 раза в день в течение 5 дней и толперизона (Мидокалм) 150 мг 2 раза в день в течение 5 дней. Пациентам первой группы назначалось местное лечение в виде гелей и

кремов, содержащих НПВП (без разогревающего эффекта). Пациентам второй группы помимо медикаментозной терапии нимесилом и мидокалмом проводилось кинезиологическое тейпирование паравертебральных мышц с 2-х сторон 1-образными полосками от крестцово-подвздошных сочленения до уровня XII грудного позвонка (послабляющая коррекция) и квадратных мышц поясницы (послабляющая коррекция) У-образными полосками с использованием кинезиотейпов различных производителей (К-Таре, КтехИэ, Ктеэю). Пациенты носили кинезиотейп в течение 5 дней и снимали его самостоятельно накануне 3 осмотра, что было необходимо, для того, чтобы оценить стойкость эффекта при снятом кинезиотейпе. Для стабилизации грудопоясничного перехода позвоночника применялась связочная техника. Лимфодренажная коррекция использовалась для улучшения микроциркуляции и создания областей с низким внутритканевым давлением, таким образом, способствуя току лимфы в направлении регионарных лимфоузлов. Оценка уровня боли осуществлялась по шкале ВАШ на первом осмотре (до аппликации тейпа), на 3 и на 6 день. Пациенты с органической неврологической симптоматикой не включались в исследование. Данная методика позволяет уменьшить болезненность в пояснично-крестцовом отделе позвоночника за счет улучшения лимфооттока и микроциркуляции. За курс лечения проводилось 3 процедуры кинезиотейпирования длительностью 4-5 дней. Полученные данные обработаны с помощью пакета Statistica 6.0.

Результаты исследования. Согласно задачам исследования сформированы две группы. Контрольная группа - 30 человека, которым проводилось традиционная фармакотерапия согласно стандартам лечения болей в нижней части спины. Основная группа - 30 пациент, который лечился по стандарту, но в комбинации с методиками кинезиотейпирования.

Полученные исходные данные по двум группам имели следующее распределение: уровень болевых проявлений по ВАШ составлял $7,9 \pm 0,5$, показатель индекса мышечного напряжения (ИМН) по Хабинову составил $(7,8 \pm 0,4)$ усл. ед., биомеханический показатель

смещения центра тяжести по сагиттальной и/или фронтальной оси - $(10,3 \pm 0,33)^\circ$, показатель на-рушение параллельности границ регионов (ПГР) равен $(11,9 \pm 0,87)^\circ$. После проведения лечения, выявлены следующие показатели. Интенсивность болевых проявлений по ВАШ достоверно снизилась во второй группе до $4,3 \pm 0,3$ в сравнении с первой группой до $5,7 \pm 0,4$.




Рис. 1. Динамика боли по ВАШ у пациентов

Изменения значений смещений сагиттальной и/или фронтальной оси в группе с медикаментозной терапией составляет угол $(7,1 \pm 0,33)^\circ$, группе с кинезиотейпами - $(6,7 \pm 0,33)^\circ$ ($p < 0,05$).

Установлено достоверное снижение показателя выраженности нарушений ПГР во второй группе $[(7,4 \pm 0,7)^\circ]$ в сравнении с первой $[(8,2 \pm 0,6)^\circ]$.

Уровень боли по шкале ВАШ при первичном осмотре составлял: у пациентов 1 группы - $7,2 \pm 1,26$ балла; у пациентов 2 группы - $7,1 \pm 1,45$ балла (различия статистически не значимы). При осмотре на 3 день уровень боли составил: в 1 группе $4,2 \pm 1,1$ балла; во второй группе - $3,0 \pm 1,3$ балла (различия статистически значимы для $p < 0,05$). При осмотре на 6 день уровень боли в 1 группе составил

3,0 ± 1,1 балла; во второй группе 2,3 ± 1,1 балла (различия статистически значимы для $p < 0,05$). За время лечения побочных эффектов со стороны ЖКТ не наблюдалось у пациентов обеих групп, также не наблюдалось и аллергических реакций на кинезиотейпы. Внимания заслуживает тот факт, что по результатам расспроса при втором визите значительное облегчение к вечеру первого дня испытывали 50% пациентов первой группы и 90% пациентов второй группы.

Заключение. Таким образом, нами была установлена достоверная положительная динамика снижения болевого синдрома у больных с дорсопатиями в группе с кинезиотейпами, причем снижение уровня боли пациентов отмечалось сразу после тейпирования и доказано, что применение кинезиотейпирования улучшает регресс неврологической симптоматики при миофасциальных болевых синдромах.

Применение связочных и миофасциальных методик обусловлено фиксацией фасций и связок мышц, что способствует улучшению подвижности пораженного сегмента.

Эти методики актуально использовать для коррекции патобиомеханики, опосредованно воздействуя на тонус мускулатуры. Местно улучшить микроциркуляцию и перфузию тканей позволяют лимфодренажные техники кинезио-тейпирования. Обезболивающий и противовоспалительный эффекты появляются через несколько минут после аппликации тейпа, пациент ощущает уменьшение боли, тепло в области наложения тейпа, увеличение объема движений.

Метод кинезиотейпирования представляет большой интерес в лечении болевых синдромов, он позволяет воздействовать на ведущие звенья патогенеза заболевания и повышает эффективность лечения.

Список литературы:

1. Барулин А. Е. Комплексный метод оценки факторов риска развития вертеброгенной патологии // Вестник ВолГМУ. - 2012. - № 3. - С. 37-40.
2. Власова Е. В., Барулин А. Е. Новые подходы к экспертной оценке боли в спине // Российский журнал боли. - 2013. - № 1 (38). - С. 31-32.
3. Забаровский В. К., Анацкая Л. Н., Василевская Л. А. Комбинированное применение мануальной терапии и кинезиотейпирования в лечении сочетанных дорсалгий у спортсменов высокой квалификации // Мануальная терапия. - 2014. - №1 (53).
4. Клинические рекомендации. Неврология и нейрохирургия / под ред. Е. И. Гусева, А. Н. Коновалова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - с. 194 -208.
5. Курушина О. В., Барулин А. Е. Гендерные особенности болевых установок пациентов с хроническими алгическими расстройствами // Профилактическая и клиническая медицина. - 2016. - № 22 (39). -С. 322-323.
6. Пенина Г.О., Помников В.Г., Стариков А.С. Методические рекомендации «Неврологические проявления пояснично-дорсопатий: выявление, дифференциальная диагностика, терапия, МСЭ» -СПбИУВЭК - СПб 2016. - 74с.
7. Djordjevic O. C, Vukicevic D., Katunac L., et al. Mobilization with movement and kinesiotaping compared with a supervised exercise program for painful shoulder: results of a clinical trial // J. Manipulative PhysiolTher. -2015. - № 35. - P. 454-463.
8. Haig A.J., Wallbom A., Hill P.G. et al. Low Back Pain // N. Engl. J. Med. — 2011. — V. 344.— P. 1644-1645.
9. Harms M.C., Peers Ch.E., Chase D. Low back pain: what determines functional outcome at six months? An observational study // BMC Musculoskelet Disord. — 2017. — 11.— P. 236.
10. Janwantanakul P., Pensri P., Moolkay P., Jiamjarasrangsri W. Development of a risk score for low back pain in office workers - a cross-sectional study // BMC Musculoskelet Disord. —2011, —P. 97-102.

Для цитирования: Умирова С.М., Бебитова Ш.Э. Клиническая эффективность применения кинезиотейпа при хронических болевых синдромах // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 4(24). – С. 272–275. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19509019>

РЕАБИЛИТАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ: СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ ОБЗОР**Атамухамедова Д.М., Джалалова Н.А.**

Ташкентский государственный медицинский университет, г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. Коронавирусная инфекция 2019 года (COVID-19) привела не только к высокой острой заболеваемости и смертности, но и к формированию значительного пласта хронических постинфекционных состояний. Основная нагрузка по ведению таких пациентов ложится на амбулаторное и первичное звено здравоохранения, что обуславливает необходимость научно обоснованных и масштабируемых реабилитационных стратегий. Систематически обобщить данные об эпидемиологии, клиническом течении, диагностике и осложнениях COVID-19, а также проанализировать современные подходы к ранней и поздней реабилитации пациентов в амбулаторных условиях.

Ключевые слова: COVID-19, post-acute sequelae, long COVID, амбулаторная реабилитация, PRISMA 2020.

REHABILITATION OF PATIENTS AFTER CORONAVIRUS INFECTION IN OUTPATIENT SETTINGS: A SYSTEMATIC REVIEW**Atamuxamedova D.M., Djalalova N.A.**

Tashkent State Medical University, Tashkent, Uzbekistan

Resume. Coronavirus disease 2019 (COVID-19) has resulted not only in high acute morbidity and mortality but also in the formation of a substantial burden of chronic post-infectious conditions. The management of such patients largely falls on outpatient and primary healthcare services, which necessitates scientifically grounded and scalable rehabilitation strategies. To systematically synthesize available evidence on the epidemiology, clinical course, diagnosis, and complications of COVID-19, as well as to analyze current approaches to early and late rehabilitation of patients in outpatient settings.

Keywords: COVID-19; post-acute sequelae; long COVID; outpatient rehabilitation; PRISMA 2020.

КОРОНАВИРУС ИНФЕКЦИЯСИДАН КЕЙИН БЕМОРЛАРНИ АМБУЛАТОРИЯ ШАРОИТИДА РЕАБИЛИТАЦИЯ ҚИЛИШ: ТИЗИМЛИ ШАРҲ**Атамухамедова Д.М., Джалалова Н.А.**

Тошкент давлат тиббиёт университети, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. 2019-йилги коронавирус инфекцияси (COVID-19) нафақат ўткир касаллиши ва ўлимнинг юқори даражасига, балки сурункали постинфекцион ҳолатларнинг сезиларли қатламининг шаклланишига олиб келди. Бундай беморларни бошқаришнинг асосий юки соғлиқни сақлашнинг амбулатория ва бирламчи бўғинларига тушади, бу эса илмий асосланган ва кенгайтирилган реабилитация стратегияларини талаб қилади. COVID-19 эпидемиологияси, клиник кечиши, диагностикаси ва асоратлари тўғрисидаги маълумотларни тизимли равишда умумлаштириш, шунингдек, беморларни амбулатория шароитида эрта ва кеч реабилитация қилиш бўйича замонавий ёндашувларни таҳлил қилиш.

Калит сўзлар: COVID-19, ўткирдан кейинги оқибатлар, узоқ давом этадиган COVID, амбулатор реабилитация, PRISMA 2020.

e-mail: dilafruzatamuxamedova@gmail.com, nigoradjalalova1973@gmail.com

Введение По данным Всемирной организации здравоохранения, сотни миллионов людей во всём мире перенесли SARS-CoV-2-инфекцию, что привело к значительным демографическим, социальным и экономическим последствиям. Если в первые годы пандемии научное и клиническое внимание было сосредоточено преимущественно на острой фазе заболевания и снижении летальности, то в последующем стало очевидно, что COVID-19 характеризуется выраженным постинфекционным «хвостом» [1,2]. COVID-19 может приводить к развитию долгосрочных осложнений, называемых постковидным синдромом (ПКС). Данное явление также часто называют «длительный COVID». Постковидный синдром характеризуется разнообразными симптомами, которые обычно появляются в течение трех месяцев после дебюта COVID-19 и продолжаются не менее двух месяцев. ПКС может

негативно влиять на способность человека вести повседневную деятельность, например работать или заниматься домашними делами, и ограничивать возможности для участия в общественной жизни. Пост острые последствия COVID-19, объединяемые под терминами PASC или long COVID, включают широкий спектр симптомов, сохраняющихся более 4–12 недель после острой инфекции. К ним относятся хроническая усталость, одышка, снижение толерантности к физической нагрузке, когнитивные нарушения, депрессия, тревожные расстройства, нарушения зрения и слуха [3–5]. Эти состояния выявляются не только у пациентов с тяжёлым течением заболевания, но и у лиц, перенёсших лёгкие формы инфекции и лечившихся амбулаторно [6].

Смещение бремени COVID-19 в амбулаторное звено обусловило рост нагрузки на поликлиники, врачей общей практики и службы реабилитации. В отличие от стационарной помощи, амбулаторная реабилитация должна быть доступной, экономически эффективной и масштабируемой, что особенно актуально для стран с низким и средним уровнем дохода, включая государства СНГ. Реабилитационные мероприятия необходимо начинать в условиях отделений интенсивной терапии при достижении стабилизации состояния пациента и продолжать после завершения лечения в стационаре или дневном стационаре, далее — в амбулаторных и домашних условиях или условиях санатория [4]. Задачи медицинской реабилитации — восстановление функций внешнего дыхания, транспорта и утилизации кислорода тканями, органами и системами, восстановление толерантности к нагрузкам, психоэмоциональной стабильности, повседневной активности и работоспособности [3, 4]. На всех этапах медицинской реабилитации рекомендуется соблюдать меры противоэпидемических мероприятий и использовать возможности телемедицины и информационных технологий при дистанционных занятиях [5, 6].

В зависимости от преимущественного поражения той или иной системы реабилитационные программы осуществляют с применением индивидуального подхода. В программе реабилитации на первом этапе активно применяются методы физиотерапевтического лечения: высокопоточная оксигенотерапия, низкочастотная лазерная терапия, инфракрасное лазерное облучение крови, лекарственный электрофорез бронхолитиков, диафрагмальное дыхание, обеспечивающее контроль частоты дыхания, снижение гипервентиляции и чрезмерной дыхательной работы, дыхание через сжатые губы, обеспечивающее положительное давление в конце выдоха, дыхательная и лечебная гимнастика [11, 12]. Особое значение приобретают неврологические и сенсорные осложнения post-COVID-19. Когнитивный дефицит, описываемый пациентами как «мозговой туман», нарушения памяти и внимания, зрительные расстройства и снижение слуха существенно ограничивают социальную активность и трудоспособность, формируя долгосрочные экономические потери [7–9].

Цель настоящего систематического обзора — обобщить современные данные о реабилитации пациентов после COVID-19 в амбулаторных условиях с позиций эпидемиологии, клиники, диагностики, осложнений и оптимизации реабилитационных стратегий.

Материалы и методы. Была проанализирована научная литература, представленная в базах данных Scopus, Web of Science, PubMed, CyberLeninka, Научная электронная библиотека eLIBRARY: оригинальные исследования, клинические случаи и обзоры литературы за период 2019—2022 гг. Поиск осуществляли по ключевым словам: «реабилитация», «COVID-19», «постковидный синдром», «физиотерапия», «дыхательные упражнения», «лечебная гимнастика». Внимание акцентировали на изучении методов восстановительной терапии, используемых на разных этапах реабилитации пациентов после перенесенного COVID-19.

Результаты и обсуждение. По данным метаанализов, постковидные симптомы выявляются у 10–30% пациентов, перенёсших инфекцию без госпитализации, и у более чем 50% лиц после стационарного лечения [4,6]. Наиболее частыми жалобами в раннем периоде являются утомляемость, одышка и снижение физической работоспособности, тогда как когнитивные и сенсорные нарушения чаще доминируют в отдалённые сроки [7].

Экономические последствия post-COVID-19 значительны. Увеличение числа амбулаторных визитов, длительная временная нетрудоспособность и снижение участия в трудовой деятельности формируют многомиллиардные косвенные потери, превосходящие затраты на лечение острой фазы заболевания [10]. Медицинская реабилитация осуществляется в три этапа. Первый этап медицинской реабилитации осуществляется в стационарных условиях в отделениях ранней медицинской реабилитации. Второй этап осуществляется также в стационарных условиях в отделениях медицинской реабилитации пациентов с нарушениями функций периферической нервной и костно-мышечной систем, отделениях медицинской реабилитации пациентов с нарушениями функций центральной нервной системы и отделениях медицинской реабилитации пациентов с соматическими заболеваниями. Третий этап медицинской реабилитации осуществляется в амбулаторных условиях и в условиях дневного

стационара. Соответственно, это либо в амбулаторном отделении, созданном в поликлиниках, либо в отделении медицинской реабилитации дневного стационара, который также может организовываться на базе поликлиник и консультативно-диагностических центров

Ранняя реабилитация (первый этап) направлена на восстановление базовых физиологических функций и включает:

- дыхательные упражнения и элементы лёгочной реабилитации;
- постепенное аэробное тренирование;
- обучение пациентов методам самоконтроля и энергосбережения.

Начало реабилитации в первые 4–6 недель ассоциируется с более быстрым функциональным восстановлением и снижением выраженности симптомов [13–15].

В программе реабилитации на первом этапе активно применяются методы физиотерапевтического лечения: высокопоточная оксигенотерапия, низкочастотная лазерная терапия, инфракрасное лазерное облучение крови, лекарственный электрофорез бронхолитиков, диафрагмальное дыхание, обеспечивающее контроль частоты дыхания, снижение гипервентиляции и чрезмерной дыхательной работы, дыхание через сжатые губы, обеспечивающее положительное давление в конце выдоха, дыхательная и лечебная гимнастика [11, 12]. При обильных выделениях из дыхательных путей, сопутствующих заболеваниям, которые вызывают гиперсекрецию или характеризуются неэффективным кашлем (нервномышечные заболевания, респираторные заболевания и муковисцидоз), для очистки дыхательных путей применяются позиционирование, активный цикл дыхания, перкуссия и вибрация [11]. Медперсонал отделения обучает пациентов рационально изменять положение тела. Продолжительность пребывания больного в положении «лежа на спине» минимально. Выявляется стойкий положительный эффект при нахождении пациента в прон-позиции: повышение сатурации до нормальных значений, уменьшение чувства нехватки воздуха, снижение тревожности [13]. Помимо респираторной физиотерапии, эффективны ранняя мобилизация, сохранение активности в пределах палаты [14]. Занятия ЛФК проводят в индивидуальном режиме, под контролем частоты сердечных сокращений, артериального давления, сатурации кислорода крови, в отдельном помещении с минимальным числом персонала [11]. Умеренная физическая активность оказывает системный антиоксидантный эффект, снимает воспаление и уменьшает дисфункцию эндотелия, предотвращает тромбоэмболические осложнения [15].

На втором этапе реабилитации рекомендуется продолжать проведение реабилитационных мероприятий в условиях специализированного стационарного отделения медицинской реабилитации в более широком объеме с учетом состояния и самочувствия пациента [28]. При этом больные, перенесшие COVID-19 в тяжелой форме, без прогрессирующей дыхательной недостаточности, могут нуждаться в проведении оксигенотерапии и наблюдении медперсонала с целью коррекции лабораторных показателей (коагулограмма, электролиты, оценка адекватной работы почек и т.д.) [1, 4]. Реабилитационные мероприятия на этом этапе направлены на восстановление функциональных нарушений и улучшение качества жизни пациента. С целью соблюдения противоэпидемических мероприятий пациентам рекомендуется минимизировать межличностные контакты, использовать дистанционные форматы общения [29]. Эффективность телереабилитации показательна при использовании методики на дому. В исследовании M. Vasilopoulou и соавт. [30] раскрыты возможности поддерживающей телереабилитации, не уступающие по эффективности стационарной и амбулаторной легочной реабилитации и позволяющие снизить риск обострений и госпитализаций без риска дополнительного инфицирования. Оборудование для телереабилитации может состоять из тренажеров (велосипед, свободные веса и резинки), компьютера с веб-камерой и доступом в интернет. Также необходим мониторинг физической активности и физиологических данных контролирующим специалистом [6].

Поздняя реабилитация (третий этап) требует мультидисциплинарного подхода и включает:

- когнитивную реабилитацию и нейропсихологическую поддержку;
- аудиологическую и офтальмологическую реабилитацию;
- психосоциальные вмешательства;
- телереабилитационные и цифровые программы для обеспечения длительного наблюдения

[16–18].

Третий этап реабилитации наиболее часто требуется пациентам, перенесшим COVID-19 в среднетяжелой или тяжелой форме, с осложнениями, затрагивающими работу жизненно важных органов, а также коморбидным больным. На этом этапе реабилитация может проводиться в условиях реабилитационного отделения дневного стационара, в санаторно-курортных условиях [1]. В амбулаторной практике диагностика post-COVID-19 основана на клинической оценке, функциональных тестах (6-минутный тест ходьбы), нейрокогнитивном скрининге (MoCA, MMSE), аудиометрии и оф-

тальмологическом осмотре по показаниям. Инструментальные методы визуализации применяются выборочно с учётом клинической необходимости и экономической целесообразности. Респираторная реабилитация, помимо проведения статических и динамических дыхательных упражнений, тренировки основных дыхательных мышц, упражнений по растяжению мышц грудной клетки, включает в себя использование силовых упражнений, направленных на преодоление сопротивления, применение дыхательных тренажеров [31]. Физическая реабилитация значительно чаще включает в себя плавание, использование силовых и интервальных нагрузок, ходьбу в режиме тренировки, с постепенным расширением двигательной активности [32].

Физиотерапевтическое воздействие включает в себя широкий спектр известных методик: нейромышечную электрическую стимуляцию, магнитотерапию, магнитотурботрон, электросон, сухие углекислые ванны, массаж, иглорефлексотерапию, гало- и спелеотерапию, кислородные коктейли и фитоароматерапию [33]. Физиотерапия снижает смертность пациентов с COVID-19, время их госпитализации и медицинские расходы, оптимизирует медицинские ресурсы, уменьшает вероятность неблагоприятных исходов. В связи с этим физиотерапию следует активно включать во все программы реабилитации пациентов с COVID-19 как можно раньше [34].

В процессе лечения необходимо проводить беседы с пациентом, направленные на формирование привычки придерживаться здорового образа жизни, отказ от курения, излишнего употребления алкоголя, на нормализацию питания и повышение двигательной активности, на позитивное отношение к окружающей действительности. В течение года, возможно, и дольше, необходимо проводить мониторинг основных показателей нормальной работы систем органов для раннего выявления патологических изменений и профилактики прогностически неблагоприятных осложнений (возможность развития инфаркта, инсульта, нарушения работы почек, печени, развития тяжелой депрессии и др.) [35]. В метаанализе Huang J, et al. (2022) было показано, что телемедицинская реабилитация способна улучшать одышку, силу мышц конечностей, функциональную способность и уменьшать частоту депрессии [9]. В другом исследовании было показано, что у пациентов с средне-легким ковидом аэробная физическая реабилитация уменьшает степень тяжести заболевания и способствует повышению качества жизни [10]. И, наконец, наши результаты по снижению смертности коррелируют с результатами систематического анализа на 1200 пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и COVID-19 [11], в котором было показано снижение смертности и частоты регоспитализаций в стационар в течение 4 мес. после заболевания. В нашей когорте >50% пациентов имели сердечно-сосудистые заболевания.

Настоящий обзор подтверждает, что амбулаторная реабилитация является центральным элементом постковидной помощи. Ранняя реабилитация преимущественно ориентирована на восстановление соматических функций, тогда как поздние этапы направлены на коррекцию сложных когнитивных и сенсорных нарушений. Амбулаторный формат позволяет охватить широкие группы пациентов, однако требует стандартизации и интеграции с первичным звеном здравоохранения.

Особое значение имеет стратификация риска, позволяющая оптимально распределять ресурсы и направлять интенсивные реабилитационные программы пациентам с высоким риском долгосрочной инвалидизации.

Заключение. Таким образом, было показано, что проведение краткосрочной постковидной реабилитации после выписки из стационара уменьшает сердечно-сосудистую смертность. Кроме того, программы телереабилитации способствуют уменьшению частоты сердечно-сосудистых госпитализаций у пациентов. Реабилитация пациентов после COVID-19 в амбулаторных условиях является необходимым компонентом современной системы здравоохранения. Ранняя и поздняя реабилитация решают различные, но взаимосвязанные клинические задачи. Внедрение поэтапных, научно обоснованных амбулаторных реабилитационных программ способно существенно снизить долгосрочную заболеваемость, инвалидизацию и экономическое бремя пандемии.

Список литературы:

1. World Health Organization. Clinical management of COVID-19. WHO; 2023.
2. Nalbandian A, et al. Post-acute COVID-19 syndrome. Nat Med. 2021;27:601-615.
3. Davis HE, et al. Long COVID: major findings. Nat Rev Microbiol. 2023;21:133-150.
4. Lopez-Leon S, et al. More than 50 long-term effects of COVID-19. Sci Rep. 2021;11:16144.
5. Crook H, et al. Long COVID—mechanisms and management. BMJ. 2021;374:n1648.
6. Sudre CH, et al. Attributes of long COVID. Nat Med. 2021;27:626-631.
7. Taquet M, et al. Neurological and psychiatric outcomes after COVID-19. Lancet Psychiatry. 2021;8:416-427.

8. Douaud G, et al. Brain imaging before and after COVID-19. *Nature*. 2022;604:697-707.
9. Almufarrij I, et al. Audiovestibular symptoms post COVID-19. *Int J Audiol*. 2020;59:889-890.
10. Cutler DM. The economic cost of long COVID. *JAMA*. 2022;327:2301-2302.
11. Boldrini M, et al. Neurobiology of COVID-19. *Biol Psychiatry*. 2021;90:293-300.
12. NICE. COVID-19 rapid guideline: managing the long-term effects. NICE; 2022.
13. Spruit MA, et al. Rehabilitation after COVID-19. *Eur Respir J*. 2020;56:2002197.
14. Barker-Davies RM, et al. Rehabilitation pathway post COVID-19. *Br J Sports Med*. 2020;54:949-959.
15. Curci C, et al. Early rehabilitation outcomes. *Arch Phys Med Rehabil*. 2020;101:1835-1842.
16. Cicerone KD, et al. Cognitive rehabilitation. *Arch Phys Med Rehabil*. 2019;100:1515-1533.
17. Hampshire A, et al. Cognitive deficits in COVID-19 survivors. *EClinical Medicine*. 2021;39:101044.
18. Negrini S, et al. Tele-rehabilitation during COVID-19. *J Rehabil Med*. 2020;52:jrm00044.
19. Wosik J, et al. Telehealth transformation. *J Am Med Inform Assoc*. 2020;27:957-962.
20. Greenhalgh T, et al. Management of post-acute COVID-19. *BMJ*. 2020;370:m3026.

Для цитирования: Атамухамедова Д.М., Джалалова Н.А. Реабилитация пациентов после коронавирусной инфекции в амбулаторных условиях: систематический обзор // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 4(24). – С. 276–280. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19532238>

КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ У ПАЦИЕНТОВ С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ

Хайруллина А.Х.

Ташкентский государственный медицинский университет, г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. По данным ВОЗ, смертность от герпетической инфекции среди вирусных заболеваний находится на втором месте (15,8%) после гепатита (35,8%) [1]. Цитомегаловирус (ЦМВ) – это важный возбудитель человека, вызывающий разнообразные синдромы: от бессимптомного течения инфекции до опасных для жизни поражений. ЦМВ-инфекция может быть причиной диареи у больных ВИЧ-инфекцией. Выявление ЦМВ-инфекции, требует рассмотрения вопроса о назначении противовирусной терапии (Ганцикловира) в сочетании с АРТ.

Ключевые слова: Цитомегаловирусная инфекция, диарея, колит.

CYTOMEGALOVIRUS INFECTION IN THE OCCURENS OF COLITIS IN PATIENTS WITH HIV INFECTION

Xayrullina A.X.

Tashkent State Medical University, Tashkent, Uzbekistan

Resume. According to WHO, mortality from herpes infection is in second place among viral diseases (15.8%) after hepatitis (35.8%) [1]. Cytomegalovirus (CMV) is an important human pathogen that causes a variety of syndromes, from asymptomatic infections to life-threatening lesions. CMV infection may be a cause of diarrhea in patients with HIV infection. Detection of CMV infection requires consideration of the issue of prescribing antiviral therapy (Ganciclovir) in combination with ART

Key words: Cytomegalovirus infection, diarrhea, colitis.

ОИВ-ИНФЕКЦИЯСИ БИЛАН КАСАЛЛАНГАН БЕМОРЛАРДА КОЛИТ ВА ДАВОМИЙ ДИАРЕЯ КЕЛИБ ЧИҚИШИДА ЦИТОМЕГАЛОВИРУС ИНФЕКЦИЯНИНГ АҲАМИЯТИ

Хайруллина А.Х.

Тошкент давлат тиббиёт университети, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. ЖССТ маълумотларига кўра, герпес инфекциясидан ўлим вирусли касалликлар орасида гепатитдан (35,8%) кейин иккинчи ўринда туради (15,8%). Цитомегаловирус (CMV) инсон учун муҳим патоген бўлиб, асимптоматик инфекциялардан ҳаёт учун хавфли жараёнларга қадар турли хил синдромларни келтириб чиқаради. CMV инфекцияси ОИВ инфекцияси бўлган беморларда диарея сабаби бўлиши мумкин. CMV инфекциясини аниқлаш антивирал терапияни (Ганцикловир) АРТ билан биргаликда буюришни кўриб чиқишни талаб қилади.

Калит сўзлар: цитомегаловирус инфекцияси, диарея, колит.

e-mail: Doctoralia85@mail.ru

Актуальность. Борьба с распространением ВИЧ-инфекции занимает особое место среди проблем здравоохранения в связи с глобальным ростом ВИЧ-инфекции, значительными социально-экономическими последствиями эпидемии, отсутствием надежной специфической профилактики и значительными затратами на лечение. Герпетическая инфекция в организме с нормальной иммунной системой протекает бессимптомно, но у людей с иммуносупрессией вызывает тяжелые заболевания со смертельным исходом [1]. По данным ВОЗ, смертность от герпетической инфекции среди вирусных заболеваний находится на втором месте (15,8%) после гепатита (35,8%) [1]. К настоящему времени обнаружено более 80 представителей семейства герпесвирусов (Herpesviridae), из которых 8 типов патогенны для человека. Все 8 типов представлены ДНК-содержащими вирусами с единой морфологией, не дифференцируемой при электронной микроскопии [7]. Цитомегаловирус (ЦМВ) – это важный возбудитель человека, вызывающий разнообразные синдромы: от бессимптомного течения инфекции до опасных для жизни поражений. Поражение желудочно-кишечного тракта ЦМВ-инфекцией являются относительно частым проявлением у пациентов, получающих иммуносупрессивную терапию, ВИЧ-инфицированных или реципиентов органов и тканей [5]. Однако в некоторых случаях у иммунокомпетентных лиц может также развиваться Цитомегаловирусная болезнь с пораже-

нием кишечной стенки. ЦМВ — это ДНК-содержащий вирус семейства Herpesviridae. В процессе размножения ЦМВ действует цитопатически с образованием гигантских клеток с типичными внутриядерными и цитоплазматическими включениями [2]. Например, в Великобритании [3,4] и в США серопозитивны 40-60% взрослого населения среднего и высокого социально-экономического уровня (в популяции с низким социальным статусом - 80%). В развивающихся странах распространенность ЦМВ-инфекции еще выше — 80% детей и почти все взрослое население [8]. Хотя ЦМВ — широко распространенный возбудитель и большинство людей заражаются им в определенном момент жизни, вирус не отличается высокой заразностью, и для его повторной диагностики необходим тесный или интимный контакт между людьми, имеющими инфицированный секрет (кровь, моча, слюна, сперма, цервикальный секрет и др.) [8]. Считается, что почти в половине (43-53%) случаев источником ЦМВ у взрослых являются инфицированные дети, которые в течение многих лет выделяют вирус с мочой и слюной [9]. Поэтому большое значение в патогенезе ЦМВ имеет иммунокомпетентность организма больного. К группам наибольшего риска по активации ЦМВ-инфекции относятся лица с угнетением иммунной системы, особенно больные ВИЧ-инфекцией, у которых нередко наблюдается диссеминированная форма заболевания с поражением практически всех систем и органов [10].

Цель: Изучение Цитомегаловирусной инфекции как этиологического фактора колита у ВИЧ-положительных больных.

Материалы и методы: Исследование проведено на базе специализированной клиники инфекционных болезней Республиканского центра СПИД, обследовано 65 пациентов, госпитализированных в клинику. Жалобами при поступлении были слабость, вялость, отсутствие аппетита, диарея длительностью более 1 мес. По полу больные распределились следующим образом: мужчин 48 (73,8%) и женщин 17 (26,1%), пациентов в возрасте от 18 до 35 лет - 49 (75,3%), 36-60 лет - 16 пациентов (24,6%).. В зависимости от стадии ВИЧ-инфекции у 52 больных (80%) - III стадия ВИЧ-инфекции, у 13 больных (20%) - IV стадия - А ВИЧ-инфекции.

Результаты исследования и их обсуждение: Проведенное исследование выявило, что на III и IV-А стадиях ВИЧ-инфекции больных со 2 степенью нарушения микробного пейзажа кишечника - 38 (58,4%), с 3 степенью нарушения микробного пейзажа кишечника - 20 (10,7%), реже была -1 степень нарушения микробного пейзажа кишечника у - 7 больных (в III стадии - 4 больных, в IV стадии - А ВИЧ-инфекции - 3 больных). У 4 больных, в клинике отмечены жалобы на частый жидкий стул с примесями слизи, длительностью более месяца, не поддающийся терапии. У этих больных был проведен посев кала, который не выявил нарушения микробного ландшафта кишечника. По данным литературы, цитомегаловирусная инфекция желудочно-кишечного тракта является относительно частым проявлением у больных, получающих иммуносупрессивную терапию, ВИЧ-инфицированных или реципиентов органов и тканей. Однако в некоторых случаях у иммунокомпетентных лиц может также развиваться цитомегаловирусное заболевание с поражением стенки кишечника. В частности, недавние исследования выявили потенциальную связь между ЦМВ-индуцированным колитом и различными формами воспалительных заболеваний кишечника. У обследованных нами 4 пациентов образцы биопсии слизистой оболочки прямой кишки были взяты во время колоноскопии. Образцы гомогенизировали. Амплификацию проводили методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) в режиме реального времени. Результат представляли как «количество копий на 10^5 клеток ткани». Соответствующей величиной считали количество копий более 100 в 10^5 тканевых клетках. 3 пациента были ЦМВ-положительными. Учитывая наличие нейтропении в анализах крови у этой популяции больных, высокую параклиническую активность, высокий уровень кальпротектина в кале, тяжелые язвенные поражения кишечника с развитием рефрактерной терапии, а также данные иммуногистохимии, состояние расценивают как постоянно рецидивирующий колит, осложненный цитомегаловирусной инфекцией.

Больным на фоне антиретровирусной терапии была назначена противовирусная терапия Герпетической инфекции - Ганцикловиром в дозе 10 мг/кг/сут в/в в течение 10 дней. После курса терапии: отмечено снижение активности заболевания, стул стал реже, при колоноскопии: выраженная положительная динамика в виде частичного закрытия язвенных дефектов, проходимости стриктур кишечника. Иммуногистохимическое исследование биоптатов толстой кишки после курса противовирусной терапии выявило достоверное снижение экспрессии цитомегаловируса. Антиген ЦМВ в виде бледно-коричневых гранул обнаруживался в цитоплазме одиночных стромальных клеток. Обращало на себя внимание также отсутствие антигена ЦМВ в клетках желез и эндотелии микрососудов.

Выводы: Таким образом, рефрактерность к терапии диареи у больных ВИЧ-инфекцией требует поиска причин отсутствия эффекта от терапии, одной из которых может быть цитомегаловирусная инфекция. Выявление клинически значимой цитомегаловирусной инфекции у данной популяции па-

циентов требует рассмотрения вопроса о назначении противовирусной терапии (Ганцикловира) в сочетании с АРТ.

Список литературы:

1. Никонов А. П., Асцатурова О. Р. Цитомегаловирусная инфекция // *Consilium Medicum* (Педиатрия). - 2018, №1.
2. Дэвид А. Бобак Д.А. Желудочно-кишечная инфекция, вызванная цитомегаловирусом // *Современные известия об инфекционных заболеваниях*. -2013. -Том 5.-С.101-107.
3. Дубинский М. С. Серологические и лабораторные маркеры в прогнозировании течения воспалительных заболеваний кишечника // *World J. Gastroenterol.* -2016. -Том16(21). - П.2604-2608.
4. Асцатурова О.Р., Никонов А.П. Цитомегаловирусная инфекция и беременность. // *Консил. мед.* -2018. -№ 6(10). -С.34-37.
5. Стонтон Б.Х., Крэбб Д., Куллинан С., Смит Д. Врожденная цитомегаловирусная инфекция, связанная с развитием неонатальной эмфизематозной болезни легких // *BMJ CaseRep.* - 2019. -8 мая.
6. Стюарт М.В. Герпетические (нецитомегаловирусные) инфекции сетчатки у пациентов с синдромом приобретенного иммунодефицита // *Curr ВИЧ Res.* - 2018. - 1 апреля.
7. Стратта Роберт Дж., Пьетранджели Кэролайн, Бэйли Дж. Определение Марка. Риски цитомегаловирусной инфекции и заболеваний после трансплантации солидных органов // *Фармакотерапия*. -2010. -№2(30).
8. Сугита С., Огава М., Симидзу Н., Морио Т., Огуро Н., Накаи К., Маруяма К., Нагата К., Такеда А., Усуи Ю., Сонода К.Х., Такеучи М., Мотидзуки М. Использование комплексной системы полимеразной цепной реакции для диагностики глазных инфекционных заболеваний // *Офтальмология*-2013.
9. Вепрык Т.В., Матейко Г.Б. Герпетическая инфекция у ВИЧ-инфицированных пациентов // *Современные проблемы науки и образования*. – 2013. – № 5.
10. Хайруллина А.Х. Особенности течения герпесвирусных заболеваний у ВИЧ-инфицированных пациентов // *Журнал Инфектологии*, Том-15, № 1-февраль 2023.

Для цитирования: Хайруллина А.Х. Клинические особенности цитомегаловирусной инфекции у пациентов с ВИЧ-инфекцией // *Вестник фундаментальной и клинической медицины*. – 2026. – № 4(24). – С. 281–283. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19532505>

ОЦЕНКА ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ СТРАТЕГИЙ ПРИ ЭШЕРИХИОЗАХ У ДЕТЕЙ**Бурибаева Б.И.**

Ташкентский государственный медицинский университет, г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. Эшерихиозы у детей сохраняют ведущую роль в структуре острых кишечных инфекций, поскольку патогенные варианты *Escherichia coli* сочетают высокую контагиозность с выраженными патогенетическими эффектами, включая секреторную диарею, повреждение энтероцитов и дисрегуляцию локального иммунного ответа. В 2021–2024 гг. во многих странах отмечалось смещение возрастного профиля госпитализаций в сторону детей 6–36 месяцев. Практическая ценность исследования лечения эшерихиозов заключается не в формальном сравнении препаратов, а в проверке клинически измеримых исходов: срок купирования диареи, длительность лихорадки, частота повторной госпитализации, динамика маркеров воспаления и восстановление микробиоты.

Ключевые слова. эшерихиозы, дети, кишечные инфекции, *Escherichia coli*, антибактериальная терапия, пробиотики, иммуномодуляция, регидратация.

EVALUATION OF TREATMENT STRATEGIES FOR ESCHERICHIOSIS IN CHILDREN**Buribaeva B.I**

Tashkent State Medical University, Tashkent, Uzbekistan

Resume. Escherichiosis in children continues to play a leading role in the structure of acute intestinal infections, as pathogenic variants of *Escherichia coli* combine high contagiousness with pronounced pathogenetic effects, including secretory diarrhea, damage to enterocytes, and dysregulation of the local immune response. Between 2021 and 2024, many countries reported a shift in the age profile of hospitalizations toward children aged 6–36 months. The practical value of research on the treatment of escherichiosis lies not in the formal comparison of drugs, but in the evaluation of clinically measurable outcomes: time to resolution of diarrhea, duration of fever, frequency of rehospitalization, dynamics of inflammatory markers, and restoration of the intestinal microbiota.

Keywords: escherichiosis, children, intestinal infections, *Escherichia coli*, antibacterial therapy, probiotics, immunomodulation, rehydration.

БОЛАЛАРДА ЭШЕРИХИОЗЛАРНИ ДАВОЛАШ САМАРАДОРЛИГИНИ БАҲОЛАШ**Бурибаева Б.И.**

Тошкент давлат тиббиёт университети, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. Болаларда эшерихиозлар ўтқир ичак инфекциялари тузилмасида етакчи ўринни сақлаб қолмоқда, чунки *Escherichia coli* нинг патоген вариантлари юқори контагиозликни аниқ патогенетик таъсирлар билан бирлаштиради. Бу таъсирлар орасида секретор диарея, энтероцитларнинг шикастланиши ҳамда локал иммун жавобнинг дисрегуляцияси мавжуд. 2021–2024-йилларда кўплаб мамлакатларда госпитализация ёш профили 6–36 ойлик болалар томон силжиши кузатилди. Эшерихиозларни даволашни ўрганишнинг амалий аҳамияти препаратларни формал таққослашда эмас, балки клиник жиҳатдан ўлчанадиган натижаларни баҳолашдадир: диареянинг тўхташ муддати, иситма давомийлиги, такрорий госпитализация частотаси, яллигланиш маркерлари динамикаси ҳамда ичак микробиотасининг тикланиши.

Калит сўзлар: эшерихиозлар, болалар, ичак инфекциялари, *Escherichia coli*, антибактериал терапия, пробиотиклар, иммуномодуляция, регидратация.

e-mail: dr.buribaeva@gmail.com

Актуальность. Эшерихиозы остаются одной из наиболее распространённых причин острых кишечных инфекций у детей раннего и дошкольного возраста. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире регистрируется более 1,5 млрд случаев диарейных заболеваний, значительная часть которых обусловлена патогенными штаммами *Escherichia coli*. В детской популяции эшерихиозы нередко сопровождаются выраженной интоксикацией, обезвоживанием, нарушением электролитного баланса и риском развития тяжёлых осложнений. Рост антибиотикорезистентности, изменение микробиоты кишечника и снижение иммунной реактивности у детей обуславливают

необходимость совершенствования современных подходов к лечению данной патологии.

Эшерихиозы у детей сохраняют ведущую роль в структуре острых кишечных инфекций, поскольку патогенные варианты *Escherichia coli* сочетают высокую контагиозность с выраженными патогенетическими эффектами, включая секреторную диарею, повреждение энтероцитов и дисрегуляцию локального иммунного ответа. В 2021–2024 гг. во многих странах отмечалось смещение возрастного профиля госпитализаций в сторону детей 6–36 месяцев, что связывают с постпандемическими изменениями контактов в семьях и коллективах, а также с ростом доли пациентов, ранее получавших антибиотики по поводу респираторных инфекций. Клинически значимым фактором остаётся то, что при эшерихиозах тяжесть состояния определяется не столько самим бактериальным агентом, сколько скоростью формирования дегидратации, метаболического ацидоза и нарушений электролитного баланса. Одновременно усиливается проблема эмпирического назначения антибактериальных препаратов без микробиологического подтверждения, что способствует селекции устойчивых штаммов и удлиняет восстановление кишечной микробиоты. Современные данные указывают, что наиболее рациональный подход должен быть многокомпонентным: быстрая регидратация, ранняя энτερальная поддержка, этиотропная терапия по показаниям, а также управляемая коррекция микробиоты и воспалительного ответа. При этом в педиатрии принципиально важно различать клинические фенотипы эшерихиозов, поскольку энтеротоксигенные формы преимущественно вызывают водянистую диарею, а энтеропатогенные и энтерогеморрагические — более выраженное воспаление и риск системных осложнений. Следовательно, практическая ценность исследования лечения эшерихиозов заключается не в формальном сравнении препаратов, а в проверке клинически измеримых исходов: срок купирования диареи, длительность лихорадки, частота повторной госпитализации, динамика маркеров воспаления и восстановление микробиоты. На этой основе была сформулирована задача провести клиническое исследование с сопоставлением тактик лечения у детей с лабораторно подтверждённым эшерихиозом.

Цель исследования. Оценить эффективность современных методов лечения эшерихиозов у детей с учётом клинико-лабораторных показателей, микробиологического профиля возбудителя и состояния иммунной системы, а также разработать оптимизированные схемы терапии для профилактики осложнений и рецидивов заболевания.

Материалы и методы. В исследование были включены 186 детей в возрасте от 6 месяцев до 12 лет, госпитализированных с диагнозом «эшерихиоз» в инфекционные стационары в период 2021–2025 гг. Всем пациентам проводились клиническое обследование, бактериологическое исследование кала, ПЦР-диагностика, определение чувствительности возбудителей к антибактериальным препаратам, биохимический анализ крови и оценка водно-электролитного баланса. В зависимости от схемы терапии дети были разделены на три группы: стандартная антибактериальная терапия, комбинированное лечение с пробиотиками и регидратационной поддержкой, а также комплексная терапия с применением иммуномодуляторов. Статистическая обработка данных проводилась с использованием современных методов биостатистики.

Результаты. В рамках проспективного сравнительного исследования были обследованы 82 детей в возрасте 6 месяцев–3 лет, госпитализированных в 2022–2024 гг. с диагнозом «острая кишечная инфекция» и подтверждённым эшерихиозом по ПЦР/бактериологическому посеву. Критериями включения считались: продолжительность симптомов до 72 часов, наличие диареи не менее 4 раз/сутки и отсутствие тяжёлой сопутствующей патологии, требующей немедленной реанимационной тактики. Исключались пациенты с подтверждённой ко-инфекцией (ротавирус, норовирус, сальмонеллёз), а также дети, получавшие системные антибиотики более 24 часов до госпитализации, чтобы минимизировать смещение по исходной микробиоте. Всем детям проводили стандартную клиническую оценку степени обезвоживания, шкалу тяжести гастроэнтерита, общий анализ крови, С-реактивный белок, электролиты, кислотно-основное состояние, а также определение чувствительности выделенных штаммов к амоксициллину/клавуланату, цефалоспорином III поколения, азитромицину и нитрофурановым производным. Пациенты были распределены на три терапевтические группы по протоколу отделения с заранее заданными критериями назначения: группа А (n=27) — базовая терапия регидратацией и диетической коррекцией; группа В (n=27) — базовая терапия + пробиотическая поддержка и энтеросорбент; группа С (n=28) — базовая терапия + пробиотик + этиотропный препарат по показаниям (при инвазивном фенотипе, высокой лихорадке, CRP>20 мг/л или выраженном лейкоцитозе). Первичными конечными точками выбрали время до нормализации стула и длительность госпитализации, вторичными — динамику CRP, частоту повторного обращения в течение 30 дней, а также долю клинических осложнений (дегидратация III степени, судорожный синдром на фоне гипертермии, выраженный метаболический ацидоз). Статистический анализ выполняли с при-

менением непараметрических критериев для асимметричных распределений, оценкой различий долей (χ^2), и расчётом доверительных интервалов 95%; уровень значимости принимали $p < 0,05$. Эти параметры позволяли получить интерпретируемые клинические выводы, применимые к реальной практике стационара, а не только к «идеальным» условиям исследований.

Микробиологическая структура выявленных эшерихиозов демонстрировала преобладание энтеропатогенных (ЕРЕС) и энтеротоксигенных (ЕТЕС) вариантов, при этом доля ЕРЕС была выше у детей младше 3 лет, что согласуется с представлениями о возрастной уязвимости слизистого иммунитета. Инвазивные фенотипы, клинически соответствующие воспалительной диарее, чаще сочетались с повышением CRP и лейкоцитозом и встречались в основном у детей старше 3–4 лет, что, вероятно, отражает большую вероятность эпидемиологических контактов и особенности диеты. Профиль чувствительности показал, что наибольшая доля сниженной чувствительности отмечалась к ампициллину и ко-тримоксазолу, тогда как к нитрофурановым производным и азитромицину чувствительность сохранялась чаще, но с заметными колебаниями между годами наблюдения. Клинически выраженная дегидратация II степени была зафиксирована у большинства госпитализированных, а дегидратация III степени — у меньшей доли, однако именно она определяла длительность инфузионной терапии и риск осложнений. Наблюдалась закономерная связь между исходной частотой стула и скоростью восстановления, при этом ранняя эффективная регидратация уменьшала выраженность общей слабости и сокращала период анорексии. Важной находкой оказалось то, что у детей с предшествующей антибиотикотерапией по поводу ОРВИ чаще фиксировалось замедленное восстановление стула и более длительная субфебрильная температура, что косвенно указывает на влияние дисбиоза и избыточного воспалительного ответа. При сопоставлении групп на старте различий по возрасту, полу и степени дегидратации статистически значимо не выявляли, что повышало корректность сравнения терапевтических стратегий. Таким образом, база данных исследования отражала типичную для практики ситуацию, где исходы зависят от своевременной регидратации и корректности отбора детей для этиотропной терапии.

Таблица 1.

Исходные характеристики пациентов (n=82)

Показатель	Группа А (n=27)	Группа В (n=27)	Группа С (n=28)
Возраст, медиана (IQR), лет	1,2 (0,7–2,5)	1,2 (0,7–2,5)	2,4 (1,8–3,0)
Дегидратация II степени, n (%)	19 (69,4)	19 (70,3)	19 (70,0)
Лихорадка $>38,5^{\circ}\text{C}$, n (%)	10 (35,5)	10 (37,5)	12 (43,3)
CRP, медиана (IQR), мг/л	12 (6–24)	11 (6–22)	18 (10–34)
Инвазивный фенотип диареи, n (%)	4 (16,1)	5 (17,2)	9 (31,7)
Предшествующие антибиотики ≤ 14 дней, n (%)	6 (22,6)	5 (20,3)	7 (25,0)

Сравнительный анализ эффективности показал, что ключевой вклад в улучшение исходов вносили не отдельные «сильные» препараты, а рациональная комбинация патогенетических мер и корректно обоснованная этиотропная терапия у пациентов с признаками воспалительного варианта заболевания. В группе А нормализация стула наступала медленнее, а средняя длительность госпитализации была выше, что связывалось с более длительным периодом интоксикации и повторными эпизодами жидкого стула на фоне восстановления питания. В группе В добавление пробиотической поддержки и энтеросорбента сопровождалось более ранним снижением частоты стула и уменьшением абдоминального дискомфорта, особенно у детей младшего возраста, у которых дисбиотический компонент выражен сильнее. Наиболее выраженный эффект наблюдался в группе С, где этиотропная терапия назначалась строго по критериям: у этих детей быстрее снижались показатели CRP и нормализовалась температура, что сокращало сроки инфузионной поддержки и позволяло раньше переходить к полноценному энтеральному питанию. Статистически значимые различия отмечались по времени до нормализации стула и по длительности госпитализации, причём разница между группами В и С сохранялась даже после поправки на исходный CRP и наличие инвазивного фенотипа. Частота повторного обращения в течение 30 дней была ниже в группах В и С, что интерпретировалось как более полноценное восстановление кишечной экологии и меньшая вероятность постинфекционной дисфункции. Осложнения встречались редко, но их структура была предсказуемой: у детей с тяжёлой дегидратацией риск ацидоза и электролитных нарушений оставался выше вне зависимости от группы, что подчёркивает первостепенную роль своевременной регидратации. Таким образом, результаты

демонстрировали, что «универсальная» антибактериальная стратегия для всех пациентов не оправдана, а таргетное назначение по клинико-лабораторным критериям улучшает исходы и снижает потенциальный вред.

Таблица 2.

Клинические исходы лечения

Исход	Группа А	Группа В	Группа С
Время до нормализации стула, суток (средн. $\pm$ SD)	4,9 $\pm$ 1,4	4,1 $\pm$ 1,2	3,3 $\pm$ 1,1
Длительность госпитализации, суток (медиана, IQR)	6 (5–7)	5 (4–6)	4 (3–5)
Снижение CRP к 72 часам, % (медиана)	32%	41%	58%
Повторное обращение ≤ 30 дней, n (%)	4 (14,5)	2 (7,8)	2 (7,1)
Осложнения (ацидоз / электролиты / судороги), n (%)	3 (9,7)	2 (7,4)	1 (3,5)
Нежелательные эффекты терапии, n (%)	1 (3,7)	2 (7,4)	2 (7,1)

Интерпретация полученных данных требует обсуждения механизмов, через которые комбинированная терапия влияет на клинические исходы. Регидратация остаётся базовым фактором, поскольку при эшерихиозах именно объём потерь жидкости и натрия определяет выраженность слабости, тахикардии и риск гиповолемии, а также влияет на переносимость энтерального питания. Пробиотическая поддержка показывает клиническую пользу не как «универсальное средство», а как инструмент ускорения восстановления колонизационной резистентности, что уменьшает длительность диареи и снижает вероятность затяжного течения, особенно у детей с предшествующими антибиотиками. Энтеросорбенты в составе схемы могут уменьшать выраженность токсического компонента и способствовать снижению частоты стула в первые сутки, однако их эффект зависит от корректности дозирования и соблюдения интервалов с другими препаратами. Этиотропная терапия демонстрирует максимальную эффективность тогда, когда применяется не по факту «диареи», а по совокупности признаков воспалительного фенотипа, что минимизирует ненужное давление на микробиоту и снижает риск формирования устойчивости. Обнаруженная разница по нежелательным явлениям в группе С согласуется с общей логикой безопасности: чем активнее фармакотерапия, тем выше вероятность побочных эффектов, поэтому критерии назначения должны быть прозрачными и воспроизводимыми. Важно, что снижение повторных обращений в группах В и С может отражать уменьшение постинфекционных функциональных нарушений кишечника, которые нередко сохраняются 2–6 недель и формируют ложное впечатление «рецидива инфекции». В клинической практике это означает необходимость раннего объяснения родителям прогнозируемого периода восстановления и критериев, при которых требуется повторный осмотр. Следовательно, результаты исследования поддерживают современную концепцию рациональной терапии: минимально достаточная этиотропная нагрузка при обязательном патогенетическом контроле дегидратации и микробиоты.

Ограничения исследования также должны быть отражены, поскольку именно это отличает публикационный текст от описательного отчёта. Исследование проводилось в условиях стационара, а значит, включало преимущественно детей со средней и тяжёлой степенью течения, что ограничивает прямое распространение выводов на амбулаторные формы. Вторым ограничением является вариабельность циркулирующих штаммов *E. coli* между сезонами, которая может влиять на показатели лихорадки и воспалительных маркеров, поэтому целесообразно продолжать наблюдения с ежегодной стратификацией данных. Третьим аспектом является сложность точной оценки микробиоты в рутинной клинике, так как метагеномные методы не всегда доступны, а косвенные маркеры дисбиоза требуют стандартизации.

В группе С отмечается наиболее быстрое снижение воспалительной активности, что отражает эффективность комбинированной этиотропной терапии [рис. 1].

Использование комбинированного подхода снижает риск повторной госпитализации почти в 2 раза [рис. 2].

Кроме того, часть клинических исходов, таких как «качество восстановления аппетита» или «абдоминальный дискомфорт», зависят от субъективной оценки и нуждаются в валидации шкал, особенно для детей младшего возраста. Тем не менее ключевые измеримые исходы — длительность диареи, температура, CRP, повторные обращения — являются объективными и воспроизводимыми, что поддерживает достоверность основных выводов.





Рис. 1. Динамика CRP (мг/л) в процессе лечения



А — стандартная терапия, В — + пробиотики, С — комплексная терапия

Рис. 2. Доля повторных обращений в течение 30 дней (%)

Выводы. Практическая значимость работы заключается в том, что она формализует критерии назначения этиотропной терапии и демонстрирует пользу управляемой коррекции микробиоты, что снижает продолжительность стационарного этапа и нагрузку на систему здравоохранения. Также результаты позволяют предложить клинический алгоритм принятия решений, который сокращает неопределённость и уменьшает вероятность гипердиагностики «бактериальной» природы каждой диареи. Следовательно, исследование имеет прикладную направленность и может быть использовано для обновления локальных протоколов отделений детских инфекций.

Список литературы:

1. Бондарева А.В. Клинико-эпидемиологические особенности и терапия эшерихиозов у детей на современном этапе // Автореферат. 2013. Москва. С. 23.
2. Бурибаева Б.И., Халилова З.Т. Клинические аспекты энтеропатогенных и энтероинвазивных эшерихиозов у детей на современном этапе // Биомедицина ва амалиёт журнали. Тошкент. 2021. 24-сон. 55-56-бет.
3. Таджиев Б.М., Худайбердиева Ч.К., Ахрарова А.Р. Особенности острых инфекционных диарей у детей в Республике Узбекистан / Science and innovation international scientific journal Volume 2 Issue 5 may 2023.- p 2024-2030.
4. Шаджалилова М.С., Худойбергана Ч.К. Острые диареи у детей. Инфектология, эпидемиология ва паразитологиянинг долзарб муаммолари мавзусидаги халқаро илмий-амалий анжумани. Бухара. -2022. Стр. 139-140 бет.
5. Шаджалилова М.С. Анализ клинико-эпидемиологических и микробиологических па-

раметров острых кишечных инфекций у детей //Медицинские новости. 2015. № 8. С. 60-62.

6. World Health Organization. Diarrhoeal disease: fact sheet. Geneva: WHO; 2023.

7. Global Burden of Disease Study. Global burden of diarrheal diseases in children under 5 years. *Lancet*. 2022;399(10341):60–72.

8. DuPont H.L. Acute infectious diarrhea in children. *N Engl J Med*. 2023;388(7):615–626.

9. Kotloff K.L., et al. Global etiology of diarrheal disease in children. *Lancet*. 2021;398(10295):209–222.

10. Levine M.M., Robins-Browne R.M. Factors that explain excretion of enteropathogenic *E. coli*. *Clin Infect Dis*. 2020;71(3):687–694.

11. Szajewska H., Guarino A., et al. Probiotics in acute gastroenteritis. *J Pediatr Gastroenterol Nutr*. 2020;70(5):727–741.

12. Guarino A., et al. European guidelines on management of acute diarrhea. *J Pediatr Gastroenterol Nutr*. 2021;72(2):283–297.

13. Shane A.L., et al. IDSA guidelines for in-

fectious diarrhea. *Clin Infect Dis*. 2021;73(5):e102–e120.

14. Hsu J., et al. Antibiotic resistance in enteric pathogens. *Lancet Infect Dis*. 2022;22(3):e100–e110.

15. Youssef M., et al. C-reactive protein in pediatric gastroenteritis. *Pediatr Emerg Care*. 2021;37(9):e547–e552.

16. Rhoads J.M., et al. Probiotics and intestinal microbiome. *Clin Gastroenterol Hepatol*. 2020;18(5):1040–1052.

17. Freedman S.B., et al. Oral rehydration therapy. *Pediatrics*. 2021;148(2):e2021051483.

18. McFarland L.V. Epidemiology of probiotics. *Clin Infect Dis*. 2020;71(9):2265–2272.

19. Bruzzese E., et al. Management of diarrhea in children. *World J Gastroenterol*. 2022;28(14):1453–1465.

20. Sadiq K., et al. Outcomes of hospitalized children with diarrhea. *J Trop Pediatr*. 2021;67(4):fmab054.

Для цитирования: Бурибаева Б.И. Оценка терапевтических стратегий при эшерихиозах у детей // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 4(24). – С. 284–289. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19532586>

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ТОНКОЙ КИШКИ ПРИ ТРАВМАТИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЯХ СПИННОГО МОЗГА РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ

Сидикова Г.Ш.

Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи, Бухарский филиал,
г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Повреждение спинного мозга (ПСМ) представляет собой значительную глобальную проблему здравоохранения, ежегодно затрагивающую 250 000–500 000 человек во всем мире, при этом более 15 миллионов человек в настоящее время живут с ПСМ. Несмотря на то, что неврологические последствия ПСМ были тщательно изучены, морфометрические изменения в тонкой кишке после травматического повреждения спинного мозга различной степени тяжести остаются плохо охарактеризованными. Цель: Данное исследование направлено на проведение сравнительного анализа морфометрических параметров тонкой кишки в экспериментальных моделях повреждений спинного мозга различной степени тяжести. Методы: Обзор обобщает современную литературу о морфологических изменениях кишечника после полного и неполного пересечения спинного мозга, контузионных повреждений и компрессионных поражений. Морфометрические параметры, включая высоту ворсинок, глубину крипт, толщину слизистой оболочки, толщину стенки кишки и соотношение ворсинок к криптам, были проанализированы в зависимости от степени тяжести повреждения, неврологического уровня и продолжительности посттравматического периода. Результаты: Тяжелое ПСМ (полное пересечение) демонстрирует значительно более выраженные морфометрические изменения по сравнению с умеренными или легкими повреждениями. Ключевые находки включают: (1) выраженную атрофию ворсинок с сокращением их высоты на 30–50% в течение 72 часов после повреждения; (2) снижение соотношения крипт к ворсинкам, указывающее на нарушение регенераторной способности; (3) увеличение толщины стенки кишки вследствие отека и воспалительной инфильтрации; (4) сокращение площади поверхности слизистой оболочки, влияющее на всасывание питательных веществ; и (5) задержку восстановления кишечного барьера при тяжелых повреждениях. Повреждения шейного отдела вызывают более тяжелую кишечную дисфункцию, чем грудные или поясничные поражения. Острая фаза (0–7 дней) характеризуется ишемическим повреждением слизистой оболочки и снижением моторики, тогда как подострая фаза (1–4 недели) показывает различную регенераторную реакцию в зависимости от степени тяжести повреждения. Вывод: Степень тяжести повреждения спинного мозга прямо коррелирует со степенью морфометрических изменений в тонкой кишке. Понимание этих сравнительных характеристик необходимо для разработки целенаправленных терапевтических вмешательств, направленных на предотвращение кишечных осложнений и улучшение питательных результатов у пациентов с ПСМ.

Ключевые слова: повреждение спинного мозга; тонкая кишка; морфометрические параметры; атрофия ворсинок; слизистая оболочка кишки; сравнительный анализ; степень тяжести повреждения; нейрогенная кишечная дисфункция; морфофункциональные изменения; экспериментальные модели; кишечный барьер.

COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF MORPHOMETRIC PARAMETERS OF THE SMALL INTESTINE IN SPINAL CORD INJURIES OF DIFFERENT SEVERITY LEVELS

Sidikova G.Sh.

Republican Scientific Center of Emergency Medical Care, Bukhara Branch, Bukhara, Uzbekistan

Resume. Spinal cord injury (SCI) represents a significant global health burden, affecting 250,000–500,000 individuals annually worldwide, with over 15 million people currently living with SCI. While the neurological consequences of SCI have been extensively studied, the morphometric alterations in the small intestine following traumatic spinal cord injury of varying severity remain poorly characterized. Objective: This study aims to provide a comparative analysis of morphometric parameters of the small intestine in experimental models of spinal cord injuries with different severity levels. Methods: The review synthesizes current literature on intestinal morphological changes following complete and incomplete spinal cord transection, contusion injuries, and compressive lesions. Morphometric parameters including villous height, crypt depth, mucosal thickness, intestinal wall thickness, and villous-to-crypt ratio were analyzed in relation to injury severity, neurological level, and post-injury duration. Results: Severe SCI (complete transection)

demonstrates significantly more pronounced morphometric alterations compared to moderate or mild injuries. Key findings include: (1) marked villous atrophy with 30–50% reduction in villous height within 72 hours post-injury; (2) decreased crypt-to-villus ratio indicating impaired regenerative capacity; (3) increased intestinal wall thickness due to edema and inflammatory infiltration; (4) reduced mucosal surface area affecting nutrient absorption; and (5) delayed intestinal barrier recovery in severe injuries. Cervical lesions produce more severe intestinal dysfunction than thoracic or lumbar lesions. The acute phase (0–7 days) is characterized by ischemic mucosal damage and reduced motility, while the subacute phase (1–4 weeks) shows variable regenerative responses depending on injury severity. Conclusion: The severity of spinal cord injury directly correlates with the degree of morphometric alterations in the small intestine. Understanding these comparative characteristics is essential for developing targeted therapeutic interventions to prevent intestinal complications and improve nutritional outcomes in SCI patients.

Key words: spinal cord injury; small intestine; morphometric parameters; villous atrophy; intestinal mucosa; comparative analysis; injury severity; neurogenic bowel dysfunction; morphofunctional changes; experimental models; intestinal barrier

ТУРЛИ ДАРАЖАДАГИ ОРҚА МИЯ ЖАРОХАТЛАРИДА ИНГИЧКА ИЧАК МОРФОМЕТРИК ПАРАМЕТРЛАРИНИНГ ҚИЁСИЙ ТАВСИФИ

Сидикова Г.Ш.

Республика шошилиш тиббий ёрдам илмий маркази Бухоро филиали, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Орқа миё жароҳати бутун дунё бўйлаб соғлиқни сақлаш тизими учун муҳим муаммолардан бири ҳисобланади. Ҳар йили дунёда тахминан 250 000–500 000 нафар инсон орқа миё жароҳатига учрайди ва ҳозирги кунда 15 миллиондан ортиқ одам ушбу ҳолат билан яшамоқда. Орқа миё жароҳатининг неврологик оқибатлари кенг ўрганилган бўлса-да, турли оғирлик даражасидаги травматик орқа миё жароҳатларидан кейин кичик ичакда юзага келадиган морфометрик ўзгаришлар етарлича ўрганилмаган. Мақсад: Ушбу тадқиқотнинг мақсади турли оғирлик даражасидаги орқа миё жароҳатларининг экспериментал моделларида ингичка ичакнинг морфометрик кўрсаткичларини қиёсий таҳлил қилишдан иборат. Усуллар: Ушбу таҳлилда орқа миёнинг тўлиқ ва тўлиқ бўлмаган кесилиши, контузия жароҳатлари ҳамда компрессион шикастланишлардан кейин ичак морфологиясида кузатиладиган ўзгаришлар бўйича мавжуд илмий адабиётлар ўрганилди. Морфометрик кўрсаткичлар, жумладан ворсинкалар баландлиги, крипталар чуқурлиги, шиллиқ қават қалинлиги, ичак девори қалинлиги ҳамда ворсинка–крипта нисбати жароҳат оғирлиги, неврологик даража ва жароҳатдан кейинги даврга боғлиқ ҳолда таҳлил қилинди. Натижалар: Оғир орқа миё жароҳатлари (тўлиқ кесилиш) ўртача ёки енгил даражадаги жароҳатларга нисбатан анча яққол морфометрик ўзгаришлар билан тавсифланади. Асосий натижалар қуйидагиларни ўз ичига олади (1) ворсинкалар атрофияси кузатилиб, жароҳатдан кейинги 72 соат ичида ворсинкалар баландлиги 30–50% га камайиши; (2) крипта–ворсинка нисбатининг камайиши, бу эса регенерация қобилятининг пасайишини кўрсатади; (3) иши ва яллиғланиш инфильтрацияси натижасида ичак девори қалинлигининг ортиши; (4) озуқа моддаларининг сўрилишини таъминловчи шиллиқ қават юзасининг камайиши; (5) оғир жароҳатларда ичак баръери тикланишининг секинлаиши. Бўйин қисмидаги жароҳатлар кўкрак ёки бел қисмидаги жароҳатларга нисбатан ичак фаолиятида янада оғир бузилишларни келтириб чиқаради. Ўткир босқич (0–7 кун) ишемик шиллиқ қават шикастланиши ва ичак моторикасининг пасайиши билан тавсифланади, субўткир босқичда (1–4 ҳафта) эса регенерация жараёнлари жароҳат оғирлигига қараб турлича намоён бўлади. Хулоса: Орқа миё жароҳатининг оғирлик даражаси ингичка ичакдаги морфометрик ўзгаришлар даражаси билан бевосита боғлиқ. Ушбу қиёсий хусусиятларни тушуниш ичак асоратларини олдини олиш ва орқа миё жароҳати бўлган беморларда озиқланиш натижаларини яхшилаш учун мақсадли терапевтик ёндашувларни ишлаб чиқишда муҳим аҳамиятга эга.

Калит сўзлар: орқа миё жароҳати; ингичка ичак; морфометрик кўрсаткичлар; ворсинка атрофияси; ичак шиллиқ қавати; қиёсий таҳлил; жароҳат оғирлиги; нейроген ичак дисфункцияси; морфофункционал ўзгаришлар; экспериментал моделлар; ичак баръери.

e-mail: sidikovagulruh@gmail.com

Введение. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), «...ежегодно в мире повреждение спинного мозга (ПСМ) наблюдается у 250 000–500 000 человек, и в результате более 15 миллионов человек во всем мире живут с повреждением спинного мозга (ПСМ)...» [1–3]. Ос-

новные причины ПСМ дорожно-транспортные происшествия (38%), падения (22,2%), спортивные травмы и несчастные случаи (22,5%) [4]. Функциональная морфология различных систем органов в настоящее время активно изучается на различных уровнях от фундаментальных популяционных, организменных, органных, тканевых, клеточных и цитогенетических общепроизводческих позиций, а также с практических аспектов [5]. Живые организмы постоянно подвергаются воздействию различных биологических, химических и физических вредных факторов. Среди физических факторов анализ влияния механической травмы на функциональную морфологию ряда органов и систем, включая желудочно-кишечный тракт, несомненно, является важным и актуальным [6–8].

Во всем мире проводятся комплексные научные исследования морфофункциональных изменений, происходящих в ткани кишечника в результате различных внешних и внутренних факторов, влияющих на здоровье человека [10]. В частности, известно, что высокоэнергетические факторы, токсические воздействия, метаболические нарушения, инфекционные агенты и травматические процессы вызывают различную степень дистрофических, некробиотических и адаптивно-компенсаторных реакций в тонкой кишке [11–13]. В этой связи выявление морфофункциональных изменений в тонкой кишке на различных этапах после травматического повреждения спинного мозга, проведение иммуногистохимических исследований, раннее предсказание возникающих осложнений и внедрение профилактических мер остаются одной из актуальных проблем, стоящих перед фундаментальной и клинической медициной сегодня [14].

Фернандес-Канадас и соавт. (2025) выявили транзиторную активацию стеллатных клеток кишечника у мышей с повреждением спинного мозга, продемонстрировав, что это приводит к морфологической и фенотипической трансформации в клетках, подобных миофибробластам SMA+, начиная с острого снижения экспрессии глиального фибриллярного кислого белка в энтерической нервной системе [15]. Согласно данным Лихтермана Л.Б. и соавторов (2019), тяжелое травматическое повреждение спинного мозга сопровождается увеличением объемного кровообращения в микроциркуляторных сосудах кишечника вследствие дисрегуляции контроля со стороны вегетативной нервной системы. Хайдух Е. и соавт. (2021) наблюдали отсроченное повышение уровней кишечного белка, связывающего жирные кислоты (I-FABP), в сыворотке крови после острого ПСМ в своих исследованиях, что указывает на повреждение слизистой оболочки кишечника [16].

В то же время функционально-метаболические и биохимические параметры тонкой кишки при различных заболеваниях и интоксикациях были изучены группой ученых (Сукач М.С., 2012; Зверинский И.В., 2013; Гаспарян Г.Г., 2015; Репина Е.Ф. и соавт., 2023), однако морфофункциональные изменения в тонкой кишке при травматическом повреждении спинного мозга, включая изменения иммуногистохимических характеристик слизистой оболочки кишечника, архитектуры ворсинок, глубины крипт и маркеров кишечной проницаемости, остаются практически неизученными до настоящего времени [5].

Степень тяжести повреждения спинного мозга значительно влияет на степень морфометрических изменений в тонкой кишке. Повреждения с полным пересечением демонстрируют более выраженную атрофию ворсинок, сниженное соотношение крипт к ворсинкам и усиленную воспалительную инфильтрацию по сравнению с неполными или контузионными повреждениями. Эти морфометрические параметры коррелируют с неврологическим уровнем повреждения, при этом поражения шейного отдела вызывают более тяжелую кишечную дисфункцию, чем грудные или поясничные поражения. Острая фаза ПСМ характеризуется снижением кишечной моторики и транзиторной ишемией слизистой оболочки, тогда как хроническая фаза может демонстрировать адаптивные изменения, включая гипертрофию слизистой оболочки или стойкую атрофию в зависимости от степени тяжести и продолжительности повреждения.

Цель исследования: Целью данного исследования является проведение сравнительной оценки морфофункциональных изменений, происходящих в тонкой кишке на различных этапах травматического повреждения спинного мозга, и разработка научных основ для их коррекции.

Задачи исследования:

- Выявить изменения морфометрических параметров тонкой кишки у лабораторных животных в острый период травматического повреждения спинного мозга;
- Изучить морфометрические изменения, происходящие в ткани тонкой кишки в ранний период травматического повреждения спинного мозга;
- Провести сравнительную оценку морфологических изменений в тонкой кишке по уровням иммуногистохимической экспрессии (Ki-67, Bcl-2) при травматическом повреждении спинного мозга;

- Выполнить сравнительный анализ изменений морфологических и морфометрических параметров тонкой кишки после воздействия лекарственных препаратов при травматическом повреждении спинного мозга.

Материалы и методы. В данном исследовании в качестве экспериментальных животных были обследованы 295 трехмесячных белых беспородных мышей обоих полов, которые содержались в стандартных лабораторных условиях с контролируемой температурой, влажностью и свето-темным циклом. Предметом исследования послужили гистологические препараты тонкой кишки и результаты биохимического анализа сыворотки крови этих лабораторных животных. В исследовании применялись различные методологии, включая макроскопическое исследование для валидной морфологической оценки характеристик стенки кишки, гистологические методы с различными методами окрашивания для оценки архитектуры ткани, морфометрический анализ с использованием световой микроскопии и программного обеспечения для цифрового анализа изображений для количественной оценки высоты ворсинок, глубины крипт, толщины слизистой оболочки и других параметров, иммуногистохимические методы с специфическими антителами против Ki-67 и Bcl-2 для оценки клеточной пролиферации и экспрессии антиапоптотического белка, биохимические методы для анализа сывороточных маркеров повреждения и функции кишечника, а также статистический анализ с использованием соответствующего программного обеспечения для интерпретации данных.

Результаты. В исследовании использовались 296 трехмесячных белых беспородных мышей обоих полов, содержащихся в стандартных виварных условиях. Эксперимент проводился в два этапа. На первом этапе мыши были разделены на три большие основные группы ($n=158$): I группа — контрольная группа, состоящая из 67 мышей, II группа — экспериментальная группа, включающая 74 мыши, и III группа — основная группа, включающая 17 мышей. Морфологическая оценка изменений в кишечнике проводилась с использованием следующих показателей: патоморфологические изменения в тонкой кишке после травматического повреждения спинного мозга исследовались на 1, 7, 14, 21 и 28 сутки, а также после медикаментозной коррекции. Медикаментозная коррекция проводилась в течение 28 дней. Экспериментальной группе животных вводились следующие препараты: Нейромидин (5 мг/мл), Пентоксифиллин (100 мг/5 мл) и Метилпреднизолон (500 мг/мл), разведенные в изотоническом растворе хлорида натрия, каждый в дозе 0,5 мл внутримышечно. Дополнительно биологически активная добавка вводилась через интрагастральный зонд. В качестве объекта исследования были взяты образцы ткани размером $0,5 \times 2$ см из различных отделов тонкой кишки, и были изготовлены гистологические препараты. Ткани окрашивались гематоксилином-эозином и по Ван-Гизону, в то время как окраска альциановым синим использовалась для выявления кислых мукополисахаридов. Иммуногистохимические результаты оценивались морфометрически с использованием программного обеспечения QuPath 4.4.0. В пяти полях зрения на препарат (при увеличении 200-400 $\times$) положительные клетки рассчитывались как процент от общего числа клеток. Уровень экспрессии оценивался как: низкий до 20%, умеренный 20-60%, высокий свыше 60%. Биохимические параметры крови: аспаратаминотрансфераза (АСТ), аланинаминотрансфераза (АЛТ), лактатдегидрогеназа (ЛДГ), мочевины, билирубин измерялись с использованием автоматического биохимического анализатора MINDRAY BC-30 (Китай). Полученные в ходе исследования морфологические данные математически обрабатывались с использованием общей матрицы пакета данных Microsoft Office в программе «Excel 7.0» на персональном компьютере Pentium-IV, с использованием возможностей программы «STTGRAF 5.1» для определения стандартного отклонения и репрезентативных ошибок.

Диаметр энтероцитов в контрольной группе составлял $13,53 \pm 0,35$ (13,18-13,88) мкм, в то время как в острый период повреждения он увеличился до $15,41 \pm 0,27$ (15,14-15,68) мкм. Ядра располагались в центре клеток, при этом диаметр ядер в контрольной группе составлял $7,37 \pm 0,29$ (7,08-7,66) мкм, а в острый период повреждения $10,01 \pm 0,18$ (9,83-10,19) мкм. Ядерно/цитоплазматическое соотношение в энтероцитах беспородных мышей в контрольной группе составляло $0,544 \pm 0,026$ (0,518-0,570), в то время как в острый период повреждения, вследствие наблюдаемого увеличения ядер энтероцитов, ядерно/цитоплазматическое соотношение составляло $0,649 \pm 0,016$ (0,633-0,665). При измерении массы тонкой кишки беспородных мышей в контрольной группе было установлено, что она составляет до 9,7-11 (10,3) г (в мышцах массой 180 г), что составляет 4-6% от массы тела животного. В экспериментальной группе беспородных мышей показатель относительно общей массы тонкой кишки (масса тонкой кишки/общая масса тела) увеличился на 15,3% на 48 часе эксперимента (в среднем 11,8 г). Толщина стенки центральной лактеали составляла $18,15 \pm 3,55$ мкм в контрольной группе, увеличиваясь до $19,95 \pm 3,45$ мкм в острый период повреждения. Количество митотических энтероцитов составляло 5 в контрольной группе на площади 1855463 пикс², увеличиваясь до 12 у поврежденных мышей. Диаметр энтероцитов составлял $13,53 \pm 0,35$ мкм в контрольной группе, увеличиваясь до

15,41±0,27 мкм в острый период повреждения. Диаметр ядер составлял 7,37±0,29 мкм в контроле, увеличиваясь до 10,01±0,18 мкм в экспериментальной группе. Ядерно/цитоплазматическое соотношение составляло 0,544±0,026 в контроле, увеличиваясь до 0,649±0,016 у поврежденных мышей. Количество бокаловидных клеток составляло 34 в контрольной группе на площади 1935443 пикс², увеличиваясь до 83 в экспериментальной группе. Количество внутриэпителиальных лимфоцитов составляло 45 в контроле на площади 1857663 пикс², 91 у поврежденных мышей, при этом доля эозинофилов увеличивалась до 22,2%. Диаметр капилляров ворсинок составлял 7,41±0,39 мкм в контроле, увеличиваясь до 8,53±0,41 мкм в экспериментальной группе. Масса тонкой кишки у мышей массой 180 г составляла 10,3 г в контроле (4-6% от общей массы), в экспериментальной группе 11,8 г на 48 часе (увеличение на 15,3%), 9,4 г на 14 сутки (снижение на 8,9%). Эти результаты указывают на то, что в ткани тонкой кишки после травматического повреждения спинного мозга происходят морфологические и морфометрические изменения с активацией воспалительных и компенсаторных процессов. В ранний период после травматического повреждения спинного мозга в тонкой кишке мышей наблюдался ряд патологических изменений. Основными особенностями данного этапа были усиление фагоцитарного ответа, затяжное течение воспаления и развитие фибротических процессов.

Заключение. Морфометрические параметры тонкой кишки у трехмесячных беспородных мышей в контрольной группе были определены следующим образом: диаметр центральной лактеали 18,15±3,55 мкм; диаметр капилляров ворсинок 7,41±0,39 мкм; диаметр энтероцитов 13,53±0,35 мкм.

В острый период у группы с травматическим повреждением по сравнению с контрольной группой диаметр центральной лактеали увеличился на 9,9% (19,95±3,45 мкм), диаметр капилляров ворсинок увеличился на 15,1% (8,53±0,41 мкм), в то время как диаметр энтероцитов остался практически неизменным (7,91±0,36 мкм). В ранний период эти изменения стали еще более выраженными, при этом диаметр центральной лактеали увеличился на 23,5% (22,40±2,61 мкм), диаметр капилляров ворсинок на 15,1% (8,53±0,41 мкм), а диаметр энтероцитов увеличился на 3,5% по сравнению с показателями контрольной группы (14,01±0,29 мкм).

В группе с травматическим повреждением экспрессия маркера Bcl-2 увеличилась в 1-1,3 раза по сравнению с контрольной группой (острый период: экспрессия 34,5-41,78% в 74% препаратов; ранний период: 19,23-22,41% в 63% препаратов), в то время как в группе с лекарственным лечением экспрессия маркера Bcl-2 снизилась в 1,14 раза. В ткани тонкой кишки группы с травматическим повреждением уровни экспрессии маркера Ki-67 снизились в 1,2-1,8 раза по сравнению с группой беспородных мышей в контрольной группе (острый период: 31,4-37,23% в 70% препаратов; ранний период: 15,8-19,21% в 67% препаратов). В группе после введения лекарственных препаратов экспрессия маркера Ki-67 увеличилась в 1,7 раза.

Список литературы:

1. Fernandez-Canadas, C., et al. (2025). Transient activation of intestinal stellate cells in spinal cord injury: Morphological and phenotypic transformation in SMA+ myofibroblast-like cells. *Journal of Neurotrauma*, 42(3), 245-258. <https://doi.org/10.1089/neu.2024.0456>
2. Likhтерman, L. B., Gekht, A. B., & Potapov, A. A. (2019). Autonomic dysregulation and intestinal microcirculatory changes in severe traumatic brain and spinal cord injury. *Zhurnal Voprosy Neirokhirurgii Imeni N. N. Burdenko*, 83(4), 45-52. <https://doi.org/10.17116/neiro20198304145>
3. Hajdуч, E., et al. (2021). Delayed elevation of intestinal fatty acid-binding protein (I-FABP) as a marker of mucosal damage in acute spinal cord injury. *Spinal Cord*, 59(8), 876-883. <https://doi.org/10.1038/s41393-021-00678-2>
4. Sukach, M. S. (2012). Functional-metabolic parameters of the gastrointestinal tract in experimental pathology. *Morfologiya*, 141(3), 78-84.
5. Zverinskiy, I. V. (2013). Biochemical markers of intestinal damage in various diseases. *Biomedical Chemistry*, 59(2), 156-163. <https://doi.org/10.18097/pbmc20135902156>
6. Gasparyan, G. G. (2015). Morphofunctional changes in the small intestine in metabolic disorders. *Experimental and Clinical Gastroenterology*, 112(4), 34-41.
7. Repina, E. F., et al. (2023). Immunohistochemical characteristics of intestinal mucosa in toxic and infectious lesions. *Archives of Pathology*, 85(2), 28-35. <https://doi.org/10.17116/patol2023850228>
8. World Health Organization. (2013). Spinal cord injury: Fact sheet. Geneva: WHO. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/spinal-cord-injury>
9. Lee, B. B., Cripps, R. A., Fitzharris, M., & Wing, P. C. (2014). The global map for traumatic spinal cord injury epidemiology: Update 2011, global incidence rate. *Spinal Cord*, 52(2), 110-116. <https://doi.org/10.1038/sc.2012.158>

10. Goyal, R. K., & Hirano, I. (1996). The enteric nervous system. *New England Journal of Medicine*, 334(17), 1106-1115. <https://doi.org/10.1056/NEJM199604253341707>
11. Sarna, S. K. (1997). Gastrointestinal motility problems in patients with spinal cord injury. *Journal of Clinical Gastroenterology*, 25(4), 641-649. <https://doi.org/10.1097/00004836-199712000-00013>
12. Coggrave, M., Norton, C., & Cody, J. D. (2014). Management of faecal incontinence and constipation in adults with central neurological diseases. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, (1), CD002115. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD002115.pub5>
13. Gondim, F. A., Lopes, E. P., Jr., da Graça, J. R., et al. (1998). Gastrointestinal and colonic segmental transit time evaluation in spinal cord-injured patients. *American Journal of Gastroenterology*, 93(9), 1566-1572. <https://doi.org/10.1111/j.1572-0241.1998.00455.x>
14. De Giorgio, R., Guerrini, S., Barbara, G., et al. (2004). Inflammatory neuropathies of the enteric nervous system. *Gastroenterology*, 126(7), 1872-1883. <https://doi.org/10.1053/j.gastro.2004.03.051>
15. Krogh, K., Christensen, P., & Laurberg, S. (2001). Colorectal symptoms in patients with neurological diseases. *Acta Neurologica Scandinavica*, 103(6), 335-343. <https://doi.org/10.1034/j.1600-0404.2001.103006335.x>
16. Furlan, J. C., & Fehlings, M. G. (2008). Cardiovascular complications after acute spinal cord injury: Pathophysiology, diagnosis, and management. *Neurosurgical Focus*, 25(5), E13. <https://doi.org/10.3171/FOC.2008.25.11.E13>

Для цитирования: Сидикова Г.Ш. Сравнительная характеристика морфометрических параметров тонкой кишки при травматических повреждениях спинного мозга различной степени тяжести // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 4(24). – С. 290–295. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19532766>

ANALYSIS OF BODY MASS INDEX INDICATORS AND DIETARY HABITS AMONG FEMALE STUDENTS OF MEDICAL COLLEGE

Sa'dullayeva M.N., Baratova M.S.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. This article analyzes the body mass index (BMI) indicators and dietary habits of female students at a medical college. The study involved 164 female students. According to the research results, overweight was identified in 27% of the respondents. The article analyzes the problems identified among students and outlines practical recommendations for their mitigation.

Keywords: students, body mass index (BMI), healthy lifestyle, alimentary factors, obesity prevention, mid-level medical personnel.

ТИББИЁТ КОЛЛЕЖИ ТАЛАБАЛАРИ ОРАСИДА ТАНА МАССАСИ ИНДЕКСИ ВА ОВҚАТЛАНИШ ОДАТЛАРИНИНГ ТАҲЛИЛИ

Саъдуллаева М.Н., Баратова М.С.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Ушбу мақолада тиббиёт коллежи талабаларининг тана массаси индекси (ТМИ) ва овқатланиш одатлари таҳлил қилинади. Тадқиқотда 164 нафар талаба иштирок этди. Натижалар шуни кўрсатдики, респондентларнинг 27 фоизи ортиқча вазнга эга. Мақолада талабалар ўртасида аниқланган муаммолар таҳлил қилинади ва уларни бартараф этиш бўйича амалий тавсиялар берилади.

Калим сўзлар: талаба қизлар, тана массаси индекси (ТМИ), соғлом турмуш тарзи, овқатланиш омиллари, семир-шининг олдини олиш, ўрта даражадаги тиббиёт ходимлари.

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИНДЕКСА МАССЫ ТЕЛА И ПИЩЕВЫХ ПРИВЫЧЕК СРЕДИ СТУДЕНТОК МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА

Саъдуллаева М.Н., Баратова М.С.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. В данной статье анализируются показатели индекса массы тела (ИМТ) и пищевые привычки студенток медицинского колледжа. В исследовании приняли участие 164 студентки. По результатам исследования, избыточный вес был выявлен у 27% респонденток. В статье анализируются выявленные среди студенток проблемы и излагаются практические рекомендации по их смягчению.

Ключевые слова: студентки, индекс массы тела (ИМТ), здоровый образ жизни, пищевые факторы, профилактика ожирения, медицинский персонал среднего звена.

e-mail: marjonasadullayeva61@gmail.com

Introduction. A fundamental priority within contemporary clinical science involves the strategic maintenance and improvement of the physiological well-being of youth, with a specific focus on those entering the medical workforce [1]. Global health statistics provided by the WHO indicate that over half of an individual's well-being is determined by their daily habits, with balanced dietary intake and consistent physical exertion being the primary factors[2]. Disorganized caloric consumption and a lack of dietary monitoring serve as primary catalysts in the progression of nutritional-related weight gain[7].

The student years can negatively impact dietary regimens due to high intellectual workloads, constant stress, and time constraints. These conditions often lead to deviations from normal body weight—either alimentary obesity or weight deficiency. As medical college students are future mid-level healthcare providers who will promote a healthy lifestyle, their own nutritional culture is of particular importance. Consequently, controlling alimentary obesity is the most effective way to reduce global mortality rates [4].

Material and methods of research. To identify issues related to a healthy lifestyle among female students of the medical college, a specialized social survey (questionnaire) was conducted between 2025 and 2026, involving 164 respondents. The survey questions focused on studying the students' daily dietary patterns, physical activity, and subjective body weight indicators. To determine the presence of overweight or

obesity, the Body Mass Index (BMI) was calculated. The methodology involved dividing the weight of each female student by her height squared (kg/m^2), following the standard WHO diagnostic criteria.

Results and discussion. According to the results, more than half of the respondents (52%) have a normal body weight. However, despite their medical education, every third female student (31%) was found to have a body weight above the norm (combined obesity and overweight). Additionally, weight deficiency (underweight) was observed in 17% of the students (Table 1).




Fig. 1. Body Mass Index

The study revealed concerning trends regarding the dietary habits of medical students across different weight categories. Surprisingly, more than half (52%) of students with a normal body mass index (BMI) reported skipping breakfast. This indicates that a majority of students in the "Normal Weight" category are neglecting the most fundamental rule of healthy nutrition. Such habits can lead to a slowed metabolism and significantly increase the risk of weight gain in the long term.

Our data demonstrated a statistically significant link, suggesting that frequent fast-food intake is closely associated with an increase in body mass indices among the participants. Fast-food consumption was most prevalent in the "Overweight + Obesity" group, with 38% of these students consuming it frequently. This figure is notably higher than those in the "Normal Weight" (36%) and "Underweight" (26%) groups. Interestingly, the high prevalence of fast-food consumption among normal-weight students (36%) suggests that this group is also at high risk for future metabolic complications.

On the other hand, the consumption of fruit was highest among the "Normal Weight" group (49%). This suggests that regular fruit intake plays a protective role and helps in maintaining a healthy body weight (Table 2).




Fig. 2.

These findings align with the research by Sutherland (2025), which emphasizes that medical staff and educators in academic institutions are not paying sufficient attention to obesity and eating behaviors. This lack of intervention increases the risk of more severe health complications in the future [8].

Scientific evidence suggests a progressive decline in physical exertion as individuals grow older, a trend further exacerbated by the pervasive integration of digital technologies into daily routines[9]. One of

the most contradictory and noteworthy findings in the data concerns physical exercise. Surprisingly, 57% of individuals in the "Overweight and Obesity" group reported engaging in physical exercise, which is more than double the rate of the "Normal Weight" group (27%).

While hypodynamia (57%) and water deficiency (43%) remain the primary issues for the overweight group, students with a normal weight exhibit a high prevalence of "digital distraction" (48%)—the habit of using a phone while eating. This habit creates a foundation for unconscious overeating and metabolic disturbances in the future.




Fig. 3.

These findings resonate with a study conducted in Romania, which identified the lack of physical activity, prolonged screen time, and short sleep duration as the primary factors contributing to obesity among students [6].

The most unexpected results of the study were revealed in the analysis of sleep patterns and stress levels. The data shows that high stress levels remain nearly identical and significantly elevated in both the "Normal Weight" (44%) and "Overweight" (41%) groups (Table 4). The stressors inherent in contemporary living and mental tension exert a significant impact on health, manifesting across all population groups irrespective of their specific metabolic profiles.




Fig. 4.

The most alarming indicator was recorded among respondents with normal body weight: 56% of them go to sleep after midnight. This figure is considerably higher than that of the overweight group (33%). This trend suggests that individuals with a normal BMI may over-rely on their body's "reserve capacities," leading them to neglect biological rhythms more frequently than their peers.

It is scientifically established that sleeping less than 6 hours per day is one of the strongest factors contributing to weight gain (AOR = 5.68), as it disrupts the hormonal balance governing appetite and energy expenditure [3].

Conclusion. The results of the survey conducted among female students of the Bukhara Medical College lead to the following conclusions:

Lifestyle Paradox: Despite their roles as future healthcare professionals, a significant portion of students (57%) do not engage in any physical exercise, and 56% regularly disrupt their circadian rhythms (sleep-wake cycles).

Digital Distraction: The habit of using smartphones during meals (48%) was identified as a primary risk factor for future weight gain, even among students currently maintaining a normal BMI. This behavior leads to "mindless eating" and a delayed feeling of satiety.

Multifactorial Nature of Obesity: Cases of overweight and obesity among students are not merely the result of a poor diet; they are the complex consequence of chronic stress, sleep deprivation, and hypodynamia (physical inactivity).

In conclusion, it is essential to foster healthy lifestyle habits among future mid-level medical personnel—not just as theoretical knowledge, but as fundamental practical skills. This transformation is vital not only for preserving their personal health but also for ensuring they serve as credible, exemplary role models for the public in their future professional clinical practice.

Practical Recommendations. Based on the research findings, the following recommendations are proposed to improve the health and well-being of the students: - **Digital Health Monitoring:** Implement a mobile application or digital platform where students can input their height and weight to automatically calculate their BMI. This is the fastest, most effective, and most convenient method for identifying high-risk groups; - **Nutritional Oversight:** School nurses should actively supervise and implement a healthy nutrition menu within college cafeterias to ensure balanced meal options; - **Physical Activity Promotion:** Organize "10,000 Steps Toward a Healthy Life" campaigns, incorporate "wellness breaks" between classes, and establish extracurricular sports clubs; - **Sleep Hygiene Education:** Conduct awareness sessions emphasizing the importance of maintaining 7–9 hours of sleep per night and the physiological benefits of going to bed before 23:00; - **Stress Management:** Develop students' skills to manage stress through breathing exercises and physical activity rather than emotional eating; - **Digital Hygiene:** Promote a culture of "digital hygiene," specifically encouraging students to avoid smartphone use during meals to prevent mindless overeating; - **Nurse-Led Training:** Medical nurses should conduct specialized training on Healthy Lifestyle (HLS) principles [5]. Research in the USA has shown that school nurses are significantly more effective and active in screening student health compared to other specialists [8].

References:

1. Decree of the President of the Republic of Uzbekistan. (2020). On measures for the wide implementation of a healthy lifestyle and the further development of mass sports. Decree No. PF-6099, dated October 30, 2020.
2. World Health Organization (WHO). (2024). Obesity and overweight: Fact sheet. [Online]. Available at: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight>
3. Abeje, E. D., et al. (2024). Dietary Habits and Determinants of Overnutrition Among Secondary and Preparatory School Adolescents: A Multi-Center Unmatched Case-Control Study. *American Journal of Lifestyle Medicine*.
4. GBD 2023 Cardiovascular Diseases and Risks Collaborators. (2025). Global, Regional, and National Burden of Cardiovascular Diseases and Risk Factors in 204 Countries and Territories, 1990–2023. *Journal of the American College of Cardiology*. DOI: 10.1016/j.jacc.2024.10.001.
5. Ling, J., et al. (2021). Relationships among perceived stress, emotional eating, and dietary intake in college students: Eating self-regulation as a mediator. *Appetite*, 163.
6. Negrea, M. O., et al. (2024). Assessing Lifestyle Patterns and Their Influence on Weight Status in Students from a High School in Sibiu, Romania: An Adaptation of ISCOLE Questionnaires and the Child Feeding Questionnaire. *Nutrients*, 16.
7. Lin, K. C., et al. (2021). Severity of Binge Eating Behavior among Overweight College Students in Taiwan and Associated Factors. *Pub-Med/Healthcare*.
8. Sutherland, M. A., et al. (2025). Health screenings in college health centers: Variations in practice. *Journal of American College Health*. Vol. 73, Issue 8. DOI: 10.1080/07448481.2025.2100000.
9. Thomas, U. M., et al. (2021). Prevalence of overweight and obesity among school children in Mysuru, Karnataka. *Journal of Family Medicine and Primary Care*, 10(8).

For citation: Sa'dullayeva M.N., Baratova M.S. Analysis of body mass indeks indicators and dietary habits among female students of medical college // *Bulletin of Fundamental and Clinic Medicine*. – 2026. – № 4(24). – P. 296–299. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19532858>

**МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРИ ЯЗВЕННО-НЕКРОТИЧЕСКОМ
ЭНТЕРОКОЛИТЕ****Каримов К.Р., Шодиева М.С.**

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Морфологическая картина язвенно-некротического энтероколита (ЯНЭК) отличается выраженным полиморфизмом и зависит от стадии процесса, глубины поражения кишечной стенки, а также от длительности заболевания. Морфологическое исследование является ключевым инструментом в диагностике ЯНЭК, позволяя дифференцировать его от других патологий кишечника у новорождённых.

Ключевые слова: язвенно-некротический энтероколит, новорождённые, морфология кишечника, некроз слизистой, воспалительная инфильтрация, иммуногистохимия, апоптоз, микроциркуляция, патогенез, перфорация кишечника.

MORPHOLOGICAL CHANGES IN NECROTIZING ENTEROCOLITIS**Karimov K.R., Shodiyeva M.S.**

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. The morphological picture of necrotizing enterocolitis (NEC) is characterized by pronounced polymorphism and depends on the stage of the process, the depth of intestinal wall involvement, and the duration of the disease. Morphological examination is a key tool in the diagnosis of NEC, allowing differentiation from other intestinal pathologies in newborns.

Keywords: necrotizing enterocolitis, newborns, intestinal morphology, mucosal necrosis, inflammatory infiltration, immunohistochemistry, apoptosis, microcirculation, pathogenesis, intestinal perforation.

ЯРАЛИ-НЕКРОТИК ЭНТЕРОКОЛИТДАГИ МОРФОЛОГИК ЎЗГАРИШЛАР**Каримов Қ.Р., Шодиева М.С.**

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Ярали -некротик энтероколит (ЯНЭК)нинг морфологик кўриниши кескин полиморфизм бўлади: жараён босқичи, ичак девори шикастланиш чуқурлиги ҳамда касалликнинг давомийлигига боғлиқ. Морфологик текширув ЯНЭКни таххис қилишда асосий восита ҳисобланади, чунки у янги тузилган чақалоқлардаги бошқа ичак патологияларидан фарқлаш имконини беради.

Калим сўзлар: ярали-некротик энтероколит, янги тузилган чақалоқлар, ичак морфологияси, шиллиқ қават некрози, яллигланиш инфильтрацияси, иммуногистохимия, апоптоз, микроциркуляция, патогенез, ичак перфорацияси.

e-mail: shodiyeva.musharraf@bsmi.uz

Актуальность. Язвенно-некротический энтероколит (ЯНЭК) является одной из наиболее серьёзных и жизнеугрожающих патологий желудочно-кишечного тракта у новорождённых, особенно у недоношенных детей и детей с экстремально низкой массой тела при рождении. По данным мировой статистики, заболеваемость ЯНЭК колеблется от 1 до 5 случаев на 1000 живорождённых, а среди глубоко недоношенных достигает 10–15%. Летальность при тяжёлых формах заболевания остаётся крайне высокой и может составлять 30–50%, что определяет значимость проблемы для современной неонатологии, педиатрии и детской хирургии. Несмотря на развитие интенсивной терапии и совершенствование методов хирургического вмешательства, прогноз при ЯНЭК остаётся неблагоприятным. Высокая частота осложнений (перфорация кишечника, перитонит, стриктуры кишечника) приводит к длительной госпитализации, инвалидизации и повышенной смертности новорождённых.

Особую актуальность имеет изучение морфологических изменений при ЯНЭК, так как именно они позволяют выявить патогенетические механизмы заболевания. Морфологический анализ обеспечивает понимание последовательности ишемических, некротических и воспалительных процессов в кишечной стенке, помогает определить глубину поражения и установить дифференциально-диагностические критерии. Применение современных методов исследования, таких как иммуногистохимия и электронная микроскопия, открывает новые возможности для выявления ранних молеку-

лярных и клеточных маркёров повреждения, что особенно важно для своевременной диагностики и разработки эффективных лечебных стратегий.

Таким образом, язвенно-некротический энтероколит остаётся одной из актуальнейших проблем неонатологии и патологической анатомии. Изучение морфологических изменений при данном заболевании имеет важное научное и практическое значение, так как способствует углублённому пониманию патогенеза, совершенствованию диагностики и повышению эффективности лечебных мероприятий.

Материалы и методы. Исследование проведено на базе БухГМИ в период с 2023-2025. В исследование было включено 65 случаев язвенно-некротического энтероколита (ЯНЭК) у новорождённых, подтверждённых клинически и морфологически. В качестве контрольного материала использовались образцы кишечника новорождённых без признаков воспалительно-некротических изменений.

Морфологические методы. Материал фиксировался в 10% нейтральном формалине, проводился через спирты возрастающей концентрации и заливался в парафин. Серийные срезы толщиной 4–5 мкм окрашивались гематоксилин-эозином, по Ван-Гизону, а также выполнялись специальные окраски (ШИК-реакция, окраска по Маллори) для более детального изучения состояния соединительной ткани и сосудов.

Таблица.1.

Морфологические стадии язвенно-некротического энтероколита

Стадия	Морфологические признаки	Микроскопические находки
I стадия (Bell I)	Отёк, гиперемия слизистой оболочки кишечника	Дистрофия эпителия, нарушение микроциркуляции
II стадия (Bell II)	Воспаление, очаги некроза, появление газа в стенке	Некротические очаги, лейкоцитарная инфильтрация, микротромбоз
III стадия (Bell III)	Тотальный некроз кишечной стенки, перфорация, перитонит	Полный некроз всех слоёв стенки, выраженный фибринозный перитонит

Материалы морфометрического исследования. Морфометрический анализ проводился на гистологических препаратах тонкой и толстой кишки при язвенно-некротическом энтероколите. Исследование включало две группы:

- **Контрольная группа (n=10)** – интактные животные
- **Экспериментальная группа (n=15)** – моделированный язвенно-некротический энтероколит

Окраска препаратов выполнялась гематоксилином и эозином. Морфометрия проводилась с использованием цифровой микроскопической системы и программного анализа изображений.

Морфометрический анализ. Изучались: - толщина слизистой и мышечного слоя кишечника; - глубина некротических изменений; - плотность сосудистого русла (количество капилляров на единицу площади); - количество апоптотических клеток в криптах и ворсинках.

Результаты исследования:




Рисунок.1. Язвенно-некротические изменения стенки кишечника при язвенно-некротическом энтероколите (макропрепарат).

При макроскопическом исследовании кишечная стенка утолщена, отёчна, гиперемирована. Определяются участки тёмно-багрового или серовато-зелёного цвета, свидетельствующие о некрозе. В ряде случаев выявляются перфорации и фибриновые наложения на серозной оболочке.

На ранних стадиях выявляются:

- дистрофия и десквамация эпителия;
- вакуолизация цитоплазмы энтероцитов;
- отёк собственной пластинки слизистой.

В дальнейшем формируются:

- коагуляционный и колликвационный некроз;
- разрушение крипт;
- язвенные дефекты;
- выраженная нейтрофильная инфильтрация.

Изменения подслизистой основы Отмечаются:

- полнокровие сосудов;
- стаз;
- микротромбозы;
- геморрагические пропитывания;
- очаги некроза.

Микроциркуляторные расстройства играют ведущую роль в прогрессировании патологического процесса.

Поражение мышечной оболочки. При тяжёлом течении наблюдается трансмуральный некроз с распространением на мышечный слой. Гладкомышечные волокна подвергаются деструкции, что создаёт предпосылки для перфорации.

Иммунорфологические изменения. Иммуногистохимически выявляется:

- повышение экспрессии TNF- α и IL-6;
- активация каспаз;
- увеличение экспрессии Bax;
- снижение Bcl-2;
- повышение экспрессии ICAM-1.

Эти изменения свидетельствуют о выраженной воспалительной реакции и активации апоптоза.

Таблица.2.

Результаты морфометрического анализа

Показатель	Контроль	ЯНЭК	p
Толщина слизистой (мкм)	412,3 $\pm$ 18,4	285,7 $\pm$ 22,1	<0,001
Подслизистая (мкм)	96,5 $\pm$ 10,2	182,4 $\pm$ 16,8	<0,001
Глубина некроза (мкм)	0	210,3 $\pm$ 25,6	<0,001
Площадь язв (%)	0	34,8 $\pm$ 4,2	<0,001
Инфильтрация (кл/мм ²)	120 $\pm$ 15	685 $\pm$ 52	<0,001
Диаметр сосудов (мкм)	18,2 $\pm$ 2,1	31,6 $\pm$ 3,4	<0,01
Индекс апоптоза (%)	2,1 $\pm$ 0,4	18,7 $\pm$ 2,3	<0,001

Полученные результаты свидетельствуют о:

- достоверном истончении слизистой оболочки;
- выраженном отёке подслизистой основы;
- значительном увеличении воспалительной инфильтрации;
- активации апоптотических механизмов;
- выраженных микроциркуляторных нарушениях.

Морфометрический анализ количественно подтверждает тяжесть деструктивных изменений кишечной стенки при язвенно-некротическом энтероколите.

Обсуждение. Морфологические изменения при язвенно-некротическом энтероколите носят стадийный характер. Первичным звеном является ишемическое повреждение, приводящее к нарушению барьерной функции слизистой оболочки. В последующем бактериальная инвазия усиливает воспалительную реакцию, формируя очаги некроза и язвообразования. Тромбоз микроциркуляторного русла усугубляет ишемию, создавая порочный круг патологических изменений.

В контрольной группе структура кишечной стенки сохраняла нормальное строение: слизистая оболочка имела чётко выраженные ворсинки и крипты, мышечные слои были упорядоченными, признаки воспаления отсутствовали.

При язвенно-некротическом энтероколите (ЯНЭК) отмечались выраженные патологические изменения. В слизистой оболочке выявлялась деструкция эпителия, укорочение и деформация ворсинок, а также очаговый некроз. В подслизистом слое наблюдался выраженный отёк, полнокровие сосудов и инфильтрация лимфоцитами и нейтрофилами. В ряде случаев некротический процесс распространялся до мышечного слоя, что сопровождалось нарушением архитектоники кишечной стенки.

Заключение. Язвенно-некротический энтероколит характеризуется комплексом морфологических изменений, включающих деструкцию слизистой оболочки, некроз различных слоёв кишечной стенки, выраженные микроциркуляторные нарушения и активацию апоптоза. Понимание морфологических особенностей заболевания имеет важное значение для разработки эффективных методов диагностики и лечения.

Список литературы:

1. Белл М. Дж. Диагностика и классификация некротизирующего энтероколита у новорождённых // Педиатрия. – 1978. – №62. – С. 123–129.
2. Ходжик З., Мельников С.А., Климова Н.А. Морфологические изменения кишечника при язвенно-некротическом энтероколите у новорождённых // Журнал морфологии. – 2017. – Т. 158, №2. – С. 45–51.
3. Сухоруков В.С., Карпова Е.И. Некротизирующий энтероколит у недоношенных детей: клиничко-морфологические аспекты // Неонатология. – 2015. – №3. – С. 14–20.
4. Воронцова Т.И., Гольдберг Е.Д. Морфология и патогенез некротизирующего энтероколита // Патологическая физиология и экспериментальная терапия. – 2002. – №4. – С. 56–61.
5. Neu J., Walker W.A. Necrotizing enterocolitis. N Engl J Med. – 2011; 364(3): 255–264.
6. Hodzic Z., Bolock A.M., Good M. The role of mucosal immunity in the pathogenesis of necrotizing enterocolitis. Front Pediatr. – 2017; 5:40.
7. Emami C.N., Petrosyan M., Giuliani S. et al. Morphological and immunohistochemical features of necrotizing enterocolitis. J Pediatr Surg. – 2019; 54(6): 1152–1158.
8. Lin P.W., Stoll B.J. Necrotizing enterocolitis. Lancet. – 2006; 368(9543): 1271–1283.
9. Niño D.F., Sodhi C.P., Hackam D.J. Necrotizing enterocolitis: new insights into pathogenesis and mechanisms. Nat Rev Gastroenterol Hepatol. – 2016; 13(10): 590–600.

Для цитирования: Каримов К.Р., Шодиева М.С. Морфологические изменения при язвенно-некротическом энтероколите // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 4(24). – С. 300–303. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19533017>

СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА ВНЕЗАПНОЙ ДЕТСКОЙ СМЕРТНОСТИ**Кадиоров С.К., Кадиоров К.У.**

Ташкентский государственный медицинский университет, г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. Внезапная смерть у детей является важной диагностической проблемой в судебно-медицинской практике. В данной статье рассматриваются современные судебно-медицинские подходы к оценке внезапной смерти в педиатрической популяции. Представлены система классификации и диагностический алгоритм, основанные на результатах аутопсии, гистологических исследований и лабораторных анализов. Особое внимание уделяется значимости мультидисциплинарного подхода в исключении насильственных причин смерти и понимании основных патофизиологических механизмов. Отдельно обсуждаются диагностические сложности, возникающие при исследовании случаев смерти младенцев и новорожденных.

Ключевые слова: внезапная смерть, дети, судебно-медицинская патология, аутопсия, СВДС, судебно-медицинская оценка.

FORENSIC ASPECTS OF SUDDEN INFANT DEATH ANALYSIS**Kadirov S.K., Kadirov K.U.**

Tashkent State Medical University, Tashkent, Uzbekistan

Resume. Sudden death in children presents a significant diagnostic challenge in forensic medicine. This article reviews modern forensic approaches to evaluating sudden death in pediatric populations. We present a classification scheme and a diagnostic algorithm based on autopsy findings, histological examinations, and laboratory analyses. The importance of a multidisciplinary strategy is emphasized, especially in excluding violent causes and understanding underlying pathophysiological mechanisms. Diagnostic complexities, particularly in infants and neonates, are discussed.

Keywords: sudden death, children, forensic pathology, autopsy, SIDS, medico-legal evaluation.

ТЎСАТДАН ЧАҚАЛОҚЛАР ЎЛИМИ ТАҲЛИЛИНИНГ СУД-ТИББИЙ ЖИҲАТЛАРИ**Қодиров С.К., Қодиров К.У.**

Тошкент давлат тиббиёт университети, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. Болаларда тўсатдан ўлим суд-тиббий амалиётда муҳим диагностик муаммо ҳисобланади. Ушбу мақолада педиатрик аҳолида тўсатдан ўлимни баҳолаш бўйича замонавий суд-тиббий ёндашувлар кўриб чиқилган. Аутопсия натижалари, гистологик текширувлар ва лаборатор таҳлилларга асосланган таснифлаш тизими ҳамда диагностик алгоритм тақдим этилган. Айниқса зўравонлик сабабларини истисно қилиш ва асосий патофизиологик механизмларни тушунишда кўп тармоқли ёндашувнинг аҳамияти таъкидланган. Чақалоқлар ва янги туғилганларда учрайдиган диагностик мураккабликлар алоҳида муҳокама қилинган.

Калим сўзлар: тўсатдан ўлим, болалар, суд-тиббий патология, аутопсия, SIDS, суд-тиббий баҳолаш.

e-mail: Yeaph91@gmail.com, kuralbaykadirov1501@gmail.com

Актуальность. Внезапная детская смертность остаётся одной из наиболее сложных и до конца не изученных проблем современной медицины и судебно-медицинской практики. Синдром внезапной детской смерти и другие формы необъяснимой гибели детей характеризуются отсутствием очевидных причин даже после проведения полного патологоанатомического исследования [1,2]. Несмотря на развитие диагностических технологий, в значительном числе случаев причина смерти остаётся неустановленной, что требует комплексного междисциплинарного подхода, включающего морфологические, биохимические и молекулярно-генетические методы исследования [3,4,5]. Актуальность темы обусловлена необходимостью точной дифференциации естественных и насильственных причин смерти, что имеет важное значение как для правоприменительной практики, так и для профилактики подобных случаев в будущем. Кроме того, недостаточная изученность патогенеза внезапной детской смерти и ограниченность эпидемиологических данных подчеркивают необходимость дальнейших

научных исследований в данной области. Несмотря на достижения в области клинической диагностики, интенсивной терапии и профилактической педиатрии, случаи неожиданной и необъяснимой смерти младенцев и детей продолжают регистрироваться во всём мире. Во многих случаях такие смерти происходят без явных клинических признаков, что создаёт серьёзные диагностические, правовые и этические проблемы для судебно-медицинских экспертов и системы здравоохранения [6,7,9]. С судебно-медицинской точки зрения, оценка внезапной смерти у детей требует строго стандартизированного, основанного на доказательствах подхода. Этот подход включает макроскопические результаты аутопсии, гистопатологические исследования, токсикологические анализы, молекулярно-генетические исследования, а также глубокий анализ клинических данных и обстоятельств случая. Однако в современной экспертной практике сохраняются значительные различия в диагностических критериях, интерпретации морфологических изменений и установлении причины и рода смерти. Это особенно актуально для таких состояний, как внезапная необъяснимая смерть младенцев (SUDI), синдром внезапной детской смерти (SIDS), наследственные кардиомиопатии и каналопатии, скрытые инфекционные процессы, нарушения обмена веществ, а также лёгкие формы асфиксии [8,10]. В последние годы в международной судебно-медицинской практике особое внимание уделяется мультидисциплинарным и многоуровневым подходам. К ним относятся иммуногистохимические маркеры повреждения миокарда, молекулярная аутопсия, посмертные микробиологические исследования, а также стандартизированные протоколы обследования места наступления смерти. Однако внедрение таких подходов осуществляется неравномерно, особенно в регионах с ограниченным доступом к современным лабораторным технологиям. Это подчёркивает необходимость систематизации и критического анализа существующих судебно-медицинских критериев внезапной смерти у детей. В связи с этим комплексный анализ современных судебно-медицинских критериев оценки внезапной смерти у детей, с акцентом на практическую экспертную деятельность и существующие подходы, является крайне актуальным. Такой анализ способствует повышению диагностической точности, гармонизации судебно-медицинских методологий, совершенствованию экспертных заключений и разработке эффективных профилактических стратегий, направленных на снижение числа внезапных и необъяснимых случаев смерти среди детей.

Цель исследования Изучение судебно-медицинских аспектов внезапной детской смертности и совершенствование методов диагностики причин смерти. Изучение причин и морфологических изменений при внезапной смерти у детей на основе материалов судебно-медицинских экспертиз, проведённых в Республиканском научно-практическом центре судебно-медицинской экспертизы в 2021–2024 годах.

Задачи исследования. Проанализировать современные представления о причинах внезапной детской смертности. Изучить особенности судебно-медицинской диагностики в подобных случаях и оценить роль гистологических, токсикологических и генетических методов диагностики. Разработать рекомендации по повышению точности установления причины смерти.

Материалы и методы исследования. Данное исследование основано на ретроспективном анализе аутопсий детей, проведённых в региональных судебно-медицинских центрах. Были отобраны случаи, классифицированные как внезапная и необъяснимая смерть. Диагностические исследования проводились на основе полной аутопсии и гистологического анализа. Полученные тканевые образцы фиксировались в 10% нейтральном формалине, затем изготавливались срезы толщиной 5–7 мкм, окрашенные гематоксилином и эозином, после чего проводилось их изучение.

Полученные результаты и обсуждение. В исследовании внезапной смерти у детей было проанализировано в общей сложности 137 случаев. Морфологическое исследование выявило комплекс изменений, характерных для терминального состояния и поражения органов, отражающих гипоксию, шок и острую недостаточность кровообращения. Распределение патологических изменений показало преобладание генерализованного гипоксически-ишемического повреждения головного мозга, миокарда, лёгких и паренхиматозных органов. Отёк головного мозга был выявлен в 79,6% случаев и являлся основным морфологическим признаком острой гипоксии. Периваскулярные кровоизлияния наблюдались в 67,2% случаев, что указывает на сосудистую и микроциркуляторную недостаточность. Отёк нейронов, соответствующий острому ишемическому повреждению, зарегистрирован в 61,3% случаев. Эти данные отражают тяжёлую терминальную гипоксию головного мозга. Изменения в миокарде выявлялись в большинстве случаев. Дистрофия кардиомиоцитов отмечена в 73,7% случаев, что свидетельствует об остром метаболическом стрессе. Контрактурные повреждения, связанные с воздействием катехоламинов, наблюдались в 46,0% случаев. Очаговые микронекрозы выявлены в 29,9% случаев, что указывает на необратимое повреждение миокарда в ряде наблюдений. Эти изменения подтверждают важную роль острой сердечной дисфункции в танатогенезе. Патология лёгких была

наиболее частым проявлением терминальной недостаточности. Альвеолярный отёк выявлен в 84,7% случаев — самый высокий показатель среди всех исследованных органов. Альвеолярные кровоизлияния наблюдались в 56,9% случаев, что отражает острую дыхательную недостаточность и сосудистое повреждение. Эти признаки подтверждают, что тяжёлая респираторная недостаточность является центральным механизмом внезапной смерти. В печени в 64,2% случаев выявлена центрлобулярная дистрофия, отражающая гипоксическое повреждение и недостаточность кровообращения. В почках в 68,6% случаев наблюдалась дистрофия эпителия канальцев, характерная для острого шока. В селезёнке в 75,2% случаев отмечен венозный застой, развившийся на фоне общего нарушения кровообращения.

Таблица №1.

Возрастное распределение внезапной смерти у детей (n = 137)

№	Распределения групп	Возрастной интервал	Количество случаев	%
1.	Новорожденные	0–28 дней	39	28,5
2	Младенцы	1–12 месяц	46	33,6
3.	Дети	1–16 лет	52	37,9
4	Всего		137	100

Таблица №2.

Анализ причин внезапной смерти у детей (n = 137)

№	Причины смерти	Количество случаев	%
1.	Острая легочно-сердечная недостаточность	41	29,9
2.	Асфиктическое состояние	33	24,1
3.	Инфекционно-воспалительные процессы	28	20,4
4.	Врожденные аномалии	19	13,9
5.	Метаболические изменения	16	11,7
6.	Итого	137	100

Ядра в основном сохранены, в некоторых клетках наблюдается пикноз. Синусоидальные капилляры расширены, заполнены кровью; отмечается венозный застой и венозный конгестия. Строма умеренно отечная. Сосуды в мозговом веществе резко расширены и заполнены кровью. Также имеются диапететические кровоизлияния. Выявляются очаговые мелкие диапететические кровоизлияния. Признаки некротического распада и выраженной воспалительной инфильтрации не обнаружены. Сравнительное описание гистологических признаков синдрома внезапной детской смерти с научной точки зрения делится на два основных направления: неспецифические терминальные изменения, прижизненные процессы и специфические маркеры.

В таблице ниже представлено систематическое сравнительное описание этих признаков. То есть, системные неспецифические изменения наблюдаются почти во всех органах и указывают на то, что механизм смерти (танатогенез) связан с острой гипоксией.

Таблица №3.

Системные неспецифические изменения при синдроме внезапной детской смерти

Орган	Гистологические признаки
Легкие	Чередование очаговых ателектазов и эмфиземы. Интерстициальный отек, эозинофильное белковое вещество в альвеолах, диапететические кровоизлияния.
Почки	Гранулярная и вакуолярная дистрофия эпителия канальцев. Застой крови и капилляры в клубочках.
Печень	Расширение синусоидов, паренхиматозная дистрофия гепатоцитов (жировая и белковая).
Сердца	Повреждение кардиомиоцитов вследствие контрактуры, отек стромы и очаговый микро-некроз.

Среди специфических диагностических маркеров важными признаками, позволяющими отличить синдром внезапной детской смерти (СВДС) от других причин смерти, являются глиоз и незрелость нейронов в длинных ядрах головного мозга, то есть в области дыхательного центра. Это указывает на нарушение механизма контроля дыхания. Гиперплазия тимуса и реактивная гиперплазия лимфоидных фолликулов часто оцениваются как состояние «тимико-лимфатического статуса». Депигментация коркового слоя надпочечников и снижение уровня липидов наблюдаются как признак острой стрессовой реакции.

Таблица №4.

Анализ случаев синдрома внезапной детской смерти (СВДС) и других случаев

Признак	СВДС	Острая инфекция , (пневмония,сепсис)
Воспаления	Отсутствует или очень слабо выражена (перибронхиальная)	Выраженная лейкоцитарная инфильтрация, нагноение
Кровообращения	Общий венозный застой и венозный застой	Тромбозы, вторичная дистрофия
Распад ткани	Не наблюдается (отсутствие разрушения)	Присутствуют некротические очаги
Изменения тимуса	Обычно увеличены	Случайная инволюция (уменьшение) в результате инфекции

Сравнительный анализ показывает, что отсутствие признаков воспаления и травмы является основным отличительным критерием синдрома внезапной детской смерти. Морфологическая картина отражает острую дыхательную недостаточность и общий гипоксический шок организма. Анализ показал, что в большинстве случаев ($n = 114$) морфологическая картина ограничивалась неспецифическими терминальными признаками, что характерно для классического течения СВДС (синдрома внезапной детской смерти). Однако в 67 случаях, помимо неспецифических признаков, выявление специфических маркеров, таких как глиоз продолговатого мозга и гиперплазия тимуса, позволяет рассматривать эти смерти как результат декомпенсации механизмов центрального контроля дыхания и иммунного гомеостаза. Это подчеркивает необходимость детального изучения проводящей системы сердца и структур ствола головного мозга для объективизации судебно-медицинского заключения. Выявленные изменения во внутренних органах соответствуют комплексу неспецифических терминальных гипоксически-ишемических повреждений, отражающих острую дыхательную и циркуляторную недостаточность. Признаков воспаления, травмы или токсического поражения не обнаружено. Морфологическая картина соответствует внезапной смерти младенца и характерна для синдрома внезапной детской смерти.

Выводы. Результаты исследования показывают, что внезапная смерть у детей характеризуется типичным мультиорганным морфологическим синдромом гипоксически-ишемического генеза. В основе патологического процесса лежат системная гипоксия, острая недостаточность кровообращения и механизмы шока. Наиболее диагностически значимые изменения наблюдаются в легких, головном мозге и миокарде, которые играют решающую роль в танатогенезе. Дети раннего постнатального периода составляют особо группу высокого риска, что объясняется уровнем функциональной зрелости дыхательной и сердечно-сосудистой систем, нестабильностью адаптивных механизмов и повышенной чувствительностью к внешним факторам. Выявленные морфологические изменения проявляются не изолированно, а как мультиорганный комплекс, формирующий объективные судебно-медицинские критерии оценки внезапной смерти.

Список литературы:

1. Авдеев М.И. Судебно-медицинская диагностика внезапной смерти. Москва: Медицина; 2021.
2. Beckwith J.B. Sudden infant death syndrome: overview and current concepts. Forensic Science, Medicine and Pathology. 2018;14(1):5–12.
3. Byard R.W. Sudden death in the young. 3rd ed. Cambridge: Cambridge University Press; 2020.
4. Dettmeyer R.B. Forensic Histopathology. 3rd ed. Berlin: Springer; 2022.
5. Икрамов К.И. Морфологические критерии внезапной смерти в судебно-медицинской практике. Ташкент: Медицина; 2022.
6. Клевено В.А. Судебная медицина: руководство для врачей. Москва: ГЭОТАР-Медиа; 2020.
7. Лисицин А.А. Судебно-медицинская экспертиза внезапной смерти. Санкт-Петербург: СпецЛит; 2018.
8. Madea B. Handbook of Forensic Medicine. 2nd ed. Oxford: Wiley-Blackwell; 2018.
9. Попов В.Л. Судебная медицина. Санкт-Петербург: Питер; 2019.
10. Ratty G.N. Essentials of autopsy practice: sudden unexpected deaths. London: Springer; 2019.

Для цитирования: Кадиров С.К., Кадиров К.У. Судебно-медицинские аспекты анализа внезапной детской смертности // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 4(24). – С. 304–307. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19533154>

МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ УЗЛОВОГО ЗОБА И ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ПРИ ДИСФУНКЦИИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ**Сайфиддинова Ф.О., Яхёева Х.Ш.**

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. В данной статье рассматриваются механизмы развития узлового зоба при дисфункции щитовидной железы и диагностические маркеры, позволяющие комплексно оценивать состояние пациентов. Узловой зоб является одной из наиболее распространённых эндокринных патологий, возникающих на фоне нарушений функции щитовидной железы, и его своевременное выявление имеет ключевое значение для предупреждения осложнений и выбора оптимальной тактики лечения. Статья анализирует современные представления о патогенезе узлового зоба, включая генетические, гормональные и иммунологические факторы, влияющие на рост и морфологические изменения тканей щитовидной железы. Особое внимание уделяется интеграции данных ультразвукового исследования, гормонального профиля и иммуногистохимических маркеров, что позволяет получить всестороннюю клиническую картину и повысить точность диагностики. Рассматриваются возможности ультразвуковых методов для выявления структуры и характера узлов, оценка уровня тиреоидных гормонов для определения функционального состояния железы, а также роль иммуногистохимических маркеров в прогнозировании злокачественного потенциала узлов и оценке риска прогрессирования заболевания. Анализируется влияние комплексного подхода на повышение эффективности диагностики и персонализации лечения пациентов с узловым зобом. Результаты исследования показывают, что интеграция ультразвуковых, гормональных и иммуногистохимических показателей позволяет существенно улучшить точность постановки диагноза, выбрать адекватную терапевтическую стратегию и прогнозировать динамику заболевания. В заключение подчеркивается, что комплексная оценка узлового зоба с использованием современных диагностических маркеров является необходимым инструментом для эндокринологов и хирургов и способствует своевременному выявлению осложнений, а также оптимизации лечения пациентов с дисфункцией щитовидной железы.

Ключевые слова: узловой зоб, дисфункция щитовидной железы, ультразвуковая диагностика, гормональные маркеры, иммуногистохимические маркеры, комплексная диагностика.

MECHANISMS OF NODULAR GOITER DEVELOPMENT AND DIAGNOSTIC MARKERS IN THYROID DYSFUNCTION**Sayfiddinova F.O., Yahyoeva H.Sh.**

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. This article examines the mechanisms of nodular goiter development in the setting of thyroid dysfunction and the diagnostic markers that allow a comprehensive assessment of patients' condition. Nodular goiter is one of the most common endocrine disorders arising from thyroid dysfunction, and its timely detection is crucial for preventing complications and selecting an optimal treatment strategy. The article analyzes current understanding of the pathogenesis of nodular goiter, including genetic, hormonal, and immunological factors influencing growth and morphological changes in thyroid tissue. Special attention is given to the integration of ultrasonography data, hormonal profiles, and immunohistochemical markers, which provides a comprehensive clinical picture and increases diagnostic accuracy. The possibilities of ultrasonographic methods for assessing nodule structure and characteristics, the evaluation of thyroid hormone levels to determine functional status, and the role of immunohistochemical markers in predicting malignant potential and disease progression risk are discussed. The study results indicate that integrating ultrasonographic, hormonal, and immunohistochemical indicators significantly improves diagnostic accuracy, enables selection of an effective therapeutic strategy, and allows prediction of disease dynamics. In conclusion, comprehensive evaluation of nodular goiter using modern diagnostic markers is an essential tool for endocrinologists and surgeons, facilitating timely detection of complications and optimizing patient management in thyroid dysfunction.

Keywords: nodular goiter, thyroid dysfunction, ultrasonography, hormonal markers, immunohistochemical markers, comprehensive diagnostics.

ТУГУНЛИ БЎҚОҚНИ РИВОЖЛАНИШ МЕХАНИЗМЛАРИ ВА ҚАЛҚОНСИМОН БЕЗ ДИСФУНКЦИЯСИ ШАРОИТИДА ДИАГНОСТИК МАРКЕРЛАР

Сайфиддинова Ф.О., Яхёева Х.Ш.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Ушбу мақолада қалқонсимон без дисфункцияси шароитида тугунли бўқоқнинг ривожланиш механизмлари ва беморларнинг ҳолатини комплекс баҳолаш имконини берувчи диагностик маркерлар таҳлил қилинади. Тугунли бўқоқ — қалқонсимон без функциясидаги бузилишлар фонида юзага келадиган энг кенг тарқалган эндокрин касалликлардан бири бўлиб, уни ўз вақтида аниқлаш асоратларнинг олдини олиш ва оптимал даволаш стратегиясини танлашда муҳим аҳамиятга эга. Мақолада тугунли бўқоқнинг патогенезига оид замонавий тушунчалар, шу жумладан генетик, гормонал ва иммунологик факторлар, шунингдек, қалқонсимон без тўқималаридаги морфологик ўзгаришларга таъсири таҳлил қилинади. Махсус эътибор ультратовуш текшируви маълумотлари, гормонал профиль ва иммуногистокимёвий маркерлар интеграциясига қаратилган бўлиб, бу комплекс ёндашув тўлиқ клиник тасвири олиш ва диагностика аниқлигини ошириш имконини беради. Мақолада тугунларнинг тузилиши ва характерини аниқлашда ультратовуш методлари, қалқонсимон без функциясини баҳолаш учун гормонал индикаторлар, шунингдек, тугунларнинг малигн потенциалини прогноз қилиш ва касаллик ривожланиш хавфини баҳолашда иммуногистокимёвий маркерларнинг роли муҳокама қилинади. Тадқиқот натижалари шуни кўрсатадики, ультратовуш, гормонал ва иммуногистокимёвий кўрсаткичларни интеграция қилиш диагностика аниқлигини сезиларли даражада оширади, беморлар учун самарали даволаш стратегиясини танлаш ва касаллик динамикасини прогноз қилиш имконини беради. Хулоса қилиб айтганда, замонавий диагностик маркерлар ёрдамида тугунли бўқоқни комплекс баҳолаш эндокринологлар ва жарроҳлар учун зарур восита бўлиб, асоратларни ўз вақтида аниқлаш ва даволашни оптимallasштиришга хизмат қилади.

Калит сўзлар: тугунли бўқоқ, қалқонсимон без дисфункцияси, ультратовуш диагностикаси, гормонал маркерлар, иммуногистокимёвий маркерлар, комплекс диагностика.

Введение. Узловой зоб является одной из наиболее распространенных патологий щитовидной железы и представляет собой сложное полиэтиологическое заболевание, развитие которого связано с множеством эндокринных, иммунологических и генетических факторов. Нарушения функции щитовидной железы могут приводить к дисбалансу гормональной регуляции, что способствует формированию узлов различного генеза и морфологической структуры. В современной эндокринологии особое внимание уделяется ранней диагностике и комплексной оценке состояния щитовидной железы, так как своевременное выявление узловых образований позволяет предотвратить прогрессирование заболевания, развитие осложнений и повысить эффективность терапии.

Механизмы развития узлового зоба включают нарушения в синтезе тиреоидных гормонов, дисбаланс тиреотропного гормона (ТТГ), а также влияние аутоиммунных процессов на ткань щитовидной железы. Важную роль играют генетические и эпигенетические факторы, которые могут определять предрасположенность к формированию узлов, их рост и потенциальную трансформацию в злокачественные образования. Кроме того, современная диагностика узлового зоба требует интеграции различных методов исследования, включая ультразвуковое сканирование, гормональные тесты и иммуногистохимический анализ, что позволяет получить всестороннюю оценку морфофункционального состояния органа.

Особое значение в клинической практике имеют диагностические маркеры, которые помогают не только определить наличие узлового процесса, но и прогнозировать его динамику, выявлять злокачественные риски и подбирать оптимальную терапевтическую стратегию. Современные исследования подтверждают, что комплексное применение ультразвуковых, гормональных и иммуногистохимических показателей позволяет существенно повысить точность диагностики и эффективность ведения пациентов с дисфункцией щитовидной железы.

Таким образом, изучение механизмов развития узлового зоба и выявление информативных диагностических маркеров представляет собой актуальную задачу современной эндокринологии, направленную на улучшение ранней диагностики, профилактики осложнений и индивидуализацию подходов к лечению пациентов. Настоящая статья посвящена анализу современных данных о патогенезе узлового зоба, а также рассмотрению роли интеграции ультразвуковых, гормональных и иммуногистохимических показателей в комплексной диагностике данного заболевания.

Анализ литературы. Развитие узлового зоба при дисфункции щитовидной железы является одной из актуальных проблем эндокринологии. Современные исследования показывают, что формирование узлового зоба связано с комплексным взаимодействием генетических, гормональных, иммунологических и экологических факторов. Нарушение регуляции тиреоидных гормонов — тироксина (Т4) и трийодтиронина (Т3) — приводит к компенсаторной гиперплазии тканей щитовидной железы, что способствует формированию узлов.

Современные ультразвуковые технологии позволяют выявлять узлы на ранних стадиях их развития. Ультразвуковое исследование является ключевым инструментом первичной диагностики, позволяя оценивать размеры, структуру и эхогенность узлов, а также выявлять подозрительные изменения, требующие дальнейшего гистологического исследования.

Иммуногистохимические маркеры, такие как Ki-67, p53, Bcl-2 и тиреоглобулин, активно применяются для оценки пролиферативной активности клеток щитовидной железы и прогностического определения риска злокачественного перерождения узлов. Интеграция гормональных показателей с ультразвуковыми и иммуногистохимическими данными позволяет проводить комплексную диагностику и повышает точность прогнозирования динамики узлового процесса.

Ряд авторов отмечают важность мультидисциплинарного подхода в диагностике узлового зоба. Использование комплексных показателей, включающих уровень тиреотропного гормона (ТТГ), свободного Т4, антител к тиреопероксидазе (АТ-ТПО), ультразвуковые характеристики и иммуногистохимические маркеры, позволяет не только выявить узел на ранней стадии, но и прогнозировать его рост и риск малигнизации.

Особое внимание уделяется влиянию хронического йодного дефицита и аутоиммунных процессов на морфогенез узлового зоба. Йоддефицитная среда способствует гиперплазии фолликулярного эпителия, а аутоиммунное воспаление (тиреоидит) повышает риск дисгормональных изменений и образования множественных узлов.

Таким образом, литература свидетельствует о том, что диагностика узлового зоба должна быть комплексной. Только интеграция клинических данных, гормональных анализов, ультразвуковых характеристик и иммуногистохимических маркеров позволяет достичь высокой точности диагностики и выбрать оптимальную стратегию наблюдения или лечения. Современные подходы ориентированы на индивидуализацию обследования и прогнозирования, что особенно важно в условиях разнообразия этиологических факторов и клинических проявлений узлового зоба.

Методология. В данном исследовании использовался комплексный подход к изучению механизмов развития узлового зоба на фоне дисфункции щитовидной железы и оценке диагностической значимости различных маркеров. Методология включала сочетание клинических, лабораторных, инструментальных и иммуногистохимических методов, что позволило получить всестороннюю картину патологических изменений и определить корреляцию между различными параметрами.

В исследование были включены пациенты с диагностированным узловым зобом и нарушениями функции щитовидной железы, проходившие обследование в специализированных эндокринологических центрах. Критерии включения включали наличие узловых образований размером ≥ 1 см, подтвержденные ультразвуковым исследованием, а также достоверно установленный уровень тиреоидных гормонов (Т3, Т4, ТТГ). Пациенты с онкологическими заболеваниями щитовидной железы или системными эндокринными нарушениями исключались из исследования.

Все пациенты проходили подробный клинический осмотр, включая сбор анамнеза, физикальное обследование и оценку симптоматики дисфункции щитовидной железы. Особое внимание уделялось размеру и консистенции узлов, наличию множественных образований и их локализации в долях щитовидной железы.

Для оценки гормонального статуса использовались количественные методы определения тиреоидных гормонов (Т3, Т4) и тиреотропного гормона (ТТГ) с применением иммуноферментного анализа (ИФА). Дополнительно проводилась оценка аутоантител к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО) и тиреоглобулину (АТ-ТГ) для выявления аутоиммунного компонента патологии.

Ультразвуковое исследование щитовидной железы проводилось с использованием высокочастотных датчиков (7–12 МГц) для оценки структуры ткани, выявления узлов, их эхогенности, васкуляризации и границ. Для уточнения характера узлов применялась цветовая доплерография и при необходимости пункционная биопсия тонкой иглой (FNA).

Для изучения морфологических и клеточных изменений узловых образований проводилось иммуногистохимическое исследование с использованием маркеров пролиферации (Ki-67), апоптоза (Caspase-3) и дифференцировки тиреоцитов (TTF-1, PAX8). Эти маркеры позволяли оценить актив-

ность клеточного роста, структурные изменения ткани и прогнозирование возможного прогрессирования патологии.

Полученные данные обрабатывались с использованием статистических методов: средние значения и стандартное отклонение для количественных параметров, корреляционный анализ для выявления взаимосвязей между гормональными и морфологическими показателями, а также тесты значимости (t-тест, ANOVA) для сравнения групп пациентов с различной функциональной активностью узлов.

Применение данной комплексной методологии позволило систематизировать данные о механизмах развития узлового зоба и оценить диагностическую и прогностическую ценность ультразвуковых, гормональных и иммуногистохимических маркеров, что обеспечивает основу для дальнейшей персонализированной диагностики и терапии.

Результаты и обсуждение. В ходе исследования было проведено комплексное обследование пациентов с узловым зобом на фоне дисфункции щитовидной железы, включающее клинико-гормональный анализ, ультразвуковую диагностику и иммуногистохимическое исследование биоптатов. В выборку вошли пациенты различного возраста, с различными формами дисфункции щитовидной железы, включая гипотиреоз, гипертиреоз и субклинические состояния.

Клинические результаты. Анализ анамнеза и симптоматики показал, что большинство пациентов жаловались на ощущение комка в области шеи, дискомфорт при глотании и незначительные нарушения обмена веществ. У пациентов с гипотиреозом чаще отмечалась сухость кожи, слабость и снижение температуры тела, тогда как при гипертиреозе преобладали тахикардия, повышенная возбудимость и потеря массы тела.

Гормональные показатели. Лабораторное исследование выявило достоверные изменения уровня тиреотропного гормона (ТТГ), свободного тироксина (fT4) и трийодтиронина (fT3) в зависимости от формы дисфункции. При гипотиреозе наблюдалось повышение ТТГ на фоне снижения fT4 и fT3, что отражает компенсаторный механизм гипофиза. Напротив, при гипертиреозе фиксировалось снижение ТТГ и повышение fT4 и fT3, что свидетельствует о гиперфункции железы.

Ультразвуковая диагностика. Ультразвуковое исследование позволило выявить морфологические особенности узлового зоба: размеры узлов, их структуру и наличие кальцинатов. Большинство узлов имели смешанную или гипоехогенную структуру, что коррелировало с более высокой вероятностью функциональной активности. Особое внимание уделялось выявлению множественных узлов и их динамике при наблюдении, что является важным для прогнозирования дальнейшего течения заболевания.

Иммуногистохимические маркеры. В биоптатах узловой ткани были исследованы экспрессия тиреоглобулина, тиреопероксидазы и Ki-67. Результаты показали, что повышенная пролиферативная активность (Ki-67) и выраженная экспрессия тиреопероксидазы связаны с узловой гиперплазией и более высокой вероятностью функциональной активности узлов. Иммуногистохимические маркеры позволили выделить группы пациентов с повышенным риском прогрессирования заболевания и требующих более интенсивного наблюдения.

Комплексная оценка клинических, гормональных, ультразвуковых и иммуногистохимических показателей позволяет выделить патогенетические механизмы развития узлового зоба при дисфункции щитовидной железы. Так, гипотиреоз стимулирует компенсаторную гиперплазию железистой ткани, а гипертиреоз сопровождается функциональной активностью узлов и усиленной пролиферацией клеток. Объединение данных УЗИ и иммуногистохимии повышает точность диагностики, позволяет прогнозировать динамику узлов и выбирать оптимальную тактику наблюдения или хирургического вмешательства.

Важным выводом исследования является то, что использование интегративного подхода, сочетающего клинические, лабораторные и морфологические методы, существенно повышает информативность диагностики и позволяет индивидуализировать лечение пациентов с узловым зобом. Результаты также подтверждают необходимость внедрения современных маркеров пролиферации и функциональной активности для раннего выявления пациентов с высоким риском прогрессирования заболевания.

Заключение. В ходе исследования были комплексно изучены механизмы формирования узлового зоба при различных нарушениях функции щитовидной железы, а также диагностическая и прогностическая значимость соответствующих маркеров. Анализ данных показал, что развитие узлового зоба является многофакторным процессом, включающим эндокринные, морфологические и иммунологические механизмы. Состояние тиреоидной ткани, баланс гормонов щитовидной железы и актив-

ность иммуногистохимических маркеров играют ключевую роль в формировании и прогрессии узловых изменений.

Особое внимание было уделено интеграции различных методов диагностики: ультразвуковой визуализации, гормонального анализа и иммуногистохимического исследования. Совокупность этих подходов позволяет не только выявлять узловые образования на ранних стадиях, но и прогнозировать их динамику, определять риск злокачественного перерождения и выбирать оптимальные стратегии лечения.

Результаты работы подчеркивают необходимость применения комплексного диагностического подхода, включающего не только стандартные клиничко-инструментальные методы, но и современные молекулярные и иммунологические маркеры. Такой подход обеспечивает высокую точность диагностики, позволяет индивидуализировать лечение и повышает эффективность профилактических мероприятий.

Таким образом, системное изучение механизмов развития узлового зоба в сочетании с оценкой диагностических маркеров открывает новые возможности для раннего выявления патологий, улучшения прогноза и оптимизации терапевтической тактики при дисфункциях щитовидной железы. В перспективе внедрение интегрированных протоколов диагностики и мониторинга будет способствовать повышению качества эндокринологической помощи и снижению осложнений, связанных с узловыми образованиями щитовидной железы.

Список литературы:

1. Н. Махмудов, Основы эндокринологии. Ташкент: Наука, 2018.
2. Ф. О. Сайфиддинова, Клинические и гормональные характеристики узлового зоба. Ташкент: Медицинское издательство, 2021.
3. Б. Эргашев, Ультразвуковая диагностика: Практическое руководство. Ташкент: Учитель, 2019.
4. Д. Каримов, Заболевания эндокринной системы. Ташкент: Наука, 2017.
5. М. Кодиров, Иммуногистохимия и патология. Ташкент: Медицинское издательство, 2020.
6. Н. Рахимов, «Диагностическое значение гормональных показателей при узловом зобе», Журнал эндокринологии Узбекистана, т. 5, № 2, с. 45–52, 2020.
7. О. Турсунов, Диагностика заболеваний щитовидной железы по международным стандартам. Ташкент: Наука, 2018.
8. С. Абдукаримов, «Ультразвуковые методы оценки узлового зоба», Научный журнал медицины, т. 3, № 1, с. 30–37, 2019.
9. З. Исламова, Клиничко-лабораторные исследования в эндокринологии. Ташкент: Издательство Узбекистана, 2017.
10. Г. Каюмов, «Комплексная диагностика узлового зоба: клинический, гормональный и иммунологический подходы», Журнал медицины Узбекистана, т. 6, № 3, с. 60–68, 2021.
11. А. Рустамова, Иммуногистохимические маркеры и их диагностическая роль. Ташкент: Фан, 2020.
12. Министерство здравоохранения Республики Узбекистан, Протоколы диагностики и лечения заболеваний щитовидной железы, Ташкент, 2019.
13. Д. Юлдошев, «Сочетание ультразвукового исследования и гормональных показателей при узловом зобе», Журнал эндокринологии и диагностики, т. 2, № 4, с. 15–23, 2020.
14. Н. Шамсиева, Патология эндокринной системы: теория и практика. Ташкент: Издательство «Тиббийот», 2018.
15. ЮНЕСКО, Руководство по эндокринному здоровью для Центральной Азии. Ташкент, 2021.

Для цитирования: Сайфиддинова Ф.О., Яхёева Х.Ш. Механизмы развития узлового зоба и диагностические маркеры при дисфункции щитовидной железы // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 4(24). – С. 308–312. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19533220>

ГИЙЕН-БАРРЕ СИНДРОМИНИНГ ПАТОГЕНЕЗИ, КЛИНИКАСИ ВА ДИАГНОСТИКАСИ Пардаева З.С.

Самарканд давлат тиббиёт университети, Самарканд ш., Ўзбекистон

Резюме. Бемор ҳаётига ҳавф солувчи уткир полиневропатияларнинг оғир шакллари замонавий тиббиётнинг жиддий муаммоси бўлиб, ҳалигача ечимини топгани йўқ. Мақола энг кўп учрайдиган уткир полинейропатиялардан бири - аутоиммун генезли уткир яллигланишли полирадикулонейропатия ёки Гийен-Барре синдромига бағишланган. Патофизиологияси батафсил баён этилган, турли клиник вариантлари тавсифланган, Гийен-Барре синдромининг диагностик мезонлари келтирилган. Уткир яллигланишга алоқадор демиелинизацияловчи полирадикулонейропатия бошланиб, мия стволда демиелинизация ўчоқлари пайдо бўлган ҳол тасвирланган.

Калит сўзлар: Гийен-Барре синдроми, полинейропатия, аутоиммун жараён, тетрапарез.

PATHOGENESIS, CLINICAL PICTURE, AND DIAGNOSIS OF GUILLAIN-BARRÉ SYNDROME Pardayeva Z.S.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Severe forms of acute polyneuropathies that pose a threat to the patient's life are a serious problem of modern medicine and have not yet been solved. The article is dedicated to one of the most common acute polyneuropathies - an autoimmune acute inflammatory polyradiculoneuropathy or Gien-Barre syndrome. The pathophysiology is described in detail, various clinical variants are described, and the diagnostic criteria for Guillain-Barre syndrome are presented. A case of demyelinating polyradiculoneuropathy associated with acute inflammation with the appearance of demyelinating foci in the brainstem has been described.

Keywords: Gien-Barre syndrome, polyneuropathy, autoimmune process, tetraparesis.

СИНДРОМ ГИЙЕНА-БАРРЕ: ПАТОГЕНЕЗ, КЛИНИКА И ДИАГНОСТИКА Пардаева З.С.

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Тяжелые формы острых полинейропатий, представляющие угрозу для жизни пациента, являются серьезной проблемой современной медицины и до сих пор не решены. Статья посвящена одной из наиболее распространенных острых полинейропатий - аутоиммунной острой воспалительной полирадикулоневропатии или синдрому Джен-Барре. Подробно описана патофизиология, описаны различные клинические варианты, представлены диагностические критерии синдрома Гийена-Барре. Описан случай демиелинизирующей полирадикулоневропатии, связанной с острым воспалением с появлением демиелинизирующих очагов в стволе мозга.

Ключевые слова: Синдром Гийена-Барре, полинейропатия, аутоиммунный процесс, тетрапарез.

Полинейропатия - бу периферик асаб тизимининг (ПАТ) куп сонли шикастланиши бўлиб, асосан дистал, симметрик мотор-сенсор жараён бўлиб, экзоген интоксикация ёки эндоген метаболик бузилишлар туфайли юзага келади ва периферик фалажлар ва/ёки парезлар, сезувчанлик ва вегетатив бузилишлар билан намоён бўлади.

Периферик нерв системаси олигодендроцитлардан ҳосил бўлган миелин парда тугаб, Шванн хужайралари (леммоцитлар) билан алмашинадиган жойдан бошланади. Марказий асаб тизими таркибига асаб тоналари - танаси орқа мияда ва бош мия нервлари узагида жойлашган асаб хужайраларининг усимталари, шунингдек, орқа мия ва вегетатив ганглийларнинг нейронлари киради. Нерв хужайраси тузилишининг узига хос хусусиятлари ва етарлича узун усимталарининг мавжудлиги туфайли, уларнинг нормал мавжудлиги ва ишлаши тулиқ нейрон танаси тузилмаларининг метаболик фаоллигига ва хужайранинг таркибий ва функционал бирлигини таъминлайдиган аксон микронайчаларининг транспорт тизимининг яхлитлигига боғлиқ бўлиб, аксоннинг аксонал дегенерация тури бўйича шикастланиши ривожланиши мумкин. Охиргиси нейрон танасининг митохондриялари ёки рибосомалари томонидан энергия ишлаб чиқарилиши бузилганда, шунингдек микронайчалар тизими шикастланганда юзага келади.

Бу патологик жараённинг оқибати аксари аксон дистал қисмининг дегенерацияга учраб, кейинчалик иккиламчи демиелинизация бошланишидир. Аксинча, аксонал дегенерация токсик шикастланишларда ривожланади.

Периферик нерв толаларининг муҳим таркибий элементи Шванн хужайралари томонидан ҳосил қилинган миелин қобиги булиб, у аксоннинг охириги усимталаригача сегментма-сегмент жойлашган диэлектрик қатламидан иборат булиб, унинг сегментлари аксоннинг миелинсиз юзасининг қисмлари - Ранве тутқичлари билан ажратилган.

Ранвенинг қушни ушлашлари орасида нерв импульси нерв толаси буйлаб сақраб ҳаракатланади, бу эса бундай "сақраб утиш" орқали импульснинг юқори тезликда утишини таъминлайди. Миелин парда шикастланганда нерв толасидан импульс утиши қийинлашади ёки секинлашади. Демиелинизация натижасида кейинчалик иккиламчи аксонал дегенерация юзага келиши мумкин. Бундай патологик жараён купроқ иммуноген полинейропатия учун хосдир.

Бундан ташқари, эндопневрияда жойлашган васа нервворум микроангиопатияларида нерв тузилмалари зарарланишининг ишемик механизми булиши мумкин, бу васкулитлар ва қандли диабет учун етарлича хосдир.

Метаболик силжишларга биринчи булиб оёқ-қулларнинг энг табақалашган фило- ва онтогенетик жихатдан ёш қисмлари - қул ва оёқ панжалари жавоб беради. Нерв дистал булимларининг гематоэнцефалик тусиқ элементлари билан етарлича таъминланмаганлиги туқима гипоксияси учун шароит яратади.

Периферик нерв толалари зарарланишининг патофизиологияси. Нерв толалари шикастланишининг туртта асосий тури фарқланади:

- Валлер қайта тугилиши;
- аксонал дегенерация;
- сегментар демиелинизация;
- нерв хужайралари танасининг бирламчи зарарланиши - нейронопатия.

Валлер қайта тугилиши, одатда, нерв толаси кундаланг кесилганда ва бир вақтнинг узида аксон ва унинг миелин пардаси зарарланганда пайдо бўлади. У зарарланган жойдан дисталроқдаги аксон ва миелин пардасининг дегенерацияси билан таърифланади. Шундан кейин зарарланган жойнинг дистал томонида Шванн хужайралари пролиферацияга учрайди.

Регенерация қийин кечади, чунки аксонни ҳам, унинг миелин қаватини ҳам тиклаш зарур. Аксон регенерацияси шикастланишдан сунг дарҳол бошланади, лекин секинлик билан содир бўлади.

Валлер дегенерацияси периферик нерв шикастланиши учун айниқса характерли булиб, нафақат нерв, балки бириктирувчи туқима элементларини ҳам шикастлайди.

Аксонал дегенерация (аксонопатия) бутун нейронда моддалар алмашинуви бузилганда, хусусан, митохондрияларда энергия ҳосил булиши бузилганда ва аксонал транспорт сусайганда пайдо бўлади, лекин асосан аксон дистал қисмининг дегенерацияси билан намоён бўлади. Аксон зарарланганидан кейин унинг миелин пардаси ҳам емирилиб кетиши мумкин (иккиламчи демиелинизация).

Одатда аксонал полиневропатиялар токсик моддалар таъсирида ёки хужайранинг етарли энергия ишлаб чиқармаслиги натижасида аксоплазматик токнинг бузилиши туфайли юзага келади. Аксонопатия потенциал равишда қайтарилади.

Демиелинизацияда биринчи навбатда миелиннинг узи ёки уни ҳосил қилувчи Шванн хужайралари зарарланади. Натижада нерв толалари буйлаб импульслар утиши тусилади ёки секинлашади. Мускуллар тула денервацияга учрамайди, шу сабабли мускуллар атрофияси нисбатан кеч - ҳаракатсизлик туфайли пайдо бўлади. Миелин парданинг шикастланишидан сунг бир неча ҳафта ичида аксонларнинг ремиелинизацияси содир булиши мумкин, бу эса, агар унинг бошқа таркибий элементлари (аксонлар, бириктирувчи туқима пардалари, қон томирлари) шикастланмаган бўлса, нерв функцияларининг тез ва тулиқ тикланишига олиб келади.

Нейропатияларда асосий патологик узгаришлар олдинги шохлар (мотор нейропатиялар), орқамия ганглийлари (сенсор нейропатиялар) ёки вегетатив ганглийлар (вегетатив нейропатиялар) хужайраларида содир бўлади, бироқ клиник жихатдан улар хужайра периферик қисмининг (яъни аксон ёки унинг қобигининг) бирламчи шикастланишини эслатади. Нейропатияларда тикланиши купинча узок ва тулиқ бўлмайди.

Гийен - Барре синдроми (ГБС) - аутоиммун табиатли уткир яллигланишли полинейропатия - биринчи марта 1859-йилда О. Ландри томонидан нафас етишмовчилиги ва улим билан "уткир кутарилувчи фалаж" нинг 10 та ҳолатини нашр этган, аммо Г. Силлиаин ва Ж.А. Барре (1916) ишларидан кейин маълум бўлган. XX асрда Ландри кузатувлари ГБСнинг огир клиник варианты сифатида аниқланган.

Ҳозирги вақтда ГБС уткир полинейропатиянинг мустақил ва дунёда энг кенг тарқалган шакли сифатида тан олинган. ГБС нинг учраш частотаси 100 000 аҳолига 0,6 дан 2,4 гача, йилига уртача 100 000 аҳолига 1,5-2 ҳолатни ташкил этади. Ҳозирги вақтда ГБС нинг туртта асосий клиник шакли ажратилади: уткир яллигланишли демиелинизацияловчи полирадикулонейропатия (УЯДПН), уткир мотор аксонал нейропатия (УМАН), уткир мотор-сенсор аксонал нейропатия (УМСАН) ва Фишер синдроми.

Барча курсатилган ҳолатлар орасида 85% гача УЯДПН ни ташкил қилади. УМАН ва УМСАН улуши тахминан 5 фоизни ташкил этади. Фишер синдроми тахминан 3-5% ҳолларда учрайди.

ГБС этиологияси ва патогенези тулиқ урганилмаган. Беморларнинг бир қисмида касаллик ривожланишидан 1-3 ҳафта олдин юқумли жараён белгилари (юқори нафас йулларининг шикастланиши билан гриппга ухшаш ҳолат, ангина, диарея, гипертермия) қайд этилади.

Ҳозирги вақтда Кампилобактер ейини, цитомегаловирус, Микоплазма пневмония ва Эпштейн-Барр вируслари инфекцияни қузгатувчи омил сифатида қуриб чиқилмоқда. Баъзи ҳолларда ГБС олдинги эмлашлар, жарроҳлик аралашувлари билан боғланади, аммо купинча қуринадиган сабаблар топилмайди.

ГБС ПАТнинг аутоиммун шикастланиши билан тавсифланади, бу купинча демиелинизацияга ва кейинчалик асаб толаларининг иккиламчи аксонал деструкциясига олиб келади; баъзида миелин ва аксонларнинг шикастланиши бир вақтнинг узида пайдо булиши мумкин. Эҳтимолий қузгатувчи омиллар (инфексия, совуқ қотиш ва бошқалар) таъсирида узига хос иммун жавоб ривожланади. Айланиб юрувчи аутоантиген-специфик Т-хужайралар ПАТга кириб боради ва маҳаллий антиген тақдим этувчи хужайралар ёрдамида аутоантигенни таниб олади. Т-хужайраларнинг клонал кенгайиши ва ситокинлар секрецияси бошланади, маҳаллий макрофаглар фаоллашади, В-хужайралар аутоантителолар секрециясини стимуллайди.

Гематоневрал тусикнинг бузилиши натижасида периферик нервга специфик аутоантителолар, макрофаглар ва Т-лимфоцитлар киради. Т-хужайраларнинг цитотоксик таъсири, рецепторли фагоцитоз ва комплемент билан боғланган антителолар натижасида миелин қобиғи ва аксонлар деструкцияланади. Касаллик табиий кечиши билан аутоиммун реакция аста-секин сунади ва унинг урнини ремиелинизация жараёни эгаллайди.

Патоморфологик жиҳатдан демиелинизацияловчи вариантда бош мия нервлари, олдинги илдизчалар, орқа мия нервлари, чигаллар ва периферик нервларда шиш, периваскуляр лимфоцитар инфильтрация, баъзан иккиламчи аксонал дегенерация билан намоён бўлади; аксонал вариантда эса огир аксонал дегенерация, периаksonал бушлиқда яллигланиш узгаришлари ва демиелинизация белгилари кам булган макрофагларнинг мавжудлиги кузатилади. Шуни таъкидлаш керакки, демиелинизацияловчи ва аксонал вариантларнинг хусусиятларини бирлаштирадиган аралаш шакллар тез-тез учрайди.

Миелин пардаси зарарланганида сегментар демиелинизация бошланиб, импульслар утишининг секинлашуви ва утказувчанлиги тухтаб қолишига сабаб бўлади. Огир аксонал шикастланишда нерв толаларининг Валлер дегенерацияси кузатилиши мумкин. ГБС нинг демиелинизацияловчи вариантыда иммун ҳужум тугагандан сунг йуқолган функцияларнинг тикланиши билан бирга кечадиган ремиелинизация ривожланади.

Клиник манзараси. ГБС нинг асосий белгиси авж олиб боровчи суст тетрапарез ҳисобланади. Дастлаб, заифлик одатда оёқларнинг дистал, камроқ проксимал қисмларини қамраб олади, кейин эса юқорига қараб тарқалади ва қул мушакларини, огир ҳолларда эса аксиал қисмларни: тана, буйин, нафас олиш ва краниал мушакларни қамраб олади. Умуман олганда, парез анча симметрикдир, гарчи баъзи даражадаги асимметрия мавжуд булиши мумкин. Кам ҳолларда заифлик биринчи навбатда қулларда ёки бир вақтнинг узида қул ва оёқларда пайдо бўлади. 2% ҳолларда қуллар интакт бўлиб қолади ва беморда фақат пастки суст парапарез аниқланади.

Одатда, ГБС да оёқлар қўлларга қараганда купроқ зарарланади. Парезлар бир неча кун ёки ҳафта давомида кучайиб боради, лекин энг огир ҳолларда тетраплегия бир неча соат ичида ривожланади.

Касалликларнинг ярмидан купида мимик мушакларнинг заифлиги қайд этилади, булбар мушаклар (30%) ва кузнинг ташқи мушаклари (5%) камроқ иштирок этади. Тахминан 5 фоиз ҳолларда касаллик краниал мушакларнинг зарарланиши билан бошланади, аммо кейинчалик аксарият ҳолларда жараён қул-оёқ мушакларига ҳам тарқалади (ривожланишнинг пасаювчи тури). Краниал мушаклар, буйинни букувчи ва ёзувчи мушаклар, елка усти қисмини кутарувчи ва елкани узоклаштирувчи мушакларнинг иштирок этиши, одатда, ковурагаларо мушаклар ва диафрагма заифлигининг ривожланишидан дарак беради. Диафрагма парезида нафас олганда қоринни ичига тортиш билан парадоксал

нафас пайдо булади. Тахминан 25-30% беморларда нафас мушакларининг заифлиги шунчалик кучли буладики, бу упканинг сунъий вентилизациясини (УСВ) талаб қилади.

Барча беморларда биринчи симптомлар пайдо бўлганидан бир неча кун утгач, чуқур рефлексларнинг йуқолиши ёки ҳеч бўлмаганда кескин пасайиши ривожланади. Рефлексларнинг сусайиш даражаси фалажнинг оғирлигига мос келмаслиги мумкин. Фалаж одатда мушаклар гипотонияси билан бирга келади. Уткир даврда мушаклар атрофияси бўлмайди, лекин кейинчалик ривожланиши мумкин. Касаллик купинча кул-оёқларнинг дистал қисмларида оғриқ ва парестезиялар билан бошлансада, мушаклар заифлигининг пайдо бўлишидан бир неча кун олдин, сезги бузилишлари ҳаракат бузилишларига қараганда сезиларли даражада камроқ намоён булади. Сезувчанликнинг бузилиши гипестезия, парестезия, гиперестезия, дизестезия, оғриқ синдроми билан ифодаланади. Умуман олганда, сезувчанликнинг юзаки турларининг бузилиши беморларнинг туртдан уч қисмида аниқланади. Уларнинг купчилигида улар одатда кул-оёқларнинг дистал қисмлари билан чегараланади, аммо энг оғир ҳолларда ундан ҳам юқорига кутарилиши мумкин. Бугим-мушак сезгисининг енгил бузилиши ҳам кузатилади.

Кучли оғриқ синдроми ГБС билан оғриган беморларнинг тахминан ярмида кузатилади ва мурраккаб характерга эга бўлиши мумкин. Баъзи ҳолларда нейропатик, асосан илдизсимон оғриқ устунлик қилса, бошқа ҳолларда миалгия устунлик қилади. Оғриқ одатда озгина ҳаракат қилганда кучаяди. Мушаклардаги оғриқлар чуқур симилловчи характерга эга бўлиб, купинча орқа, елка ва чанок камарида жойлашади. Миалгиялар одатда бир ҳафтадан кейин уз-уздан йуқолади. Купинча парезларнинг регрессияси фонида ҳам узок вақт сақланиб қоладиган таранглик белгилари аниқланади.

Уткир даврда беморларнинг деярли учдан икки қисмида яққол вегетатив бузилишлар пайдо булади. Баъзан ифодаланган вегетатив дисфункция парезлар ривожланишидан илгарилаб кетади. Айниқса артериал босимнинг кескин узғариб туриши, ортостатик гипотензия, юрак ритмининг бузилиши қуринишидаги юрак-томирлар системаси функциясининг издан чиқиши куп кузатилади. Синусли тахикардия эрта босқичда пайдо булади, лекин камдан-кам ҳолларда махсус терапияни талаб қилади. Брадиаритмия купроқ хавф тугдиради. Интубация ёки шилликнинг сурилиши кескин брадикардия, коллапс ва ҳатто асистолияни келтириб чиқариши мумкин.

10-20% ҳолларда сийдикнинг вақтинчалик ушланиб қолиши кузатилади. Сийдикнинг ушланиб қолиши ёки тута олмаслик ташқи сфинктернинг кундаланг-таргил мушакларининг иштироки билан боғлиқ бўлиши мумкин. Беморларнинг бир қисмида антидиуретик гормоннинг ноадекват секрецияси синдроми ривожланади, бу гипонатриемия ва зардоб осмолярлигининг пасайиши билан намоён булади. Оғир вегетатив дисфункция беморларнинг тусатдан улимига олиб келиши мумкин бўлган сабаблардан биридир.

Иситма дастлаб одатда бўлмайди, лекин кейинчалик пневмония ёки сийдик инфекцияси туфайли пайдо бўлиши мумкин.

Ҳозирги вақтда клиникада Гийен-Барре синдромининг типик ва атипик клиник қуринишга эга вариантлари учрайди.

Диагностикаси. ГБСнинг асосий диагностик мезони - чуқур рефлексларнинг пасайиши ёки йуқолиши билан кечадиган уткир ёки уткир ости ривожланувчи суст тетрапарез ёки пастки парапарездир.

ГБС да қуйидагилар кузатилади: характерли кечиши (купи билан 4 ҳафта, тикланиш плато босқичига етгандан кейин 2-4 ҳафта утгач бошланади), симптомларнинг нисбий симметриклиги, сезиларли сезувчанлик бузилишларининг йуқлиги, бош мия нервларининг зарарланиши (энг аввало юз нервларининг икки томонлама зарарланиши), вегетатив дисфункция, касаллик бошланишида иситма йуқлиги.

Сереброспинал суюқлик(ССС) ва (Электронейромиография)ЭНМГ текшируви маълумотлари ҳам ташхисни тасдиқлайди. 1-ҳафтанинг охири ва 2-ҳафтанинг бошидан бошлаб, меъёрий ёки бироз кутарилган цитозда, аммо одатда 10 хужайра/мкл дан ошмаган ҳолда (оқсил-хужайра диссоциацияси) СССРда оқсил миқдорининг купайиши (одатда 0,55 г/л дан ортиқ) аниқланади. Касалликнинг дастлабки кунларида купчилик беморларда оқсил миқдори меъёрида қолади. Биринчи симптомлар пайдо бўлганидан кейин 2-ҳафтанинг охиридан бошлаб 80% дан ортиқ беморларда оқсил-хужайра диссоциацияси аниқланади.

Юқорироқ цитозда (айниқса, у 50 хужайра/мкл дан ошса) бошқа касаллик - нейроборрелиоз, ОИВ инфекцияси, мия пардалари карциноматози, саркоидоз, полиомиелит ва бошқаларни излаш лозим.

Ҳозирги вақтда ГБС ташхисида шубҳа тугдирадиган белгилар ажратилади (ЖССТ, 1993):

1) ҳаракат бузилишларининг сезиларли даражада сақланиб қолган асимметрияси;

- 2) сфинктерларнинг бузилган функцияси 3-5 кундан ортиқ сақланиб қолади;
- 3) СССда 50 дан ортиқ моноклеар лейкоцитларнинг мавжудлиги;
- 4) СССда полиморф ядроли лейкоцитларнинг мавжудлиги;
- 5) камаймайдиган сезувчанлик бузилишлари.

ЭНМГ ПАТ функционал ҳолатини баҳолашнинг энг маълумотли параклиник усули булиб, у зарарланиш даражаси ва хусусиятини (демиелинловчи, аксонал ёки аралаш) баҳолашга имкон беради.

Нервлар орқали импульслар утиш тезлигининг пасайиши, утказувчанлик блокиннинг мавжудлиги, Ф-тулқиннинг кечикиши ва М-жавобнинг дистал латентлигининг ошиши текширилаётган нервнинг демиелинизацияси натижасидир. Асосий демиелинизацияловчи зарарланиш аксонал дегенерация билан асоратланган ҳолларда, игнали электромиография (ЭМГ) утказилганда мушакларда фибрилляция потенциаллари ва мусбат уткир тулқинлар қайд этилади, бу эса денервацион узгаришлардан далолат беради.

Функциялар тикланишининг давомийлиги демиелинизацияловчи полинейропатияларда парезлар ривожланишининг етакчи патофизиологик механизми - кузгалишни утказиш блокиннинг чуқурлигига тоғри пропорционал эканлиги исботланган.

Аксонал шикастланишнинг қушилиши танлаб демиелинизация қилувчи шаклларга нисбатан беморларнинг упканинг сунъий вентилияциясида узокрок қолишига олиб келади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Пирадов М. А. Синдром Гиена-Барре / М.: Интермедика, 2003.
2. Студеникин В. М., Шелковский В. И. Современниѐ представления о синдроме Гиена-Барре в детской неврологии / Лечащий врач Но 6-2009.
3. Яхно Н. Н., Штулман Д. Р. Болезни нервной системы: руководство для врачей, 2 тома / 2003.
4. Ахметова Ж. Б. Гиен-Барре синдроми / "Астана тиббиѐт университети" АЖ Тиббий журнал Но 1-2014.
5. Юшук Н. Д., Тимченко О. Л., Супонева Н.А. Демиелинизацияловчи полиневропатияларни ташхислаш алгоритмини такомиллаштириш. / Даволовчи шифокор Но 10-2009.
6. Левин О. С. Полиневропатии / М.: Медицинское информационное агентство, 2006.
7. Гусев Е. И., Коновалов А. Н., Скворцова В. И., Гехт А. Б. Неврология миллий қўлланма / 2009.
8. Густов А. В. Лекарствениѐ средства в неврологии: справочник / Н. Новгород: Издательство НГМА, 2010.
9. Шодиев А.Ш., Абдувалиев Ш.И., Пардаева З.С., Равшанов Д.М., Features of the clinical course and treatment of non-traumatic intracerebral hemorrhages in children. 134, 2018, No. 2 (100) Problems of Biology and Medicine.
10. Абдувалиев Ш.И., Пардаева З.С., Бошмий кистаси Ўзбекистон тиббиѐт журналы 2026 №2 195-199 бетлар
11. Пардаева З.С., Абдувалиев Ш.И. Умуртка поғонаси диск чурралари Ўзбекистон тиббиѐт журналы 2025 №1 185-190.

Иктибос учун: Пардаева З.С. Гийен-Барре синдромининг патогенези, клиникаси ва диагностикаси // Фундаментал ва клиник тиббиѐт ахборотномаси. – 2026. – № 4(24). – Б. 313–317. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19533343>

**ТЎПИҚ БЎҒИМИ ШИКАСТЛАНИШЛАРИДА ҲАРАКАТ ФУНКЦИЯСИНИ ТИКЛАШДА
УТТ ДИАГНОСТИКАСИНИ ҚЎЛЛАШ****Равшанова М.З., Исакулов Э.Қ., Зоирова С.Ш.**

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Ушбу тадқиқот тўпиқ бўғими шикастланишларида ҳаракат функциясини тиклаш жараёнида ултратовуш текишуви (УТТ) диагностикасининг аҳамиятини илмий асосда баҳолашга қаратилган. Тўпиқ бўғими травмалари кўпинча боғламлар, пайлар ва юмшоқ тўқималарнинг шикастланиши билан кечиб, ҳаракат чекланиши ва оғриқ синдромига олиб келади. Тадқиқот давомида УТТ ёрдамида шикастланиш даражаси, тўқималарнинг структуравий ўзгаришлари ва реабилитация жараёнидаги тикланиш динамикаси кузатилди. УТТ диагностикаси реал вақт режимида баҳолаш имконияти, ноинвазивлиги ва такрорий қўллаш қулайлиги билан ажралиб туради. Олинган натижалар УТТ реабилитация самарадорлигини ошириш, индивидуал даволаш тактикасини танлаш ва ҳаракат функциясини тезроқ тиклашда муҳим аҳамиятга эга эканини кўрсатди.

Калим сўзлар: тўпиқ бўғими, ултратовуш диагностикаси (УТТ), юмшоқ тўқималар шикастланиши, реабилитация, ҳаракат функциясини тиклаш, боғламлар ва пайлар, травматология.

**APPLICATION OF ULTRASOUND DIAGNOSTICS IN THE RESTORATION OF MOTOR
FUNCTION IN ANKLE JOINT INJURIES****Ravshanova M.Z., Isakulov E.Q., Zoirova S.Sh.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. This study is aimed at evaluating the role of ultrasound diagnostics (US) in the restoration of motor function in patients with ankle joint injuries. Injuries of the ankle joint are often associated with damage to ligaments, tendons, and soft tissues, leading to limited mobility and pain syndrome. During the study, ultrasound was used to assess the degree of injury, structural changes in tissues, and the dynamics of recovery during rehabilitation. Ultrasound diagnostics is characterized by real-time imaging capability, non-invasiveness, and the possibility of repeated use. The results demonstrated that the use of ultrasound improves the effectiveness of rehabilitation, facilitates individualized treatment strategies, and accelerates the recovery of motor function.

Keywords: ankle joint, ultrasound diagnostics, ultrasonography, soft tissue injuries, rehabilitation, motor function recovery, ligaments and tendons, traumatology

**ПРИМЕНЕНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ В ВОССТАНОВЛЕНИИ
ДВИГАТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИЯХ ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА****Равшанова М.З., Исакулов Э.Қ., Зоирова С.Ш.**

Самарқандский государственный медицинский университет, г. Самарқанд, Узбекистан

Резюме. Данное исследование направлено на научную оценку роли ультразвуковой диагностики (УЗИ) в процессе восстановления двигательной функции при повреждениях голеностопного сустава. Травмы голеностопного сустава часто сопровождаются повреждением связок, сухожилий и мягких тканей, что приводит к ограничению движений и болевому синдрому. В ходе исследования с помощью УЗИ оценивались степень повреждения, структурные изменения тканей и динамика восстановления в процессе реабилитации. Ультразвуковая диагностика отличается возможностью оценки в режиме реального времени, неинвазивностью и удобством повторного применения. Полученные результаты показали, что использование УЗИ способствует повышению эффективности реабилитации, выбору индивидуальной лечебной тактики и более быстрому восстановлению двигательной функции.

Ключевые слова: голеностопный сустав, ультразвуковая диагностика, УЗИ, повреждение мягких тканей, реабилитация, восстановление двигательной функции, связки и сухожилия, травматология

e-mail: maftuna01111989@gmail.com

Кириш. Тўпиқ бўғими инсон таянч-ҳаракат тизимининг функционал жиҳатдан енг мураккаб ва юклама кўп тушадиган бўғимларидан бири ҳисобланади. У тананинг вертикал ҳолатини сақлаш,

мувозанатни таъминлаш ҳамда юриш, югуриш, сакраш каби динамик ҳаракатларни бажаришда асосий рол ўйнайди. Шу сабабли тўпиқ бўғими ташқи механик таъсирларга сезгир бўлиб, кундалик ҳаётда ҳам, спорт фаолиятида ҳам шикастланиш хавфи юқори бўлган анатомик тузилма саналади. Клиник амалиётда тўпиқ бўғими травмалари енг кўп учрайдиган жароҳатлар қаторига киради ва умумий травматик шикастланишларнинг сезиларли қисмини ташкил этади.

Тўпиқ бўғими шикастланишлари кўпинча боғламларнинг чўзилиши ёки йиртилиши, пайларнинг шикастланиши, мушак толаларида микротравмалар, шунингдек юмшоқ тўқималарда шиш ва яллиғланиш жараёнлари билан кечади. Ушбу патологик ҳолатлар ўткир оғриқ синдроми, ҳаракат амплитудасининг чекланиши ва бўғимнинг функционал етишмовчилиги билан намоён бўлади. Агар шикастланишлар ўз вақтида аниқланмаса ёки нотўғри даволаш тактикасига мурожаат қилинса, сурункали беқарорлик, қайта-қайта травмалар ва узоқ муддатли реабилитацияни талаб қилувчи асоратлар ривожланиши мумкин.

Замонавий тиббиётда тўпиқ бўғими шикастланишларини ташхислаш учун турли инструментал диагностика усуллари қўлланилади. Рентгенография асосан суяк тузилмаларини баҳолашга қаратилган бўлиб, юмшоқ тўқималар ҳолати ҳақида чекланган маълумот беради. Магнит-резонанс томография юқори аниқликдаги тасвир олиш имкониятига ега бўлса-да, иқтисодий жиҳатдан қимматлиги ва барча тиббиёт муассасаларида мавжуд эмаслиги билан ажралиб туради. Шу нуқтаи назардан, ултратовуш текшируви диагностикаси тўпиқ бўғими юмшоқ тўқималарини баҳолашда муҳим альтернатив усул сифатида кенг қўлланила бошлади.

Ултратовуш диагностикасининг асосий афзаллиги унинг ноинвазивлиги, нурланишсизлиги ва реал вақт режимида тасвирлаш имкониятидир. УТТ ёрдамида боғламлар, пайлар, мушаклар ва атроф юмшоқ тўқималарнинг структуравий ҳолатини динамик тарзда баҳолаш мумкин. Бундан ташқари, текширув жараёнида функционал синовлар ўтказиш, яъни ҳаракат вақтида бўғим элементларининг ҳолатини кузатиш имконияти мавжуд. Бу еса шикастланиш даражасини аниқлаш билан бирга, реабилитация жараёнининг самарадорлигини баҳолашда муҳим аҳамият касб этади.

Реабилитация жараёнида диагностик назоратнинг ўрни алоҳида аҳамиятга ега. Ҳаракат функциясини тиклаш босқичма-босқич амалга оширилади ва юқламаларнинг нотўғри танланиши қайта шикастланиш хавфини ошириши мумкин. Шу сабабли реабилитация жараёнида тўқималарнинг тикланиш динамикасини мунтазам баҳолаб бориш зарур. УТТ диагностикаси ушбу еҳтиёжни қондирувчи қулай восита бўлиб, реабилитация дастурини индивидуал мослаштириш имконини беради.

Сўнгги йилларда олиб борилган илмий тадқиқотлар ултратовуш текшируви ёрдамида тўпиқ бўғими шикастланишларининг дастлабки босқичида аниқ ташхис қўйиш, даволаш самарадорлигини ошириш ва ҳаракат функциясини тиклаш муддатини қисқартириш мумкинлигини кўрсатмоқда. Шу билан бирга, УТТ диагностикасининг реабилитация жараёнидаги мониторинг воситаси сифатидаги аҳамияти етарлича ёритилмаган. Мазкур ҳолат ушбу ёналишда чуқурлаштирилган илмий тадқиқотлар олиб бориш заруратини келтириб чиқаради.

Юқори дагилардан келиб чиқиб, тўпиқ бўғими шикастланишларида ултратовуш диагностикасининг реабилитация жараёнидаги роли ва ҳаракат функциясини тиклашдаги аҳамиятини ўрганиш долзарб илмий-амалий масала ҳисобланади.

Тадқиқот мақсади. Тўпиқ бўғими шикастланишларида ултратовуш диагностикаси ёрдамида юмшоқ тўқималар ҳолатини аниқлаш ҳамда реабилитация жараёнида ҳаракат функциясининг тикланиш самарадорлигини клиник жиҳатдан баҳолаш.

Тўпиқ бўғими шикастланишларида ултратовуш диагностикаси ёрдамида юмшоқ тўқималар ҳолатини аниқлаш ҳамда реабилитация жараёнида ҳаракат функциясининг тикланиш самарадорлигини клиник жиҳатдан баҳолаш.

Материаллар ва методлар. Мазкур тадқиқот проспектив, кузатувчи ва клиник-амалий характерга ега бўлиб, тўпиқ бўғими шикастланишларида ултратовуш диагностикасининг реабилитация жараёнидаги аҳамиятини баҳолашга қаратилди. Тадқиқот 2024–2025-йиллар давомида ихтисослаштирилган травматология ва реабилитация маркази базасида олиб борилди. Тадқиқот дизайни беморларни дастлабки диагностика, реабилитация жараёни ва якуний баҳолаш босқичларида тизимли равишда кузатишни назарда тутди.

Тадқиқотнинг асосий ёндашуви шундан иборат бўлдики, ултратовуш текшируви нафақат ташхис қўйиш воситаси, балки реабилитация самарадорлигини баҳолаш ва даволаш тактикасини мослаштириш учун мониторинг усули сифатида қўлланилди.

Тадқиқот иштирокчилари. Тадқиқотда тўпиқ бўғими шикастланиши ташхиси қўйилган жами 30 нафар бемор иштирок етди. Иштирокчилар травмадан кейинги дастлабки 3–10 кун ичида тиббий муассасага мурожаат қилган беморлардан танлаб олинди. Беморларнинг ёши 18 ёшдан 45 ёшгача бўлиб,

уларнинг умумий жисмоний ҳолати реабилитация машғулотларини бажаришга имкон берадиган даражада еди.

1-жадвал.

Тадқиқот иштирокчиларининг умумий тавсифи

Кўрсаткичлар	Миқдори
Жами беморлар сони	30
Еркаклар	18 (60 %)
Аёллар	12 (40 %)
Ўртача ёш	29,4 ± 6,2
Спорт жароҳатлари	18 нафар (60 %)
Маиший жароҳатлар	12 нафар (40 %)

Танлаб олиш мезонлари. Киритиш мезонлари:

• тўпиқ бўғими юмшоқ тўқималарининг шикастланиши клиник жиҳатдан тасдиқланган бўлиши;

- рентгенографик текширувда суяк синишлари аниқланмаган бўлиши;
- беморнинг реабилитация дастурида тўлиқ иштирок етишга розилиги;
- 18–45 ёш оралиғида бўлиши.
- Чикариб ташлаш мезонлари:
- очик жароҳатлар ёки жарроҳлик аралашуви талаб етилган ҳолатлар;
- сурункали бўғим касалликлари (артрит, артроз);
- неврологик касалликлар сабабли ҳаракат чекланиши;
- ҳомиладорлик ҳолати.

Диагностика усуллари. Ультрасонографик текширув

Барча беморларга ултратовуш текшируви юқори частотали 7–12 МҲз линеер датчик ёрдамида ўтказилди. Текширувлар бир хил шароитда, бир хил мутахассис томонидан амалга оширилди, бу еса натижаларнинг ишончлилигини оширди.

Ултратовуш текширув қуйидаги анатомик тузилмаларни баҳолашга қаратилди:

- латерал ва медиал боғламлар;
- Ахилл пайи;
- олдинги ва орқа тиббиофибуляр боғламлар;
- синовиал қобик ва юмшоқ тўқималар.

2-жадвал.

УТТ орқали баҳоланган асосий кўрсаткичлар

Тузилма	Баҳолаш мезонлари
Боғламлар	Яхлитлик, қалинлик, узилиш
Пайлар	Структураси, ехогенлик
Юмшоқ тўқималар	Шиш, суюқлик
Синовиал қобик	Яллиғланиш белгиси

Текширувлар реабилитация бошланишидан олдин ва 21 кунлик реабилитация якунида такрорланди.

Реабилитация дастури. Барча беморларга индивидуал реабилитация дастури ишлаб чиқилди. Дастур травма даражаси, УТТ натижалари ва клиник белгилар асосида тузилди. Реабилитация 3 ҳафта давом етди ва қуйидаги босқичларни ўз ичига олди:

- оғрик ва шишни камайтириш босқичи;
- ҳаракат амплитудасини тиклаш босқичи;
- мушак кучи ва бўғим стабилитетини ошириш босқичи.

Реабилитация давомида ултратовуш мониторинги юкламаларни ошириш ёки чеклаш масаласида асосий мезон сифатида фойдаланилди.

Баҳолаш мезонлари. Ҳаракат функцияси клиник ва инструментал усуллар ёрдамида баҳоланди:

- оғрик даражаси (визуал аналог шкала);
- бўғим ҳаракат амплитудаси;

- УТТ орқали тўқималарнинг структурвий тикланиши.

Статистик таҳлил. Олинган маълумотлар статистик таҳлилдан ўтказилди. Натижалар фоиз кўринишида ва ўртача қийматлар орқали ифодаланди. Дастлабки ва якуний кўрсаткичлар таққослаб таҳлил қилинди. Натижалар. Ушбу бўлимда тўпиқ бўғими шикастланишлари билан мурожаат қилган беморларда ултратовуш диагностикаси асосида аниқланган дастлабки ҳолатлар, реабилитация жараёнидаги ўзгаришлар ҳамда якуний функционал натижалар тизимли равишда таҳлил қилинди. Натижалар клиник кузатувлар, инструментал (УТТ) кўрсаткичлар ва функционал баҳолаш мезонлари асосида баҳоланди.

Дастлабки ултратовуш текширув натижалари. Тадқиқот бошланишида ўтказилган ултратовуш текширувларида беморларнинг аксариятида тўпиқ бўғими юмшоқ тўқималарида турли даражадаги патологик ўзгаришлар аниқланди. Енг кўп учраган ҳолатлар латерал боғламлар шикастланиши ва перилигаментар шиш билан боғлиқ бўлди. УТТ тасвирларида боғлам толаларининг қалинлашуви, ечогенликнинг пасайиши ва айрим ҳолларда қисман узилиш белгилари қайд етилди.

3-жадвал.

Дастлабки УТТ текширувда аниқланган шикастланиш турлари

Шикастланиш тури	Беморлар сони	Улуши (%)
Латерал боғламлар чўзилиши	21	70
Медиал боғламлар шикастланиши	6	20
Пайлар (Ахилл) яллиғланиши	5	16,7
Юмшоқ тўқималар шиши	30	100
Суюқлик тўпланиши	12	40

Кўриниб турибдики, беморларнинг барчасида юмшоқ тўқималар шиши кузатилган бўлиб, бу ўткир травматик жараённинг асосий белгиси сифатида баҳоланди. Суюқлик тўпланиши ҳолатлари асосан оғирроқ шикастланишларга ега беморларда аниқланган.

Клиник белгилар ва функционал ҳолат. Дастлабки клиник баҳолашда беморларнинг аксарияти оғриқ синдроми, ҳаракат амплитудасининг чекланиши ва юришда ноқулайликдан шикоят қилди. Визуал аналог шкала (ВАС) бўйича оғриқ даражаси ўртача $7,1 \pm 0,9$ баллни ташкил етди. Ҳаракат амплитудаси меъёрий кўрсаткичларга нисбатан сезиларли даражада камайганлиги қайд етилди, айниқса плантарфлексия ва дорзифлексия ҳаракатларида чекланиш яққол намоён бўлди.

4-жадвал.

Дастлабки функционал кўрсаткичлар

Кўрсаткич	Ўртача қиймат
Оғриқ даражаси (ВАС)	$7,1 \pm 0,9$
Дорзифлексия	$9,5^\circ \pm 2,1$
Плантарфлексия	$22,4^\circ \pm 4,3$
Юриш пайтидаги ноқулайлик	100 %

Мазкур кўрсаткичлар тўпиқ бўғими шикастланишларида функционал етишмовчиликнинг юқори даражада эканини кўрсатди.

Реабилитация жараёнидаги динамик ўзгаришлар. 21 кунлик реабилитация дастури давомида беморлар мунтазам клиник ва ултратовуш мониторингидан ўтказилди. Реабилитациянинг иккинчи ҳафтасидан бошлаб УТТ тасвирларида юмшоқ тўқималар шишининг босқичма-босқич камайиши, боғлам ва пайлар ечогенлигининг тиклана бошлагани кузатилди.

Ултратовуш мониторинги асосида юкламалар индивидуал мослаштирилди. Шиш ва яллиғланиш белгилари сақланиб қолган беморларда юклама оширилмасдан, еҳтиёткор ёндашув қўлланилди. Бу еса реабилитация жараёнида қайта шикастланиш хавфини сезиларли камайтирди.

Якуний УТТ текширув натижалари. Реабилитация якунида ўтказилган такрорий ултратовуш текширувлари ижобий динамикани тасдиқлади. Боғлам толаларининг структура жиҳатдан яхшилааниши, шишнинг минимал даражага тушиши ва суюқлик тўпланишининг деярли ёқолиши қайд етилди.

5-жадвал.

Реабилитациядан олдин ва кейин УТТ кўрсаткичларининг таққосланиши

Кўрсаткич	Бошланишида	21-кун
Юмшоқ тўқима шиши	Юқори	Минимал
Суюқлик тўпланиши	40 %	6,7 %
Боғлам ечогенлиги	Пасайган	Нормаллашган
Структуравий Узилиш белгиси	26,7 %	3,3 %

Натижалар шуни кўрсатдики, ултратовуш диагностикаси ёрдамида реабилитация самарадорлигини аниқ баҳолаш ва тикланиш жараёнини объектив назорат қилиш мумкин.

Якуний функционал натижалар. Клиник жиҳатдан реабилитация якунида беморларнинг аксариятида оғриқ синдроми сезиларли камайди. ВАС бўйича оғриқ даражаси ўртача $2,3 \pm 0,7$ баллгача тушди. Ҳаракат амплитудаси еса меъёрий кўрсаткичларга яқинлашди.

6-жадвал.

Функционал кўрсаткичларнинг динамикаси

Кўрсаткич	Бошланишида	Якунида
Оғриқ даражаси (ВАС)	7,1	2,3
Дорзифлексия	9,5°	16,8°
Плантарфлексия	22,4°	38,6°
Юришдаги ноқулайлик	100 %	13,3 %

Мазкур кўрсаткичлар тўпиқ бўғими ҳаракат функциясининг сезиларли даражада тикланганини кўрсатади.

Натижаларнинг клиник аҳамияти. Олинган натижалар ултратовуш диагностикасини реабилитация жараёнига интеграция қилиш клиник жиҳатдан асосли эканини тасдиқлади. УТТ назорати остида олиб борилган реабилитация жараёни беморларда тезроқ функционал тикланишга, оғриқ синдроминанги камайишига ва қайта шикастланиш хавфининг пасайишига олиб келди.

Шу тариқа, натижалар УТТ диагностикаси тўпиқ бўғими шикастланишларида нафақат ташхис қўйиш, балки даволаш ва реабилитация жараёнини самарали бошқариш воситаси эканини кўрсатди.

Хулоса. Ўтказилган илмий тадқиқот натижалари тўпиқ бўғими шикастланишларида ултратовуш текшируви (УТТ) диагностикасининг аҳамияти юқори эканини илмий ва амалий жиҳатдан асослаб берди. Тўпиқ бўғими инсон таянч-ҳаракат тизимининг энг кўп юклама тушадиган ва травмаларга мойил бўлган бўғимларидан бири бўлиб, унинг шикастланиши ҳаракат функциясининг кэскин бўзилишига, оғриқ синдроминанги кучайишига ва беморнинг кундалик ҳаёт сифатининг пасайишига олиб келади. Шу сабабли ушбу жароҳатларни ўз вақтида ва тўғри баҳолаш, самарали реабилитация дастурини ишлаб чиқиш замонавий тиббиётнинг долзарб вазифаларидан биридир.

Мазкур тадқиқот доирасида ултратовуш диагностикаси тўпиқ бўғими юмшоқ тўқималарининг ҳолатини баҳолашда ишончли, хавфсиз ва иқтисодий жиҳатдан самарали усул эканлиги аниқланди. Тадқиқот натижалари шуни кўрсатдики, УТТ ёрдамида боғламлар, пайлар ва атроф юмшоқ тўқималарнинг структуравий ўзгаришларини аниқ аниқлаш мумкин. Айниқса латерал боғламлар шикастланишлари, юмшоқ тўқималар шиши ва суюқлик тўпланиши каби ҳолатлар ултратовуш текширувида юқори аниқлик билан қайд этилди. Бу еса дастлабки ташхис қўйишда УТТ диагностикасининг аҳамиятини яққол намоён этди.

Тадқиқотнинг муҳим жиҳатларидан бири шундан иборат бўлдики, ултратовуш текшируви фақатгина ташхис қўйиш босқичида емас, балки реабилитация жараёнининг барча босқичларида мониторинг воситаси сифатида қўлланилди. Реабилитация жараёнида УТТ ёрдамида тўқималарнинг тикланиш динамикаси мунтазам кузатилиб, юкламалар беморнинг индивидуал ҳолатига мослаштирилди. Натижада реабилитация жараёнида қайта шикастланиш ҳолатлари минимал даражага тушди ва функционал тикланиш тезлашди.

Олинган натижалар шуни кўрсатдики, ултратовуш мониторинги остида олиб борилган реабилитация беморларда оғриқ синдроминанги сезиларли камайишига олиб келди. Визуал аналог шкала бўйича оғриқ даражасининг пасайиши беморларнинг субъектив ҳолатини яхшилаш билан бирга, реабилитация машғулотларини тўлиқ ва сифатли бажаришига имкон яратди. Ҳаракат амплитудасининг ошиши, бўғим стабилитетининг яхшиланиши ва юриш жараёнидаги ноқулайликларнинг камайиши еса реабилитация самарадорлигини тасдиқловчи муҳим клиник кўрсаткичлар бўлиб хизмат қилди.

Тадқиқот давомида аниқланганки, ултратовуш диагностикасининг муҳим афзалликларидан бири унинг динамик баҳолаш имкониятидир. Ҳаракат вақтида боғлам ва пайларнинг ҳолатини кўриш, уларнинг функционал барқарорлигини баҳолаш имконияти бошқа инструментал усулларга нисбатан

УТТ диагностикасини устун қўяди. Шу билан бирга, текширувнинг ноинвазивлиги ва нурланишсизлиги уни қайта-қайта қўллаш имконини беради, бу еса узоқ муддатли реабилитация жараёнида айниқса муҳимдир.

Мазкур тадқиқот натижалари шуни кўрсатадики, ултратовуш диагностикасини тўпик бўғими шикастланишларини даволаш ва реабилитация қилиш бўйича клиник протоколларга киритиш мақсадга мувофиқдир. УТТ ёрдамида олинган маълумотлар асосида индивидуал реабилитация дастурларини тузиш беморларнинг тезроқ соғайишига, меҳнат фаолиятига ва спорт машғулотларига қайтиш муддатини қисқартиришга хизмат қилади. Бу еса нафақат тиббий, балки ижтимоий-иқтисодий жиҳатдан ҳам муҳим аҳамиятга эга.

Шунингдек, тадқиқот давомида ултратовуш диагностикасининг иқтисодий самарадорлиги ҳам ётиборга молик жиҳат сифатида қайд этилди. Магнит-резонанс томография каби қиммат усулларга нисбатан УТТ арзонроқ, қулайроқ ва кенгроқ қўллаш имкониятига эга. Бу еса уни ҳудудий тиббиёт муассасалари ва реабилитация марказларида кенг жорий этиш имконини яратади.

Хулоса қилиб айтганда, тўпик бўғими шикастланишларида ултратовуш диагностикаси ҳаракат функциясини тиклаш жараёнида юқори самарадорликка эга бўлган замонавий усул ҳисобланади. УТТ диагностикасини реабилитация жараёнига интеграция қилиш клиник натижаларни яхшилади, реабилитация муддатини қисқартиради ва беморларнинг ҳаёт сифатини оширади.

Келгусида ушбу ёналишда беморлар сонини кўпайтирган ҳолда кенгроқ клиник тадқиқотлар олиб бориш, шунингдек ултратовуш диагностикасини бошқа реабилитация усуллари билан биргаликда қўллаш имкониятларини ўрганиш мақсадга мувофиқдир. Бу еса тўпик бўғими шикастланишларини даволаш ва реабилитация қилишнинг янада самарали ва илмий асосланган ёндашувларини ишлаб чиқишга хизмат қилади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Magee D.J. Orthopedic Physical Assessment. 7th ed. St. Louis: Elsevier; 2021.
2. Bianchi S., Martinoli C. Ultrasound of the Musculoskeletal System. Berlin: Springer; 2020.
3. Brukner P., Khan K. Clinical Sports Medicine. 5th ed. New York: McGraw-Hill; 2019.
4. Van Dijk C.N., Kerkhoffs G.M.M.J. Ankle ligament injuries: diagnosis, treatment and prevention. Journal of Sports Medicine. 2018;52(6):356–364.
5. Fong D.T., Hong Y., Chan L.K. A systematic review on ankle injury and ankle sprain in sports. Sports Medicine. 2017;37(1):73–94.
6. American College of Radiology. ACR–AIUM Practice Parameter for the Performance of a Musculoskeletal Ultrasound Examination. Reston; 2022.
7. Whittaker J.L., Stokes M. Ultrasound imaging and muscle function. Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy. 2019;49(8):572–583.
8. McNally E.G. Ultrasound of the ankle and foot. Seminars in Musculoskeletal Radiology. 2020;24(3):245–258.
9. Kjaer M., Langberg H., Heinemeier K. From mechanical loading to collagen synthesis, structural changes and function in human tendon. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports. 2018;19(4):500–510.
10. Cook J.L., Purdam C.R. Is tendon pathology a continuum? British Journal of Sports Medicine. 2019;43(6):409–416.
11. Hertel J. Functional instability following lateral ankle sprain. Sports Medicine. 2018;29(5):361–371.
12. Maffulli N., Longo U.G. Conservative management for ankle instability. Foot and Ankle Clinics. 2019;14(2):213–227.
13. Kane D., Balint P.V., Sturrock R. Musculoskeletal ultrasound — a state of the art review. Rheumatology. 2020;43(7):829–838.
14. Zikria B.A., Ozkan F.U. Role of ultrasound in ankle injuries. European Journal of Orthopaedic Surgery & Traumatology. 2021;31(4):689–696.
15. World Health Organization. Rehabilitation in health systems. Geneva: WHO; 2017.

Иқтибос учун: Равшанова М.З., Исақулов Э.Қ., Зоирова С.Ш. Тўпик бўғими шикастланишларида ҳаракат функциясини тиклашда утт диагностикасини қўллаш // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. — 2026. — № 4(24). — Б. 318–323. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19533381>

КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ПРОТЕОЗА У НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ**Караматуллаева З.Э.**

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Протейная инфекция (протеоз), вызываемая условно-патогенными бактериями рода *Proteus*, представляет серьезную проблему в неонатологии и педиатрии из-за риска тяжелого течения с поражением желудочно-кишечного тракта, развития эксикоза, нейротоксикоза и генерализации процесса, особенно у детей раннего возраста и пациентов с иммунодефицитами. В статье представлен анализ клинического случая протейной кишечной инфекции у новорожденного ребенка в возрасте 1,5 месяцев, госпитализированного в тяжелом состоянии в реанимационное отделение Самаркандской областной инфекционной больницы. Проведено клиническое наблюдение и бактериологическое исследование кала. Возбудитель отличается высокой природной устойчивостью к антибиотикам и дезинфектантам, что создает риск внутрибольничного инфицирования. Комплексный лечебный подход, основанный на данных антибиотикограммы и учитывающий возрастные особенности, а также строгое соблюдение санитарно-эпидемиологического режима, являются залогом успешного лечения и профилактики осложнений.

Ключевые слова: протеоз, протейная инфекция, *Proteus mirabilis*, новорожденные, кишечная инфекция, диагностика, антибиотикорезистентность

CLINICAL FEATURES OF THE COURSE OF PROTEOSIS IN NEWBORN CHILDREN**Karamatullayeva Z.E.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. *Proteus* infection (proteosis), caused by opportunistic bacteria of the genus *Proteus*, poses a serious challenge in neonatology and pediatrics due to the risk of severe disease progression, including gastrointestinal tract involvement, exsiccosis, neurotoxicosis, and generalization, especially in young children and immunocompromised patients. This article presents a clinical analysis of a case of *Proteus* intestinal infection in a 1.5-month-old newborn infant hospitalized in serious condition in the intensive care unit of the Samarkand Regional Infectious Diseases Hospital. Clinical observation and bacteriological examination of stool were conducted. The pathogen is highly naturally resistant to antibiotics and disinfectants, posing a risk of nosocomial infection. A comprehensive treatment approach based on antibiogram data and taking into account age-related factors, as well as strict adherence to sanitary and epidemiological regulations, are the key to successful treatment and the prevention of complications.

Key words: proteosis, *proteus* infection, *Proteus mirabilis*, newborns, intestinal infection, diagnostics, antibiotic resistance

ЯНГИ ТУҒИЛГАН ЧАҚАЛОКЛАРДА ПРОТЕОЗ ИНФЕКЦИЯСИ КЕЧИШ ХУСУСИЯТЛАРИ**Караматуллаева З.Э.**

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Шартли-патоген бактериялар - *Proteus* туркуми қўзғатадиган протей инфекцияси (протеоз) неонатология ва педиатрияда жиддий муаммо ҳисобланади. Бунинг сабаби, айниқса ёш болалар ва иммунитет танқислиги бўлган беморларда касалликнинг оғир кечиши, ошқозон-ичак трактининг зарарланиши, эксикоз, нейротоксикоз ривожланиши ва жараённинг оғирлашиши хавфидир. Ушбу мақолада Самарқанд вилоят юқумли касалликлар шифохонасининг реанимация бўлимига оғир аҳволда ётқизилган 1,5 ойлик чақалоқдаги протей ичак инфекциясининг клиник ҳолати таҳлили тақдим этилган. Касаллик таъхиси нажаснинг бактериологик текшируви асосида қўйилган. Қўзғатувчи антибиотиклар ва дезинфекцияловчи воситаларга нисбатан юқори табиий чидамлилиги билан ажралиб туради, бу эса касалхона ичи инфекциясининг юқиси хавфини тугдиради. Антибиотикограмма маълумотларига асосланган ва ёш хусусиятларини ҳисобга олган комплекс даволаш ёндашуви, шунингдек, санитария-эпидемиологик режимга қатъий риоя қилиш муваффақиятли даволаш ва асоратларнинг олдини олиш гаровидир.

Калим сўзлар: протеоз, протей инфекцияси, *Proteus mirabilis*, янги туғилган чақалоқлар, ичак инфекцияси, диагностика, антибиотикларга резистентлик.

e-mail: karamatullaevazebo@gmail.com

Введение. Протеоз или протейная инфекция это группа инфекционных заболеваний, вызываемых условно патогенными микробами из рода семейства *Proteus*, характеризующееся с преимущественным поражением желудочно-кишечного тракта и возможным развитием сепсиса.

Протейная кишечная инфекция представляет актуальную проблему неонатальной инфектологии, вследствие высокой частоты тяжелого течения и риска генерализации инфекции, особенно у детей раннего возраста. Ранняя лабораторная верификация диагноза с определением антибиотикочувствительности позволяет обосновать рациональную антибактериальную терапию и снизить риск осложнений.

Бактерии, вызывающие протеоз распространены повсеместно, их можно выделить из почвы, воды, воздуха, с предметов ухода за больными, медицинского инструментария. Источником инфекции является больной или носитель. Наибольшую эпидемиологическую опасность представляют больные с поражением кишечника и мочевыделительной системы. Передаются возбудители контактным и пищевым путем. Восприимчивы к протеозу преимущественно новорожденные и дети раннего возраста, а также больные с вторичными и первичными иммунодефицитами. Возбудители протеозов относятся к семейству *Enterobacteriaceae* роду *Proteus*. Это палочковидные перитрихальные аспорогенные грамотрицательные хемоорганотрофные факультативно-анаэробные подвижные бактерии, неприхотливые к условиям роста и питательным средам. Содержат Н и О антигены, на основании которых разделяются на большое количество сероваров. Род включает 5 видов: *P. vulgaris*, *P. mirabilis*, *P. morgani*, *P. retgari*, *P. inconstans*. Для всех видов протейных бактерий характерна высокая степень резистентности к антибактериальным препаратам, ультрафиолетовым лучам, дезинфектантам и другим физико-химическим факторам. Протеи могут стать причиной внутрибольничной инфекции. Характерной особенностью этих бактерий является способность вызывать у человека заболевания различной локализации и с полиморфной клинической картиной. Клинические варианты протейной инфекции включают в себя гнойно-воспалительные процессы в желудочно-кишечном тракте, мочевыводящих путях, органах дыхания, ЛОР-органах, костной ткани, возможны поражения мозговых оболочек, кожи. Заболевание как правило, протекает остро, однако возможно и хроническое рецидивирующее течение. У детей доминирующее положение занимает инфекции пищеварительного тракта, на втором месте по частоте - инфекции мочевыделительной системы. В примере одного больного мы проанализировали особенности течения протеозной инфекции.

Цель исследования: изучить клинико-эпидемиологические особенности протеоза у новорожденных детей.

Материалы и методы исследования: проведён ретроспективный анализ клинико-лабораторных данных новорождённых с протеозом, находившихся на стационарном лечении, с использованием бактериологического исследования кала, стандартных клинических, биохимических анализов крови и статистической обработки полученных результатов.

Обсуждение исследования: В Самаркандскую областную инфекционную больницу 28 июня 2024 года поступил новорожденный ребенок 1,5 мес, с признаками кишечной инфекции. После осмотра врачом приемного покоя, больной был госпитализирован в реанимационное отделение с диагнозом- острая кишечная инфекция. Жалобы при поступлении: на высокую лихорадку, рвоту многократного характера, жидкий стул инвазивного характера, беспокойство, плохой аппетит. Из анамнеза заболевания выяснилось, что болезнь началась бурно, с повышения температуры тела до 39 градусов, затем присоединилась рвота. Мать дала ибуфен, но состояние не улучшалось, присоединился жидкий стул инвазивного характера, ребенок стал капризным, ухудшился аппетит и после повторной рвоты на машине скорой помощи ребенок был доставлен в инфекционную больницу. Из анамнеза жизни выяснилось, что ребенок родился доношенным с весом 2,8 кг, рост 53см, закричал сразу, находится на грудном вскармливании. Состояние больного тяжелое, кожа и слизистые сухие, тургор кожи снижен, глазки запавшие температура тела 39,5 градусов, в легких везикулярное дыхание. Животе отмечается метеоризм, отмечается урчание по ходу кишечника, стул частый, инвазивного характера. Диурез снижен. Отмечаются признаки нейротоксикоза: мраморность кожных покровов, судорожная готовность, возбуждение. При бактериологическом исследовании кала больного были обнаружены: *Proteus mirabilis*. Бактериологические методы являются основополагающими, направленными на выделение и идентификацию бактерий, при кишечной форме протейной инфекции, необходимо наряду с видовой идентификацией установление чувствительности к антибактериальным препаратам.

При анализе данного клинического случая протеоза можно сделать следующие выводы- протейная кишечная инфекция сохраняет клиническую значимость среди бактериальных кишечных

инфекций, преимущественно поражая детей раннего возраста и пациентов с факторами риска. Ведущими этиологическими агентами заболевания являются *Proteus mirabilis*, обладающие выраженными факторами патогенности. Клиническое течение характеризуется вариабельностью симптомов - от легких гастроинтестинальных форм до тяжелых состояний с синдромом интоксикации и эксикоза. Диагностика заболевания должна базироваться на бактериологическом исследовании кала с обязательным определением антибиотикочувствительности возбудителя, что позволяет обосновать рациональную терапию, соблюдение профилактических санитарно-эпидемиологических мероприятий способствуют улучшению исходов, снижению частоты осложнений.

Заключение: Полученные данные подчеркивают необходимость ранней диагностики, динамического наблюдения и разработки оптимизированных алгоритмов ведения новорожденных с протеозом. Заболевание характеризуется полиморфизмом клинических проявлений, преобладанием гастроинтестинальных симптомов и выраженным интоксикационным синдромом. Комплексный лечебный подход с учетом возрастных особенностей способствуют улучшению клинических исходов заболевания. Результаты свидетельствуют о многообразии клинических проявлений заболевания и их зависимости от степени тяжести инфекционного процесса. Установлено, что своевременное выявление протеоза позволяет снизить риск развития осложнений и улучшить исходы заболевания у новорожденных. Представленные данные могут быть использованы в практическом здравоохранении для совершенствования диагностических и лечебно-профилактических мероприятий у детей данного возраста.

Список литературы:

1. Орзикулов, А. О., Ш. А. Рустамова, З. Э. Караматуллаева and Э. Ф. Ибрагимова. "COVID-19 инфекциясини даволашда антикоагулянтлар ўрни ва аҳамияти." Материалы международной научно-практической конференции с участием международных партнерских вузов, РР. 206-215.
2. ГМ Одилова, ША Рустамова. Иммунологические реакции при острой бактериальной дизентерии. Материалы конференции Молодежь и медицинская наука в XXI веке. 2019 гг. Страницы 177-178
3. Одилова Г. М., Рустамова Ш. А., Муротова З. Т. Клинико-лабораторные особенности течения кишечных инфекций сальмонеллезной этиологии у детей //Педиатр. - 2017. - Т. 8.
4. Орзикулов А. О., Рустамова Ш. А., Караматуллаева З. Э. Неврологические изменения при паротитной инфекции у взрослых (на примере Самаркандской области) //Uzbek journal of case reports. - 2023. - Т. 3. - №. 3. - С. 86-89.
5. Караматуллаева З.Э. Особенности течения кампилобактериоза у детей до года. Экономика и социум №1(140)-1 2026
6. Mustayeva G. B. et al. About the so-called prolonged or persistent diarrhea in children //American Journal of Technology and Applied Sciences. - 2024. - Т. 20. - С. 48-51
7. Рустамова Ш.А. «Республикамизда болаларда ўткир юкумли ичак касалликларининг иклимий ўзгаришлар билан боғлиқлигини таҳлил қилиш (Самарқанд вилояти миқёсида)». Биология ва тиббиёт муаммолари илмий амалий журнал. №3 (128) 2021 С.102-107.
8. Рустамова Ш. А., Кахрамонова А. К. Последствия у детей родившихся путем операции кесарево сечения (на примере Самаркандской области) //Uzbek journal of case reports. - 2023. - Т. 3. - №. 3. - С. 90-92.
9. Zhuraev Shavkat Abdukhudovich, YN Anvarovna, SA Rustamova, US Mukhtarovich, IS Buribaevna. Журнал «European Journal of Molecular and Clinical Medicine». Том 7. Номер 3. 2020. Страницы 2716-2721
10. Караматуллаева З.Э. «Современные подходы к предотвращению ботулизма» Экономика и социум №11(138)-1 2025 www.iupr.ru
11. Караматуллаева З. Э., Ибрагимова Э.Ф. Особенности течения паротитной инфекции у взрослых (на примере Самаркандской области). (2024). Современник аспекты паразитологии и актуальные проблемы кишечных инфекций, 1(1), 41
12. Караматуллаева, З. Э., Ибрагимова Э. Ф., Мустаева Г. Б. "Роль микроэлементов при заболевании COVID-19." International Scientific and Practical conference «COVID-19 and other topical infections of Central Asia» June 23-24, 2022, Shymkent.
14. Караматуллаева, З. Э., & Ибрагимова, Э. Ф. (2020). Значение D-димера в прогнозе течения COVID-19. J Thromb Haemost, 18(6), 1324-1329.

Для цитирования: Караматуллаева З.Э. Клинические особенности течения протеоза у новорожденных детей // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 4(24). – С. 324–326. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19533446>

ОПРЕДЕЛЕНИЕ АССОЦИАЦИИ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ COVID-19 С НЕАЛКОГОЛЬНОЙ ЖИРОВОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПЕЧЕНИ

Облокулов А.Р., Тагаева Л.М.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. В данной статье обобщены литературные и собственные данные о роли изучения связи неалкогольной жировой болезни печени с тяжелой степенью COVID-19. Определение взаимосвязи неалкогольной жировой болезни печени с тяжелой степенью COVID-19 в раннем периоде развития данного вирусного заболевания может помочь провести своевременную комплексную консервативную степень-связанную терапию, чтобы улучшить метаболизм углеводного и липидного обмена с последующим улучшением общего состояния пациента на восстановительном этапе клинического улучшения.

Ключевые слова: COVID-19, печень, НАЖБП, ожирение, сахарный диабет, метаболический синдром.

DETERMINING THE ASSOCIATION OF COVID-19 SEVERITY WITH NON-ALCOHOLIC LIVER FAT DISEASE

Oblokulov A.R., Tagaeva L.M.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. This article summarizes literature and personal data on the role of studying the relationship between non-alcoholic fatty liver disease and severe COVID-19. Determining the relationship of non-alcoholic fatty liver disease with severe COVID-19 in the early period of the development of this viral disease can help to conduct timely complex conservative degree-related therapy in order to improve the metabolism of carbohydrate and lipid metabolism, followed by an improvement in the patient's general condition at the recovery stage of clinical improvement.

Key words: COVID-19, liver, NAFLD, obesity, diabetes mellitus, metabolic syndrome.

COVID-19 КАСАЛЛИГИ ОВИРЛИК ДАРАЖАСИНИНГ ЖИГАРНИНГ АЛКОГОЛСИЗ ЁВЛИ КАСАЛЛИГИ БИЛАН БОВЛИҚЛИГИНИ АНИҚЛАШ

Облокулов А.Р., Тагаева Л.М.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Ушбу мақолада жигарнинг алкохолсиз ёғли касаллиги ва COVID-19 оғир кечилиши ўртасидаги боғлиқликни ўрганишнинг аҳамиятига доир адабий манбалар ҳамда шахсий тадқиқот маълумотлари умумлаштирилган. Ушбу вирусли касаллик ривожланишининг илк босқичида жигарнинг алкохолсиз ёғли касаллиги ва COVID-19 оғир даражаси ўртасидаги ўзаро боғлиқликни аниқлаш углевод ва липидлар алмашинувида яхшилашга қаратилган ўз вақтида, босқичли комплекс консерватив даволаш чораларини қўллашга ёрдам беради. Бу эса ўз навбатида, тикланиш даврида беморнинг умумий аҳволи яхшиланишига олиб келади.

Калит сўзлар: COVID-19, жигар, ЖАЁК, семизлик, қандли диабет, метаболик синдром.

e-mail: obloqulov.abdurashid@bsmi.uz

Обоснование актуальности темы. Коронавирусная болезнь 2019 (COVID-19) и ассоциированные с ним осложнения периферических органов, в результате нередко выраженного системного иммунного и цитокинового ответа организма, по сей день признаны Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) глобальной пандемией, представляющее собой беспрецедентную, серьезную, а также нерешенную медико-социальную и экономическую проблему здравоохранения [1].

Пандемия COVID-19 представляет собой крупнейший глобальный кризис в области общественного здравоохранения после пандемии гриппа 1918 года, которая была самой тяжелой пандемией в новейшей истории [2]. Согласно данным ВОЗ, «по состоянию на 7 декабря 2022 года у более 650 миллион человек мира был идентифицирован COVID-19, а количество смертельных случаев составило более 6,6 млн [3].

Одним из важнейших направлений развития современной медицины является разработка способов диагностики и прогнозирования степени тяжести общего состояния при COVID-19 на основе применения современного диагностического алгоритма с учетом наличия неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП) [4]. Особенность этих исследований на современном этапе заключается, с одной стороны, в углубленном изучении связи НАЖБП с тяжестью клинического течения COVID-19 и в анализе связи НАЖБП с продолжительностью восстановительного периода после полного курса лечения на основе анализа лабораторных показателей функции печени и метаболического синдрома [5].

Актуальность исследования определяется тем, что недостаточно выполнены исследования, направленные на изучение ассоциации НАЖБП с тяжелым течением COVID-19 независимо от наличия метаболического синдрома, а также имеются несколько сложностей в диагностике НАЖБП при отсутствии метаболического синдрома, что подтверждается возрастающим уровнем плохого контроля состояния больных на восстановительном этапе данного вирусного заболевания в сочетании с НАЖБП [6].

Комплексное лечение данного заболевания с полным пониманием сложных патофизиологических механизмов проникновения COVID-19 в клетку человека и изучением сложных, как и системных, так и локальных иммуно-воспалительных реакций является одним из наиболее сложных, глобальных разделов в современной вирусологии и на сегодняшний день проблемой далекой от своего разрешения [7,8].

В настоящее время при диагностике и лечении COVID-19 существуют ряд одобренных глобальных и национальных стратегии и сертифицированных вакцин, однако прогнозирование клинического течения COVID-19 с учетом наличия НАЖБП у пациентов данной категории с определением течение-ассоциированной лечебной стратегии в раннем периоде вирусного заболевания по сей день остаётся нерешенным вопросом современной медицины [9,10].

За годы независимости в нашей стране начата и продолжается широкомасштабная работа по социальной защите населения и реформирования системы здравоохранения. В вирусологии, в частности, в совершенствовании методов диагностики и консервативного лечения пациентов с COVID-19 различной клинической степени получены результаты положительного характера. Вместе с тем для прогнозирования клинических течений в раннем периоде данного вирусного системного заболевания, а также совершенствования протокола по своевременной профилактических и лечебных мероприятий исходя из прогнозируемой степени клинического течения у пациентов с НАЖБП требуются научно-обоснованные исследования.

Материал и методы. В данное ретроспективное исследование включены 105 пациента с COVID-19 типа и сопутствующей патологией - неалкогольной жировой болезнью печени в возрасте от 28 до 75 лет, госпитализированные в Бухарской инфекционной больницы. При госпитализации всем пациентам была проведена КТ печени.

Критерием исключения были пациенты с вторичными причинами НАЖБП (алкогольная болезнь печени, лекарственное поражение печени, аутоиммунный гепатит, вирусный гепатит, холестатическое заболевание печени и метаболическое/генетическое заболевание печени).

Положительный результат образцов ротоглотки и носовых мазков на COVID-19 определяли как положительный результат ПЦР-анализа с обратной транскриптазой в режиме реального времени.

Исследуемая популяция была разделена на две группы: в первую группу вошли 50 (31%) пациентов с COVID-9, у которых установлен НАЖБП, а во вторую - контрольную группу, вошли 55 (69%) пациента с COVID-9 без наличия НАЖБП.

У всех пациентов были изучены данные по общей характеристике и выполнены следующие лабораторные методы: демографические данные (возраст, пол, ИМТ), наличие сопутствующих заболеваний (сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, застойная сердечная недостаточность, хроническая почечная недостаточность, курение); лабораторные анализы: уровень АЛТ, АСТ, щелочной фосфатазы, гамма-глутамилтрансферазы, общего билирубина, амилазы и С-реактивного белка (СРБ) в крови.

Текущее исследование получило этическое одобрение этического комитета клиники. Информированное согласие было отклонено из-за ретроспективного неинтервенционного дизайна исследования.

Результаты. В период с сентября 2020 года по декабрь 2022 года пролечены 678 пациентов с COVID-19, из которых 105 пациента были включены в данное ретроспективное исследование с учетом критериев включения.

Средний возраст пациентов составил $58,2 \pm 14,4$ лет. Для устранения систематических погрешностей проведена стратификация исследуемых на две группы по наличию НАЖБП: первая группа – 50 (31%) пациентов с COVID-19; вторая группа – 55 (69%) пациента с COVID-19 без наличия НАЖБП. Средний индекс массы тела составил $27,2 \pm 2,8$ кг/м².

В группе НАЖБП у 31 пациента (56,3%) диагноз НАЖБП был поставлен с помощью компьютерной томографии, выполненной во время госпитализации в соответствии с новым определением метаболически ассоциированной жировой болезни печени и в остальных 24 случаях (43,7%) – данный диагноз был поставлен по данным анамнеза.

По данным исходных характеристик пациентов, пациенты с НАЖБП были статистически больше страдали ожирением ($p=0,015$), артериальной гипертензией ($p=0,028$), сахарным диабетом 2 типа ($p=0,03$), метаболическим синдромом ($p=0,015$) с более высоким уровнем гликированного гемоглобина ($p=0,036$), ферментов функции печени в сыворотке крови, а также с частой дислипидемией и более низким количеством лимфоцитов ($p=0,036$) по сравнению с группой без НАЖБП. Кроме того, у пациентов с НАЖБП был установлен более частое тяжелое течение COVID-19 по сравнению с пациентами без НАЖБП (34,5% против 18,0%; $p=0,001$, соответственно). Исходные характеристики исследуемых групп представлены в (табл. 1).

Таблица 1

Общая клиническая характеристика пациентов, n (%) или $\text{сред} \pm \text{СО}$

Показатели	Общее количество ($n=105$)	Группа с НАЖБП ($n=55$)	Группа без НАЖБП ($n=50$)	p
Возраст, лет	$58,2 \pm 14,4$	$61,1 \pm 11,1$	$62,4 \pm 11,7$	0,270
Женский пол, (%)	68 (64,7)	38 (69,1)	30 (60,0)	0,048
Индекс массы тела	$27,2 \pm 2,8$	$30,6 \pm 2,64$	$25,9 \pm 4,8$	0,015
Артериальная гипертензия, (%)	58 (55,2)	36 (65,4)	22 (44,0)	0,028
Сахарный диабет, (%)	35 (33,3)	$29,27 \pm 4,13$	$31,37 \pm 5,04$	0,03
Метаболический синдром, (%)	25 (23,8)	25 (45,4)	12 (24,0)	0,015
Курение, (%)	19 (18,1)	15 (27,7)	11 (22,0)	0,047
СРБ, мг/л	$2,3 \pm 1,9$	$5,1 \pm 1,3$	$2,7 \pm 1,1$	0,025
HbA1c, %	$6,2 \pm 0,8$	$7,0 \pm 0,9$	$6,4 \pm 0,3$	0,036
Триглицериды, ммоль/л	$1,8 \pm 5,4$	$2,1 \pm 0,2$	$1,68 \pm 0,4$	0,031
ЛПНП, ммоль/л	$1,3 \pm 0,5$	$1,4 \pm 0,2$	$1,1 \pm 0,3$	0,045
ЛПВП, ммоль/л	$0,8 \pm 0,1$	$0,4 \pm 0,1$	$0,8 \pm 0,2$	0,024
АСТ, ед/л	$128,4 \pm 21,4$	$158,5 \pm 18,8$	$132,4 \pm 28,6$	0,038
АЛТ, ед/л	$132,7 \pm 19,3$	$153,7 \pm 19,7$	$138,3 \pm 21,2$	0,025
Лимфопения, %	17 (16,2)	11 (20,0)	6 (12,0)	0,036
Тяжелое течение COVID-19	28 (26,6)	19 (34,5)	9 (18,0)	0,001

Примечание: НАЖБП – неалкогольная жировая болезнь печени; СРБ – с-реактивный белок; HbA1c – гликированный гемоглобин; ЛПНП – липопротеиды низкой плотности; ЛПВП – липопротеиды высокой плотности; АСТ – аспартатаминотрансфераза; АЛТ – аланинаминотрансфераза; COVID-19 – коронавирусная болезнь-19.

В нашей исследуемой когорте было 77 пациентов (73,3%) с нетяжелым течением COVID-19 и 28 (26,7%) пациентов с тяжелым течением данного вирусного заболевания. Пациенты с тяжелой формой COVID-19 больше страдали ожирением ($\text{ИМТ} > 30$ кг/м²) 89,3% против 42,8% ($p=0,031$); чаще являются активными курильщиками 64,3% против 14,3% ($p=0,001$), соответственно. Они также демонстрировали более высокие концентрации СРБ $4,8 \pm 1,4$ мг/л против $1,3 \pm 1,2$ мг/л ($p=0,002$), более высокие уровни АСТ $143,3 \pm 16,7$ ед/л против $82,3 \pm 22,1$ ед/л ($p < 0,001$), АЛТ $98,2 \pm 18,4$ ед/л против $69,5 \pm 21,2$ ед/л ($p < 0,001$), ГГТ $158,6 \pm 48,7$ ед/л против $110,6 \pm 44,6$ ед/л ($p=0,005$) и более низкое количество лимфоцитов $1,2 \pm 0,8 \cdot 10^9/\text{л}$ против $1,5 \pm 0,9 \cdot 10^9/\text{л}$ ($p=0,004$) (табл. 2).

Исходя из данных множественной логистической регрессии с целью изучения взаимосвязи между НАЖБП и степени тяжести COVID-19, пациенты с НАЖБП с большей вероятностью имели тяжелое течение заболевания COVID-19 [отношение шансов (ОШ) 4,13 (1,85-14,85; 95% доверительный интервал (ДИ)), $p=0,002$].

Таблица 2

Сравнительная клиническая характеристика пациентов в зависимости от наличия тяжелой степени COVID-19, n (%) или сред±СО

Показатели	Тяжелая степень COVID-19 (n=37)	Нетяжелая степень COVID-19 (n=68)	p
Возраст, лет	59,8±12,4	60,2±10,4	0,340
Ожирение (ИМТ >30 kg/m ²), %	25 (89,3)	33 (42,8)	0,031
Артериальная гипертензия, (%)	24 (85,7)	39 (50,6)	0,004
Сахарный диабет, (%)	29,27±4,13	31,37±5,04	0,03
Метаболический синдром, (%)	19 (67,8)	15 (19,5)	0,005
Активное курение, (%)	18 (64,3)	11 (14,3)	0,001
СРБ, мг/л	4,8±1,4	1,3±1,2	0,002
HbA1c, %	7,2±0,8	6,2±0,7	0,048
АСТ, ед/л	143,3±16,7	82,3±22,1	0,001
АЛТ, ед/л	98,2±18,4	69,5±21,2	0,002
ГГТ, ед/л	158,6±48,7	110,6±44,6	0,005
Лимфоциты *10 ⁹ /л	1,2±0,8	1,5±0,9	0,004

Примечание: COVID-19 – коронавирусная болезнь-19; СРБ – с-реактивный белок; HbA1c – гликированный гемоглобин; АСТ – аспартатаминотрансфераза; АЛТ – аланинаминотрансфераза; ГГТ – гамма-глутамилтрансептидаза

Были рассчитаны адаптированные ОШ (на возраст, курение, ИМТ и компоненты метаболического синдрома) для НАЖБП у обоих полов. При этом логистический регрессионный анализ показывает, что НАЖБП (мужчины: ОШ 3,18, 95% ДИ: 3,10-3,69, p=0,004; женщины: ОШ 4,17 (4,08- 4,58; 95% ДИ, p=0,001)), ожирение (мужчины: ОШ 2,58 (2,08-2,98; 95% ДИ, p=0,002; женщины: ОШ 3,49 (2,87-4,11; 95% ДИ, p=0,015), метаболический синдром (мужчины: ОШ 3,18 (3,0-3,48; 95% ДИ, p=0,004; женщины: ОШ 3,54 (3,29-3,87; 95% ДИ, p=0,003), сахарный диабет (мужчины: ОШ 3,45 (3,24-3,79; 95% ДИ, p=0,02; женщины: ОШ 3,15 (3,27-3,38; 95% ДИ, p=0,04), курение (мужчины: ОШ 1,98 (1,85-3,23; 95% ДИ, p=0,0001; женщины: ОШ 1,05 (1,0-1,2; 95% ДИ, p=0,07)) были связаны с тяжелой формой COVID-19.

Таблица 3

Предикторы тяжелой степени COVID-19 в зависимости от пола

Параметры	Мужчины ОШ (95% ДИ)	p	Женщины ОШ (95% ДИ)	p
НАЖБП	3,18 (3,10-3,69)	0,004	4,17 (4,08-4,58)	0,001
Ожирение	2,58 (2,08-2,98)	0,002	3,49 (2,87-4,11)	0,015
Метаболический синдром	3,18 (3,0-3,48)	0,004	3,54 (3,29-3,87)	0,003
Сахарный диабет	1,32 (0,6-2,91)	0,02	0,95 (0,84-1,09)	0,04
Курение	9,94 (3,16-31,22)	<0,001	11,37 (4,36-29,63)	0,07

Примечание: НАЖБП – неалкогольная жировая болезнь печени; ОШ – отношение шансов; ДИ – доверительный интервал.

Закключение. Наше исследование имеет несколько ограничений; основным ограничением является ретроспективный характер исследования. Во-вторых, небольшое количество пациентов с COVID-19 прошли КТ для диагностики НАЖБП.

В заключение, пациенты с НАЖБП имеют повышенный риск прогрессии тяжелого течения COVID-19 у обоих полов, особенно у женщин; НАЖБП, ожирение, гипертония и метаболический синдром были в значительной степени связаны с тяжелым течением COVID-19. Потенциальную роль компонентов НАЖБП и метаболического синдрома в развитии тяжелого течения COVID-19 еще предстоит выяснить в ходе больших проспективных исследований в ближайшем будущем.

Список литературы:

1. Lloyd-Jones G, Molayem S, Pontes CC, et al. The COVID-19 Pathway: A Proposed Oral-Vascular-Pulmonary Route of SARS-CoV-2 Infection and the Importance of Oral Healthcare Measures. *J Oral Med and Dent Res.* 2021;2(1):1-25.
2. Guan WJ, Ni ZY, Hu Y, et al.; China Medical Treatment Expert Group for Covid-19. Clinical characteristics of coronavirus disease 2019 in China. *N Engl J Med.* 2020;382:1708–1720.
3. World Health Organization – Weekly operational update on COVID-19 - 8 February 2022. Available at: <https://www.who.int/publications/m/item/weekly-epidemiological-update-on-covid-19---8-february-2022>.
4. Gao F, Zheng KI, Wang XB, et al. Obesity is a risk factor for greater COVID-19 severity. *Diabetes Care* 2020; 43:e72–e74.
5. Younossi ZM, Blissett D, Blissett R, et al. The economic and clinical burden of nonalcoholic fatty liver disease in the United States and Europe. *Hepatology.* 2016; 64:1577–1586.
6. Abd El-Kader SM, El-Den Ashmawy EM. Non-alcoholic fatty liver disease: The diagnosis and management. *World J Hepatol.* 2015;7:846–858.
7. Ahmed A, Wong RJ, Harrison SA. Nonalcoholic fatty liver disease review: diagnosis, treatment, and outcomes. *Clin Gastroenterol Hepatol.* 2015;13:2062–2070.
8. Nseir WB, Mograbi JM, Amara AE, Abu Elheja OH, Mahamid MN. Non-alcoholic fatty liver disease and 30-day all-cause mortality in adult patients with community-acquired pneumonia. *QJM.* 2019;112:95–99.
9. Lee CH, Choi SH, Chung GE, Park B, Kwak MS. Nonalcoholic fatty liver disease is associated with decreased lung function. *Liver Int.* 2018; 38:2091–2100.
10. Пинчук Т.В., Орлова Н.В., Суранова Т.Г., Бонкало Т.И. Механизмы поражения печени COVID-19. *Медицинский алфавит.* № 19/2020. Коморбидные состояния (1) 39-45.

Для цитирования: Облокулов А.Р., Тагаева Л.М. Определение ассоциации степени тяжести COVID-19 с неалкогольной жировой болезнью печени // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 4(24). – С. 327–331. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19533517>

THE IMPORTANCE OF INFLAMMATION MARKERS IN BRUCELLOSIS: DIAGNOSTIC, PROGNOSTIC, MONITORING, DIFFERENTIAL DIAGNOSIS, AND TREATMENT CONSIDERATIONS**Rashidova G.U.**

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. *Brucellosis is a widespread zoonotic infection caused by Brucella species, frequently complicated by osteoarticular involvement (10–85% of cases). Inflammation plays a central role in its pathogenesis due to intracellular persistence of the pathogen in macrophages. Traditional inflammatory markers such as C-reactive protein (CRP), erythrocyte sedimentation rate (ESR), white blood cell count, and derived ratios (neutrophil-to-lymphocyte ratio [NLR], platelet-to-lymphocyte ratio [PLR], systemic immune-inflammation index [SII]) serve as accessible, cost-effective tools for diagnosis, severity assessment, prediction of complications, differential diagnosis, and treatment monitoring, particularly in endemic regions. These markers help distinguish brucellosis from mimics like typhoid, tuberculosis, and viral fevers. They also guide prolonged antibiotic therapy (e.g., doxycycline + rifampin) and early detection of relapse. This review highlights the multifaceted value of inflammation markers in improving outcomes in resource-limited settings.*

Keywords: *Brucellosis; inflammation markers; C-reactive protein (CRP); erythrocyte sedimentation rate (ESR); neutrophil-to-lymphocyte ratio (NLR); osteoarticular involvement; differential diagnosis; treatment monitoring*

БРУЦЕЛЛЁЗДА ЯЛЛИГЛАНИШ МАРКЕРЛАРИНИНГ АҲАМИЯТИ: ДИАГНОСТИКА, ПРОГНОЗ, МОНИТОРИНГ, ДИФФЕРЕНЦИАЛ ДИАГНОСТИКА ВА ДАВОЛАШ МАСАЛАЛАРИ**Рашидова Г.Ў.**

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. *Бруцеллёз — Brucella туркумига мансуб бактериялар келтириб чиқарадиган кенг тарқалган зооноз инфекция бўлиб, кўпинча остеоартикуляр зарарланиш (10–85% ҳолларда) билан мураккаблашади. Яллигланиш жараёни касаллик патогенезида марказий ўрин тутadi, чунки патоген макрофагларда ҳужайра ичида сақланиб қолади. Анъанавий яллигланиш маркерлари — С-реактив оқсил (CRP), эритроцитлар чўкиш тезлиги (ESR), оқ қон ҳужайралари сони ҳамда ҳосил қилинган нисбатлар (нейтрофил-лимфоцит нисбати [NLR], тромбоцит-лимфоцит нисбати [PLR], тизимли иммун-яллигланиш индекси [SII]) — эндемик ҳудудларда диагностика, оғирлик даражасини баҳолаш, асоратлар башорати, дифференциал диагностика ва даволашни мониторинг қилиш учун қулай ва арзон воситалар ҳисобланади. Ушбу маркерлар бруцеллёзни тиф, сил ва вирусли иситмалардан фарқлашга ёрдам беради. Улар, шунингдек, узоқ муддатли антибиотик терапиясини (масалан, доксисиклин + рифампин) бошқариш ва релапсни эрта аниқлашда муҳимдир. Ушбу мақола ресурслари чекланган шароитларда яллигланиш маркерларининг кўп қиррали аҳамияти-ни таъкидлайди.*

Калит сўзлар: *Бруцеллёз; яллигланиш маркерлари; С-реактив оқсил (CRP); эритроцитлар чўкиш тезлиги (ESR); нейтрофил-лимфоцит нисбати (NLR); остеоартикуляр зарарланиш; дифференциал диагностика; даволаш мониторинги*

ЗНАЧЕНИЕ МАРКЁРОВ ВОСПАЛЕНИЯ ПРИ БРУЦЕЛЛЁЗЕ: ДИАГНОСТИКА, ПРОГНОЗ, МОНИТОРИНГ, ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА И АСПЕКТЫ ЛЕЧЕНИЯ**Рашидова Г.У.**

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. *Бруцеллёз — широко распространённая зоонозная инфекция, вызываемая видами Brucella, часто осложняющаяся остеоартикулярным поражением (в 10–85% случаев). Воспаление играет центральную роль в патогенезе заболевания из-за внутриклеточного персистирования возбудителя в макрофагах. Традиционные маркёры воспаления, такие как С-реактивный белок (СРБ), скорость оседания эритроцитов (СОЭ), количество лейкоцитов и производные соотношения (нейтрофильно-лимфоцитарный индекс [НЛИИ], тромбоцитарно-лимфоцитарный индекс [ТЛИИ], системный иммуно-воспалительный индекс [SII]), служат доступными и недорогими инструментами для диагностики, оценки тяжести, прогнозирования осложнений, дифференциальной диагностики и*

мониторинга лечения, особенно в эндемичных регионах. Эти маркёры помогают отличить бруцеллёз от таких заболеваний, как брюшной тиф, туберкулёз и вирусные лихорадки. Они также помогают управлять длительной антибиотикотерапией (например, доксициклин + рифампицин) и раннему выявлению рецидивов. Новые биомаркёры, такие как ирисин и цитокины, ещё больше повышают клиническую ценность. Данный обзор подчёркивает многогранную значимость маркёров воспаления для улучшения исходов в условиях ограниченных ресурсов.

Ключевые слова: Бруцеллёз; маркёры воспаления; С-реактивный белок (СРБ); скорость оседания эритроцитов (СОЭ); нейтрофильно-лимфоцитарный индекс (НЛИ); остеоартикулярное поражение; дифференциальная диагностика; мониторинг лечения

e-mail: rashidovaguljahon99@gmail.com

Introduction. Brucellosis remains a significant zoonotic disease, with global annual incidence conservatively estimated at 2.1 million cases, predominantly in Asia and Africa, though underreporting is common due to diagnostic challenges. In endemic areas (e.g., parts of Central Asia, China, Iran), incidence rates can exceed 35–84/100,000 in high-burden regions like Ningxia (average 35.08/100,000 from 2010–2024) or certain Iranian provinces (>200/100,000 historically). The acute phase features systemic inflammation from bacterial dissemination and host response, often complicated by osteoarticular involvement (10–85%, most frequently 20–40%; sacroiliitis in ~48–62%, peripheral arthritis in children)[9]. Inflammation markers offer rapid, inexpensive insights for diagnosis (complementing serology/culture), severity grading, complication prediction (e.g., focal forms in 30–40% of cases)[5], differential diagnosis, and monitoring response to antibiotics (e.g., doxycycline + rifampin). Their importance is amplified in settings with delayed confirmation, where early marker assessment prevents progression to chronicity.

This review details the inflammatory basis of brucellosis and evaluates key markers' statistical performance in diagnosis, prognosis, differential diagnosis, and management.

Etiopathogenesis of inflammation in brucellosis. *Brucella* species enter and survive within macrophages primarily through their Type IV secretion system and a structurally atypical, low-endotoxin LPS that blunts early TLR4 signaling. This strategy effectively dampens initial innate immune activation, limiting neutrophil recruitment while simultaneously favoring a robust Th1-polarized adaptive response characterized by elevated production of IFN- γ , TNF- α , IL-6, and IL-12.

Ongoing intracellular replication of the pathogen perpetuates a sustained cytokine storm, driving persistent inflammation, granuloma formation in affected tissues, and progressive tissue injury. These processes account for the marked elevation of classical acute-phase reactants—most notably CRP (induced mainly by IL-6) and fibrinogen (which accelerates ESR)—even though peripheral white blood cell counts are frequently normal or reduced (leukopenia) as a result of effective immune evasion and bone marrow suppression.

Key intracellular signaling cascades, including NF- κ B and MAPK pathways, become hyperactivated and amplify the inflammatory cascade, thereby contributing to the development of focal complications. Osteoarticular involvement is especially common (reported in 2–77% of cases depending on series and definition), while anemia occurs in 20–53% of pediatric acute brucellosis patients.

The observed heterogeneity in inflammatory biomarker profiles arises from the dual and opposing dynamics of the infection: strong suppression of certain innate immune arms contrasted with vigorous activation of adaptive (Th1) immunity.

Clinical importance of traditional inflammation markers. CRP and ESR serve as cornerstone acute-phase reactants in acute brucellosis. C-reactive protein (CRP) shows a rapid increase during active infection—commonly exceeding 10–50 mg/L—with reported diagnostic sensitivities of 65–80% and specificities around 72% (for example, one ROC analysis found 65% sensitivity and 72% specificity [1], while other studies report up to 77.8% sensitivity and 95% specificity at an optimal cut-off of 3.33 mg/L). CRP levels closely track disease severity and typically return to normal following successful treatment.

Erythrocyte sedimentation rate (ESR) is elevated in the majority of cases (70–76%), often ranging from >20–50 mm/h (e.g., mean 35.6 mm/h in patients vs. 12.2 mm/h in controls, $p < 0.001$). While valuable for longitudinal monitoring, ESR lacks the specificity of CRP.

White blood cell count (WBC) shows considerable variability: it is frequently normal or even reduced (leukopenia secondary to bone marrow suppression), though neutrophilia may occur in some patients; overall diagnostic performance is modest (sensitivity ~54%, specificity ~66%).

In complicated brucellosis (affecting 38–39% of cases overall), both ESR and CRP are markedly higher than in uncomplicated disease (e.g., ESR 48 vs. 38 mm/h, CRP 29 vs. 17 mg/L, $p < 0.001$), underscoring their prognostic utility [2].

These traditional markers are particularly effective for treatment follow-up: failure of CRP and/or ESR to normalize, or their secondary rise, strongly suggests relapse, treatment failure, or the emergence of focal complications.[19]

Derived hematological ratios and systemic indices. Derived hematological ratios and systemic inflammatory indices provide valuable insights into immune responses during brucellosis. For instance, the neutrophil-to-lymphocyte ratio (NLR) is frequently lower in affected patients (e.g., median 1.69 vs. 2.07 in controls, $p=0.013$; AUC 0.644), while the platelet-to-lymphocyte ratio (PLR) shows variable findings, the lymphocyte-to-monocyte ratio (LMR) tends to be elevated (median 5.28 vs. 4.12, $p=0.008$), and the systemic immune-inflammation index (SII) may be reduced in certain pediatric cohorts. These shifts mirror altered immune dynamics in the infection.

Multivariate or combined models, such as one integrating mean platelet volume (MPV) with erythrocyte sedimentation rate (ESR) and C-reactive protein (CRP), demonstrate markedly improved diagnostic accuracy (AUC 0.891, with 84% sensitivity and 86% specificity) compared to single markers.[3][6]

In pediatric and focal/complicated presentations, elevated neutrophil-to-monocyte ratio (NMR) and CRP levels serve as predictors of osteoarticular involvement (OI, occurring in ~23.7% of cases in some series; e.g., CRP 30.2 vs. 9.8 mg/L, $p=0.039$; accompanied by lower white blood cell counts, $p=0.015$). Additionally, reduced MPV is linked to the presence of complications ($p=0.038$), highlighting its potential prognostic significance[4].

Special considerations: pediatric and complicated brucellosis. Osteoarticular involvement (OI) occurs in 10–85% of brucellosis cases, with peripheral joint involvement being more frequent in children, while sacroiliitis is more commonly seen in adults. Pediatric studies report significantly higher CRP levels, lower white blood cell counts, and elevated NMR values in patients with osteoarticular disease ($p < 0.05$)[4]. These laboratory markers can help stratify risk, guiding decisions about the need for targeted imaging and extended treatment duration.[6][8][9][20]

Differential diagnosis using inflammation markers. Acute brucellosis mimics numerous conditions due to nonspecific symptoms (fever, malaise, arthralgia), complicating diagnosis in endemic areas. Key differentials include infectious etiologies (malaria, typhoid fever, tuberculosis, leptospirosis, viral infections like influenza or dengue) and noninfectious ones (collagen-vascular diseases, lymphoma, histiocytosis, sarcoidosis). Inflammation markers aid differentiation: in brucellosis, CRP and ESR are often markedly elevated (CRP >20 – 50 mg/L in 70–90% of cases; ESR >50 mm/h in 70–76%), but WBC is normal or low (leukopenia in 20–40%, neutrophilia absent in most), contrasting with pyogenic bacterial infections (e.g., pneumonia, abscess) where leukocytosis ($>10,000/\mu\text{L}$) and neutrophilia predominate. For malaria or typhoid, similar low WBC may occur, but CRP is typically lower in viral fevers (e.g., <10 mg/L in uncomplicated influenza). Derived ratios like NLR are lower in brucellosis (median 1.69–2.5) vs. higher in acute bacterial infections (e.g., >5 in sepsis). In osteoarticular presentations, markers distinguish from rheumatoid arthritis (higher ESR/CRP with positive autoantibodies) or sacroiliitis from ankylosing spondylitis (normal WBC, variable CRP)[13]. Combined with serology (e.g., Rose Bengal test positive in 88–90%), markers achieve high diagnostic accuracy (e.g., ELISA + elevated CRP/ESR AUC >0.85 for sacroiliitis)[14]. Novel markers like endocan (elevated in brucellosis) may further refine differentials from healthy controls or subacute/chronic forms.[12]

Treatment considerations and role of inflammation markers in monitoring. Treatment of brucellosis requires prolonged combination antibiotics to prevent relapse (rates 4.8–10% with suboptimal regimens) and chronicity. World Health Organization guidelines recommend doxycycline (100 mg twice daily) + rifampin (600–900 mg/day) for 6 weeks (relapse risk ~8–10%), or doxycycline + streptomycin (1 g/day IM for 2–3 weeks; relapse ~4–5%, more effective for prevention)[15]. Recent meta-analyses favor doxycycline + gentamicin (1–2 weeks; SUCRA efficacy ranking 0.94, relapse $<5\%$) or triple therapy (doxycycline + rifampin + aminoglycoside) for severe cases (e.g., endocarditis, meningitis; duration 4–6 months, case-fatality $<1\%$ with early intervention)[16]. For children <8 years, rifampin + trimethoprim-sulfamethoxazole (TMP-SMZ) for 6 weeks is preferred (avoid tetracyclines). In pregnancy, TMP-SMZ + rifampin is used (tetracyclines contraindicated). Inflammation markers guide therapy: baseline high CRP/ESR (>50 mg/L or >50 mm/h) predict need for prolonged courses; normalization (CRP <5 mg/L, ESR <20 mm/h) post-treatment indicates success (80–90% resolution in 2–3 weeks for uncomplicated cases). Persistent elevation (>2 – 4 weeks) signals relapse (10–15% risk) or complications, prompting extended therapy or adjunctive corticosteroids in severe inflammation. Cytokines (e.g., IL-6 decline) and ratios (NLR normalization) enhance monitoring, especially in resource-limited settings where culture (positive in 30–70%) is unavailable.[18]

Conclusion. Inflammatory biomarkers play a central role in the management of acute brucellosis, offering robust statistical support across multiple clinical domains. They aid in diagnosis (with CRP and ESR frequently achieving AUC values of 0.7–0.8 or higher), prognostication (elevated levels strongly associated with complicated disease, affecting 30–40% of cases), differential diagnosis (characteristic patterns, such as relatively low white blood cell counts, help distinguish brucellosis from bacterial mimics), and treatment monitoring—particularly relevant given the ongoing global burden of approximately 2.1 million new cases annually.

Both conventional markers (CRP, ESR) and derived hematological ratios (NLR, SII, among others) facilitate timely intervention in endemic regions, thereby helping to decrease long-term morbidity. When used in conjunction with established treatment protocols—most commonly doxycycline-based combination regimens—these tools contribute to improved patient outcomes.[19]

Future prospective studies validating combined biomarker models and establishing reliable diagnostic/prognostic cut-off values are expected to further refine and strengthen their clinical utility.

References:

1. Akya A, et al. Usefulness of Blood Parameters for Preliminary Diagnosis of Brucellosis. *Int J Infect.* 2020;7(1):e7125307.
2. Sen P, et al. Predictive Value of Inflammation Markers in Brucellosis. *Arch Iran Med.* 2019;22(12):710-716.
3. Çağlar Y, et al. Diagnostic Value of Hematological Inflammatory Ratios in Brucellosis. Preprints. 2025. doi:10.20944/preprints202510.1751.v1.
4. Böncüoğlu E, et al. Inflammatory marker comparison in childhood brucellosis: predicting osteoarticular involvement. *Turk J Pediatr.* 2025;67(2):1-10.
5. Xu N, et al. Improved Early Detection of Focal Brucellosis Complications with Anti-Brucella IgG. *J Clin Microbiol.* 2020;58(11):e00903-20.
6. Şahin AM, et al. The Role of Laboratory Parameters in Predicting Osteoarticular Involvement in Brucellosis. *EJMI.* 2025;9(1):47-53.
7. Erkan REC, et al. Investigation of new inflammatory biomarkers in patients with brucella. *Bratisl Lek Listy.* 2024;125(3):178-183.
8. Zhou L, et al. A novel diagnostic model for brucellosis spondylitis using serum PINP and inflammatory factors. *BMC Infect Dis.* 2025. doi:10.1186/s12879-025-12404-1.
9. Jin M, et al. Research progress on complications of Brucellosis. *Front Cell Infect Microbiol.* 2023;13:1136674.
10. Pappas G, et al. Brucellosis. *Lancet.* 2006;367(9523):1805-1815 (updated epidemiology references from 2023–2025 global estimates).
11. Demirdag K, et al. Serum cytokine levels in patients with acute brucellosis and their relation to the traditional inflammatory markers. *Pathogens and Disease.* 2003;39(2):149.
12. Brucellosis Differential Diagnoses. Medscape. Updated Sep 8, 2025.
13. Cift A, et al. Comparison of inflammatory markers between brucella and non-brucella epididymo-orchitis. *Int Braz J Urol.* 2018;44(4):771-778.
14. Barkay O, et al. Determining Diagnostic Sensitivity: A Comparison of Rose Bengal Test, Coombs Gel Test, ELISA and Bacterial Culture in Brucellosis Diagnosis. *Diagnostics.* 2024;14(14):1546.
15. Brucellosis Treatment & Management. Medscape. Updated Sep 8, 2025.
16. Huang S, et al. Updated therapeutic options for human brucellosis: A systematic review and network meta-analysis of randomized controlled trials. *PLoS Negl Trop Dis.* 2024;18(8):e0012402.
17. About Brucellosis. CDC. Updated May 2, 2024.
18. Alavi SM, et al. Treatment of brucellosis: a systematic review of studies in recent twenty years. *Caspian J Intern Med.* 2013;4(2):636-641.
19. Lavigne JP, et al. What's new in the diagnosis and treatment of human brucellosis? *Infect Dis Now.* 2025;55(3):104956.
20. Tekin R, et al. Comparison of Inflammatory Markers between Adult and Pediatric Brucellosis Patients. *Jundishapur J Microbiol.* 2020;13(8):e104058.

For citation: Rashidova G.U. The importance of inflammation markers in brucellosis: diagnostic, prognostic, monitoring, differential diagnosis, and treatment considerations // *Bulletin of Fundamental and Clinic Medicine.* – 2026. – № 4(24). – P. 332–335. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19533552>

СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ПОДРОСТКОВ 15 - 17 ЛЕТ И СИСТЕМА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ МОЛОДЁЖИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН ПО ДАННЫМ ВТОРИЧНОГО АНАЛИЗА

Амлаев К.Р., Атоева М.А.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. В данной статье проведен системный анализ состояния здоровья подростков на основе официальных статистических данных, характеризующих здравоохранение Узбекистана в 2025 году и выявлено, что для формирования качественного призывного контингента необходимо усилить профилактическую работу по туберкулёзу в Бухарской области и привлечь дополнительных детских психиатров.

Ключевые слова: подростки, здоровье, заболеваемость, туберкулёз, психические расстройства, Узбекистан, Бухарский регион.

THE HEALTH STATUS OF 15-17 YEAR-OLD ADOLESCENTS AND THE SYSTEM OF MEDICAL CARE FOR YOUTH IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN BASED ON SECONDARY ANALYSIS

Amlayev K.R., Atoyeva M.A.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. This article presents a systematic analysis of adolescent health conditions based on official statistical data characterizing healthcare in Uzbekistan in 2025. It is concluded that, in order to form a high-quality conscript contingent, it is necessary to strengthen tuberculosis prevention efforts in the Bukhara region and attract additional child psychiatrists.

Key words: adolescents, health, morbidity, tuberculosis, mental disorders, Uzbekistan, Bukhara region.

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА 15-17 ЁШЛИ ЎСМИРЛАРНИНГ САЛОМАТЛИГИ ҲОЛАТИ ВА ЁШЛАРГА ТИББИЙ ЁРДАМ КЎРСАТИШ ТИЗИМИНИНГ ТАҲЛИЛИ

Амлаев К.Р., Атоева М.А.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Ушбу мақолада Ўзбекистонда 2025-йилда соғлиқни сақлашни тавсифловчи расмий статистик маълумотлар асосида ўсмирлар саломатлиги ҳолатининг тизимли таҳлили келтирилган ва ҳарбий хизматга чақирув контингентини сифатли шакллантириш учун Бухоро вилоятида сил касаллиги бўйича профилактика ишларини кучайтириш ва қўшимча болалар психиатрларини жалб қилиш зарурлиги аниқланди.

Калит сўзлар: ўсмирлар, соғлиқни сақлаш, касалланиш, сил касаллиги, руҳий касалликлар, Ўзбекистон, Бухоро вилояти.

e-mail:karen.amlaev@bsmi.uz, atoyeva.mashhura@bsmi.uz

Состояние здоровья молодёжи призывного возраста является ключевым индикатором национальной безопасности и оборонного потенциала Республики Узбекистан. Изучение литературных источников по данной тематике показало, что состояние здоровья подростков в Республике Узбекистан характеризуется выраженными гендерными различиями. Эпидемиологические исследования выявили, что, например, распространённость бронхиальной астмы и других аллергических заболеваний среди подростков в целом выше, чем у детей до 14 лет, а внутри подростковой группы чаще болеют мальчики. Исследователи объясняют данный факт особенностями их поведения, такими как курение (в том числе пассивное), работа в запылённых условиях, а также с более высокой частотой аллергических факторов [4].

Установлено, что аналогичная тенденция наблюдается также в отношении ожирения и метаболических нарушений. Исследования подтверждают, что распространённость избыточной массы тела и ожирения у подростков демонстрирует устойчивый рост, причём у мальчиков эти показатели зача-

стую выше, чем у девочек [6]. По-видимому это обусловлено меньшим контролем питания, более высокой калорийностью рациона и менее регулярными обращениями к врачу со стороны юношей.

В то же время, в области психического здоровья наблюдается обратная картина. Глобальные и региональные данные [7,8,9], включая исследования ВОЗ, указывают на то, что депрессивные расстройства и тревога чаще диагностируются у девочек-подростков, тогда как расстройства поведения и злоупотребление психоактивными веществами - у мальчиков. По Узбекистану открытые данные по данной тематике ограничены, однако клинические наблюдения свидетельствуют о близости структуры заболеваемости подростков к мировым тенденциям.

На основании научных работ можно выделить несколько ключевых трендов в состоянии здоровья молодёжи. Отмечено, что неинфекционные заболевания (ожирение, бронхиальная астма, аллергии, болезни опорно-двигательного аппарата) демонстрируют устойчивый рост частоты среди подростков. Кроме того, установлено, что подростки-мальчики демонстрируют существенно более высокую заболеваемость травмами и последствиями внешних причин (дорожные происшествия, спортивные и бытовые травмы) по сравнению с девочками, что полностью соответствует структуре рискованного поведения [1,2,3].

В официальных обзорах по здравоохранению в Узбекистане в последние годы фиксируется общий рост заболеваемости населения, особенно по неинфекционным болезням (органов дыхания, системы кровообращения, эндокринные заболевания, травмы). Доля подростков в общей структуре заболевших остаётся значимой, однако детализация данных по полу и возрасту в открытых источниках, как правило, отсутствует. Несмотря на принимаемые меры по укреплению общественного здоровья, в научной литературе Узбекистана отсутствуют комплексные, системные исследования, посвящённые анализу заболеваемости именно этой социально-демографической группы.

Целью настоящей работы является обобщение и анализ имеющихся данных за период с 2021 по 2024 годы, а также выявление существующих пробелов в научном знании.

Материалы и методы. В работе использован метод анализа вторичных данных. Объектом исследования стали официальные статистические данные «Здравоохранение в Узбекистане» за 2025 год [5]. Проанализированы следующие блоки информации:

- Демографические показатели Республики Узбекистан и Бухарской области (2021-2024 гг.).
- Заболеваемость подростков 15-17 лет по основным классам болезней, туберкулёзу, болезням, передаваемым половым путём, и психическим расстройствам.
- Заболеваемость населения ВИЧ-инфекцией по возрастным группам.
- Сеть медицинских учреждений для оказания помощи подросткам (детские поликлиники, койки, обеспеченность врачами).

Результаты исследования: Общие демографические показатели. В период 2021-2024 гг. в Республике Узбекистан наблюдалась положительная динамика основных демографических показателей:

Таблица 1.

Основные демографические показатели Республики Узбекистан (2021-2024 гг.)

Показатель	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Общий коэффициент рождаемости, ‰	22,3	22,8	23,4	23,7
Общий коэффициент смертности, ‰	5,1	5,0	4,9	4,8
Естественный прирост, ‰	17,2	17,8	18,5	18,9
Младенческая смертность (на 1000 родившихся)	16,3	15,8	15,2	14,7

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении увеличилась с 72,4 года в 2021 г. до 74,1 года в 2024 г. При этом сохраняется гендерный разрыв: у женщин показатель достиг 76,3 года, у мужчин - 71,8 года.

Демографическая ситуация в Бухарской области. Бухарская область демонстрирует менее благоприятные демографические показатели по сравнению со средне республиканскими.

Ожидаемая продолжительность жизни в Бухарской области составила 72,8 года в 2024 г., что на 1,3 года ниже средне республиканского показателя. Гендерный разрыв сохраняется: 74,9 года у женщин и 70,6 года у мужчин.

Заболеваемость подростков в возрасте 15-17 лет по основным классам болезней. В 2024 г. зарегистрировано 1 961,1 тыс. случаев заболеваний с впервые установленным диагнозом среди подростков 15-17 лет.

Таблица 2.

Демографические показатели Бухарской области (2021-2024 гг.)

Показатель	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	РУзбекистан, 2024 г.
Рождаемость, ‰	20,6	21,0	21,4	21,8	23,7
Смертность, ‰	5,6	5,5	5,3	5,2	4,8
Естественный прирост, ‰	15,0	15,5	16,1	16,6	18,9
Младенческая смертность, ‰	18,4	17,8	17,1	16,3	14,7

Таблица 3.

Заболеваемость подростков Узбекистана 15-17 лет по основным классам болезней (2024 г.)

Класс болезней по МКБ-10	Число случаев, тыс.	% от общего числа
Всего	1 961,1	100,0
Из них:		
некоторые инфекционные и паразитарные болезни	127,6	6,5
новообразования	4,7	0,2
болезни эндокринной системы, расстройства питания, нарушения обмена веществ	91,4	4,7
болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм	177,2	9,0
психические расстройства и расстройства поведения	2,9	0,1
болезни нервной системы	85,2	4,3
болезни глаза и его придаточного аппарата	115,9	5,9
болезни уха и сосцевидного отростка	81,7	4,2

Заболеваемость активным туберкулёзом подростков 15-17 лет.

Таблица 4.

Заболеваемость подростков 15-17 лет активным туберкулёзом (2021-2024 гг.)

Показатель	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Выявлено больных с впервые установленным диагнозом, человек	1 250	1 145	990	1 053
На 100 000 подростков	79,3	70,0	57,2	55,7
Из них с диагнозом туберкулёза органов дыхания, человек	55	49	63	17
На 100 000 подростков	3,5	3,0	3,5	0,9
Численность больных, состоящих на учёте (на конец года), человек	8 364	8 618	8 848	9 057
На 100 000 подростков	530,9	526,9	494,3	479,2

Отмечается устойчивая тенденция к снижению заболеваемости активным туберкулёзом среди подростков 15-17 лет: с 79,3 до 55,7 случая на 100 000 подростков за четырёхлетний период (-29,8%).

Заболеваемость болезнями, передаваемыми половым путём, подростков 15-17 лет

Таблица 5.

Заболеваемость подростков 15-17 лет болезнями, передаваемыми преимущественно половым путём (2024 г.)

Нозологическая форма	Число случаев	На 100 000 подростков
Сифилис, всего	6	0,3
Гонорея, всего	1	0,1
Трихомоноз, всего	1	0,1
Хламидиоз, всего	1	0,1

Заболеваемость психическими расстройствами подростков 15-17 лет

Таблица 6.

Заболеваемость подростков 15-17 лет психическими расстройствами и расстройствами поведения (2024 г.)

Показатель	Число случаев	На 100 000 подростков
Взято под диспансерное наблюдение больных с впервые установленным диагнозом, всего	2 933	155,1
Из них с диагнозом:		
психозы и состояния слабоумия, всего	17	0,9
в том числе шизофрения	26	1,4
психические расстройства непсихотического характера	82	4,3
умственная отсталость (олигофрения)	216	11,4
Обратилось больных за консультативно-лечебной помощью, всего	563	29,8

Таблица 7.

Контингент подростков 15-17 лет, больных психическими расстройствами и расстройствами поведения (на конец 2024 г.)

Показатель	Число человек	На 100 000 подростков
Численность больных, состоящих на учёте в лечебно-профилактических учреждениях, всего	9 057	479,2
Из них с диагнозом:		
психические расстройства и умственная отсталость, всего	453	24,0
в том числе шизофрения	149	7,9
психические расстройства непсихотического характера	1 335	70,6
умственная отсталость (олигофрения)	3 220	170,4

Заболеваемость психическими расстройствами, связанными с употреблением психоактивных веществ, подростков 15-17 лет

Таблица 8.

Заболеваемость подростков 15-17 лет психическими расстройствами и расстройствами поведения, связанными с употреблением психоактивных веществ (2024 г.)

Показатель	Число случаев	На 100 000 подростков
Взято под диспансерное наблюдение больных с впервые установленным диагнозом:		
алкоголизмом и алкогольными психозами, всего	17	0,9
наркоманией, всего	26	1,4
токсикоманией, всего	82	4,3
Кроме того, взято на профилактический учёт в связи с употреблением вредных веществ:		
алкоголя, всего	216	11,4
наркотических веществ, всего	563	29,8

Наибольшая заболеваемость ВИЧ-инфекцией отмечена в возрастной группе 20-29 лет (15,4 случая на 100 000 населения), что указывает на необходимость усиления профилактической работы среди молодёжи допризывного и призывного возраста.

Сеть медицинских учреждений для оказания помощи подросткам. В республике Узбекистан функционировало 486 детских поликлиник (отделений).

Таблица 9.

Заболеваемость населения ВИЧ-инфекцией по возрастным группам (2024 г.)

Возрастная группа, лет	Число случаев	На 100 000 населения соответствующего возраста
Всего	3 293	9,0
Из них:		
0-14	81	1,1
15-19	390	5,4
20-29	1 108	15,4
30-39	805	11,1
40 лет и старше	909	12,6

Таблица 10.

Сеть детских поликлиник Узбекистана и обеспеченность педиатрами (2021-2024 гг.)

Показатель	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Число детских поликлиник (отделений), ед.	535	688	573	486
Численность врачей всего, тыс.	95,6	100,5	105,7	107,5
На 10 000 населения	27,1	27,9	29,0	28,6
Педиатры всего, тыс.	5,0	6,0	4,6	9,4
Средний медперсонал всего, тыс.	372,5	382,8	387,6	353,8
На 10 000 населения	105,6	106,3	105,3	94,2

Отмечается сокращение числа детских поликлиник с 688 в 2022 г. до 486 в 2024 г., что связано с реорганизацией сети медицинских учреждений. При этом обеспеченность педиатрами на 10 000 детей увеличилась с 5,5 в 2022 г. до 8,3 в 2024 г.

Койки для больных детей

Таблица 11.

Число коек для больных детей по регионам (на конец 2024 г.)

Регион	Число коек, тыс.
Республика Узбекистан	48,4
г. Ташкент	13,4
Республика Каракалпакстан	2,1
Андижанская область	4,2
Бухарская область	3,4
Джизакская область	2,5
Кашкадарьинская область	2,8
Навоийская область	1,9
Наманганская область	3,8
Самаркандская область	4,6
Сурхандарьинская область	2,9
Сырдарьинская область	1,8
Ташкентская область	3,5
Ферганская область	4,8
Хорезмская область	2,7

В Бухарской области обеспеченность койками для больных детей составляет 47,9 на 10 000 детей, что близко к средне республиканскому показателю (48,4).

Таблица 12.

Распределение детских врачей по отдельным специальностям (2024 г.)

Специальность	Число врачей, человек	На 10 000 детей
Педиатры всего	8 111	7,1
Из них:		
хирурги	1 654	1,5
офтальмологи	133	0,1
отоларингологи	203	0,2
невропатологи	711	0,6
психиатры	86	0,08
стоматологи	747	0,7
гинекологи	159	0,3

Обсуждение полученных результатов: За период 2021-2024 гг. в Республике Узбекистан наблюдалась положительная динамика в отношении индикаторов общественного здоровья: общий коэффициент рождаемости вырос с 22,3 до 23,7‰, а младенческая смертность снизилась с 16,3 до 14,7 на 1000 родившихся. Однако Бухарская область демонстрирует менее благоприятные показатели: рождаемость в 2024 г. составила 21,8‰ против 23,7‰ в среднем по республике, а младенческая смертность - 16,3‰ против 14,7‰.

В 2024 г. среди подростков 15-17 лет зарегистрировано 1 961,1 тыс. случаев заболеваний с впервые установленным диагнозом. Наиболее распространены болезни крови и кроветворных органов (9,0%), эндокринной системы (4,7%) и нервной системы (4,3%). Особую тревогу вызывает заболеваемость психическими расстройствами: на учёте состоит 9 057 подростков (479,2 на 100 000), из них 3 220 с умственной отсталостью (170,4 на 100 000). Также отмечается употребление психоактивных веществ: 563 подростка находятся на профилактическом учёте за употребление наркотиков.

Бухарская область характеризуется более высокой заболеваемостью активным туберкулёзом среди подростков (68,3 случая на 100 000) по сравнению со средне республиканским уровнем (55,7 случая на 100 000). При этом обеспеченность койками для больных детей (47,9 на 10 000) близка к республиканскому показателю (48,4 на 10 000). В 2024 г. в республике функционировало 486 детских поликлиник. Обеспеченность педиатрами на 10 000 детей увеличилась до 8,3. Однако обеспеченность узкими специалистами крайне низкая: на 10 000 детей приходится всего 0,08 психиатра, что создаёт серьёзные барьеры для раннего выявления и лечения психических расстройств.

Проведённый анализ позволяет сделать вывод, что состояние здоровья подростков в Узбекистане неоднородно и напрямую зависит от региональных факторов. Наиболее уязвимой группой являются юноши, проживающие в экологически депрессивных регионах, таких как Приаралье. Несмотря на наличие отдельных качественных работ, в научной литературе наблюдаются серьёзные пробелы. В массиве статистических показателей отсутствуют данные по возрастной группе 18-30 лет, факторам риска поведения подростков (курение, употребление алкоголя), а также результаты допризывных медицинских осмотров юношей допризывного возраста. Это затрудняет проведение глубокого анализа и разработку целевых программ профилактики для призывного контингента.

Выводы и рекомендации. На основании проведённого анализа сделаны следующие выводы:

1. Состояние здоровья подростков 15-17 лет характеризуется ростом неинфекционных заболеваний и высокой нагрузкой, вызванной психическими расстройствами.
2. Бухарская область имеет более неблагоприятные демографические и эпидемиологические показатели по сравнению со средне республиканским уровнем, особенно по заболеваемости туберкулёзом.
3. Крайне низкая обеспеченность психиатрами (0,08 на 10 000 детей) является системной проблемой, требующей немедленного решения.

Органам управления здравоохранением всех уровней рекомендуется:

- Усилить профилактическую работу и раннее выявление туберкулёза среди подростков в Бухарской области.
- Принять меры по усилению подготовки и привлечению детских психиатров, особенно в сельские районы.
- Обеспечить публикацию в статистических сборниках данных по возрастной группе 18-30 лет и результатам допризывных осмотров для проведения комплексного мониторинга здоровья призывного контингента.

Список литературы:

1. Амлаев К.Р., Атоева М.А. Здоровье юношей в Узбекистане. Современное состояние проблемы, вызовы и стратегии профилактики./Новый день в медицине. 2025, 9(83). Стр. 273-280.
2. Васильева Е. Б. Здоровое молодое поколение в Узбекистане // Проблемы науки. 2021. №3 (62). URL : <https://cyberleninka.ru/article/n/zdorovoe-molodoe-pokolenie-v-uzbekistane> (дата обращения: 21.05.2025).
3. Еркудов В.О., Заславский Д.В., Пуговкин А.П., Матчанов А.Т., Розумбетов К.У., Даулетов Р.К., Есемуратова С.П., Нажимов И.И., Пузырев В.Г. Антропометрические характеристики молодежи Приаралья (Узбекистан) в зависимости от степени экологического неблагополучия территории // Экология человека. - 2020. - №10. - С. 45-54.
4. Нурмаматова К.Ч. Основные показатели заболеваемости детей бронхиальной астмой в Республике Узбекистан // Молодой ученый. - 2020. - № 17 (307). - С. 322-325.
5. Республиканский центр гигиены и эпидемиологии. Здравоохранение в Узбекистане: Статистический сборник. Ташкент: Госкомстат РУз; 2025. 248 с.
6. Таланцева В.К., Волкова Т.И., Пьянзина Н.Н., Платунов А.И. Анализ индекса массы тела у студентов вузов России и Узбекистана // Известия ТулГУ. Физическая культура. Спорт. - 2021. - №4. - С. 68-73.
7. CDC. Adolescent and School Health. - Atlanta: Centers for Disease Control and Prevention, 2023.
8. World Health Organization (WHO). Global Accelerated Action for the Health of Adolescents (AA-HA!): Guidance to support country implementation. Доступ: <https://www.who.int/publications/i/item/9789241512343>
9. Youth of Central Asia: challenges for peacebuilding (UNESCO, 2021) - contains sections on youth health, risk behavior and factors important for conscripts.

Для цитирования: Амлаев К.Р., Атоева М.А. Состояние здоровья подростков 15 - 17 лет и система медицинской помощи молодёжи в республике узбекистан по данным вторичного анализа // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 4(24). – С. 336–342. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19533583>

ГИПЕРТЕНЗИВ КАСАЛЛИКЛАРГА ЧАЛИНГАН ҲОМИЛАДОР АЁЛЛАРДА ЭНДОТЕЛИАЛ ДИСФУНКЦИЯ ЮЗАГА КЕЛИШИДА ЎТКИР РЕСПИРАТОР ИНФЕКЦИЯЛАРНИНГ РОЛИ: ҚИСҚАЧА ШАРҲ

Дўстова Н.К., Салимова Т.Б.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Ушбу шарҳ грип касаллиги ва унинг ҳомиладорларда кечиши хусусиятларини ўзига мужассамлаштирган. XX аср инфектологиясида эришилган улкан ютуқларга қарамай, грип ҳозирги кунгача деярли назорат қилиб бўлмайдиган глобал инфекция бўлиб қолмоқда ва катта ижтимоий-иқтисодий зарар етказмоқда. Ҳозирги кунда грип ва бошқа ўткир респиратор вирусли касалликлар нафақат аёлнинг ҳаёти ва соғлиги учун хавф тугдириши, балки ҳомиладорликни тохтатиши хавфини бир неча баробар ошириши, шунингдек, тузруқ ва тузруқдан кейинги давр асоратларининг ривожланишига олиб келиши умум этироф этилган. Аҳоли орасида вирусларнинг кенг тарқалиши ва ушбу касалликлар гуруҳининг инсонда ҳомиладорлиқнинг кечиши ҳамда натижасига тасир механизмлари ҳақидаги малумотларнинг қарама-қарши эканлиги ҳомиладорлик, ҳомила ва янги туғилган чақалоқ патологиясининг ривожланишида ОРВИ нинг ролини янада чуқур ўрганиши зарурлигини белгилайди.

Калит сўзлар: эндотелиал дисфункция, ўткир респиратор инфекция, гипертензив касалликлар

THE ROLE OF ACUTE RESPIRATORY INFECTIONS IN THE OCCURRENCE OF ENDOTHELIAL DYSFUNCTION IN PREGNANT WOMEN WITH HYPERTENSIONIC DISEASES: A BRIEF OVERVIEW

Dustova N.K., Salimova T.B.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. This review summarizes the characteristics of influenza and its course in pregnant women. Despite the tremendous achievements of 20th-century infectiology, influenza remains an almost uncontrollable global infection and causes significant socio-economic damage. Currently, it is generally recognized that influenza and other acute respiratory viral diseases not only pose a threat to a woman's life and health, but also increase the risk of termination of pregnancy several times, as well as lead to the development of complications in childbirth and the postpartum period. The widespread prevalence of viruses among the population and the contradictory nature of data on the mechanisms of influence of this group of diseases on the course and outcome of pregnancy in humans determine the need for a more in-depth study of the role of ARVI in the development of pathology of pregnancy, fetus, and newborn.

Keywords: endothelial dysfunction, acute respiratory infection, hypertensive diseases

РОЛЬ ОСТРЫХ РЕСПИРАТОРНЫХ ИНФЕКЦИЙ В ВОЗНИКНОВЕНИИ ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ У БЕРЕМЕННЫХ С ГИПЕРТЕНЗИОННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ: КРАТКИЙ ОБЗОР.

Дустова Н.К., Салимова Т.Б.

Бухарский государственный медицинский институт им. Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Этот обзор включает в себя особенности гриппа и его течения у беременных. Несмотря на огромные достижения в инфектологии XX века, грип до сих пор остается практически неконтролируемой глобальной инфекцией и наносит значительный социально-экономический ущерб. В настоящее время общепризнано, что грип и другие острые респираторные вирусные заболевания не только представляют опасность для жизни и здоровья женщины, но и в несколько раз увеличивают риск прерывания беременности, а также приводят к развитию осложнений родов и послеродового периода. Широкое распространение вирусов среди населения и противоречивые данные о механизмах влияния этой группы заболеваний на течение и исход беременности у человека определяют необходимость более глубокого изучения роли ОРВИ в развитии патологии беременности, плода и новорожденного.

Ключевые слова: эндотелиальная дисфункция, острая респираторная инфекция, гипертензивные заболевания

e-mail: nigora_dustova@bsmi.uz; salimova.toxtajan@bsmi.uz

Ҳозирги кунда грипп ва бошқа ўткир респиратор вирусли касалликлар нафақат аёлнинг ҳаёти ва соғлиғи учун хавф туғдириши, балки ҳомиладорликни тўхтатиш хавфини бир неча баробар ошириши, шунингдек, туғруқ ва туғруқдан кейинги давр асоратларининг ривожланишига олиб келиши умум эътироф этилган. 2009–2010 йиллардаги А(Н1Н1) гриппи пандемияси ва унинг салбий оқибатлари ҳомиладорлик даврида грипп ва унинг асоратларини ўз вақтида аниқлаш ва даволаш бўйича ташкилий ҳамда даволаш-диагностик чора-тадбирларни такомиллаштиришга асос бўлди. Гипертензив касалликлар (айниқса преэклампсия ва гестацион гипертензия) ҳомиладорлик даврида она ва ҳомила учун юқори хавф туғдиради. Ушбу ҳолатларнинг патогенезида эндотелиал дисфункция марказий ўрин тутди. Сўнгги йилларда ўткир респиратор инфекциялар (ЎРИ) — жумладан, COVID-19, Грипп ва бошқа вирусли респиратор касалликлар — эндотелиал шикастланишни кучайтирувчи омил сифатида кўриб чиқилмоқда. [4].

Ҳозирги пайтда мавжуд бўлган қон-томир ва эндотелиал омиллар, яъни эндотелий дисфункцияси (ЭД) маркерларининг таъсири ҳақидаги маълумотлар уларнинг плацента ангиогенези жараёнларидаги роли ва трофобластнинг функционал фаоллигига таъсирини кўрсатади. Бу эса ҳомиладорлик ва туғруқ асоратларининг патогенезида ушбу омиллар иштирок этиши мумкинлигини тахмин қилишга имкон беради, чунки ҳомиладорлик пайтида ОРВИ билан оғриган аёлларда бундай асоратлар частотаси сезиларли даражада ошади [5–7]. Ҳомиладор аёлларда ЭД маркерлари ҳақидаги чуқурлаштирилган маълумотлар, ушбу омиллар даражасининг динамикасини таҳлил қилиш ва уларнинг ҳомиладор аёл ҳамда ҳомила организмга таъсирини ўрганиш профилактик чора-тадбирларни ўз вақтида амалга ошириш имконини беради, деб тахмин қилиш мантикийдир.

1918, 1957 ва 2009 йиллардаги грипп пандемиялари маълумотлари шуни кўрсатадики, ҳомиладор аёлларда грипп билан касалланиш ва унга боғлиқ ўлим даражаси ҳомиладор бўлмаганларга нисбатан юқорироқ бўлган. 1918 йилдаги Н1Н1 грипп пандемияси ҳақидаги (n=1350) маърузада ҳомиладор беморларнинг ярмида пневмония ривожлангани, уларнинг тахминан 50% и вафот этгани, ўша даврда ҳомиладорлар орасида ўлим 27% ни ташкил этгани хабар қилинган [8]. 1957 йилдаги Н2Н2 грипп пандемияси вақтида ҳам ҳомиладорлик хавф омил сифатида белгиланган. 1957–1958 йилларда Миннесота штатида ўтказилган тадқиқотда грипп ҳомиладорлик даврида ўлимнинг етакчи сабаби бўлган — ҳомиладорлик вақтида ўлим ҳолатларининг қарийб 20% и грипп билан боғлиқ эди. 1957–1958 йиллар давомида гриппдан вафот этган репродуктив ёшдаги аёлларнинг ярми ҳомиладор бўлган [3].

ЖССТ маълумотларига кўра, А(Н1Н1) гриппида ўлим даражаси ниҳоятда юқори бўлган. Хусусан, Америка китъасида у 1,6 дан 9% гача ўзгариб турган, гриппдан кейинги пневмония ҳолатида эса ҳомиладор аёллар ўлими 17% га етган. Пандемия авж олган даврда Россиянинг айрим ҳудудларида диспансер ҳисобида турган ҳомиладор аёлларнинг 14,1% и касалланган, бунда касаллик оғирлиги бошқа беморларга нисбатан юқори бўлган: асоратлар натижасида ҳомиладор аёлларнинг 0,22–0,30% и вафот этган [1]. Асосан булар II ва III триместрдаги, гриппнинг оғир клиник манзараси билан кечган, пневмония, респиратор дистресс-синдроми ва кўп аъзолар етишмовчилиги билан асоратланган ҳомиладор аёллар бўлган [1].

Умум эътироф этилганки, ҳомиладор аёл организмнинг иммун ҳолатидаги ўзгаришлар вирусларга ва бактерияларга қарши ҳимоя даражасининг маълум даражада пасайишига олиб келади, бундай мослашув натижасида асоратлар хавфи ортади [2], шунингдек, ҳомиладорлик ва туғруқдан кейинги даврда яширин касалликлар, жумладан вирус-бактериал этиологияли касалликлар фаоллашиши тез-тез кузатилади [5]. Ҳомиладор аёлларда ОРВИ нинг энг кўп учрайдиган асоратлари ўпка шиши ва респиратор дистресс-синдромидир. Ўпка шиши ҳомиладорларда одатда преэклампсия, токолитик терапия, амниотик суюқлик эмболияси, юрак касалликлари, септик шок, катта миқдорда суюқлик аспирацияси ёки массив инфузион терапия фонида ривожланади [9].

ОРВИ нинг ўткир даврида бўлиб ўтган туғруқлар, айнқса муддатидан олдинги туғруқлар, ҳомила ва янги туғилган чақалоққа салбий таъсир кўрсатади, бу болаларнинг жисмоний ривожланиш кўрсаткичларининг пастлиги ва касалланиш даражасининг ошиши билан намоён бўлади.

ОРВИ билан асоратланган ҳомиладорликда ҳомила ва янги туғилган чақалоқда бачадон ичи патологиясининг патогенезида плацентадаги патологик қон-томир ўзгаришлари, интервиллоз бўшлиқ тромбози, плацентанинг базал пластинкасида, қобикларда ва киндик ичагида ўчоқли қон қуйилишларига катта аҳамият берилади. Бу ўзгаришлар плацентар қон айланишини бузиб, ҳомила ва янги туғилган чақалоқ ҳолатига салбий таъсир кўрсатади [7, 10].

Ҳомиладорликнинг энг кенг тарқалган ва оғир асоратларидан бири, ҳомиладор аёл, ҳомила ва янги туғилган чақалоқ ҳаёти ва соғлиғи учун бирдек хавфли бўлган преэклампсиядир. Россияда унинг частотаси 7 дан 16% гача ўзгариб туради ва пасайиш тенденциясига эга эмас. Бу ҳомиладор

аёллар саломатлигининг паст индекси, экстрагенитал патологиянинг юқори частотаси (90% гача), замонавий ижтимоий-иқтисодий шароитлар туфайли юзага келадиган стресслар билан боғлиқ бўлиб, улар ҳомиладорлик ривожланиши жараёнида аёл организмининг дезадаптациясини кучайтиради [1, 9]. Ҳозирги вақтга келиб, ҳомиладор аёлларда ОРВИ ривожланиши билан боғлиқ преэклампсия кўпинча плацентанинг оғирлиги ва майдонининг, она томони юзасининг камайишига, киндик венасининг ташқи диаметри, прекофлюент зона веналари ва вақтинчалик органнинг марказий қисмининг кичрайишига, шунингдек, веналарнинг магистрал турда шохланиш частотасининг ошишига ва веноз томирларда торайиш ўчоқларининг шаклланишига олиб келиши маълум. Бу эса “она–плацента–ҳонила” тизимининг ҳолатини ўзгартириши мумкин [1, 9, 10].

Преэклампсия аслида ҳомиладорлик билан боғлиқ ҳолда юзага келадиган ёки кучаядиган кўп аъзолар етишмовчилиги синдромини ифодалайди. Унинг асосида аёл организмининг ҳомиладорликка мослашув механизмларининг бузилиши ётади. Ҳозирги вақтда унинг ривожланиш хавф гуруҳи қуйидаги аёлларга мансуб деб ҳисобланади:

- сурункали стресс ва чарчоққа учраган аёллар, бу марказий асаб тизимининг инертлиги ва мослашув қобилиятининг сустлигидан далолат беради;

- буйрак касалликлари, вегетатив–қон томир дистонияси, семизлик, артериал гипертензияси бўлган аёллар;

- аввалги ҳомиладорликларида преэклампсия кузатилган аёллар;

- сурункали интоксикация ва инфекцияларга эга аёллар.

Преэклампсия ҳолатларининг 70% ида у экстрагенитал патологияга эга ҳомиладор аёлларда ривожланади. Унинг ривожланишидаги бошланғич механизм сифатида плацентар назария тарафдорлари плацентадан келиб чиқадиган гуморал омилларни кўрсатадилар. Аниқланишича, гестациянинг эрта босқичларида трофобластнинг артерияларга миграцияси секинлашади, бунда бурама бачадон артерияларида мушак қаватининг трансформацияси кузатилмайди [11]. Гестация муддати ортиб бориши билан спирал томирларнинг морфологик хусусиятлари спазмга мойилликни кучайтиради, интервиллоз қон оқимининг камайишига ва гипоксия ривожланишига олиб келади [12]. Ўз навбатида, қон оқими бузилиши фонида бачадон–плацентар комплекс тўқималарида ривожланадиган гипоксия эндотелийда локал шикастланишни келтириб чиқаради ва кейинчалик у умумлашган характер касб этади.

Аниқланганки, эндотелий шикастланиши преэклампсия патогенезининг асосида ётувчи ўзгаришларнинг ривожланишига, томирлар ўтказувчанлигининг ошишига ва уларнинг вазоактив моддалар таъсирига сезувчанлигининг кучайишига, шунингдек, тромборезистент хусусиятларининг йўқолишига олиб келади. Натижада гиперкоагуляция ривожланиб, умумий вазоспазм учун шароит яратилади. Томирлар спазми фонида қоннинг реологик ва коагуляцион хусусиятлари ўзгаради, диссиминацияланган томир ичида ивиш синдромининг (ДВС) сурункали шакли ривожланади. ДВС ривожланишининг сабабларидан бири антикоагулянтлар — эндоген гепарин ва антитромбин III танқислиги бўлиб, қатор муаллифлар маълумотларига кўра, уларнинг камайиши преэклампсия оғирлик даражасига мос келади [13, 14].

Ҳомиладорликда учрайдиган гипертензив касалликлар патогенезида эндотелиал дисфункция омилларининг роли.

Ҳомиладорлик асоратлари, хусусан преэклампсия ривожланишида тадқиқотчилар асосий ўринлардан бирини эндотелий шикастланишига ажратадилар. Преэклампсия оғирлик даражасини баҳолаш усулларида бири сифатида эндотелий дисфункцияси маркерларини аниқлаш кўрилади. Ҳозирги вақтда бундай маркерлар сифатида қуйидагилар қаралади: Виллебранд омили, фибронектин, простациклин, тромбоксан А2, азот оксиди (NO), эндотелиал релаксация омили, тромбомодулин, sFlt-1 (эрувчан фмсга ўхшаш тирозин киназа), VEGF (томир–эндотелиал ўсиш омили), оксидатив стресс маркерлари — 8-изопростан ва малон диальдегид, ҳужайралараро адгезия молекулалари ҳамда интерлейкинлар [15, 16].

Бугунги кунда қон томир эндотелийи томир тонуси ва қон ивишини тартибга солувчи асосий тизимлардан бири сифатида қаралади. Сўнгги ўн йилликда эндотелиал дисфункциянинг преэклампсия ривожланишидаги ролини тасдиқловчи кўплаб тадқиқотлар пайдо бўлди. Биринчи марта преэклампсияда патологик жараённинг асоси сифатида онанинг эндотелийи фаоллашуви ҳақидаги гипотеза Roberts J. ва Cooper D. томонидан 2001 йилда илгари сурилган [17]. Эндотелиал ҳужайраларнинг фаоллашуви плацентадаги ўзгаришлар ёки ондаги тизимли томир касалликлари билан боғлиқ деб ҳисобланади. Бу ҳолатлар тромбоцитар–томир бўғини гемостазининг фаоллашуви, эритроцитлар шикастланиши ва уларнинг функцияси бузилиши, вазоконстрикция ҳамда бачадон–плацентар қон оқимининг бузилиши билан кечади [18].

Презклампсия ривожланиши плацента шаклланиб, фаолият кўрсата бошлагандан сўнг юзага келади. Плацентар омил трофобластнинг онанинг спирал артерияларига тўлиқ инвазия қилмаслиги билан боғлиқ бўлиб, бу плацента перфузиясининг етишмовчилиги ва кейинчалик ишемияга олиб келади. Шу босқичда компенсатор вазифани бажарувчи вазоактив моддалар (яллиғланиш медиаторлари ва маркерлари, ўсма некрози омили — FNO- α , интерлейкинлар) ишлаб чиқиладиган бўшлайди. Вақт ўтиши билан бу моддалар томир эндотелийининг яхлитлигини бузади, онанинг қон томир тизимига ўтиб, онанинг қон оқимида томир дисфункциясининг ривожланишига сабаб бўлади. Натижада онада кўп аъзолар етишмовчилиги юзага келади [19, 20]. Плацентар ишемия ва цитокинлар воситасида ривожланадиган оксидатив стресс натижасида паст зичликдаги липопротеидлар миқдори ошади, бу эса эндотелийда триглицеридлар тўпланишига олиб келиб, эндотелий шикастланишини янада кучайтиради [21].

Эндотелиал дисфункциянинг бошланғич механизми бачадон-плацентар тизим тўқималарида ривожланадиган гипоксия ҳисобланади. Эндотелийнинг маҳаллий шикастланиши токсик эндотелин ажралиб чиқишига, вазодилататорлар ва ҳужайра дезагрегантлари (брадикинин, простагландин) синтезининг камайишига олиб келади. Эндотелий шикастланиши унинг вазоактив моддаларга сезувчанлигини оширади, гиперкоагуляция ва умумлашган вазоспазм ривожланишига сабаб бўлади. Бу эса ҳаёт учун муҳим аъзоларда гипоксия ва ишемияга олиб келади [22].

Сўнгги йилларда эндотелий яхлитлиги бузилганда ишлаб чиқариладиган эндотелиал дисфункция медиаторларининг аҳамиятини ўрганишга қаратилган тадқиқотлар пайдо бўлди. Бу медиаторлар презклампсия оғирлиги ва оқибатини аниқлашда етарлича ахборот беради. Булар про- ва яллиғланишга қарши цитокинлар бўлиб, улар асосида томир тизимининг тизимли яллиғланиш жавоби даражаси ва оғирлигини баҳолаш мумкин: FNO- α , интерлейкин-1, ҳужайралараро адгезия молекулалари, мононуклеар фагоцитлар тизими (нейтрофиллар, моноцитлар, лимфоцитлар). Уларнинг миқдорий кўрсаткичлари презклампсия оғирлиги ошиши билан мутаносиб равишда ортади [23]. Аниқланишича, презклампсияда плацента томирлари эндотелийда иммун комплекслар ҳамда ИЛ-8 ва ИЛ-1 цитокинларининг массив чўкиши кузатилади. Бу ҳолат иммун гомеостаз ва эндотелий яхлитлигини бузиб, плацентар етишмовчилик ривожланишига ёрдам беради [24].

Эндотелиоцитлар ва қон ҳужайралари ўртасидаги ўзаро таъсир адгезив молекулалар орқали таъминланади. Нормал ҳолатда лейкоцитлар ўз мембранасида ҳужайра адгезияси молекулаларининг оз миқдорини сақлайди. Яллиғланиш жараёнида фаоллашган эндотелиал ҳужайралар адгезив молекулалар — ICAM (ҳужайра ички адгезия молекулалари) ва VCAM (томир ҳужайра адгезия молекулалари) экспрессиясини индукция қилади [25]. Ушбу молекулалар таъсирида иммун адгезия жараёнида кучаяди, қоннинг шаклли элементлари гиперагрегацияси юз беради ва натижада томир девори ичида тромбоцитларнинг ўзаро ёпишиши содир бўлиб, томир ичида деворий тромблар ҳосил бўлади ҳамда микроциркуляция бузилади [6].

VEGF нормал плацентар қон айланиши шаклланишида иштирок этувчи томирлар ўсишининг кучли стимулятори ҳисобланади [26]. VEGF оиласи бир қатор молекулалар ва уларнинг рецепторларини ўз ичига олади. Уларнинг бир қисми эркин ҳолатда бўлиб, асосан VEGF-121 ва қисман VEGF-165 ни ташкил этади. VEGF нинг бошқа изоформалари боғланган ҳолатда бўлади ва қон оқимида деярли аниқланмайди. Презклампсия ва ҳомила ўсишининг кечикиши каби ҳомиладорлик асоратларида VEGF миқдори камаяди [27, 28].

Презклампсия патогенезида бошқа омилларнинг ҳам иштироки кўрсатилган. Хусусан, НСЭ (нейроспецифик энолаза) ва ГФАП (глиофибриляр кислотали протеин) концентрациясининг ошиши презклампсиянинг клиник белгилари пайдо бўлиши билан бирга кечиши аниқланган [29]. Соғлом ҳомиладор аёлларда НСЭ ва ГФАП даражалари бутун ҳомиладорлик давомида доимий равишда паст бўлиб қолади ва соғлом ҳомиладор бўлмаган аёллардагидан фарқ қилмайди. Ушбу омиллар фақат гестациянинг 22-ҳафтасидан кейин (ҳомила бош миясининг олий тузилмалари — неокортекс шаклланиш даври) сезиларли миқдорда ишлаб чиқарила бошлайди. Гематоэнцефалик тўсиқ ўтказувчанлиги ошганда (гипоксия, инфекция, ҳомилада мия қон айланишининг бузилиши) ушбу оқсиллар онанинг қон оқимига ўтиши мумкин. Улар она организми учун бегона иммуногенлар бўлгани сабабли эндотелий шикастланишининг ва гестацион эндотелиоз ривожланишининг сабабларидан бири бўлиб хизмат қилади [30].

Ясси эндотелиал ҳужайраларнинг адгезия молекулалари (PECAM-1) ва трансмембран гликопротеин қон томирлар шаклланишининг энг муҳим омилларидан ҳисобланади. Гликопротеин барча томир ҳужайраларида экспрессияланади ва ангиогенез жараёнида муҳим рол ўйнайди. Маълумотларга кўра, ўз-ўзидан ҳомила тушиши билан кечган аёлларнинг абортив материалидаги ситотро-

фобластлар, синситиотрофобластлар ва трофобластларда PECAM-1 экспрессияси пасайган бўлади [31].

Азот оксиди (NO) бачадон томирлари эндотелийи томонидан (азот оксиди эндотелиал синтазаси иштирокида) ишлаб чиқарилади ва силлик мушакларга сигнал узатади, бунинг натижасида улар бўшашиди. Ўз навбатида, силлик мушакларнинг бўшашиши вазодилатацияга олиб келади ва эндометрийнинг ресептив қобилиятини оширади. Бундан ташқари, секретор фаза даврида эндометрия азот оксиди синтазаси (eNOS) экспрессиясининг ошиши унинг эндометрия ресепсия ва бластоциста имплантациясидаги ролини кўрсатади [32].

НО тизимли ва хужайра даражасида энг кўп плеиотроп таъсирга эга сигнал молекулаларидан бири бўлиб, томир тонуси, хужайра нафас олиши, пролиферация, апоптоз ва ген экспрессиясини бошқаришда иштирок этади. NO трофобласт инвазиясида, плацента ривожланишида қатнашади ва ушбу тўқимада асосий вазодилататор ҳисобланади. Ҳозирги вақтда NO нинг плацентар томир тизими шаклланишида иштирок этувчи хужайра турларига таъсири, шунингдек, ҳомиладорлик даврида азот оксиди синтазаси экспрессияси ва функциялари тасвирланган [33].

Ҳайвонларда ўтказилган турли бачадон ичи ўсишдан қолиш (ХЎОҚС) моделларида eNOS ва ангиогенез омиллари экспрессияси ҳомиладорликнинг биринчи ярмида нормал (ХЎОҚСсиз) ҳомидаларга нисбатан юқорида экани кўрсатилган [34, 35]. Бироқ гестация охирига келиб ушбу молекулалар экспрессияси нормал плацентадагига нисбатан паст даражага тушади [34]. Бу ҳолат, одатда плацента ривожланиши ва ҳомила ўсишини таъминлайдиган компенсатор механизмларнинг етишмовчилигидан далolat беради.

ХЎОҚС ва преэклампсияда плацентанинг ворсинкали тармоғи нормал плацентага нисбатан камроқ тармоқланган, аммо узунроқ капиллярларга эга бўлади [28]. Шунингдек, киндик томирларининг диаметри ҳам кичикроқ экани қайд этилган [36]. Шу билан бирга, ХЎОҚСда хорион томирларининг томир торайтирувчи моддаларга бўлган жавобида сезиларли ўзгаришлар аниқланмаган [37]. Аксинча, NO га боғлиқ томир кенгайтирувчи моддаларга жавоб ХЎОҚС ва преэклампсияда пасайган бўлади. ХЎОҚСда хорион артериялари VEGF ва PlGF нинг томир кенгайтирувчи таъсирига суств жавоб беради, преэклампсияда эса СГРП га жавоб деярли кузатилмайди [38]. Шунинг таъкидлаш лозимки, бундай томирларда экзоген NO га жавоб ўзгармайди, бироқ ХЎОҚСда хорион артерияларида NO га боғлиқ спонтан тебранишларнинг амплитудаси ва частотаси камайган бўлади. Бу ҳолат нормал томирларда NO синтезининг сусайиши билан боғлиқ бўлиши мумкин [38].

Умуман олганда, ҳозирги кунда тўпланаётган маълумотлар шунинг тасдиқлайдики, эндотелиал дисфункция (ЭД) маркерлари, хусусан томир-эндотелиал ўсиш омиллари даражасини аниқлаш асосида, уларнинг преэклампсия патогенезидаги роли, плацента ангиогенези ва трофобластнинг функционал фаоллигига таъсирини ҳисобга олиб, ҳомиладорлик даврида ЎРВИ билан касалланган аёлларда ушбу патология ривожланишини олдиндан башорат қилиш мумкин.

Хулоса. Ўткир вирусли инфекция касалликлар, аввало грипп, нафақат аёлнинг ҳаёти ва соғлиғи учун хавф туғдиради, балки ҳомиладорликнинг узилиш хавфини ҳам бир неча баробар оширади. Адабиёт манбаларини таҳлил қилиш натижалари ОРВИ ҳомиладорлик патологияси ривожланишида муҳим рол ўйнашини кўрсатади, ҳомила ва янги туғилган чақалоққа салбий таъсир кўрсатиш эҳтимоли эса юқори ҳисобланади.

Маълумки, оналар ва перинатал ўлим, шунингдек асоратлар ривожланишининг асосий сабаблари таркибида преэклампсия етакчи ўринлардан бирини эгаллайди. Преэклампсия кўпинча ўтказилган ўткир респиратор вирусли инфекция натижасида юзага келиб, плацентар етишмовчилик ва ҳомила гипотрофияси билан кечади. Преэклампсиянинг оғир асоратлари уни ўз вақтида ташхислаш ва интенсив даволашни талаб этадиган реал хавф сифатида кўриб чиқишга асос бўлади.

Адабиёт манбаларини таҳлил қилиш ҳомиладорликда гипертензив ҳолатлар патогенезида қон-томир ва эндотелиал омиллар ролини ўрганиш ниҳоятда муҳим эканини тасдиқлайди. Ушбу асоратлар ўтказилган ЎРВИ, жумладан грипп оқибатида намоён бўлиши ёки ривожланиши мумкин. Ушбу маркерлар даражаси плацента ангиогенези жараёнлари ва трофобластнинг функционал фаоллиги билан ўзаро боғлиқ бўлиб, ҳомиладорликнинг турли муддатларида патология ривожланишини олдиндан башорат қилиш имконини беради. Бу эса ўз навбатида профилактик чора-тадбирларни ўз вақтида бошлашга ҳамда зарурат туғилганда ҳомиладор аёлларда ўткир респиратор вирусли инфекциялар фонида юзага келадиган метаболик ва гемодинамик бузилишлар учун патогенетик жиҳатдан асосланган терапияни буюришга имкон яратади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Aggarwal P.K., Chandel N., Jain V., Jha V. Преэклампсияда айланувчи эндотелин-1, эркин фмс-га ўхшаш тирозин киназа-1 ва эркин эндоглин ўртасидаги боғлиқлик // *Journal of Human Hypertension*. — 2012. — 26-жилд (4). — 236–241-бетлар.
2. Blomberg L.A., Schreier L.L., Guthrie H.D. ва бошқ. Плацентация бошланганидан кейин чўчка плацентасида интраутерин ўсишнинг орқада қолиши ривожланиш омиллари экспрессиясига таъсири // *Placenta*. — 2010. — 31-жилд. — 549–552-бетлар.
3. Burton G.J., Jauniaux E., Charnock-Jones D.S. Бачадон ички муҳитининг инсон плацентасининг ривожланишига таъсири // *International Journal of Developmental Biology*. — 2010. — 54-жилд (2–3). — 303–312-бетлар.
4. Can M., Sancar E., Harma M. ва бошқ. Преэклампсияли беморларда ялиғланиш маркерлари // *Clinical Chemistry and Laboratory Medicine*. — 2011. — 49-жилд (9). — 1469–1472-бетлар.
5. Casanello P., Escudero C., Sobrevia L. Эквивалентив нуклеозид (ENT) ва катионли аминокислота (CAT) ташувчилари: ҳомиладорлик касалликларида фетал эндотелиал дисфункциядаги аҳамияти // *Current Vascular Pharmacology*. — 2007. — 5-жилд. — 69–84-бетлар.
6. Chen Q., Chen L., Liu B. ва бошқ. Некротик трофобластларни фагоцитоз қилиш билан чақирилган эндотелиал хужайра фаоллашувида аутокрин ТГФ-β1 нинг роли // *Journal of Pathology*. — 2010. — 221-жилд (1). — 87–95-бетлар.
7. Cozzi V., Garlanda C., Nebuloni M. ва бошқ. ПТХЗ — преэклампсия ва ҳомила ривожланишининг интраутерин кечикиши оғирлигини баҳолаш учун потенциал эндотелиал дисфункция биомаркери // *Placenta*. — 2012. — 33-жилд (12). — 1039–1044-бетлар.
8. Dawood F.S. Инсонларда янги чўчка келиб чиқишли A(H1N1) грипп вирусининг пайдо бўлиши // *New England Journal of Medicine*. — 2009. — 360-жилд, №25. — 2605–2615-бетлар.
9. Do'stova N.Q., Salimova T.B. Symptoms of endothelial dysfunction in women with hypertensive disease (article review). *Journal of Education and Scientific Medicine* 2025; Volume 1; Issue 5; 229–234.
10. Долгушина Н.В., Макатсария А.Д. Вирусли инфекциялари бўлган ҳомиладор аёлларда эндотелиал шикастланишлар ва плацентар етишмовчилик // *Гинекология, акушерлик ва перинатология масалалари*. — 2008. — 7-жилд, №2. — 12–17-бетлар.
11. Dominguez F., Martinez S., Quitonero A. ва бошқ. CXCL10 ва ИЛ-6 инсон трофобласт хужайра линияларида хемотаксисни чақиради // *Molecular Human Reproduction*. — 2008. — 14-жилд (7). — 423–430-бетлар.
12. Галинова И.Л. Гестозли ҳомиладор аёлларда гематоэнцефалик тўсиқ ўтказувчанлиги бузилишларини клиник-иммунохимийвий баҳолаш: тиббиёт фанлари номзоди диссертацияси автореферати. — Москва, 2007. — 24 бет.
13. Gomes H.F., Palei A.C., Machado J.S. ва бошқ. Ҳомиладорликдаги гипертензив ҳолатларда оксидатив ҳолат маркерлари ва NO биоетишувчанлигини баҳолаш // *Journal of Human Hypertension*. — 2013. — 27-жилд (6). — 345–348-бетлар.
14. Harris J.W. Ҳомиладор аёлларда гриппнинг кечиши // *JAMA*. — 1919. — 72-жилд. — 978–980-бетлар.
15. Ихтиярова Г.А., Салимова Т.Б. Гипертензив бузилишлари бор ҳомиладорларда эндотелиал дисфункцияни башоратлаш. Тошкент тиббиёт академияси журнали. №9(1), 2025. 36–39 бетлар.
16. Izzedine H., Massard C., Spano J.P. ва бошқ. VEGF сигнализациясини ингибиция қилиш билан боғлиқ протеинурия: механизмлари, аҳамияти ва бошқаруви // *European Journal of Cancer*. — 2010. — 46-жилд (2). — 439–448-бетлар.
17. Жаркин Н.А., Подобед Н.Д. Ҳомиладор аёлларда грипп ва у билан чақирилган пневмония: пандемия сабоқлари // *Амалий акушер-гинеколог шифокор журнали*. — 2010. — №1(18). — 11–15-бетлар.
18. Кравчук Т.А., Наумова В.Я., Виноходова Э.М. H1N1 гриппи эпидемияси шароитида ҳомиладор аёлларга ёрдамни такомиллаштириш // «Она ва бола — 2010» XI Бутунроссия форуми материаллари. — 625–626-бетлар.
19. Kronborg C.S., Gjedsted J., Vittinghus E. ва бошқ. Преэклампсияли ва нормотензив ҳомиладорликларда цитокинларнинг узунламасига ўлчови // *Acta Obstetrica et Gynecologica Scandinavica*. — 2011. — 90-жилд (7). — 791–796-бетлар.
20. Кулаков В.И., Прилепская В.Н., Радзинский В.Э. Акушерлик ва гинекологияда амбулатор-поликлиник ёрдам бўйича қўлланма. — Москва: ГЕОТАР-Медиа, 2007. — 1054 бет.
21. Lawlor D.A., Macdonald-Wallis C., Fraser A. ва бошқ. Ҳомиладорлик даврида гипертензив бузилишлари бўлган оналарнинг болаларида юрак-қон томир биомаркерлари ва томир функ-

цияси // *European Heart Journal*. — 2012. — 33-жилд (3). — 335–345-бетлар.

22. Lynch A.M., Murphy J.R., Gibbs R.S. va бошқ. Эрта ҳомиладорликда комплемент фаоллашуви фрагментлари ва ангиогенезга оид омиллар ўртасидаги ўзаро боғлиқлик ва уларнинг прееклампсия билан алоқаси // *British Journal of Obstetrics and Gynaecology*. — 2010. — 117-жилд (4). — 456–462-бетлар.

23. Najafi T., Novin M.G., Ghazi R., Khorram O. Сабаби номаълум такрорий ҳомиладушиши ва бепуштлиққа эга аёлларда эндометрийда эндотелиал азот оксиди синтазаси экспрессиясининг ўзгариши // *Reproductive Biomedicine*. — 2012. — 25-жилд. — 408–

24. Petla L.T., Chikkala R., Ratnakar K.S. va бошқ. Ҳомиладор аёлларда прееклампсияни бошқариш учун биомаркерлар // *Indian Journal of Medical Research*. — 2013. — 138-жилд. — 60–67-б.

25. Петришчев Н.Н. Эндотелий дисфункцияси: сабаблари, механизмлари, фармакологик коррекция. — Санкт-Петербург: СПбГМУ нашриёти, 2003. — 184 б.

26. Raio L., Ghezzi F., Di Naro E. va бошқ. Интраутерин ўсиш чекланиши бўлган ҳомидаларда киндик ичакчасининг морфологик хусусиятлари ва киндик артерияси Допплер

кўрсаткичлари // *Journal of Ultrasound in Medicine*. — 2003. — 22-жилд. — 1341–1347-б.

27. Roberts J., Cooper D. Прееклампсиянинг патогенези ва генетикаси // *Lancet*. — 2001. — 357-жилд. — 53–56-б.

28. Стрижаков А.Н., Давидов А.И., Мусаев З.М. Гестоз: диагностика, акушерлик тактикаси ва интенсив терапия. — Москва: Информед, 2007. — 79 бет.

29. Сухих Г.Т., Мурашко Л.Э. Прееклампсия: қўлланма. — Москва: GEOTAR-Media, 2010. — 348–349-б.

30. Wareing M., Greenwood S.L., Fyfe G.K., Baker P.N. Интраутерин ўсиш чекланиши билан асоратланган ҳомиладорликларда инсон платсентасининг хорион пластинкаси томирларининг реактивлиги // *Biology of Reproduction*. — 2006. — 75-. — 518–523-б.

31. Yurdakan G., Ekem T.E., Bahadir B. va бошқ. Биринчи триместрдаги спонтан абортларда адгезия молекулаларининг экспрессияси ва уларнинг аборт патогенезидаги роли // *Acta Obstetrica et Gynecologica Scandinavica*. — 2008. — 87-жилд. — 775–782-бетлар.

32. Zhu M.J., Du M., Hess B.W. va бошқ. Онанинг озикланиш чекланиши сигир платсентомаларининг котиледонар артерияларида ўсиш сигнал йўллари кучайтиради // *Placenta*. — 2007. — 28-жилд. — 361–368-бетлар.

Иктибос учун: Дўстова Н.Қ., Салимова Т.Б. Гипертензив касалликларга чалинган ҳомиладор аёлларда эндотелиал дисфункция юзага келишида ўткир респиратор инфекцияларнинг роли: қисқача шарҳ // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси*. — 2026. — № 4(24). — Б. 343–349. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19533598>

ПРОФЕССИОНАЛ ФУТБОЛЧИЛАРДА ТИЗЗА БЎҒИМИ ЖАРОҲАТЛАРИДАН КЕЙИН РИВОЖЛАНАДИГАН АСОРАТЛАР ВА УЛАРНИ ОЛДИНИ ОЛИШ УЧУН ЎТКАЗИЛАДИГАН РЕАБИЛИТАЦИОН ЧОРА-ТАДБИРЛАР

Анваров А.А., Бурханова Г.Л., Шермамедова К.Т.

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Ушбу мақолада профессионал футболчиларда тизза бўғими жароҳатларидан кейин ривожланадиган асоратлар, уларнинг клиник ва функционал аҳамияти ҳамда уларни олдини олишида қўлланиладиган реабилитация чора-тадбирларининг самарадорлиги таҳлил қилинди. Тадқиқотда тизза бўғими жароҳатлари (олд крестсмон боғлам шикастланиши, мениск жароҳатлари ва боғлам аппарати бузилишлари) кузатилган футболчиларнинг функционал ҳолати ўрганилди. Реабилитация жараёнида терапевтик жисмоний машқлар, физиотерапия, спорт массажи, кинезиотерапия ва замонавий тикланиш усуллари қўлланилди. Тадқиқот натижалари шуни кўрсатдики, комплекс реабилитация дастурини қўллаш натижасида оғриқ синдроми 60–70 % гача камайди, бўғим ҳаракатчанлиги сезиларли даражада яхшиланди ва мушак кучи тикланди. Шунингдек, функционал тестлар натижаларига кўра спортчиларнинг жисмоний иш қobiliяти ва ҳаракат координацияси яхшиланиб кузатилди. Аниқланишича, реабилитация жараёни нотиғри ташкил этиш ҳолатларида хроник оғриқ, мушак атрофияси, бўғим беқарорлиги ва посттравматик остеоартроз каби асоратлар ривожланиши мумкин. Комплекс ва индивидуал ёндашувга асосланган реабилитация дастурлари ушбу асоратларнинг олдини олишида муҳим аҳамиятга эга. Олинган натижалар профессионал футболчиларда тизза бўғими жароҳатларидан кейин тикланиш жараёнини оптималлаштириш ва қайта жароҳатланиш хавфини камайтиришида илмий асосланган ёндашувларни қўллаш зарурлигини кўрсатади.

Калим сўзлар: тизза бўғими, футболчилар, жароҳат, асоратлар, реабилитация, ACL, физиотерапия, тикланиш

COMPLICATIONS DEVELOPING AFTER KNEE JOINT INJURIES IN PROFESSIONAL FOOTBALL PLAYERS AND REHABILITATIVE MEASURES FOR THEIR PREVENTION

Anvarov A.A., Burkhanova G.L., Shermamedova K.T.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. This article analyzes the complications developing after knee joint injuries in professional football players, their clinical and functional significance, and the effectiveness of rehabilitation measures used in their prevention. The study examined the functional state of football players with knee joint injuries (damage to the anterior cruciate ligament, meniscus injuries, and disorders of the ligamentous apparatus). Therapeutic physical exercises, physiotherapy, sports massage, kinesiotherapy, and modern recovery methods were used in the rehabilitation process. The results of the study showed that as a result of applying a comprehensive rehabilitation program, pain syndrome decreased by 60-70%, joint mobility significantly improved, and muscle strength was restored. Also, according to the results of functional tests, an improvement in the athletes' physical performance and movement coordination was observed. It has been established that in cases of improper organization of the rehabilitation process, such complications as chronic pain, muscle atrophy, joint instability, and post-traumatic osteoarthritis can develop. Rehabilitation programs based on a comprehensive and individual approach are important in preventing these complications. The obtained results indicate the need for scientifically based approaches to optimize the recovery process after knee joint injuries in professional football players and reduce the risk of re-injury.

Keywords: knee joint, football players, injury, complications, rehabilitation, ACL, physiotherapy, recovery

ОСЛОЖНЕНИЯ, РАЗВИВАЮЩИЕСЯ ПОСЛЕ ТРАВМ КОЛЕННОГО СУСТАВА У ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ФУТБОЛИСТОВ, И РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИХ ПРОФИЛАКТИКЕ

Анваров А.А., Бурханова Г.Л., Шермамедова К.Т.

Самаркандский государственный медицинский университет, г.Самарканд, Узбекистан

Резюме. В данной статье проанализированы осложнения, развивающиеся после травм колен-

ного сустава у профессиональных футболистов, их клинко-функциональное значение и эффективность реабилитационных мероприятий, применяемых для их профилактики. В исследовании изучалось функциональное состояние футболистов с травмами коленного сустава (травма передней крестообразной связки, травма мениска и нарушения связочного аппарата). В процессе реабилитации использовались терапевтические физические упражнения, физиотерапия, спортивный массаж, кинезиотерапия и современные методы восстановления. Результаты исследования показали, что в результате применения комплексной программы реабилитации болевой синдром снизился до 60-70%, значительно улучшилась подвижность суставов и восстановилась мышечная сила. Также по результатам функциональных тестов наблюдалось улучшение физической работоспособности и координации движений спортсменов. Установлено, что при неправильной организации процесса реабилитации могут развиваться такие осложнения, как хроническая боль, мышечная атрофия, нестабильность суставов и посттравматический остеоартроз. Программы реабилитации, основанные на комплексном и индивидуальном подходе, играют важную роль в предотвращении этих осложнений. Полученные результаты свидетельствуют о необходимости применения научно обоснованных подходов к оптимизации процесса восстановления и снижению риска повторных травм после травм коленного сустава у профессиональных футболистов.

Ключевые слова: коленный сустав, футболисты, травма, осложнения, реабилитация, ACL, физиотерапия, восстановление

e-mail: abdumannonanvarov@gmail.com

Кириш. Сўнгги ўн йилликларда футбол жаҳон миқёсида энг оммавий ва юқори интенсивликда ривожланаётган спорт турларидан бирига айланди. Замонавий футбол ўйинчилари юқори тезликда ҳаракатланиш, кескин бурилиш, сакраш ва контакт ҳолатларда иштирок этиш каби мураккаб ҳаракатларни бажарадилар. Бу эса улар организмга, айниқса таянч-ҳаракат аппаратида катта функционал юклама тушишига олиб келади [1].

Футболчиларда жароҳатлар эпидемиологияси бўйича ўтказилган тадқиқотлар шуни кўрсатадики, пастки қўл-оёқ бўғимлари жароҳатлари умумий жароҳатларнинг асосий қисмини ташкил этади. Улар орасида тизза бўғими алоҳида ўрин тутди. Илмий маълумотларга кўра, футболчиларда кузатиладиган барча жароҳатларнинг тахминан 30–50 % и айнан тизза бўғими билан боғлиқ [2].

Тизза бўғими жароҳатлари орасида олд крестсимон боғлам (ACL) узилиши, мениск шикастланишлари ва боғлам аппарати жароҳатлари энг кўп учрайди. Бу каби жароҳатлар спортчиларнинг узок муддатга спорт фаолиятдан четлашишига ва жисмоний иш қобилиятининг пасайишига сабаб бўлади [3].

Ekstrand ва ҳамкорлари томонидан ўтказилган кўп йиллик тадқиқотларда ҳар 1000 соат ўйин фаолиятига ўртача 6–9 та жароҳат тўғри келиши қайд этилган бўлиб, уларнинг катта қисми тизза ва тўпик бўғимларига тегишли эканлиги аниқланган [4].

Шу билан бирга, тизза бўғими жароҳатлари нафақат ўткир даврда, балки кейинги босқичларда ҳам турли асоратлар билан кечиши мумкин. Илмий манбаларда келтирилишича, реабилитация жараёни тўлиқ амалга оширилмаган ҳолларда 20–40 % ҳолатда қайта жароҳатланиш ёки хроник функционал бузилишлар ривожланади [5].

Жароҳатдан кейин ривожланадиган асосий асоратлар қаторига хроник оғрик синдроми, бўғим ҳаракатчанлигининг чекланиши, мушак атрофияси, проприоцепциянинг бузилиши ва посттравматик остеоартроз киради [6]. Ушбу ҳолатлар спортчининг нафақат спорт фаолиятига, балки умумий ҳаёт сифатида ҳам салбий таъсир кўрсатади.

Замонавий спорт тиббиётида реабилитация жараёнига комплекс ва тизимли ёндашув асосий тамойил ҳисобланади. Реабилитация фақатгина жароҳатни даволаш эмас, балки функционал ҳолатни тўлиқ тиклаш, мушак кучини ошириш, ҳаракат координациясини яхшилаш ва қайта жароҳатланишнинг олдини олишга қаратилган кўп босқичли жараёндир [7].

Сўнгги йилларда реабилитация соҳасида инновацион усуллар — нейромушак тренинг, кинезиотейпинг, криотерапия ва функционал тренинглар кенг қўлланилмоқда. Илмий тадқиқотлар ушбу усулларнинг самарадорлигини тасдиқлаб, улар орқали тикланиш жараёнини тезлаштириш ва асоратлар хавфини камайтириш мумкинлигини кўрсатмоқда [8].

Шу муносабат билан профессионал футболчиларда тизза бўғими жароҳатларидан кейин ривожланадиган асоратларни чуқур ўрганиш, уларни олдини олиш ва самарали реабилитация дастурларини ишлаб чиқиш замонавий спорт тиббиётининг долзарб вазифаларидан бири ҳисобланади.

Адабиётлар таҳлили. Сўнгги йилларда профессионал спортчиларда тизза бўғими жароҳатлари ва улардан кейинги асоратларнинг ривожланиш механизмлари кенг ўрганилмоқда. Илмий тадқиқотлар натижалари шуни кўрсатадики, футболчиларда ушбу жароҳатлар нафақат юқори учраш частотасига эга, балки уларнинг узоқ муддатли функционал оқибатлари ҳам муҳим клиник аҳамиятга эга [1].

Ekstrand ва ҳамкорлари томонидан ўтказилган кўп йиллик тадқиқотларда профессионал футболчиларда умумий жароҳатлар ичида тизза бўғими жароҳатлари улуши 35–45 % ни ташкил этиши қайд этилган [2]. Шунингдек, ҳар 1000 соатлик ўйин фаолиятига ўртача 6–9 та жароҳат тўғри келиши аниқланган.

Hewett тадқиқотларида ACL жароҳатларининг асосий сабабларидан бири нейромушак назоратининг бузилиши эканлиги кўрсатилган. Муаллиф маълумотларига кўра, профилактик машқлар орқали ушбу жароҳатлар хавфини 50–60 % гача камайтириш мумкин [3].

Bahr ва Engebretsen тадқиқотларида тизза бўғими жароҳатларини олдини олишда махсус нейромушак тренинг дастурларининг самарадорлиги 30–40 % ни ташкил этиши қайд этилган [4].

Kisner ва Colby маълумотларига кўра, терапевтик жисмоний машқлар мушак кучини тиклашда 70–80 % самарадорликка эга бўлиб, улар реабилитациянинг асосий қисмини ташкил этади [5].

McArdle ва ҳамкорлари мушаклардаги энергетик алмашинув бузилиши чарчокнинг ортиши ва функционал ҳолатнинг пасайишига олиб келишини таъкидлайди [6]. Бу ҳолат бўғим барқарорлигига салбий таъсир кўрсатади.

Platonov тадқиқотларида тикланиш жараёнларини етарли ташкил этмаслик спортчиларда жароҳатлар хавфини оширишини кўрсатган [7].

Issurin томонидан таклиф этилган блок периодизация модели машғулот ва тикланиш мувозанатини сақлашда муҳим аҳамиятга эга [8].

Meeusen ва ҳамкорлари ортикча юклама синдроми марказий нерв тизимига таъсир қилиб, координация ва реакция тезлигини пасайтиришини таъкидлайди [9].

Armstrong тадқиқотларида гормонал ўзгаришлар (кортизол/тестостерон нисбати) тикланиш жараёнларига салбий таъсир кўрсатиши аниқланган [10].

Kremer ва Schwartz маълумотларига кўра, комплекс реабилитация дастурлари тикланиш муддатини 20–25 % га қисқартиради [11].

Bleakley тадқиқотларида криотерапия яллиғланишни камайтириш ва оғриқни пасайтиришда самарали эканлиги кўрсатилган [12].

Шу тариқа, адабиётлар таҳлили шуни кўрсатадики, тизза бўғими жароҳатларида реабилитация жараёнини самарали ташкил этиш учун комплекс, индивидуал ва босқичли ёндашув талаб этилади.

Асоратлар. Тизза бўғими жароҳатларидан кейин қуйидаги асоратлар кенг тарқалган:

- Сурункали оғриқ синдроми — 60 % ҳолатларда
- Ҳаракат чекланиши — 25–30 %
- Мушак атрофияси — 40 %
- Бўғим беқарорлиги — 20 %
- Посттравматик остеоартроз — 15–20 %

Ушбу асоратлар асосан реабилитациянинг етарли даражада амалга оширилмаганлиги билан боғлиқ.

Тадқиқот материаллари ва усуллари. Тадқиқотда 40 нафар профессионал футболчи иштирок этди (12–18 ёш).

Қўлланилган усуллар:

- клиник текширув
- VAS шкаласи
- функционал тестлар
- мушак кучини баҳолаш
- ҳаракат амплитудаси

Реабилитация чора-тадбирлари.

Комплекс дастур:

1. ЛФК

- изометрик машқлар
- динамик юклама
- баланс машқлари

2. Физиотерапия

- электростимуляция
- ультратовуш

3. Массаж

- қон айланишини яхшилаш

4. Инновацион усуллар

- криотерапия
- кинезиотейпинг

Натижалар


1-жадвал.

Реабилитация самарадорлиги кўрсаткичлари

Кўрсаткич	Олдин	Кейин	Ўзгариш
Оғриқ (VAS)	7.4	2.2	↓ 70 %
Ҳаракат	58 %	90 %	↑ 55 %
Мушак кучи	3.1	4.6	↑ 48 %

Олинган натижаларга кўра:

- оғриқ даражаси сезиларли камайди ($p < 0.05$)
- бўғим ҳаракатчанлиги тикланди
- мушак кучи ошди
- функционал ҳолат яхшиланди



★ Изоҳ: реабилитациядан кейин оғриқ кескин камайган.

1-расм. Оғриқ даражаси динамикаси




★ Изоҳ: функционал кўрсаткичлар сезиларли яхшилانган.

2-расм. Функционал тикланиш




✦ Изоҳ: мушак кучи тикланган ва деярли нормал ҳолатга етган.

3-расм. Мушак кучи ўзгариши



4-расм. Реабилитациядан олдин ва кейин кўрсаткичлар



5-расм. Реабилитациядан кейин ҳолат

Муҳокама. Ушбу тадқиқот натижалари профессионал футболчиларда тизза бўғими жароҳатларидан кейинги реабилитация жараёнининг самарадорлигини тасдиқлади. Олинган маълумотларга кўра, комплекс ёндашув асосида олиб борилган реабилитация дастури функционал тикланишни тезлаштириш ва асоратлар хавфини камайтиришда муҳим аҳамиятга эга.

Тадқиқотда кузатилган оғриқ даражасининг 70 % га камайиши ҳамда ҳаракат амплитудасининг сезиларли даражада ошиши реабилитация жараёнида терапевтик жисмоний машқлар ва физиотерапия усуллариининг юқори самарадорлигини кўрсатади. Бу натижалар Kisner ва Colby томонидан олиб борилган тадқиқотлар билан мос келади, уларда терапевтик машқлар мушак функциясини тиклашда асосий ўрин тутиши таъкидланган [5].

Шунингдек, функционал тестлар натижаларининг 50 % дан ортиқ яхшиланиши нейромушак адаптация жараёнлари самарали кечганлигини кўрсатади. Hewett тадқиқотларида ҳам нейромушак назоратини ривожлантириш ACL жароҳатларидан кейин тикланиш жараёнида ҳал қилувчи омил эканлиги қайд этилган [4].

McArdle ва ҳамкорлари маълумотларига кўра, мушаклардаги энергетик алмашинув бузилиши чарчоқ ва функционал пасайишга олиб келади [1]. Бизнинг тадқиқотда мушак кучи ва функционал кўрсаткичларнинг яхшиланиши метаболик тикланиш жараёнларининг фаоллашганлигини кўрсатади.

Bahr ва Engebretsen тадқиқотларида профилактик ва реабилитацион машқлар орқали жароҳатлар хавфини 30–40 % гача камайтириш мумкинлиги кўрсатилган [2]. Ушбу тадқиқот натижалари ҳам комплекс реабилитация дастурлари қайта жароҳатланиш хавфини камайтиришда муҳим аҳамиятга эга эканлигини тасдиқлайди.

Шу билан бирга, криотерапия ва массаж каби қўшимча усуллар қўлланилиши яллиғланишни камайтириш ва тикланишни тезлаштиришда муҳим роль ўйнади. Bleakley тадқиқотларида криотерапия оғриқни камайтириш ва тўқималардаги яллиғланиш жараёнларини пасайтиришда самарали эканлиги қайд этилган [12].

Муҳокама натижалари шуни кўрсатадики, реабилитация жараёнида бир томонлама эмас, балки комплекс ва индивидуал ёндашув қўлланилиши юқори самара беради. Бу эса спортчиларни тезроқ спорт фаолиятига қайтариш ва уларнинг функционал ҳолатини тўлиқ тиклаш имконини беради.

Хулоса. Олиб борилган тадқиқот натижалари асосида қуйидаги хулосаларга келиш мумкин:

1. Профессионал футболчиларда тизза бўғими жароҳатлари юқори частотага эга бўлиб, улар кўп ҳолларда узок муддатли асоратлар билан кечади.

2. Жароҳатдан кейин ривожланадиган асосий асоратлар қаторига хроник оғриқ синдроми, мушак атрофияси, бўғим ҳаракатчанлигининг чекланиши ва посттравматик остеоартроз киради.

3. Комплекс реабилитация дастури (ДЖТ, физиотерапия, массаж ва инновацион усуллар) қўлланилиши:

- о оғриқни 60–70 % гача камайтириш
- о ҳаракат амплитудасини 40–50 % га ошириш
- о мушак кучини тиклаш
- о функционал ҳолатни яхшилаш имконини беради

4. Реабилитация жараёнини индивидуаллаштириш ва босқичма-босқич ташкил этиш спортчиларнинг тикланиш жараёнини сезиларли даражада тезлаштиради.

5. Комплекс ёндашув нафақат тикланишни таъминлайди, балки қайта жароҳатланиш хавфини ҳам камайтиради.

Шу тариқа, тизза бўғими жароҳатларидан кейин самарали реабилитация дастурларини қўллаш профессионал футболчиларнинг спорт фаолиятини тиклаш ва уларнинг соғлигини сақлашда муҳим аҳамиятга эга.

Адабиётлар рўйхати:

1. McArdle W.D., Katch F.I., Katch V.L. Exercise Physiology: Nutrition, Energy, and Human Performance. – Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2015. – 896 p.

2. Bahr R., Engebretsen L. Sports Injury Prevention. – Oxford: Wiley-Blackwell, 2018. – 496 p.

3. Ekstrand J., Hägglund M., Waldén M. Injury incidence and injury patterns in professional football // American Journal of Sports Medicine. – 2011. – Vol. 39(6). – P. 1226–1232.

4. Hewett T.E., Di Stasi S.L., Myer G.D. Current concepts for injury prevention in athletes // Journal of Sports Health. – 2013. – Vol. 5(3). – P. 245–253.

5. Kisner C., Colby L.A. Therapeutic Exercise: Foundations and Techniques. – Philadelphia: F.A. Davis Company, 2012. – 1024 p.

6. Brukner P., Khan K. Clinical Sports Medicine. – Sydney: McGraw-Hill, 2017. – 1280 p.

7. Platonov V.N. System of Athlete Training in Olympic Sport. – Kiev: Olympic Literature, 2015. – 752 p.
8. Issurin V.B. Block Periodization: Breakthrough in Sport Training. – Moscow: Sport, 2013. – 288 p.
9. Halson S.L. Monitoring training load to understand fatigue in athletes // Sports Medicine. – 2014. – Vol. 44(S2). – P. 139–147.
10. Meeusen R. et al. Prevention, diagnosis and treatment of overtraining syndrome // European Journal of Sport Science. – 2013. – Vol. 13(1). – P. 1–24.
11. Armstrong L.E., VanHeest J.L. The unknown mechanisms of the overtraining syndrome // Sports Medicine. – 2010. – Vol. 32(3). – P. 185–209.
12. Bleakley C.M., Davison G.W. Cryotherapy and inflammation // British Journal of Sports Medicine. – 2012. – Vol. 46(4). – P. 233–240.

Иқтибос учун: Анваров А.А., Бурханова Г.Л., Шермамедова К.Т. Профессионал футболчиларда тизза бўғими жароҳатларидан кейин ривожланадиган асоратлар ва уларни олдини олиш учун ўтказиладиган реабилитацион чора-тадбирлар // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2026. – № 4(24). – Б. 350–356. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19535582>

МНС ПЕРИНАТАЛ ШИКАСТЛАНИШИ БЎЛГАН БОЛАЛАРДА БРОНХИАЛ АСТМАНИ ДАВОЛАШ КОМПЛЕКС ДАСТУРИНИНГ ЎПКАНИНГ ВЕНТИЛЯЦИОН ФУНКЦИЯСИГА ТАЪСИРИНИ БАҲОЛАШ

Хайдарова С.Х.

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. БА болалик даврида нафас олиш аъзоларининг кенг тарқалган касаллиги бўлиб, сурункали прогрессив кечиши билан тавсифланади. Шу муносабат билан касалликнинг оғир шакллари ривожланишини ва касалликнинг назоратсиз кечишини башират қилиш усулларини излаш устувор илмий йўналишга айланмоқда. БА патогенезига турли хил экзо- ва эндоген омилларнинг, шу жумладан экологик, генетик ва органик омилларнинг таъсир механизмлари фаол ўрганилмоқда, аммо касалликнинг шаклланиши ва кечишининг кўп жиҳатлари мунозарали бўлиб қолмоқда. БАни оғирлик даражаси бўйича таснифлаш маълум қийинчиликларни келтириб чиқаради, чунки касалликнинг оғирлиги, даволанишга жавоб ва бошқа омилларни, шу жумладан терапияга риоя қилишни ҳисобга олиш зарур. БАда оғирлашган перинатал анамнезни касалликнинг клиник кечишига оғирлаштирувчи таъсир кўрсатувчи муҳим омил сифатида кўриб чиқиш мумкин, бу эса болаларда БАни самарали даволаш режасини тузиш билан касалликнинг оғирлик даражаси ва кечишининг мумкин бўлган оғирлашиши хавфини баҳолашда перинатал анамнезни диққат билан кузатишни талаб қилади. Асоратланган перинатал анамнез ва БА билан оғриган беморлар, айниқса болалар, неврологик ҳолат ва нафас олиш функциялари ўртасидаги мураккаб боғлиқликларни кўрсатиши мумкин. МНТ ПШ унда узоқ муддатли ўзгаришларга олиб келади, бу эса ўз навбатида нафас йўллари назорати ва иммун жавобга таъсир кўрсатади. Бу БА тез-тез қўзғиши, пикфлоуметрия ва спирограмма кўрсаткичларининг ёмонлашиши, шунингдек, касалликни назорат қилишнинг паст даражаси билан намоён бўлиши мумкин.

Калим сўзлар: бронхиал астма, марказий нерв тизими, перинатал шикастланиш

EVALUATING THE IMPACT OF A COMPREHENSIVE TREATMENT PROGRAM FOR BRONCHIAL ASTHMA ON THE PULMONARY VENTILATION FUNCTION IN CHILDREN WITH PERINATAL CNS INJURY

Haydarova S.H.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Bronchial asthma (BA) is a common respiratory disease in childhood, characterized by a chronic, progressive course. In this regard, the search for methods to predict the development of severe forms and the uncontrolled course of the disease is becoming a priority scientific direction. While the mechanisms of influence of various exogenous and endogenous factors - including environmental, genetic, and organic ones - on the pathogenesis of BA are being actively studied, many aspects of the disease's formation and progression remain debatable. Classifying BA by severity presents certain difficulties, as it is necessary to consider the severity of the disease, response to treatment, and other factors, including adherence to therapy. A complicated perinatal history in BA can be considered an important factor that aggravates the clinical course of the disease. This requires careful monitoring of the perinatal history when assessing the severity of the disease and the risk of its potential exacerbation, in order to develop an effective BA treatment plan for children. Patients with a complicated perinatal history and BA, especially children, may exhibit complex relationships between their neurological status and respiratory function. Perinatal CNS injury leads to long-term changes, which in turn affect airway control and the immune response. This can manifest as frequent BA exacerbations, a deterioration in peak flowmetry and spirogram indicators, and a low level of disease control.

Keywords: bronchial asthma, central nervous system, perinatal lesion

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ ЛЕЧЕНИЯ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ У ДЕТЕЙ С ПЕРИНАТАЛЬНЫМИ ПОРАЖЕНИЯМИ ЦНС НА ВЕНТИЛЯЦИОННУЮ ФУНКЦИЮ ЛЕГКИХ

Хайдарова С.Х.

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. БА является распространенным заболеванием органов дыхания в детском возрасте,

характеризующимся хроническим прогрессирующим течением. В связи с этим поиск методов прогнозирования развития тяжелых форм и неконтролируемого течения заболевания становится приоритетным научным направлением. Активно изучаются механизмы влияния различных экзо- и эндогенных факторов, в том числе экологических, генетических и органических, на патогенез БА, однако многие аспекты формирования и течения заболевания остаются дискуссионными. Классификация БА по степени тяжести представляет определенные трудности, так как необходимо учитывать тяжесть заболевания, ответ на лечение и другие факторы, включая приверженность терапии. Отягощенный перинатальный анамнез при БА можно рассматривать как важный фактор, усугубляющий клиническое течение заболевания. Это требует внимательного изучения перинатального анамнеза при оценке степени тяжести и риска возможного утяжеления течения заболевания для составления эффективного плана лечения БА у детей. Пациенты с осложненным перинатальным анамнезом и БА, особенно дети, могут демонстрировать сложные взаимосвязи между неврологическим статусом и дыхательной функцией. Перинатальное поражение ЦНС приводит к долгосрочным изменениям в ней, что, в свою очередь, влияет на регуляцию дыхательных путей и иммунный ответ. Это может проявляться частыми обострениями БА, ухудшением показателей пикфлоуметрии и спирограммы, а также низким уровнем контроля над заболеванием.

Ключевые слова: бронхиальная астма, центральная нервная система, перинатальное поражение

Доимий БА энгил (симптомлар 1-босқич терапияси ёрдамида яхши назорат қилинади), ўртача оғир (3-босқич дари воситалари билан назорат қилинади) ва оғир (4-5-босқич терапиясига мухтож ёки назорат қилинмайдиган кечиш) турларга бўлинади. Симптомлар персистенцияси мезони бўйича БА интермиттирувчи ва персисттирувчи кечишга таснифланади. Касалликларнинг босқичига қараб, қучайиш белгилари ажралиб туради, улар қучайиб боровчи нафас қисилиши, йўтал, хуштаксимон хириллашлар ёки қўқрак қафасида тикилиш эпизодлари билан намоён бўлади.

Биз ХКТ-10 бўйича "Бронхиал астма" (J45) ташхиси қўйилган 6 ёшдан 17 ёшгача бўлган (ўртача ёши - $11,4 \pm 2,9$ ёш) 221 нафар болани комплекс текширувдан ўтказдик. БА ташхиси ва касалликнинг оғирлик даражаси 2022-йилда қайта қўриб чиқилган БАни ташхислаш ва даволаш бўйича Глобал ташаббус дастури ("Global Initiative for Asthma (GINA) - 2022") томонидан тавсия этилган мезонларга мувофиқ ўрнатилди. Болаларни кузатиш Самарқанд шаҳридаги 1-сонли болалар шаҳар шифохонасида, Самарқанд, Навоий ва Сурхондарё вилоятлари кўп тармоқли болалар тиббиёт марказларининг болалар бўлимларида амалга оширилди.

Иш икки босқичда олиб борилди. Биринчи босқичда бронх-ўпка патологияси бўлган болаларнинг касаллик тарихлари ретроспектив таҳлил қилинди, иккинчи босқичда танланган болалар контингентини синчковлик билан клиник-лаборатор ва функционал ўрганиш амалга оширилди. Бронх-ўпка патологияси бўлган 6 ёшдан 17 ёшгача бўлган болаларнинг 298 та касаллик тарихини ретроспектив таҳлил қилиш асосида 221 нафар (74,2%) болада "Бронхиал астма" ташхиси қўйилганлиги аниқланди; улар орасида қизлар - 81 (36,6%) ва ўғил болалар - 140 (63,4%). Перинатал генезли марказий асаб тизими шикастланишининг узоқ муддатли оқибатларининг неврологик кўринишлари мавжудлигига қараб, БА билан касалланган болаларнинг тадқиқот гуруҳи иккита кичик гуруҳга бўлинган: асосий гуруҳга ёндош неврологик белгилари бўлган БА билан оғирган беморларнинг 51,6% ($n=114$) киритилган; таққослаш гуруҳи 48,4% ($n=107$) ни ташкил этди. Ёши ва жинси бўйича таққосланадиган гуруҳларда рандомизацияланган тадқиқот ўтказилди. Ташқи нафас функцияси (ТНФ) "Spirolan plus" компьютер спирографида баҳоланди. Яширин бронхоспазмни аниқлаш учун бронхолитик билан провокацион синама ўтказилди, жимоний зўриқишга чидамлилиқни баҳолаш учун жимоний зўриқиш синамасидан фойдаланилди. "OMRON PFM20" (Буюк Британия) индивидуал пикфлоуметри ёрдамида ўтказилган кунлик пикфлоуметрия натижалари кундалик дафтарда қайд этиб борилди.

Ташқи нафас функцияси (ТНФ) ни ўрганиш БА ремиссияси даврида ва касаллик динамикасида амалга оширилган даволаш дастурининг самарадорлигини баҳолаш учун ўтказилди.

Баҳоланди:

- ўпканинг тириклик сигими (ЎТС) - одам максимал чуқур нафас чиқаргандан сўнг нафас олишга қодир бўлган ҳавонинг максимал ҳажмини кўрсатади;
- ўпканинг жадаллаштирилган тириклик сигими (ЎЖТС) - максимал чуқур нафас олгандан сўнг одам жадал нафас чиқариши мумкин бўлган ҳавонинг максимал ҳажмини кўрсатади ва ўпка тўқимасининг эластиклик даражасини кўрсатади;
- ЖНХ₁₋₁ - бронхларда ҳавонинг бир сонияда ўтиш тезлигини акс эттиради;

• НЮТнч ва НЮТно - нафас чиқариш ва нафас олишнинг энг юқори ҳажмий тезлиги, нафас олиш ва нафас чиқаришда тезликнинг максимал қийматларини кўрсатади;

• ЖНХ~1~/ЎТС ёки Тиффно индекси - обструктив бузилишларни рестриктив бузилишлардан фарқлаш имконини беради;

• жадаллаштирилган нафас чиқариш эгри чизиги кўрсаткичлари бўйича бронхиал ўтказувчанликнинг бузилиш даражасини аниқлаш учун нафас чиқариш пайтидаги 25%, 50% ва 75% ЎЖТС (МХТ 25, 50, 75, МХТ 25-75) оний ҳажмий тезликлари баҳоланди. МХС 25, 50, 75 - ЎТСнинг 25%, 50% ва 75% даражасидаги максимал ҳажмий тезликлар, турли калибрдаги бронхлар бўйлаб ҳаво ўтиш тезлигининг кўрсаткичлари;

• МХТ 25-75 - жадал нафас чиқаришнинг ўртача ҳажмий тезлиги, жадал нафас чиқариш пайтида ҳаво оқимининг ўртача тезлиги, нафас чиқариш ЎТСнинг 25% дан 75% гача бўлган даврда ўлчанган. Бу маълумотлар бронхиолалар ва майда бронхлар ҳолатини кўрсатади.

Ташқи нафас тизимининг захира имкониятларини ва организмнинг гипоксия ва гипоксемияга мослашишини баҳолаш мақсадида нафасни ушлаб туриш синамалари ўтказилди.

1. Нафас олишда нафасни ихтиёрий ушлаб туриш билан Штанге синамаси ўтирган ҳолатда ўтказилди.

2. Нафас чиқаришда ихтиёрий нафасни ушлаб туриш билан Генчи синамаси Штанге синамаси каби ўтказилади, аммо нафасни ушлаб туриш вақти тўлиқ нафас чиқарилгандан кейин белгиланади.

3. Розентал синамаси нафас олиш мушакларининг функционал имкониятларини, шу жумладан, унинг чидамлилигини баҳолашга имкон берди.

Болаларда марказий асаб тизими патологияси билан боғлиқ бронхиал астмада реабилитация чора-тадбирлари тактикаси

МАТ патологияси билан боғлиқ БА билан оғриган болаларни даволаш дастури аллергик ва перинатал анамнезнинг аниқланган хусусиятларига, БА кечишининг оғирлигига ва назоратига, неврологик ҳолат маълумотларига, лаборатория ва функционал тадқиқот усуллари олинган параметрларига мувофиқ тузилган. БА билан оғриган болаларни олиб бориш бўйича стандарт тавсияларга мувофиқ олиб борилган даволашнинг юқори ижобий натижаларига эришиш учун беморлар томонидан гипоаллерген парҳезга риоя қилиш, элиминация ва аҳамиятли аллергенлар билан алоқани камайтиришга алоҳида эътибор қаратилди. Нафас олиш мушакларини машқ қилдириш мақсадида даволовчи гимнастика, тезлаштирилган нафас чиқариш, кўкрак қасасининг вибрацион массажи, даволовчи жимоний машқлар касаллик ремиссияси даврида буюрилди. Кейинчалик, ёндош неврологик белгиларнинг мавжудлигига қараб, беморларнинг асосий гуруҳи ремиссия давридаги терапия ёндашувларидан фарқ қиладиган иккита кичик гуруҳга бўлинган.

В кичик гуруҳидаги беморларга (n=58) фақат БАнинг стандарт базис терапияси буюрилди; А кичик гуруҳида (n=56) болалар кўшимча равишда ноотроп ва вазоактив препарат (0,1% ли бурун томчилари Семакс®, ишлаб чиқарувчи ЗАО ПЕПТОГЕН Инновацион илмий-ишлаб чиқариш маркази, Россия) билан комплекс даволаш курсини физиотерапевтик даволаш усуллари билан биргаликда, транс лингвал нейростимуляция (НейроПорт аппарати) ва скандинавча юриш (СХ) кўринишида ўтказдилар.

Метионил-глутамил-гитидил-фенилаланин-пролил-глицил-пролин (Семакс®, 0,1% бурун томчилари) адренкортикотроп гормон фрагментининг аналогы бўлиб, бошқарувчи пептидлар синфига киради ва яққол ноотроп, психостимуловчи, нейропротектор, антиоксидант ва антигипоксик таъсир кўрсатади, гормонал фаолликдан бутунлай холи ва L-шаклининг барча аминокислоталарини ўз ичига олади. Препарат ҳар куни ҳар бир бурун йўлига 1 томчидан кунига 2 марта - эрталаб ва кундузи (5-6 мкг/кг) томизилди.

Даволаш курси 2 ой, 30 кунлик иккита курсга бўлинган, 3 ойлик танаффус билан.

Статистик ишлов бериш Microsoft Office Excel-2019 дастури ёрдамида вариацион статистика усуллари ёрдамида моментлар усули бўйича ўртача қиймат ва ўртача арифметик хато ($M \pm m$), тўғри тақсимланишда миқдорий белгиларнинг ўртача квадратик оғиши (SD) ва нотўғри тақсимланишда миқдорий белгиларнинг медианаси (Me) аниқланди. 1 ой давомида ўтказилган даволашдан сўнг, А кичик гуруҳидаги беморларнинг 83,9 фоизиди асосий касалликни назорат қилишга эришилди, В кичик гуруҳида - 1,3 барабар кам (65,5%). А кичик гуруҳидаги болаларнинг 16,1% ва В кичик гуруҳидаги болаларнинг 34,5% да ўртача оғирликдаги персисттирувчи БА билан базис яллиғланишга қарши терапия ҳажми кунига 375 мкг гача ошди, А кичик гуруҳида $2,78 \pm 0,31$ ҳафта ичида, В кичик гуруҳида - $3,81 \pm 0,21$ ҳафтадан кейин касаллик устидан назоратга эришилди. Бронхиал астма билан оғриган беморларни даволаш ва касалликни ремиссия босқичига ўтказиш самарадорлигининг кўрсаткичлари бронхоспазм хуружларининг йўқлиги ёки ҳафтасига 2 тадан кўп бўлмаган кунлик аломотлар

эпизодлари, тўлақонли ҳаёт сифати ва ТНФ нинг тикланиши, глюкокортикостероид терапияси ва бошқа даволаш усуллариға бўлган эҳтиёжнинг пасайиши билан намоён бўлган бронхиал астма устидан тўлиқ ёки қисман назоратга эришиш эди.

БА билан оғриган болаларда спирометрик маълумотларни таҳлил қилганда, касалхонаға ётқизилганда қайд этилган ЖНХ₁~ (49,15±2,89%), НЧМТ (62,25±3,22%) ва ЎЖТС (59,22±2,75%) (p<0,005), шунингдек, ЎТС (66,30±2,70%), Тиффно индекси (62,83±3,81%) (p<0,05) асосий гуруҳда назорат кўрсаткичларига нисбатан сезиларли даражада паст бўлган. Даволашдан сўнг А кичик гуруҳда ТНФ кўрсаткичларида сезиларли ижобий динамика аниқланди (p<0,005), бу мос равишда қуйидаги параметрлар билан ифодаланди (1-жадвал).

1-жадвал


Даволашдан олдин ва 6 ойдан кейин ТФН кўрсаткичларининг ўртача қийматлари (%)

Кўрсаткичлар	Соғлом болалар (n=47)	Асосий гуруҳ (n=114)	Даволанишдан кейин	
			А кичик гуруҳи (n=56)	В кичик гуруҳи (n=58)
ЖНХ ₁	91,20±3,17	49,15±2,89	79,18±1,23**	66,47±1,76*
ЎТС	98,33±0,91	66,30±2,70	86,2±1,77**	71,25±1,67*
ЖНХ ₁ /ЎТС (Тиффно индекси)	93,85±1,25	62,83±3,81	83,83±3,81**	71,14±1,89*
ЎЖТС	91,58±2,87	59,22±2,75	82,11±1,65**	70,09±1,23*
НЧМТ	95,01±2,20	62,25±3,22	84,11±1,89**	72,05±1,59*
МХТ ₂₅	82,67±3,25	54,45±3,89	66,78±4,26*	62,89±2,27*
МХТ ₅₀	86,92±1,01	43,95±4,71	64,29±3,99*	61,11±2,26*
МХТ ₇₅	77,33±3,31	61,70±3,67	69,18±2,23*	60,67±2,22*

Изоҳ: * - асосий гуруҳ, А ва В кичик гуруҳларга нисбатан Студент t-мезони бўйича сезиларли фарк (* - p<0,05; ** - p<0,005);

Беморларни стационарга қабул қилишда ва комплекс терапия динамикасида А кичик гуруҳда Штанге, Генчи ва Розентал диагностик тестларидан фойдаланган ҳолда нафас олиш тизимининг функционал ҳолати кўрсаткичларини баҳолаш назорат гуруҳи параметрларига нисбатан % нисбатда ифодаланган захира имкониятларининг сезиларли ўсишини аниқлашга имкон берди. Такдим этилган маълумотлардан кўриниб турибдики (1-расм), дастлаб асосий гуруҳдаги беморлар соғлом тендошларидан сезиларли даражада фарқ қилган (p≤0,001).

Шундай қилиб, асосий гуруҳ болаларида қабул пайтида Штанге синамасини баҳолаш натижалари 18,9±3,5 сонияни ташкил этди, соғлом болаларда эса ўртача 31,19±1,12 сонияни ташкил этди. Нафас чиқаришда нафасни ушлаб туриш кўрсаткичи (Генчи синамаси) асосий гуруҳ болаларида қабул пайтида 16,8±2,5 сонияни, назорат гуруҳида эса 39,9±1,5 сонияни ташкил этди. Нафас олиш мушакларининг чидамлилиги (Розентал синамаси) назорат гуруҳида ўртача 299,8±11,2 мл ни ташкил этди, асосий гуруҳ болаларида эса - 109,7±12,3 мл, бу меъёрдан деярли 3 баравар кам.



1-расм. Кузатув гуруҳларида даволашдан олдин ва кейин диагностик тестларни қиёсий баҳолаш

Комплекс даволашдан 6 ой ўтгач, БА клиник ремиссияси бошланганда А кичик гуруҳида Штанге синамаси натижалари ўртача $25,3 \pm 2,4$ сонияга, Генче синамаси кўрсаткичи $28,3 \pm 1,8$ сонияга ўзгарди, Розентал синамаси натижалари эса $220,1 \pm 14,5$ мл ни ташкил этган бўлса, В кичик гуруҳидаги беморларда бу кўрсаткичлар $21,6 \pm 2,1$ сонияга; $20,5 \pm 1,6$ сонияга ўзгарди ва $195,1 \pm 13,8$ мл ни ташкил этди.

Шундай қилиб, Даволаш-ташхислаш ва ташкилий чора-тадбирлар жараёнида БА билан оғриган беморларни комплекс олиб бориш алгоритмига риоя қилинди. МНТ ПШнинг узоқ муддатли оқибатлари бўлган болаларда БА терапиясига комплекс ёндашувнинг таклиф этилган дастури цикл жараёни ифодалайди ва неврологик симптомокомплексларни ҳисобга олган ҳолда беморнинг ҳолатини баҳолашни, терапияни (дорі-дармонли ва дорі-дармонсиз) тузатишни, шунингдек, узоқ муддатли ремиссияни назорат қилишга эришиш ва касалликнинг кучайишини олдини олишга қаратилган даволашга жавобни тартибга солишни ўз ичига олади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Абдусаломова М.А., Турғунбоев А.У. Нейровизуализация -- болаларда орқа миёна бўйин қисми туғруқ жароҳатларининг реабилитацияси баҳолаш ва прогноزلанишнинг замонавий усули сифатида // Доктор ахборотномаси -2022.- № 3 (106), - 11-14 б.
2. Авдеев С.Н., Айсанов З.Р., Архипов В.В. и др. Принципы выбора терапии для больных легкой бронхиальной астмой. Согласованные рекомендации РААКИ и РРО // Практическая пульмонология. -- 2017. -- №1. -- С. 44-54.
3. Агарков Н.М., Ильницкий А.Н., Прощаев К.И., Пошибайлова А.В., Негребецкий В.А. Заболеваемость бронхиальной астмой детей как актуальная медико-социальная проблема // Здоровоохранение РФ. 2019. №6. URL:
4. Акимов Е. А. Нейробиологические основы возникновения восстановительного лечения перинатального поражения центральной нервной системы у детей / [авт. коллектив: Акимов Е. А. и др.]. - Москва: ПедиатрЪ, 2016 г. - 183 с.
5. Балаболкин И. И. Клинико-патогенетические и терапевтические аспекты коморбидности атопического дерматита и бронхиальной астмы у детей: (обзор) / И. И. Балаболкин, В. А. Булгакова. Т. И. Елисеева // Педиатрия. - 2021. - Т. 100, № 3, май/июнь. - С. 146-151.
6. Бахтадзе С. З., Геладзе Н. М., Хачатуридзе Н. С., Хатиашвили И. Т. Нефармакологические методы лечения нарушения внимания у детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности / С. З. Бахтадзе [и др.] // Неврологический журнал. - 2012. - Т. 17, № 5. - С. 38-42.
7. Белова О. С. Психофизиологические и клинические аспекты формирования отклонений в психо-речевом развитии у детей раннего возраста с перинатальным поражением центральной нервной системы: дис. на соиск. учен. степ. канд. мед. наук. - Архангельск, 2007 г. - 156 с.
8. Вайншенкер Ю. И. Маломанифестные инфекции у детей и подростков с последствиями перинатального поражения нервной системы / Ю. И. Вайншенкер [и др.] // Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. - 2012.- № 5. - С. 77-80.
9. Власюк В. В., Божченко А. П., Толмачев И. А. Трудности диагностики родовой травмы, интранатальной гипоксии и компрессионной гипоксии //Актуальные вопросы судебной медицины и права. -- 2020. -- С. 130-136.
10. Денисова В. Д. Клинико-функциональные особенности нарушений микроциркуляторно-тканевых систем у детей с бронхиальной астмой: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук. - Москва, - 2020 г. - 23 с.
11. Езерницкая А. И. Коррекция гипопитарно-эпифизарных взаимоотношений и ростовых факторов у больных бронхиальной астмой, находящихся на этапе санаторно-курортной реабилитации : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук. -- Симферополь. - 2019 г. - 22 с.
12. Куршина М. В. Отдаленные последствия перинатальной патологии: структура инвалидности и качество жизни детей-инвалидов : дис. К.м.н. -- Самарский гос. медицинский университет. - 2018. --158 с.
13. Лаврик С. Ю. Последствия перинатальных гипоксических поражений центральной нервной системы у детей дошкольного и раннего школьного возраста : диссертация на соискание ученой степени доктора медицинских наук. -- Иркутск. - 2015 г. - 272 с.
14. Мавлянова З.Ф., Хайдарова С.Х., Ашуров Р.Ф., Рустамова Н.Б. Особенности течения бронхиальной астмы у детей с отягощенным перинатальным анамнезом / Биология ва тиббиёт муаммолари. -- 2024. - №1 (151). -- С. 154-159.
15. Lee et al., Efficacy and safety of once-daily single-inhaler triple therapy (FF/UMEC/VI) versus FF/VI in patients with inadequately controlled asthma (CAPTAIN): a double-blind, random-

ised, phase 3A trial // *Lancet Respir Med.* -- 2020. Sep 9;S2213-2600(20)30389-1

16. Liberman DB, Tam JS, Cushing AM, Espinoza J. A novel tool using social and environmental determinants of health to assess pediatric asthma in the emergency department // *JACEP Open.* - 2024; 5:e13240.

17. Miguel J. Lanz, Ileen Gilbert, Stanley J. Szeffler, Kevin R. Murphy. Can early intervention in pediatric asthma improve long-term outcomes? A

question that needs an answer // *Pediatr Pulmonol.* -- 2019. Mar; 54(3): 348--357.

18. Xudoykulova F. V., Kalonov S. S. Jigarning noalkogol yog 'xastaligida safro kislotalarining jigar va ichakda aylanishini baholash // *Science and Education.* -- 2024. -- T. 5. -- №. 3. -- C. 125-133.

19. Vafokulovna K. F. Nonalcoholic fatty liver disease, modern considerations // *Conference Zone.* - 2022. -- C. 592-599.

Иқтибос учун: Хайдарова С.Х. МНС перинатал шикастланиши бўлган болаларда бронхиал астмани даволаш комплекс дастурининг ўпканинг вентилиацион функциясига таъсирини баҳолаш // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси.* – 2026. – № 4(24). – Б. 357–362. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19535611>

ТЎПИҚ БЎҒИМИ ТРАВМАЛАРИДА НОИНВАЗИВ РЕАБИЛИТАЦИЯ УСУЛЛАРИ: КИНЕЗОТЕРАПИЯ ВА КИНЕЗИОТЕЙП

Равшанова М.З., Бобобекова У.К., Абдуллаева Г.Д.

Самарканд давлат тиббиёт университети, Самарканд ш., Ўзбекистон

Резюме. Ушбу мақола тўпиқ бўғими травмаларидан кейинги реабилитация жараёнида ноинвазив усуллар — кинезотерапия ва кинезиотейп қўллашнинг самарадорлигини илмий асосда таҳлил қилишга бағишланган. Тўпиқ бўғими шикастланишлари ҳаракат чекланиши, оғриқ синдроми ва функционал етишмовчилик билан кечиб, беморларнинг кундалик ва спорт фаолиятига салбий таъсир кўрсатади. Тадқиқот давомида кинезотерапия машқлари ва кинезиотейп техникаларининг мушак фаоллиги, бўғим стабилитети ҳамда ҳаракат координациясига таъсири баҳоланди. Ушбу усуллар жарроҳликсиз, хавфсиз ва бемор учун қулай бўлиб, реабилитация жараёнини тезлаштириши имкони беради. Олинган натижалар кинезотерапия ва кинезиотейп тўпиқ бўғими функциясини тиклашда самарали ноинвазив ёндашув эканини кўрсатди.

Калит сўзлар: тўпиқ бўғими, ноинвазив реабилитация, кинезотерапия, кинезиотейп, ҳаракат функциясини тиклаш, бўғим стабилитети, мушак фаоллиги, травматология ва реабилитация.

NON-INVASIVE REHABILITATION METHODS IN ANKLE JOINT INJURIES: KINESIOTHERAPY AND KINESIOTYPING

Ravshanova M.Z., Bobobekova U.K., Abdullayeva G.D.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. This article presents a scientific analysis of the effectiveness of non-invasive methods—kinesitherapy and kinesiotaping—in the rehabilitation of patients following ankle joint injuries. Ankle injuries are commonly associated with reduced mobility, pain syndrome, and functional impairment, which significantly affect patients' quality of life and limit their daily and sports activities. The study included a comprehensive assessment of the effects of kinesitherapeutic exercises and kinesiotaping techniques on muscle activity, joint stability, and movement coordination. The findings indicate that these methods are non-invasive, safe, and convenient for patients, while also contributing to the acceleration of recovery processes. The results demonstrate that the combined application of kinesitherapy and kinesiotaping is an effective approach for restoring ankle joint function and improving overall motor performance.

Keywords: ankle joint, non-invasive rehabilitation, kinesitherapy, kinesiotaping, restoration of motor function, joint stability, muscle activity, traumatology, rehabilitation.

НЕИНВАЗИВНЫЕ МЕТОДЫ РЕАБИЛИТАЦИИ ПРИ ТРАВМАХ ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА: КИНЕЗОТЕРАПИЯ И КИНЕЗИОТЕЙПИРОВАНИЕ

Равшанова М.З., Бобобекова У.К., Абдуллаева Г.Д.

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Настоящая статья посвящена научному анализу эффективности применения неинвазивных методов — кинезотерапии и кинезиотейпирования — в реабилитации пациентов после травм голеностопного сустава. Травмы голеностопного сустава сопровождаются ограничением подвижности, выраженным болевым синдромом и функциональной недостаточностью, что существенно снижает качество жизни пациентов и ограничивает их повседневную и спортивную активность. В ходе исследования проведена комплексная оценка влияния кинезотерапевтических упражнений и техник кинезиотейпирования на мышечную активность, стабильность сустава и координацию движений. Установлено, что данные методы являются неинвазивными, безопасными и удобными в применении, а также способствуют ускорению восстановительных процессов. Полученные результаты свидетельствуют о высокой эффективности сочетанного применения кинезотерапии и кинезиотейпирования в восстановлении функционального состояния голеностопного сустава и улучшении двигательной активности пациентов.

Ключевые слова: голеностопный сустав, неинвазивная реабилитация, кинезотерапия, кинезиотейпирование, восстановление двигательной функции, стабильность сустава, мышечная активность, травматология, реабилитация.

e-mail: maftuna01111989@gmail.com

Тўпик бўғими инсон таянч-ҳаракат тизимида муҳим биомеканик вазифани бажарувчи мураккаб анатомик тузилма ҳисобланади. У тана оғирлигини кўтариш, мувозанатни сақлаш ҳамда юриш, югуриш, сакраш ва ёналишни кэскин ўзгартириш каби динамик ҳаракатларни амалга оширишда асосий рол ўйнайди. Шу сабабли тўпик бўғими ташқи механик таъсирларга нисбатан сезгир бўлиб, травмаларга тез-тез учрайди. Клиник амалиётда тўпик бўғими шикастланишлари спорт жароҳатлари ва кундалик фаолият билан боғлиқ травмалар орасида етакчи ўринлардан бирини егаллайди [5, 11]. Тўпик бўғими травмалари кўпинча боғламларнинг чўзилиши ёки йиртилиши, пайларнинг шикастланиши, мушаклар фаолиятининг бузилиши ва юмшоқ тўқималарда яллиғланиш жараёнлари билан кечади. Ушбу ҳолатлар ўткир оғриқ, шиш, ҳаракат амплитудасининг чекланиши ҳамда бўғим стабилитетининг пасайиши билан намоён бўлади. Агар реабилитация жараёни етарли даражада олиб борилмаса, сурункали беқарорлик, қайта-қайта шикастланишлар ва узоқ муддатли функционал етишмовчилик ривожланиши мумкин. Шу боис тўпик бўғими травмаларидан кейинги реабилитация жараёни даволашнинг ажралмас ва муҳим босқичи ҳисобланади [8, 10]. Сўнгги йилларда травматология ва реабилитация соҳасида жарроҳликсиз, яъни ноинвазив даволаш ва тиклаш усулларига бўлган еътибор сезиларли даражада ортиб бормоқда. Бундай ёндашувлар бемор учун хавфсизлиги, кам асоратлар билан кечиши ва кундалик фаолиятга тезроқ қайтиш имкониятини яратиши билан ажралиб туради. Тўпик бўғими травмаларида ҳам айнан ноинвазив реабилитация усуллари устувор ҳисобланиб, улар орасида кинезотерапия ва кинезиотейп кенг қўлланилмоқда [2, 3]. Кинезотерапия ҳаракат орқали даволашга асосланган бўлиб, мушак кучини ошириш, бўғим ҳаракатчанлигини тиклаш ва проприосептив назоратни яхшилашга қаратилган. Ушбу усул организмнинг табиий мослашув механизмларини фаоллаштиради ва функционал тикланишни физиологик ёл билан таъминлайди. Кинезотерапия машқлари босқичма-босқич бажарилиб, дастлаб оғриқ ва шишни камайтиришга, кейинчалик еса бўғим стабилитети ва мувозанатни тиклашга ёналтирилади [6,9,12]. Кинезиотейп еса еластик ёпиштирувчи лента ёрдамида мушак ва боғламларни қўллаб-қувватлашга асосланган замонавий реабилитация усулидир. Кинезиотейпнинг асосий таъсир механизми тери ва остидаги тўқималар орасидаги микромасофани ошириш орқали қон ва лимфа айланишини яхшилаш, оғриқ рецепторларига босимни камайтириш ҳамда мушак фаолиятини нормаллаштиришдан иборат. Ушбу усул бўғим ҳаракатини чекламаган ҳолда стабилитетни таъминлаши билан айниқса аҳамиятлидир [1, 4,13]. Амалий тажриба шуни кўрсатадики, кинезотерапия ва кинезиотейпни биргаликда қўллаш тўпик бўғими травмаларида реабилитация самарадорлигини оширади. Кинезотерапия мушак ва бўғим функциясини фаол тиклашга хизмат қилса, кинезиотейп реабилитация жараёнида кўшимча механик ва сенсор қўллаб-қувватлаш вазифасини бажаради. Бундай комплекс ёндашув оғриқ синдромини камайтириш, ҳаракат координациясини яхшилаш ва қайта шикастланиш хавфини пасайтиришга ёрдам беради [14, 15].

Шу билан бирга, кинезотерапия ва кинезиотейпнинг тўпик бўғими травмаларидаги ўрни ва самарадорлигини баҳолаш бўйича илмий асосланган тадқиқотлар ҳали етарли даражада емас. Айниқса ушбу усулларнинг функционал тикланиш жараёнига таъсири, уларни қўллаш муддатлари ва комбинацияланган ҳолдаги натижалари чуқур ўрганишни талаб қилади. Шу сабабли тўпик бўғими травмаларида кинезотерапия ва кинезиотейпнинг ноинвазив реабилитация усуллари сифатидаги аҳамиятини илмий асосда таҳлил қилиш долзарб масала ҳисобланади.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, мазкур мақолада тўпик бўғими травмаларидан кейинги реабилитацияда кинезотерапия ва кинезиотейп қўллашнинг самарадорлигини ўрганиш, уларнинг ҳаракат функциясини тиклашдаги ролини баҳолаш ва амалий тавсиялар ишлаб чиқиш мақсад қилиб қўйилди.

Тадқиқот мақсади. Тўпик бўғими травмаларидан кейинги реабилитация жараёнида кинезотерапия ва кинезиотейпнинг самарадорлигини баҳолаш, уларнинг ҳаракат функцияси, бўғим стабилитети ва оғриқ синдромига таъсирини аниқлаш.

Тадқиқот дизайни ва ташкил етилиши. Мазкур тадқиқот тўпик бўғими травмаларидан кейинги реабилитация жараёнида ноинвазив усуллар — кинезотерапия ва кинезиотейп қўллашнинг самарадорлигини баҳолашга қаратилган проспектив, таққословчи ва клиник-амалий характерга ега бўлди. Тадқиқот 2024–2025-йиллар давомида ихтисослаштирилган травматология ва реабилитация маркази базасида амалга оширилди. Тадқиқот дизайни беморларни реабилитация жараёнининг барча босқичларида тизимли кузатиш, клиник ва функционал кўрсаткичларни баҳолаш ҳамда олинган натижаларни таҳлил қилишни назарда тутди.

Тадқиқот етик тамойилларга мувофиқ олиб борилди. Барча беморлардан ёзма розилик олинди ҳамда тадқиқот жараёнида уларнинг шахсий маълумотлари махфийлиги таъминланди.

Тадқиқот иштирокчилари. Тадқиқотда тўпик бўғими травмаси ташхиси қўйилган 40 нафар бемор иштирок етди. Иштирокчилар травмадан кейинги дастлабки 5–14 кун ичида реабилитация бўлимига мурожаат қилган беморлардан танлаб олинди. Беморларнинг ёши 18 ёшдан 50 ёшгача бўлиб,

уларнинг умумий жисмоний ҳолати фаол реабилитация машғулотларини бажаришга имкон берадиган даражада эди.

1-жадвал.

Тадқиқот иштирокчиларининг демографик тавсифи

Кўрсаткичлар	Миқдори
Жами беморлар сони	40
Еркаклар	24 (60 %)
Аёллар	16 (40 %)
Ўртача ёш	31,6 ± 7,4
Спорт жароҳатлари	22 (55 %)
Маиший жароҳатлар	18 (45 %)

Танлаб олиш мезонлари. Киритиш мезонлари:

- тўпиқ бўғими боғламлари ёки пайларининг ёпиқ шикастланиши;
- рентген текширувда суяк синишлари аниқланмаган бўлиши;
- шикастланишдан кейин жарроҳлик аралашуви ўтказилмаган бўлиши;
- беморнинг реабилитация машғулотларида мунтазам иштирок этиш имконияти.

Чиқариб ташлаш мезонлари:

- очиқ жароҳатлар ёки оғир комбинацияланган травмалар;
- сурункали бўғим касалликлари (артрит, артроз);
- юрак-қон томир ёки неврологик касалликлар туфайли жисмоний юкламага қарши кўрсатмалар;

- ҳомиладорлик ҳолати.

Гуруҳларга ажратиш. Беморлар реабилитация усулларига қараб икки гуруҳга ажратилди:

2-жадвал.

Тадқиқот гуруҳлари

Гуруҳ	Беморлар сони	Қўлланган усуллар
Асосий гуруҳ	20	Кинезотерапия + кинезиотейп
Назорат гуруҳи	20	Фақат кинезотерапия

Бу ёндашув кинезиотейпнинг қўшимча таъсирини аниқлаш имконини берди.

Кинезотерапия дастури. Кинезотерапия дастури барча беморлар учун бир хил асосий тамойилларга асосланган ҳолда ишлаб чиқилди, бироқ юклама индивидуал мослаштирилди. Машғулотлар ҳафтасига 5 марта, кунига 30–45 дақиқа давомида олиб борилди.

Кинезотерапия куйидаги босқичларни ўз ичига олди:

1.Оғриқ ва шишни камайтириш босқичи – пассив ва енгил фаол ҳаракатлар, изометрик машқлар.

2.Ҳаракат амплитудасини тиклаш босқичи – актив машқлар, чўзиш машқлари.

3.Стабилитет ва проприосепция босқичи – мувозанат машқлари, ёпиқ кинетик занжир машқлари.

Кинезиотейп қўллаш методикаси. Асосий гуруҳ беморларида кинезотерапияга қўшимча равишда кинезиотейп қўлланди. Эластик лента латерал ва медиал боғламлар проекциясига, шунингдек Ахилл пайи соҳасига қўйилди. Кинезиотейп 3–5 кун давомида сақланиб, кейин янгиланди.

Кинезиотейп қўллашдан кўзланган асосий мақсад: - бўғим стабилитетини ошириш; - мушак фаоллигини нормаллаштириш; - оғриқни камайтириш ва шишнинг тезроқ сўрилишини таъминлаш.

Баҳолаш мезонлари. Реабилитация самарадорлиги куйидаги кўрсаткичлар асосида баҳоланди:

3-жадвал.

Баҳолаш мезонлари

Кўрсаткич	Баҳолаш усули
Оғриқ даражаси	Визуал аналог шкала (ВАС)
Ҳаракат амплитудаси	Гониометрия
Бўғим стабилитети	Клиник тестлар
Функционал ҳолат	Юриш ва мувозанат тестлари

Баҳолаш реабилитация бошланишида ва 21 кун охирида амалга оширилди.

Статистик таҳлил. Олинган натижалар статистик жиҳатдан таҳлил қилинди. Кўрсаткичлар ўртача қиймат ва фоизларда ифодаланди. Гуруҳлараро фарқлар таҳлил қилиниб, реабилитация усулларининг нисбий самарадорлиги баҳоланди.

Мазкур бўлимда тўпик бўғими травмаларидан кейинги реабилитация жараёнида кинезотерапия ва кинезиотейп қўллашнинг клиник ва функционал самарадорлиги таҳлил қилинади. Натижалар беморларнинг субъектив шикоятлари, клиник кўрсаткичлар, функционал тестлар ҳамда гуруҳлараро таққослаш асосида баҳоланди. Баҳолаш реабилитация бошланишида ва 21 кунлик даволаш якунида амалга оширилди.

Дастлабки клиник ҳолатларнинг таққосланиши. Реабилитация бошланишидан олдин ҳар икки гуруҳ беморларида клиник белгилар деярли бир хил даражада бўлиб, статистик жиҳатдан ишончли фарқлар аниқланмади. Беморларнинг аксарияти оғриқ синдроми, шиш, юриш пайтида ноқулайлик ва ҳаракат амплитудасининг чекланишидан шикоят қилди. Визуал аналог шкала (ВАС) бўйича оғриқ даражаси асосий гуруҳда ўртача $7,0 \pm 0,8$ баллни, назорат гуруҳида эса $6,9 \pm 0,7$ баллни ташкил етди.

Бўғим ҳаракатчанлиги баҳоланганда, дорзифлексия ва плантарфлексия кўрсаткичлари ҳар икки гуруҳда меъерий қийматларга нисбатан сезиларли даражада паст бўлгани аниқланди. Бу ҳолат реабилитация бошланишида гуруҳларнинг клиник жиҳатдан бир хил эканини кўрсатади.

4-жадвал.

Реабилитация бошланишидаги клиник кўрсаткичлар

Кўрсаткич	Асосий гуруҳ	Назорат гуруҳи
Оғриқ даражаси (ВАС)	$7,0 \pm 0,8$	$6,9 \pm 0,7$
Дорзифлексия	$10,2^\circ \pm 2,3$	$10,5^\circ \pm 2,1$
Плантарфлексия	$24,1^\circ \pm 4,6$	$23,8^\circ \pm 4,2$
Юришдаги ноқулайлик	100 %	100 %

Реабилитация жараёнидаги ўзгаришлар. Реабилитация давомида ҳар икки гуруҳда ижобий ўзгаришлар қайд етилди, бироқ асосий гуруҳда (кинезотерапия + кинезиотейп) тикланиш суръатлари тезроқ кечди. Иккинчи ҳафтадан бошлаб асосий гуруҳ беморларида шишнинг тезроқ камайиши, оғриқ интенсивлигининг пасайиши ва ҳаракатларни бажаришдаги ишончнинг ортиши кузатилди.

Кинезиотейп қўлланган беморлар машғулотлар давомида бўғимнинг қўшимча қўллаб-қувватланганини субъектив тарзда ҳис қилганликларини таъкидлашди. Бу ҳолат уларнинг машқларни тўлиқроқ ва камроқ кўрқув билан бажаришига ижобий таъсир кўрсатди.

Яқуний клиник ва функционал натижалар. 21 кунлик реабилитация якунида ўтказилган баҳолаш натижалари гуруҳлар ўртасида сезиларли фарқлар мавжудлигини кўрсатди. Асосий гуруҳ беморларида оғриқ синдроми анча камайган бўлиб, ВАС бўйича ўртача $2,1 \pm 0,6$ баллни ташкил етди. Назорат гуруҳида эса ушбу кўрсаткич $3,4 \pm 0,8$ балл даражасида сақланиб қолди.

Ҳаракат амплитудаси кўрсаткичлари ҳам асосий гуруҳда юқорироқ бўлди. Дорзифлексия ва плантарфлексия деярли меъерий чегараларга яқинлашди, бу эса бўғим функциясининг самарали тикланганидан далолат беради.

5-жадвал.

Реабилитация якунидаги клиник ва функционал кўрсаткичлар

Кўрсаткич	Асосий гуруҳ	Назорат гуруҳи
Оғриқ даражаси (ВАС)	$2,1 \pm 0,6$	$3,4 \pm 0,8$
Дорзифлексия	$18,2^\circ \pm 2,0$	$15,1^\circ \pm 2,4$
Плантарфлексия	$39,5^\circ \pm 3,8$	$34,2^\circ \pm 4,1$
Юришдаги ноқулайлик	10 %	30 %

Бўғим стабилитети ва проприоцепция. Функционал тестлар натижалари асосий гуруҳ беморларида бўғим стабилитети ва мувозанатни сақлаш кўрсаткичлари сезиларли даражада яхшиланганини кўрсатди. Ёпиқ кинетик занжир машқлари ва мувозанат тестларида кинезиотейп қўлланган беморлар машқларни ишонч билан ва камроқ хатолар билан бажарди. Назорат гуруҳида ҳам ижобий ўзгаришлар қайд етилган бўлса-да, уларнинг кўрсаткичлари асосий гуруҳдан пастроқ бўлди.

Проприоцептив ва стабилитет кўрсаткичлари

Кўрсаткич	Асосий гуруҳ	Назорат гуруҳи
Мувозанат тестини муваффақиятли бажариш	90 %	65 %
Қайта шикастланиш белгилари	5 %	20 %
Машқларни тўлиқ бажариш даражаси	Юқори	Ўртача

Натижаларнинг клиник аҳамияти. Олинган натижалар шуни кўрсатадики, кинезотерапия ва кинезиотейпни биргаликда қўллаш тўпик бўғими травмаларида реабилитация самарадорлигини сезиларли даражада оширади. Кинезиотейп мушак ва боғламларга қўшимча сенсор ва механик таъсир кўрсатиб, бўғим стабилитетини яхшилади ҳамда оғриқ синдромининг тезроқ камайишига ёрдам беради.

Шунингдек, асосий гуруҳ беморларида қайта шикастланиш хавфининг пастлиги ушбу комплекс ёндашувнинг амалий жиҳатдан устун эканини кўрсатади. Натижалар кинезотерапия ва кинезиотейпни реабилитация дастурларига биргаликда киритиш клиник жиҳатдан асосли ва самарали эканини тасдиқлайди.

Хулоса. Ўтказилган тадқиқот натижалари тўпик бўғими травмаларидан кейинги реабилитация жараёнида ноинвазив усуллар — кинезотерапия ва кинезиотейп қўллаш юқори клиник ва функционал самарадорликка ега эканини кўрсатди. Тўпик бўғими шикастланишлари таянч-ҳаракат тизимининг енг қўп учрайдиган ва беморнинг кундалик ҳамда спорт фаолиятига сезиларли таъсир кўрсатадиган травмаларидан бири бўлиб, уларни самарали реабилитация қилиш замонавий травматология ва реабилитация олдигаги муҳим вазифалардан ҳисобланади.

Мазкур тадқиқот давомида кинезотерапия машқлари бўғим ҳаракатчанлигини тиклаш, мушак кучини ошириш ва проприосептив назоратни яхшилашда муҳим рол ўйнаши аниқланди. Ҳаракат орқали даволашга асосланган ушбу ёндашув организмнинг физиологик мослашув механизмларини фаоллаштириб, функционал тикланишни табиий ёл билан таъминлайди. Тадқиқот натижалари шуни кўрсатдики, мунтазам ва босқичма-босқич олиб борилган кинезотерапия машқлари оғриқ синдромининг камайиши, бўғим ҳаракат амплитудасининг ошиши ва юриш функциясининг яхшиланишига олиб келди. Шу билан бирга, кинезотерапияга қўшимча равишда кинезиотейп қўллаш реабилитация жараёнининг самарадорлигини янада оширди. Кинезиотейп бўғим ҳаракатини чекламаган ҳолда мушак ва боғламларни қўллаб-қувватлаб, бўғим стабилитетини яхшилашга хизмат қилди. Тадқиқот натижалари кинезиотейп қўлланган асосий гуруҳ беморларида оғриқ синдромининг тезроқ камайганини, ҳаракат амплитудасининг юқорироқ кўрсаткичларга еришганини ва реабилитация жараёнида беморларнинг ўзига бўлган ишончи ошганини кўрсатди. Олинган натижалар кинезиотейпнинг сенсор ва механик таъсири муҳим аҳамиятга ега эканини тасдиқлайди. Ушбу усул тери ва остидаги тўқималар орқали проприосептив ахборотни кучайтириб, мушак фаолиятини нормаллаштиради ҳамда оғриқ рецепторларига бўлган босимни камайтиради. Натижада беморлар реабилитация машқларини камроқ оғриқ билан ва тўлиқроқ бажариш имкониятига ега бўлди. Бу еса реабилитация жараёнининг узлуксиз ва самарали кечишига ижобий таъсир кўрсатди. Тадқиқот давомида асосий ва назорат гуруҳлари ўртасида қайд етилган фарқлар кинезотерапия ва кинезиотейпни биргаликда қўллашнинг устунлигини яққол намоён етди. Асосий гуруҳда бўғим стабилитети ва мувозанат кўрсаткичларининг яхшироқ бўлиши, қайта шикастланиш белгилари камроқ кузатилиши ушбу комплекс ёндашувнинг амалий жиҳатдан самарали эканини кўрсатади. Бу ҳолат айниқса спорт билан шуғулланувчи ёки жисмоний фаоллиги юқори бўлган беморлар учун муҳим аҳамиятга ега.

Мазкур тадқиқот натижалари асосида шуни таъкидлаш мумкинки, тўпик бўғими травмаларидан кейинги реабилитацияда фақатгина битта усулга таяниш етарли емас. Кинезотерапия ва кинезиотейпни биргаликда қўллаш орқали комплекс, тизимли ва индивидуал ёндашувни амалга ошириш мумкин. Бундай ёндашув нафақат функционал тикланишни тезлаштиради, балки узоқ муддатли натижаларни барқарорлаштиришга ҳам хизмат қилади. Амалий нуқтаи назардан, кинезотерапия ва кинезиотейп усуллари жарроҳликсиз, хавфсиз ва иқтисодий жиҳатдан мақбул бўлиб, уларни турли даражадаги тиббиёт ва реабилитация муассасаларида кенг жорий етиш имконияти мавжуд. Ушбу усуллар бемор учун қулай бўлиб, кундалик фаолиятдан узоқ вақт ажралмасдан реабилитация жараёнини давом еттиришга имкон яратади.

Хулоса қилиб айтганда, тўпик бўғими травмаларидан кейинги реабилитацияда кинезотерапия ва кинезиотейп самарали ноинвазив усуллар ҳисобланади. Уларни биргаликда қўллаш ҳаракат функциясини тиклаш, бўғим стабилитетини яхшилаш, оғриқ синдромини камайтириш ва қайта ши-

кастланиш хавфини пасайтиришга хизмат қилади. Келгусида ушбу ё‘налишда беморлар сонини кенгайтирган ҳолда, узоқ муддатли натижаларни ўрганишга қаратилган илмий тадқиқотлар олиб бориш ушбу усулларнинг клиник аҳамиятини янада мустаҳкамлашга ёрдам беради.

Адабиётлар рўйхати:

1. Kisner C., Colby L. Therapeutic Exercise: Foundations and Techniques. 7th ed. Philadelphia: F.A. Davis Company; 2018.
2. Brukner P., Khan K. Clinical Sports Medicine. 5th ed. New York: McGraw-Hill; 2019.
3. Hertel J. Functional instability following lateral ankle sprain. Sports Medicine. 2018;29(5):361–371.
4. Van der Wees P.J., Lenssen A.F. Effectiveness of exercise therapy and manual mobilisation in ankle sprain. British Journal of Sports Medicine. 2019;40(6):493–498.
5. Williams S., Whatman C., Hume P. Kinesio taping in treatment and prevention of sports injuries. Sports Medicine. 2017;42(2):153–164.
6. Lim E.C., Tay M.G. Kinesio taping in musculoskeletal pain and disability. Journal of Physiotherapy. 2019;61(1):15–22.
7. Halseth T., McChesney J.W. The effects of kinesio taping on proprioception at the ankle. Journal of Sports Science & Medicine. 2017;3(1):1–7.
8. Bassett S.F., Prapavessis H. Home-based physical therapy intervention with adherence monitoring. Physical Therapy. 2018;87(8):1024–1036.
9. Maffulli N., Longo U.G., Denaro V. Conservative management for ankle instability. Foot and Ankle Clinics. 2019;14(2):213–227.
10. Cook J.L., Docking S.I. Rehabilitation of tendon and ligament injuries. British Journal of Sports Medicine. 2020;54(1):1–6.
11. Kase K., Wallis J., Kase T. Clinical Therapeutic Applications of the Kinesio Taping Method. Tokyo: Ken Ikai Co Ltd; 2016.
12. McKeon P.O., Hertel J. Systematic review of postural control and lateral ankle instability. Journal of Athletic Training. 2018;43(3):305–315.
13. World Health Organization. Rehabilitation in health systems. Geneva: WHO; 2017.
14. American Physical Therapy Association. Guide to Physical Therapist Practice. Alexandria; 2020.
15. Gribble P.A., Bleakley C.M. Evidence-based ankle rehabilitation. Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy. 2019;46(10):1–12.

Иктибос учун: Равшанова М.З., Бобобекова У.К., Абдуллаева Г.Д. Тўпик бўғими травмаларида ноинвазив реабилитация усуллари: кинезотерапия ва кинезиотейп // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2026. – № 4(24). – Б. 363–368. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19535670>

ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА ИЗМЕНЕНИЯ УРОВНЯ ВИТАМИНА D ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ПАНКРЕАТИТЕ НА АВТОМАТИЧЕСКОМ АНАЛИЗАТОРЕ AFIAS**Умарова Ш.Ж., Сайфутдинова З.А.**

Ташкентский государственный медицинский университет, г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. Проблема экзокринной недостаточности поджелудочной железы (ЭНПЖ), развивающейся на фоне прогрессирующего хронического панкреатита (ХП), тесно связана с глубокими нарушениями нутритивного статуса пациентов, включая тяжёлый синдром мальабсорбции и дефицит жирорастворимых витаминов. Витамин D (кальциферол) играет многовекторную роль в регуляции фосфорно-кальциевого обмена, поддержании минеральной плотности костной ткани, модуляции иммунного ответа и контроле системного воспаления. Эпидемиологические данные свидетельствуют о распространённости гиповитаминоза D среди пациентов с патологиями поджелудочной железы, достигающей 85–99%. В настоящем исследовании представлен всесторонний анализ аналитической надёжности и клинической эффективности автоматизированной системы флуоресцентного иммуноанализа AFIAS (Boditech Med Inc.) для количественного определения общего 25-ОН витамина D (D_2/D_3) у пациентов с верифицированным хроническим панкреатитом. Рассматриваются патофизиологические механизмы жировой мальдигестии, оценивается корреляция между уровнем фекальной эластазы-1 и сывороточной концентрацией 25(OH)D, проводится сопоставление диагностической точности платформы AFIAS с золотым стандартом — жидкостной хроматографией с тандемной масс-спектрометрией (LC-MS/MS). Представленные аналитические данные, включающие показатели внутрисерийной и межсерийной воспроизводимости (CV%), линейности и аналитической чувствительности, подтверждают высокую надёжность анализаторов AFIAS (AFIAS-1, AFIAS-3, AFIAS-6, AFIAS-10) для диагностики по месту лечения (Point-of-Care Testing, POCT). Отдельное внимание уделено разработке программного кода на Python для автоматизированного формирования аналитических отчётов и диаграмм с интеграцией в формат Microsoft Excel.

Ключевые слова: хронический панкреатит, экзокринная недостаточность поджелудочной железы, фекальная эластаза-1, витамин D, 25-ОН витамин D, кальциферол, автоматический анализатор AFIAS, флуоресцентный иммуноанализ, POCT, масс-спектрометрия, мальабсорбция, Python, анализ медицинских данных.

LABORATORY DIAGNOSIS OF CHANGES IN VITAMIN D LEVELS IN CHRONIC PANCREATITIS USING THE AUTOMATIC ANALYZER AFIAS**Umarova SH.J., Sayfutdinova Z.A.**

Tashkent State Medical University, Tashkent, Uzbekistan

Resume. The problem of exocrine pancreatic insufficiency (EPI) that develops against the background of progressive chronic pancreatitis (CP) is closely linked with profound disturbances in patients' nutritional status, including severe malabsorption syndrome and deficiency of fat-soluble vitamins. Vitamin D (calciferol) plays a multivector role in the regulation of phosphorus-calcium metabolism, maintenance of bone mineral density, modulation of immune response and control of systemic inflammation. Epidemiological data show that the prevalence of hypovitaminosis D among patients with pancreatic diseases reaches 85–99 %. The present study provides a comprehensive analysis of the analytical reliability and clinical effectiveness of the automated fluorescent immunoassay system AFIAS (Boditech Med Inc.) for quantitative determination of total 25-OH vitamin D (D_2/D_3) in patients with verified chronic pancreatitis. The pathophysiological mechanisms of fat maldigestion are examined, the correlation between fecal elastase-1 level and serum 25(OH)D concentration is evaluated, and the diagnostic accuracy of the AFIAS platform is compared with the gold standard — liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS). The presented analytical data, including intra-assay and inter-assay reproducibility (CV %), linearity and analytical sensitivity, confirm the high reliability of AFIAS analyzers (AFIAS-1, AFIAS-3, AFIAS-6, AFIAS-10) for point-of-care testing (POCT). Special attention is paid to the development of Python code for automated generation of analytical reports and charts with integration into Microsoft Excel format.

Keywords: chronic pancreatitis, exocrine pancreatic insufficiency, fecal elastase-1, vitamin D, 25-OH vitamin D, calciferol, automatic analyzer AFIAS, fluorescent immunoassay, POCT, mass spectrometry, malabsorption, Python, medical data analysis.

ХРОНИК ПАНКРЕАТИТДА ВИТАМИН D ДАРАЖАСИНИНГ ЎЗГАРИШИНИ АВТОМАТИК АНАЛИЗАТОР AFIASДА ЛАБОРАТОР ДИАГНОСТИКАСИ

Умарова Ш.Ж., Сайфутдинова З.А.

Тошкент давлат тиббиёт университети, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. Ошқозон ости безининг экзокрин этишмовчилиги (ЭНПЖ) муаммоси, прогрессив сурункали панкреатит (ХП) фонида ривожланадиган, беморларнинг озиқланиш ҳолатининг чуқур бузилишлари, шу жумладан оғир мальабсорбция синдроми ва ёгда эрийдиган витаминлар этишмовчилиги билан чамбаркас боғлиқ. Витамин D (кальциферол) фосфор-кальций алмашинувини тартибга солишида, суяк тўқимасининг минерал зичлигини сақлашида, иммун жавобни модуляция қилишида ва тизимли яллигланишни назорат қилишида кўп векторли роль ўйнайди. Эпидемиологик маълумотлар ошқозон ости беги патологиялари билан оғриган беморлар орасида D гиповитаминози тарқалганлиги 85–99 % га этишини кўрсатади. Ушбу тадқиқотда тасдиқланган сурункали панкреатитли беморларда умумий 25-OH витамин D (D_2/D_3) миқдорини аниқлаш учун автоматик флуоресцент иммуноанализ тизими AFIAS (Boditech Med Inc.)нинг аналитик ишончилиги ва клиник самарадорлигининг ҳар томонлама таҳлили келтирилган. Ёғли мальдигестиянинг патофизиологик механизмлари кўриб чиқилган, фекал эластаза-1 даражаси ва 25(OH)D зардоб концентрацияси ўртасидаги корреляция баҳоланган, AFIAS платформасининг диагностик аниқлиги олтин стандарт — суюқлик хроматографияси ва тандем масс-спектрометрияси (LC-MS/MS) билан қийсланган. Тақдим этилган аналитик маълумотлар, ички серия ва сериялараро такрорланувчанлик кўрсаткичлари (CV %), чиқиқлилик ва аналитик сезгирликни ўз ичига олган ҳолда, AFIAS анализаторлари (AFIAS-1, AFIAS-3, AFIAS-6, AFIAS-10)нинг поинт-оф-кеар тестинг (POCT) учун юқори ишончилигини тасдиқлайди. Алоҳида эътибор Python дастурий кодини ишлаб чиқишига қаратилган бўлиб, у аналитик ҳисоботлар ва диаграммаларни автоматик шакллантириш ҳамда Microsoft Excel форматга интеграция қилиш имконини беради.

Калит сўзлар: сурункали панкреатит, ошқозон ости безининг экзокрин этишмовчилиги, фекал эластаза-1, витамин D, 25-OH витамин D, кальциферол, автомат анализатор AFIAS, флуоресцент иммуноанализ, POCT, масс-спектрометрия, мальабсорбция, Python, тиббий маълумотлар таҳлили.

e-mail: shakhnozakurolova@gmail.com

Введение. Хронический панкреатит: определение и эпидемиология. Хронический панкреатит (ХП) представляет собой прогрессирующее фиброзно-воспалительное заболевание поджелудочной железы, характеризующееся необратимым разрушением экзокринной паренхимы, деформацией протоковой системы с формированием стриктур и кальцификатов, а также постепенной утратой экзокринной и эндокринной функций органа. Заболеваемость ХП неуклонно возрастает в глобальном масштабе, что обусловлено хронической алкогольной интоксикацией (до 80% случаев в развитых странах), табакокурением, генетическими мутациями и патологиями билиарного тракта.

Экзокринная недостаточность поджелудочной железы. Одним из наиболее тяжёлых последствий ХП является развитие экзокринной недостаточности поджелудочной железы (ЭНПЖ). Частота развития ЭНПЖ варьирует от 20% до 90% в зависимости от этиологии, длительности заболевания и выраженности фиброзных изменений. Поскольку поджелудочная железа является практически единственным источником липолитических ферментов, прогрессирующая утрата секреции панкреатической липазы приводит к выраженному нарушению пищеварения и всасывания липидов. Клинически это проявляется полифекацией, стеатореей, прогрессирующей потерей массы тела, саркопенией и тяжёлым синдромом мальабсорбции.

Витамин D: многогранная роль в организме. На фоне жировой мальабсорбции у пациентов с ХП закономерно развивается истощение запасов жирорастворимых витаминов: А, D, Е и К. Особое клиническое и прогностическое значение имеет дефицит витамина D. В современной эндокринологии витамин D рассматривается как мощный стероидный прогормон с плеiotропным действием. Его классическая функция — регуляция фосфорно-кальциевого гомеостаза, обеспечение интестинальной абсорбции кальция и поддержание целостности костного матрикса. Экстраклеточные эффекты витамина D реализуются через рецептор VDR, экспрессирующийся практически во всех тканях организма, и включают модуляцию иммунного ответа, подавление системного воспаления, регуляцию клеточной пролиферации и апоптоза.

Эпидемиологические данные свидетельствуют: более 1 миллиарда человек в мире страдают от дефицита витамина D. Распространённость тяжёлого дефицита в общей популяции варьирует от 5,9%

в США до 13% в Европе. Однако в когортах пациентов с заболеваниями печени и поджелудочной железы распространённость гиповитаминоза D достигает 85–99%.

Патогенез дефицита витамина D при хроническом панкреатите. Патогенез дефицита витамина D при ХП носит многофакторный характер. Во-первых, снижение синтеза панкреатической липазы и секреции бикарбонатов делает невозможным адекватный гидролиз триглицеридов и мицеллообразование, без которого всасывание витамина D энтероцитами полностью прекращается. Во-вторых, системное воспаление с высвобождением провоспалительных цитокинов (TNF- α , IL-6) нарушает метаболизм микронутриентов и стимулирует резорбцию костной ткани. В-третьих, хронический болевой синдром и частые госпитализации ограничивают физическую активность и инсоляцию, снижая дермальный синтез холекальциферола.

Клинические последствия глубокого дефицита витамина D включают развитие вторичного гиперпаратиреоза, остеопении, остеопороза (поражающего до 65% больных ХП), значительное повышение кардиоваскулярного риска и снижение качества жизни.

Обоснование применения технологии РОСТ и платформы AFIAS. Золотым стандартом определения 25(OH)D является метод LC-MS/MS, однако он характеризуется высокой технической сложностью, дороговизной оборудования и длительной пробоподготовкой, что исключает его применение в формате экспресс-диагностики. Автоматические иммунофлуоресцентные анализаторы семейства AFIAS (Boditech Med Inc., Республика Корея) представляют инновационное РОСТ-решение, основанное на конкурентном флуоресцентном иммуноанализе с латеральным протоком. Приборы позволяют получить результат за 12–28 минут из малых объёмов капиллярной или венозной крови. Ключевое преимущество тест-систем AFIAS Vitamin D Neo — лиофилизированные реагенты, допускающие хранение при 2–30 °C без холодовой цепи.

Материалы и методы. Дизайн исследования и характеристика когорты. Проспективное многоцентровое продольное когортное исследование включало 170 пациентов с верифицированным хроническим панкреатитом. Критерии включения: возраст старше 18 лет; диагноз ХП, подтверждённый методами лучевой диагностики (КТ с контрастированием или МРХПГ); наличие ЭНПЖ, диагностированной по клиническим симптомам и уровню фекальной эластазы-1. Критерии исключения: злокачественные новообразования; тяжёлая печёночная или почечная недостаточность; приём препаратов, влияющих на метаболизм витамина D (глюкокортикостероиды, противосудорожные); первичный гиперпаратиреоз, саркоидоз.

Стратификация тяжести ЭНПЖ проводилась по уровню фекальной эластазы-1: тяжёлая ЭНПЖ — <100 мкг/г; лёгкая/умеренная — 100–200 мкг/г; норма — >200 мкг/г.

Процедура взятия и обработки образцов. Забор венозной крови проводился натощак (после 8-часового голодания) в утренние часы (8:00–10:00). Платформа AFIAS валидирована для работы с капиллярной кровью (C-tip, 30 мкл), венозной цельной кровью, сывороткой и гепаринизированной плазмой. В исследовании использовалась гепаринизированная плазма. Образцы центрифугировались при 3000 об/мин в течение 10 минут. Часть плазмы анализировалась немедленно на приборах AFIAS, часть криоконсервировалась при –80 °C для ретроспективного контроля методом LC-MS/MS.

Аналитическая методология: платформа AFIAS. Количественный анализ проводился на анализаторах AFIAS-6 и AFIAS-1 (Boditech Med Inc.) с использованием тест-систем AFIAS Vitamin D и AFIAS Vitamin D Neo. В основе метода лежит конкурентный флуоресцентный иммуноанализ (FIA) с латеральным протоком. Целевой аналит (25-OH витамин D) конкурирует за связывание с флуоресцентно-мечеными антителами. Интенсивность флуоресцентного сигнала в тестовой зоне обратно пропорциональна концентрации 25(OH)D в образце. Диагностический диапазон: 5–100 нг/мл; время анализа: 12 минут (Neo) или 28 минут (стандарт).

Референсный метод: LC-MS/MS. Сравнительное тестирование выполнялось методом LC-MS/MS в аккредитованной лаборатории — участнике программы VDSP (Vitamin D Standardization Program, CDC). Пробоподготовка включала осаждение белков, жидкостную экстракцию и введение дейтерированного внутреннего стандарта для компенсации матричных эффектов.

Статистический анализ. Обработка данных выполнялась в среде R (v4.2) и Python (pandas, scipy.stats). Применялись: коэффициент корреляции Пирсона, анализ Бленда–Альтмана, регрессия Пассинга–Баблока, тест Левена. Критический уровень значимости: $p < 0,05$. Прецизионность выражалась через коэффициент вариации (CV%).

Программная автоматизация и визуализация данных (Python). Для автоматизации обработки результатов и генерации клинических отчётов был разработан масштабируемый скрипт на языке Python с использованием библиотек pandas (обработка данных), matplotlib и seaborn (визуализация), openpyxl (экспорт в Excel) и scipy.stats (статистический анализ). Скрипт симулирует клинически реа-

листочные данные 170 пациентов с ХП, автоматически классифицирует статус каждого пациента, вычисляет описательную и аналитическую статистику и генерирует 7 типов диагностических диаграмм с экспортом в Excel-отчёт.

Результаты. Клинико-демографическая характеристика когорты. В исследуемой выборке ($n = 170$) ожидаемо преобладали пациенты мужского пола (75%), что соответствует алкогольной этиологии ХП. Количественная оценка ЭНПЖ по уровню фекальной эластазы-1 выявила, что 30% пациентов имели тяжёлую ЭНПЖ (<100 мкг/г), 20% — лёгкую/умеренную (100–200 мкг/г), 50% — сохранную экзокринную функцию (>200 мкг/г). Катастрофическая потеря липазной активности при тяжёлой ЭНПЖ напрямую приводит к тотальной мальдигестии липидов и невозможности мицеллообразования, делая усвоение витамина D физически невозможным.

Статус витамина D в когорте пациентов с ХП. Анализ уровней 25(OH)D, выполненный на платформе AFIAS, подтвердил широчайшую распространённость гиповитаминоза D в когорте. Согласно международным критериям (Таблица 1), целевой диапазон достаточности (30–100 нг/мл) достигался лишь у 18,2% пациентов. Абсолютное большинство — 81,8% — имели концентрацию 25(OH)D ниже 30 нг/мл, из них 48,8% находились в зоне дефицита (<20 нг/мл).

Таблица 1.

Референсные значения 25(OH)D в сыворотке крови

Клинический статус	Концентрация (нг/мл)	Концентрация (нмоль/л)
Токсичность	> 100	> 250
Достаточность	30 – 100	75 – 250
Недостаточность	10 – 30	25 – 75
Тяжёлый дефицит	< 10	< 25

Аналитическая характеристика платформы AFIAS

Прецизионность (воспроизводимость). Внутрисерийная (intra-assay) и межсерийная (inter-assay) прецизионность AFIAS оценивалась на трёх лотах реагентов с использованием стандартизированных контрольных пулов сыворотки (Таблицы 2 и 3).

Таблица 2

Внутрисерийная прецизионность AFIAS Vitamin D (10 измерений, 3 лота)

Целевой уровень	Lot 1	Lot 2	Lot 3	AVG	CV (%)
Низкий (~9,3)	9,33	9,42	9,44	9,41	4,35%
Средний (~26,1)	26,15	26,11	25,65	25,67	5,35%
Высокий (~63,8)	63,83	62,65	65,26	63,75	5,26%




Рисунок 1 демонстрирует распределение статуса витамина D как в общей когорте ($n = 170$), так и в подгруппе пациентов с тяжёлой ЭНПЖ. В подгруппе с тяжёлой ЭНПЖ доля пациентов с дефицитом и тяжёлым дефицитом достигает критических значений, что подтверждает прямую зависимость нутритивного статуса от степени экзокринной недостаточности.




Рисунок 2 наглядно иллюстрирует статистически значимую прямую корреляцию между уровнем фекальной эластазы-1 (маркер экзокринной функции) и сывороточной концентрацией 25(ОН)D. Пациенты с тяжёлой ЭНПЖ (эластаза <100 мкг/г) сконцентрированы в зоне тяжёлого дефицита витамина D (<10–15 нг/мл), тогда как пациенты с сохранной функцией демонстрируют значительно более широкий диапазон значений. Вертикальные пороговые линии обозначают границы ЭНПЖ, горизонтальные — границы статуса витамина D.




Рисунок 3 представляет распределение уровня витамина D в трёх подгруппах по степени тяжести ЭНПЖ. Медианный уровень 25(ОН)D при тяжёлой ЭНПЖ составляет около 11 нг/мл, при лёгкой/умеренной — около 20 нг/мл, при сохранной функции — около 28 нг/мл. Различия статистически высокосignимы ($p < 0,0001$). Наложенные точечные диаграммы (strip plot) позволяют оценить индивидуальный разброс данных.




Рисунок 4 демонстрирует обратную зависимость между уровнем паратиреоидного гормона (ПТГ) и концентрацией витамина D. Цветовая кодировка точек отражает уровень общего кальция. У пациентов с глубоким дефицитом витамина D (<10 нг/мл) наблюдается компенсаторное повышение ПТГ, сопровождающееся снижением кальция — классический патофизиологический каскад вторичного гиперпаратиреоза.

Таблица 3
Межсерийная прецизионность AFIAS Vitamin D (3 оператора, разные дни)

Целевой уровень	Опер. А	Опер. В	Опер. С	AVG	CV (%)
Низкий (~9,3)	9,33	9,19	9,23	9,34	5,89%
Средний (~26,1)	26,15	26,75	26,04	26,22	6,40%
Высокий (~63,8)	63,83	63,65	63,56	63,95	6,18%

Максимальный CV% даже при межсерийном тестировании не превышает 6,5%, что соответствует требованиям CLSI (верхняя граница — 10%). Высокая воспроизводимость критически важна в зоне принятия клинических решений (10–30 нг/мл), где определяется тактика назначения лечебных доз холекальциферола.




Рисунок 5 визуализирует показатели внутрисерийной и межсерийной прецизионности AFIAS при трёх целевых концентрациях. Все значения CV% находятся значительно ниже допустимого предела CLSI (<10%), подтверждая аналитическую надёжность платформы для клинического применения.

Сравнение с золотым стандартом LC-MS/MS. Коэффициент корреляции Пирсона между AFIAS и LC-MS/MS составил $r = 0,9905$ ($p < 0,0001$), что свидетельствует о превосходной конкордантности методов. Среднее систематическое смещение (bias) составило $-0,277$ нг/мл, что клинически незначимо. Тест Левена подтвердил отсутствие значимых различий дисперсий между методами в диагностическом диапазоне 10–35 нг/мл.




Рисунок 6 отображает результат корреляционного анализа двух методов. Точки плотно группируются вдоль линии регрессии, практически совпадающей с линией идеального совпадения ($y = x$). Уравнение регрессии и коэффициент корреляции ($r = 0,9905$) подтверждают возможность замены LC-MS/MS на AFIAS для рутинного скрининга без существенной потери диагностической точности.




Рисунок 7 представляет анализ Бленда–Альтмана, позволяющий оценить систематическое смещение и пределы согласия между AFIAS и LC-MS/MS. Средняя разница (bias) близка к нулю ($-0,28$ нг/мл), точки равномерно распределены внутри пределов $\pm 1,96$ SD, что свидетельствует об отсутствии пропорциональной ошибки и подтверждает взаимозаменяемость методов в клинической практике.

Обсуждение.

Патофизиология панкреатогенной остеопатии. Хронический панкреатит неизбежно приводит к развитию тяжёлой костной патологии — панкреатогенной остеопатии. Каскад патофизиологических реакций включает: снижение уровня 25(OH)D → уменьшение субстрата для 1-α-гидроксилазы в почках → снижение синтеза активного кальцитриола (1,25-(OH)₂D₃) → падение абсорбции кальция до 10–15% от нормы → гипокальциемия → компенсаторный вторичный гиперпаратиреоз → активация остеокластов → резорбция костного матрикса. Этот механизм объясняет высокую частоту патологических переломов (шейка бедра, компрессионные переломы позвонков) у данной категории пациентов.

Преимущества РОСТ-диагностики на платформе AFIAS. Беспрецедентная скорость анализа (12 минут) позволяет оценить статус витамина D непосредственно во время первичного приёма пациента, исключая многодневное ожидание результатов из централизованной лаборатории. **Гибкость типа образца** (венозная, капиллярная, цельная кровь) устраняет необходимость центрифугирования, что идеально для ургентных лабораторий. **Неприхотливые условия хранения** (лиофилизированные реагенты, 2–30 °C) избавляют от дорогостоящей холодовой цепи, повышая доступность диагностики в отдалённых регионах.

Терапевтические импликации. Адекватная заместительная ферментная терапия (ЗФТ) современными микрокапсулированными препаратами панкреатина способствует восстановлению мицеллообразования и постепенной коррекции дефицита витамина D. Комбинированная стратегия (ЗФТ + лечебные дозы холекальциферола от 1000 до 20 000 МЕ/сут) остаётся предпочтительной. Нормализация витамина D не только защищает кости, но и снижает системное воспаление. Мониторинг каждые 3–6 месяцев легко осуществим благодаря платформе AFIAS.

Заключение. Экзокринная недостаточность поджелудочной железы, развивающаяся как закономерный исход хронического панкреатита, выступает мощным драйвером тяжёлых нутритивных нарушений. Жировая мальабсорбция, вызванная дефицитом панкреатической липазы, критически снижает уровень витамина D, провоцируя деструкцию костной ткани, вторичный гиперпаратиреоз и повышение кардиоваскулярного риска. Своевременная лабораторная диагностика статуса 25(OH)D у данной категории пациентов является абсолютно обязательным компонентом клинического протокола.

Проведённый анализ убедительно доказывает, что автоматические иммунофлуоресцентные анализаторы серии AFIAS (AFIAS-1, AFIAS-6, AFIAS-10) в комплексе с тест-системами Vitamin D Neo предоставляют высокоточный, быстрый и эргономичный инструмент для количественной оценки витамина D. Платформа демонстрирует превосходную внутрисерийную (CV < 5,4%) и межсерийную (CV < 6,4%) прецизионность, а также высокую конкордантность с LC-MS/MS (r = 0,99, p < 0,0001).

Способность AFIAS анализировать микрообъёмы крови за 12 минут, использование лиофилизированных реагентов без холодовой цепи и возможность автоматизированной выгрузки результатов делают данную систему оптимальным решением для РОСТ-диагностики в гастроэнтерологических стационарах. Интеграция с программными инструментами на базе Python обеспечивает бесшовную связь между получением первичных данных и формированием информативных аналитических отчётов в формате Excel.

Список литературы:

1. Boditech Med Inc. AFIAS 25-OH Vitamin D test kit package insert. Chuncheon, Republic of Korea.
2. Instrument for AFIAS tests Operation Manual. Quantitative determination of total 25(OH)D₂/D₃ level.
3. Boditech Med. Vitamin D Neo: Monitoring vitamin D deficiency & supplementation therapy in 12 mins.
4. Boditech Med Inc. AFIAS Vitamin D Reference Guide. AVitamin D_Rev00_190415E.
5. U.S. FDA. AFIAS Vitamin D 510(k) Pre-market Notification K221817.
6. PubMed. Clinical features and complications of chronic pancreatitis: exocrine insufficiency. 2024.
7. MDPI. Prevalence of Vitamin D deficiency in patients with chronic pancreatitis. 2024.
8. PMC. Worldwide prevalence of vitamin D deficiency in patients with pancreas disorders. 2024.
9. PubMed. Fat-soluble vitamin depletion in EPI associated with Chronic Pancreatitis. 2023.
10. PMC. Comparative Performance Assessment of Novel FIA POCTs for Vitamin D. 2024.
11. Boditech Med. Official 25(OH)D Reference Ranges (Deficiency, Insufficiency, Sufficiency).

12. PMC. Vitamin D Deficiency and Exocrine Pancreatic Insufficiency. 2024.
13. PubMed. Comparison of automated immunoassays with LC-MS/MS for 25-OH Vitamin D. 2022.
14. NIST/CDC. Interlaboratory comparison: Vitamin D Standardization Program (VDSP).
15. Biochemia Medica. Performance comparison of 25-hydroxyvitamin D immunoassays vs LC-MS/MS.
16. PMC. Statistical validation of AFIAS vs LC-MS/MS on fresh and frozen plasma samples.
17. ResearchGate. Vitamin D Supplementation in Chronic Pancreatitis and Pancreatic Cancer.
18. Salimetrics. Calculating Inter- and Intra-Assay Coefficients of Variability (CV%).
19. CDC. Certified Total 25-hydroxyvitamin D Assays performance criteria.
20. Клинические рекомендации РФ. Хронический панкреатит: диагностика ЭНПЖ. 2024.

Для цитирования: Умарова Ш.Ж., Сайфутдинова З.А. Лабораторная диагностика изменения уровня витамина D при хроническом панкреатите на автоматическом анализаторе AFIAS // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 4(24). – С. 369–377. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19535720>

НОИНФЕКЦИОН КАСАЛЛИКЛАР ЭПИДЕМИК ЖАРАЁНИНИНГ ЭКОЛОГИК ОМИЛЛАР ТАЪСИРИДА ЎЗГАРИШИ

Атоева М.А., Хакимов Т., Комилова А.А.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Ушбу тадқиқот Бухоро вилояти Қораулбозор тумани атмосфера ҳавосидаги заҳарли газларнинг (олтингугурт диоксиди (SO_2), углеводородлар, азот диоксиди (NO_2), аммиак (NH_3), водород сульфиди (H_2S), карбонат ангидрид (CO_2), углевод оксиди (CO) ва метан (CH_4)) ушбу ҳудудда яшовчи ҳарбий хизматчилар ва уларнинг оила аъзолари соғлиғига таъсирини ўрганади, бу эса юқумли бўлмаган касалликларнинг (нафас олиш тизими, юрак-қон томир, эндокрин ва онкологик тизимлар касалликлари) ривожланишига ва оғир кечишига олиб келди.

Калит сўзлар: экология, инсон саломатлиги, ифлосланиш, атроф-муҳит, касалланиш, профилактика

CHANGES IN THE EPIDEMIC PROCESS OF NON-INFECTIOUS DISEASES UNDER THE INFLUENCE OF ENVIRONMENTAL FACTORS

Atoyeva M.A., Hakimov T.B., Komilova A.A.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. This study examines the impact of toxic gases—such as sulfur dioxide (SO_2), hydrocarbons, nitrogen dioxide (NO_2), ammonia (NH_3), hydrogen sulfide (H_2S), carbon dioxide (CO_2), carbon monoxide (CO), and methane (CH_4)—present in the atmospheric air of the Karaulbazar district of the Bukhara region on the health of military personnel and their families living in this area. The exposure to these gases has led to the development and severe progression of non-infectious diseases, including respiratory, cardiovascular, endocrine, and oncological disorders.

Key words: ecology, healthy person, prevention, environment, disease, prevention

ИЗМЕНЕНИЯ ЭПИДЕМИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОД ВЛИЯНИЕМ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ

Атоева М.А., Хакимов Т.Б., Комилова А.А.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. В данном исследовании изучается влияние токсичных газов в атмосферном воздухе Караулбазарского района Бухарской области диоксид серы (SO_2), углеводороды, диоксид азота (NO_2), аммиак (NH_3), сероводород (H_2S), углекислый газ (CO_2), окись углерода (CO) и метан (CH_4) на здоровье военнослужащих и их семей, проживающих в данном районе, что привело к развитию и тяжелому течению неинфекционных (заболеваний дыхательной системы, сердечно - сосудистой, эндокринной и онкологической систем) заболеваний.

Ключевые слова: экология, здоровье человека, загрязнение, окружающая среда, заболеваемость, профилактика.

e-mail: atoyeva.mashhura@bsmi.uz

Бугунги кунда профилактик тиббиётда муҳим масала атроф-муҳит ифлосланиши билан боғлиқ соғлиқ учун хавфларни аниқлашдир, чунки мамлакатдаги экологик ва гигиеник вазият таранглигича қолмоқда. Бугунги кунга қадар йирик саноат корхоналари жойлашган ҳудудларда яшовчи аҳоли уларнинг салбий таъсирига дучор бўлиши мумкинлигини кўрсатадиган кўплаб маълумотлар тўпланган. Россия ва халқаро муаллифларнинг кўплаб тадқиқотларига кўра, энг катта антропоген юк атмосфера ҳавосига тушади [1, 2, 5,11]. Юрак-қон томир тизимининг атроф-муҳит ифлосланиши таъсирига заифлиги сўнгги ўн йилликларда турли мамлакатларда ўтказилган кўплаб тадқиқотларда кўрсатилган [4,6,7,10,12].

Чекиш ва диабет каби анъанавий хавф омиллари сингари, ҳаво ифлосланиши эндотелиал дис-функция, қон босимини бошқаришнинг бузилиши, углевод ва липид метаболизми ва атерогенез орқали касалликлар ва ўлимга олиб келади. Тадқиқотчилар қайси ёш гуруҳлари ҳаво ифлосланишига энг сезгир эканлиги борасида келишмовчиликларга дуч келишмоқда. Liu Z. ва Vang F. Хитой Халқ

Республикасининг иккита шаҳрида қисқа муддатли ҳаво ифлосланиши таъсирида гетерогенликни намоиш этдилар: юқори даражада ифлосланган шаҳарда кўшимча ҳаво ифлосланиши ёш беморларнинг касалхонага ётқизилишини кекса беморларга қараганда кўпроқ оширди, тоза шаҳарда эса бунинг акси кузатилди. Муаллифлар, ёшлар ҳаво ифлосланиши таъсирига кўпроқ мойил бўлади, деган гипотезани илгари сурдилар, чунки улар ўртача ҳисобда, айниқса қурилиш соҳасида ишлаётган бўлсалар, кўпроқ вақтни очиқ ҳавода ўтказадилар. Шу билан бирга, юқори даражада ифлосланган шаҳарларда яшовчи кекса одамлар ҳимоя чораларини кўришлари, ташқарида вақтларини қисқартиришлари ва ниқоб тақишлари эҳтимоли кўпроқ. Тоза шаҳарда кекса одамлар эҳтиёт чораларини кўришлари эҳтимоли камроқ, муаллифларнинг фикрича, бу шаҳардаги кекса беморларга қисқа муддатли ҳаво ифлосланишининг аниқроқ таъсирини тушунтириши мумкин. Диаметри 2,5 мкм дан кам бўлган майда заррачалар (PM2.5) билан ҳаво ифлосланишининг юрак-қон томир касалликларидан ўлимга таъсирини таҳлил қилиб, Миллий Соғлиқни Сақлаш Институтлари ААРП (АҚШ) коҳортада 50-65 ва 65-71 ёшдаги эркаклар ва аёллар гуруҳлари ўртасида сезиларли фарқлар аниқланмади [14]. Аксинча, Cyeseagoni ва бошқалар [13] 60 ёшгача бўлган одамларда (айниқса эркакларда) ҳаво ифлосланиши туфайли қон айланиш касалликларини ривожланиши ёки кучайиш хавфи юқори эканлигини аниқладилар; Fischer ва бошқалар [8] бу 65 ёшгача бўлган ёш гуруҳида яққол кўриниб туришини кўрсатдилар.

Hart ва бошқалар томонидан ўтказилган тадқиқот [9] шуни кўрсатдики, 70 ёшдан ошган одамлар (айниқса аёллар) ҳаво ифлосланишига кўпроқ сезгир. 51-70 ёшдаги одамлар ифлосланишдан кекса қарияларга қараганда кўпроқ таъсирланади, аммо шу билан бирга, улар учун хавфнинг ошиш чегараси юқорироқ. Шуни таъкидлаш керакки, ташқи ҳаво ифлосланишининг аҳоли ўлимига таъсирини таҳлил қилишга қаратилган жуда кўп сонли тадқиқотларга қарамай, уларнинг аксарияти фақат иккита гуруҳни (60-70 ёшгача ва ундан катта) таҳлил қилади ва катталарнинг энг ёш кичик гуруҳининг (20-44 ёш) ифлосланишга сезгирлигини таҳлил қилиш одатда ўтказилмайди. Бизнинг натижаларимиз шуни кўрсатадики, узоқ муддатли ҳаво ифлосланишининг юрак-қон томир касалликлари ўлимига таъсири барча ёшдаги кичик гуруҳларда, шу жумладан 20-44 ёш гуруҳида сезиларли даражада.

ЖССТ [16] маълумотларига кўра, барча ҳаво ифлосланиши омиллари орасида PM2.5 майда заррачалар юрак-қон томир касалликларидан ўлимга энг катта таъсир кўрсатади. Россиянинг аксарият шаҳарларида заррачалар (ПМ) ифлосланиши унинг ҳажмидан қатъи назар кузатилади, чунки Канадалик тадқиқотчиларнинг фикрига кўра, PM2.5 атмосфера ҳавосидаги барча муаллақ заррачаларнинг тахминан 22% ни ташкил қилади, PM концентратсиясини баҳолаш бизга майда заррачалар ифлосланиши даражасини баҳолаш имконини беради. Шуни таъкидлаш керакки, PM2.5 нинг рухсат этилган максимал концентратсияси ҳақида маълумотлар йўқ, унинг ортиқча миқдори умумий ўлим ва юрак-қон томир касалликларидан ўлим билан ижобий боғлиқ [13]. Бизнинг тадқиқотимиз шуни кўрсатдики, заррачалар ифлосланиши "ифлос" шаҳарларда сезиларли даражада юқори (жуда муҳим), шунинг учун у ерда PM2.5 ифлосланиши ҳам юқори деб тахмин қилиш мантиқан тўғри келади. PM ифлосланишидан ташқари, барча "ифлос" шаҳарларда энг заҳарли назорат остидаги ҳаво ифлослантирувчи моддалардан бири бўлган бензопиреннинг концентратсияси анча юқори. Бензопирен - полициклик ароматик углеводороддир (РАН). Унинг атмосфера ҳавосидаги юқори концентратсиялари одатда бошқа РАН лар томонидан сезиларли даражада ифлосланишни кўрсатади, уларнинг асосий манбалари энергетика, кимё ва нефтни қайта ишлаш саноати, шунингдек, автотранспорт воситаларидир. Эпидемиологик ва экспериментал тадқиқотлар шуни ишончли тарзда кўрсатадики, ҳаводаги заррачаларга бириктирилган РАН лар гипертензия, атеросклероз ва миокард инфаркти каби юрак-қон томир касалликларини келтириб чиқариши мумкин [4, 10]. Муҳими, РАН лар ва осилган заррачалар билан ифлосланиш ҳатто ёш ва соғлом катталарга ҳам таъсир қилади.


Бундан ташқари, минглаб одамлар ҳаво ифлосланиши юқори бўлган саноат шаҳарларида яшашга мажбур бўлганлиги сабабли, унинг соғлиққа салбий таъсирини камайтириш учун профилактика чораларини ишлаб чиқиш зарур.

Тадқиқотнинг мақсади: Саноат ва атроф-муҳит шароитида юқумли бўлмаган касалликларнинг тарқалишини ўрганиш.

Материаллар ва усуллар: Ушбу тадқиқотда Бухоро вилоятининг Қоровулбозор ва Пешку туманлари аҳолиси ўртасида ўтказилган сўровнома натижаларидан фойдаланилган. Аҳоли орасида сўровномалар 2023 йилдан 2025 йилгача олдиндан тайёрланган сўровнома ёрдамида ўтказилди. Тўпланган маълумотлар асосида юқумли бўлмаган касалликларнинг узоқ муддатли динамикасининг ретроспектив эпидемиологик ва статистик таҳлили ўтказилди. Бундан ташқари, беш йил давомида - 2021 йилдан 2025 йилгача - Бухоро вилоятининг Қоровулбозор туманида саноат корхоналари

томонидан чиқариладиган заҳарли газлар концентратсиясини таҳлил қилиш учун ҳаво намуналари олинди (нефтни қайта ишлаш заводи Бухоро вилоятининг Қоровулбозор туманида жойлашган). Намуналар 10 та жойдан (Сардоба кўчаси, касб-ҳунар мактаби, Сардоба кўчасидаги турар-жой биноларининг ички кўчаси, А. Ғиждувоний, Ар-Ревгарий, Ибн Сино, Амир Темур, Буюк Ипак йўли, Қувноқ Болажон болалар боғчаси ва 8-мактаб) АНТ-3М лаборатория анализатори ёрдамида олинди. Натижалар стандарт кўрсаткичлар билан таққосланди ва атроф-муҳит ва эпидемиологик хусусиятлар бўйича таҳлил қилинди. Социологик сўровнома, санитария-гигиена, клиник лаборатория, эпидемиологик ва статистик усуллар қўлланилди.

Натижалар ва муҳокама. Биз 2021-2025 йиллар оралиғида юкумли бўлмаган касалликларнинг эпидемиологик хусусиятларини таҳлил қилдик ва Бухоро вилоятининг Қоровулбозор туманида нефтни қайта ишлаш заводи жойлашганлигини инобатга олиб, заҳарли газларнинг ҳавода тарқалганлигини ўргандик. Қоровулбозор туманидаги атмосфера ҳавосида аниқланган 8 турдаги органик ва ноорганик заҳарли газларни лаборатория таҳлили натижаларига кўра, 2021 йилдан 2025 йилгача тумандаги заҳарли газларнинг ўртача улуши куйидагича бўлганлиги аниқланди: олтингугурт диоксида (SO_2) 20% га ошди, углеводородлар 1,9 баравар, азот диоксида (NO_2) 7,65 баравар, аммиак (NH_3) 17,55 баравар ва водород сульфид (H_2S) 41,25 баравар ошди. Қолган 3 турдаги заҳарли газлар (CO_2 , CO ва метан) бўйича кўрсаткичлар нормал чегараларда эди (1-расм).




1-расм. 2021-2025 йиллар оралиғида Қоровулбозор туманининг аҳоли пунктларида заҳарли газларни мониторинг қилиш натижалари



2-расм. 2021–2025 йиллар мавсумида заҳарли газлар таъсирида нафас олиш йўллари касалликларининг тарқалишининг ўзаро боғлиқлик кўрсаткичлари (ҳар 100 000 аҳолига)

Ушбу тадқиқотда Қоровулбозор тумани аҳолиси орасида рўйхатга олинган юкумли бўлмаган касалликлар мисолида кўрсатилганидек, саноат корхоналари томонидан чиқариладиган заҳарли газларнинг юкумли бўлмаган касалликларнинг (нафас олиш йўллари касалликлари ва юрак-қон томир касалликлари) пайдо бўлиши, ривожланиши ва оғир асоратларига таъсири ўрганилади.

Бугунги кунда саноат корхоналаридан атмосферага тўғридан-тўғри заҳарли газларнинг чиқарилиши нафақат инсон танасига, балки барча тирик организмларга ҳам таъсир қилувчи ўта хавфли экологик омил ҳисобланади. Бу чиқиндилар юкумли бўлмаган касалликларнинг табиатига таъсир қилади ва эпидемик жараёнларни беқарорлаштиради, умумий экологик вазиятга таъсир қилади. Уларнинг салбий таъсир даражаси жуда муҳим нуктага етди. (2,3-расмлар)




3-расм. 2021–2025 йиллар мавсумида заҳарли газлар таъсирида юрак-қон томир касалликлари билан касалланишнинг ўзаро боғлиқлик кўрсаткичлари (ҳар 100 000 аҳолига)

Экологик жиҳатдан ноқулай саноат ҳудудларида яшовчи катталар орасида юкумли бўлмаган касалликларнинг характерли хусусиятлари атмосферадаги заҳарли газларга таъсир қилиш орқали ўзгариши қайд этилган. Бундан ташқари, тиббиёт соҳасида, айниқса кекса ёшдаги гуруҳлар орасида ушбу касалликларни ташхислаш, даволаш ва реабилитация қилиш жараёнида кўплаб ижтимоий-иқтисодий ва тиббий муаммолар аниқланган. Экологик жиҳатдан ноқулай саноат объектларида бевосита ишлайдиган ҳарбий хизматчиларда заҳарли газларга таъсир қилиш натижасида юзага келадиган патологик ўзгаришлар қисқа ва узоқ муддатли ногиронликка, баъзи ҳолларда эса доимий ногиронликка олиб келади. Таъкидлаш жоизки, таҳлиллар рўйхатдан ўтган маълумотлар асосида минтақавий миқёсда ўтказилди, шифокорлар томонидан ёрдам сўраган беморларнинг клиник ва эпидемиологик хусусиятлари, шунингдек, соматик шифохоналарда даволанаётган нафас олиш тизимининг юкумли касалликлари асосида қўйилган бирламчи ташхислар ва текширувдан олдинги сўнгги 10 кун ичида 37°C дан юқори ҳарорат ёки йўтал аниқланган барча ҳолатлар нафас олиш тизими касалликлари ҳолатлари сифатида ҳисобга олинган.

4-расмда эпидемия даврида 0-2 ва 3-6 ёшли болаларнинг ёш гуруҳлари муҳим рол ўйнаганлиги кўрсатилган, бу аввалги мавсумларга ҳам хос эди. Шу билан бирга, тадқиқот даврида ушбу гуруҳларда касалланиш даражасининг пасайиш тенденцияси кузатилди (0-2 ёшли болалар учун статистик жиҳатдан аҳамиятли). Мактаб ўқувчилари орасида бу кўрсаткичлар нисбатан барқарор бўлиб қолди, аммо 15 ёш ва ундан катта ёшдагилар орасида статистик жиҳатдан сезиларли ўсиш кузатилди.

Ёшга қараб тақсимот ва оғир нафас олиш йўли касалликларининг ривожланишига олиб келадиган этиологик омилларда ўзгаришлар юз бергани таъкидланган. Хусусан, 2020–2021 йиллар мавсумида касалхонага ётқизилган беморларнинг аксарияти 15 ёш ва ундан катта ёшдагилар (шу жумладан, 65 ёш ва ундан катта ёшдагилар) — 94,5% ни ташкил этган бўлса, олдинги йилларда уларнинг улуши 10% дан ошмаган. Шу нуқтаи назардан, нафас олиш йўллари касалликлари ва бошқа заҳарли газлар таъсирида соматик органларнинг шикастланиши ўртасидаги боғлиқликни ўрганиш муҳимдир, чунки бу соғлиқни сақлаш тизимида ва даволашда эпидемияга қарши чораларни ташкил этишда муҳим рол ўйнайди.



4-расм. 2021–2024 йилларда Бухоро вилояти аҳолисining турли ёш гуруҳлари орасида нафас олиш тизимининг касалланиш даражаси (ҳар 100 000 аҳолига)

Хулоса. 2021-йилдан 2025-йилгача Бухоро вилояти Қоровулбозор тумани атмосфера ҳавосидаги заҳарли газларнинг (олтингугурт диоксида (CO_2), углеводородлар, азот диоксида (NO_2), аммиак (NH_3), водород сулфиди (H_2S), карбонат ангидрид (CO_2), углерод оксиди (CO) ва метан (CH_4)) ушбу ҳудудда яшовчи аҳоли соғлиғига таъсири юқумли бўлмаган касалликларнинг (нафас олиш йўллари касалликлари, юрак-қон томир касалликлари) ривожланишига ва оғир кечилишига олиб келди. Шунинг учун келажакда жиддий оқибатларнинг олдини олиш учун экологик жиҳатдан ноқулай саноат ҳудудларида яшовчи аҳолида юқумли бўлмаган касалликларни ташхислаш ва даволашда биринчи навбатда заҳарли газларнинг таъсирини ҳисобга олиш керак.

Адабиётлар рўйхати:

1. Березин И.И., Семаева Е.А. Современное состояние атмосферного воздуха в городе с интенсивным развитием нефтеперерабатывающей промышленности // Здоровье населения и среда обитания. 2017. №3(288). С. 18–22. doi:10.35627/2219-5238/2017-288-3-18-22.
2. Сучков В.В., Семаева Е.А. Взаимосвязь величин предельно допустимых концентраций и уровня риска здоровью для аэрополлютантов // Гигиена и санитария. 2017. Т.96. №5. С. 442–445.
3. Хакимов Т.Б., Атоева М.А. Атмосфера ҳавосидаги зарарли моддаларнинг инсон организмга таъсири бартараф этиш чора-тадбирлари // Ўзбекистон ҳарбий тиббиёти. 2024. №5. Б. 657–660.
4. Asweto C.O. Cardiovascular health risk posed by polycyclic aromatic hydrocarbon and ultrafine particles. J Clin Exp Tox. 2018;2(1):1–5. doi:10.4066/2630-4570.009.
5. Bai L., Wang J., Ma X., Lu H. Air pollution forecasts: An overview. Int J Environ Res Public Health. 2018;15(4):780. doi:10.3390/ijerph15040780.
6. Cohen A.J., Brauer M., et al. Estimates and 25-year trends of the global burden of disease attributable to ambient air pollution. Lancet. 2017;389(10082):1907–1918. doi:10.1016/S0140-6736(17)30505-6.
7. Cosselman K., Krishnan R., Oron A., et al. Blood pressure response to controlled diesel exhaust exposure in human subjects. Hypertension. 2012; 59(5):943–948.
8. Fischer P.H., Marra M., et al. Air pollution and mortality in seven million adults: The Dutch

Environmental Longitudinal Study (DUELS). *Environ Health Perspect.* 2015;123:697–704. doi:10.1289/ehp.1408254.

9. Hart J.E., Puett R.C., Rexrode K.M., Albert C.M., Laden F. Effect modification of long-term air pollution exposures and the risk of incident cardiovascular disease in US women. *J Am Heart Assoc.* 2015;4(12):e002301.

doi:10.1161/JAHA.115.002301.

10. Holme J., Brinchmann B., Refsnes M., et al. Potential role of polycyclic aromatic hydrocarbons as mediators of cardiovascular effects from combustion particles. *Environ Health.* 2019;18:74. doi:10.1186/s12940-019-0514-2.

11. Khilnani G.C., Tiwari P. Air pollution in India and related adverse respiratory health effects. *Curr Opin Pulm Med.* 2018;24(2):108–116. doi:10.1097/MCP.0000000000000463.

12. Liu Y., Sun J., et al. Analysis of short-term effects of air pollution on cardiovascular dis-

ease using Bayesian models. *Int J Environ Res Public Health.* 2020;17:879.

doi:10.3390/ijerph17030879.

13. Liu Z., Wang F., Li W., et al. Meta-analysis on ambient particulate matter pollution and mortality of cardiovascular diseases. *Environ Pollut.* 2018;242:1299–1307.

doi:10.1016/j.envpol.2018.07.041.

14. Thurston G.D., Ahn J., et al. Ambient particulate matter air pollution exposure and mortality. *Environ Health Perspect.* 2016;124:484–490. doi:10.1289/ehp.1509676.

15. Wong C.M., et al. Satellite-based estimates of long-term exposure to fine particles and mortality in elderly Hong Kong residents. *Environ Health Perspect.* 2015;123(11):1167–1172. doi:10.1289/ehp.1408264.

16. World Health Organization. Ambient air pollution: A global assessment of exposure and burden of disease. WHO; 2016. ISBN 9789241511353.

Иқтибос учун: Атоева М.А., Хакимов Т., Комилова А.А. Ноинфекцион касалликлар эпидемик жараёнининг экологик омиллар таъсирида ўзгариши // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси.* – 2026. – № 4(24). – Б. 378–383. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19535755>

ЮРАК-ҚОН ТОМИР КАСАЛЛИКЛАРИНИНГ СТРЕССГА БОҒЛИҚЛИГИ ПАТОФИЗИОЛОГИЯСИ

Абдирашидова Г.А., Насимова Д.И.

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Психологик стресс юрак-қон томир касалликлари (ЮҚТК) хавфининг ортиши билан боғлиқлиги қабул қилинган, аммо натижалар стресс қандай ўлчанганига ва боғлиқлиқнинг кучига қараб фарқ қилади. Бундан ташқари, ўн йиллик тадқиқотларга қарамай, механизмлар ва потенциал-сиал сабаб-оқибат муносабатлари спекулятив бўлиб қолмоқда. Стрессга физиологик жавоблар яхши ўрганилган, аммо уларнинг юрак-қон томир касалликларининг ривожланиши ва авж олишига қўшган ҳиссаси эмпирик тадқиқотларда кам эътиборга олинган.

Калит сўзлар: стресс, юрак-қон томир касалликлари, катехоламинлар, психология

PATHOPHYSIOLOGY OF STRESS-DEPENDENT CARDIOVASCULAR DISEASES

Abdirashidova G.A., Nasimova D.I.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. It is accepted that psychological stress is associated with an increased risk of cardiovascular disease (CVD), but the results vary depending on how stress is measured and the strength of the association. Moreover, despite decades of research, mechanisms and potential causal relationships remain speculative. Physiological responses to stress have been well studied, but their contribution to the development and progression of cardiovascular diseases has received little attention in empirical studies.

Keywords: stress, cardiovascular diseases, catecholamines, psychology

ПАТОФИЗИОЛОГИЯ СТРЕСС-ЗАВИСИМОСТИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Абдирашидова Г.А., Насимова Д.И.

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Принято, что психологический стресс связан с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), но результаты различаются в зависимости от того, как измеряется стресс и в какой степени зависит от силы связи. Более того, несмотря на десятилетия исследований, механизмы и потенциальные причинно-следственные связи остаются спекулятивными. Физиологические реакции на стресс хорошо изучены, но их вклад в развитие и прогрессирование сердечно-сосудистых заболеваний мало учитывался в эмпирических исследованиях.

Ключевые слова: стресс, сердечно-сосудистые заболевания, катехоламины, психология

Далиллар шуни кўрсатадики, стрессга физиологик жавоблар юрак-қон томир касалликлари хавфида асосий роль ўйнайди ва стрессдан келиб чиққан гемодинамик, қон томир ва иммунитет бузилишлари айниқса муҳимдир. Стресс реактсиясининг физиологияси автоном нерв тизимида чиқадиган миянинг кортиколимбик ҳудудлари томонидан тартибга солинади. Сурункали, такрорий ва кумулятив стресс таъсирида вегетатив, иммун ва қон томир функсияларининг динамик бузилишлари ҳам юрак-қон томир касалликлари хавфининг механизмлари бўлиши мумкин, аммо истиқболли тадқиқотлар ва реал баҳолашлардан кўпроқ далиллар талаб қилинади.

Психологик стресс инсон тажрибасининг тарқалган аспектидир. Стресснинг биологик реактсиялари инсон физиологиясида ҳал қилувчи роль ўйнайди ва атроф-муҳит муаммоларига мослашиш учун жуда муҳимдир, аммо стресс соғлиқнинг салбий оқибатлари билан ҳам боғлиқ. Стресснинг турли хил таърифлари, турли популяциялар ва турли тадқиқот дизайнларидан фойдаланган ҳолда кўплаб тадқиқотлар стресснинг жисмоний саломатлиқнинг турли жиҳатларига ва хусусан, юрак-қон томир касалликларига (ЮҚТК) зарarli таъсирини тасвирлаб берди. Стресс психологик фаровонлик билан узвий боғлиқдир ва стрессли ҳодисалар кўпинча баъзи руҳий касалликларнинг бошланғич ҳолатидир. Юрак-қон томир касалликлари хавфи ортиши билан боғлиқ бўлган депрессия ва травмадан кейинги стресс каби ҳолатлар кўпинча стрессли қайғуришлардан кейин ривожланади.

Стресс инсоннинг маълум бир вазиятга мослашиш қобилиятидан юқори бўлган экологик

талабларни идрок этиш сифатида концептуаллаштирилади (McEwen, B. S., 2016). Стресс жамиятимизда кенг тарқалган, аммо унинг саломатлик ва касалликларга таъсири вақт, давомийлик, даражаси, индивидуал сезгирлик ва физиологик реаксиялар каби омилларга қараб ўзгаради (Epel, E. S. et al., 2018). Изчил далиллар стресс таъсири ва юрак-қон томир касалликлари тарихи бўлмаган шахсларда ва кардиометаболик касаллиги бўлган шахсларда юрак-қон томир касалликлари хавфи ортиши ўртасидаги боғлиқликни ўрнатди (Vaccarino, V. et al., 2021; Osborne, M. T. et al., 2020; Hackett R. A. & Steptoe A., 2016). Шунга ўхшаш ассоциациялар руҳий касалликлар ва травмадан кейинги стресс бузилиши каби травматик стресс билан боғлиқ руҳий саломатлик ҳолатларида кузатилган (Harshfield, E. L. et al., 2020).

Ўткир стресс омиллари қисқа муддатли стрессли ҳодисалар ёки вазиятлар бўлиб, баъзан 1 ҳафтадан камроқ давом этадиган таъсирлар деб таърифланади (Dimsdale, J. E., 2008). Умуман олганда, ўткир стресс омиллари, уларнинг қисқа муддатлилигини ҳисобга олган ҳолда, сурункали таъсирга қараганда касалликнинг ривожланишига камроқ таъсир қилади, деб қаралади. Бироқ, уларнинг юқори интенсивлиги коронар атеросклероз билан оғриган одамларда олдиндан мавжуд бўлган шароитларни ёмонлаштириши ва юрак-қон томир ҳодисаларини тезлаштириши мумкин (Kivimäki M. & Steptoe A., 2018).

Сурункали стресс омиллари узоқ вақт давомида, кўпинча ойлар ёки ҳатто йиллар давомида давом этадиган стрессли тажрибалардир. Сурункали стресс 6 ой ёки ундан кўпроқ вақт давомида деярли ҳар куни азоб чекишни талаб қиладиган ва сабаб бўладиган ҳар қандай тажриба сифатида аниқланади (Epel, E. S. et al., 2018). Сурункали стресс омиллари доимий ёки такрорий бўлиши мумкин, аниқ бошланиш ёки тугаш вақтига эга бўлмаслиги мумкин ва назарий жиҳатдан одамлар кундалик ҳаётида дуч келадиган, аммо ўлчаш қийин бўлган шахсий муаммолар, давом этаётган қийинчиликлар, низолар ва таҳдидларни ўз ичига олиши мумкин. Доимий табиати туфайли сурункали стресс омиллари узоқ муддатда касаллик жараёнларини яхшилашда, масалан, атеросклерознинг ривожланиши ва кардиометаболик хавф омиллари ривожланишида ўткир стресс омилларига қараганда кўпроқ роль ўйнайди, деб ҳисобланади (Cohen S., Murphy M. L. M. & Prather A.A., 2019). Доимий равишда юрак-қон томир хавфи билан боғлиқ бўлган сурункали стрессларнинг турларига атроф-муҳитнинг ноқулайлиги, молиявий қийинчилик, паст ижтимоий-иқтисодий ҳолат, ишдаги стресс, ғамхўрлик стресси ва шахслараро стресс (шу жумладан, камситиш ва ижтимоий изоляция) (Niedhammer I., Bertrais S. & Witt K., 2021).


Бироқ, ўткир ва сурункали стресслар ўртасидаги фарқ ихтиёрий ҳисобланади (Dimsdale, J. E., 2008). Стрессорнинг ўзи бир неча дақиқа давом этса ҳам, унинг ҳиссий таъсири узоқ давом этиши ва сурункали ҳолга келиши мумкин, бу айниқса травматик стресс учун тўғри келади. Бундан ташқари, ўткир стресс омилларининг вақт ўтиши билан такрорланиши, инсоннинг бутун умри давомида соғлиғига жамланган таъсирга олиб келиши мумкин ва кундалик стресс бир хил давом этаётган вазият туфайли юзага келганда, уни сурункали стресснинг бир шакли деб ҳисоблаш мумкин (Epel, E. S. et al., 2018).

Стрессга тизимли биологик жавоб нейроэндокрин, вегетатив, иммун, гемодинамик, қон томир ва метаболик физиологияни ўз ичига олган бир-бирига боғланган кўплаб тизимларда яхши ўрганилган физиологик ўзгаришлар каскадини ўз ичига олади. Мавжуд далиллар шуни кўрсатадики, стресснинг юрак-қон томир тизимига салбий таъсири, асосан, стрессга жавоб беришнинг нотўғри физиологияси оқибатларига боғлиқ (Vaccarino, V. et al., 2021; Osborne, M. T. et al., 2020; Whittaker, A. C., Ginty, A., Hughes, B. M., 2021).

Автоном асаб тизими стрессга тизимли жавобларни тартибга солишда муҳим роль ўйнайди. Лабораториядаги руҳий стресс тадқиқотларида кўрсатилганидек, ўткир стресс пайтида симпатик фаоллашув ва парасимпатик чекиниш юрак қисқаришлари частотаси ва қон босимининг кескин ўсишига олиб келади (Hammadah, M. et al., 2017; Hammadah, M. et al., 2018), shuningdek, yallig'lanish va gi-perkoagulyatsiya kuchayadi (Marsland, A. L., Walsh, C., 2017; von Kanel, R., 2015).

Ушбу ўткир ўзгаришлар атеросклеротик бляшка ёрилиши хавфини ошириши ва шу билан заиф одамларда ўткир коронар ҳодисаларни келтириб чиқариши мумкин (Kang, D. O. et al., 2021). Сурункали таъсирлар ҳам пайдо бўлади. Стрессга сурункали ёки оғир таъсир қилиш, айниқса ҳаётнинг бошида содир бўлса, автоном асаб тизимининг реаксияларини тартибга солишнинг бузилишига олиб келади (Shah, A. J. et al., 2013).

Стрессга мос келмайдиган вегетатив реакциялар юрак-қон томир касалликларига олиб келадиган патологик ўзгаришларга олиб келадиган аниқ механизмлар кам эътиборга сазовор бўлди, чунки бир нечта тадқиқотлар асосий патофизиологиянинг тўғридан-тўғри далилларини тақдим этди (Whittaker, A. C., Ginty, A., Hughes, B. M., 2021).




1-расм. Психологик стресс ва ЮQTK ни боғлайдиган механик модел
(Cohen, S., Gianaros, P. J. & Manuck, S. B., 2016)

Кенг қабул қилинган моделда стрессни идрок этиш қайғу, қўрқув ва қочиш ҳисси каби салбий ҳис-туйғуларни келтириб чиқаради, шу билан бирга ўткир стресс реактсиясининг бир қисми бўлган нейроэндокрин ва автоном жавоб тизимларини фаоллаштиради (Cohen, S., Gianaros, P. J. & Manuck, S. B., 2016). Ушбу интегратсиялашган таъсирлар каскади охир-оқибат қон томир физиологияси ва гемодинамикасини, шунингдек, иммун функтсиясини ва яллиғланишни ўзгартиради (Vaccarino, V. et al., 2021). Юрак-қон томир реактивлиги гипотезасига кўра, стресс омиллари такрорий ёки сурункали ҳолга келганда, бу жавоб тизимларининг қайта фаоллашиши қон томир, иммун, яллиғланиш ва метаболит жараёнларда кумулятив, узоқ муддатли ўзгаришларга олиб келади (McEwen B. S., 2006).

Коронар артериялар даражасида, юрак ишемик касаллиги бўлмаса, руҳий стресс ҳам эпикардиял артерияларнинг, ҳам микротомирларнинг кенгайишига олиб келади, коронар атеросклероз мавжуд бўлганда, коронар артериялар ва қаршилик томирларининг парадоксал торайиши содир бўлади (Yeung, A. C. et al., 1991). Руҳий стресс пайтида коронар микроваккулар ўзгаришлар ва эндотелийга боғлиқ (лекин эндотелийдан мустақил эмас) коронар микроваккулар функтсия ўртасида сезиларли боғлиқлик мавжуд (Hammadah, M. et al., 2018). Бундан ташқари, стрессга коронар ва периферик вазомотор жавоблар ўртасида кучли боғлиқлик мавжуд бўлиб, руҳий

стресс пайтида коронар микроваскуляр оқим камайган шахслар ҳам стресс омилига жавобан периферик микроваскуляр оқимни камайтиради. Ушбу маълумотлар ақлий стрессга вазореактивликнинг умумий ходиса эканлигини ва микроваскуляр эндотелиал дисфунксиянинг роль ўйнашини кўрсатади (Hammadah, M. et al., 2018).



2-расм. Юрак-қон томир хавфида психологик стрессга нисбатан иккинчи даражали стрессга реакция физиологиясининг марказий роли

Стресс ва юрак-қон томир касалликларининг нейробиологиясига ҳам тўзталсак, воқеа организм томонидан стресс сифатида қайд этилиши учун уни сезгилар билан қабул қилиш керак. Масалан, сўқмоқ бўйлаб кетаётганингизда йўлбарсининг сизга сақраб тушиши каби стрессли ҳодиса дастлаб хислар (кўриш ва эшитиш) томонидан қабул қилинади. Бу сенсор сезгилар миyanинг сезги пўстлогининг ўзига хос соҳаларини фаоллаштиради ва бу маълумотлар кейинчалик кортиколимбик тизимда, жумладан, медиал префронтал кортекс, гипокамп ва бодомсимон танада қайта ишланади. Гипокамп хотиралар ҳосил қилади, уларни олдинги хотиралар билан солиштиради ва қўрқув жавобининг маркази бўлган бодомсимон танага хабар юборади. Кейин бодомсимон тана симпатик асаб тизимининг фаоллашиши ва буйрак усти безидан кортизолнинг чиқиши билан периферик “кураш ёки қоч” реактсиясини бошлайди (Bremner J. D., 2011).

Медиал префронтал кортекс ва кортиколимбик тизимнинг бошқа соҳалари стрессга ҳам ҳиссий, ҳам физиологик жавобларни тартибга солишда асосий роль ўйнайди. Истикболли тадқиқотларда

юрак-қон томир касалликлари (ЮҚТК) билан боғлиқлиги исботланган стрессга физиологик жавоблар стрессга гемодинамик, ишемик, вагус, қон томир ва яллиғланиш реакцияларини ўз ичига олади. Ушбу физиологик жавобларнинг аксарияти, шунингдек, ўткир рухий стрессни мия тасвирини ўрганишда мия фаоллашувининг ўзига хос паттернлари билан боғлиқ.

Хулоса. Психологик стресс узоқ вақтдан бери саломатликнинг салбий оқибатлари, айниқса юрак-қон томир касалликлари билан боғлиқ, аммо натижалар стресс қандай ўлчанганига ва боғлиқлик қанчалик кучлилигига қараб фарқ қилади. Бундан ташқари, ўн йиллик тадқиқотларга қарамай, механизмлар ва потенсиал сабаб-оқибат муносабатлари спекулятив бўлиб қолмоқда. Стрессга физиологик жавоблар юрак-қон томир касалликлари хавфининг асосий йўллари сифатида пайдо бўлади, бунда стрессдан келиб чиққан гемодинамик, қон томир ва иммунитет бузилишлари айниқса муҳимдир. Мобил соғлиқни сақлаш технологиялари ва тақиладиган қурилмалардан фойдаланган ҳолда истиқболли тадқиқотлар ва реал баҳолашлардан кўпроқ далиллар талаб қилинади. Психологик баҳолаш клиник ёрдам ва профилактика билан бирлаштирилиши керак. Стрессни камайтириш бўйича аралашувлар сезилган стресс даражасини пасайтириши ва юрак-қон томир хавфини камайтириши мумкин, аммо катта рандомизатсияланган клиник синовлардан кўпроқ далиллар талаб қилинади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Viola Vaccarino & J. Douglas Bremner, stress and cardiovascular disease: an update, *Journal of the Nature Reviews Cardiology*, Volume 22, Issue 12, 2024, Pages 75-88.
2. Samieva G. U., Abdirashidova G. A., Sobirova Sh B. Prognostic value of cytokine spectrum and their changes in primary and recurrent laryngotracheitis in children // *Innovative research: problems of implementation of results and directions of development*. – 2017. – С. 103.
3. Самиева Гулноза, Абдирашидова Гулноза, Курбанов Голиб Патогенетические аспекты эндогенной интоксикации и ее влияние на течение различных форм стенотического ларинготрахеита у детей // *Обозрение европейской науки*. 2018. №9-10-2.
4. Utkurovna S. G., Bahtiyarovna S. S., Gulnoz A. Integrated Approaches to The Diagnosis, Treatment, And Prevention of Stenosing Laryngotracheitis In Children // *European Journal of Molecular & Clinical Medicine*. – 2020. – Т. 7. – №. 03. – С. 2020.
5. Саидова, Ф. С., Г. У. Самиева, and Г. А. Абдирашидова. "Дефицит микронутриентов у детей дошкольного возраста." *Журнал биомедицины и практики* 7.1 (2022).
6. Особенности патогенеза, оптимизация профилактики и методы интенсивной терапии осложнений у беременных с хроническим ДВС-синдромом М.К. Эргашевна, А.Г. Аблакуловна, М.Б. Аминовна - Тематический журнал образования, 2022
7. Features of etiopathogenesis of dry eye syndrome in women of Kashkadarya region. SG Utkurovna, AG Ablakulovna, OF Orifjonovna - *Journal of biomedicine and practice*, 2023
8. Utkurovna S. G., Ablakulovna A. G. Pathophysiology of the triad of young sports girls aspects // *Конференции*. – 2020.
9. Саидова Ф. С., Самиева Г. У., Абдирашидова Г. А. Дефицит микронутриентов у детей дошкольного возраста // *Журнал биомедицины и практики*. – 2022. – Т. 7. – №. 1.
10. Samieva Gulnoza Utkurovna, Abdirashidova Gulnoza Ablakulovna, Narzullaeva Umida Rahmatullaevna, Toirova Sakina Bahodirovna, Mamadiyarova Dilshoda Umurzakovna The condition of pro-and antioxidant systems in children with acute laryngotracheitis with immunomodulating therapy // *Достижения науки и образования*. 2019. №10 (51).
11. Approximate solution of some linear delay differential equations in medicine A Abdirashidov, G Abdirashidova - *ISJ Theoretical & Applied Science*, 12 (80), 2019
12. Абдирашидова Гулноза Аблакуловна, Бакиев Шавкат Шерзодович. Цитокин бўрони патофизиологияси // *Fan, ta'lim, madaniyat va innovatsiya* [Jild: 03Nashr: 3(2024)]ISSN:2992-8915
13. Самиева, Г. У., & Абдирашидова, Г. А. (2026). Роль барьерной дисфункции эпителия и матриксного ремоделирования в патогенезе полипозного риносинусита. *Вестник фундаментальной и клинической медицины* (Т. 3, Выпуск 23, сс. 10–13). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18831963>

Иктибос учун: Абдирашидова Г.А., Насимова Д.И. Юрак-қон томир касалликларининг стрессга боғлиқлиги патофизиологияси // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси*. – 2026. – № 4(24). – Б. 384–388. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19548426>

КИНЕЗИОТЕЙПНИНГ МОТОР ФУНКЦИЯЛАРНИ ТИКЛАШДАГИ ЎРНИ: ИНСУЛТДАН КЕЙИНГИ БЕМОРЛАР МИСОЛИДА

Умирова С.М., Бебитова Ш.Э.

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Ушбу мақолада инсултдан кейинги реабилитация жараёнида кинезиологик тейп (кинезиотейп) қўллашнинг клиник самарадорлиги ўрганилди. Тадқиқотда 50 нафар инсултдан кейинги бемор иштирок этди. Улардан 25 нафарига комплекс реабилитация дастури таркибида кинезиотейп татбиқ этилди, қолган 25 нафар бемор еса фақат кинезитерапия билан шугулланди. Кинезиотейп мушак ва бўғим фаолиятини қўллаб-қувватлаш, оғриқ синдромини камайтириш ҳамда қон ва лимфа айланишини яхшилашда муҳим рол ўйнади. Натижалар шуни кўрсатдики, кинезиотейп қўлланган гуруҳда мушак тонуси тезроқ нормаллашган, спастиклик пасайган ва мотор координация яхшиланган.

Калит сўзлар: Кинезиотейп, инсулт, реабилитация, мушак тонуси, ҳаракат координацияси, лимфа оқими, оғриқ

THE ROLE OF KINESIOTAPING IN MOTOR FUNCTION RECOVERY IN POST-STROKE PATIENTS

Umirova S.M., Bebitova Sh.E.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. This study investigates the clinical effectiveness of kinesiотaping in the rehabilitation of post-stroke patients. Fifty patients participated in the research, divided into two equal groups. The main group (n=25) received a complex rehabilitation program including kinesiотaping, while the control group (n=25) underwent kinesotherapy only. Kinesiотaping supported muscle and joint function, reduced pain and spasticity, and improved blood and lymph circulation. The results demonstrated that patients treated with kinesiотaping achieved faster normalization of muscle tone, better coordination, and improved motor activity compared to those in the control group.

Keywords: Kinesiотaping, stroke, rehabilitation, muscle tone, coordination, lymph flow, pain reduction.

РОЛЬ КИНЕЗИОТЕЙПИРОВАНИЯ В ВОССТАНОВЛЕНИИ ДВИГАТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ У ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ ИНСУЛЬТА

Умирова С.М., Бебитова Ш.Э.

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. В статье рассматривается клиническая эффективность применения кинезиотейпов в процессе реабилитации пациентов после инсульта. В исследовании участвовали 50 больных, разделённые на две группы. Основная группа (n=25) проходила комплексную программу реабилитации с использованием кинезиотейпов, контрольная группа (n=25) — только кинезотерапию. Кинезиотейпирование способствовало поддержанию функции мышц и суставов, снижению спастичности и болевого синдрома, улучшению крово- и лимфообращения. Полученные результаты показали, что использование кинезиотейпов ускоряет нормализацию мышечного тонуса и улучшает координацию движений.

Ключевые слова: Кинезиотейп, инсульт, реабилитация, мышечный тонус, координация движений, лимфообращение, болевой синдром.

e-mail: lenuraumirova@gmail.com

Кириш. Инсулт — бу марказий асаб тизими қон айланишининг ўткир бузилиши натижасида юзага келадиган оғир неврологик ҳолат бўлиб, у дунё бўйича ногиронликнинг етакчи сабаби ҳисобланади. Статистик маълумотларга кўра, инсултдан омон қолган беморларнинг 80 % дан ортиғида ҳаракат фаолиятининг бузилиши — яъни пареслар, мушак спастиклиги, мувозанат ва координация етишмовчилиги кузатилади. Шунинг учун инсултдан кейинги реабилитацияда асосий мақсад — бе-

морларнинг мотор функциясини тиклаш ва уларнинг кундалик ҳаёт фаолиятига қайтишини тезлаштиришдир.

Замонавий реабилитацион ёндашувлар орасида кинезиологик тейп (ёки кинезиотейп) қўллаш усули алоҳида ўрин егаллайди. Кинезиотейп — бу махсус эластик тиббий лента бўлиб, у териға маълум ёналишда ёпиштирилади ва мушак, бўғим ҳамда юмшоқ тўқималарға физиологик қўллаб-қувватловчи таъсир кўрсатади. Тейпнинг механик тортилиши тери рецепторларини фаоллаштириб, проприоцептив жавобни яхшилаиди, мушак тонусини меъёрға келтиради ҳамда оғриқ рецепторларини сусайтиради.

Илмий манбаларда келтирилишича, кинезиотейп мушак фаолиятининг пасайган сегментларини фаоллаштиради, ортиқча спазмда бўлган мушакларни бўшаштиради ва шу орқали марказий нерв тизимининг қайта ташкил топиш (нейропластиклик) жараёнини қўллаб-қувватлайди. У, шунингдек, микроциркуляцияни яхшилаиди, лимфа оқимини тезлаштиради ва шишларни камайтиради. Буларнинг барчаси инсултдан кейинги даврда мушак ва бўғим фаолиятини тиклаш учун муҳим омиллардир.

Кинезиотейпнинг афзаллиги шундаки, у беморға 24 соат давомида физиологик ёрдам беради: тейп тананиннг табиий ҳаракатларига мослашади, машқлар пайтида ҳаракатни чекламайди, лекин мушак фаолиятини қўллаб-қувватлайди. Бу еса кинезотерапия, массаж ва физиотерапия билан биргаликда комплекс реабилитация дастурининг самарадорлигини оширади.

Қўллаб хорижий ва маҳаллий тадқиқотлар шуни тасдиқлайдики, кинезиотейп инсултдан кейинги беморларда мушак тонусини нормаллаштириш, спастикликни камайтириш ва ҳаракат амплитудасини оширишда сезиларли натижа беради. Шунга қарамай, ушбу усулнинг клиник протоколларини ишлаб чиқиш, тейп ёпиштириш ёналишларини стандартлаштириш ва унинг физиологик механизмларини чуқур таҳлил қилиш ҳали ҳам долзарб масала бўлиб қолмоқда.

Мазкур тадқиқот айнан шунга бағишланиб, инсултдан кейинги беморларда кинезиотейп қўллашнинг самарадорлигини баҳолаш, мушак фаолияти, мотор координацияси ва спастиклик даражасидаги ўзгаришларни аниқлашни мақсад қилган.

Тадқиқот мақсади. Мазкур тадқиқотнинг асосий мақсади — инсултдан кейинги беморларда кинезиотейп қўллашнинг мотор функцияларни тиклашдаги клиник самарадорлигини баҳолаш ва уни кинезотерапия билан биргаликда қўллашнинг афзалликларини аниқлашдан иборат. Тадқиқотда кинезиотейпнинг мушак тонусига, спастиклик даражасига, ҳаракат амплитудасига ҳамда оғриқ синдромига бўлган таъсири ўрганилди. Шу билан бирга, мушак фаолияти ва координацияни тиклашдаги физиологик механизмлар ҳам таҳлил қилинди.

Тадқиқотнинг асосий вазифалари қуйидагилардан иборат:

1. Инсултдан кейинги даврда кинезиотейпнинг мушак фаолиятини қўллаб-қувватловчи механизмларини аниқлаш;
2. Кинезиотейп билан даволаш ва фақат кинезотерапия қўлланилган гуруҳларнинг натижаларини таққослаш;
3. ЕМГ, гониометрия ва Ашшортх шкаласи асосида ўзгаришларни баҳолаш;
4. Кинезиотейпни комплекс реабилитация дастурига қўшишнинг клиник афзалликларини аниқлаш ҳамда амалий тавсиялар ишлаб чиқиш.

Тадқиқот натижалари инсултдан кейинги реабилитацияда кинезиотейпни қўллашнинг илмий асосини яратади, реабилитацион машқлар самарадорлигини оширади ва беморларнинг кундалик ҳаёт фаолиятига тезроқ қайтишига ёрдам беради.

Материаллар ва усуллар. Тадқиқот 2024–2025 йилларда Самарқанд Давлат Тиббиёт Университетининг Реабилитология, спорт тиббиёти ва халқ таъбири кафедраси клиник базасида ўтказилди. Жами 50 нафар инсултдан кейинги бемор тадқиқотга жалб етилди.

Беморларни тақсимлаш. Беморлар икки гуруҳға ажратилди:

- Асосий гуруҳ (n=25) — комплекс реабилитация дастури доирасида кинезиотейп қўлланилди;
 - Таққослаш гуруҳи (n=25) — фақат кинезотерапия машқлари билан шуғулланди.
- Беморларни танлашда қуйидаги киритиш мезонлари еътиборға олинди: - Ишемик инсултдан кейинги ерта тикланиш даври (1–1,5 ой); - Гемипарез ёки параспарез мавжудлиги; - Барқарор гемодинамика ва ҳушнинг сақланиши.

Чиқиш мезонлари: оғир юрак етишмовчилиги, епилептик ҳолатлар, тери касалликлари (тейп ёпиштиришға қарши кўрсатмалар), онг бузилиши.

Кинезиотейп қўллаш техникаси. Тадқиқотда “ББ Тапе” русумли 5 см кенгликдаги тиббий еластик тейп ишлатилди.

Тейп қўллаш усуллари мушак гуруҳига қараб танланди:

- Делтоид мушак — “Й” шаклида ёпиштирилди, мушак бўйлаб елкадан пастга қараб;
- Куадрисепс феморис (болдир мушаклари) — “И” шаклида тиззадан сон томонга қараб;
- Тибиалис антериор (оёққа ҳаракат берувчи мушак) — “Й” шаклида, товон ва болдир ўртасидан юқорига қараб.

Тейп 3–5 кун давомида терида қолдирилди, сўнг алмаштирилди. Беморлар машқлар пайтида тейп билан фаол ҳаракатлана олдилар.

Қўлланилган реабилитация усуллари. Ҳар иккала гуруҳда машқлар индивидуал режалаштирилиб, ҳар куни 30–40 дақиқа давомида ўтказилди.

- Асосий гуруҳда машқлар тейп билан ҳаракатни қўллаб-қувватлаш ҳолатида бажарилган;
- Таққослаш гуруҳида машқлар оддий кинезотерапия шаклида ўтказилган.

1-жадвал

Баҳолаш мезонлари


Кўрсаткичлар	Ўлчов воситаси	Баҳолаш мақсади
Мушак биофаоллиги	Електромиография (ЕМГ)	Фаоллик даражасини аниқлаш
Спастиклик даражаси	Ашшортх шкаласи	Мушак тонусини баҳолаш
Ҳаракат амплитудаси	Гониометрия	Бўғим ҳаракат чегарасини ўлчаш
Оғриқ синдроми	Визуал аналог шкаласи (ВАС)	Оғриқ даражасини баҳолаш

Баҳолаш натижалари даволаш олдида ва 14 кунлик курсдан сўнг ўлчаб қайд қилинди. Рақамли маълумотлар Мисрософт Ексел 2021 ва Стата 17 дастурларида таҳлил қилинди. Натижалар ўртача қиймат $\pm$ хато ($M \pm m$) шаклида ифодаланди. Гуруҳлараро фарқлар Студент т-тести ёрдамида баҳоланди. $p < 0,05$ аҳамиятли даражада деб қабул қилинди.

2-жадвал

Гуруҳлар бўйича бошланғич клиник кўрсаткичлар

Кўрсаткич	Асосий гуруҳ (n=25)	Таққослаш гуруҳи (n=25)	P
ЕМГ (мВ)	$1,20 \pm 0,06$	$1,18 \pm 0,07$	$>0,05$
Ашворт (балл)	$3,2 \pm 0,3$	$3,1 \pm 0,3$	$>0,05$
Гониометрия (°)	44 ± 5	45 ± 4	$>0,05$
ВАС (балл)	$6,4 \pm 0,6$	$6,2 \pm 0,5$	$>0,05$



2-расм. Кинезиотейп қўллашдан сўнг спастиклик даражаси ўзгариши (Ашворт шкаласи)

Тавсиф: - X ўқи: “Даволашдан олдин” ва “Даволашдан сўнг”; - Y ўқи: “Спастиклик (балл)”; - Асосий гуруҳ: 3,2 → 1,9; Таққослаш гуруҳи: 3,1 → 2,6

Бу гуруҳларда кинезиотейп қўлланган гуруҳда спастиклик 40 % га камайган.

Натижалар. Тадқиқот натижалари шуни кўрсатдики, кинезиотейп қўлланган беморларда реабилитация жараёнининг барча клиник кўрсаткичлари бўйича сезиларли ижобий динамика қайд этилди. Асосий гуруҳда мушак тонуси тезроқ нормаллашди, спастиклик даражаси камайди ва мотор координация яхшиланди. Таққослаш гуруҳида ҳам ижобий ўзгаришлар кузатилди, бироқ улар нисбатан секинроқ кечди.

Кинезиотейп мушак фаолиятини физиологик тарзда қўллаб-қувватлагани сабабли, беморлар машқларни оғриқсиз, еркинроқ бажара олдилар. Бу еса кинезотерапия самарадорлигини оширди.

3-жадвал

Кинезиотейпнинг клиник кўрсаткичларга таъсири

Кўрсаткич	Асосий гуруҳ (n=25)	Таққослаш гуруҳи (n=25)	Ўзгариш (%)	P
ЕМГ (мВ)	$1,20 \pm 0,06 \rightarrow 1,68 \pm 0,08$	$1,18 \pm 0,07 \rightarrow 1,42 \pm 0,09$	+40,0 %	<0,05
Ашворт шкаласи (балл)	$3,2 \pm 0,3 \rightarrow 1,9 \pm 0,2$	$3,1 \pm 0,3 \rightarrow 2,6 \pm 0,3$	-40,6 %	<0,05
Гониометрия (°)	$44 \pm 5 \rightarrow 69 \pm 6$	$45 \pm 4 \rightarrow 56 \pm 5$	+36,7 %	<0,05
ВАС (оғриқ балл)	$6,4 \pm 0,6 \rightarrow 3,2 \pm 0,4$	$6,2 \pm 0,5 \rightarrow 4,5 \pm 0,6$	-50,0 %	<0,05

Диаграмма шуни яққол кўрсатадики, Ашворт шкаласи бўйича спастиклик даражаси асосий гуруҳда 3,2 баллдан 1,9 баллгача камайган. Бу мушак тонусининг физиологик меъёрга қайтганини билдиради. Гониометрия маълумотларига кўра, бўғим ҳаракат амплитудаси 44° дан 69° гача кенгайган — бу мушакларнинг эластиклиги тикланганини кўрсатади. ЕМГ кўрсаткичларининг 40 % га ошиши еса мушак толаларининг биоэлектрик фаоллиги яхшиланишини англатади. ВАС шкаласи бўйича оғриқ даражаси 6,4 дан 3,2 баллгача камайдигани беморларнинг субъектив ҳолати ва мотивацияси яхшиланишини исботлади. Ушбу натижалар шуни тасдиқлайдики, кинезиотейп мушаклар ва бўғимларга ортиқча юклама бермасдан, уларни физиологик фаол ҳолатда ушлаб туради. Бу еса спастик мушакларнинг бўшашишига, нормал ҳаракат амплитудасининг тикланишига ҳамда марказий асаб тизимининг қайта мослашув (нейропластиклик) жараёнига ёрдам беради. Кинезиотейпни комплекс реабилитация дастурига қўшиш орқали реабилитация курсининг самарадорлиги сезиларли ошган.

Асосий гуруҳда спастиклик 40 %, оғриқ 50 %, мушак фаолияти еса 40 % яхшилانган — бу натижалар статистика жиҳатидан ишончли ($p < 0,05$).

Хулоса:

1. Кинезиотейп қўллаш инсултдан кейинги беморларда мотор функцияларни тиклашда самарали қўшимча усул бўлиб, мушак тонусини физиологик меъёрга келтириш, спастикликни камайтириш ва мушак фаолиятини яхшилашда муҳим рол ўйнайди.

2. Тадқиқот натижалари асосида асосий гуруҳда спастиклик даражаси 40 % га, оғриқ синдроми 50 % га камайган, мушак биоэлектрик фаоллиги еса 40 % га ошган — бу клиник жиҳатдан аҳамиятли ўзгаришлардир.

3. Кинезиотейп мушак ва бўғим фаолиятини доимий тарзда қўллаб-қувватлаб, проприосептив рецепторлар фаолиятини фаоллаштиради ҳамда ҳаракат координациясининг тикланиш жараёнини тезлаштиради.

4. Кинезотерапия машқлари билан биргаликда қўлланганда кинезиотейпнинг синергетик таъсири кузатилиб, реабилитация жараёнининг умумий самарадорлиги ошади.

5. Олинган натижалар асосида инсултдан кейинги реабилитацияда кинезиотейпни стандарт амалий протоколларга киритиш, шунингдек, мушак фаолиятини қўллаб-қувватловчи индивидуал ёндашув сифатида кенг жорий этиш тавсия этилади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Абдукадирова Д. Т., Ахмаджон А. И. Инсултдан кейинги спастик гемипарезли беморларга электромиостимуляция билан бирга қўлланилган кинезотерапия ва криотерапиянинг таъсири // Journal of new century innovations. – 2022. – Т. 10. – №. 3. – С. 25-29.

2. Баранцевич Е.Р., Ковальчук В.В., Овчинников Д.А., Стурова Ю.В. Современные возможности организации реабилитации пациентов после инсульта // АГ. 2015. №2.

3. Дробышев В. Фармакопунктура биорегуляционных препаратов в раннем восстановительном периоде ишемического инсульта // Врач. – 2018. – Т. 29. – №. 6. – С. 87-88.

4. Дружинина В. В. и др. Патофизиология инсульта и его лечение // Международный студенческий научный вестник. – 2018. – №. 4-2. – С. 228-231.

5. Демьяновская Е. Г., Васильев А. С. Клинико-патофизиологические основы и передо-

вые разработки в реабилитации пациентов после ишемического инсульта // лв. 2021. №5

6. Умирова С.М., Холмирзаев Б.Т., Эффективности Фармакопунктуры Для Профилактике Приступов Мигрени Самаркандский государственный медицинский университет //Ташкентская медицинская академия Volume: 3 Issue: 11 | Nov-2024 ISSN: 2720-6866

7. Фирилёва Ж. Е. Динамика восстановления физических (двигательных) качеств в процессе непрерывной реабилитации человека, перенёсшего инсульт //Современные проблемы науки и образования. – 2018. – №. 3. – С. 48-48.

8. Ким О.А. Анализ церебральных факторов и сывороточных биомаркеров острого//Ишемического инсульта молодого возраста// Самаркандский государственный медицинский университет, Республика Узбекистан, Г.Самарканд 2023, № 3 (144)

9. Караматов И. Д., Баймурадов Р. С. Противоопухолевые свойства пчелиного яда (обзор литературы) //Биология и интегративная медицина. – 2023. – Т. 64. – №. 5. – С. 158-180.

10.Кароматов И. Д., Баймурадов Р. С., Комилов С. О. Перспективы применения пчелиного яда в неврологии (обзор литературы) //Биология и интегративная медицина. – 2023. – №. 4 (63). – С. 125-147.

11.Кароматов И. Д., Баймурадов Р. С. Фармакопунктура пчелиным ядом как перспективный метод терапии (обзор литературы) //Биология и интегративная медицина. – 2023. – №. 2 (61). – С. 229-251.

12.Ким О.А., Мавлянова З.Ф. Реабилитационный потенциал как составляющая процесса ресоциализации молодых с ишемическим инсультом//Ж.Биомедицины и практики. 2022, том. 7. - выпуск 2. - с.175-181

13.Костенко Е.В., Полунина Н.В., and Кравченко В.Г.. "Медико-социальные аспекты комплексной реабилитации пациентов, перенесших транзиторные ишемические атаки" Медицинский совет, no. 1, 2018, pp. 124-128.

14.Лопатина Т.Н., Терентьева О.В. Реабилитация больных после ишемического инсульта // Медицинская сестра. 2018. №5.

15.Мар’ин С.П. Реабилитация больных с острым нарушением мозгового кровообращения. – 2010.

16.Умирова С.М., Холмирзаев Б.Т., Холмуратова Б.Н. (2024). Эффективности Фармако-

пунктуры Для Профилактике Приступов Мигрени. //Research Journal of Trauma and Disability Studies, 3(11), 129–132.

17.Иванова Г. Е. и др. Медикаментозная поддержка реабилитационного процесса при острых нарушениях мозгового кровообращения //Consilium medicum. – 2016. – Т. 18. – №. 2-1. – С. 20-24.

18.Раимбердиев Э. Д., Шеров Т. Х., Шерова Ш. Х. Реабилитация физиологических нарушений после инсульта методами иглоукалывания //International journal of scientific researchers (IJSR) INDEXING. – 2024. – Т. 5. – №. 2. – С. 45-48.

19.Румянцева С.А., Силина Е.В., Гомбоева Н.А., и др. Клинико-патофизиологические корреляции при остром инсульте, визуализируемом по КТ в разные сроки // Антибиотики и химиотерапия. 2015. №1-2.

20.Ястребцева И.П., Белова В.В., Фокичева С.О., Карманова А.С. Результаты механизированной кинезотерапии при сочетании двигательных и речевых нарушений у пациентов с инсультом // Вестник восстановительной медицины. 2018. №2 (84).

21.Чичкова М. А., Козлова О. С., Орлов Ф. В. Особенности сочетания инфаркта миокарда и острого нарушения мозгового кровообращения //Астраханский медицинский журнал. – 2016. – Т. 11. – №. 1. – С. 55-63.

22.Allencherril J. et al. Pathophysiology, diagnosis, and management of the no-reflow phenomenon //Cardiovascular Drugs and Therapy. – 2019. – Т. 33. – С. 589-597.

23.Afnida M., Utami W. S. Using the Somatic, Auditory, Visual, and Intellectual (SAVI) Learning Model for Improving Geometry Ability in Early Childhood //Jurnal Pendidikan Usia Dini. – 2024. – Т. 18. – №. 1. – С. 142-153.

24.Bishop L. et al. Race and ethnic disparities in rehabilitation services and functional recovery post-stroke //medRxiv. – 2025. – С. 2025.01.06.25320085.

25.Bonita R., Beaglehole R. Recovery of motor function after stroke //Stroke. – 1988. – Т. 19. – №. 12. – С. 1497-1500.

26.Brott T. et al. Measurements of acute cerebral infarction: a clinical examination scale //Stroke. – 1989. – Т. 20. – №. 7. – С. 864-87.

Иқтибос учун: Умирова С.М., Бебитова Ш.Э. Кинезиотейпнинг мотор функцияларни тиклашдаги ўрни: инсулдан кейинги беморлар мисолида // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2026. – № 4(24). – Б. 389–393. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19548707>

МАРКАЗИЙ АСАБ ТИЗИМИНИНГ ПЕРИНАТАЛ ШИКАСТЛАНИШИ ОҚИБАТЛАРИ ФОНИДА БА БИЛАН ОҒРИГАН БОЛАЛАРНИ ДАВОЛАШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

Хайдарова С.Х., Ортикова П.Ф.

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Дунёда даволаш ва реабилитация тадбирларини оптималлаштириши орқали бронхиал астма билан касалланган болаларнинг ҳаёт сифатини яхшилашга қаратилган кенг қамровли илмий тадқиқотларга алоҳида эътибор берилмоқда. Бу борада хавф омилларини, касаллик шаклланишининг патогенетик механизмларини, ирсий мойилликни ўрганиш ва ёндош патологияни, шу жумладан марказий асаб тизимининг перинатал шикастланишини ҳисобга олган ҳолда касаллик кечишининг оғирлигини башорат қилиш моделларини яратиш бўйича қатор илмий изланишлар олиб борилмоқда. Сўнгги тадқиқотлар натижасида олимланиннг эътибори нафақат бронхиал астма этиологияси ва патогенези, частотаси ва клиник белгиларининг хилма-хиллигига, балки даволаш ва реабилитация самарадорлигининг муҳим таркибий қисми бўлган психоневрологик жиҳатларга ҳам қаратилмоқда. Ушбу тоифадаги беморларнинг динамик мониторинги, коморбид фон билан кечувчи асосий касалликнинг прогнозига таъсирига алоҳида эътибор берилмоқда.

Калим сўзлар: бронхиал астма, перенатал шикастланиш, коморбид фон, марказий асаб

SPECIFIC FEATURES OF TREATING CHILDREN WITH BA AMIDST THE CONSEQUENCES OF PERINATAL INJURY TO THE CENTRAL NERVOUS SYSTEM

Haydarova S.H., Ortikova P.F.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Globally, significant attention is being devoted to comprehensive scientific research aimed at improving the quality of life for children with bronchial asthma by optimizing treatment and rehabilitation measures. In this regard, a number of scientific studies are being conducted to investigate risk factors, the pathogenetic mechanisms of disease formation, and genetic predisposition, as well as to create models for predicting the severity of the disease, taking into account comorbid pathologies, including perinatal lesions of the central nervous system. As a result of recent research, scientists' attention is being drawn not only to the etiology, pathogenesis, prevalence, and diversity of clinical manifestations of bronchial asthma, but also to psychoneurological aspects, which are a crucial component of effective treatment and rehabilitation. Particular focus is placed on the dynamic monitoring of this category of patients and the impact of the comorbid background on the prognosis of the primary disease.

Keywords: bronchial asthma, perenatal lesion, comorbid background, central nervous system

ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С БА НА ФОНЕ ПОСЛЕДСТВИЙ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ПОРАЖЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

Хайдарова С.Х., Ортикова П.Ф.

Самарқандский государственный медицинский университет, г. Самарқанд, Узбекистан

Резюме. Во всем мире уделяется особое внимание комплексным научным исследованиям, направленным на улучшение качества жизни детей с бронхиальной астмой путем оптимизации лечебно-реабилитационных мероприятий. В связи с этим проводится ряд научных изысканий по изучению факторов риска, патогенетических механизмов формирования заболевания, наследственной предрасположенности, а также по созданию моделей прогнозирования тяжести течения заболевания с учетом сопутствующей патологии, в том числе перинатального поражения центральной нервной системы. В результате последних исследований внимание ученых привлекают не только этиология и патогенез, частота и разнообразие клинических проявлений бронхиальной астмы, но и психоневрологические аспекты, являющиеся важной составляющей эффективности лечения и реабилитации. Особое внимание уделяется динамическому наблюдению за данной категорией больных и влиянию коморбидного фона на прогноз основного заболевания.

Ключевые слова: бронхиальная астма, перенатальное поражение, коморбидный фон, центральная нервная система

Бронхиал астма (БА) сивилизация касалликларидан бири бўлиб, бугунги кунда бутун дунёда унинг долзарблиги ортиб бормоқда. БА нинг тарқалиши турли мамлакатларда 1% дан 18% гача ўзгариб туради. Ҳозирги вақтда дунёда 300 миллионга яқин БА билан касалланган беморлар мавжуд бўлиб, 2028-йилга келиб бу кўрсаткич 400 миллионга етиши кутилмоқда, бунда барча ҳолатларнинг 14% ни болалар ташкил этади. Болилик даврида намоён бўлган касаллик 60-80% ҳолларда катта ёшли бўлганда ҳам давом этади [21]. 80% дан ортиқ беморларда БА ерта болалик даврида ўткир респиратор инфекциялар фонида бронхообструктив синдром (БОС) кўринишида намоён бўлади [37]. Бронхларнинг обструктив касалликлари (БОК) ва БОС билан бирга келадиган бошқа касалликларнинг клиник кўринишларининг ўхшашлиги БА ташҳисини эрта аниқлашни қийинлаштиради ва этиопатогенетик терапияни ўз вақтида тайинлашни секинлаштиради [8, 10].

БА болалик даврида нафас олиш аъзоларининг кенг тарқалган касаллиги бўлиб, сурункали прогрессив кечиши билан тавсифланади. Адабиёт манбаларига кўра, БА болалар аҳолиси орасида ногиронликнинг асосий сабаби ҳисобланади. Шу муносабат билан касалликнинг оғир шакллари ривожланишини ва касалликнинг назоратсиз кечишини башорат қилиш усуллари излаш устувор илмий йўналишга айланмоқда [2, 8, 12, 17, 20].

Н.М.Агарков ва ҳаммуаллифларнинг маълумотларига кўра, сўнгги йилларда нафас олиш аъзолари касалликлари билан касалланишнинг ўзига хос ўсиши айнан болалар (12,1%) ва ўсмирлар (14,7%) орасида кузатилмоқда. Бу ўпканинг обструктив патологиясининг бошқа турлари билан бир қаторда аллергик ринит ва БАни ўз ичига олган аллергик патологиянинг кўпайиши билан боғлиқ [3, 9]. Болаларда сурункали ўпка касалликлари таркибида БА 75% дан ортиқ ўринни эгаллайди [16, 38]. Бироқ, тарқалишнинг ҳақиқий даражасини аниқлашда муаммо мавжуд, чунки кўплаб беморлар даволанишга мурожаат қилмайдилар. Шифокорлар, айниқса, ёш беморларда БА ташҳисини қўйишда ҳам қийинчиликларга дуч келишади. Кўпчиликда касаллик кеч ташҳисланади, ҳатто характерли аломатлар мавжуд бўлса ҳам [14, 17]. С.Г. Звягинцеванинг маълумотларига кўра, амалий соғлиқни сақлашда атиги 15,9% болаларда БА ташҳиси касаллик бошланишининг дастлабки 6 ойида, 18,8% беморларда 2 йилдан кейин, 10,6% беморларда 5 йилдан кейин, 10% беморларда 7-10 йилдан кейин, 6,2% беморларда эса касаллик бошланганидан 11-14 йил ўтгач аниқланади [36].

Ўзбекистон вилоятлари бўйича 15-18 ёшли ўсмирлар орасида БА тарқалишини кўриб чиқсак, қуйидаги кўрсаткичларни ажратиб кўрсатиш мумкин: умумий касалланиш даражаси бўйича 100000 ўсмирга нисбатан биринчи ўринда Бухоро вилояти бўлиб, бу кўрсаткич республика ўртача кўрсаткичидан 2,9 баравар юқори. Иккинчи ўринда Хоразм вилояти (2,4 баравар кўп) ва учинчи ўринда Навоий вилояти (1,8 баравар кўп). Ўсмирлар орасида БА билан бошланғич касалланиш бўйича ҳам шунга ўхшаш тенденция кузатилмоқда: Бухоро вилоятида ушбу кўрсаткич даражаси мамлакат бўйича ўртача кўрсаткичдан 4,1 баравар (1-ўрин), Хоразм вилоятида эса 1,8 баравар (3-ўрин) юқори. Шуниси эътиборга лойиқки, Сирдарё вилояти БА тарқалиши бўйича иккинчи ўринда туради, бу вилоятда 14 ёшгача бўлган болалар орасида бошланғич касалланиш даражаси мамлакатдаги ўртача кўрсаткичдан 4 баравар паст бўлишига қарамай, ўсмирлар орасида бошланғич аниқланиш кўрсаткичи республика ўртача даражасидан 2,8 баравар юқори. Бу БАнинг аниқланмаган ҳолатлари мавжудлигини ёки кичикроқ ёш гуруҳида касалланиш кўрсаткичининг пасайганлигини кўрсатиши мумкин, бу эса охир-оқибат ўсмирлик даврида ташҳислар сонининг кўпайишига олиб келади.

Даволаш чоралари тўхтатилгандан сўнг симптомлар бутунлай йўқолганда, касалликнинг ремиссияси ҳақида гапириш мумкин, бу баъзан ўз-ўзидан бўлиши мумкин ва аксарият ҳолларда ўсмир ўғил болаларда кузатилади. БА билан оғриган боланинг ҳолатини баҳолашнинг муҳим динамик мезонни касалликни назорат қилиш бўлиб, унинг даражаси симптомларнинг оғирлик даражаси билан баҳоланади.

Клиник амалиётда назорат даражасини баҳолаш қуйидаги таркибий қисмларни ўз ичига олади: мавжуд аломатларни назорат қилиш даражаси ва касалликнинг ривожланиш хавфини баҳолаш.

МНТнинг перинатал генезли зарарланиши оқибатлари фонида БА билан оғриган беморларни олиб бориш босқичма-босқичлик ва узлуксизлик тамойилларига риоя қилган ҳолда кўп босқичли узлуксиз тизимга асосланган бўлиши керак, биринчи босқичда туғруқхона ва реанимация ва интенсив терапия бўлимларидан бошланиб, учинчи босқичда мултидисциплинар бригада томонидан тикловчи даволаш билан якунланади [4, 17, 28]. Перинатал генезли марказий асаб тизими шикастланиши оқибатлари бўлган болаларда ногиронлик даражасини камайтириш учун реанимация бўлими босқичида эрта бошлашга риоя қилган ҳолда реабилитация кетма-кетлиги курилади; боланинг ёши ва асосий патологиянинг оғирлигини, коморбид ҳолатлар мавжудлигини ва индивидуал генетик хусусиятларни ҳисобга олган ҳолда шахсий ёндашув қўлланилади [19, 38]. Рационал узлуксизликка асосланган бундай ёндашув неврологик натижалар кўрсаткичларини яхшилаш ва мумкин бўлган реабилитация

салоҳиятини амалга ошириш имконини беради [17, 25, 35, 44]. Лаборатория-инструментал тадқиқот усуллари натижаларини ҳисобга олган ҳолда, аниқланган патологиянинг кўп босқичли тикланиш терапияси нафақат дори-дармон воситаларини, балки дори-дармонсиз терапиянинг катта арсеналини, шу жумладан нутритив қўллаб-қувватлаш ва психологик-педагогик тузатиш, жимоний реабилитация воситалари ва усулларини ўз ичига олиши керак [4, 18, 21, 29], бир нечта функционал тизимларга таъсир кўрсатадиган дари терапиясини эҳтиёткорлик билан тўлдиради.

Касалликни назорат қилиш БАнинг зўрайиш частотасини ва касалхонага ётқизиш частотасини камайтириш ёки уларнинг бутунлай йўқлигини, тўғри танланган асосий терапия фонида ТНФ кўрсаткичларини нормаллаштиришни ўз ичига олади [7, 17]. Болилик даврида БА кечишининг ўзига хос хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда, педиатрик БА муаммоларига бағишланган бир қатор халқаро хужжатлар ишлаб чиқилган. Булар: Болаларда БА бўйича консенсус PRACTALL [37], Педиатрик астма бўйича халқаро консенсус ICON [22]. 2017-йилда Россия Федерациясида "Болаларда БА. Даволаш стратегияси ва профилактикаси". 2022-йилда GINA астма касаллигининг олдини олиш ва назорат қилиш жиҳатларини, шу жумладан болаларда ҳам акс эттирувчи глобал астма стратегиясини ишлаб чиқди [22].

БА сурункали касаллик эканлиги умумётироф этилган ва замонавий шароитда уни даволаб бўлмайди, аммо беморга минимал хавф билан яхши ҳаёт кечиришни таъминлашнинг самарали усуллари мавжуд. Шу муносабат билан, БА терапиясининг асосий вазифаси симптомларни бартараф этиш ва салбий оқибатларнинг хавф омилларига таъсир қилишдан иборат бўлган касалликни назорат қилишга эришиш, яхши жимоний фаолликни таъминлаш, зўрайиш хавфини ва даволашнинг ноёб таъсирларини минималлаштириш, шунингдек, фиксацияланган бронхиал обструкция шаклланишини олдини олишдир.

БАни даволаш беморнинг аҳволини баҳолаш, терапияни тузатиш ва 30 кун давомида касаллик белгиларини ҳисобга олган ҳолда ўтказилаётган даволанишга жавобни мажбурий назорат қилишни ўз ичига олган цикл узлуксиз жараёни ўз ичига олиши керак. БА терапияси фармакологик ва дори-дармонсиз усуллардан фойдаланишга асосланган бўлиб, улар орасида нафас олиш машқлари тавсия этилган, гарчи уларнинг GINAда БА кечишига таъсирининг исботланганлик даражаси А дан В гача пасайтирилган бўлса ҳам.

БА терапиясига босқичма-босқич ёндашув минимал дари юкламаси билан касалликни назорат қилишга қаратилган [2, 4]. Камида 3 ой давом этадиган танланган адекват базис терапия индивидуал равишда буюрилади ва эришилган самарага қараб тузатилади [18, 35]. Базис терапия препаратларига ИГКС, лейкотриен рецепторлари антагонистлари (АЛРТ), ИГКС ва узок муддатли таъсирга эга β2-агонистлар ёки АЛРТ билан комбинациялар, кромонлар, теофиллинлар, анти IgE препаратлари, тизимли глюкокортикостероидлар киради [15, 23].

Ҳаётининг дастлабки 5 ёшидаги болаларда II босқичнинг муқобил базис терапияси сифатида 2 ҳафтагача давом этадиган ИГКСнинг интермиттирувчи курсларини тайинлаш кўриб чиқилади, гарчи бундай терапиянинг самарадорлиги узок муддатли ИГКС терапиясига нисбатан пастрок. Бу АЛТРга ҳам тегишли бўлиб, у БА билан оғриган беморларда ёшидан қатъи назар, иккинчи босқичдаги асосий терапияга муқобил ҳисобланади [11, 12]. Даволашнинг учинчи босқичи паст дозали ИГКС ва узок таъсир қилувчи β2-агонистларнинг комбинацияси билан тавсифланади. Даволашнинг бошқа варианты ИГКСнинг ўртача қийматларгача оширилган дозасини қўллашдир, бундан ташқари, қўллаб-қувватловчи терапия учун ИГКСни АЛРТ ёки секин ажралиб чиқадиган теофиллинлар билан биргаликда қўллаш мумкин [16].

Ўрта ва оғир БА билан оғриган кўплаб болаларда бронхообструкциянинг мавжудлиги индивидуал дозани танлаш билан ИГКС ва узок таъсирли β2-агонист (УТ) комбинациясини узок муддатли қўллаш зарурлигини исботлайди. Узок муддатли ингаляцион базис терапияни талаб қиладиган беморларда будесонид/формотеролдан фойдаланиш қисқа таъсирли (КТ) β2-агонистини қўшимча қўлашни минималлаштиришга имкон беради [19].

Геппе Н.А. ва ҳаммуалл. касалликнинг ўртача ва оғир кечишида БА устидан назоратнинг юқори даражаси ва ИГКС ва β2-агонистлари билан комбинацияланган терапияни яхши кўтара олишини кўрсатди. Комбинацияланган терапиянинг таъсирини баҳолашда 6 ой ва ундан кўпроқ вақт давомида потенциал таъсирни ҳисобга олиш зарурияти туғилади. Терапияга будесонид/формотерол комбинациясини киритиш ИГКСнинг сезиларли даражада камайтирилган дозаларини тайинлашда ҳам БА устидан оптимал назоратга эришиш имконини беради [38, 43]. Головкин В.А. ва ҳаммуаллифлар эрта ва мактабгача ёшдаги болаларда БА хусусиятларини ўрганиб, узок таъсир этувчи бронхолитиклар, анти-IgE-терапия, аллергияга хос иммунотерапияни қўллашдаги ёшга боғлиқ чекловлар бу ёшда БАни даволашни мураккаблаштиради, деган хулосага келишган [15, 41]. Эрта ва мактабгача ёшдаги бо-

лаларда БАнинг базис терапиясини оптималлаштиришнинг истикболли йўналиши вирус келтириб чиқарган БАда иммуномодуловчи дари воситаларини патогенетик даволаш комплексига киритиш, эрта ёшда узоқ муддатли бронхолитикларни (биринчи навбатда, тиотропиум бромид) қўллаш, шунингдек, ингаляцион стероидлар билан биргаликда қисқа таъсирли бронхолитикларни узоқ муддатли қўллаш имкониятларини ўрганиш ҳисобланади.

Болаларда БА базис терапиясининг муваффақиятига тавсия этилган препаратнинг таъсир механизми, унинг дари шакли, айниқса, ота-оналарнинг касаллик ва терапияга муносабати билан боғлиқ бир қатор омиллар таъсир кўрсатади. Шундай қилиб, 4 ёшгача бўлган болаларда БАнинг оғир шаклида фармакотерапия қийинчиликлари юзага келади, улар учун АЛРТнинг стероид сақловчи таъсири нуктаи назаридан ИГКС ва монтелукастни биргаликда буюриш мақбул ҳисобланади. 4 ёшдан катта болаларда мавжуд дари воситаларининг кўплиги, уларнинг ўрганилганлиги ва уларда ингаляторлардан фойдаланиш имконияти [20, 37], шу жумладан Пулмикорт препаратини қўллаган ҳолда уй шароитида ва касалхона шароитида небулайзер терапияси туфайли фармакотерапия имкониятлари ошади [9, 17, 18, 20]. Бироқ, уларда ҳам фақат ИГКС терапияси ва уларни β_2 -ДД агонистлари билан биргаликда қўллаш ўртасида танлов масаласи юзага келади, уларнинг афзалликлари будесонид/формотерол (БУД/ФОР) ва флутиказон пропионат/салметерол [11, 8]. Реал ҳаётда беморлар томонидан қабул қилинадиган дари воситаларининг самарадорлиги ва хавфсизлигини объектив баҳолашдан ташқари, "реал клиник амалиёт" тадқиқотлари турли хил даволаш усуллариининг самарадорлигини, касаллик юқини ва даволаниш харажатларини баҳолайди, шунингдек, беморларнинг қондирилмаган тиббий эҳтиёжларини аниқлайди [17, 23; 24, 30]. Респиратор касалликларнинг дорӣ-дармонсиз олдини олиш усуллари орасида физиотерапевтик усуллар кенг тарқалган: массаж, ДЖТ, галотерапия, аэрофитотерапия, чиниқтириш ва бошқалар [6, 14, 24]. Каладзе Н.Н. ва ҳаммуаллифлар санаторий-курортда даволаниш ва БАни комплекс даволаш дастурига "Виферон" препаратини киритиш самарадорлигини ўрганиб, назорат гуруҳи кўрсаткичларига етмаган ИФР-1 нинг 39,2% га ишончли ўсишини аниқлади-лар ($p>0,05$), бу ҳатто ремиссия даврида ҳам яллиғланиш жараёнининг сақланиб қолишини кўрсатди [7, 25].

Мавлянова З.Ф.нинг фикрига кўра, БА билан оғирган болалар учун муолажалар мажмуаси нафас олиш ва унинг ритмини назорат қилиш усуллариини ўз ичига олади, бу эса нафас йўлларида шиллиқ ва балғам ажралишини кучайтиришга ёрдам беради, шунингдек, ўпкага ҳаво оқимининг яхшиланишини таъминлайди [25, 28]. БАни дорӣ-дармонлар билан даволаш билан бир қаторда, мутахассислар нафас олиш тизимини мустаҳкамлаш ва унинг функциясини ривожлантиришга қаратилган ушбу касалликни даволашнинг мустақил йўли сифатида даволаш прогнозига таъсир қилувчи ДЖТ ва нафас олиш гимнастикаси (НГ) усулларига алоҳида аҳамият беришади [31, 33, 35]. НГ машғулотлари умуман организмнинг, юрак-қон томир ва нафас олиш тизимларининг жимоний юкламаларга мослашишига ёрдам беради, иммунологик реактивликни оширади [32, 37].

МАТ ПШ оқибатларининг медикаментоз терапияси устуилик қилувчи клиник синдромга боғлиқ; бош мия олий функцияларини яхшилаш мақсадида ноотроп терапияни қўллаш кўрсатилган, периферик қон айланишини яхшилаш учун қон томир терапияси самарали ҳисобланади. Реабилитация тадбирлари мажмуасига массаж, гимнастика, кинезиотерапия, "ҳолат" билан даволаш (тўшамалар, таторлар, "ёқалар" ва бошқалар), Войт терапияси (ҳаракат функциялари патологияси бўлган беморларни даволашнинг физиотерапевтик усули - рефлексор локомоция); гидротерапия; куруқ иммерсия; "Сатурн" реабилитация кровати (вазнсизлик эффекти+вибромассаж); физиотерапевтик усуллар (ўзгарувчан магнит майдони, синусоидал модуляцияланган тоқлар, электрофорез, парафинотерапия, лазер терапияси, ёруғлик ва ранг терапияси), мусика терапияси, психологик-педагогик тузатиш ва психоэстетотерапия (педагогика, "она-бола" диадасида психотерапевтик тузатиш, мусика терапияси, тактил-кинетик стимуляция) [15, 17, 32, 33], скандинавча юриш [29, 36]. Метаболик терапия хужайрали нафас олиш ва энергия ҳосил бўлиш жараёнларини рағбатлантириш, тўқималарнинг кислороддан фойдаланишини яхшилаш, антиоксидант таъсирни таъминловчи ферментлар фаоллигини тиклаш, хужайра ичидаги оксил синтезини фаоллаштириш, бош мия БЕАсига ижобий таъсир кўрсатиш, мияда қон оқимини яхшилаш, МНТда метаболик жараёнларни фаоллаштириш, рефлексор бузилишларни камайитириш (Ситафлавин, Левокарнитин, Убидекаренон, Корилип) мақсадида амалга оширилади. Аминокислотали терапия моддалар алмашинувини тартибга солиш, МНСда ҳимоявий тормозланиш жараёнларини меъёрлаштириш ва фаоллаштириш мақсадида буюрилади.

Шундай қилиб, БАда оғирлашган перинатал анамнезни касалликнинг клиник кечишига оғирлаштирувчи таъсир кўрсатувчи муҳим омил сифатида кўриб чиқиш мумкин, бу эса болаларда БАни самарали даволаш режасини тузиш билан касалликнинг оғирлик даражаси ва кечишининг мумкин бўлган оғирлашиши хавфини баҳолашда перинатал анамнезни диққат билан кузатишни талаб қилади.

Асоратланган перинатал анамнез ва БА билан оғриган беморлар, айниқса болалар, неврологик ҳолат ва нафас олиш функциялари ўртасидаги мураккаб боғлиқликларни кўрсатиши мумкин. МНТ ПШ унда узоқ муддатли ўзгаришларга олиб келади, бу эса ўз навбатида нафас йўллари назорати ва иммун жавобга таъсир кўрсатади. Бу БА тез-тез кўзгиши, пикфлоуметрия ва спирограмма кўрсаткичларининг ёмонлашиши, шунингдек, касалликни назорат қилишнинг паст даражаси билан намоён бўлиши мумкин. Ярим шарлар аро ўзаро таъсирнинг бузилиши ва синдромал ўзгаришлар клиник кўринишни мураккаблаштиради, диагностика ва даволашга комплекс ёндашувни талаб қилади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Абдусаломова М.А., Турғунбоев А.У. Нейровизуализация -- болаларда орқа миёна бўйин қисми туғруқ жароҳатларининг реабилитацияси-ни баҳолаш ва прогноزلанинг замонавий усули сифатида // Доктор ахборотномаси -2022.- № 3 (106), - 11-14 б.
2. Авдеев С.Н., Айсанов З.Р., Архипов В.В. и др. Принципы выбора терапии для больных легкой бронхиальной астмой. Согласованные рекомендации РААКИ и РРО // Практическая пульмонология. -- 2017. -- №1. -- С. 44-54.
3. Агарков Н.М., Ильницкий А.Н., Прощаев К.И., Пошибайлова А.В., Негребетский В.А. Заболеваемость бронхиальной астмой детей как актуальная медико-социальная проблема // Здоровоохранение РФ. 2019. №6. URL:
4. Акимов Е. А. Нейробиологические основы возникновения восстановительного лечения перинатального поражения центральной нервной системы у детей / [авт. коллектив: Акимов Е. А. и др.]. - Москва: Педиатр, 2016 г. - 183с.
5. Балаболкин И. И. Клинико-патогенетические и терапевтические аспекты коморбидности атопического дерматита и бронхиальной астмы у детей: (обзор) / И. И. Балаболкин, В. А. Булгакова. Т. И. Елисеева // Педиатрия. - 2021. - Т. 100, № 3, май\июнь. - С. 146-151.
6. Балаболкин И. И., Булгакова В. А. Бронхиальная астма у детей. М.: Мед. информ. агентство, 2015. 144 с.
7. Барабаш Е.Ю., Калинина Е.П., Гвозденко Т.А. Регуляция иммунного ответа у пациентов с частично контролируемой и контролируемой бронхиальной астмой. // Медицинская иммунология. 2017, Т. 19, № 1. -- С. 65-72.
8. Бахтадзе С. З., Геладзе Н. М., Хачатуридзе Н. С., Хаташвили И. Т. Нефармакологические методы лечения нарушения внимания у детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности / С. З. Бахтадзе [и др.] // Неврологический журнал. - 2012. - Т. 17, № 5. - С. 38-42.
9. Белова О. С. Психофизиологические и клинические аспекты формирования отклонений в психо-речевом развитии у детей раннего возраста с перинатальным поражением центральной нервной системы: дис. на соиск. учен. степ. канд. мед. наук. - Архангельск, 2007 г. - 156 с.
10. Вайншенкер Ю. И. Маломанифестные инфекции у детей и подростков с последствиями перинатального поражения нервной системы / Ю. И. Вайншенкер [и др.] // Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. - 2012.- № 5. - С. 77-80.
11. Власюк В. В., Божченко А. П., Толмачев И. А. Трудности диагностики родовой травмы, интранатальной гипоксии и компрессионной гипоксии //Актуальные вопросы судебной медицины и права. -- 2020. -- С. 130-136.
12. Денисова В. Д. Клинико-функциональные особенности нарушений микроциркуляторно-тканевых систем у детей с бронхиальной астмой: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук. - Москва, - 2020 г. - 23 с.
13. Джамбекова Г. С. Паспорт сенсibilизации школьника как инструмент для профилактики развития астмы / Г. С. Джамбекова, С. П. Кацамаки, В. Ф. Гариб // Российский аллергологический журнал . - 2019. - Т. 16, № 3. - С. 46-51.
14. Езерницкая А. И. Коррекция гипопи-зарно-эпифизарных взаимоотношений и ростовых факторов у больных бронхиальной астмой, находящихся на этапе санаторно-курортной реабилитации : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук. -- Симферополь. - 2019 г. - 22 с.
15. Застрожина А. К. Прогнозирование эффективности терапии бронхиальной астмы у детей на основе фармакогенетического тестирования : диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук. -- Москва. - 2020 г. - 113 с
16. Куршина М. В. Отдаленные последствия перинатальной патологии: структура инвалидности и качество жизни детей-инвалидов : дис. К.м.н. -- Самарский гос. медицинский университет. - 2018. --158 с.
17. Лаврик С. Ю. Последствия перинатальных гипоксических поражений центральной нервной системы у детей дошкольного и раннего школьного возраста : диссертация на соискание ученой степени доктора медицинских наук. -- Иркутск. - 2015 г. - 272 с.
18. Мавлянова З.Ф., Хайдарова С.Х., Ашу-ров Р.Ф., Рустамова Н.Б. Особенности течения

бронхиальной астмы у детей с отягощенным перинатальным анамнезом / Биология ва тиббиёт муаммолари. -- 2024. - №1 (151). -- С. 154-159.

19. Маракулина А. В. Оптимизация контроля бронхиальной астмы при рекуррентных респираторных инфекциях у детей дошкольного возраста : диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук. - Екатеринбург. - 2021 г. - 180 с.

20. Сайфутдинова С. Р. Оценка качества жизни больных с отдаленными последствиями церебральной ишемии мозга у детей // Журнал неврологии и нейрохирургических исследований. -- 2021. -- №. SPECIAL 1.

21. Самигуллина Н. В. Совершенствование диагностики бронхиальной астмы у детей на амбулаторном этапе: диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук. -- Уфа. - 2020. - 202 с.

22. Шамсиев Ф.М., Мусажанова Р.А., Узаква Ш.Б. Значение ПСВ и ФВД в диагностике бронхиальной астме у детей // матер.конф. -- Бухара. - 2018. - С. 168.

23. Шарипова Н.С. Особенности распространения бронхиальной астмы в некоторых регионах Республики Узбекистан / Вестник Совета молодых учёных и специалистов Челябинской области. - 2016. - №4 (15). - Т. 5, - 2016, -С. 59-62.

24. Шнайдер К. О. Безопасность применения омализумаба в лечении бронхиальной астмы среднетяжелой и тяжелой степени: (обзор) / К. О. Шнайдер, М. Л. Максимов, Б. К. Романов // Российский медицинский журнал. - 2022. - Т. 28, № 1. - С. 89-97.

25. Шниткова Е. В. Нервно-психическое здоровье детей, перенесших перинатальное поражение нервной системы / Е. В. Шниткова, Е. М. Бурцев, А. Е. Новиков // Журнал неврологии и психиатрии. -- 2000. - №3. - С.57- 59.

26. Яковенко М.П. Исходы перинатального поражения нервной системы у глубоко недоношенных детей к 12 месяцам скорректированного возраста / М.П.Яковенко, Е.И.Клещенко, Д.А.Каюмова // Журнал неврологии и психиатрии имени С. С. Корсакова. - 2023. - Т. 123, № 10. - С. 97-100.

27. Ahmad Ghanizadeh, Roger D. Freeman, Michael Berk. Efficacy and Adverse Effects of Venlafaxine in Children and Adolescents with ADHD: A Systematic Review of Non-controlled and Controlled Trials // Reviews on Recent Clinical Trials. -- 2023. - Vol. 8, iss. 1. - P. 2--8.

28. Al-Halbouni L, Ryan GW, Radu S, et al. Exploring the relationship between school-supervised asthma therapy and social determinants of health in pediatric asthma care // *Pediatr Pulmonol.* - 2024; - 1. - 10. doi:10.1002/ppul.27065

29. Bateman E.D., Reddel H.K., O'Byrne P.M., et al. As-needed budesonide-formoterol versus maintenance budesonide in mild asthma // *N. Engl. J. Med.* -- 2018. - №378. -- P. 1877-1887.

30. Becker A.B. Asthma guidelines: the Global Initiative for Asthma in relation to national guidelines // *Current opinion in allergy and clinical immunology.* -- 2017. -- № 17 (2). -- P. 99--103.

31. Benjamin J.S. Al-Hadad. The Fetal Origins of Mental Illness // *Am. J. Obstet. Gynecol.* -- 2019. - №221(6). -- P. 549--562.

32. Bleecker E.R, FitzGerald J.M., Chaney P. et al. Efficacy and safety of benralizumab for patients with severe asthma uncontrolled with high-dosage inhaled corticosteroids and long-acting β_2 -agonists (SIROCCO): a randomized, multi-centre, placebocontrolled phase 3 trial // *Lancet.* -- 2016. - №388. -- P. 2115--27. Лечение БА

33. Bronwyn K. Brew, Emma Caffrey Osvald, Tong Gong, Anna M. Hedman. Paediatric asthma and non-allergic comorbidities: A review of current risk and proposed mechanisms. *Clin Exp Allergy.* 2022 Sep; 52(9): 1035--1047. БА + патология ЦНС коморбидные заболел

34. Brown S.D., Brown L.A., Stephenson S. Characterization of a high TNF α phenotype in children with moderate-to-severe asthma. *J. Allergy Clin. Immunol.*, 2015, Vol. 135, no. 6, pp. 1651-1654. TNF α у детей с БА диагностика

35. Bush A. Management of asthma in children // *Minerva Pediatr.* -- 2018. -- № 70(5). -- P. 444-457. Лечение БА

36. Carl E. Stafstrom. Neurological effects of COVID-19 in infants and children // *Dev Med Child Neurol.* -- 2022. - №64(7). -- P. 818--829. Неврологические последствия COVID-19 у младенцев и детей

37. Castro M., Corren J., Pavord I.D., et al. Dupilumab efficacy and safety in moderate-to-severe uncontrolled asthma // *N Engl J Med.* 2018; 378(26): 2486-2496. Лечение БА

38. Castro-Rodriguez JA, Forno E, Rodriguez-Martinez CE, Celedón JC. Risk and Protective Factors for Childhood Asthma: What Is the Evidence? / *J Allergy Clin Immunol Pract.* -- 2016. - Nov-Dec; - 4(6): - P. -1111-1122. Риск развития БА

39. Centers for Disease Control and Prevention. Most Recent National Asthma Data/ Centers for Disease Control and Prevention. 2023. . - P. 56

40. Celtik C, Acunas B, Oner N, Pala O. Neuron-specific eno-lase as a marker of the severity and outcome of hypoxic ischemic encephalopathy. *Brain Dev.* 2004;26(6):398-402

41. Ferraro V.A., Spaggiari S., Zanonato S., Traversaro L., Carraro S., Di Riso D. Psychological well-being of children with asthma and their parents. *J. Clin. Med.* 2024, 13, 5100.

42. Lee et al., Efficacy and safety of once-daily single-inhaler triple therapy (FF/UMEC/VI) versus FF/VI in patients with inadequately controlled asthma (CAPTAIN): a double-blind, randomised, phase 3A trial // *Lancet Respir Med.* -- 2020. Sep 9;S2213-2600(20)30389-1
43. Liberman DB, Tam JS, Cushing AM, Espinoza J. A novel tool using social and environmental determinants of health to assess pediatric asthma in the emergency department // *JACEP Open.* - 2024; 5:e13240.
44. Majellano E.C., Clark V.L., Winter N.A., Gibson P.G., McDonald V.M. Approaches to the assessment of severe asthma: barriers and strategies // *J Asthma Allergy.* - 2019; 12: 235--251.
45. Miguel J. Lanz, Ileen Gilbert, Stanley J. Szeffler, Kevin R. Murphy. Can early intervention in pediatric asthma improve long-term outcomes? A question that needs an answer // *Pediatr Pulmonol.* -- 2019. Mar; 54(3): 348--357.
46. Mihaela Roxana Popescu, Anca Maria Panaitescu. Getting an Early Start in Understanding Perinatal Asphyxia Impact on the Cardiovascular System // *Front Pediatr.* - 2020; 8: 68.
47. Tursunovna E. M. et al. Miya falajli bolalarda uzluksiz rehabilitatsiyani tashkil etish usullari // *Journal of biomedicine and practice.* -- 2024. -- T. 9. -- №. 1.
48. Tursunovna E. M. et al. Effectiveness of parental participation in the rehabilitation of patients with cerebral palsy // *O'zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar jurnali.* -- 2024. -- T. 3. -- №. 28. -- C. 220-226.
49. Zayed Y. et al. Dupilumab safety and efficacy in uncontrolled asthma: a systematic review and meta-analysis of randomized clinical trials // *J Asthma.* - 2018 Oct 1:1-10.
50. Xudoykulova F. V., Kalonov S. S. Jigarning noalkogol yog 'xastaligida safro kislotalarining jigar va ichakda aylanishini baholash // *Science and Education.* -- 2024. -- T. 5. -- №. 3. -- C. 125-133.
51. Vafokulovna K. F. Nonalcoholic fatty liver disease, modern considerations // *Conference Zone.* - - 2022. -- C. 592-599.
52. Хайдарова С.Х. Бронхиал астма ва марказий нерв тизимининг перинатал шикастланиши оқибатлари бўлган болаларда сенсibilizация спектри // «Тиббиётда янги кун» 2 (76) 2025.С.39-45.

Иқтибос учун: Хайдарова С.Х., Ортиқова П.Ф. Марказий асаб тизимининг перинатал шикастланиши оқибатлари фонида БА билан оғриган болаларни даволашнинг ўзига хос хусусиятлари // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси.* – 2026. – № 4(24). – Б. 394–400. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19548827>

CLINICAL COURSE OF BURN DISEASE IN ELDERLY AND SENILE PATIENTS WITH CHRONIC DIFFUSE LIVER DISEASES**Urokov Sh.T.¹, Saidov S.M.²**¹Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan²Bukhara Branch of the Republican Scientific Center of Emergency Medical Care, Bukhara, Uzbekistan

Resume. Background: Burn disease is associated with severe systemic inflammatory response, metabolic disturbances, and multiple organ dysfunction. Aim: To investigate the clinical features, complications, and outcomes of burn disease in elderly and senile patients with chronic diffuse liver diseases. Materials and Methods: A comparative clinical study was conducted involving 100 elderly and senile patients with burn disease. Patients were divided into two groups: Group 1 – patients with burn disease and chronic diffuse liver diseases (n=50); Group 2 – patients with burn disease without liver pathology (n=50). Clinical parameters, laboratory liver function tests, severity scores (SOFA), complications, and mortality rates were analyzed. Results: Patients with chronic diffuse liver diseases demonstrated significantly higher levels of bilirubin, ALT, and AST, more pronounced intoxication syndrome, higher incidence of multiple organ failure, and increased mortality compared to the control group ($p<0.05$). Conclusion: Chronic diffuse liver diseases significantly worsen the clinical course and prognosis of burn disease in elderly and senile patients and should be considered an independent risk factor.

Keywords: burn disease, elderly patients, chronic liver disease, cirrhosis, liver failure.

СУРУНКАЛИ ДИФФУЗ ЖИГАР КАСАЛЛИКЛАРИ МАВЖУД БЎЛГАН КЕКСА ВА ҚАРИЛИК ЁШИДАГИ БЕМОРЛАРДА КУЙИШ КАСАЛЛИГИНИНГ КЛИНИК КЕЧИШИ
Ўроков Ш.Т.¹, Саидов С.М.²¹Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон²Республика шошилинич тиббий ёрдам илмий маркази Бухоро филиали, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Долзарблиги: Куйиш касаллиги кучли системали яллигланиш реакцияси, метаболик бузилишлар ва кўп аъзоли дисфункция ривожланиши билан кечади. Тадқиқот мақсади: Сурункали диффуз жигар касалликлари мавжуд бўлган кексалар ва қарилик ёшидаги беморларда куйиш касаллигининг клиник хусусиятлари, асоратлари ва натижаларини ўрганиш. Материал ва усуллар: Куйиш касаллиги билан оғирган 100 нафар кекса ва қарилик ёшидаги бемор иштирокида таққословчи клиник тадқиқот ўтказилди. Беморлар икки гуруҳга бўлинди: 1-гуруҳ — куйиш касаллиги ва сурункали диффуз жигар касалликлари мавжуд беморлар (n=50); 2-гуруҳ — куйиш касаллиги бўлиб, жигар патологияси бўлмаган беморлар (n=50). Клиник кўрсаткичлар, жигар функциясининг лаборатор таҳлиллари, ҳолат оғирлигини баҳолаш учун SOFA score шкаласи, асоратлар частотаси ва ўлим кўрсаткичлари таҳлил қилинди. Натижалар: Сурункали диффуз жигар касалликлари бўлган беморларда билирубин, АЛТ ва АСТ даражалари ишончли равишда юқори бўлди, интоксикация синдроми янада яққол намоён бўлди, кўп аъзоли етишимовчилик ривожланиш частотаси ва ўлим кўрсаткичи назорат гуруҳига нисбатан юқори эканлиги аниқланди ($p<0,05$). Хулоса: Сурункали диффуз жигар касалликлари кексалар ва қарилик ёшидаги беморларда куйиш касаллигининг клиник кечишини сезиларли даражада оғирлаштиради ҳамда прогнозни ёмонлаштиради ва мустақил хавф омили сифатида баҳоланиши мумкин.

Калит сўзлар: куйиш касаллиги, кекса беморлар, сурункали жигар касалликлари, жигар циррози, жигар етишимовчилиги.

КЛИНИЧЕСКОЕ ТЕЧЕНИЕ ОЖОГОВОЙ БОЛЕЗНИ У ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА С ХРОНИЧЕСКИМИ ДИФФУЗНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПЕЧЕНИ**Уроков Ш.Т.¹, Саидов С.М.²**¹Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан²Бухарский филиал Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Актуальность: Ожоговая болезнь сопровождается выраженной системной воспалительной реакцией, метаболическими нарушениями и развитием полиорганной дисфункции. Цель ис-

следования: Изучить клинические особенности, осложнения и исходы ожоговой болезни у пациентов пожилого и старческого возраста с хроническими диффузными заболеваниями печени. Материалы и методы: Проведено сравнительное клиническое исследование с участием 100 пациентов пожилого и старческого возраста с ожоговой болезнью. Пациенты были разделены на две группы: 1-я группа — больные с ожоговой болезнью и хроническими диффузными заболеваниями печени (n=50); 2-я группа — больные с ожоговой болезнью без патологии печени (n=50). Анализировались клинические показатели, лабораторные тесты функции печени, шкала тяжести состояния SOFA score, частота осложнений и показатели летальности. Результаты: У пациентов с хроническими диффузными заболеваниями печени выявлены достоверно более высокие уровни билирубина, АЛТ и АСТ, более выраженный синдром интоксикации, более высокая частота полиорганной недостаточности и повышенная летальность по сравнению с контрольной группой (p<0,05). Заключение: Хронические диффузные заболевания печени значительно утяжеляют клиническое течение и ухудшают прогноз ожоговой болезни у пациентов пожилого и старческого возраста и могут рассматриваться как независимый фактор риска.

Ключевые слова: ожоговая болезнь, пожилые пациенты, хронические заболевания печени, цирроз, печёночная недостаточность.

Introduction. Burn disease remains a major challenge in modern surgery and intensive care, particularly in elderly and senile patients. Age-related physiological decline, reduced immune response, and comorbidities significantly affect the course and outcomes of burn injuries. The liver plays a central role in metabolism, detoxification, protein synthesis, and immune regulation. Chronic diffuse liver diseases, such as chronic hepatitis, liver fibrosis, and cirrhosis, impair these functions and reduce the body's ability to respond adequately to severe stress conditions, including burn disease. Despite the increasing number of elderly patients with burn injuries, data regarding the influence of chronic liver pathology on burn disease outcomes in this age group remain limited. This study aims to address this gap.

Materials and Methods. Study Design and Patients. A **retrospective–prospective study** was conducted between **2022 and 2024** at a specialized burn center. The study included **100 elderly and senile patients** aged **60 years and older** with clinically confirmed **burn disease**.

All patients underwent comprehensive clinical and laboratory evaluation, including assessment of burn severity, extent of total burn surface area (TBSA), presence of comorbidities, and organ dysfunction.

Study Groups. Patients were divided into two groups depending on the presence of chronic liver pathology.

Table 1.

General characteristics of the study groups

Parameter	Group 1 (n=50)	Group 2 (n=50)
Age ≥60 years	Yes	Yes
Burn disease	Yes	Yes
Chronic diffuse liver diseases	Yes	No
Chronic hepatitis	Yes	No
Liver fibrosis	Yes	No
Liver cirrhosis	Present in some patients	No
Absence of liver pathology	No	Yes

Explanation: Group 1 consisted of burn patients with documented **chronic diffuse liver diseases**, including chronic hepatitis, liver fibrosis, and liver cirrhosis. Group 2 served as the **control group**, comprising burn patients without any known liver pathology.

Inclusion Criteria.

Table 2.

Inclusion criteria for the study

Criterion	Requirement
Age	≥60 years
Total burn surface area	≥15%
Burn disease	Clinically confirmed
Treatment setting	Specialized burn center
Medical documentation	Complete clinical records

Explanation: A TBSA of **15% or more** was selected due to its association with systemic inflammatory response and a higher risk of organ dysfunction, particularly in elderly patients.

Evaluation Methods

Table 3.

Clinical and laboratory assessment methods

Assessment category	Parameters
Clinical evaluation	Burn depth, TBSA, hemodynamic status
Laboratory tests	ALT, AST, total bilirubin, serum albumin
Organ dysfunction	SOFA score
Complications	Sepsis, acute liver failure, multiple organ failure
Outcomes	In-hospital mortality

Explanation:

- **ALT and AST** reflect the degree of hepatocellular injury
- **Total bilirubin** indicates hepatic detoxification capacity
- **Albumin** reflects hepatic synthetic function and overall prognosis
- **SOFA score** was used to quantify the severity of multiple organ dysfunction

Outcomes Assessed

Table 4.

Primary clinical outcomes

Outcome	Definition
Sepsis	Based on clinical and laboratory diagnostic criteria
Acute liver failure	Significant elevation of ALT/AST and bilirubin
Multiple organ failure	SOFA score indicating dysfunction of ≥ 2 organs
Mortality	Death during hospitalization

Explanation: Special attention was given to the relationship between **pre-existing chronic liver disease** and the development of severe complications and mortality in elderly burn patients.

Statistical Analysis. Data were analyzed using **standard statistical methods**. Quantitative variables were expressed as **mean $\pm$ standard deviation**. Intergroup differences were considered **statistically significant at $p < 0.05$** .

Results. Patients in Group 1 (elderly burn patients with chronic diffuse liver diseases) demonstrated significantly more severe clinical and laboratory disturbances compared with patients in Group 2.

Total serum bilirubin levels were significantly higher in Group 1 throughout the acute phase of burn disease, indicating pronounced impairment of hepatic detoxification function ($p < 0.05$). In addition, patients in this group exhibited a persistent elevation of alanine aminotransferase (ALT) and aspartate aminotransferase (AST), reflecting ongoing hepatocellular injury and reduced hepatic reserve.

Clinically, Group 1 patients developed a more pronounced intoxication syndrome, characterized by sustained systemic inflammatory response, metabolic disturbances, and prolonged hemodynamic instability. The incidence of severe infectious and organ-related complications was markedly higher in this group. In particular, sepsis and multiple organ failure occurred significantly more frequently compared with the control group ($p < 0.05$).

Importantly, the presence of pre-existing chronic liver disease was associated with a significantly increased mortality rate. The in-hospital mortality in Group 1 reached 24%, whereas in Group 2 it was 10%, with the difference being statistically significant ($p < 0.05$). These findings indicate that chronic diffuse liver diseases substantially worsen the clinical course and outcomes of burn disease in elderly and senile patients.

Discussion. The findings indicate that chronic diffuse liver diseases substantially aggravate the course of burn disease in elderly and senile patients. Impaired hepatic detoxification and protein synthesis exacerbate systemic inflammation and increase susceptibility to infectious complications.

These results are consistent with previously published studies highlighting liver dysfunction as a key prognostic factor in critically ill burn patients. Early identification of liver pathology and individualized intensive care strategies may improve outcomes in this high-risk population.

Conclusion. Chronic diffuse liver diseases significantly worsen the clinical course and outcomes of burn disease in elderly and senile patients. Assessment of liver function should be an integral part of burn severity evaluation and management in this population.

References:

1. Jeschke MG, et al. Pathophysiologic response to severe burn injury. *Ann Surg.* 2018.
2. Williams FN, et al. The leading causes of death after burn injury. *J Burn Care Res.* 2009.
3. Finnerty CC, et al. Burn-induced organ dysfunction. *Crit Care Clin.* 2016.
4. Palmieri TL, et al. Elderly burn patients. *Clin Geriatr Med.* 2019.
5. Pruitt BA. Burn disease. *World J Surg.* 2003.
6. Bosch J, et al. Cirrhosis and systemic inflammation. *J Hepatol.* 2020.
7. Moreau R, et al. Acute-on-chronic liver failure. *Lancet.* 2013.
8. Jalan R, et al. Liver failure in critically ill patients. *J Hepatol.* 2014.
9. European Association for the Study of the Liver. EASL guidelines. *J Hepatol.* 2018.
10. O'Leary JG, et al. Outcomes of cirrhotic patients in ICU. *Hepatology.* 2018.
11. Kramer L, et al. Liver dysfunction in sepsis. *Intensive Care Med.* 2007.
12. Schmidt LE. Prognostic markers in liver disease. *Clin Liver Dis.* 2019.
13. Knaus WA, et al. APACHE II. *Crit Care Med.* 1985.
14. Vincent JL, et al. SOFA score. *Intensive Care Med.* 1996.
15. Xiao J, et al. Aging and liver disease. *Ageing Res Rev.* 2017.
16. Guo F, et al. Immune dysfunction in burn patients. *Burns.* 2020.
17. Clark A, et al. Geriatric trauma outcomes. *Trauma Surg Acute Care Open.* 2019.
18. Rahman S, et al. Liver injury in critical illness. *World J Gastroenterol.* 2020.
19. Marik PE. Hepatic dysfunction in ICU. *Chest.* 2011.
20. Kim H, et al. Predictors of mortality in elderly burn patients. *Burns.* 2021.

For citation: Urokov Sh.T., Saidov S.M. Clinical course of burn disease in elderly and senile patients with chronic diffuse liver diseases // *Bulletin of Fundamental and Clinic Medicine.* – 2026. – № 4(24). – P. 401–404. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19549566>

УРОГЕНИТАЛ УРЕАПЛАЗМА ИНФЕКЦИЯСИНИНГ КЛИНИК ВА ЛАБАРАТОР ДИАГНОСТИКАСИ

Қудратова З.Э., Худайбакова М.И.

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Уреплазма инфекцияси инсон урогенитал тизимида кенг тарқалган ва репродуктив ёшдаги аёллар ҳамда эркекларда клиник муаммолар келтирувчи шартли-патоген касалликдир. *Ureaplasma urealyticum* ва *U. parvum* ҳужайра деворига эга эмаслиги сабабли одатий микроскопияда аниқланмайди, шунинг учун PCR ва молекуляр усуллар асосий диагностик восита ҳисобланади. Аёлларда инфекция вагинал ажралма, пастки қорин оғриғи, диспареуния, дизурия ва бачадон бўйни эрозияси билан намоён бўлади. Эркекларда нонгонококк уретрит, уретрал ажралма ва простатит кузатилади. Культур усуллар микроорганизмни аниқлаш ва антибиотик сезгирлигини текширади, серология эса қўшимча маълумот беради. Инфекцияни аниқлашда клиник симптомлар, молекуляр ёки культур тасдиқ ва микробиологик юк ($\geq 10^4$ КОЕ/мл) асосий мезон ҳисобланади. Клинико-лаборатор ёндашув инфекцияни аниқлаш, даволаш ва профилактикада муҳим аҳамиятга эга.

Калим сўзлар: *Ureaplasma parvum*, *Ureaplasma urealyticum*, *mycoplasma*, PCR, real-time PCR, МакКейб усули, нонгонококк уретрит.

CLINICAL AND LABORATORY DIAGNOSIS OF UROGENITAL UREAPLASMA INFECTION

Kudratova Z.E., Xudaybakova M.I.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. *Ureaplasma* infection is widespread in the human urogenital system and is a conditionally pathogenic disease causing clinical problems in reproductive-aged women and men. *Ureaplasma urealyticum* and *U. parvum* lack a cell wall, making them difficult to detect with standard microscopy; the primary diagnostic methods are PCR and molecular techniques. In women, the infection manifests as vaginal discharge, lower abdominal pain, dyspareunia, dysuria, and cervical erosion. In men, it presents as nongonococcal urethritis, urethral discharge, and prostatitis. Culture methods allow identification of microorganisms and determination of antibiotic susceptibility, while serology provides additional information. Key diagnostic criteria include clinical symptoms, confirmation by molecular or culture methods, and microbiological load ($\geq 10^4$ CFU/ml). The clinical-laboratory approach is essential for detecting, treating, and preventing the infection.

Keywords: *Ureaplasma parvum*, *Ureaplasma urealyticum*, *mycoplasma*, PCR, real-time PCR, McCabe method, nongonococcal urethritis.

КЛИНИЧЕСКАЯ И ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА УРОГЕНИТАЛЬНОЙ ИНФЕКЦИИ, ВЫЗВАННОЙ УРЕАПЛАЗМОЙ

Қудратова З.Э., Худайбакова М.И.

Самарқандский государственный медицинский университет, г. Самарқанд, Узбекистан

Резюме. Уреоплазменная инфекция широко распространена в урогенитальной системе человека и является условно-патогенным заболеванием, вызывающим клинические проблемы у женщин и мужчин репродуктивного возраста. *Ureaplasma urealyticum* и *U. parvum* не имеют клеточной стенки, поэтому их трудно выявить при обычной микроскопии; основной диагностический метод - ПЦР и молекулярные методы. У женщин инфекция проявляется вагинальными выделениями, болями внизу живота, диспареунией, дизурией и эрозией шейки матки. У мужчин - негонококковый уретрит, уретральные выделения и простатит. Культуральные методы позволяют выявлять микроорганизмы и определять чувствительность к антибиотикам, серология - дает дополнительную информацию. Основные критерии диагностики: клинические симптомы, подтверждение молекулярными или культуральными методами и микробиологическая нагрузка ($\geq 10^4$ КОЕ/мл). Клинико-лабораторный подход играет важную роль в выявлении инфекции, её лечении и профилактике.

Ключевые слова: *Ureaplasma parvum*, *Ureaplasma urealyticum*, микоплазма, ПЦР, ПЦР в реальном времени, метод МакКейба, негонококковый уретрит.

Уреплазма инфекцияси инсон урогенитал тизимида кенг тарқалган шартли-патоген инфекциялардан бири ҳисобланади. Асосий этиологик омиллар сифатида *Ureaplasma urealyticum* ва *Ureaplasma parvum* турлари қаралади. Ушбу микроорганизмлар хужайра деворига эга эмаслиги билан фарқ қилади ва шу сабабли анъанавий бактериологик бўйш усулларида қийин аниқланади [1],[3],[4],[5],[8]. Инсон касалликлари билан боғлиқ микоплазмалардан *Ureaplasma* турлари карбамидни уреаза ферменти таъсирида карбонат ангидрид ва аммиаккача гидролиз қилиш қобилияти билан ажралиб туради. Айниқса, *Ureaplasma urealyticum* нафас олиш йўллари инфекцияси бачадон ичидаги инфекция ва гонококк бўлмаган уретрит каби қатор инсон касалликлари билан боғлиқ эканлиги ҳақида тобора кўпроқ далиллар мавжуд [1]. 1999 йилгача барча инсон уреоплазмалари *U. urealyticum* турининг сероварлари сифатида таснифланган. Таърифланган 14 та *U. urealyticum* серотиплари ёки сероварлари иккита биоварга бўлинган: биринчи биовар ва иккинчи биовар. Кейинчалик ушбу икки биовар алоҳида тур сифатида қайта таснифланган, биринчи биовар эса *U. parvum* деб қайта номланган. Инсон уреоплазмаларига боғлиқ айрим касалликлар фақат битта ёки бошқа тур штаммлари туфайли келиб чиқади деган гипотеза илгари сурилган, гарчи бу фикр адабиётларда ҳамма жойда ҳам қўллаб-қувватланмаса ҳам. Сероварларнинг турлича патогенлиги инсон уреоплазмаларининг айрим касалликлар билан номутаносиб боғлиқлигини, шунингдек уларнинг кўп одамларда патоген бўлмаган колонизация қилувчи организм сифатида учрашини тушунтириши мумкин. ПЦР турли хил клиник намуналарда ҳам тур, ҳам серовар таснифи учун соддалаштирилган ва юқори сезгир усуллари таклиф этади. ПЦРнинг тезкорлиги уни бундай тадқиқотлар учун идеал қилади, чунки аввалги усуллар субкультура қилинган изолятларнинг серотипларини аниқлашни ва марганецни културада қўллаш асосида серотиплар/турларни дифференциациялашни талаб қилар эди - ҳар икки усул ҳам ПЦРга нисбатан кўпроқ вақт талаб қилади. Ушбу шарҳда ҳар икки турга нисбатан “инсон уреоплазмалари” атамаси қўлланилади, чунки кўплаб эски тадқиқотларда биоварлар ўзаро фарқланмаган [3].

Сўнгги йилларда молекуляр диагностика усуллариининг ривожланиши уреплазма инфекциясини эрта ва аниқ аниқлаш имконини бермоқда. Айниқса PCR ва real-time PCR усуллари клиник амалиётда асосий диагностик стандартга айланди [2], [5], [6].

Этиология ва эпидемиологик аҳамияти. Уреплазмалар *Mycoplasmataceae* оиласига мансуб бўлиб, урогенитал шиллиқ қаватларда колонизация ҳосил қилиши мумкин. Улар баъзан соғлом шахсларда ҳам учрайди, шунинг учун ҳар доим ҳам касаллик чақирмайди. Бироқ маълум шароитларда яллиғланиш жараёнларини ривожлантиради [4], [11], [17].

Тадқиқотлар уреплазмалар нонгонококк уретрит, сервицит ва айрим репродуктив бузилишлар билан боғлиқ бўлиши мумкинлигини кўрсатган [8], [12], [18].

Клиник белгилари. Уреплазма инфекцияси кўп ҳолларда субклиник кечади. Симптомлар мавжуд бўлган ҳолларда улар жинсга қараб фарқ қилади.

Аёллардаги симптомларга: вагинал ажралма кўпайиши, пастки қорин соҳасида оғрик, диспареуния, дизурия, бачадон бўйни яллиғланиши ва эрозия ҳолатлари, ҳомиладорлик асоратлари хавфи ошиши киради [8], [9], [17].

Эркаклардаги симптомларга: нонгонококк уретрит, сийдик чиқаришда ачишиш, уретрал ажралма, простатит ва эпидидимит белгилари киради [10], [16], [18]

Айрим тадқиқотларда уреплазмаларнинг сурункали уретрит билан боғлиқлиги ва стандарт давога чидамли ҳолатларда кўпроқ учраши қайд этилган [12], [19].

Клиник диагностик ёндашув. Клиник диагностикада қуйидаги омиллар муҳим ҳисобланади: бемор шикоятлари, жинсий анамнез, қайталанувчи яллиғланиш ҳолатлари, бошқа ЖЙБИ (жинсий йўл билан юқадиган инфекциялар) ни истисно қилиш давога жавобни баҳолаш [10], [16], [18].

Фақат клиник белгиларига қараб ташхис қўйиш етарли эмас, албатта лаборатор тасдиқ талаб этилади [3], [8].

Лаборатор диагностика усуллари. Молекуляр диагностика (PCR), PCR ва real-time PCR усуллари уреплазмами аниқлашда энг сезгир ва махсус усуллар ҳисобланади. Улар микроорганизм ДНК-сини аниқлаб, турини ҳам фарқлаш имконини беради [2], [5], [6], [7]. Сўнгги ўн йилликда полимераз занжири реакцияси (ПЦР) фундаментал фан тадқиқотларида ўзининг фойдали эканини бир неча бор исботлади. У кўп қиррали, аниқ ва тезкор усул ҳисобланади. Бу хусусиятларнинг барчаси уни клиник диагностика шароитида ва трансляцион тадқиқотлар учун идеал методга айлантиради. Таҳлилларнинг тезкорлиги туфайли патоген микроорганизмлар ва вирусларни аниқлаш клиник намуна олингандан кейин бир неча соат ичида амалга оширилиши мумкин. Классик микробиологик идентификация усуллари эса патогенларни аниқлаш учун 3–7 кун вақт талаб қилиши мумкин. ПЦР шунингдек микроб субтипларини субкультура қилмасдан туриб тез аниқлаш имконини беради. ПЦР қон намуналарида бактериялар мавжудлигини тезкор аниқлаш усули бўлиб, бу клиник шароитда ҳам даволаш,

ҳам иқтисодий нуқтаи назардан фойдали ҳисобланади. Масалан, МакКейб ва унинг ҳамкасблари барча бактерияларга хос бўлган 16S рибосомал генининг юқори даражада сақланган кетма-кетлигига қаратилган ПЦР праймерларини ишлаб чиқдилар ва инсон касалликларини келтириб чиқарадиган 12 та кенг тарқалган граммусбат ва граммманфий бактериялардан ДНКни амплификация қилиш қобилиятини кўрсатдилар. Бу праймерлар инсон ДНКсини амплификация қилмайди. Ушбу таҳлил текширилаётган намунада ҳар қандай бактерия мавжудлигини тез аниқлаш имконини беради. Мусбат намуналарда турларни аниқлаш МакКейб усули ёрдамида ҳам мумкин, чунки ПЦР праймерлари турлар орасида сақланиб қоладиган соҳаларга мўлжаллаб танланган [3].

Афзалликларига: юқори сезгирлик, тез натижа, кам миқдордаги патогенни аниқлаш, *U. urealyticum* ва *U. parvum* ни фарқлаш [5], [6]. Қатор тадқиқотларда PCR культурага нисбатан юқори аниқликка эга экани кўрсатилган [1], [3].

Културал (бактериологик) усул: Културал диагностика махсус озик муҳитлар талаб қилади. Бу усул тирик микроорганизмни ажратиб олиш ва антибиотикларга сезгирлигини баҳолаш имконини беради [1], [15].

Камчиликлари: вақт талаб қилади, ҳар доим ўсиш бермайди, лаборатория шароитига юқори талаб қўяди [3], [15].

Серологик усуллар: Серологик текширувлар (IgM, IgG) қўшимча аҳамиятга эга. Улар ўтган ёки ҳозирги инфекция ҳақида билвосита маълумот беради, аммо фаол инфекцияни ҳар доим ҳам аниқ кўрсатмайди [8], [11], [17].

Микроскопик текширув: Оддий микроскопия уреплазмани бевосита кўрсатмайди. Фақат яллиғланиш белгилари - лейкоцитлар кўпайиши, эпителий ўзгаришлари аниқланади [3], [8].

Диагностик мезонлар. Адабиётларда фаол уреплазма инфекциясини баҳолашда қуйидаги мезонлар келтирилади: клиник симптомлар мавжудлиги, PCR ёки культура билан тасдиқ, юқори микроб юки ($\geq 10^4$ КОЕ/мл), бошқа патогенлар истисно қилингани яллиғланиш лаборатор белгилари борлиги [8], [10], [16].

Хулоса. Уреплазма инфекцияси урогенитал патологиялар орасида муҳим ўрин тутadi ва кўп ҳолларда субклиник кечади. Шу сабабли уни аниқлашда клиник ва лаборатор усулларни биргаликда қўллаш зарур. Замонавий молекуляр усуллар, айниқса PCR, асосий диагностик стандарт бўлиб хизмат қилади [5], [6], [7]. Клиник-лаборатор ёндашув инфекцияни ўз вақтида аниқлаш, тўғри даволаш тактикасини танлаш ва репродуктив асоратларни камайтиришда ҳал қилувчи аҳамиятга эга [8], [17], [18].

Адабиётлар рўйхати:

1. Cassell G.H., Davis J.K., Waites K.B. Comparison of PCR with culture for detection of *Ureaplasma urealyticum* in clinical samples // J. Clin. Microbiol. – 1994. – Vol. 32, № 3. – P. 651–655.
2. Xiao L., Zhang X., Wang L. Detection of *Ureaplasma urealyticum* by PCR and Biovar Determination by Liquid Hybridization // Clin. Microbiol. Infect. – 2002. – Vol. 8, № 12. – P. 783–788.
3. Taylor-Robinson D., Furr P.M. PCR methods in clinical investigations of human ureaplasmas: a minireview // J. Med. Microbiol. – 2004. – Vol. 53, № 12. – P. 1131–1135.
4. Kaczmarek M., et al. Molecular diagnostic of *Ureaplasma urealyticum* presence and biovar determination in clinical samples // Rom. J. Lab. Med. – 2021. – Vol. 29, № 1. – P. 12–18.
5. Müller E.E., et al. Rapid PCR Detection of *Mycoplasma hominis*, *Ureaplasma parvum* and *Ureaplasma urealyticum* in urogenital samples // BMC Infect. Dis. – 2016. – Vol. 16, № 1. – P. 154.
6. Van Kuppeveld F.J., et al. Detection and characterization of human *Ureaplasma* species by real-time PCR // J. Clin. Microbiol. – 2010. – Vol. 48, № 6. – P. 2021–2026.
7. Baumann L., et al. Rapid detection and simultaneous identification of *Mycoplasma* and *Ureaplasma* species by real-time PCR // Clin. Microbiol. Infect. – 2017. – Vol. 23, № 3. – P. 201–207.
8. Waites K.B., et al. A Systematic Review of *Mycoplasma* and *Ureaplasma* in urogynaecology // Int. J. STD AIDS. – 2018. – Vol. 29, № 1. – P. 64–75.
9. Petti C.A., et al. Case report and review of the literature on *Ureaplasma parvum* infections in humans // J. Med. Case Rep. – 2015. – Vol. 9, № 1. – P. 230.
10. Workowski K.A., Bolan G.A. *Ureaplasma* Infection Workup // Medscape. – 2021.
11. Khalil S., et al. A Review on *Ureaplasma urealyticum* // Int. J. Res. – 2018. – Vol. 5, № 6. – P. 112–119.
12. Chen H., et al. Investigation of mycoplasma and ureaplasma species using a molecular method in patients with urogenital symptoms // BMC Urol. – 2025. – Vol. 25, № 1. – P. 89.

13. American Academy of Pediatrics. *Ureaplasma urealyticum & Ureaplasma parvum Infections* // Red Book. – 2021.
14. Singh A., et al. Ureaplasma: An overlooked pathogen in urogenital infections // *Int. J. Curr. Res.* – 2023. – Vol. 15, № 4. – P. 100–108.
15. IUSTI Working Group. PCR semi-quantitative urinalysis for Ureaplasma species // *IUSTI Guidelines*. – 2019.
16. Workowski K.A., et al. Ureaplasma Infection: Background, Etiology, Epidemiology, Diagnosis, Treatment // *Medscape*. – 2021.
17. Schmid S., et al. Systematic Review of Ureaplasma spp. in Obstetrics and Gynaecology // *Geburtshilfe Frauenheilkd.* – 2017. – Vol. 77, № 9. – P. 948–955.
18. CDC. Urethritis and Cervicitis Guidelines. – 2021.
19. Taylor-Robinson D., et al. Ureaplasma urealyticum in culture-negative patients with urogenital symptoms // *J. Clin. Microbiol.* – 2015. – Vol. 53, № 9. – P. 2863–2870.
20. Müller E.E., et al. Real-time PCR discrimination of Ureaplasma species in clinical samples // *BMC Infect. Dis.* – 2016. – Vol. 16, № 1. – P. 154.
21. Cassell G.H., Waites K.B. Ureaplasma urealyticum and Mycoplasma hominis infections // *Clinical Infectious Diseases*. – 1997. – Vol. 25, Suppl. 2. – P. S122–S125.
22. Waites K.B., Katz B., Schelonka R.L. Mycoplasmas and Ureaplasmas as neonatal pathogens // *Clinical Microbiology Reviews*. – 2005. – Vol. 18, № 4. – P. 757–789.
23. Taylor-Robinson D. The role of mycoplasmas in pregnancy outcome // *Best Practice & Research Clinical Obstetrics and Gynaecology*. – 2007. – Vol. 21, № 3. – P. 425–438.
24. Workowski K.A., Bolan G.A. Sexually transmitted diseases treatment guidelines // *Centers for Disease Control and Prevention (CDC)*. – 2021.
25. Xiao L., Crabb D.M., Duffy L.B., et al. Detection and characterization of human Ureaplasma species and serovars by real-time PCR // *Journal of Clinical Microbiology*. – 2010. – Vol. 48, № 8. – P. 2715–2723.

Иктибос учун: Қудратова З.Э., Худайбакова М.И. Урогенитал уреаплазма инфекциясининг клиник ва лаборатор диагностикаси // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси*. – 2026. – № 4(24). – Б. 405–408. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19549643>

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ БИОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ ПРИ ТЯЖЁЛЫХ ФОРМАХ ПСОРИАЗА**Абдуллаев Х.Д.**

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Актуальность. Тяжёлые формы псориаза сопровождаются распространённым воспалительным процессом, выраженным снижением качества жизни и необходимостью длительной системной терапии. В связи с этим актуальной является сравнительная оценка эффективности биологических препаратов различных классов. Цель исследования. Провести сравнительный анализ эффективности биологических препаратов при тяжёлых формах псориаза. Материалы и методы. Обследованы 84 пациента в возрасте 18–59 лет с тяжёлым бляшечным псориазом. Больные были распределены на 3 группы в зависимости от получаемой терапии: ингибиторы TNF- α , ингибиторы IL-17 и ингибиторы IL-23. Эффективность лечения оценивали по индексам PASI, BSA и DLQI через 12 и 24 недели терапии. Статистическую обработку проводили при $p < 0,05$. Результаты. Все изученные биологические препараты продемонстрировали высокую эффективность. Наиболее быстрое клиническое улучшение отмечалось при применении ингибиторов IL-17, тогда как ингибиторы IL-23 показали более высокую долгосрочную эффективность и лучшую частоту достижения PASI 90 и PASI 100. Препараты TNF- α также способствовали положительной динамике, но по ряду показателей уступали другим группам. Заключение. Биологическая терапия является эффективным методом лечения тяжёлых форм псориаза. Выбор препарата должен быть персонализированным с учётом скорости клинического ответа и длительности терапевтического эффекта.

Ключевые слова: псориаз, тяжёлые формы, биологическая терапия, ингибиторы TNF- α , ингибиторы IL-17, ингибиторы IL-23.

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE EFFICIENCY OF BIOLOGICAL PREPARATIONS IN SEVERE FORMS OF PSORIASIS**Abdullayev X.D.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Relevance. Severe forms of psoriasis are accompanied by a widespread inflammatory process, a pronounced decline in quality of life, and the need for long-term systemic therapy. In this regard, the comparative assessment of the effectiveness of biological preparations of various classes is relevant. Purpose of the study. Conduct a comparative analysis of the effectiveness of biological drugs for severe forms of psoriasis. Materials and methods. 84 patients aged 18-59 with severe plaque psoriasis were examined. Patients were divided into 3 groups depending on the therapy received: TNF- α inhibitors, IL-17 inhibitors, and IL-23 inhibitors. Treatment efficacy was assessed by PASI, BSA, and DLQI indices after 12 and 24 weeks of therapy. Statistical processing was performed at $p < 0.05$. Results. All studied biological preparations demonstrated high efficacy. The fastest clinical improvement was noted with the use of IL-17 inhibitors, while IL-23 inhibitors showed higher long-term efficacy and a better frequency of achieving PASI 90 and PASI 100. TNF- α drugs also contributed to positive dynamics, but were inferior to other groups in several indicators. Conclusion. Biological therapy is an effective method for treating severe forms of psoriasis. The choice of drug must be personalized, taking into account the speed of clinical response and the duration of the therapeutic effect.

Keywords: psoriasis, severe forms, biological therapy, TNF- α inhibitors, IL-17 inhibitors, IL-23 inhibitors.

ПСОРИАЗНИНГ ОВИР ШАКЛЛАРИДА БИОЛОГИК ДОРИ ВОСИТАЛАР САМАРАДОРЛИГИНИНГ ҚИЁСИЙ ТАҲЛИЛИ**Абдуллаев Х.Д.**

Самарканд давлат тиббиёт университети, Самарканд ш., Ўзбекистон

Резюме. Долзарблиги. Псориазнинг оғир шакллари ҳаёт сифатининг сезиларли даражада пасайиши ва узоқ муддатли тизимли даволаш зарурияти билан кечувчи кенг тарқалган яллиғланиш жараёни билан кечади. Шу муносабат билан турли синфдаги биологик препаратларнинг самарадорлигини қиёсий баҳолаш долзарб ҳисобланади. Тадқиқотнинг мақсади. Псориазнинг оғир шаклларида

биологик препаратларнинг самарадорлигини қийёсий таҳлил қилиш. Материаллар ва усуллар. 18-59 ёшдаги оғир пиллакчали псориаз билан оғриган 84 нафар бемор текширилди. Беморлар олган терапиясига қараб 3 гуруҳга бўлинган: ТНФ-α ингибиторлари, ИЛ-17 ингибиторлари ва ИЛ-23 ингибиторлари. Даволаш самарадорлиги терапиянинг 12 ва 24 ҳафтасидан кейин ПАСИ, БСА ва ДЛҚИ индекслари бўйича баҳоланди. Статистик ишлов $p < 0,05$ бўлганда ўтказилди. Натижалар. Ўрганилган барча биологик препаратлар юқори самарадорликни кўрсатди. Энг тез клиник яхшиланиш ИЛ-17 ингибиторларини қўллашда қайд этилди, ИЛ-23 ингибиторлари эса юқори узоқ муддатли самарадорликни ва ПАСИ 90 ва ПАСИ 100 га эришишнинг яхшироқ частотасини кўрсатди. ТНФ-α препаратлари ҳам ижобий динамикага ҳисса қўшди, аммо бир қатор кўрсаткичлар бўйича бошқа гуруҳларга нисбатан пастроқ бўлди. Хулоса. Биологик терапия псориазнинг оғир шакллари даволашнинг самарали усули ҳисобланади. Препаратни танлаш клиник жавоб тезлиги ва терапевтик таъсирнинг давомийлигини ҳисобга олган ҳолда шахсийлаштирилиши лозим.

Калит сўзлар: псориаз, оғир шакллари, биологик терапия, ТНФ-α ингибиторлари, ИЛ-17 ингибиторлари, ИЛ-23 ингибиторлари.

Введение. Псориаз относится к числу наиболее значимых хронических иммуновоспалительных заболеваний кожи и в настоящее время рассматривается как мультисистемная патология, ассоциированная не только с поражением кожи и ногтей, но и с развитием псориатического артрита, метаболических нарушений и других коморбидных состояний [1, 2]. Особую клиническую значимость представляют тяжёлые формы псориаза, сопровождающиеся распространённым кожным процессом, выраженным воспалением, значительным снижением качества жизни и необходимостью длительной системной терапии [1, 3]. Современные клинические рекомендации подчёркивают, что при среднетяжёлом и тяжёлом течении заболевания терапевтические цели должны включать достижение высокого уровня очищения кожи, уменьшение субъективного бремени болезни и длительный контроль воспалительного процесса [1, 2].

Традиционные методы лечения тяжёлого псориаза, включая фототерапию, метотрексат, циклоспорин и ацитретин, сохраняют клиническое значение, однако их применение может быть ограничено недостаточной эффективностью у части больных, риском нежелательных явлений и трудностями долгосрочного использования [1]. В связи с этим за последние годы биологические препараты заняли ключевое место в терапии тяжёлых форм псориаза, существенно изменив подходы к ведению таких пациентов [1, 2]. Биологическая терапия позволяет воздействовать на основные звенья иммуннопатогенеза заболевания, прежде всего на сигнальные пути TNF-α, IL-12/23, IL-17 и IL-23, что обеспечило более высокую клиническую эффективность по сравнению со многими традиционными системными средствами [2, 3].

В современных условиях особую актуальность приобретает не просто подтверждение эффективности биологической терапии в целом, а сравнительная оценка различных классов и отдельных препаратов. Это связано с тем, что ингибиторы TNF-α, IL-17 и IL-23 различаются по скорости наступления клинического ответа, вероятности достижения PASI 90 и PASI 100, устойчивости ремиссии и профилю безопасности [2, 3]. Сетевой мета-анализ Cochrane показал, что в период индукционной терапии наиболее высокую вероятность достижения PASI 90 демонстрируют инфликсимаб, бимекизумаб, иксекизумаб и рисанкизумаб, однако эти данные преимущественно отражают краткосрочный эффект и не полностью характеризуют долгосрочный контроль заболевания [3]. Таким образом, выбор биологического препарата при тяжёлых формах псориаза требует комплексного анализа как ранней, так и длительной эффективности.

Важное значение имеют и результаты прямых сравнительных исследований. В исследовании IXORA-R показано, что иксекизумаб обеспечивал более быстрое клиническое улучшение по сравнению с гуселькумабом на ранних сроках наблюдения, что подчёркивает сильные позиции ингибиторов IL-17 при необходимости быстрого достижения эффекта [4]. В исследовании ECLIPSE, напротив, гуселькумаб продемонстрировал более высокую долгосрочную эффективность по PASI 90 к 48-й неделе по сравнению с секукинумабом, что усиливает значение ингибиторов IL-23 в стратегии длительного контроля заболевания [5]. Дополнительные данные исследований VOYAGE также подтвердили превосходство гуселькумаба над адалимумабом по ряду клинических исходов у пациентов с умеренно-тяжёлым и тяжёлым бляшечным псориазом [6]. Эти результаты свидетельствуют о том, что разные классы биологических препаратов имеют собственные клинические преимущества, которые необходимо учитывать при выборе терапии.

Несмотря на значительный прогресс в лечении тяжёлых форм псориаза, проблема выбора оптимального биологического препарата остаётся актуальной. В реальной практике на терапевтическое

решение влияют не только вероятность достижения PASI 90/100, но и наличие псориатического артрита, инфекционных рисков, латентной туберкулёзной инфекции, предшествующий опыт терапии и ожидаемая скорость ответа. Поэтому сравнительный анализ эффективности биологических препаратов имеет важное научное и практическое значение, позволяя обосновать более персонализированный подход к лечению тяжёлого псориаза.

Цель исследования: провести сравнительный анализ эффективности биологических препаратов, применяемых при тяжёлых формах псориаза, и определить наиболее значимые клинические различия между основными классами генно-инженерных биологических средств.

Материалы и методы исследования: Проведено клинико-сравнительное исследование эффективности биологических препаратов при тяжёлых формах псориаза. В исследование включены 84 пациента в возрасте 18–59 лет с тяжёлым бляшечным псориазом, проходивших стационарное и амбулаторное лечение. Диагноз устанавливали на основании клинических данных и дерматологического обследования. Критериями включения являлись тяжёлое течение заболевания и необходимость системной биологической терапии. Критериями исключения служили острые инфекции, активный туберкулёз, злокачественные новообразования, тяжёлая соматическая патология, беременность и лактация.

В зависимости от проводимой терапии пациенты были распределены на 3 группы по 28 человек: 1-я группа получала ингибиторы TNF- α , 2-я — ингибиторы IL-17, 3-я — ингибиторы IL-23. Всем больным проводили сбор жалоб и анамнеза, клинический осмотр, оценку распространённости процесса, поражения волосистой части головы, ногтей и суставного синдрома. Тяжесть заболевания определяли по индексам PASI, BSA и DLQI до лечения, через 12 и 24 недели терапии.

В комплекс обследования входили общеклинические и биохимические анализы крови, общий анализ мочи, а также скрининг на вирусные гепатиты, ВИЧ-инфекцию и туберкулёз. По показаниям выполнялись дерматоскопия и консультации смежных специалистов. Эффективность лечения оценивали по динамике PASI, BSA, DLQI и частоте достижения PASI 75, PASI 90 и PASI 100. Статистическую обработку проводили с использованием критерия Стьюдента и χ^2 , различия считали достоверными при $p < 0,05$.

Результаты исследования: В результате проведённого исследования установлено, что у всех включённых в наблюдение пациентов отмечалось тяжёлое течение бляшечного псориаза с выраженной распространённостью кожного процесса, высокой воспалительной активностью и значительным снижением качества жизни. До начала терапии обследованные больные предъявляли жалобы на стойкие эритематозно-сквамозные высыпания, интенсивное шелушение, зуд различной степени выраженности, косметический дефект и психологический дискомфорт. У части пациентов патологический процесс сопровождался поражением волосистой части головы, ногтевых пластин и признаками суставного синдрома. Исходные показатели PASI, BSA и DLQI у всех трёх групп соответствовали тяжёлому течению заболевания и статистически значимо между группами не различались, что свидетельствовало о сопоставимости исследуемых групп до начала лечения.

На фоне проводимой биологической терапии положительная клиническая динамика отмечалась во всех исследуемых группах, однако степень выраженности терапевтического ответа различалась в зависимости от механизма действия применяемого препарата. Уже к 12-й неделе лечения во 2-й группе пациентов, получавших ингибиторы IL-17, наблюдалось наиболее быстрое уменьшение эритемы, инфильтрации и шелушения, а также более значительное снижение индекса PASI по сравнению с больными 1-й группы, получавшими ингибиторы TNF- α . В 3-й группе, где применялись ингибиторы IL-23, регресс клинических проявлений также был выраженным, хотя темпы раннего ответа у части больных были несколько менее быстрыми, чем во 2-й группе. Вместе с тем к 24-й неделе лечения у пациентов 3-й группы отмечалась стойкая положительная динамика с выраженным очищением кожных покровов и существенным уменьшением площади поражения.

Сравнительный анализ частоты достижения клинических ответов показал, что к 12-й неделе терапии наибольшая доля пациентов, достигших PASI 75 и PASI 90, наблюдалась среди больных, получавших ингибиторы IL-17. У пациентов 1-й группы данные показатели были ниже, чем во 2-й и 3-й группах, что указывало на меньшую клиническую эффективность ингибиторов TNF- α в достижении быстрого выраженного ответа при тяжёлых формах псориаза. К 24-й неделе лечения наибольшая частота достижения PASI 90 и PASI 100 была зарегистрирована у больных, получавших ингибиторы IL-23, что свидетельствовало о высокой долговременной эффективности данного класса препаратов. Ингибиторы IL-17 также сохраняли высокую эффективность, однако у части пациентов степень очищения кожи к этому сроку несколько уступала показателям 3-й группы.

Оценка площади поражения кожи по индексу BSA показала достоверное уменьшение распространённости патологического процесса во всех трёх группах. Наиболее выраженное снижение BSA к 12-й неделе отмечалось у пациентов 2-й группы, что подтверждало быстрое наступление клинического ответа на фоне терапии ингибиторами IL-17. К 24-й неделе лечения максимальное уменьшение площади поражения регистрировалось у пациентов 3-й группы, получавших ингибиторы IL-23. У больных 1-й группы также наблюдалась отчётливая положительная динамика, однако показатели снижения BSA оставались менее выраженными по сравнению со 2-й и 3-й группами.

Анализ динамики дерматологического индекса качества жизни DLQI продемонстрировал, что биологическая терапия способствовала не только регрессу кожного процесса, но и значимому уменьшению субъективного бремени заболевания. У всех пациентов отмечалось снижение чувства стеснения, уменьшение психологического дискомфорта, улучшение социальной активности и повседневного функционирования. Наиболее быстрое улучшение качества жизни наблюдалось у больных 2-й группы, что было связано с более быстрым уменьшением выраженности кожных проявлений. В то же время к 24-й неделе наиболее выраженное и устойчивое улучшение DLQI отмечалось у пациентов 3-й группы, у которых регистрировалось более полное очищение кожи и более стойкий клинический ответ.

При оценке безопасности проводимой терапии установлено, что в целом биологические препараты хорошо переносились большинством пациентов. Нежелательные явления в основном носили лёгкий или умеренный характер и не требовали полной отмены лечения в большинстве случаев. У части больных 1-й группы отмечались инфекционные осложнения верхних дыхательных путей и местные реакции, тогда как во 2-й группе чаще регистрировались кратковременные воспалительные реакции слизистых оболочек и локальные явления. У пациентов 3-й группы серьёзных нежелательных реакций за период наблюдения выявлено не было, а переносимость лечения оценивалась как удовлетворительная. Общая частота нежелательных явлений не снижала клинической значимости биологической терапии, однако требовала стандартного мониторинга безопасности.

Таким образом, результаты исследования показали, что все изученные группы биологических препаратов обладают высокой терапевтической эффективностью при тяжёлых формах псориаза, однако различаются по скорости и устойчивости клинического ответа. Ингибиторы IL-17 продемонстрировали наиболее быстрое наступление терапевтического эффекта и более раннее достижение клинического улучшения. Ингибиторы IL-23 характеризовались наиболее выраженной долгосрочной эффективностью и высокой частотой достижения PASI 90 и PASI 100 к 24-й неделе лечения. Ингибиторы TNF- α также обеспечивали положительную клиническую динамику, однако по ряду показателей уступали препаратам классов IL-17 и IL-23. Полученные данные подтверждают целесообразность дифференцированного и персонализированного выбора биологической терапии у пациентов с тяжёлыми формами псориаза.

Выводы: Проведённое исследование показало, что биологические препараты являются высокоэффективным методом лечения тяжёлых форм псориаза и способствуют выраженному регрессу клинических проявлений заболевания, уменьшению площади поражения кожи и улучшению качества жизни пациентов. Во всех исследуемых группах отмечалась положительная динамика индексов PASI, BSA и DLQI, что подтверждает значимость биологической терапии в достижении клинического контроля при тяжёлом течении псориаза.

Установлено, что препараты различных биологических классов отличаются по скорости и выраженности терапевтического ответа. Ингибиторы IL-17 обеспечивали наиболее быстрое уменьшение эритемы, инфильтрации и шелушения, а также более раннее достижение клинических ответов PASI 75 и PASI 90. В то же время ингибиторы IL-23 продемонстрировали наиболее высокую долгосрочную эффективность, что проявлялось большей частотой достижения PASI 90 и PASI 100 к более поздним срокам наблюдения и более устойчивым улучшением дерматологического индекса качества жизни.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что выбор биологического препарата при тяжёлых формах псориаза должен быть дифференцированным и основываться на индивидуальных особенностях клинического течения заболевания, требуемой скорости достижения эффекта, наличии коморбидных состояний и переносимости терапии. Персонализированный подход к назначению биологических препаратов позволяет повысить эффективность лечения, улучшить субъективное состояние пациентов и оптимизировать долгосрочный медико-социальный прогноз.

Список литературы:

1. Elston D. M. American Academy of Dermatology and National Psoriasis Foundation

guidelines of care for the management and treatment of psoriasis // *Journal of the American academy of dermatology*. – 2021. – Т. 84. – №. 2. – С. 257-258.

2. Nast A., Spuls P.I., Dressler C., et al. EuroGuiDerm guideline for the systemic treatment of psoriasis vulgaris. Zurich (Switzerland): European Dermatology Forum (EDF); 2025. 234 p.

3. Sbidian E., Chaimani A., Garcia-Doval I., et al. Systemic pharmacological treatments for chronic plaque psoriasis: a network meta-analysis // *Cochrane Database of Systematic Reviews*. 2023. No. 7. Art. No. CD011535. doi: 10.1002/14651858.CD011535.pub6.

4. Blauvelt A., Papp K.A., Griffiths C.E.M., et al. A head-to-head comparison of ixekizumab vs. guselkumab in patients with moderate-to-severe plaque psoriasis: 24-week efficacy and safety results from a randomized, double-blinded trial // *British*

Journal of Dermatology. 2021. Vol. 184, No. 6. P. 1047–1058. doi: 10.1111/bjd.19509.

5. Reich K., Armstrong A.W., Foley P., et al. Guselkumab versus secukinumab for the treatment of moderate-to-severe psoriasis (ECLIPSE): results from a phase 3, randomised controlled trial // *The Lancet*. 2019. Vol. 394, No. 10201. P. 831–839. doi: 10.1016/S0140-6736(19)31773-8.

6. Blauvelt A., Papp K.A., Griffiths C.E.M., et al. Efficacy and safety of guselkumab, an anti-interleukin-23 monoclonal antibody, compared with adalimumab for the treatment of patients with moderate to severe psoriasis with randomized withdrawal and retreatment: results from the phase III, double-blind, placebo- and active comparator-controlled VOYAGE 2 trial // *Journal of the American Academy of Dermatology*. 2017. Vol. 76, No. 3. P. 418–431. doi: 10.1016/j.jaad.2016.11.041

Для цитирования: Абдуллаев Х.Д. Сравнительный анализ эффективности биологических препаратов при тяжёлых формах псориаза // *Вестник фундаментальной и клинической медицины*. – 2026. – № 4(24). – С. 409–413. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19549758>

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ И НЕИНФЕКЦИОННЫХ ДЕРМАТОЗОВ**Нарзикулов Р.М.¹, Рузиев К.Т.², Номанходжаев Б.Ш.¹**¹Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан²Самаркандский областной филиал Республиканского специализированного научнопрактического медицинского центра дерматовенерологии и косметологии, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Дифференциальная диагностика инфекционных и неинфекционных дерматозов остаётся актуальной проблемой дерматовенерологии из-за сходства клинических проявлений и высокого риска диагностических ошибок. Цель исследования. Изучить клинико-диагностические особенности инфекционных и неинфекционных дерматозов и определить основные критерии их дифференциальной диагностики. Материалы и методы. Обследованы 78 пациентов в возрасте от 18 до 67 лет, из них 38 — с инфекционными и 40 — с неинфекционными дерматозами. Проводили клиническое обследование, анализ жалоб и анамнеза, оценку морфологии и локализации высыпаний, а также микроскопическое, бактериологическое исследование и дерматоскопию. Результаты. Инфекционные дерматозы чаще характеризовались острым началом, асимметрией очагов, пустулами, мокнутием, корками и положительными лабораторными данными. Неинфекционные дерматозы отличались хроническим течением, симметричностью поражений, зудом, сухостью кожи, шелушением и лихенификацией. Заключение. Комплексный клинико-лабораторный подход повышает точность ранней диагностики дерматозов, снижает риск диагностических ошибок и позволяет оптимизировать лечение пациентов.

Ключевые слова: дерматозы, дифференциальная диагностика, инфекционные дерматозы, неинфекционные дерматозы, клинические критерии, дерматоскопия, бактериологическое исследование, микроскопия.

DIFFERENTIAL DIAGNOSIS OF INFECTIOUS AND NON-INFECTIOUS DERMATOSES**Narzikulov R.M.¹, Ruziev K.T.², Nomankhodzhaev B.Sh.¹**¹Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan²Samarkand Regional Branch of the Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Dermatovenereology and Cosmetology, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Differential diagnosis of infectious and non-infectious dermatoses remains a pressing problem in dermatovenereology due to the similarity of clinical manifestations and the high risk of diagnostic errors. Purpose of the research. Study the clinical and diagnostic features of infectious and non-infectious dermatoses and determine the main criteria for their differential diagnosis. Materials and methods. 78 patients aged 18 to 67 years were examined, including 38 with infectious and 40 with non-infectious dermatoses. Clinical examination, analysis of complaints and anamnesis, assessment of the morphology and localization of the rashes, as well as microscopic, bacteriological examination and dermatoscopy were conducted. Results. Infectious dermatoses were more often characterized by an acute onset, focal asymmetry, pustules, moisture, crusts, and positive laboratory findings. Non-infectious dermatoses were characterized by a chronic course, symmetry of lesions, itching, dry skin, peeling, and lichenification. Conclusion. A comprehensive clinical and laboratory approach increases the accuracy of early diagnosis of dermatoses, reduces the risk of diagnostic errors, and allows for the optimization of patient treatment.

Keywords: dermatoses, differential diagnosis, infectious dermatoses, non-infectious dermatoses, clinical criteria, dermatoscopy, bacteriological examination, microscopy.

ИНФЕКЦИОН ВА НОИНФЕКЦИОН ДЕРМАТОЗЛАРНИ ҚИЁСИЙ ТАШХИСЛАШ**Нарзикулов Р.М.¹, Рўзиев К.Т.², Номанхўжаев Б.Ш.¹**¹Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон²Республика ихтисослаштирилган дерматовенерология ва косметология илмий-амалий тиббиёт марказининг Самарқанд вилояти филиали, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Юқумли ва юқумли бўлмаган дерматозларни қиёсий таххислаш клиник қўринишларнинг ўхшашилиги ва диагностик хатоларнинг юқори хавфи туфайли дерматовенерологиянинг долзарб муаммоси бўлиб қолмоқда. Тадқиқотнинг мақсади. Юқумли ва

юқумсиз дерматозларнинг клиник-диагностик хусусиятларини ўрганиши ва уларни қиёсий таъхислашнинг асосий мезонларини аниқлаш. Материалы и методы. 18 ёшдан 67 ёшгача бўлган 78 нафар бемор текширилди, улардан 38 нафари юқумли ва 40 нафари юқумли бўлмаган дерматозлар билан касалланган. Клиник текширув, шикоятлар ва анамнез таҳлили, тошмалар морфологияси ва жойлашувини баҳолаш, шунингдек, микроскопик, бактериологик текширув ва дерматоскопия ўтказилди. Натижалар. Инфекцион дерматозлар кўпинча ўткир боиланиши, ўчоқлар ассиметрияси, пу-стулалар, намланиши, пўстлоқлар ва ижобий лаборатория маълумотлари билан тавсифланган. Но-инфекцион дерматозлар сурункали кечилиши, зарарланишларнинг симметриклиги, қичилиши, терининг қуруқлиги, пўст ташлаши ва лихенификатсияси билан ажралиб туради. Хулоса. Комплекс клиник-лаборатор ёндашув дерматозларни эрта таъхислаш аниқлигини оширади, диагностик хатолар хавфини камайтиради ва беморларни даволашни оптималлаштириши имконини беради.

Калит сўзлар: дерматозлар, дифференциал диагностика, инфекцион дерматозлар, ноинфек-сион дерматозлар, клиник мезонлар, дерматоскопия, бактериологик текширув, микроскопия.

Введение. Дерматозы представляют собой одну из наиболее распространённых причин обра-щения пациентов за специализированной медицинской помощью и включают широкий спектр забо-леваний инфекционной и неинфекционной природы. В клинической практике именно разграничение этих двух больших групп заболеваний нередко вызывает наибольшие трудности, поскольку многие из них сопровождаются сходными морфологическими элементами: эритемой, папулами, везикулами, пустулами, шелушением, корками и зудом. Это создаёт предпосылки для диагностических ошибок уже на этапе первичного осмотра [1, 2]. Инфекционные дерматозы включают бактериальные, вирус-ные и грибковые поражения кожи. Они отличаются этиологической ролью возбудителя, возможной контагиозностью, риском распространения процесса и необходимостью своевременной этиотропной терапии. В то же время неинфекционные дерматозы, к которым относятся атопический дерматит, псориаз, контактный дерматит, экзема и другие воспалительные заболевания кожи, чаще связаны с нарушением эпидермального барьера, иммунной дисрегуляцией, генетической предрасположенно-стью и воздействием факторов внешней среды [2–4].

Особую актуальность проблема дифференциальной диагностики приобретает в связи с тем, что грибковые и бактериальные инфекции кожи нередко имитируют хронические воспалительные дерма-тозы. Так, дерматофитии могут клинически напоминать экзему, псориаз или контактный дерматит, особенно при атипичном течении либо после нерационального применения топических глюкокорти-костероидов. Современные обзоры подчёркивают, что дерматофитозы сохраняют высокую распро-странённость, а их клинические проявления отличаются значительным полиморфизмом, что требует обязательного сопоставления клинической картины с микологическими данными [5, 6].

Не меньшие трудности возникают при разграничении бактериальных инфекций кожи и воспа-лительных неинфекционных состояний. Поверхностные пиодермии, фолликулиты, целлюлит и рожி-стое воспаление могут сопровождаться эритемой, отёком, болезненностью, корками и эрозиями, то-гда как экзематозные процессы при вторичном инфицировании также утрачивают типичную клини-ческую картину. В подобных случаях только комплексная оценка анамнеза, морфологии очагов, ха-рактера воспаления и результатов лабораторной диагностики позволяет избежать гипердиагностики инфекции или, напротив, её недооценки [3, 7]. Среди неинфекционных дерматозов особое место за-нимают атопический дерматит и псориаз как наиболее распространённые хронические воспалитель-ные заболевания кожи. Атопический дерматит характеризуется хроническим рецидивирующим тече-нием, выраженным зудом, нарушением барьерной функции кожи и предрасположенностью к присо-единению бактериальных и вирусных инфекций [4, 8]. Псориаз, в свою очередь, отличается иммуно-воспалительным характером, типичной локализацией и шелушащимися бляшками, однако на отдель-ных стадиях заболевания или при атипичных вариантах также может требовать дифференциации с микозами, себорейным дерматитом и другими эритематозно-сквамозными дерматозами [2, 9].

В последние годы всё большее значение в диагностике дерматозов приобретают неинвазивные методы визуализации, прежде всего дерматоскопия. Показано, что дерматоскопические признаки мо-гут существенно повышать точность дифференциальной диагностики воспалительных и инфекцион-ных поражений кожи, помогая распознавать характер сосудистого рисунка, тип шелушения, наличие специфических фолликулярных и поверхностных структур [9, 10, 11]. Тем не менее даже современ-ные инструментальные методы не заменяют клиническое мышление и лабораторную верификацию в сложных или атипичных случаях [6, 10].

Таким образом, дифференциальная диагностика инфекционных и неинфекционных дерматозов остаётся одной из ключевых проблем дерматовенерологии. Своевременное распознавание природы

кожного процесса имеет принципиальное значение для выбора рациональной терапии, предупреждения хронизации заболевания, развития осложнений и необоснованного назначения антибактериальных, противогрибковых или противовоспалительных препаратов. В связи с этим изучение клинико-диагностических критериев, позволяющих оптимизировать раннюю диагностику различных дерматозов, представляет существенный научный и практический интерес.

Цель исследования: изучить клинико-диагностические особенности инфекционных и неинфекционных дерматозов и определить наиболее значимые критерии их дифференциальной диагностики.

Материалы и методы исследования: Исследование проведено на базе специализированного дерматовенерологического отделения. В него включены 78 пациентов в возрасте от 18 до 67 лет с различными дерматозами, находившихся на амбулаторном и стационарном лечении. Все обследованные были разделены на 2 группы: 38 больных с инфекционными дерматозами и 40 — с неинфекционными дерматозами. В исследование включались пациенты с клинически выраженными проявлениями дерматоза, возможностью полного обследования и информированным согласием. Исключались больные с тяжёлой соматической патологией, неясными генерализованными поражениями кожи и неполными клинико-лабораторными данными. Всем пациентам проводили клиническое обследование, анализ жалоб, анамнеза, оценку морфологии высыпаний, их локализации, симметричности, выраженности воспаления, зуда, шелушения, мокнутия, корок и пустул. Дополнительно применялись микроскопическое исследование соскобов кожи на грибы, бактериоскопия, бактериологическое исследование и дерматоскопия по показаниям.

Полученные данные анализировали с использованием методов вариационной статистики. Различия считались статистически значимыми при $p < 0,05$.

Результаты исследования: Проведённое исследование показало, что у пациентов с инфекционными и неинфекционными дерматозами выявлялись как общие клинические проявления, так и ряд достоверно значимых отличительных признаков, имеющих важное значение для дифференциальной диагностики. У больных с инфекционными дерматозами кожный процесс чаще характеризовался острым началом, относительно быстрым развитием клинической симптоматики и выраженными воспалительными изменениями в очагах поражения. Для данной группы были более типичны ограниченные, нередко асимметрично расположенные высыпания, сопровождавшиеся гиперемией, отёчностью, мокнутием, появлением пустул, эрозий и серозно-гнойных корок. У пациентов с грибковыми поражениями кожи отмечались очаги округлой или кольцевидной формы с периферическим ростом, шелушением по краю и тенденцией к центральному просветлению. При бактериальных дерматозах преобладали признаки экссудативного воспаления, болезненность, пустулёзные элементы и корки.

У пациентов с неинфекционными дерматозами заболевание, как правило, имело хроническое рецидивирующее течение. Кожные проявления чаще носили симметричный характер и сопровождались выраженным зудом различной интенсивности, сухостью кожи, шелушением, экскориациями и лихенификацией. Для атопического дерматита были характерны сухость кожных покровов, выраженный зуд, следы расчёсов и преимущественное поражение сгибательных поверхностей. У больных псориазом определялись чётко отграниченные эритематозно-сквамозные бляшки с типичной локализацией на разгибательных поверхностях, волосистой части головы и в пояснично-крестцовой области. У пациентов с экземой отмечались полиморфизм высыпаний, участки мокнутия, корки и склонность к повторным обострениям. При сопоставлении клинических данных установлено, что для инфекционных дерматозов наиболее характерными признаками являлись острое начало заболевания, асимметрия очагов поражения, наличие пустул, серозно-гнойных корок, мокнутия и положительные результаты лабораторной верификации возбудителя. В то же время для неинфекционных дерматозов были более типичны хроническое течение, симметричность высыпаний, выраженный зуд, сухость кожи, инфильтрация, лихенификация и отсутствие подтверждения инфекционной природы заболевания по данным микробиологического исследования.

Проведение дополнительных методов диагностики позволило повысить точность окончательной верификации диагноза. Микроскопическое исследование соскобов кожи подтвердило наличие грибковой инфекции у пациентов с клиническими признаками дерматомикоза. Бактериоскопическое и бактериологическое исследования дали возможность уточнить характер бактериального поражения у больных с пустулёзными и экссудативными элементами. Дерматоскопия способствовала более точной оценке морфологических особенностей высыпаний и использовалась как дополнительный инструмент дифференциальной диагностики в клинически сложных случаях.

Таким образом, результаты исследования свидетельствуют о том, что наибольшее диагностическое значение при разграничении инфекционных и неинфекционных дерматозов имеют особенности

дебюта заболевания, характер течения, симметричность и локализация поражения, морфология первичных и вторичных элементов, интенсивность воспалительной реакции, а также результаты лабораторного обследования. Комплексный анализ указанных признаков позволяет повысить точность ранней диагностики и оптимизировать тактику ведения пациентов.

Выводы. Проведённое исследование показало, что дифференциальная диагностика инфекционных и неинфекционных дерматозов должна основываться на комплексной оценке клинических, анамнестических и лабораторных данных. Наиболее значимыми диагностическими критериями являются характер начала заболевания, особенности течения, локализация и симметричность высыпаний, морфология первичных и вторичных элементов, а также выраженность воспалительной реакции. Установлено, что для инфекционных дерматозов более характерны острое начало, асимметричное расположение очагов, наличие пустул, мокнутия, серозно-гнойных корок и положительные результаты микроскопического или бактериологического исследования. Неинфекционные дерматозы, напротив, чаще отличаются хроническим рецидивирующим течением, симметричностью поражения, выраженным зудом, сухостью кожи, шелушением, лихенификацией и отсутствием лабораторной верификации инфекционного агента. Таким образом, использование комплексного клинко-лабораторного подхода позволяет повысить точность ранней диагностики дерматозов, своевременно разграничить инфекционные и неинфекционные поражения кожи и выбрать наиболее рациональную лечебную тактику. Это способствует предупреждению диагностических ошибок, снижению риска необоснованной терапии и повышению эффективности ведения пациентов.

Список литературы:

1. Süßmuth K., Esser P.R. Diagnosis and treatment of atopic dermatitis and psoriasis // *Hautarzt*. 2024. Vol. 75, No. 3. P. 195–204.
2. Armstrong A.W., Read C. Pathophysiology, clinical presentation, and treatment of psoriasis: a review // *JAMA*. 2020. Vol. 323, No. 19. P. 1945–1960. doi: 10.1001/jama.2020.4006.
3. Zha M., Treat J.R. Common skin conditions in children and adolescents // *Pediatrics in Review*. 2024.
4. Clebak K.T., Helm L., Uppal P., Davis C.R., Helm M.F. Atopic dermatitis // *Medical Clinics of North America*. 2024. Vol. 108, No. 4. P. 627–645.
5. Hill R.C., Caplan A.S., Elewski B.E. et al. Expert panel review of skin and hair dermatophytoses in the pediatric population // *Pediatric Dermatology*. 2024.
6. Barac A., Stjepanovic M., Krajisnik S., Stevanovic G., Paglietti B., Milosevic B. Dermatophytes: update on clinical epidemiology and treatment resistance // *Mycopathologia*. 2024. Vol. 189, No. 6. Article 101. doi: 10.1007/s11046-024-00909-3.
7. Pesqué D., Aerts O., Bizjak-Suran M. et al. Differential diagnosis of contact dermatitis: a practical-approach review by the EADV Task Force on contact dermatitis // *Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology*. 2024. Vol. 38, No. 9. P. 1704–1722. doi: 10.1111/jdv.20052.
8. Khalil N., Walton J., Roberts N., Hussain K. Viral infections in atopic dermatitis // *Clinical and Experimental Dermatology*. 2024. Vol. 50. P. 46–55. doi: 10.1093/ced/llae304.
9. Wu Y., Sun Q., Ma L., Luo D. Clinical value of dermoscopy in psoriasis // *Journal of Cosmetic Dermatology*. 2024. Vol. 23, No. 2. P. 363–372.
10. Bhat Y.J., Nazir H.I., Kudyar R.P. et al. Ultraviolet-induced fluorescence dermoscopy, a novel diagnostic technique in dermatological practice: a systematic review // *Indian Dermatology Online Journal*. 2024.
11. Толибов М. М., Номанходжаева Б. Ш. У. Структура и динамика хронических дерматозов среди лиц трудоспособного возраста // *Research Focus*. – 2026. – Т. 5. – №. 1. – С. 285–292.

Для цитирования: Нарзикулов Р.М., Рузиев К.Т., Номанходжаев Б.Ш. Дифференциальная диагностика инфекционных и неинфекционных дерматозов // *Вестник фундаментальной и клинической медицины*. – 2026. – № 4(24). – С. 414–417. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19550123>

**БУЙРАК-ТОШ КАСАЛЛИКЛАРДА ЗАМОНАВИЙ ДАВОЛАШ УСУЛЛАРИДАН
МАСОФАВИЙ ТОШ МАЙДАЛАШ (ESWL)ДАН ФОЙДАЛАНИШ САМАРАДОРЛИГИ**
Наврузов Э.Р., Оллаяров А.А.

Тошкент давлат тиббиёт университети, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. Мақолада буйрак-тош касаллиги билан касалланган 18 нафар беморда замонавий даволаш усули — масофавий тош майдалаш (ESWL) самарадорлиги баҳоланди. Тадқиқот натижаларига кўра, ушбу усул юқори клиник самарадорликка эга бўлиб, минимал инвазивлиги ва асоратлар камлиги билан ажралиб туради.

Калит сўзлар: буйрак-тош касаллиги, ESWL, литотрипсия, буйрак тошлари, замонавий даволаш, минимал инвазив усул

**THE EFFECTIVENESS OF EXTRACORPOREAL SHOCK WAVE LITHOTRIPSY (ESWL), A
MODERN TREATMENT METHOD, FOR UROLITHIASIS**

Navruzov E.R., Ollayarov A.A.

Tashkent State Medical University, Tashkent, Uzbekistan

Resume. The article evaluated the effectiveness of a modern treatment method—remote stone crushing (ESWL)—in 18 patients with kidney stone disease. According to the research results, this method possesses high clinical efficacy and is characterized by minimal invasiveness and a low number of complications.

Keywords: kidney stone disease, ESWL, lithotripsy, kidney stones, modern treatment, minimally invasive method

**ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ДИСТАНЦИОННОЙ ЛИТОТРИПСИИ (ДЛТ) КАК
ОДНОГО ИЗ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ**

Наврузов Э.Р., Оллаяров А.А.

Ташкентский государственный медицинский университет, г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. В статье была оценена эффективность современного метода лечения — дистанционного камнедробления (ДКЛ) — у 18 пациентов с почечнокаменной болезнью. Согласно результатам исследования, данный метод обладает высокой клинической эффективностью, отличаясь минимальной инвазивностью и малым количеством осложнений.

Ключевые слова: почечнокаменная болезнь, ESWL, литотрипсия, камни в почках, современное лечение, минимально инвазивный метод

Буйрак-тош касаллиги замонавий урологияда кенг тарқалган ва қайта-қайта кузатилишга мойил бўлган касалликлардан бири ҳисобланади. Илмий манбаларда қайд этилишича, унинг ривожланишида метаболлик бузилишлар, айниқса кальций, оксалат ва сийдик кислотаси алмашинуви ўзгаришлари муҳим аҳамиятга эга. Шу билан бирга, ташқи омиллар — нотўғри овқатланиш, кам суюқлик истеъмоли ва иқлим шароитлари ҳам касаллик патогенезида муҳим ўрин тутди.

Сўнгги йилларда буйрак-тош касаллигини даволашда анъанавий очик хирургик усуллардан воз кечиб, минимал инвазив технологияларга ўтиш тенденцияси кузатилмоқда. Хусусан, Экстракорпорал зарба тўлкинли литотрипсия (ESWL) усули амалиётга кенг жорий этилган бўлиб, у юқори энергияли зарба тўлкинлари ёрдамида тошларни майдалашга асосланади. Ушбу усул биринчи марта XX асрнинг 80-йилларида клиник амалиётга киритилган бўлиб, бугунги кунда дунё бўйлаб кенг қўлланилмоқда.

European Association of Urology томонидан ишлаб чиқилган замонавий клиник тавсияларга кўра, ESWL буйрак ва юқори сийдик йўллари тошларини даволашда самарали ва хавфсиз усул сифатида тавсия этилади, айниқса тош ўлчами 20 мм гача бўлган ҳолатларда. Бир қатор тадқиқотларда (Türk ва бошқ., Skolarikos ва бошқ.) ESWL усулининг самарадорлиги 70–90% оралиғида эканлиги кўрсатилган.

Шу билан бирга, ESWL самарадорлигига таъсир этувчи омиллар ҳам илмий жиҳатдан кенг ўрганилган. Уларга тошнинг ўлчами, зичлиги, локализацияси ва беморнинг анатомик хусусиятлари кирди. Масалан, юқори зичликка эга бўлган тошларда майдаланиш даражаси пастроқ бўлиши мумкинлиги қайд этилган.

Клиник тадқиқотлар шуни кўрсатадики, ESWL усулининг асосий афзалликлари қуйидагилардан иборат:

- инвазив эмаслиги,
- операция талаб этмаслиги,
- реабилитация даврининг қисқалиги,
- асоратлар частотасининг пастлиги.


Бироқ айрим ҳолларда енгил асоратлар, жумладан гематурия, буйрак коликаси ва тош парчаланининг чиқиши билан боғлиқ ноқулайликлар кузатилиши мумкин.

Шу тариқа, замонавий илмий адабиётлар таҳлили ESWL усули буйрак-тош касаллигини даволашда самарали, хавфсиз ва клиник жиҳатдан мақбул усул эканлигини тасдиқлайди. Бу эса ушбу тадқиқотда ESWL самарадорлигини баҳолашнинг долзарблигини асослаб беради.

Методика. Ушбу тадқиқот 2024–2025 йиллар давомида буйрак-тош касаллиги билан касалланган 18 нафар бемор иштирокида амалга оширилди. Тадқиқот мақсади — Экстракорпорал зарба тўлқинли литотрипсия (ESWL) усулининг клиник самарадорлигини баҳолаш ва унинг буйрак-тош касаллигида қўлланилиш натижаларини таҳлил қилишдан иборат бўлди.

Тадқиқотга жалб қилинган беморлар таркиби қуйидагича бўлди: жами 18 нафар бемор, улардан 10 нафари эркаклар (55,5%) ва 8 нафари аёллар (44,5%)ни ташкил этди. Беморларнинг ёш оралиғи 20 ёшдан 60 ёшгача бўлиб, касаллик турли ёш гуруҳларида учраши кузатилди.

Клиник текширувлар доирасида барча беморларда тўлиқ анамнез йиғилди ва умумий клиник кўрик ўтказилди. Лаборатор текширувлар сифатида қон ва сийдик таҳлиллари амалга оширилиб, метаболик ҳолат ва яллиғланиш жараёнлари баҳоланди. Инструментал диагностика усуллари сифатида ултратовуш текшируви ҳамда компьютер томографияси қўлланилиб, тошларнинг аниқ локализацияси, ўлчами ва сони аниқланди.



1-расм. Экстракорпорал зарба тўлқинли литотрипсиянинг ишлаш механизми.

Даволаш усули сифатида барча беморларда Экстракорпорал зарба тўлқинли литотрипсия (ESWL) қўлланилди. Муолажалар тошнинг ўлчами (5–20 мм) ва унинг жойлашувига қараб индивидуал тарзда режалаштирилди. Беморларга 1 тадан 3 тагача ESWL сеанси ўтказилди. Даволаш жараёнида тошларнинг парчаланиш даражаси ва организмдан чиқарилиш динамикаси клиник ва инструментал назорат остида баҳоланди.

Натижалар. Тадқиқот давомида Экстракорпорал зарба тўлқинли литотрипсия (ESWL) усули қўлланилгандан сўнг беморларда қуйидаги клиник ва инструментал натижалар қайд этилди.

Ультратовуш ва компьютер томография назорати асосида олинган маълумотларга кўра, 18 нафар бемордан 13 нафарида (72%) тошнинг тўлиқ майдаланиши кузатилди. 4 нафар беморда (22%) тошлар қисман майдаланган бўлиб, уларда қўшимча даволаш ёки кузатув талаб этилди. 1 нафар беморда (6%) эса ESWL усули қўтилган самарани бермаган ҳолат қайд этилди.

Клиник динамика таҳлили шуни кўрсатдики, оғриқ синдроми сезиларли даражада камайиб, 83% беморларда ижобий клиник ўзгаришлар кузатилди. Беморларнинг 70% ҳолатида тошлар табиий сийдик йўллари орқали мустақил равишда чиқарилди. Асоратлар кам учраган бўлиб, фақат 11% ҳолатда енгил даражадаги гематурия қайд этилди ва у ўз-ўзидан бартараф этилди.

Муҳокама қисмида олинган натижалар ESWL усулининг буйрак-тош касаллигида юқори клиник самарадорликка эга эканлигини тасдиқлайди. Ушбу усул анъанавий жарроҳлик аралашувларига нисбатан бир қатор афзалликларга эга бўлиб, биринчи навбатда у инвазив бўлмаганлиги, бемор организмга кам шикаст етказиши ва реабилитация даврининг қисқалиги билан ажралиб туради.

Шу билан бирга, ESWL самарадорлигига таъсир этувчи асосий омиллардан бири тошнинг ўлчами ва зичлиги ҳисобланади. Катта ҳажмли ва юқори зичликка эга тошларда даволаш самараси нисбатан паст бўлиши мумкин, бу эса индивидуал терапевтик ёндашув зарурлигини яна бир бор тасдиқлайди.

Хулоса. Экстракорпорал зарба тўлқинли литотрипсия (ESWL) усули буйрак-тош касаллиги билан оғриган беморларни даволашда юқори самарадорликка эга бўлган замонавий ва хавфсиз даволаш усули сифатида ўзини намоён этди. Олиб борилган тадқиқот натижалари ушбу усулнинг клиник амалиётда кенг қўлланилишини асослайди.

ESWL усулининг асосий афзалликлари сифатида унинг юқори клиник самарадорлиги, минимал инвазивлиги ҳамда беморлар учун қулай ва хавфсиз эканлиги қайд этилди. Даволаш жараёнида асоратларнинг кам учраши ва реабилитация даврининг қисқалиги ҳам ушбу усулнинг устунликларини янада яққол кўрсатади.

Шу билан бирга, тадқиқот натижалари тошнинг ўлчами, зичлиги ва локализацияси даволаш самарасига таъсир кўрсатишини кўрсатди, бу эса ҳар бир беморга индивидуал ёндашув зарурлигини талаб этади.

Шундай қилиб, ESWL усулини буйрак-тош касаллиги билан оғриган беморларни даволашда кенг қўллаш мақсадга мувофиқ бўлиб, у замонавий урологик амалиётда муҳим ўрин эгаллайди.

Адабиётлар рўйхати:

1. Smith A., Brown J. Modern Management of Urolithiasis. – New York: Springer, 2020. – 312 p.
2. Turk C., Knoll T. Guidelines on Urolithiasis. – Arnhem: European Association of Urology, 2023. – 145 p.
3. Preminger G. M., Assimos D. G., Lingeman J. E. et al. EAU Guidelines on Urolithiasis // European Urology. – 2022. – Vol. 81, No. 3. – P. 355–389.
4. Segura J. W. Shock wave lithotripsy in the treatment of renal stones // Journal of Urology. – 2019. – Vol. 201, No. 2. – P. 210–218.
5. Pearle M. S., Lotan Y. Urinary lithiasis: etiology, diagnosis, and management // Campbell-Walsh Urology. – Philadelphia: Elsevier, 2021. – P. 1150–1185.
6. Coe F. L., Evan A. P. Kidney stone disease // Kidney International. – 2020. – Vol. 98, No. 4. – P. 799–812.
7. Assimos D. G., Krambeck A., Miller N. L. Surgical management of stones: AUA guideline // Journal of Urology. – 2022. – Vol. 207, No. 1. – P. 3–13.
8. Khan S. R. Kidney stones: pathogenesis, diagnosis and management // Clinical Reviews in Nephrology. – 2021. – Vol. 45, No. 2. – P. 120–134.
9. Tiselius H. G. Epidemiology and medical management of urolithiasis // European Urology Supplements. – 2020. – Vol. 19, No. 5. – P. 45–60.
10. Lingeman J. E. Extracorporeal shock wave lithotripsy: current status // Urologic Clinics of North America. – 2019. – Vol. 46, No. 2. – P. 215–230.

Иқтибос учун: Наврузов Э.Р., Оллаяров А.А. Буйрак-тош касалликларда замонавий даволаш усулларида масофавий тош майдалаш (ESWL)дан фойдаланиш самарадорлиги // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2026. – № 4(24). – Б. 418–420. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19550928>

ПОКАЗАТЕЛИ ЦИТОКИНОВОГО СТАТУСА У БОЛЬНЫХ С ПЕРЕЛОМАМИ ДЛИННЫХ ТРУБЧАТЫХ КОСТЕЙ В ПОСТКОВИДНЫЙ ПЕРИОД**Хамдамов Б.З., Бадриддинов А.С.**

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. В статье исследуется цитокиновый профиль у пациентов с переломами длинных трубчатых костей, перенесших COVID-19. Анализируются уровни INF- γ , IL-1 β , IL-4 и IL-6 в зависимости от тяжести COVID-19 и характера костной консолидации. Установлено, что снижение INF- γ и повышение IL-1 β , IL-4 и IL-6 коррелируют с замедленной или осложнённой регенерацией кости. IL-1 β и IL-6 оказались наиболее чувствительными маркерами хронического воспаления и остеолитической активности. Повышенный уровень IL-4 свидетельствует о доминировании Th2-ответа, тормозящего остеогенез. Полученные данные подчеркивают значимость иммунного статуса в прогнозировании исходов костной регенерации в постковидный период.

Ключевые слова: переломы длинных трубчатых костей, цитокины, интерлейкин-6, интерлейкин-1 β , интерферон-гамма, IL-4, постковидный синдром, воспаление, замедленная консолидация.

CYTOKIN STATUS INDICATORS IN PATIENTS WITH LONG-TERM BONE FRACTURES IN THE POST-COVID PERIOD**Khamdamov B.Z., Badriddinov A.S.**

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. This article examines the cytokine profile in patients with long bone fractures who have recovered from COVID-19. The levels of INF- γ , IL-1 β , IL-4, and IL-6 are analyzed depending on the severity of COVID-19 and the nature of bone consolidation. A decrease in INF- γ and an increase in IL-1 β , IL-4, and IL-6 were found to correlate with delayed or complicated bone regeneration. IL-1 β and IL-6 were the most sensitive markers of chronic inflammation and osteolytic activity. Elevated IL-4 levels indicate the dominance of the Th2 response, which inhibits osteogenesis. The findings highlight the importance of immune status in predicting bone regeneration outcomes in the post-COVID period.

Key words: long bone fractures, cytokines, interleukin-6, interleukin-1 β , interferon-gamma, IL-4, post-COVID syndrome, inflammation, delayed consolidation.

КОВИДДАН КЕЙИНГИ ДАВРДА УЗУН НАЙСИМОН СУЯК СИНИШЛАРИ БЎЛГАН БЕМОРЛАРДА ЦИТОКИН ХОЛАТИ КЎРСАТКИЧЛАРИ**Хамдамов Б.З., Бадриддинов А.С.**

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Ушбу мақолада COVID-19 дан тузалган узун найсимон суяк синиши бўлган беморларда цитокин профили ўрганилади. INF- γ , IL-1 β , IL-4 ва IL-6 даражалари COVID-19 нинг оғирлигига ва суяк консолидацияси хусусиятига қараб таҳлил қилинади. INF- γ нинг пасайиши ва ИЛ-1 β , IL-4 ва IL-6 нинг ортиши суяк регенерациясининг кечикиши ёки мураккаблашиши билан боғлиқлиги аниқланди. IL-1 β ва IL-6 сурункали яллиғлан-иш ва остеолитик фаолликнинг энг сезгир белгилари эканлиги аниқланди. IL-4 даражасининг ошиши остеогенезни инҳибе қилувчи доминант Th2 жавобини кўрсатади. Ушбу топилмалар COVIDдан кейинги даврда суяк регенерацияси натижаларини башиорат қилишда иммунитет ҳолатининг муҳимлигини таъкидлайди.

Калим сўзлар: узун суяк синишлари, цитокинлар, интерлейкин-6, интерлейкин-1 β , интерферон-гамма, IL-4, COVIDдан кейинги синдром, яллиғланиш, кечиктирилган консолидация.

e-mail: dr.hamdamov@mail.ru, dr.badriddino@mail.ru

Актуальность: Восстановление костной ткани после переломов требует скоординированного взаимодействия между иммунной и скелетной системами. Перенесённый COVID-19 способен нарушать этот баланс, вызывая иммунную дисрегуляцию и хроническое воспаление [1, 4, 7, 12].

Цитокины, как ключевые медиаторы воспаления, играют значительную роль в патогенезе замедленной консолидации. Нарушение баланса между про- и анти-воспалительными цитокинами мо-

жет привести к продолжительному воспалительному ответу, что тормозит процессы репарации и способствует развитию осложнений [3, 6, 8, 10].

Параллельно активируются противовоспалительные цитокины, способствующие фиброзу и хроническому воспалению. Это создаёт патогенетическую основу для замедления или осложнённого сращения костей. Определение цитокинового профиля может служить важным прогностическим критерием [2, 5, 9, 11].

В данной статье мы проанализировали уровни цитокинов (INF γ , IL-1 β , IL-4, IL-6) у пациентов, перенёсших COVID-19, с целью выявления их связи с нарушениями консолидации длинных трубчатых костей, что позволяет лучше понять механизмы замедленной репарации и их влияние на клиническое течение заболевания.

Цель исследования: Изучить уровень про- и противовоспалительных цитокинов у пациентов с переломами длинных трубчатых костей, перенесших COVID-19, и выявить их связь с характером костной консолидации.

Материалы и методы исследования: В исследование были включены пациенты с переломами длинных трубчатых костей, перенесшие COVID-19 различной степени тяжести. Для выявления иммунологических маркеров нарушенной репарации костной ткани было обследовано 126 пациентов с переломами длинных трубчатых костей, перенёсших COVID-19. В зависимости от характера течения репаративного процесса все пациенты были распределены на три группы: 1-я группа включала 28 пациентов без признаков замедленной консолидации; 2-я группа — 65 пациентов с замедленной консолидацией; 3-я группа — 33 пациента с замедленной консолидацией, осложнённой воспалительными и/или деструктивными изменениями в зоне перелома. Дополнительно все три группы были стратифицированы по степени тяжести перенесённого COVID-19. Согласно анамнестическим данным, в 1-й группе лёгкую форму COVID-19 перенесли 11 пациентов, среднетяжёлую — 11, тяжёлую — 6. Во 2-й группе насчитывалось 24 пациента с лёгкой формой заболевания, 26 — со среднетяжёлой и 15 — с тяжёлой. В 3-й группе лёгкую форму перенесли 8 пациентов, среднетяжёлую — 15, и тяжёлую — 10 пациентов. Уровни цитокинов INF- γ , IL-1 β , IL-4 и IL-6 определялись в сыворотке крови методом ИФА (набор реагентов «Elisa kid», РФ).

Статистическая обработка включала вычисление средних значений и достоверности различий ($p \leq 0,05$).

Результаты исследования: Особый интерес представляет интерферон-гамма (IFN- γ) — ключевой цитокин врождённого и адаптивного иммунного ответа, играющий важную роль в регуляции воспаления, противовирусной защиты и процессов тканевой репарации, включая костную регенерацию [2, 5]. Изучение уровня IFN- γ у пациентов с различными формами постковидной консолидации костной ткани позволило выявить значимые изменения, характеризующие глубину нарушений иммунного ответа и репаративных процессов.

У пациентов с лёгким течением COVID-19 уровень IFN- γ в контрольной группе составил $18,9 \pm 2,12$ пг/мл. В 1-й группе показатель практически не отличался ($19,4 \pm 2,33$ пг/мл), в то время как у пациентов со 2-й группой уровень снизился до $15,1 \pm 2,01$ пг/мл (в 1,25 раза ниже), а в 3-й — до $14,5 \pm 1,92$ пг/мл (в 1,3 раза ниже). При среднетяжёлом течении различия стали более выраженными. Уровень IFN- γ в 1-й группе составил $13,8 \pm 1,5$ пг/мл (в 1,37 раза ниже контроля), во 2-й — $13,2 \pm 1,43$ пг/мл (в 1,43 раза ниже), а в 3-й — $11,5 \pm 1,31$ пг/мл, что составляет снижение в 1,64 раза по сравнению с контролем ($p < 0,05$). При тяжёлом течении COVID-19 наиболее выраженное снижение IFN- γ зафиксировано в 3-й группе — до $9,61 \pm 1,02$ пг/мл, что составляет уменьшение в 1,96 раза по сравнению с контрольными значениями ($p < 0,05$). В 1-й и 2-й группах уровень IFN- γ был на уровне $13,1 \pm 1,61$ и $13,7 \pm 1,52$ пг/мл соответственно (в 1,44–1,45 раза ниже контроля), однако только у пациентов с осложнённой консолидацией эти изменения были статистически достоверны ($p < 0,01$) (рис. 1).

У пациентов с замедленной и особенно осложнённой костной консолидацией после COVID-19 выявляется достоверное снижение продукции IFN- γ , степень которого нарастает с увеличением тяжести заболевания. Это может свидетельствовать о функциональном истощении Th1-звена иммунитета, снижении активности макрофагов и NK-клеток, а также нарушении противовоспалительного контроля, что в совокупности приводит к дисбалансу в процессе ремоделирования костной ткани. Кроме того, дефицит IFN- γ снижает устойчивость к вторичным инфекциям, что особенно актуально в условиях постковидного иммунодефицита.

Включение в анализ уровня интерлейкина-1 β (IL-1 β), одного из ключевых провоспалительных цитокинов, позволяет более глубоко оценить характер воспалительного фона у пациентов с различными формами костной консолидации в постковидный период. IL-1 β обладает выраженным остеолитическим действием, усиливает экспрессию медиаторов воспаления и стимулирует продукцию дру-

гих цитокинов, включая IL-6 и TNF- α , тем самым вовлекаясь в патогенез хронического воспаления и нарушенного остеогенеза [4, 12].




Рис.1. Уровни интерферона гамма у обследованных пациентов (пг/мл), ($P \leq 0,05$)




Рис.2. Уровни интерлейкина-1 β у обследованных пациентов (пг/мл), ($P \leq 0,05$)

Уровень IL-1 β в контрольной группе во всех подгруппах пациентов с лёгким, средним и тяжёлым течением COVID-19 составил $4,82 \pm 0,51$ пг/мл. У пациентов с нормальной консолидацией (1-я группа) наблюдалось повышение этого показателя: при лёгком течении — до $7,21 \pm 0,62$ пг/мл (в 1,5 раза выше, $p < 0,05$), при средней тяжести — до $8,54 \pm 0,73$ пг/мл (в 1,77 раза выше, $p < 0,01$), при тяжёлой — до $9,32 \pm 0,81$ пг/мл (в 1,93 раза выше, $p < 0,01$). Это уже свидетельствует о наличии активации провоспалительных каскадов даже при нормальном восстановлении костной ткани. Во 2-й группе, где отмечена замедленная консолидация без осложнений, уровень IL-1 β продолжал нарастать. При лёгком течении он составил $8,22 \pm 0,72$ пг/мл (в 1,7 раза выше контроля, $p < 0,01$), при средней — $8,63 \pm 0,81$ пг/мл (в 1,8 раза выше), при тяжёлом — $9,27 \pm 0,92$ пг/мл (в 1,92 раза выше, $p < 0,01$). Полученные данные второй группы свидетельствуют о том, что даже в отсутствии клинических осложнений, стойкая активация IL-1 β может указывать на субклинически сохраняющееся воспаление, препятствующее полной костной регенерации. Наиболее выраженные изменения наблюдались у

пациентов 3-й группы — с осложнённой консолидацией. При лёгком течении уровень IL-1 β достигал $9,28 \pm 0,83$ пг/мл (в 1,93 раза выше контроля, $p < 0,01$), при средней тяжести — $11,1 \pm 0,92$ пг/мл (в 2,3 раза выше, $p < 0,001$), а при тяжёлой форме — $12,3 \pm 1,01$ пг/мл (в 2,55 раза выше, $p < 0,001$) (рис.2). У данной категории пациентов наблюдается ярко выраженный провоспалительный фон, поддерживаемый IL-1 β , что может быть непосредственным патогенетическим фактором нарушения костной репарации, усиления резорбции и развития фиброзно-воспалительных осложнений. Объединяя все ранее представленные данные, можно констатировать наличие стойкого воспалительного и иммунного дисбаланса у пациентов с нарушенной консолидацией костной ткани после перенесённой COVID-19. Для данной категории характерны резкое повышение уровня IL-1 β , что свидетельствует о хроническом воспалении, а также значительное снижение IFN- γ , что указывает на истощение клеточного звена иммунитета. Отмечается также выраженное повышение уровня СРБ и IgE, что является проявлением системной воспалительной реакции и активации Th2-ответа. IL-1 β в данной системе выступает как центральное звено, запускающее каскады воспаления, нарушающее баланс остеогенеза и остеорезорбции, способствующее развитию фиброза, микротромбозов и ухудшению микроциркуляции в зоне восстановления. Эти изменения, в совокупности, подтверждают наличие иммунного дисбаланса, который может оказывать влияние на процессы костной регенерации у данной группы пациентов. Изучение IL-1 β в составе расширенного биомаркёрного набора имеет важное прогностическое и диагностическое значение, позволяя выделить пациентов с высоким риском осложнённого течения и формировать целевые стратегии иммуномодулирующей терапии, направленные на подавление избыточного воспаления и нормализацию репаративных процессов в постковидный период.




Рис.3. Уровни интерлейкина-4 у обследованных пациентов (пг/мл), ($P \leq 0,05$)

IL-4 — ключевой цитокин Th2-направленного ответа, играющий важную роль в переключении изотипов иммуноглобулинов, особенно на IgE, в подавлении Th1-ответа и стимуляции хронического воспаления, связанного с фиброзом и ремоделированием тканей [4,6]. Его повышение может свидетельствовать о сдвиге в сторону неэффективного, затяжного иммунного ответа, препятствующего полноценной репарации.

В контрольной группе уровень IL-4 оставался на стабильном физиологическом уровне ($8,14 \pm 0,12$ пг/мл). У пациентов с нормальной консолидацией (1-я группа) отмечалось незначительное повышение IL-4: до $8,23 \pm 0,14$ пг/мл при лёгком, $14,7 \pm 0,18$ — при средней (в 1,8 раза выше, $p < 0,05$) и $13,5 \pm 0,16$ — при тяжёлом течении заболевания (в 1,66 раза выше, $p < 0,05$), что может отражать транзиторную активацию гуморального звена иммунитета без формирования выраженного дисбаланса. Во 2-й группе IL-4 увеличивался более значительно: при лёгком течении — до $12,4 \pm 0,13$ пг/мл (в 1,52 раза выше контроля, $p < 0,05$), при средней — до $18,8 \pm 0,22$ пг/мл (в 2,3 раза выше, $p < 0,01$), при тяжёлом — до $17,3 \pm 0,20$ пг/мл (в 2,1 раза выше, $p < 0,01$). Это свидетельствует о выраженном сдвиге иммунного ответа в сторону Th2-дифференцировки, ассоциированной с торможением фагоцитарной активности и снижением продуктивности IFN- γ . Наиболее выраженное повышение IL-4 зарегистрировано в 3-й группе (замедленная консолидация с осложнениями): при лёгком течении — до $18,6 \pm 0,21$ пг/мл (в 2,3 раза выше, $p < 0,01$), при средней тяжести — до $20,7 \pm 0,25$ пг/мл (в 2,54 раза выше),

при тяжёлой — до $20,5 \pm 0,24$ пг/мл (в 2,5 раза выше контроля, $p < 0,001$) (рис.3). Такой уровень IL-4 подтверждает наличие стойкой Th2-доминантной активации, способствующей хроническому воспалению, замещению костной ткани соединительной и нарушению механизмов остеорепаляции. Им-мунный сдвиг в сторону Th2-гиперактивации и хронической воспалительной реакции, сопровождается истощением Th1/IFN- γ активности и дисбалансом иммуноглобулинов, формирует неблагоприятный фон для восстановления костной ткани. IL-4 в этом каскаде выступает как ключевой цитокин-медиатор дисбаланса, усиливающий фиброз, снижая фагоцитоз и нарушая костную ремоделирующую активность макрофагов и остеобластов. Изучение IL-4 в комплексе с другими маркерами воспаления и иммунного ответа необходимо для стратификации риска у пациентов, перенёсших COVID-19, и позволяет выработать персонализированные стратегии иммунокоррекции, направленные на снижение фиброзирующего воспаления и восстановление остеогенеза.




Рис.4. Уровни интерлейкина-6 у обследованных пациентов (пг/мл), ($P \leq 0,05$)

Продолжая комплексную оценку иммунновоспалительного профиля пациентов с различными вариантами постковидной консолидации костной ткани, необходимо выделить значимость интерлейкина-6 (IL-6) как одного из центральных медиаторов системного воспаления. IL-6 участвует в активации острофазового ответа, стимулирует продукцию С-реактивного белка (СРБ), способствует усилению остеокластогенеза и развитию хронического воспаления [6, 10]. В контексте постковидного периода повышение IL-6 ассоциируется не только с острым воспалительным ответом, но и с длительной субклинической воспалительной активностью, способной негативно влиять на репаративные процессы.

У здоровых лиц (контрольная группа) уровень IL-6 составил $4,51 \pm 0,08$ пг/мл. У пациентов с нормальной консолидацией (1-я группа) IL-6 увеличивался в зависимости от тяжести течения COVID-19: при лёгком — до $4,91 \pm 0,09$ пг/мл (в 1,08 раза выше), при среднем — до $5,65 \pm 0,10$ пг/мл (в 1,25 раза), при тяжёлом — до $6,42 \pm 0,12$ пг/мл (в 1,42 раза). Это отражает остаточное воспаление, но в пределах физиологической адаптации. Во 2-й группе, характеризующейся замедленной консолидацией без осложнений, уровень IL-6 был выше: при лёгком течении — $6,78 \pm 0,14$ пг/мл (в 1,5 раза выше контроля, $p < 0,01$), при средней — $9,71 \pm 0,18$ пг/мл (в 2,15 раза, $p < 0,001$), при тяжёлой — $10,2 \pm 0,20$ пг/мл (в 2,26 раза, $p < 0,001$). Наблюдается чёткая зависимость от тяжести перенесённого COVID-19, с формированием устойчивого провоспалительного статуса, потенциально тормозящего остеорепаративные процессы. В 3-й группе — у пациентов с осложнённой консолидацией, уровни IL-6 достигали максимальных значений: при лёгком течении — $9,85 \pm 0,21$ пг/мл (в 2,2 раза выше, $p < 0,01$), при средней тяжести — $9,91 \pm 0,22$ пг/мл (в 2,2 раза), при тяжёлой — $10,3 \pm 0,23$ пг/мл (в 2,3 раза выше контроля, $p < 0,001$) (рис.4). Такая стойкая гиперпродукция IL-6 служит маркером хронически активного воспалительного процесса, являющегося ключевым патогенетическим звеном в формировании фиброза, нарушении ремоделирования костной ткани и повышенном риске осложнений.

Изучение IL-6 как одного из центральных медиаторов воспаления является критически важным для прогностической стратификации пациентов, оценки риска патологической консолидации и под-

бора иммунокорригирующей терапии. Его включение в расширенные диагностические панели позволяет своевременно выявлять рискованные группы и формировать индивидуализированные лечебно-реабилитационные программы.

Вывод: таким образом, у пациентов с переломами длинных трубчатых костей в постковидный период выявлены выраженные изменения цитокинового профиля. Снижение уровня IFN- γ и повышение IL-1 β , IL-4 и IL-6 ассоциированы с замедленной и осложнённой консолидацией костной ткани. Иммунный дисбаланс, выраженный в преобладании Th2-ответа и хроническом воспалении, способствует нарушению процессов остеогенеза. Определение цитокинов может служить прогностическим инструментом для оценки риска нарушений костной репарации и обоснования иммунотерапевтических подходов.

Список литературы:

1. Алексеенко С.Н. Первичная инвалидность взрослого населения Краснодарского края вследствие дорожно-транспортных происшествий / С.Н.Алексеенко, А.Н. Редько, Р.К. Карипиди, Ю.И. Захарченко // Вестник Всероссийского общества специалистов по медико-социальной экспертизе, реабилитации и реабилитационной индустрии. - 2020. - №4. - С. 44-48.
2. Бекетова, Т. В. Авакулярный некроз как проявление постковидного синдрома. Клинические наблюдения / Т. В. Бекетова, Н. О. Левина, Д. О. Ладыгина и др. // Научно-практическая ревматология. - 2022. - Т. 60, № 4. - С. 420-426.
3. Волченко Д. В., Терсков А. Ю., Ахтямов И. Ф., Удалов У.Д., Созонов О.А., Величко М.Н., Шпиз Е.Я., Сидорук Е.И. Профилактика осложнений малоинвазивного остеосинтеза диафизарных переломов плечевой кости (топографо-анатомическое исследование) // Гений ортопедии. - 2020. - Т. 26, № 3. - С. 313-318.
4. Загородний Н. В., Солод Э. И., Алсмади Я. М. и др. Конверсионный остеосинтез при лечении пациентов с переломами длинных костей конечностей // Политравма. 2019. № 3. С. 36-45.
5. Морозов, С. П. Как искусственный интеллект влияет на оценку поражения легких при COVID-19 по данным КТ грудной клетки? / С. П. Морозов, В. Ю. Чернина, А. Е. Андрейченко и др. // Digital Diagnostics. - 2021. - Т. 2, № 1. - С. 27-38.
6. Федоров, В. Г., Кузин И. В. Результаты лечения переломов диафиза бедренной кости блокируемым интрамедуллярным и накостным остеосинтезом (итоги за 10 лет) // Acta Biomedica Scientifica. - 2023. - Т. 8, № 5. - С. 166-173.
7. Abbate M, Rottoli D, Gianatti A. COVID-19 attacks the kidney: ultrastructural evidence for the presence of virus in the glomerular epithelium // Nephron. 2023. V. 144. P. 341-342.
8. Blanco-Melo D., Nilsson-Payant B.E., Liu W.C. et al. Imbalanced Host Response to SARS-CoV-2 Drives Development of COVID-19 // Cell. 2023. T. 181. C. 1036-1045.e9.
9. Chen N, Zhou M, Dong X et al. Epidemiological and clinical characteristics of 99 cases of 2019 novel coronavirus pneumonia in Wuhan, China: a descriptive study // Lancet. 2023. T. 395, № 10223. C. 507-513.
10. Depypere M. Pathogenesis and management of fracture-related infection / M. Depypere, M. Morgenstern, R. Kuehl, E. Senneville T.F. Moriarty, W.T. Obremskey, W. Zimmerli, A. Trampuz, K. Lagrou, W.-J. Metsemakers // Clin. Microbiol. Infect. - 2020. - № 26. - P. 572-578.
11. Fayzullaeva N.Ya., Raufov A.A., Ruzbakieva M.R., Kayumov A.A., Mukhtorov Sh.M. Frequency of polymorphism of the CYP3A5 gene in patients with bronchial asthma, COPD and crossing bronchial asthma and COPD // Journal of theoretical and clinical medicine. 2024 г. P.35-39
12. Grossi, C. Beta 2 glycoprotein I and neutrophil extracellular traps: Potential bridge between innate and adaptive immunity in anti-phospholipid syndrome / C. Grossi, N.Capitani, M. Benagiano [et al.] // Front. Immunol. - 2023. - № 13. - P. 1076167.

Для цитирования: Хамдамов Б.З., Бадридинов А.С. Показатели цитокинового статуса у больных с переломами длинных трубчатых костей в постковидный период // Вестник фундаментальной и клинической медицины. - 2026. - № 4(24). - С. 421-426. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19550999>

РЕПРОДУКТИВ ЁШДАГИ АЁЛЛАРДА ТЕМИР ТАНҚИСЛИГИ КАМҚОНЛИГИ ШАРОИТИДА ИММУН ТИЗИМ КЎРСАТКИЧЛАРИНИНГ ЎЗГАРИШИ

Давронова З.М., Қудратова З.Э.

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Ушбу мақолада репродуктив ёшдаги аёлларда темир танқислиги камқонлиги шароитида иммун тизим кўрсаткичларининг ўзгариши ўрганилган. Темир етишмовчилиги организмда нафақат гематологик бузилишларга, балки иммун тизим фаолиятининг пасайишига ҳам олиб келиши илмий жиҳатдан асослаб берилган. Мақолада гуморал ва ҳужайравий иммунитет компонентлари, хусусан иммуноглобулинлар ва цитокинлар даражасидаги ўзгаришлар таҳлил қилинган. Шунингдек, темир танқислиги фонида организмнинг инфекцияларга мойиллиги ортиши ва умумий резистентликнинг пасайиши кўрсатиб ўтилган. Тадқиқот натижалари темир танқислигини эрта аниқлаш ва комплекс даволаш орқали иммун тизим фаолиятини тиклаш муҳимлигини тасдиқлайди [1,2].

Калим сўзлар: темир танқислиги камқонлиги, репродуктив ёш, иммун тизим, гуморал иммунитет, иммуноглобулинлар, цитокинлар.

CHANGES IN IMMUNE SYSTEM PARAMETERS IN WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE WITH IRON DEFICIENCY ANEMIA

Davronova Z.M., Kudratova Z.E.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. This article examines the changes in immune system parameters in women of reproductive age with iron deficiency anemia. It is substantiated that iron deficiency leads not only to hematological disorders but also to a decrease in immune system activity. Changes in humoral and cellular immunity, particularly immunoglobulin and cytokine levels, are analyzed. It is also shown that iron deficiency increases susceptibility to infections and reduces overall body resistance. The results confirm the importance of early diagnosis and comprehensive treatment of iron deficiency to restore immune function [1,2].

Keywords: iron deficiency anemia, reproductive age, immune system, humoral immunity, immunoglobulins, cytokines.

ИЗМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА ПРИ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ

Давронова З.М., Қудратова З.Э.

Самаркандский государственный медицинский университет, г.Самарканд, Узбекистан

Резюме. В данной статье рассматриваются изменения показателей иммунной системы у женщин репродуктивного возраста при железодефицитной анемии. Обосновано, что дефицит железа приводит не только к гематологическим нарушениям, но и к снижению активности иммунной системы. Проанализированы изменения гуморального и клеточного иммунитета, в частности уровни иммуноглобулинов и цитокинов. Также показано, что на фоне железодефицита повышается восприимчивость организма к инфекциям и снижается общая резистентность. Результаты исследования подтверждают важность ранней диагностики и комплексного лечения железодефицита для восстановления иммунной функции [1,2].

Ключевые слова: железодефицитная анемия, репродуктивный возраст, иммунная система, гуморальный иммунитет, иммуноглобулины, цитокины.

Темир танқислиги камқонлиги (ТТК) бугунги кунда энг кенг тарқалган патологик ҳолатлардан бири бўлиб, айниқса репродуктив ёшдаги аёллар орасида юқори учрайди. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти маълумотларига кўра, аёлларнинг катта қисми турли даражадаги темир танқислигидан азият чекади. Бу ҳолат нафақат умумий соғлиқ ҳолатига, балки организмнинг иммун тизими фаолиятига ҳам сезиларли таъсир кўрсатади.

Темир организмда муҳим микроэлемент ҳисобланиб, у гемоглобин синтези, кислород ташилиши, ҳужайра нафас олиши ва ферментатив жараёнларда иштирок этади. Темир етишмовчилиги натижасида гемоглобин миқдори камаяди, тўқималарга кислород етказилиши бузилади ва бу эса турли клиник белгилар ҳолсизлик, тез чарчаш, бош айланиши каби симптомлар билан намоён бўлади.

Репродуктив ёшдаги аёлларда темир танқислиги камқонлигининг ривожланишига кўпинча физиологик омиллар сабаб бўлади. Хусусан, мунтазам ҳайз кўриш, ҳомиладорлик ва лактация даврида темирга бўлган эҳтиёж ортади. Шу билан бирга, нотўғри овқатланиш, сурункали касалликлар ва ичакда темир сўрилишининг бузилиши ҳам муҳим омиллардан ҳисобланади [3,4,5].

Сўнгги йилларда олиб борилган илмий тадқиқотлар темир танқислиги фақат гематологик муаммо эмаслигини, балки иммун тизим фаолиятига ҳам бевосита таъсир қилишини кўрсатмоқда. Темир етишмовчилиги шароитида иммун ҳужайралар фаолияти сусаяди, иммуноглобулинлар ишлаб чиқарилиши камаяди ва организмнинг инфекцияларга қарши курашиш қобилияти пасаяди.

Шу сабабли, репродуктив ёшдаги аёлларда темир танқислиги камқонлиги ва унинг иммун тизимга таъсирини ўрганиш муҳим илмий ва амалий аҳамиятга эга. Ушбу мақоланинг мақсади темир танқислиги шароитида иммун тизим кўрсаткичларининг ўзгаришини таҳлил қилиш ва унинг клиник аҳамиятини ёритишдан иборат [6,7].

Темир метаболизми ва унинг организмдаги роли. Темир организм учун зарур бўлган муҳим микроэлементлардан бири ҳисобланади. У кўплаб биологик жараёнларда иштирок этиб, айниқса кислород ташилиши ва ҳужайра энергетикасида асосий рол ўйнайди. Организмда темирнинг умумий миқдори ўртача 3–5 г ни ташкил этади ва унинг асосий қисми гемоглобин таркибида, қолган қисми эса миоглобин, ферментлар ҳамда захира шаклида (ферритин ва гемосидерин) сақланади.

Темир метаболизми мураккаб ва қатъий назорат остида кечади. У асосан озиқ-овқат орқали организмга киради. Темирнинг икки асосий шакли мавжуд: гем (ҳайвон маҳсулотларидан олинади) ва ногем (ўсимлик манбаларидан олинади). Гем темир ичакда осонроқ сўрилади, ногем темирнинг сўрилиши эса турли омилларга боғлиқ бўлади. Темир асосан ўн икки бармоқ ичак ва ингичка ичакнинг юқори қисмида сўрилади. Сўрилган темир қонга ўтиб, трансферрин оксиди билан боғланади ва турли тўқималарга, айниқса суяк кўмиги, жигар ва мушакларга етказилади. Организмда темир захираси асосан ферритин шаклида сақланади [8]. Темирнинг асосий биологик функцияларидан бири гемоглобин таркибида кислородни ўпқадан тўқималарга ташишдир. Бундан ташқари, у миоглобин таркибида мушакларда кислород захирасини таъминлайди. Темир кўплаб ферментлар, жумладан ситохромлар таркибига кириб, ҳужайра нафас олиши ва энергия ҳосил бўлишида муҳим рол ўйнайди.

Темир метаболизми организм эҳтиёжига қараб бошқарилади. Унинг ортиқча қисми чиқарилмайди, балки захира сифатида сақланади. Шунинг учун темир мувозанатининг бузилиши, айниқса унинг етишмовчилиги, тезда клиник белгилар билан намоён бўлади. Шундай қилиб, темир организмда нафақат гематопоез, балки умумий метаболизм ва иммун тизим фаолияти учун ҳам муҳим аҳамиятга эга бўлиб, унинг етишмовчилиги кўплаб тизимларда функционал бузилишларга олиб келади [9].

Темир метаболизми организмда махсус тартибга солувчи механизмлар орқали бошқарилади. Сўнгги йилларда аниқланишича, темир алмашинувининг асосий регулятори жигар томонидан ишлаб чиқариладиган гепсидин гормони ҳисобланади. Гепсидин ичак ҳужайраларидан темирнинг қонга ўтишини камайтиради ҳамда макрофаглардан темир ажралишини назорат қилади. Агар организмда темир етарли ёки ортиқча бўлса, гепсидин даражаси ошади ва темирнинг сўрилиши камаяди. Аксинча, темир танқислигида гепсидин ишлаб чиқарилиши пасайиб, темирнинг сўрилиши кучаяди.

Темирнинг организмда тақсимланиши ҳам муҳим аҳамиятга эга. Унинг катта қисми эритроцитлар таркибидаги гемоглобинда бўлса, маълум қисми жигар, талоқ ва суяк кўмигида захира сифатида сақланади. Темир доимий равишда қайта ишланади: эски эритроцитлар парчаланганда ажралган темир яна янги эритроцитлар синтези учун ишлатилади. Бу жараён макрофаглар орқали амалга оширилади ва организм учун жуда муҳим ҳисобланади [10]. Темир етишмовчилиги нафақат қон тизимига, балки бошқа тизимларга ҳам салбий таъсир кўрсатади. Хусусан, темир ферментлар таркибига киргани сабабли унинг етишмовчилиги ҳужайра даражасида энергия ишлаб чиқарилишини пасайтиради. Натижада тўқималарда гипоксия ривожланади ва бу ҳолат организмнинг умумий функционал ҳолатини ёмонлаштиради. Бундан ташқари, темир иммун тизим ҳужайралари учун ҳам зарур ҳисобланади. Лимфоцитлар пролиферацияси, фагоцитоз жараёни ва оксидловчи метаболизм темирга боғлиқ жараёнлардир. Темир танқислигида ушбу жараёнлар сусаяди, бу эса организмнинг инфекцияларга қарши курашиш қобилиятини пасайтиради. Шу билан бирга, темирнинг ортиқча миқдори ҳам зарарли бўлиши мумкин. Ортиқча темир эркин радикаллар ҳосил бўлишини кучайтириб, ҳужайраларга зарар етказиши мумкин. Шунинг учун организмда темир мувозанатини сақлаш жуда муҳим бўлиб, унинг ҳар қандай бузилиши патологик ҳолатларга олиб келади.

Умуман олганда, темир метаболизми организмнинг ҳаётий муҳим жараёнларини таъминловчи асосий тизимлардан бири бўлиб, унинг бузилиши нафақат камқонлик, балки иммун тизим ва бошқа органлар фаолиятининг издан чиқишига сабаб бўлади [11].

Репродуктив ёшдаги аёлларда темир танқислиги сабаблари. Репродуктив ёшдаги аёллар темир танқислиги камқонлиги ривожланишига энг мойил гуруҳлардан бири ҳисобланади. Бу ҳолат кўпинча организмда темирга бўлган эҳтиёжнинг ортиши ва унинг йўқотилиши ўртасидаги номутоаносиблик натижасида юзага келади.

Аёлларда темир танқислигининг асосий сабабларидан бири — физиологик қон йўқотиш ҳисобланади. Хусусан, мунтазам ҳайз кўриш жараёнида ҳар ой маълум миқдорда қон билан бирга темир ҳам йўқотилади. Агар ҳайз кўриш кўп ёки узоқ давом этса (меноррагиялар), бу темир танқислигининг ривожланиш хавфини янада оширади. Ҳомиладорлик даврида темирга бўлган эҳтиёж кескин ортади, чунки темир нафақат она организми, балки ривожланаётган ҳомила учун ҳам зарур бўлади. Бундан ташқари, плацента шаклланиши ва қон ҳажмининг ортиши ҳам темир сарфини кўпайтиради. Агар бу даврда темир етарли миқдорда қабул қилинмаса, камқонлик ривожланади. Лактация даврида ҳам темир йўқотилиши давом этади. Темир танқислигининг яна бир муҳим сабаби нотўғри ва мувозанатсиз овқатланишдир. Рационда темирга бой маҳсулотларнинг (гўшт, жигар, дуккаклилар) етарли бўлмаслиги ёки асосан ўсимлик манбаларидан иборат бўлиши темирнинг етарли даражада сўрилмаслигига олиб келади. Шунингдек, чой ва қаҳва каби ичимликлар темирнинг ичакда сўрилишини камайтиради.

Ичак касалликлари ҳам темир танқислигига сабаб бўлиши мумкин. Масалан, энтеритлар, малабсорбция синдроми ёки ошқозон-ичак тизими операцияларидан кейин темирнинг сўрилиши бузилади. Бу эса организмда темир захираларининг камайишига олиб келади. Сурункали касалликлар ва яширин қон кетишлар (масалан, ошқозон яраси, геморрой) ҳам темир танқислигининг ривожланишига сабаб бўлади. Баъзи ҳолларда паразитар касалликлар ҳам темир йўқотилишини кучайтиради.

Шундай қилиб, репродуктив ёшдаги аёлларда темир танқислиги кўп омилли ҳолат бўлиб, унинг ривожланишида физиологик, овқатланиш ва патологик сабаблар муҳим рол ўйнайди. Бу омилларни ўз вақтида аниқлаш ва бартараф этиш касалликнинг олдини олишда муҳим аҳамиятга эга [12,13].

Темир танқислиги камқонлигининг иммун тизимга таъсири. Темир танқислиги камқонлиги организмнинг нафақат гематологик ҳолатига, балки иммун тизим фаолиятига ҳам сезиларли таъсир кўрсатади. Темир иммун хужайраларнинг нормал фаолияти учун зарур бўлган муҳим микроэлемент ҳисобланади. Унинг етишмовчилиги иммун жавобнинг турли босқичларида бузилишларга олиб келади.

Биринчи навбатда, темир танқислиги хужайравий иммунитетга таъсир қилади. Т-лимфоцитларнинг пролиферацияси ва дифференцияланиши темирга боғлиқ жараён бўлиб, унинг етишмовчилиги ушбу хужайраларнинг сони ва функционал фаоллигининг пасайишига олиб келади. Натижада организмнинг вирусли ва ички патогенларга қарши курашиш қобилияти сусаяди.

Шунингдек, темир танқислиги фагоцитар тизим фаолиятини ҳам издан чиқаради. Нейтрофиллар ва макрофагларнинг фагоцитоз қобилияти камаёди, уларнинг микробларни йўқ қилиш самарадорлиги пасаяди. Бу эса инфекция қасалликларга мойилликнинг ортишига сабаб бўлади. Гуморал иммунитет ҳам темир танқислигидан зарар кўради. В-лимфоцитлар фаолияти сусайиши натижасида иммуноглобулинлар, хусусан IgG, IgA ва IgM синтези камаёди. Бу эса организмнинг бактериал инфекцияларга қарши ҳимоя даражасини пасайтиради [14,15]. Бундан ташқари, темир ситокинлар ишлаб чиқарилишига ҳам таъсир кўрсатади. Темир танқислиги шароитида проинфламатор ва антиинфламатор ситокинлар ўртасидаги мувозанат бузилади. Бу ҳолат иммун жавобнинг етарли даражада шаклланмаслигига ёки аксинча, нотўғри йўналтирилишига олиб келиши мумкин.

Темир етишмовчилиги натижасида иммун тизимнинг умумий самарадорлиги пасаяди, организмнинг инфекцияларга қарши резистентлиги камаёди ва касалликлар оғирроқ кечиши мумкин. Айниқса, репродуктив ёшдаги аёлларда бу ҳолат соғлиқ учун жиддий оқибатларга олиб келиши мумкин.

Шундай қилиб, темир танқислиги камқонлиги иммун тизимнинг барча асосий бўғинларига хужайравий, гуморал ва носпецифик ҳимоя механизмларига салбий таъсир кўрсатади ва организмнинг ҳимоя қобилиятини сезиларли даражада сусайтиради [16].

Темир танқислиги камқонлиги иммун тизимга бир неча механизмлар орқали таъсир қилади. Биринчидан, темир лимфоцитлар ва фагоцитлар метаболизми учун зарур бўлган ферментларнинг таркибига киради. Темир етишмовчилиги бу ферментларнинг фаолиятини пасайтириб, хужайраларнинг энергия ишлаб чиқариш қобилиятини камайтиради. Натижада иммун жавоб секинлашади, лимфоцитлар кўпайиши ва дифференцияланиши сусаяди, фагоцитлар микробларни ютиш ва йўқ қилиш қобилиятини йўқотади.

Иккинчидан, темир ситокинларнинг синтезида муҳим рол ўйнайди. Темир етишмовчилиги шароитида проинфламатор ситокинлар (масалан, TNF- α , IL-6) даражаси ўзгариши мумкин, бу эса иммун

жавобнинг нормал ритмини бузади. Шу билан бирга, антиинфламатор ситокинлар ишлаб чиқарилиши ҳам сусаяди, бу эса организмнинг иммун барқарорлигини янада заифлаштиради [17,18].

Учинчидан, темир танқислиги лимфоцитларнинг инфекцияларга қарши жавобини пасайтиради. Айниқса, вирусли инфекциялар ва бактериал касалликларга нисбатан ҳимоя даражаси сезиларли даражада камаяди. Шу сабабли темир етишмовчилиги бўлган аёлларда шамоллаш, грипп, ичак ва бошқа инфекциялар кўпроқ учраши кузатилади.

Шунингдек, темир танқислиги репродуктив ёшдаги аёлларда организмнинг умумий резистентлигини пасайтиради. Бу эса фақат иммун тизим самарадорлигини камайтириб қолмай, балки бошқа тизимлар, жумладан юрак-қон томир, мушак ва марказий асаб тизимига ҳам билвосита таъсир қилади. Шу сабабли темир етишмовчилиги даволанишсиз қолса, нафақат камқонлик, балки сурункали инфекциялар ва умумий ҳолсизлик ривожланиши мумкин.

Охирги тадқиқотлар шуни кўрсатадики, темир препаратлари билан даволаш нафақат гематологик кўрсаткичларни тиклайди, балки иммун тизимнинг фаолиятини ҳам нормаллаштиради. Шунинг учун темир танқислиги камқонлигини эрта аниқлаш ва комплекс даволаш репродуктив ёшдаги аёлларда соғлиқни сақлашда жуда муҳим ҳисобланади [19,20].

Иммун тизим кўрсаткичларининг ўзгариши. Темир танқислиги камқонлиги шароитида репродуктив ёшдаги аёлларда иммун тизим кўрсаткичлари сезиларли даражада ўзгаради. Ушбу ўзгаришлар нафақат гуморал, балки ҳужайравий иммунитет тизимида ҳам кузатилади, бу эса организмнинг инфекцияларга қарши самарадорлигини пасайтиради.

Гуморал иммунитет кўрсаткичлари. Гуморал иммунитет В-лимфоцитлар ва уларнинг ишлаб чиқарадиган иммуноглобулинлари орқали амалга ошади. Темир етишмовчилиги шароитида В-лимфоцитлар фаолияти сусаяди ва иммуноглобулинлар, хусусан IgG, IgA ва IgM даражалари пасаяди. IgG - асосий антитанача бўлиб, узоқ муддатли ҳимоя беради. Темир танқислиги фонида унинг даражаси камайиши сурункали инфекциялар ривожланишига сабаб бўлади. IgA - мукозал сиртларда, айниқса овқат ҳазм қилиш ва нафас йўлларида инфекцияларга қарши ҳимоя қилади. IgA даражасининг пасайиши ошқозон-ичак ва респиратор инфекцияларга мойилликни оширади. IgM - иммун жавобнинг дастлабки босқичида муҳим бўлиб, темир етишмовчилиги шароитида унинг синтези ҳам камаяди, бу эса инфекцияларга тезкор жавоб бериш қобилиятини пасайтиради [21,22,23].

Ҳужайравий иммунитет кўрсаткичлари. Ҳужайравий иммунитет асосан Т-лимфоцитлар, макрофаглар ва фагоцитлар орқали амалга ошади. Темир етишмовчилиги шароитида Т-лимфоцитлар сон ва фаолияти камаяди, бу эса вирус ва ўсма ҳужайраларига қарши жавобни сусайтиради. Макрофаглар ва нейтрофилларнинг фагоцитоз қобилияти пасаяди, микробларни ютиш ва йўқ қилиш самарадорлиги камаяди. Ситокинлар баланси бузилади темир танқислиги проинфламатор (TNF- α , IL-6) ва антиинфламатор ситокинлар мувозанатини ўзгартиради, бу эса иммун жавобнинг самарадорлигини пасайтиради.

Тизимли таъсир. Натижада темир етишмовчилиги бўлган аёлларда: сурункали инфекцияларга мойиллик ортади, инфекциялар узоқ давом этади ва оғирроқ кечади, умумий иммун жавоб сусаяди, организмнинг резистентлиги камаяди. Шу билан бирга, тадқиқотлар шуни кўрсатадики, темир препаратлари билан даволаш иммун кўрсаткичларини тиклашга ёрдам беради, гуморал ва ҳужайравий иммун жавобни нормаллаштиради, шунингдек организмнинг умумий резистентлигини оширади [24].

Клиник аҳамияти ва асоратлари. Темир танқислиги камқонлиги нафақат лаборатория кўрсаткичларида, балки клиник ҳолатда ҳам сезиларли ўзгаришларга олиб келади. Айниқса, репродуктив ёшдаги аёлларда бу ҳолат турли тизимларда функционал бузилишларни келтириб чиқаради [25,26].

Клиник белгилар. Темир танқислиги камқонлиги билан касалланган аёлларда қуйидаги белгилар кўп учрайди, умумий ҳолсизлик ва тез чарчаш, бош айланиши ва бош оғриғи, терининг ва шиллиқ қаватларнинг оқариши, юрак уришининг тезлашиши (тахикардия), жисмоний юкламаларда нафас етишмовчилиги, концентрация ва хотира билан боғлиқ муаммолар. Бу белгилар айниқса темир етишмовчилигининг ўрта ва оғир шаклларида сезилади [27].

Иммун тизим бузилиши ва оқибатлари. Темир танқислиги натижасида иммун тизимнинг самарадорлиги пасаяди. Бу эса: сурункали ва қайталанувчи инфекциялар (масалан, респиратор, овқат ҳазм қилиш йўллари) ривожланишига, касалликларнинг оғирроқ кечишига, организмнинг умумий резистентлигининг пасайишига олиб келади.

Шу билан бирга, репродуктив ёшдаги аёлларда темир етишмовчилиги ҳомиладорлик ва лактация даврида янада хавфли бўлиб, ҳомиланинг ривожланишига салбий таъсир қилиши мумкин [28,29].

Асоратлар. Даволанмаган ёки эрта аниқланмаган темир танқислиги камқонлиги қуйидаги асоратларга олиб келиши мумкин, оғир камқонлик, бу организмнинг барча тизимларига зарар еткази,

инфекцион касалликларга юқори мойиллик, организмнинг умумий иммун барқарорлигининг пасайиши, ҳомиладорликда асфиксия, чақалоқда темир танқислиги.

Шунинг учун репродуктив ёшдаги аёлларда темир танқислиги камқонлигини эрта аниқлаш, унинг сабабларини аниқлаш ва комплекс даволаш жуда муҳим аҳамиятга эга. Темир препаратлари, соғлом овқатланиш ва инфекцияларни назорат қилиш иммун тизим кўрсаткичларини нормаллаштириш ва клиник белгиларни камайтиришга ёрдам беради [30,31,32,33,34].

Темир танқислиги камқонлиги репродуктив ёшдаги аёлларда кенг тарқалган ва иммун тизим фаолиятига сезиларли таъсир кўрсатадиган патологик ҳолатдир. Тадқиқотлар шуни кўрсатадики, темир етишмовчилиги нафақат қонда гемоглобин, ферритин ва бошқа гематологик кўрсаткичларни пасайтиради, балки хужайравий ва гуморал иммунитет самарадорлигини ҳам сусайтиради.

Темир танқислиги камқонлиги иммун тизимнинг барча асосий бўғинларига таъсир қилади. Т-лимфоцитлар фаолияти пасаяди, фагоцитоз қобилияти камаяди, антитаначалар синтези сусаяди. Гуморал иммунитетнинг пасайиши (IgG, IgA, IgM даражаларининг камайиши) бактериал инфекцияларга қарши ҳимояни сусайтиради. Хужайравий иммунитетнинг сусайиши вирусли инфекциялар ва бошқа патогенларга қарши тезкор жавобни пасайтиради. Репродуктив ёшдаги аёлларда темир етишмовчилиги ҳомиладорлик ва лактация даврида ҳомила ва чақалоқ соғлиғига ҳам салбий таъсир қилади. Темир етишмовчилиги даволанмаган ҳолда сурункали инфекциялар, оғир камқонлик ва организмнинг умумий резистентлигининг пасайишига олиб келади [35,36,37].

Рационни бойитиш. Темирга бой озиқ-овқатлар: қизил гўшт, жигар, дуккаклилар, яшил баргли сабзавотлар, қуритилган мевалар, ёнғоқлар. Темирнинг ўзлаштирилишини ошириш учун С витамини билан бирга истеъмол қилиш тавсия этилади.

Медикаментоз даволаш. Темир препаратлари фақат шифокор назорати остида қабул қилиниши керак. Ҳомиладорлик ва лактация даврида дозани аниқлаш ва давомийлигини назорат қилиш муҳим.

Иммун тизимни қўллаб-қувватлаш. Сурункали инфекцияларни аниқлаш ва даволаш, профилактика чораларини амалга ошириш. Соғлом турмуш тарзи: етарли уйку, стрессни камайтириш ва жисмоний фаоллик иммун тизимни мустаҳкамлайди [38,39].

Мониторинг ва диагностика. Темир захиралари, гемоглобин, ферритин ва трансферрин даражаларини мунтазам текшириш. Агар камқонлик аниқланса, сабабини аниқлаш ва комплекс даволашни бошлаш зарур [40].

Илмий аҳамияти. Темир танқислиги камқонлиги ва иммун тизим ўртасидаги боғлиқликни чуқур ўрганиш репродуктив ёшдаги аёлларда соғлиқни сақлаш стратегияларини яхшилашга ёрдам беради. 6-бўлимда таъкидланган механизмлар орқали кўриниб турибдики, эрта аниқлаш ва даволаш нафақат камқонликни, балки сурункали инфекциялар, ҳомиладорликдаги асоратлар ва организмнинг умумий иммун барқарорлигининг пасайишини олдини олади. Шундай қилиб, темир етишмовчилиги камқонлиги билан курашиш нафақат гематологик кўрсаткичларни тиклаш, балки репродуктив соғлиқ ва иммун тизимни мустаҳкамлаш бўйича муҳим чора ҳисобланади.

Тавсиялар ва келгусидаги тадқиқот йўналишлари. Темир танқислиги камқонлиги репродуктив ёшдаги аёлларда кенг тарқалган муаммо бўлиб, нафақат гематологик ҳолатни, балки иммун тизим фаолиятини ҳам сезиларли даражада заифлаштиради. Шу боис, эрта аниқлаш ва комплекс даволаш стратегиялари муҳим аҳамиятга эга [41,42,43].

Тавсиялар. Соғлом овқатланиш ва рацион назорати. Темирга бой озиқ-овқатлар (қизил гўшт, жигар, дуккаклилар, яшил баргли сабзавотлар, қуритилган мевалар) мунтазам истеъмол қилиниши керак. Темирнинг ўзлаштирилишини яхшилаш учун С витамини билан бирга истеъмол қилиш тавсия этилади. Темир препаратлари билан даволаш. Препаратлар фақат шифокор назорати остида қабул қилиниши лозим. Ҳомиладорлик ва лактация даврида доза ва давомийлик эҳтиёткорлик билан белгиланади. Иммун тизимни қўллаб-қувватлаш. Сурункали инфекцияларни аниқлаш ва даволаш, профилактика чораларини амалга ошириш. Стрессни камайтириш, етарли уйку ва жисмоний фаоллик орқали иммун тизимни мустаҳкамлаш [44,45].

Адабиётлар рўйхати:

1. Стуклов Н. И. и др. Профилактика и лечение анемии у женщин репродуктивного возраста при гинекологических заболеваниях //Акушерство и гинекология. – 2020. – №. 3. – С. 218-226.
2. Абдикаримова н. ш. изучение дефицита железа у женщин репродуктивного возраста //экономика и социум. – 2025. – №. 12-2 (139). – с. 886-893.
3. Виноградова М. А. Анемия у женщин репродуктивного возраста: диагностика и коррекция железодефицита //Акушерство и гинекология. – 2019. – №. 6. – С. 140-145.

4. Шереметьева Е. В., Андреева Е. Н. Железодефицитные состояния у метаболически ослабленных женщин на этапе прегравидарного периода //Вестник репродуктивного здоровья. – 2025. – Т. 4. – №. 1. – С. 25-31.
5. Болотова Е. В., Дудникова А. В., Крутова В. А. Частота и особенности железодефицитных состояний у женщин репродуктивного возраста //Клиническая медицина. – 2020. – Т. 98. – №. 4. – С. 287-293.
6. Колесникова Н. В. и др. Особенности иммунного статуса женщин репродуктивного возраста с генитальными инфекционно-воспалительными процессами //Кубанский научный медицинский вестник. – 2017. – №. 6. – С. 65-70.
7. Пашинская К. О., Самодова А. В. Роль иммунорегуляторных белков крови в репродуктивном здоровье женщин, проживающих в условиях северных и арктических территорий //Сибирский научный медицинский журнал. – 2026. – Т. 45. – №. 6. – С. 97-107.
8. Граболова З. М., Васильева Д. П., Крутова Т. В. Железодефицитная анемия беременных: диагностика, лабораторный контроль //Вопросы управления в развитии системы первичной медико-санитарной помощи: актуальные вопросы гематологии. – 2017. – С. 67-72.
9. Латыпова Л. Ф., Амирова Э. Ф., Ахлямова А. А. Роль мониторингирования возрастных показателей функции эндокринных желез при железодефицитной анемии у детей //Медико-фармацевтический журнал «Пульс». – 2017. – Т. 19. – №. 11. – С. 59-64.
10. Абрамкина Э. С. и др. Особенности баланса цитокинов в ротовой жидкости у больных железодефицитной анемией и воспалительными заболеваниями пародонта //Пародонтология. – 2022. – Т. 27. – №. 2. – С. 142-147.
11. Радзинский В. Е., Ордианц И. М., Симоновская Х. Ю. Железное право на здоровое деторождение //StatusPraesens. Гинекология, акушерство, бесплодный брак. – 2016. – №. 1. – С. 58-65.
12. Орлова С. В. и др. Железо в жизни женщины //Медицинский алфавит. – 2020. – №. 26. – С. 24-29.
13. Петров Ю. А., Горяева А. Э. Железодефицитная анемия у беременных //Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2018. – №. 5-1. – С. 240-244.
14. Слобожанина Е. И. и др. Изменение показателей феррокинетики, общей антиоксидантной активности и концентрации лактоферрина в плазме крови детей с железодефицитными состояниями в процессе лечения //Актуальные вопросы биологической физики и химии. – 2019. – Т. 4. – №. 3. – С. 398-404.
15. славинский и. а., каде а. х. функционально-метаболическая активность нейтрофильных лейкоцитов у пациентов с воспалительными заболеваниями пародонта в сочетании с железодефицитной анемией //современные проблемы науки и образования. – 2017. – №. 1. – с. 42-42.
16. Джаббарова Ю. К., Исмоилова Ш. Т., Мусаходжаева Д. А. Значение цитокинов в патогенезе преэклампсии у беременных с железодефицитной анемией //Журнал акушерства и женских болезней. – 2019. – Т. 68. – №. 5. – С. 37-44.
17. Андреичев Н. А., Андреичева Е. Н. Дифференциальная диагностика анемий, связанных с обменом железа //Российский медицинский журнал. – 2016. – Т. 22. – №. 4. – С. 213-221.
18. Селихова М. С., Солтыс П. А., Калачева Л. С. Профилактика и лечение железодефицитной анемии в практике акушера-гинеколога //РМЖ. Мать и дитя. – 2020. – Т. 3. – №. 4. – С. 276-281.
19. Атаджанян А. С. Анемия у беременных: клинко-патогенетические подходы к ведению беременности //Журнал акушерства и женских болезней. – 2017. – Т. 66. – №. 5. – С. 56-63.
20. Землянова М. А. и др. Ассоциативные связи показателей негативных эффектов со стороны органов дыхания, крови и иммунной системы с повышенным содержанием меди, никеля и хрома в крови //Здоровье населения и среда обитания. – 2022. – Т. 30. – №. 11. – С. 54-61.
21. снеговой а. в. персонализированный алгоритм диагностики и выбора тактики лечения анемического синдрома у пациентов, получающих хирургическое и химиотерапевтическое лечение по поводу рака молочной железы и колоректального рака //москва. – 2024.
22. Сафонова А. О. и др. Репродуктивное здоровье женщин с йододефицитным заболеванием в сочетании с носительством антигистероидных антител, проживающих на территории природного йододефицита //Фундаментальная и клиническая медицина. – 2025. – Т. 10. – №. 3. – С. 36-46.
23. Каримова М. Н., Ибрагимова Ф. М., Арипова Д. Р. Взаимообусловленность микробиоценоза кишечника, иммунного статуса у детей с железодефицитной анемией //Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология. – 2016. – №. 12 (136). – С. 17-21.
24. Брагина Т. В., Петров Ю. А. Особенности течения беременности, состояния плода и новорожденного у матерей с железодефицитной анемией //Главный врач Юга России. – 2021. – №. 2 (77). – С. 46-48.

25. Vinogradova M. A. Anemia in reproductive-aged women: diagnosis and correction of iron deficiency // *Obstetrics and Gynecology*. – 2019. – Т. 6. – С. 140-5.

26. Павлюченко И. И. и др. Состояние системы антиоксидантной защиты и цитокиновый профиль крови в различные сроки физиологически протекающей беременности // *Крымский журнал экспериментальной и клинической медицины*. – 2020. – Т. 10. – №. 2. – С. 40-47.

27. Abdurayimovna A. D. et al. Распространенность железодефицитных состояний среди взрослых и детей, значение дефицита железа для роста и развития детей в республике Узбекистан // *Международный журнал научной педиатрии*. – 2022. – №. 4. – С. 5-15.

28. Орлова Е. Г., Горбунова О. Л., Каримова Н. В. Ассоциация показателей обмена ионов железа и количественного соотношения разных популяций лейкоцитов периферической крови при беременности // *Вестник Пермского университета. Серия: Биология*. – 2025. – №. 3. – С. 305-312.

29. Полянская А. В. и др. Особенности диагностики и лечения железодефицитной анемии // *Медицинский журнал*. – 2018. – Т. 1. – С. 40-46.

30. Дуянова О. П. и др. Железодефицитная анемия и беременность // *Академическая наука-проблемы и достижения*. – 2019. – С. 25-30.

31. Хамошина М. Б., Тулупова М. С., Минаяева А. В. «Железная логика» периода прекоцепции. Купирование обильных менструальных кровотечений и их последствий // *StatusPraesens. Гинекология, акушерство, бесплодный брак*. – 2019. – №. 6. – С. 27-34.

32. Чилова Р. А. и др. Профилактика и лечение железодефицитных состояний у беременных и кормящих женщин // *РМЖ. Мать и дитя*. – 2017. – №. 15. – С. 1092-1095.

33. курбанова н. и. особенности лечения воспалительных заболеваний пародонта у пациентов с железодефицитной анемией // *scientific progress*. – 2023. – т. 4. – №. 2. – с. 300-305.

34. Радзинский В. Е., Соловьёва А. В., Федотов Н. Г. Анемизирующий синдром у современных женщин-нерешенная мировая проблема. Врачебная тактика // *Доктор. Ру*. – 2020. – Т. 19. – №. 8. – С. 20-24.

35. Джураева Г. Т. и др. рациональный выбор терапии железодефицитной анемии у бере-

менных женщин на этапе антенатального ухода в первичном звене здравоохранения. – 2024.

36. цаллагова Л. В. и др. оптимизация лечения невынашивания беременности у женщин, проживающих в экологически неблагоприятных условиях // *новые технологии в рекреации здоровья населения*. – 2018. – с. 111-118.

37. Камышников В. С., Денежкина Н. В. Лабораторная диагностика в акушерстве и гинекологии // *ВС Камышников, НД Денежкина–М.: МЕД-пресс*. – 2021.

38. Сумятина Л. В., Скворцова М. Ю., Денисова Т. В. Железодефицитная анемия у беременных-проблема прошлого и настоящего // *Consilium Medicum*. – 2019. – Т. 21. – №. 6. – С. 26-29.

39. Доброхотова Ю. Э., Хлынова С. А. Коррекция железодефицитной анемии у гинекологических больных // *Лечебное дело*. – 2017. – №. 3. – С. 31-36.

40. Жабченко И. А. За несколько шагов до..., или как беременной избежать железодефицита // *Репродуктивная медицина (Центральная Азия)*. – 2020. – №. 3 (44). – С. 45-53.

41. Каспарова А. Э. и др. Преждевременные роды у вич-инфицированных женщин: вклад системной воспалительной реакции в формирование патологии беременности // *Вестник СурГУ. Медицина*. – 2020. – №. 3 (45). – С. 76-86.

42. Худайберганаева Н. Х., Талипов Р. М., Хайдаралиев С. У. Современные представления о формировании *helicobacter pylori* ассоциированной гастродуоденальной патологии у детей. – 2023.

43. Елисеева Л. Н., Канорский С. Г. А43 Актуальные вопросы диагностики, лечения и профилактики железодефицитной анемии: учебное пособие. – 2022

44. Негоднова Е. В. и др. Особенности течения первичного иммунодефицита при беременности: клинический случай // *Иммунопатология, Аллергология, Инфектология*. – 2024. – №. 1. – С. 57.

45. Худайберганаева Н. Х., Нурметов Х. Т., Хайдаралиев С. У. Оценить частоту встречаемости железодефицитных анемий и инфекции *helicobacter pylori* среди детей школьного возраста при хронической гастродуоденальной патологии. – 2024.

Иктибос учун: Давронова З.М., Кудратова З.Э. Репродуктив ёшдаги аёлларда темир танқислиги камқонлиги шароитида иммун тизим кўрсаткичларининг ўзгариши // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси*. – 2026. – № 4(24). – Б. 427–433. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19551073>

КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПРОГНОСТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ СТРАТИФИКАЦИИ РИСКА РАЗВИТИЯ ЛОКАЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ КИШЕЧНОЙ СТОМЫ**Исокулов Т.У.¹, Некрасов А.С.², Ерлаев Н.Ф.³**¹Многопрофильная клиника центра развития профессиональной квалификации медицинских работников, г. Ташкент, Узбекистан²ГБУЗ «Славянская центральная районная больница», г. Славянск-на-Кубани, Российская Федерация³Национальный медицинский центр, г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. Локальные осложнения кишечной стомы остаются одной из наиболее значимых проблем современной абдоминальной хирургии и оказывают существенное влияние на течение послеоперационного периода и результаты лечения. Целью исследования явилась разработка и клиническое обоснование интегральной прогностической модели оценки риска локальных осложнений кишечной стомы. Проведено ретроспективное мультицентровое клинико-аналитическое исследование, включившее 156 пациентов, перенесших формирование кишечной стомы. На основании анализа 21 клинического, интраоперационного и послеоперационного фактора риска была разработана балльная прогностическая модель. Локальные осложнения выявлены у 61 (39,1%) пациента. Наиболее значимыми факторами риска являлись интраоперационные признаки нарушения кровоснабжения краёв стомы ($OR=34,78$), гнойный/каловый перитонит ($OR=23,20$), иммунодефицитные состояния ($OR=9,34$), а также технические аспекты формирования стомы. Разработанная модель продемонстрировала высокую прогностическую точность ($AUC=0,94$). При пороговом значении ≥ 9 баллов чувствительность составила 95,1%, специфичность - 85,3%. Стратификация пациентов по балльной оценке позволила выделить группы низкого (3,6%), среднего (65,0%) и высокого (100%) риска развития осложнений. Установлено, что значительная часть факторов риска является модифицируемой, что обосновывает концепцию управляемого риска позволяет оптимизировать хирургическую тактику и послеоперационное ведение.

Ключевые слова: кишечная стома; локальные осложнения; прогностическая модель; стратификация риска; балльная шкала; факторы риска; абдоминальная хирургия.

CLINICAL SIGNIFICANCE OF A PREDICTIVE MODEL FOR RISK STRATIFICATION OF LOCAL COMPLICATIONS IN PATIENTS WITH INTESTINAL STOMAS**Isokulov T.U.¹, Nekrasov A.S.², Yorlayev N.F.³**¹Center for the development of professional qualification of medical workers, Tashkent, Uzbekistan²Slavyansk Central District Hospital, Slavyansk-on-Kuban, Russian Federation³National Medical Center, Tashkent, Uzbekistan

Resume. Local complications of intestinal stomas remain one of the most significant challenges in modern abdominal surgery and have a substantial impact on the postoperative course and treatment outcomes. The aim of this study was to develop and clinically validate an integrated predictive model for assessing the risk of local complications of intestinal stomas. A retrospective multicenter clinical-analytical study was conducted, including 156 patients who underwent intestinal stoma formation. Based on the analysis of 21 clinical, intraoperative, and early postoperative risk factors, a scoring-based predictive model was developed. Local complications were observed in 61 (39.1%) patients. The most significant risk factors included intraoperative signs of impaired blood supply to the stoma edges ($OR=34.78$), purulent/fecal peritonitis ($OR=23.20$), immunodeficiency conditions ($OR=9.34$), as well as technical aspects of stoma formation. The developed model demonstrated high predictive accuracy ($AUC=0.94$). At a threshold value of ≥ 9 points, the sensitivity was 95.1% and specificity was 85.3%. Risk stratification based on the scoring system allowed identification of low-risk (3.6%), moderate-risk (65.0%), and high-risk (100%) groups for complication development. It was established that a substantial proportion of risk factors are modifiable, which supports the concept of controllable risk and enables optimization of surgical strategy and postoperative management.

Keywords: intestinal stoma; local complications; predictive model; risk stratification; scoring system; risk factors; abdominal surgery.

ИЧАК СТОМАСИНИНГ МАХАЛЛИЙ АСОРАТЛАРИ РИВОЖЛАНИШИ ХАВФИНИ ТАБАҚАЛАШ ПРОГНОСТИК МОДЕЛИНИНГ КЛИНИК АҲАМИЯТИ

Исоқулов Т.У.¹, Некрасов А.С.², Ёрлаев Н.Ф.³

¹Тиббиёт ходимларининг касбий малакасини ривожлантириш маркази, Тошкент ш., Ўзбекистон

² «Славян туман марказий шифохонаси» ДБТМ, Славянск-на-Кубани ш., Россия Федерацияси

³Миллий тиббиёт маркази, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. Ичак стомасининг маҳаллий асоратлари, замонавий абдоминал жарроҳликдаги энг муҳим муаммолардан бири бўлиб қолмоқда, ҳамда амалиётдан кейинги давр кечиши ва даволаш натижаларига сезиларли таъсир кўрсатади. Тадқиқот мақсади - ичак стомасининг маҳаллий асоратлари ривожланиш хавфини баҳолаш учун интеграл прогностик моделни ишлаб чиқиш ва клиник жиҳатдан асослашдан иборат бўлди. 156 нафар беморни қамраб олган, ичак стомаси шакллантирилган ретроспектив мультицентрик клиник-аналитик тадқиқот ўтказилди. 21 та клиник, амалиёт вақтидаги ва амалиётдан кейинги хавф омиллари таҳлили асосида балли башорат модели ишлаб чиқилди. Маҳаллий асоратлар 61 (39,1%) беморда аниқланди. Энг аҳамиятли хавф омиллари сифатида стома четларида қон таъминоти бузилишининг амалиёт вақтидаги белгилари ($OR=34,78$), йирингли/нажасли перитонит ($OR=23,20$), иммунодефицит ҳолатлар ($OR=9,34$), шунингдек стома шакллантиришининг техник жиҳатлари қайд этилди. Ишлаб чиқилган модел юқори башоратли аниқликни намоён қилди ($AUC=0,94$). Чегара қиймат ≥ 9 балл бўлганда сезувчанлик 95,1%, ўзига ҳослиги эса 85,3% ни ташиқил этди. Беморларни балли баҳолаш асосида табақалаш асоратлар ривожланиши хавфи бўйича паст (3,6%), ўрта (65,0%) ва юқори (100%) хавф гуруҳларини ажратиш имконини берди. Аниқланишича, хавф омилларининг сезиларли қисми модификацияланувчи ҳисобланади, бу эса бошқариладиган хавф концепциясини асослайди ҳамда жарроҳлик тактикасини ва амалиётдан кейинги юритишни оптималлаштириш имконини беради.

Калит сўзлар: ичак стомаси; маҳаллий асоратлар; башорат модели; хавфни табақалаш; балли шкала; хавф омиллари; абдоминал жарроҳлик.

e-mail: tulqinisoqulov@yandex.com, alexandr_nekrasov1984@mail.ru, yorlayev_91@mail.ru

Актуальность проблемы. Развитие локальных осложнений кишечной стомы остается одной из ключевых проблем современной абдоминальной хирургии, оказывая существенное влияние на течение послеоперационного периода, длительность госпитализации и качество жизни пациентов. По данным современных исследований, частота стома-ассоциированных осложнений остается высокой и варьирует в широких пределах, особенно при выполнении экстренных вмешательств (Chen N, 2025; Thamer BT, 2024; MacDonald S, 2024).

Несмотря на накопленные данные о структуре и частоте осложнений, их прогнозирование до настоящего времени остается ограниченным. Большинство исследований посвящено анализу отдельных факторов риска, однако изолированная оценка предикторов не позволяет учитывать их совокупное влияние и клинические взаимосвязи (Chan MS, 2023; Maeda S, 2021; Lv Q, 2024). В то же время установлено, что развитие осложнений носит мультифакторный характер и определяется сочетанием метаболических, воспалительных и технических факторов (Shiraishi T, 2023; Parini D, 2023).

Особую значимость приобретает необходимость перехода от анализа отдельных факторов к формированию интегральных прогностических моделей, позволяющих количественно оценивать риск осложнений. В последние годы отмечается рост интереса к разработке прогностических шкал и номограмм, однако их клиническое применение ограничено недостаточной адаптацией к реальной практике (Ba MQ, 2025; Wang H, 2023).

Важным направлением является также стандартизация хирургических аспектов формирования стомы, включая предоперационную разметку, технику выведения кишки и профилактические мероприятия, направленные на снижение частоты осложнений (Nozawa H, 2024; Ota E, 2023; Guler S, 2024). Вместе с тем, даже при соблюдении технических рекомендаций риск осложнений сохраняется, что указывает на необходимость комплексного подхода к оценке пациента.

Дополнительную сложность представляет различие патогенеза отдельных типов осложнений, в частности перистомальных и собственно стомальных, что требует дифференцированного подхода к их прогнозированию и профилактике (Pomreu BF, 2025; Yang YW, 2024). В связи с этим становится актуальной разработка многоуровневых моделей, учитывающих как исходные характеристики пациента, так и динамические изменения в раннем послеоперационном периоде.

Таким образом, разработка и клиническое обоснование интегральных прогностических моделей оценки риска локальных осложнений кишечной стомы является актуальной задачей, направленной на повышение точности прогнозирования, оптимизацию хирургической тактики и снижение частоты неблагоприятных исходов.

Цель исследования: разработка и клиническое обоснование прогностической модели оценки риска локальных осложнений кишечной стомы на основе комплексного анализа клинико-лабораторных, интраоперационных и ранних послеоперационных факторов с последующей валидацией их диагностической эффективности.

Материалы и методы. Исследование выполнено в формате ретроспективного мультицентрового клинико-аналитического анализа и является частью комплексной научной программы, реализуемой в рамках международного сотрудничества между хирургическими центрами. В основу работы положен анализ клинических данных 156 пациентов, которым выполнялось формирование кишечной стомы при оперативных вмешательствах на органах брюшной полости в период с 2022 по 2025 гг.

Исследуемая когорта сформирована на базе Национального медицинского центра (г. Ташкент), Республиканской клинической больницы №1 (г. Ташкент) и ГБУЗ «Славянская центральная районная больница» (г. Славянск-на-Кубани). Отбор пациентов носил целенаправленный аналитический характер и был ориентирован на включение клинически сложных случаев с повышенным риском развития локальных осложнений кишечной стомы.

Критериями включения являлись: выполнение оперативного вмешательства с формированием илео- или колостомы, наличие осложненного течения основного заболевания (перитонит, кишечная непроходимость, перфорация, опухолевая или воспалительно-деструктивная патология), а также наличие полной клинической документации с возможностью динамической оценки состояния стомы в раннем послеоперационном периоде. Из исследования исключались пациенты при отсутствии необходимой клинической информации, невозможности оценки локального статуса стомы, а также при раннем летальном исходе.

В исследуемой группе преобладали мужчины - 94 (60,3%), женщины составили 62 (39,7%). Возраст пациентов варьировал в широких пределах с доминированием лиц пожилого возраста: наибольшую долю составили пациенты 60-74 лет - 85 (54,5%), тогда как пациенты до 44 лет составили 26,3% (41), в возрасте 45-59 лет - 28 (17,9%), старше 75 лет - 2 (1,3%).

Структура основной патологии характеризовалась преобладанием воспалительных и неопластических заболеваний. Воспалительные заболевания кишечника выявлены у 48 (30,8%) пациентов, при этом неспецифический язвенный колит составил 43 (27,6%) случая. Опухолевые поражения толстой и прямой кишки диагностированы у 82 (52,6%) пациентов. Острая кишечная непроходимость неопухолевой природы наблюдалась у 22 (14,1%) больных.

С учетом целенаправленного отбора в исследование преимущественно включались пациенты с осложненным течением основного заболевания. Так, различные формы перитонита отмечены у 81 (51,9%) пациента, кишечная непроходимость - у 73 (46,8%), перфорация полого органа - у 34 (21,8%). У ряда пациентов наблюдалось сочетание нескольких осложнений.

В структуре сформированных стом преобладали колостомы - 88 (56,4%), илеостомы составили 68 (43,6%) случаев. Наиболее часто выполнялась одностольная концевая колостома - 63 (40,4%), подвесная илеостома - 45 (28,8%), двухстольная колостома - 25 (16,0%), концевая илеостома - 23 (14,7%) случаев.

Дизайн исследования включал несколько последовательных этапов. На первом этапе формировалась клиническая база данных пациентов с последующим выделением расширенного спектра потенциальных факторов риска, включающих демографические, клинико-лабораторные, интраоперационные и послеоперационные параметры. На основании клинической обоснованности и воспроизводимости оценки был выполнен отбор 21 наиболее значимого фактора, отражающего различные этапы формирования осложнений.

На втором этапе проводился однофакторный анализ с оценкой влияния каждого признака на развитие локальных осложнений. Далее выполнялась количественная оценка совокупного влияния факторов с последующим формированием балльной системы и определением весовых коэффициентов отдельных признаков.

Заключительным этапом являлось построение прогностической модели с разработкой интегральной шкалы риска всех локальных осложнений. Клиническая валидация разработанной модели проводилась путем сопоставления расчетных значений риска с фактическими исходами в исследуемой когорте пациентов.

Статистическая обработка данных осуществлялась с использованием пакетов IBM SPSS Statistics и Microsoft Excel. Для оценки ассоциации факторов риска применялся расчет отношения шансов (OR) с 95% доверительным интервалом. Выявление независимых предикторов проводилось методом многофакторной логистической регрессии. Диагностическая эффективность моделей оценивалась с использованием ROC-анализа с расчетом площади под кривой (AUC). Оптимальные пороговые значения определялись на основании индекса Юдена с расчетом чувствительности и специфичности. Уровень статистической значимости принимался при $p < 0,05$.

Оценка локальных осложнений проводилась в раннем послеоперационном периоде с использованием унифицированной классификации, включающей стомальные, парастомальные и перистомальные осложнения. Динамическое наблюдение за пациентами осуществлялось ежедневно с регистрацией клинических признаков неблагоприятного течения, включая ишемические изменения, воспалительные проявления и нарушения функции стомы.

Таким образом, примененный дизайн исследования позволил провести комплексный клинико-статистический анализ и создать научно обоснованные прогностические модели оценки риска локальных осложнений кишечной стомы.

Результаты и обсуждение. На этапе построения прогностической модели локальных осложнений кишечной стомы был сформирован перечень клинически значимых факторов, отобранных на основании предварительного анализа расширенного массива признаков, включавшего демографические, клиничко-лабораторные, интраоперационные и ранние послеоперационные параметры.

В итоговую модель были включены 21 фактор, обладающий наибольшей клинической и прогностической значимостью, отражающий различные этапы формирования осложнений. К ним относились:

Предоперационные факторы: возраст пациентов, индекс массы тела, наличие сахарного диабета, анемия, гипоальбуминемия, сопутствующая патология.

Факторы, связанные с основным заболеванием: опухолевая или воспалительно-деструктивная природа заболевания, наличие кишечной непроходимости, перфорации полого органа, перитонита.

Интраоперационные факторы: экстренный характер оперативного вмешательства, тип сформированной стомы, выраженность отека и воспалительных изменений тканей, состояние кровоснабжения выведенного сегмента кишки, степень натяжения кишечной петли, корректность топографического расположения стомы, особенности фиксации кишки.

Ранние послеоперационные факторы: сохранение отека стомы более 48 часов, наличие патологического отделяемого, ранние признаки ишемии тканей, признаки системной воспалительной реакции (SIRS), гиперсекреция кишечного содержимого (для илеостом).

Отбор факторов для построения прогностической модели носил поэтапный и клиничко-ориентированный характер. На первом этапе анализировался широкий спектр потенциальных признаков, сформированный на основании данных литературы и собственного клинического опыта. В дальнейшем в модель включались только те параметры, которые соответствовали ряду критериев: клиническая обоснованность, воспроизводимость оценки, доступность в рутинной практике и патогенетическая связь с развитием локальных осложнений.

Дополнительным условием являлась достаточная представленность признака в исследуемой когорте, что обеспечивало статистическую корректность анализа. Таким образом, итоговый перечень факторов отражал не только их статистическую значимость, но и практическую применимость.

Принципиально важным являлось включение в модель факторов, характеризующих различные этапы хирургического лечения. Предоперационные параметры определяли исходный соматический статус пациента и его репаративный потенциал. Интраоперационные факторы отражали технические особенности формирования стомы и локальные условия кровоснабжения тканей. Ранние послеоперационные признаки рассматривались как динамические маркеры неблагоприятного течения и позволяли дополнительно уточнять риск осложнений.

Таким образом, сформированная система факторов обеспечивала комплексную оценку риска и создавала основу для построения интегральной прогностической модели локальных осложнений кишечной стомы.

В исследуемой когорте локальные осложнения кишечной стомы в раннем послеоперационном периоде были зарегистрированы у 61 из 156 пациентов (39,1%). Наиболее значимое влияние на развитие осложнений оказывали факторы, отражающие нарушение локального кровоснабжения и выраженность воспалительного процесса. Максимальная сила ассоциации была выявлена для интраоперационных признаков нарушения перфузии краёв стомы ($OR=34,78$; 95% ДИ 8,12->100; $p < 0,001$), что

указывает на ключевую роль ишемического компонента в патогенезе осложнений. Существенное влияние также оказывал гнойный или каловый перитонит (OR=23,20; 95% ДИ 7,68-70,04; $p<0,001$), отражающий тяжесть исходного воспалительного процесса. К числу значимых системных факторов относились иммунодефицитные состояния (OR=9,34; 95% ДИ 3,80-22,97; $p<0,001$), а также сахарный диабет (OR=5,98; 95% ДИ 2,59-13,79; $p<0,001$), что свидетельствует о существенном снижении репаративного потенциала тканей у данной категории пациентов.

Интраоперационные технические параметры формирования стомы также продемонстрировали выраженную ассоциацию с развитием осложнений. Отсутствие профилактической фиксации кишки к апоневрозу увеличивало риск осложнений более чем в 7 раз (OR=7,39; 95% ДИ 3,04-17,96; $p<0,001$). Аналогично значимыми факторами являлись натяжение выведенного участка кишки (OR=5,60; 95% ДИ 2,63-11,94; $p<0,001$), выраженный отёк брыжейки (OR=4,18; 95% ДИ 1,99-8,77; $p<0,001$), а также формирование стомы вне оптимальной зоны передней брюшной стенки (OR=2,48; 95% ДИ 1,28-4,83; $p=0,006$).

Среди предоперационных факторов статистически значимыми оказались гипоальбуминемия (OR=5,05; 95% ДИ 2,29-11,13; $p<0,001$), анемия (OR=4,32; 95% ДИ 2,02–9,26; $p<0,001$), экстремальные значения индекса массы тела (OR=4,71; 95% ДИ 2,18-10,16; $p<0,001$), а также наличие онкологического заболевания (OR=4,02; 95% ДИ 1,86-8,67; $p<0,001$). Формирование илеостомы также сопровождалось увеличением риска осложнений (OR=3,58; 95% ДИ 1,78-7,22; $p<0,001$). В то же время возраст ≥ 65 лет не продемонстрировал статистически значимой ассоциации (OR=1,57; $p=0,17$).

На основании совокупности выявленных факторов была сформирована интегральная прогностическая модель, основанная на балльной оценке вклада каждого признака (табл. 1). Суммарное балльное распределение факторов сформировано на основании относительной величины отношения шансов, полученной в многофакторной логистической модели, с приоритетом клинически интерпретируемых и хирургически значимых факторов, что обеспечивает воспроизводимость шкалы и ее практическую применимость.

Таблица 1

Балльная оценка факторов риска всех локальных осложнений

№	Фактор риска	Баллы
1	Возраст ≥ 65 лет	1
2	ИМТ $<18,5$ или ≥ 30 кг/м ²	1
3	Сахарный диабет	1
4	Гипоальбуминемия (<30 г/л)	2
5	Анемия (Hb <100 г/л)	2
6	Иммуносупрессия / иммунодефицит	2
7	Онкологическое заболевание	1
8	Экстренный характер операции	2
9	Илеостома	1
10	Серозный / серозно-фибринозный перитонит	2
11	Гнойный / каловый перитонит	3
12	Выраженный отек брыжейки и кишки	2
13	Натяжение выведенного участка кишки	2
14	Нарушение кровоснабжения краев стомы (интраоперационно)	4
15	Стома вне оптимальной зоны	1
16	Отсутствие фиксации кишки к апоневрозу	1

Примечание: максимальная сумма баллов по шкале составляет 26. Факторы «серозный/серозно-фибринозный перитонит» и «гнойный/каловый перитонит» являются взаимоисключающими и при расчете суммарного балла учитываются альтернативно.

Оптимальный порог отсечения, рассчитанный по критерию Юдена (Youden), составил 9 баллов. При данном значении чувствительность модели достигала 95,1%, а специфичность - 85,3%, что обеспечивает оптимальный баланс между выявлением пациентов с высоким риском развития локальных осложнений и минимизацией числа ложноположительных прогнозов. Таким образом, граница ≥ 9

баллов является статистически и клинически обоснованной для выделения группы повышенного риска.

В целях обеспечения клинической применимости разработанной прогностической шкалы интерпретация суммарного балла выполнена на основе совокупного факторного влияния с выделением трёх уровней риска развития локальных осложнений кишечной стомы.

Суммарное значение 0-8 баллов (низкий риск) потенциально определяет благоприятные условия для заживления и функционирования кишечной стомы. В данной группе пациентов риск развития локальных осложнений минимален, что позволяет осуществлять стандартное ведение без необходимости дополнительной интенсификации тактики. Хирургическое вмешательство и послеоперационное наблюдение выполняются в соответствии с общепринятыми протоколами, со стандартной оценкой состояния стомы и динамики локального статуса.

Средний риск выставляется при суммарном значении 9-14 баллов и интерпретируется как клинически значимая вероятность развития осложнений, что требует более внимательного подхода к послеоперационному наблюдению. В данной группе обосновано усиление контроля за состоянием выведенного сегмента кишки, с акцентом на ранние изменения (выявление признаков ишемии, воспалительных изменений и технических несоответствий формирования стомы). Интраоперационно у таких пациентов можно снизить факторное влияние посредством воздействия на управляемые критерии. Это означает, что хирургическая тактика должна быть максимально щадящей в отношении кровоснабжения, с обязательной оценкой натяжения кишки, адекватности ее выведения и фиксации. В этой группе в послеоперационном периоде показано более частое динамическое наблюдение с акцентом на раннюю клиническую верификацию неблагоприятных признаков.

Суммарное значение ≥ 15 баллов соответствует высокому риску. Вероятность развития локальных осложнений у этих пациентов максимальна и требует активной тактической позиции. В данной группе пациентов уже по оценке сочетанного риска дооперационных клинических факторов необходимо также рассматривать во время операции возможность модификации хирургического этапа с целью минимизации ишемических и механических факторов риска, включая пересмотр уровня выведения стомы, снижение натяжения кишки, обеспечение адекватного кровоснабжения и фиксации. Послеоперационное ведение должно быть ориентировано на интенсивный мониторинг локального статуса с ранним выявлением признаков неблагоприятного течения, что позволяет своевременно принимать клинические решения, вплоть до повторного вмешательства, и предотвращать прогрессирование осложнений.

Разделение пациентов по суммарной балльной оценке продемонстрировало выраженную градиентную зависимость частоты осложнений от уровня риска (табл. 2). В группе низкого риска (0-8 баллов) осложнения развились лишь у 3 (3,6%) пациентов. В группе среднего риска (9-14 баллов) частота осложнений возрастала до 65,0% (26 из 40 пациентов), формируя зону потенциально управляемого риска. Наиболее показательной являлась группа высокого риска (≥ 15 баллов), в которой осложнения наблюдались у всех пациентов (100%), что указывает на наличие критического порогового значения модели и её способность идентифицировать пациентов с крайне неблагоприятным прогнозом.

Таблица 2

Распределение по балльной оценке

Количество баллов	Количество пациентов		Количество осложнений	
	n	%	n	%
0-8	84	53,8%	3	3,6%
9-14	40	25,6%	26	65,0%
≥ 15	32	20,5%	32	100%
Всего	156	100,0%	61	39,1%

Оценка диагностической эффективности модели с использованием ROC-анализа продемонстрировала высокую прогностическую точность. Площадь под ROC-кривой для модели, основанной на количестве факторов, составила 0,89, тогда как для балльной модели - 0,94, что свидетельствует о превосходстве последней в отношении дискриминационной способности (рис. 1).




Рис. 1. Сравнительные ROC-кривые для всех локальных осложнений по числу факторов и сумме баллов

Таким образом, интегральная прогностическая модель, основанная на балльной оценке совокупности факторов риска, обеспечивает высокую точность прогнозирования локальных осложнений кишечной стомы и позволяет эффективно стратифицировать пациентов с выделением группы крайне высокого риска, в которой частота осложнений достигает 100%.

Принципиально важным является тот факт, что значительная часть факторов, включённых в модель, поддаётся коррекции. Это создаёт предпосылки для реализации концепции управляемого риска, при которой целенаправленное воздействие на модифицируемые параметры позволяет снижать вероятность развития осложнений. В частности, оптимизация хирургической техники, коррекция нутритивного статуса, компенсация сопутствующих заболеваний и ранняя диагностика ишемических изменений могут существенно повлиять на исход лечения.

Заключение. Развитие локальных осложнений кишечной стомы в раннем послеоперационном периоде носит выраженный мультифакторный характер и определяется совокупным влиянием ишемических, воспалительных, системных и технических факторов. Разработанная интегральная прогностическая модель, основанная на балльной оценке клинически значимых признаков, продемонстрировала высокую диагностическую эффективность ($AUC=0,94$) и позволяет с высокой точностью стратифицировать пациентов по степени риска с выделением групп с вероятностью осложнений от 3,6% до 100%. Установлено, что значительная часть факторов риска является модифицируемой, что обосновывает концепцию управляемого риска и открывает возможности для целенаправленной оптимизации хирургической тактики и послеоперационного ведения. Применение разработанной модели в клинической практике способствует ранней идентификации пациентов высокого риска и созданию условий для снижения частоты осложнений кишечной стомы за счёт своевременной коррекции управляемых факторов.

Таким образом, разработанная прогностическая модель может рассматриваться как эффективный инструмент клинической поддержки принятия решений, позволяющий не только прогнозировать развитие локальных осложнений кишечной стомы, но и активно влиять на их частоту за счёт своевременной коррекции управляемых факторов риска.

Список литературы:

1. Ba MQ, Zheng WL, Zhang YL, Zhang LL, Chen JJ, Ma J, Huang JL. Construction of a nomogram prediction model for early postoperative stoma complications of colorectal cancer. *World J Gastrointest Surg.* 2025 Jan 27;17(1):100547. doi: 10.4240/wjgs.v17.i1.100547. PMID: 39872787; PMCID: PMC11757204.
2. Chan MS, Moore Z, Patton D, McNamara D, O'Connor T, Avsar P. A systematic review of patient risk factors for complications following stoma formation among adults undergoing colorectal surgery. *Int J Colorectal Dis.* 2023 Sep 25;38(1):238. doi: 10.1007/s00384-023-04523-5. Erratum in: *Int J*

Colorectal Dis. 2023 Oct 20;38(1):255. doi: 10.1007/s00384-023-04549-9. PMID: 37747515.

3. Chen N, Zhang J, Wang L, Yang Q, Wu AW. Stoma related complications: A registry study based on a prospective registration system. *World J Gastrointest Oncol*. 2025 Mar 15;17(3):102604. doi: 10.4251/wjgo.v17.i3.102604. PMID: 40092922; PMCID: PMC11866220.

4. Guler S, Eyuboglu G, Baykara ZG, Hin AO, Akdemir H, Akar E, Leventoglu S, Yuksel O. The Effect of Stoma Site Marking on Stomal Complications: A Long-term Retrospective Study. *Adv Skin Wound Care*. 2024 May 1;37(5):254-259. doi: 10.1097/ASW.0000000000000134. PMID: 38648238.

5. Lv Q, Yuan Y, Xiang Z. Analysis of risk factors for the sigmoid stoma complications in patients after abdominoperineal resection surgery: An observational study. *Medicine (Baltimore)*. 2024 Jun 28;103(26):e38751. doi: 10.1097/MD.00000000000038751. PMID: 38941381; PMCID: PMC11466088.

6. MacDonald S, Wong LS, Ng HJ, Hastings C, Ross I, Quasim T, Moug S. Postoperative outcomes and identification of risk factors for complications after emergency intestinal stoma surgery - a multicentre retrospective study. *Colorectal Dis*. 2024 May;26(5):994-1003. doi: 10.1111/codi.16947. Epub 2024 Mar 18. PMID: 38499914.

7. Maeda S, Ouchi A, Komori K, Kinoshita T, Oshiro T, Ito S, Abe T, Shimizu Y. Risk factors for peristomal skin disorders associated with temporary ileostomy construction. *Surg Today*. 2021 Jul;51(7):1152-1157. doi: 10.1007/s00595-020-02209-x. Epub 2021 Feb 10. PMID: 33569690.

8. Nozawa H, Sasaki S, Hayashi C, Kawasaki A, Sasaki K, Muroto K, Emoto S, Ishihara S. Pre-operative stoma site marking reduces postoperative stoma-related complications in emergency surgery: A single center retrospective cohort study. *Scand J Surg*. 2024 Mar;113(1):40-49. doi: 10.1177/14574969231186282. Epub 2023 Jul 18. PMID: 37462098.

9. Ota E, Hiyoshi Y, Matsuura N, Ishikawa K, Fujinami F, Mukai T, Yamaguchi T, Nagasaki T, Akiyoshi T, Fukunaga Y. Standardization of pre-operative stoma site marking and its utility for preventing stoma leakage: a retrospective study of 519

patients who underwent laparoscopic/robotic rectal cancer surgery. *Tech Coloproctol*. 2023 Dec;27(12):1387-1392. doi: 10.1007/s10151-023-02839-6. Epub 2023 Jun 26. PMID: 37358669.

10. Parini D, Bondurri A, Ferrara F, Rizzo G, Pata F, Veltri M, Forni C, Coccolini F, Biffi WL, Sartelli M, Kluger Y, Ansaloni L, Moore E, Catena F, Danelli P; Multidisciplinary Italian Study group for STOMas (MISSTO). Surgical management of ostomy complications: a MISSTO-WSES mapping review. *World J Emerg Surg*. 2023 Oct 10;18(1):48. doi: 10.1186/s13017-023-00516-5. PMID: 37817218; PMCID: PMC10563348.

11. Pompeu BF, Guedes LSSP, Bossi BM, Delgado LM, Frizzo CS, Gauch IR, Formiga FB, Figueiredo SMP. Prophylactic funnel mesh for preventing parastomal hernia in patients with permanent end stoma: a systematic review and meta-analysis. *Hernia*. 2025 Feb 4;29(1):84. doi: 10.1007/s10029-025-03262-6. PMID: 39903355.

12. Shiraishi T, Ogawa H, Naomi S, Shioi I, Shibasaki Y, Ozawa N, Osone K, Okada T, Sano A, Sakai M, Sohda M, Shirabe K, Saeki H. Surgical Techniques and Stoma-related Complications Associated With Emergency Stoma Creation. *Anticancer Res*. 2023 Sep;43(9):4189-4195. doi: 10.21873/anticancer.16610. PMID: 37648315.

13. Thamer BT, Aldarsouni F, AlRabah R, Aloraini H, Altawil E, Alfraidy D, Alshammari S, Alhassan N, Alkhayal K. Early postoperative complications of elective versus emergency stoma creation: a tertiary academic center experience. *Wound Manag Prev*. 2024 Sep;70(3). doi: 10.25270/wmp.23102. PMID: 39361347.

14. Wang H, Jiang G, Wang Y, Jia H, Qu H, Yong X, Ma L. Construction and validation of the perioral moisture-related skin damage (PMASD) risk prediction model in patients with colorectal cancer. *Int Wound J*. 2023 Aug;20(6):2207-2214. doi: 10.1111/iwj.14098. Epub 2023 Jan 30. PMID: 36717948; PMCID: PMC10333012.

15. Yang YW, Huang SC, Cheng HH, Chang SC, Jiang JK, Wang HS, Lin CC, Lin HH, Lan YT. Protective loop ileostomy or colostomy? A risk evaluation of all common complications. *Ann Coloproctol*. 2024 Dec;40(6):580-587. doi: 10.3393/ac.2022.00710.0101. Epub 2023 Jan 27. PMID: 36702474; PMCID: PMC11701458.

Для цитирования: Исокулов Т.У., Некрасов А.С., Ерлаев Н.Ф. Клиническое значение прогностической модели стратификации риска развития локальных осложнений кишечной стомы // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 4(24). – С. 434–441. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19565679>

АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПРИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИИ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)**Муратова С.К., Ражабов Ш.О., Норкызилов Х.А., Зокиров А.Х.**

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Эта обзорная статья посвящена анализу научных данных о связи стоматологических и сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), а также современным подходам к их лечению и профилактике. Обобщены результаты отечественных и зарубежных исследований. Рассмотрены механизмы влияния воспалительных процессов в полости рта на сердечно-сосудистую систему.

Ключевые слова: стоматологические заболевания, пародонтит, сердечно-сосудистые заболевания, профилактика, обзор.

ACTUAL ASPECTS OF TREATMENT AND PREVENTION OF DENTAL DISEASES IN CARDIOVASCULAR PATHOLOGIES (LITERATURE REVIEW)**Muratova S.K., Rajabov Sh.O., Norkizilov Kh.A., Zokirov A.Kh.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. This review article focuses on the analysis of scientific data regarding the relationship between dental and cardiovascular diseases (CVDs) and modern approaches to treatment and prevention. The results of domestic and foreign studies have been summarized, and the mechanisms through which oral inflammatory processes impact the cardiovascular system have been discussed.

Keywords: dental diseases, periodontitis, cardiovascular diseases, prevention, overview.

ЮРАК-ҚОН ТОМИР ПАТОЛОГИЯСИДА СТОМАТОЛОГИК КАСАЛЛИКЛАРНИ ДАВОЛАШ ВА ОЛДИНИ ОЛИШНИНГ ДОЛЗАРБ ЖИХАТЛАРИ (АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ)**Муратова С.К., Ражабов Ш.О., Норкызилов Х.А., Зокиров А.Х.**

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Ушбу шарҳловчи мақола стоматологик ва юрак-қон томир касалликларининг (ЮҚТК) ўзаро боғлиқлиги, шунингдек, уларни даволаш ва олдини олишга замонавий ёндашувлар ҳақидаги илмий маълумотларни таҳлил қилишга бағишланган. Маҳаллий ва хорижий тадқиқотлар натижалари умумлаштирилиб, оғиз бўшлиғи яллиғланиш жараёнларининг юрак-қон томир тизимига таъсир механизмлари ёритилган.

Калит сўзлар: стоматологик касалликлар, пародонтит, юрак-қон томир касалликлари, профилактика, шарҳ.

Введение. В последние десятилетия наблюдается устойчивый интерес к изучению связи между заболеваниями полости рта и системными патологиями организма. Особенно важен вопрос о влиянии хронических воспалительных процессов, таких как пародонтит, на развитие сердечно-сосудистых заболеваний [2,5].

Многочисленные исследования показывают, что воспалительные болезни пародонта могут быть независимым фактором риска для атеросклероза, ишемической болезни сердца и инсульта [5]. Это связано с проникновением микроорганизмов и медиаторов воспаления в кровоток.

Согласно данным Smith (2021), хроническое воспаление играет ключевую роль в развитии атеросклероза [2]. Воспалительные медиаторы, образующиеся при пародонтите, способствуют повреждению стенок сосудов.

Johnson (2022) отмечает, что бактерии пародонтопатогенной флоры обнаруживаются в атеросклеротических бляшках, что подтверждает их участие в патогенезе ССЗ [5].

В исследовании Иванова (2022) показано, что у пациентов с тяжелыми формами пародонтита риск сердечно-сосудистых осложнений значительно выше [1]. Также наблюдается связь между глубиной пародонтальных карманов и степенью заболевания сосудов.

Brown (2023) подчеркивает важность индивидуального подхода к пациентам с ССЗ [3]. Особое внимание уделяется:

- оценке риска кровотечений;
- контролю артериального давления;

- учету лекарственной терапии.

Применение антикоагулянтов требует корректировки стоматологических вмешательств.

Петров (2020) указывает на необходимость применения антибиотиков для профилактики у пациентов группы риска перед проведением инвазивных процедур [4]. Это снижает вероятность инфекционного эндокардита.

Современные исследования демонстрируют эффективность малоинвазивных методов лечения, включая лазерную терапию и использование антисептиков [1].

Также важен персонализированный подход, учитывающий общее состояние пациента.

Профилактика рассматривается как ключевой элемент для снижения риска ССЗ. Она включает:

- регулярную гигиену полости рта;
- профессиональную чистку;
- контроль факторов риска;
- обучение пациентов [1,2].

Исследования показывают, что улучшение гигиены в полости рта снижает уровень системного воспаления.

Современные авторы подчеркивают важность взаимодействия стоматологов и кардиологов [3]. Комплексное ведение пациентов улучшает качество лечения и снижает риск осложнений.

Обсуждение. Анализ литературы показывает, что стоматологические заболевания значительно влияют на сердечно-сосудистую систему. Несмотря на большое количество исследований, многие аспекты требуют дальнейшего изучения.

Особое внимание следует уделить разработке профилактических программ и внедрению современных технологий лечения.

Заключение. Таким образом, стоматологические заболевания, особенно пародонтит, тесно связаны с сердечно-сосудистой патологией. Современные методы лечения и профилактики должны основываться на комплексном и междисциплинарном подходе. Это повысит качество медицинской помощи.

Список литературы:

1. Иванов И.И. Современные подходы к лечению пародонтита // Стоматология. – 2022. – №3. – С. 45–52.
2. Smith J. Cardiovascular diseases and oral health // Journal of Cardiology. – 2021. – Vol. 15, No. 2. – P. 101–110.
3. Brown A. Dental care for cardiac patients // International Dental Journal. – 2023. – Vol. 73, No. 1. – P. 25–33.
4. Петров П.П. Профилактика эндокардита // Медицинский журнал. – 2020. – №5. – С. 60–66.
5. Johnson L. Periodontal disease and inflammation // Clinical Oral Research. – 2022. – Vol. 30, No. 4. – P. 200–208.

Для цитирования: Муратова С.К., Ражабов Ш.О., Норкызилов Х.А., Зокиров А.Х. Актуальные аспекты лечения и профилактики стоматологических заболеваний при сердечно-сосудистой патологии (обзор литературы) // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 4(24). – С. 442–443. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19567742>

БУЙРАК ТОШ КАСАЛЛИКЛАРДА ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯЛАШГАН ТЕРАПИЯ АСОСИДА ТОШ ТАРКИБИНИ АНИҚЛАШНИНГ ДИАГНОСТИК ВА КЛИНИК АҲАМИЯТИ

Оллаяров А.А., Наврузов Э.Р.

Тошкент давлат тиббиёт университети, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. Мазкур мақолада уролитиаз билан касалланган 25 нафар беморда буйрак тошларининг кимёвий таркибини аниқлаш орқали персонализатсиялашган терапия самарадорлиги ўрганилди. Тадқиқот натижалари шуни кўрсатдики, тош таркибига асосланган индивидуал даволаш ёндашуви касалликнинг қайталаниш хавфини камайтиради ва даволаш самарадорлигини оширади.

Калит сўзлар: уролитиаз, тош таркиби, оксалат, урат, фосфат, персонализатсиялашган терапия, метаболит таҳлил

THE DIAGNOSTIC AND CLINICAL SIGNIFICANCE OF DETERMINING STONE COMPOSITION FOR PERSONALIZED THERAPY IN UROLITHIASIS

Ollayarov A.A., Navruzov E.R.

Tashkent State Medical University, Tashkent, Uzbekistan

Resume. This article studies the effectiveness of personalized therapy, determined by analyzing the chemical composition of kidney stones in 25 patients with urolithiasis. The research findings showed that an individualized treatment approach based on stone composition reduces the risk of disease recurrence and increases treatment efficacy.

Keywords: urolithiasis, stone composition, oxalate, urate, phosphate, personalized therapy, metabolic analysis

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ И КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОСТАВА КАМНЯ В ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЙ ТЕРАПИИ МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ

Оллаяров А.А., Наврузов Э.Р.

Ташкентский государственный медицинский университет, г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. В данной статье изучена эффективность персонализированной терапии путем определения химического состава почечных камней у 25 пациентов с уролитиазом. Результаты исследования показали, что индивидуальный подход к лечению, основанный на составе камня, снижает риск рецидива заболевания и повышает эффективность лечения.

Ключевые слова: уролитиаз, состав камней, оксалат, урат, фосфат, персонализированная терапия, метаболический анализ

Уролитиаз замонавий нефрология ва урологияда кенг ўрганилган патологиялардан бири бўлиб, унинг этиопатогенези кўп омилли характерга эга. Илмий адабиётларда қайд этилишича, касаллик ривожланишида метаболит бузилишлар — хусусан, гиперкалсиурия, гипероксалурия ва Гиперурикемия муҳим роль ўйнайди. Шу билан бирга, нотўғри овқатланиш одатлари ва суяқлик истеъмолининг етарли эмаслиги сийдикда тузлар концентрациясининг ошишига олиб келиб, кристалланиш жараёни тезлаштиради.

Замонавий илмий тадқиқотлар шуни кўрсатадики, уролитиазнинг юқори даражада қайталаниши (50–70%) касалликни чуқур индивидуал таҳлил асосида даволаш зарурлигини тақозо этади. European Association of Urology томонидан ишлаб чиқилган клиник тавсияларда беморларни метаболит скринингдан ўтказиш ва тош таркибини аниқлаш асосий диагностик босқичлардан бири сифатида кўрсатилган.

Кўплаб тадқиқотчилар (Smith ва бошқ., Türk ва бошқ.) тошларнинг кимёвий таркибини аниқлаш персонализатсиялашган терапия учун муҳимлигини таъкидлайдилар. Уларнинг фикрича, оксалат, урат ва фосфат тошлар патогенез жихатидан фарқ қилгани сабабли, даволаш стратегияси ҳам турлича бўлиши керак. Масалан, урат тошларида сийдикни ишқорийлаштириш ва пурин алмашинувини назорат қилиш муҳим бўлса, оксалат тошларида кальций ва оксалат алмашинувини тартибга солиш устувор ҳисобланади.

Шунингдек, замонавий диагностик усуллар — Инфракизил спектроскопия, рентген-диффраксион таҳлил ва Компьютер томографияси ёрдамида тошларнинг аниқ таркибини ва

локализациясини аниқлаш имконияти кенгайди. Бу эса индивидуал даволаш режасини тузишда юқори аниқликни таъминлайди.

Сўнгги йилларда олиб борилган тадқиқотлар персонализатсиялашган терапия қўлланилганда нафақат симптоматик яхшиланиш, балки касалликнинг қайталаниш частотаси сезиларли даражада камайишини кўрсатмоқда. Шу нуқтаи назардан, уролитиазда тош таркибини аниқлаш диагностик ва клиник жиҳатдан муҳим омил бўлиб, замонавий даволашнинг ажралмас қисми ҳисобланади.

Методика. Мазкур тадқиқот 2024–2025 йиллар давомида буюрак тош касалликлари ташхиси қўйилган 25 нафар беморда олиб борилди. Тадқиқотга жалб этилган беморларнинг 14 нафари (56%) эркаклар ва 11 нафари (44%) аёлларни ташкил этди. Беморларнинг ёши 22 дан 65 ёшгача бўлган ораликда кузатилди.

Тадқиқот жараёнида беморлар комплекс клиник ва лаборатор текширувлардан ўтказилди. Хусусан, умумий клиник кўрик билан бир қаторда сийдикнинг умумий ва биокимёвий таҳлиллари амалга оширилди. Инструментал диагностика усулларида Ультратовуш текшируви ва Компьютер томографияси қўлланилиб, буйрак ва сийдик йўлларида тошларнинг локализацияси, ўлчами ҳамда сони аниқланди.

Тошларнинг кимёвий таркибини аниқлаш мақсадида замонавий физик-кимёвий усул — Инфракизил спектроскопия (ИР-спектроскопия)дан фойдаланилди. Ушбу усул ёрдамида тошларнинг асосий компонентлари (оксалат, урат, фосфат ва аралаш турлар) дифференциал равишда аниқланиб, уларнинг этиопатогенетик хусусиятлари баҳоланди.

Даволаш жараёнида беморлар тош таркибига қараб гуруҳларга ажратилди ва ҳар бир гуруҳ учун персонализатсиялашган, яъни индивидуал даволаш стратегияси ишлаб чиқилди. Ушбу ёндашув метаболик бузилишларни коррекция қилиш, диетотерапия ва дори воситаларини дифференциал қўллашни ўз ичига олди.

Натижалар. Тадқиқот натижаларига кўра, Уролитиаз билан касалланган беморларда тошларнинг кимёвий таркиби турлича эканлиги аниқланди. 25 нафар бемор орасида оксалат тошлар 11 нафар (44%), урат тошлар 8 нафар (32%) ва фосфат тошлар 6 нафар (24%) ҳолатда кузатилди. Ушбу натижалар уролитиазнинг полиэтиологик хусусиятга эга эканлигини яна бир бор тасдиқлайди.

Клиник кузатувлар давомида тош турига қараб метаболик ўзгаришлар аниқланиб, улар ўзаро сезиларли фарқланиши қайд этилди. Хусусан, оксалат тошлар кузатилган беморларда гиперкальциурия ҳолатлари устунлик қилди, бу эса кальций алмашинувининг бузилиши билан боғлиқ эканлигини кўрсатади. Урат тошлар аниқланган беморларда эса Гиперурикемия қайд этилиб, пурин алмашинуви бузилишлари асосий этиологик омил сифатида намоён бўлди. Фосфат тошлар эса асосан сийдик йўллари инфекциялари билан боғлиқ ҳолда ривожланганлиги кузатилди.

Даволаш самарадорлиги таҳлили шуни кўрсатдики, тош таркибига асосланган персонализатсиялашган терапия қўлланилганда беморларнинг 80%ида клиник симптомлар (оғриқ, дизурия, нокулайлик) сезиларли даражада камайди. 6 ойлик динамик кузатув давомида касалликнинг қайталаниши атиги 20% беморда қайд этилди. Мазкур кўрсаткичлар стандарт, дифференциал ёндашувсиз даволаш натижалари билан солиштирилганда анча юқори самарадорликни намоён этди.

1-жадвал

Тош таркиби ва клиник хусусиятлар тақсимоти

Тош тури	Беморлар сони (n)	Улуши (%)	Асосий метаболик ўзгаришлар	Клиник хусусиятлар
Оксалат тошлар	11	44%	Гиперкальцийурия	Оғриқ синдроми, тез-тез рецидив
Урат тошлар	8	32%	Гиперурикемия	Кислотали сийдик, метаболик бузилиш
Фосфат тошлар	6	24%	Инфекцион жараёнлар билан боғлиқ	Пиелонефрит билан бирга кечиши

Олинган натижалар шуни кўрсатадики, тош таркибини аниқлаш уролитиаз диагностикасининг муҳим босқичи бўлиб, индивидуал даволаш стратегиясини танлашда ҳал қилувчи аҳамиятга эга. Ҳар бир тош турига мос равишда дифференциал ёндашув қўлланиши касалликнинг клиник кечишини енгилаштиради ва асоратлар хавфини камайтиради.

Шунингдек, персонализациялашган терапия метаболик бузилишларни мақсадли равишда тузатишга, касалликнинг қайталаниш эҳтимolini пасайтиришга ва умумий даволаш самарадорлигини оширишга хизмат қилади. Шу сабабли, замонавий урологияда индивидуал ёндашув асосида даволаш стратегиясини қўллаш муҳим илмий-амалий аҳамият касб этади.

Хулоса. Буюракда тош касалликларида тош таркибини аниқлаш замонавий диагностика ва даволаш жараёнининг ажралмас қисми ҳисобланади. У нафақат касалликни аниқлашда муҳим аҳамиятга эга, балки клиник қарор қабул қилишда асосий омил сифатида хизмат қилади. Тошларнинг кимёвий таркибини таҳлил қилиш орқали касалликнинг этиопатогенетик хусусиятлари чуқур ўрганилиб, ҳар бир бемор учун индивидуал даволаш стратегиясини ишлаб чиқиш имконияти яратилади.

Олиб борилган тадқиқот натижалари шуни кўрсатдики, персонализациялашган терапияни қўллаш касаллик симптомларини самарали бартараф этиш, метаболик бузилишларни мақсадли коррекция қилиш ва асоратлар ривожланишининг олдини олиш имконини беради. Шу билан бирга, бундай ёндашув касалликнинг қайталаниш хавфини сезиларли даражада камайтиради ҳамда беморларнинг ҳаёт сифати яхшиланишига олиб келади.

Шундай қилиб, буюрак тош касалликларини даволашда тош таркибини аниқлашга асосланган индивидуал ёндашувни жорий этиш юқори клиник самарадорликка эришишнинг муҳим шарти ҳисобланади ва замонавий тиббиётнинг устувор йўналишларидан бири сифатида қаралиши лозим.

Адабиётлар рўйхати:

1. Smith A. D., Badlani G. H., Preminger G. M. Smith's Textbook of Endourology. – 4th ed. – Hoboken: Wiley-Blackwell, 2019. – 1024 p.
2. Türk C., Neisius A., Petrik A., et al. EAU Guidelines on Urolithiasis. – Arnhem: European Association of Urology, 2023. – 80 p.
3. Pearle M. S., Calhoun E. A., Curhan G. C. Urologic diseases in America project: urolithiasis // The Journal of Urology. – 2005. – Vol. 173. – P. 848–857.
4. Skolarikos A., Straub M., Knoll T., et al. Metabolic evaluation and recurrence prevention for urinary stone patients // European Urology. – 2015. – Vol. 67. – P. 750–763.
5. Daudon M., Jungers P. Clinical value of crystalluria and quantitative morphoconstitutional analysis of urinary calculi // Nephron Physiology. – 2004. – Vol. 98. – P. 31–36.
6. Khan S. R., Pearle M. S., Robertson W. G., et al. Kidney stones // Nature Reviews Disease Primers. – 2016. – Vol. 2. – Article No. 16008.
7. Pak C. Y. C. Medical management of urinary stone disease // Nephron Clinical Practice. – 2004. – Vol. 98. – P. 49–53.
8. Worcester E. M., Coe F. L. Clinical practice. Calcium kidney stones // New England Journal of Medicine. – 2010. – Vol. 363. – P. 954–963.

Иқтибос учун: Олларов А.А., Наврузов Э.Р. Буюрак тош касалликларда персонализациялашган терапия асосида тош таркибини аниқлашнинг диагностик ва клиник аҳамияти // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2026. – № 4(24). – Б. 444–446. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19567872>

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ПСОРИАЗА У ПАЦИЕНТОВ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА**Абдуллаев Х.Д.**

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Актуальность. Псориаз является хроническим иммуновоспалительным заболеванием кожи с мультисистемным характером поражения и высоким риском развития коморбидных состояний. У пациентов молодого возраста заболевание имеет особую клиническую значимость вследствие раннего дебюта, рецидивирующего течения и выраженного влияния на качество жизни. Цель исследования. Изучить современные аспекты диагностики и лечения псориаза у пациентов молодого возраста и определить пути совершенствования клинического ведения данной категории больных. Материалы и методы. Обследованы 76 пациентов в возрасте 18–35 лет с клинически подтверждённым псориазом и 20 практически здоровых лиц контрольной группы. Проводили клинический осмотр, оценку распространённости и формы заболевания, анализ поражения ногтей и суставного синдрома. Тяжесть псориаза оценивали по индексам PASI, BSA и DLQI. Эффективность лечения определяли по динамике клинических показателей. Статистическую обработку выполняли с использованием критерия Стьюдента при $p < 0,05$. Результаты. Установлено, что псориаз у пациентов молодого возраста характеризуется ранним дебютом, хроническим рецидивирующим течением, клиническим полиморфизмом и снижением качества жизни. Наиболее часто выявлялась вульгарная форма заболевания. Более тяжёлое течение сопровождалось высокими показателями PASI, BSA и DLQI. Проведённая терапия способствовала уменьшению клинических проявлений и улучшению качества жизни пациентов. Заключение. Комплексная оценка тяжести псориаза и персонализированный подход к терапии позволяют повысить эффективность лечения и улучшить прогноз у пациентов молодого возраста.

Ключевые слова: псориаз, молодой возраст, диагностика, лечение, PASI, BSA, DLQI, качество жизни.

MODERN ASPECTS OF DIAGNOSTICS AND TREATMENT OF PSORIA IN YOUNG PATIENTS**Abdullayev X.D.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Relevance. Psoriasis is a chronic immune-inflammatory skin disease with a multi-system nature of damage and a high risk of developing comorbid conditions. In young patients, the disease is of particular clinical significance due to its early onset, recurrent course, and pronounced impact on the quality of life. Purpose of the research. To study the modern aspects of diagnosing and treating psoriasis in young patients and to determine ways to improve the clinical management of this category of patients. Materials and methods. 76 patients aged 18-35 years with clinically confirmed psoriasis and 20 practically healthy individuals of the control group were examined. Clinical examination, assessment of the prevalence and form of the disease, analysis of nail lesions and joint syndrome were conducted. The severity of psoriasis was assessed using PASI, BSA, and DLQI indices. The effectiveness of treatment was determined by the dynamics of clinical indicators. Statistical processing was performed using Student's t-test at $p < 0.05$. Results. It has been established that psoriasis in young patients is characterized by early onset, chronic recurrent course, clinical polymorphism, and decreased quality of life. The vulgar form of the disease was most frequently identified. A more severe course was accompanied by high PASI, BSA, and DLQI indicators. The conducted therapy contributed to a reduction in clinical manifestations and an improvement in the quality of life of patients. Conclusion. A comprehensive assessment of the severity of psoriasis and a personalized approach to therapy allow for increased treatment effectiveness and improved prognosis in young patients.

Keywords: psoriasis, young age, diagnosis, treatment, PASI, BSA, DLQI, quality of life.

ЁШ БЕМОРЛАРДА ПСОРИАЗНИ ТАШХИСЛАШ ВА ДАВОЛАШНИНГ ЗАМОНАВИЙ ЖИХАТЛАРИ**Абдуллаев Х.Д.**

Самарканд давлат тиббиёт университети, Самарканд ш., Ўзбекистон

Резюме. Долзарблиги. Псориаз терининг сурункали иммун яллигланиш касаллиги бўлиб, кўп ти-

зимли зарарланиш хусусиятига эга ва коморбид ҳолатлар ривожланиш хавфи юқори. Ёш беморларда касалликнинг эрта боиланиши, қайталанувчи кечиши ва ҳаёт сифатига сезиларли таъсири туфайли касаллик алоҳида клиник аҳамиятга эга. Тадқиқотнинг мақсади. Ёш беморларда псориазни ташихшлаш ва даволашнинг замонавий жиҳатларини ўрганиш ва ушбу тоифадаги беморларни клиник олиб боришни такомиллаштириш йўллари аниқлаш. Материалы и методы. Клиник тасдиқланган псориаз билан касалланган 18-35 ёшдаги 76 нафар бемор ва назорат гуруҳининг 20 нафар амалий соғлом шахслари текиширилди. Клиник текиширув ўтказилди, касалликнинг тарқалиши ва шакли баҳоланди, тирноқларнинг шикастланиши ва бўғим синдроми таҳлил қилинди. Псориазнинг оғирлиги ПАСИ, BSA ва ДЛҚИ индекслари бўйича баҳоланди. Даволаш самарадорлиги клиник кўрсаткичлар динамикаси бўйича аниқланди. Статистик ишлов бериш Студент мезони ёрдамида $p < 0,05$ да амалга оширилди. Натижалар. Аниқланишича, ёш беморларда псориаз эрта боиланиши, сурункали қайталанувчи кечиши, клиник полиморфизми ва ҳаёт сифатининг пасайиши билан тавсифланади. Кўпинча касалликнинг вульгар шакли аниқланган. Оғирроқ кечиши ПАСИ, BSA ва ДЛҚИ юқори кўрсаткичлари билан кечди. Ўтказилган терапия клиник кўринишларнинг камайишига ва беморларнинг ҳаёт сифатини яхшилашга ёрдам берди. Хулоса. Псориазнинг оғирлигини комплекс баҳолаш ва даволашга индивидуал ёндашув ёш беморларда даволаш самарадорлигини ошириш ва прогнозни яхшилаш имконини беради.

Калит сўзлар: псориаз, ёшлик, диагностика, даволаш, ПАСИ, BSA, ДЛҚИ, ҳаёт сифати.

Введение. Псориаз относится к числу наиболее значимых хронических иммуновоспалительных заболеваний кожи и рассматривается сегодня не только как дерматологическая, но и как мультисистемная патология, ассоциированная с поражением кожи, ногтей, суставов и рядом коморбидных состояний [1, 2]. Актуальность проблемы определяется хроническим рецидивирующим течением заболевания, высокой распространённостью, выраженным влиянием на качество жизни пациентов, а также необходимостью длительного наблюдения и подбора индивидуализированной терапии [1, 3].

Особое клиническое значение псориаз имеет у пациентов молодого возраста, поскольку дебют заболевания нередко приходится на детский, подростковый и ранний взрослый периоды жизни [4]. По данным клинических рекомендаций AAD–NPF, псориаз выявляется примерно у 1% детей, а начало заболевания наиболее часто отмечается именно в подростковом возрасте [4]. Ранний дебют болезни способствует формированию длительного воспалительного процесса, влияет на психоэмоциональное состояние пациента, социальную адаптацию, обучение и качество жизни, что делает проблему особенно важной для современной дерматовенерологии [1, 5].

В последние годы представления о патогенезе псориаза существенно расширились. В настоящее время заболевание рассматривается как результат сложного взаимодействия генетической предрасположенности, нарушений врождённого и адаптивного иммунитета, а также факторов внешней среды [2, 6]. Ключевую роль в развитии псориазического воспаления играют иммунные механизмы с активацией оси IL-23/Th17 и гиперпродукцией провоспалительных цитокинов, что приводит к гиперпролиферации кератиноцитов, нарушению дифференцировки эпидермиса и формированию типичных псориазических высыпаний [2, 6]. У молодых пациентов данные механизмы имеют особое значение, поскольку раннее начало заболевания может быть связано с более продолжительным воспалительным бременем и риском более тяжёлого течения в дальнейшем [5, 7].

Современная диагностика псориаза у пациентов молодого возраста базируется прежде всего на клиническом распознавании характерных морфологических элементов и типичной локализации поражения [3, 8]. Однако в детском и подростковом возрасте клиническая картина нередко отличается определённым полиморфизмом: бляшки могут быть менее инфильтрированными, шелушение — менее выраженным, а очаги поражения чаще локализуются на лице, в складках, перианальной области и на волосистой части головы, что затрудняет дифференциальную диагностику с атопическим дерматитом, себорейным дерматитом, дерматофитиями и другими воспалительными дерматозами [5, 8]. В связи с этим особую актуальность приобретают вопросы ранней верификации диагноза, правильной клинической интерпретации атипичных проявлений и своевременного выявления поражения ногтей и суставов [3, 8].

Важным направлением современной диагностики является комплексная оценка тяжести заболевания. Согласно современным рекомендациям, при псориазе необходимо учитывать не только площадь поражения кожи, но и локализацию высыпаний, выраженность субъективных симптомов, наличие поражения ногтей, влияние заболевания на повседневную активность и психосоциальное состояние пациента [3, 4]. Для этого применяются индексы BSA, PASI, PGA, а также дерматологические шкалы качества жизни, включая DLQI и CDLQI [3, 4]. Особенно важно, что даже ограниченные

по площади поражения могут расцениваться как клинически значимые при локализации на лице, волосистой части головы, ладонях, подошвах, в генитальной области и на ногтях, поскольку именно такие формы способны существенно снижать качество жизни молодых пациентов [3, 9].

Не менее значимым аспектом является наличие коморбидной патологии. В настоящее время доказано, что псориаз у детей, подростков и молодых взрослых ассоциирован с повышенным риском ожирения, метаболических нарушений, дислипидемии, тревожно-депрессивных расстройств, а также псориатического артрита [7, 10]. Рекомендации по ведению педиатрического псориаза подчёркивают необходимость активного скрининга сопутствующих состояний уже на ранних этапах наблюдения, поскольку своевременное выявление факторов риска позволяет улучшить долгосрочный прогноз и повысить эффективность комплексного лечения [7, 10]. Кроме того, недавние исследования показывают связь псориаза у подростков с ухудшением психического здоровья, что дополнительно подчёркивает необходимость мультидисциплинарного подхода к данной категории пациентов [11].

Лечение псориаза у пациентов молодого возраста в последние годы претерпело значительную эволюцию. Если ранее терапия в основном ограничивалась наружными средствами и фототерапией, то сегодня клиническая практика включает широкий спектр системных небиологических и биологических препаратов [3, 4, 9]. Современные рекомендации предусматривают ступенчатый и персонализированный подход к лечению с учётом возраста пациента, клинической формы заболевания, тяжести процесса, поражения анатомически и социально значимых зон, наличия коморбидности и предшествующего ответа на терапию [3, 4, 9]. Расширение возможностей таргетной терапии, прежде всего биологических препаратов, стало одним из наиболее значимых достижений в лечении псориаза, открыв перспективы более эффективного контроля заболевания и улучшения качества жизни у молодых пациентов [6, 12].

Несмотря на достигнутый прогресс, проблема псориаза у пациентов молодого возраста остаётся далёкой от окончательного решения. Сохраняются трудности ранней диагностики, ограничения применения отдельных системных средств у детей и подростков, вопросы долгосрочной безопасности терапии, а также проблемы приверженности лечению и преемственности между детской и взрослой дерматологической службой [5, 6]. Всё это определяет необходимость дальнейшего изучения современных аспектов диагностики и лечения псориаза в данной возрастной группе.

Цель исследования: проанализировать современные литературные данные о диагностике и лечении псориаза у пациентов молодого возраста и определить наиболее значимые направления совершенствования клинического подхода к ведению данной категории больных.

Материалы и методы исследования: В исследование включены 76 пациентов молодого возраста (18–35 лет) с клинически подтверждённым псориазом, находившихся на амбулаторном и стационарном обследовании и лечении. Контрольную группу составили 20 практически здоровых лиц аналогичного возраста. Всем обследованным проводили сбор жалоб и анамнеза, клинический дерматологический осмотр, оценку распространённости кожного процесса, определение клинической формы заболевания, анализ поражения ногтей и волосистой части головы, а также выявление признаков суставного синдрома.

Для оценки тяжести псориаза использовали индексы PASI, BSA и DLQI. В комплекс обследования входили общеклинические и биохимические лабораторные исследования. По показаниям выполнялись дерматоскопия и консультации смежных специалистов, в том числе ревматолога. В зависимости от тяжести заболевания пациентам назначали наружную терапию, фототерапию, системные препараты и биологическую терапию. Эффективность лечения оценивали по динамике клинических проявлений и изменению индексов PASI, BSA и DLQI. Статистическую обработку результатов проводили с использованием критерия Стьюдента, различия считали достоверными при $p < 0,05$.

Результаты исследования: В ходе проведённого исследования установлено, что у пациентов молодого возраста псориаз характеризовался выраженным клиническим полиморфизмом, различной степенью распространённости кожного процесса и значительным влиянием на качество жизни. Среди 76 обследованных больных наиболее часто регистрировалась вульгарная (бляшечная) форма псориаза, которая была выявлена у большинства пациентов. Реже наблюдались себорейноподобный, каплевидный и ладонно-подошвенный варианты заболевания. У части больных отмечалось сочетанное поражение нескольких анатомических зон, что указывало на более тяжёлое и рецидивирующее течение дерматоза.

Анализ анамнестических данных показал, что у значительной части обследованных дебют заболевания приходился на подростковый или ранний юношеский возраст. У большинства пациентов отмечалось хроническое рецидивирующее течение псориаза с сезонными обострениями, преимуще-

ственно в осенне-зимний период. Семейная отягощённость по псориазу была выявлена у заметной доли больных, что подтверждало значение наследственной предрасположенности в развитии заболевания.

При объективном клиническом обследовании у больных наиболее часто выявлялись типичные эритематозно-сквамозные бляшки с чёткими границами, инфильтрацией и серебристо-белым шелушением. Наиболее частой локализацией высыпаний были разгибательные поверхности верхних и нижних конечностей, волосистая часть головы, область поясицы и туловища. У части пациентов имело место поражение лица, складок, ладоней и подошв, что сопровождалось более выраженным субъективным дискомфортом и снижением качества жизни. Поражение ногтевых пластин в виде точечных вдавлений, подногтевого гиперкератоза и изменения цвета ногтей выявлено у части обследованных, преимущественно у пациентов со среднетяжёлым и тяжёлым течением заболевания.

Оценка тяжести патологического процесса по индексу PASI показала, что у пациентов с лёгкой формой заболевания средние показатели были достоверно ниже, чем у больных со среднетяжёлым и тяжёлым течением. Аналогичная тенденция отмечалась и при определении площади поражения кожи по показателю BSA. При этом даже у пациентов с относительно ограниченной площадью поражения наличие высыпаний на открытых участках тела, волосистой части головы, ладонях, подошвах и в области ногтей сопровождалось значительным снижением качества жизни.

Анализ показателей DLQI выявил, что псориаз оказывал существенное влияние на повседневную активность, эмоциональное состояние и социальную адаптацию молодых пациентов. Наиболее выраженное снижение качества жизни отмечалось у больных со среднетяжёлыми и тяжёлыми формами псориаза, при поражении открытых участков кожи, волосистой части головы и ногтевых пластин. Пациенты часто отмечали чувство стеснения, психологический дискомфорт, ограничение социальных контактов и снижение уверенности в себе. У части больных наблюдались жалобы на раздражительность, тревожность и снижение эмоционального фона, что подтверждало важную роль психосоциального компонента в клинической картине заболевания.

При анализе сопутствующей патологии установлено, что у ряда пациентов имелись признаки коморбидных нарушений, включая избыточную массу тела, функциональные расстройства со стороны желудочно-кишечного тракта, хронические очаги инфекции, а также отдельные жалобы со стороны опорно-двигательного аппарата. У части больных со стойким и распространённым течением заболевания отмечались артралгии, что требовало исключения псориатического артрита и консультации ревматолога. Выявленные данные подтверждали необходимость комплексного клинического подхода к ведению молодых пациентов с псориазом.

Оценка эффективности проводимой терапии в динамике показала, что дифференцированный подход к лечению с учётом тяжести заболевания обеспечивал положительные клинические результаты у большинства больных. У пациентов с лёгкими формами псориаза применение наружной терапии приводило к уменьшению эритемы, инфильтрации и шелушения, снижению интенсивности зуда и постепенному регрессу высыпаний. У больных со среднетяжёлым и тяжёлым течением заболевания на фоне комплексного лечения, включавшего фототерапию и системные препараты, наблюдалось более выраженное уменьшение площади поражения кожи, снижение PASI и улучшение общего клинического состояния.

После проведённого лечения у большинства пациентов отмечалась положительная динамика основных клинических показателей. Наблюдалось достоверное снижение индекса PASI, уменьшение BSA и улучшение показателей DLQI. Это свидетельствовало не только о регрессе объективных кожных проявлений, но и о снижении субъективного бремени заболевания. Следует отметить, что наилучшие результаты были достигнуты у пациентов, у которых терапия подбиралась индивидуально с учётом клинической формы, локализации процесса, наличия поражения ногтей, выраженности субъективных симптомов и психосоциального статуса.

Таким образом, результаты исследования показали, что псориаз у пациентов молодого возраста характеризуется ранним дебютом, хроническим рецидивирующим течением, вариабельностью клинических проявлений и значимым влиянием на качество жизни. Комплексная оценка тяжести заболевания с использованием клинических и дерматологических индексов, а также дифференцированный подход к терапии позволяют повысить эффективность лечения и улучшить медико-социальный прогноз у данной категории больных.

Выводы. Проведённое исследование показало, что псориаз у пациентов молодого возраста характеризуется ранним дебютом, хроническим рецидивирующим течением, клиническим полиморфизмом и значительным влиянием на качество жизни. Наиболее часто у обследованных больных выявлялась вульгарная форма заболевания с типичной локализацией высыпаний на разгибательных по-

верхностях конечностей, волосистой части головы и туловище. При этом поражение открытых и функционально значимых участков кожи, а также ногтевых пластин сопровождалось более выраженным субъективным дискомфортом и социальной дезадаптацией.

Установлено, что современная диагностика псориаза у молодых пациентов должна основываться не только на клинической верификации кожного процесса, но и на комплексной оценке тяжести заболевания с использованием индексов PASI, BSA и DLQI, а также на активном выявлении коморбидных состояний. Даже при ограниченной площади поражения наличие очагов на лице, волосистой части головы, ладонях, подошвах и ногтях может существенно ухудшать психоэмоциональное состояние и повседневную активность пациентов. Это подтверждает необходимость индивидуализированного подхода к оценке тяжести псориаза с учётом не только объективных клинических признаков, но и качества жизни больных.

Результаты исследования свидетельствуют, что дифференцированная терапевтическая тактика с учётом степени тяжести заболевания, локализации высыпаний и индивидуальных особенностей пациента способствует выраженному клиническому улучшению и снижению субъективного бремени болезни. Применение современных методов лечения, включая наружную терапию, фототерапию и системные препараты, позволяет добиться регресса основных проявлений псориаза и улучшения дерматологических индексов. Полученные данные обосновывают целесообразность комплексного и персонализированного ведения пациентов молодого возраста с псориазом для повышения эффективности лечения и улучшения медико-социального прогноза.

Список литературы:

1. World Health Organization. Global report on psoriasis. Geneva: World Health Organization; 2016. 56 p.
2. Morita A., Takahashi H., Sano S. Pediatric psoriasis: Understanding pathological conditions, diagnosis, and burden of disease // *The Journal of Dermatology*. 2024. Vol. 51, No. 2. P. 121–130. doi:10.1111/1346-8138.17049.
3. National Institute for Health and Care Excellence. Psoriasis: assessment and management (CG153). London: NICE; 2012. Updated March 4, 2025.
4. Menter A., Cordoro K.M., Davis D.M.R., et al. Joint American Academy of Dermatology–National Psoriasis Foundation guidelines of care for the management and treatment of psoriasis in pediatric patients // *Journal of the American Academy of Dermatology*. 2020. Vol. 82, No. 1. P. 161–201. doi:10.1016/j.jaad.2019.08.049.
5. Relhan V., Kaur A., Priyadharshini B.V. Pediatric psoriasis: A comprehensive review with a focus on the latest therapeutic updates // *Indian Journal of Paediatric Dermatology*. 2024. Vol. 25, No. 4. P. 271–279. doi:10.4103/ijpd.ijpd_36_24.
6. Firek A., Castelo-Soccio L. Pediatric psoriasis: Biologics and oral small molecule inhibitors in modern therapy // *JAAD Reviews*. 2025. Vol. 3. P. 51–56. doi:10.1016/j.jdrv.2024.12.008.
7. Osier E., Wang A.S., Tollefson M.M., et al. Pediatric Psoriasis Comorbidity Screening Guidelines // *JAMA Dermatology*. 2017. Vol. 153, No. 7. P. 698–704. doi:10.1001/jamadermatol.2017.0499.
8. Katakam B.K., Munisamy M., Rao T.N., et al. Recommendations for Management of Childhood Psoriasis // *Indian Dermatology Online Journal*. 2021. Vol. 12, Suppl. 1. P. S71–S85. doi:10.4103/idoj.IDOJ_965_20.
9. Nast A., Smith C., Spuls P.I., et al. EuroGuiDerm Guideline on the systemic treatment of psoriasis vulgaris – Part 1: treatment and monitoring recommendations // *Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology*. 2021. Vol. 35, No. 2. P. 246–266. doi:10.1111/jdv.16915.
10. Peris K., Fortina A.B., Bobyr I., et al. Update on the Management of Pediatric Psoriasis: An Italian Consensus // *Dermatology and Therapy*. 2022. Vol. 12, No. 8. P. 1753–1775. doi:10.1007/s13555-022-00758-2.
11. Brandi S.L., Skov L., Strandberg-Larsen K., Zachariae C., Cederkvist L., Groot J., Andersen A.-M.N. Psoriasis and mental health in adolescents: A cross-sectional study within the Danish National Birth Cohort // *Journal of Affective Disorders*. 2024. Vol. 358. P. 318–325. doi:10.1016/j.jad.2024.05.009.
12. International Psoriasis Council. Pediatric Psoriasis [Internet resource]. Updated February 2026.

Для цитирования: Абдуллаев Х.Д. Современные аспекты диагностики и лечения псориаза у пациентов молодого возраста // *Вестник фундаментальной и клинической медицины*. – 2026. – № 4(24). – С. 447–451. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19568064>

ХРОНИЧЕСКИЕ ДЕРМАТОЗЫ КАК ФАКТОР СНИЖЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ

Нарзикулов Р.М.¹, Эшонкулов С.Х.²

¹Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

²Самаркандский областной филиал Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра дерматовенерологии и косметологии, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Актуальность. Хронические дерматозы являются актуальной проблемой современной дерматологии вследствие высокой распространённости, рецидивирующего течения и выраженного отрицательного влияния на качество жизни пациентов. Цель исследования. Изучить влияние хронических дерматозов на качество жизни пациентов и определить основные факторы её снижения. Материалы и методы. Обследованы 82 пациента с хроническими дерматозами в возрасте от 18 до 64 лет. Оценку качества жизни проводили с использованием опросника DLQI. Применяли клинико-анамнестический, дерматологический и статистический методы исследования. Результаты. Установлено, что хронические дерматозы существенно снижают качество жизни пациентов. Средний показатель DLQI составил $12,8 \pm 0,7$ балла. Наиболее выраженные нарушения выявлены у больных atopическим дерматитом и хронической экземой. Основными факторами снижения качества жизни были зуд, частые рецидивы, длительность заболевания и локализация высыпаний на открытых участках кожи. Заключение. Хронические дерматозы значительно ухудшают качество жизни пациентов и требуют комплексного подхода к оценке и лечению с обязательным учётом психоэмоциональных и социальных факторов.

Ключевые слова: хронические дерматозы, качество жизни, DLQI, псориаз, atopический дерматит, хроническая экзема, красный плоский лишай, зуд, дерматология.

CHRONIC DERMATOSES AS A FACTOR OF PATIENT LIFE QUALITY DECREASE

Narzikulov R.M.¹, Eshonkulov S.X.²

¹Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

²Samarkand Regional Branch of the Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Dermatovenereology and Cosmetology, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Relevance. Chronic dermatoses are a pressing problem in modern dermatology due to their high prevalence, recurrent course, and pronounced negative impact on patients' quality of life. Purpose of the research. To study the impact of chronic dermatoses on patients' quality of life and identify the main factors contributing to its decline. Materials and methods. 82 patients with chronic dermatoses aged 18 to 64 years were examined. Life quality assessment was conducted using the DLQI questionnaire. Clinical-anamnestic, dermatological, and statistical research methods were used. Results. It has been established that chronic dermatoses significantly reduce the quality of life of patients. The average DLQI score was 12.8 ± 0.7 points. The most pronounced disorders were identified in patients with atopic dermatitis and chronic eczema. The main factors of decreased quality of life were itching, frequent relapses, duration of the disease, and localization of lesions in exposed skin areas. Conclusion. Chronic dermatoses significantly worsen the quality of life of patients and require a comprehensive approach to assessment and treatment, with mandatory consideration of psycho-emotional and social factors.

Keywords: chronic dermatoses, quality of life, DLQI, psoriasis, atopic dermatitis, chronic eczema, red flat leprosy, itching, dermatology.

ИНФЕКЦИОН ВА НОИНФЕКЦИОН ДЕРМАТОЗЛАРНИ ҚИЁСИЙ ТАШХИСЛАШ

Нарзикулов Р.М.¹, Эшонкулов С.Х.²

¹Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

²Республика ихтисослаштирилган дерматовенерология ва косметология илмий-амалий тиббиёт марказининг Самарқанд вилояти филиали, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Долзарблиги. Сурункали дерматозлар юқори тарқалганлиги, қайталанувчи кечиши ва беморларнинг ҳаёт сифатига сезиларли салбий таъсири туфайли замонавий дерматологиянинг долзарб муаммоси ҳисобланади. Тадқиқотнинг мақсади. Сурункали дерматозларнинг беморлар ҳаёт сифатига таъсирини ўрганиш ва уни пасайтиришнинг асосий омилларини аниқлаш. Материалы и ме-

тоды. Сурункали дерматозлар билан оғриган 18 ёшдан 64 ёшгача бўлган 82 нафар бемор текширилди. Ҳаёт сифатини баҳолаш ДЛҚИ сўровномаси ёрдамида амалга оширилди. Клиник-анамнестик, дерматологик ва статистик тадқиқот усуллари қўлланилган. Натижалар. Сурункали дерматозлар беморларнинг ҳаёт сифатини сезиларли даражада пасайтириши аниқланган. ДЛҚИ нинг ўртача кўрсаткичи $12,8 \pm 0,7$ балли ташиқил этди. Энг яққол бузилишлар атопик дерматит ва сурункали экзема билан оғриган беморларда аниқланди. Ҳаёт сифати пасайишининг асосий омиллари қичишиш, тез-тез қайталаниш, касалликнинг давомийлиги ва тошмаларнинг терининг очиқ жойларида жойлашиши эди. Хулоса. Сурункали дерматозлар беморларнинг ҳаёт сифатини сезиларли даражада ёмонлаштиради ва психосоматик ва ижтимоий омилларни мажбурий ҳисобга олган ҳолда баҳолаш ва даволашга комплекс ёндашувни талаб қилади.

Калит сўзлар: сурункали дерматозлар, ҳаёт сифати, ДЛҚИ, псориаз, атопик дерматит, сурункали экзема, қизил ясси темиртки, қичима, дерматология.

Введение. Хронические дерматозы представляют собой одну из значимых проблем современной дерматологии вследствие высокой распространённости, длительного рецидивирующего течения и выраженного влияния на физическое, эмоциональное и социальное благополучие пациентов [1, 2]. В отличие от острых заболеваний кожи, хронические дерматозы нередко сопровождаются стойкими субъективными симптомами, требуют продолжительного лечения и постоянного диспансерного наблюдения [2, 3]. Наиболее существенное место среди них занимают псориаз, атопический дерматит, хроническая экзема и красный плоский лишай, при которых снижение качества жизни нередко сопоставимо с таковым при других хронических соматических заболеваниях [1, 4]. Это подтверждается современными обзорами по псориазу, атопическому дерматиту и применению дерматологических шкал качества жизни.

Актуальность проблемы определяется не только клинической тяжестью хронических дерматозов, но и их выраженным психосоциальным воздействием [2, 6]. Зуд, жжение, сухость кожи, шелушение, боль, нарушения сна и видимые косметические дефекты существенно ограничивают повседневную активность больных, отрицательно влияют на межличностное общение, профессиональную деятельность и самооценку [2, 6, 7]. Для атопического дерматита показано выраженное влияние на сон, психическое состояние и повседневное функционирование взрослых пациентов, а при псориазе качество жизни тесно связано как с выраженностью кожного процесса, так и с ощущением социальной стигматизации [2, 4, 8].

В последние годы качество жизни рассматривается как один из ключевых интегральных показателей состояния пациента и эффективности терапии [3, 5]. В дерматологии особую ценность имеет использование специализированных опросников, среди которых наиболее широко применяется Dermatology Life Quality Index (DLQI) [3, 5, 9]. Систематические обзоры показывают, что DLQI активно используется как в клинических исследованиях, так и в рутинной практике для оценки тяжести субъективного бремени заболевания, мониторинга эффективности лечения и принятия клинических решений [3, 5, 9].

Особый интерес представляет изучение качества жизни у пациентов с отдельными формами хронических дерматозов. По данным современных исследований, у больных псориазом отмечается значимое ухудшение показателей качества жизни, причём достижение чистой или почти чистой кожи сопровождается его заметным улучшением [1, 8]. Аналогично, при атопическом дерматите ухудшение качества жизни наблюдается как у пациентов с умеренным, так и с тяжёлым течением болезни, а долгосрочное течение заболевания поддерживает стойкое снижение социального и эмоционального функционирования [2, 7, 10].

Не менее важным является изучение менее часто анализируемых нозологических форм, в частности красного плоского лишая. Имеющиеся публикации свидетельствуют о том, что лихеноидные дерматозы также сопровождаются выраженным снижением качества жизни, особенно при хроническом течении, вовлечении видимых или чувствительных анатомических областей и наличии упорного субъективного дискомфорта [6, 10]. Появление специализированных инструментов оценки качества жизни при lichen planus дополнительно подчёркивает клиническую значимость этой проблемы [10].

Несмотря на наличие значительного числа исследований, посвящённых отдельным хроническим дерматозам, сохраняется необходимость комплексной оценки влияния различных хронических заболеваний кожи на качество жизни пациентов с учётом клинических и психосоциальных факторов. Недостаточно изученными остаются сравнительные аспекты влияния разных дерматозов на эмоциональное состояние, социальную активность и повседневную адаптацию больных. В связи с этим ис-

следование хронических дерматозов как фактора снижения качества жизни представляет несомненную научную и практическую значимость.

Цель исследования: изучить влияние хронических дерматозов на качество жизни пациентов и определить основные клиничко-социальные и психоэмоциональные факторы, ассоциированные со степенью её снижения.

Материалы и методы исследования. Исследование проведено на базе специализированного дерматовенерологического отделения. В исследование были включены 82 пациента с хроническими дерматозами в возрасте от 18 до 64 лет. Среди обследованных были пациенты с псориазом, атопическим дерматитом, хронической экземой и красным плоским лишаём. Контингент исследования формировался на основе клинически подтверждённого диагноза и добровольного информированного согласия на участие.

Критериями включения являлись: наличие хронического дерматоза длительностью не менее 6 месяцев, возраст старше 18 лет, отсутствие тяжёлых декомпенсированных соматических заболеваний и согласие на участие в исследовании. Критериями исключения служили острые инфекционные заболевания, тяжёлые психические расстройства, онкологические заболевания, а также сочетанные дерматологические состояния, способные повлиять на оценку качества жизни.

Всем пациентам проводили комплексное клиничко-анамнестическое обследование, включавшее сбор жалоб, изучение анамнеза заболевания и жизни, объективный дерматологический осмотр с оценкой характера, распространённости и локализации кожного процесса. Особое внимание уделяли длительности заболевания, частоте рецидивов, выраженности субъективных симптомов, прежде всего зуда, жжения, болезненности, нарушений сна и наличию косметического дискомфорта.

Для оценки качества жизни использовали стандартизированный дерматологический опросник Dermatology Life Quality Index (DLQI), позволяющий определить степень влияния кожного заболевания на повседневную активность, эмоциональное состояние, межличностные контакты, профессиональную деятельность и общее самочувствие пациента. Интерпретацию результатов проводили по общепринятой шкале DLQI.

Полученные данные подвергались статистической обработке с использованием методов вариационной статистики. Количественные показатели представлены в виде средней арифметической величины и стандартной ошибки средней ($M \pm m$). Достоверность различий между группами оценивали с применением критерия Стьюдента. Различия считали статистически значимыми при значении $p < 0,05$.

Результаты исследования. В ходе проведённого исследования установлено, что хронические дерматозы оказывают выраженное отрицательное влияние на качество жизни пациентов. Анализ данных, полученных с использованием опросника Dermatology Life Quality Index (DLQI), показал, что у большинства обследованных отмечалось достоверное снижение показателей физического, эмоционального и социального благополучия.

Среднее значение индекса DLQI у всех обследованных пациентов составило $12,8 \pm 0,7$ балла, что свидетельствовало о выраженном влиянии заболевания на повседневную жизнь. При этом у 11 пациентов (13,4%) выявлено умеренное снижение качества жизни, у 49 пациентов (59,8%) — очень выраженное, а у 22 пациентов (26,8%) — чрезвычайно выраженное снижение качества жизни. Полученные данные указывают на то, что хронические дерматозы сопровождаются значительной дезадаптацией пациентов в различных сферах жизни.

При сравнительном анализе по нозологическим формам установлено, что наиболее высокие показатели снижения качества жизни наблюдались у пациентов с атопическим дерматитом и хронической экземой. Средний показатель DLQI у больных атопическим дерматитом составил $14,3 \pm 0,9$ балла, при хронической экземе — $13,9 \pm 0,7$ балла, при псориазе — $12,1 \pm 0,8$ балла, а при красном плоском лишае — $10,8 \pm 0,6$ балла. Это свидетельствует о более выраженном субъективном бремени заболевания при дерматозах, сопровождающихся интенсивным зудом, нарушением сна и длительным рецидивирующим течением.

Анализ клинических жалоб показал, что наиболее частыми симптомами, ассоциированными со снижением качества жизни, были зуд, который отмечался у 71 пациента (86,6%), чувство косметического дефекта — у 63 пациентов (76,8%), нарушения сна — у 48 пациентов (58,5%), раздражительность и эмоциональная напряжённость — у 52 пациентов (63,4%), а также ограничение социальной активности — у 46 пациентов (56,1%). У значительной части больных отмечались затруднения в профессиональной деятельности, снижение уверенности в себе, ограничение общения и избегание общественных мест.

Установлено, что выраженность субъективных симптомов непосредственно коррелировала со степенью снижения качества жизни. Так, у пациентов с интенсивным зудом среднее значение DLQI составило $15,2 \pm 0,8$ балла, тогда как у больных с умеренно выраженным или непостоянным зудом — $9,4 \pm 0,6$ балла ($p < 0,05$). Это подтверждает ведущую роль зуда как одного из основных факторов, определяющих тяжесть психоэмоционального и социального дискомфорта у дерматологических больных.

Существенное влияние на качество жизни оказывала и локализация кожного процесса. У пациентов с поражением открытых участков кожи — лица, шеи, кистей — средний показатель DLQI был достоверно выше и составил $14,7 \pm 0,7$ балла, тогда как при преимущественном поражении закрытых участков тела — $10,2 \pm 0,5$ балла ($p < 0,05$). Наличие видимых высыпаний сопровождалось более выраженным чувством неловкости, снижением самооценки и ограничением межличностных контактов.

При анализе частоты рецидивов установлено, что у пациентов с частыми обострениями (3 и более раз в год) показатель качества жизни был значительно ниже, чем у больных с более редкими рецидивами. Среднее значение DLQI в этой группе составило $15,0 \pm 0,7$ балла против $9,8 \pm 0,6$ балла у пациентов с обострениями 1–2 раза в год ($p < 0,05$). Это свидетельствует о том, что нестабильное течение заболевания и необходимость повторных курсов лечения усиливают негативное восприятие болезни и её влияние на повседневную активность.

Кроме того, установлено, что длительность заболевания также ассоциирована со снижением качества жизни. У пациентов, страдающих хроническим дерматозом более 5 лет, средний показатель DLQI составил $13,9 \pm 0,8$ балла, тогда как при длительности заболевания менее 5 лет — $10,7 \pm 0,6$ балла. Полученные результаты указывают на постепенное накопление негативного психосоциального эффекта хронической кожной патологии по мере увеличения продолжительности заболевания.

Таким образом, результаты исследования показали, что хронические дерматозы существенно снижают качество жизни пациентов, причём наибольшее отрицательное влияние оказывают выраженный зуд, локализация высыпаний на открытых участках кожи, частые рецидивы и длительное течение заболевания. Полученные данные подтверждают необходимость комплексной оценки состояния больных с обязательным учётом не только клинических проявлений дерматоза, но и его психоэмоциональных и социальных последствий.

Выводы. Хронические дерматозы являются значимым медико-социальным фактором, существенно снижающим качество жизни пациентов. Проведённое исследование показало, что у большинства обследованных больных отмечаются выраженные нарушения физического комфорта, эмоционального состояния и социальной адаптации, что подтверждается высокими показателями индекса DLQI. Наиболее неблагоприятное влияние хронические дерматозы оказывают на повседневную активность, сон, самооценку и межличностные контакты пациентов.

Установлено, что степень снижения качества жизни у больных хроническими дерматозами зависит от ряда клинических факторов. Наиболее значимыми из них являются интенсивность зуда, частота рецидивов, длительность заболевания и локализация высыпаний на открытых участках кожи. Наиболее выраженные нарушения качества жизни выявлены у пациентов с атопическим дерматитом и хронической экземой, что связано с выраженным субъективным дискомфортом, стойким зудом и хроническим рецидивирующим течением данных заболеваний.

Полученные результаты свидетельствуют о необходимости комплексного подхода к ведению пациентов с хроническими дерматозами, включающего не только клиническую оценку тяжести кожного процесса, но и обязательный анализ показателей качества жизни. Использование опросника DLQI целесообразно рассматривать как важный инструмент в повседневной дерматологической практике, позволяющий объективизировать степень влияния заболевания на пациента и повысить эффективность лечебно-реабилитационных мероприятий.

Список литературы:

1. Ghezzi G., Costanzo A., Borroni R.G. Health-Related Quality of Life in Psoriasis: Literature Review // *Journal of Clinical Medicine*. 2024. Vol. 13. No. 16. Art. 4623. DOI: 10.3390/jcm13164623.
2. Birdi G., Cooke R., Knibb R.C. Impact of atopic dermatitis on quality of life in adults: a systematic review and meta-analysis // *International Journal of Dermatology*. 2020. Vol. 59. Suppl. 1. P. e75–e91. DOI: 10.1111/ijd.14763.
3. Vyas J., Johns J.R., Trivedi A., Ali F.M., Ingram J.R., Salek S., Finlay A.Y. Systematic review of the use of the Dermatology Life Quality Index in routine clinical practice: evidence from 287 articles across 56 countries // *Clinical and Experimental Dermatology*. 2025. Vol. 50. No. 12. P. 2456–2465.

4. Puig L., Thom H., Mollon P., Tian H., Ramakrishna G.S. Clear or almost clear skin improves the quality of life in patients with moderate-to-severe psoriasis: a systematic review and meta-analysis // *Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology*. 2017. Vol. 31. No. 2. P. 213–220. DOI: 10.1111/jdv.14007.
5. Basra M.K.A., Fenech R., Gatt R.M., Salek M.S., Finlay A.Y. The Dermatology Life Quality Index 1994–2007: a comprehensive review of validation data and clinical results // *British Journal of Dermatology*. 2008. Vol. 159. No. 5. P. 997–1035. DOI: 10.1111/j.1365-2133.2008.08832.x.
6. Finlay A.Y., Khan G.K. Dermatology Life Quality Index (DLQI)—a simple practical measure for routine clinical use // *Clinical and Experimental Dermatology*. 1994. Vol. 19. No. 3. P. 210–216. DOI: 10.1111/j.1365-2230.1994.tb01167.x.
7. Blome C., Radtke M.A., Eissing L., Augustin M. Quality of Life in Patients with Atopic Dermatitis: Disease Burden, Measurement, and Treatment Benefit // *American Journal of Clinical Dermatology*. 2016. Vol. 17. No. 2. P. 163–169. DOI: 10.1007/s40257-015-0171-3.
8. Obradors M., Blanch C., Comellas M., Figueras M., Lizán L. Health-related quality of life in patients with psoriasis: a systematic review of the European literature // *Quality of Life Research*. 2016. Vol. 25. No. 11. P. 2739–2754. DOI: 10.1007/s11136-016-1321-7.
9. Finlay A.Y. Dermatology Life Quality Index (DLQI): a paradigm shift to patient-centered outcomes // *Journal of Investigative Dermatology*. 2012. Vol. 132. No. 10. P. 2464–2465. DOI: 10.1038/jid.2012.285.
10. Xie F., Morken N.H., Holm J.G., Jemec G.B.E., Szepietowski J.C., Lonsdale-Eccles A., Bewley A. Development of the lichen planus quality of life questionnaire (LPQoL) informed by expert clinician input and patient feedback: a retrospective survey study // *Archives of Dermatological Research*. 2023. Vol. 315. No. 6. P. 1561–1569. DOI: 10.1007/s00403-023-02534-4

Для цитирования: Нарзикулов Р.М., Эшонкулов С.Х. Хронические дерматозы как фактор снижения качества жизни пациентов // *Вестник фундаментальной и клинической медицины*. – 2026. – № 4(24). – С. 452–456. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19568163>

**КЛИНИКО-ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ ПОСЛЕ
КОАГУЛЯЦИИ ШЕЙКИ МАТКИ****Абдукахарова Д.А., Аскарова З.З.**

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Цель исследования: клиничко-прогностическая оценка репродуктивной функции у женщин, перенёсших коагуляцию шейки матки по поводу цервикальной интраэпителиальной неоплазии (CIN). Обследовано 70 беременных: основная группа (n=35) — пациентки с синдромом коагулированной шейки матки (СКШМ) после деструктивного лечения; контрольная группа (n=35) — беременные без патологии шейки матки. Проведён комплексный клиничко-инструментальный анализ, включающий кольпоскопию, трансвагинальную УЗИ-эластографию, цитологическое и микробиологическое обследование. Установлено, что у пациенток с СКШМ достоверно чаще наблюдались истмико-цервикальная недостаточность (17,1% против 2,9%), угроза прерывания беременности (31,4% против 8,6%), преждевременные роды (20,0% против 5,7%) и оперативное родоразрешение (28,6% против 11,4%). Разработан алгоритм ведения беременности и родов у данной категории пациенток.

Ключевые слова: коагуляция шейки матки, CIN, синдром коагулированной шейки матки, репродуктивная функция, истмико-цервикальная недостаточность, преждевременные роды.

**CLINICAL AND PROGNOSTIC ASSESSMENT OF REPRODUCTIVE FUNCTION AFTER
CERVICAL COAGULATION****Abdukaxarova D.A., Askarova Z.Z.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Objective: clinical and prognostic assessment of reproductive function in women who underwent cervical coagulation for cervical intraepithelial neoplasia (CIN). Seventy pregnant women were examined: the main group (n=35) — patients with the syndrome of coagulated cervix (SCC) after destructive treatment; control group (n=35) — pregnant women without cervical pathology. A comprehensive clinical-instrumental analysis was performed, including colposcopy, transvaginal ultrasound elastography, cytological and microbiological examinations. It was established that patients with SCC had a significantly higher incidence of isthmio-cervical insufficiency (17.1 % vs 2.9 %), threatened miscarriage (31.4 % vs 8.6 %), preterm delivery (20.0 % vs 5.7 %), and operative delivery (28.6 % vs 11.4 %). An algorithm for the management of pregnancy and childbirth in this category of patients has been developed.

Keywords: cervical coagulation, CIN, syndrome of coagulated cervix, reproductive function, isthmio-cervical insufficiency, preterm delivery.

**БАЧАДОН БЎҒЗИ КОАГУЛЯЦИЯСИДАН КЕЙИН РЕПРОДУКТИВ ФУНКЦИЯНИНГ
КЛИНИК-ПРОГНОСТИК БАҲОСИ****Абдукахарова Д.А., Аскарова З.З.**

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Тадқиқот мақсади: цервикал интраэпителиал неоплазия (CIN) туфайли бачадон бўғзи коагуляциясини ўтказган аёлларда репродуктив функцияни клиник-прогностик баҳолаш. 70 ҳомиладор аёл текширилди: асосий гуруҳ (n=35) — деструктив даволашдан кейин бачадон бўғзи коагуляцияланган синдроми (СКШМ) бўлган пациенткалар; назорат гуруҳи (n=35) — бачадон бўғзи патологиясиз ҳомиладорлар. Кольпоскопия, трансвагинал УЗИ-эластография, цитологик ва микробиологик текширувларни ўз ичига олган комплекс клиник-инструментал таҳлил ўтказилди. СКШМ бўлган пациенткаларда истмико-цервикал етишмовчилик (17,1 % га нисбатан 2,9 %), ҳомиладорликнинг узилиш хавфи (31,4 % га нисбатан 8,6 %), муддатдан илгари туғилишлар (20,0 % га нисбатан 5,7 %) ва оператив туғруқ (28,6 % га нисбатан 11,4 %) ишончли даражада кўпроқ кузатилгани аниқланди. Ушбу тоифадаги пациенткалар учун ҳомиладорлик ва туғруқни олиб бориш алгоритми ишлаб чиқилди.

Калит сўзлар: бачадон бўғзи коагуляцияси, CIN, бачадон бўғзи коагуляцияланган синдроми, репродуктив функция, истмико-цервикал етишмовчилик, муддатдан илгари туғилишлар.

e-mail: abdukaxarovadiya@gmail.com

Введение. Доброкачественные заболевания шейки матки занимают 25–45% в структуре гинекологической патологии. Ведущую роль в развитии патологических процессов шейки матки играет вирус папилломы человека (ВПЧ). Распространённость внутриэпителиального поражения плоского эпителия лёгкой степени (LSIL) составляет 1,5–7,7%, тяжёлой степени (HSIL) — 0,4–1,5%.

Адекватным лечением преинвазивной карциномы шейки матки у женщин репродуктивного возраста является конизация, а при лёгкой и средней дисплазии (CIN I–II) применяются деструктивные методы: диатермокоагуляция, радиодеструкция, лазерная вапоризация, криодеструкция. Однако влияние каждого из этих методов на последующую беременность и роды остаётся предметом дискуссий.

По данным литературы, частота срочных родов после конусовидной эксцизии составляет 66,2%, преждевременных — 14,7%, спонтанных аборт — 19,1%. В литературе имеются противоречивые мнения о течении беременности и родов после деструктивных вмешательств, а их тщательного сравнительного анализа не проводилось, что определяет актуальность настоящего исследования.

Цель исследования. Усовершенствование методов ведения беременности и родов у женщин, перенёсших инвазивные вмешательства на шейке матки по поводу CIN, на основе комплексной клинико-прогностической оценки репродуктивной функции.

Материалы и методы. Исследование выполнено на базе Самаркандского государственного медицинского университета в период 2024–2026 гг. Обследованы 70 беременных, разделённых на две группы:

Таблица 1

Распределение пациенток по группам исследования

Группа	n	Характеристика
Основная	35	Беременные с СКШМ после деструктивного лечения (диатермокоагуляция, радиоволновая, лазерная коагуляция)
Контрольная	35	Беременные без патологии шейки матки и без инвазивных вмешательств в анамнезе

Методы обследования: общеклинические (анамнез, общий и биохимический анализ крови, общий анализ мочи, бактериологическое исследование мазков), гинекологический осмотр, кольпоскопия, трансвагинальная УЗИ-эластография шейки матки, ПЦР-диагностика ВПЧ, цитологическое и гистологическое исследование.

Критерии включения: информированное согласие, перенесённые инвазивные вмешательства на шейке матки по поводу CIN. Критерии исключения: злокачественные новообразования любой локализации.

Результаты исследования

Клинико-anamnestическая характеристика пациенток

Таблица 2

Клинико-anamnestическая характеристика обследованных женщин

Показатель	Основная (n=35)	Контрольная (n=35)
Средний возраст, лет	28,4 ± 3,2	27,1 ± 2,8
Возраст менархе, лет	12,8 ± 1,1	13,0 ± 0,9
Возраст начала половой жизни, лет	18,2 ± 1,5	19,4 ± 1,3
Первобеременные, %	28,6	34,3
Повторнобеременные, %	71,4	65,7
Бесплодие в анамнезе, %	14,3	2,9
ВПЧ-инфицированность, %	42,9	11,4
Хронический цервицит, %	54,3	8,6

Анализ клинико-anamnestических данных показал, что пациентки основной группы достоверно чаще имели отягощённый гинекологический анамнез. Частота бесплодия в анамнезе составила 14,3% в основной группе против 2,9% в контрольной ($p < 0,05$). ВПЧ-инфицированность была выявлена у 42,9% пациенток основной группы, что в 3,8 раза превышало аналогичный показатель контрольной группы (11,4%).

Частота осложнений беременности в сравниваемых группах

Осложнение	Основная, n (%)	Контрольная, n (%)	p
ИЦН	6 (17,1%)	1 (2,9%)	<0,05
Угроза прерывания	11 (31,4%)	3 (8,6%)	<0,01
Преждевременные роды	7 (20,0%)	2 (5,7%)	<0,05
ПРПО	5 (14,3%)	1 (2,9%)	<0,05
Кесарево сечение	10 (28,6%)	4 (11,4%)	<0,05
Ригидность шейки в родах	8 (22,9%)	0 (0%)	<0,001

Как видно из таблицы 3, у пациенток с СКШМ все изучаемые гестационные осложнения встречались достоверно чаще. Наиболее характерным осложнением являлась ригидность шейки матки в родах (22,9%), которая не встречалась в контрольной группе. Частота ИЦН в основной группе превышала контрольную в 5,9 раза, угроза прерывания беременности — в 3,7 раза, а преждевременные роды — в 3,5 раза.



Рис. 1. Частота гестационных осложнений в сравниваемых группах (%)

Динамика длины шейки матки

Таблица 4

Динамика длины шейки матки по данным трансвагинального УЗИ (мм, M±m)

Срок гестации	Основная (n=35)	Контрольная (n=35)	p
16–18 недель	36,2 ± 2,4	38,5 ± 1,8	>0,05
20–22 недели	32,1 ± 3,1	36,8 ± 2,0	<0,05
26–28 недель	27,4 ± 3,5	34,2 ± 2,2	<0,01
32–34 недели	23,8 ± 4,2	32,1 ± 2,5	<0,001

Данные таблицы 4 демонстрируют, что у пациенток основной группы отмечалось более выраженное укорочение шейки матки во второй половине беременности. К 32–34 неделям средняя длина шейки матки составила 23,8±4,2 мм, что достоверно ниже контрольных значений (32,1±2,5 мм, p<0,001). У 17,1% пациенток основной группы длина шейки матки составляла менее 25 мм к концу II триместра, что потребовало назначения поддерживающей терапии прогестероном, а в 8,6% случаев — установки акушерского pessaria.




Рис. 2. Динамика длины шейки матки при беременности в сравниваемых группах

Способы родоразрешения

Таблица 5

Способы родоразрешения в сравниваемых группах

Способ родоразрешения	Основная, n (%)	Контрольная, n (%)	p
Самопроизвольные роды	21 (60,0%)	29 (82,9%)	<0,05
Кесарево сечение	10 (28,6%)	4 (11,4%)	<0,05
Вакуум-экстракция	4 (11,4%)	2 (5,7%)	>0,05

Частота оперативного родоразрешения путём кесарева сечения у пациенток основной группы составила 28,6%, что в 2,5 раза превышало показатель контрольной группы (11,4%, $p < 0,05$). Основными показаниями к оперативному родоразрешению у пациенток с СКШМ являлись: ригидность шейки матки при отсутствии эффекта от медикаментозной стимуляции (50%), дискоординация родовой деятельности (30%), а также сочетание ригидности шейки с ИЦН (20%).




Рис. 3. Структура способов родоразрешения в основной группе

Состояние местного иммунитета. Анализ показателей местного иммунитета шейки матки выявил значимые различия между группами. У пациенток с СКШМ отмечалось снижение уровня секреторного IgA в цервикальной слизи ($0,18 \pm 0,04$ г/л против $0,32 \pm 0,06$ г/л в контроле, $p < 0,01$) и повышение уровня IgM ($0,24 \pm 0,05$ г/л против $0,08 \pm 0,02$ г/л, $p < 0,001$), что свидетельствует о нарушении барьерной функции шейки матки и наличии активного воспалительного процесса. Повышение провоспалительного цитокина ИЛ-6 в цервикальной слизи ($14,8 \pm 3,2$ пг/мл в основной группе против $4,2 \pm 1,1$ пг/мл в контрольной, $p < 0,001$) подтверждает наличие хронического воспаления.

Обсуждение. Результаты проведённого исследования подтверждают, что синдром коагулированной шейки матки оказывает комплексное негативное влияние на репродуктивную функцию женщин. Основные патогенетические механизмы данного влияния включают: рубцовые изменения цервикального канала с нарушением его эластичности и проходимости; гипосекрецию шеечной слизи с

изменением её реологических свойств; нарушение барьерной функции шейки матки с повышением риска восходящей инфекции; а также нарушение локального иммунитета.

Полученные данные согласуются с результатами зарубежных исследований. По данным Kyrgiou M. et al. (2016), глубина конусовидной эксцизии является ключевым фактором, определяющим риск неблагоприятных акушерских исходов. Castanon A. et al. (2014) установили, что риск преждевременных родов возрастает пропорционально глубине эксцизии. Наши данные подтверждают, что даже менее инвазивные деструктивные методы (диатермокоагуляция) могут приводить к значимым нарушениям репродуктивной функции. Особого внимания заслуживает проблема ригидности шейки матки в родах, выявленная у 22,9% пациенток основной группы. Данное осложнение обусловлено замещением нормальной мышечной и эластической ткани фиброзной, что приводит к неспособности шейки к адекватной дилатации. Это состояние является одним из ведущих показаний к оперативному родоразрешению у данной категории пациенток. Укорочение шейки матки у пациенток с СКШМ, особенно выраженное во второй половине беременности, является проявлением функциональной цервикальной недостаточности. Важно отметить, что данная форма ИЦН может не сопровождаться классическим укорочением шейки менее 25 мм, однако проявляется несостоятельностью внутреннего зева и нарушением замыкательной функции.

Выводы. У женщин, перенёсших коагуляцию шейки матки по поводу CIN, достоверно чаще встречаются гестационные осложнения: ИЦН (17,1% против 2,9%), угроза прерывания (31,4% против 8,6%), преждевременные роды (20,0% против 5,7%). Динамика длины шейки матки у пациенток с СКШМ характеризуется более выраженным укорочением во второй половине беременности (23,8±4,2 мм к 32–34 неделям против 32,1±2,5 мм в контроле). Частота оперативного родоразрешения у пациенток с СКШМ составляет 28,6%, что в 2,5 раза выше контрольных значений, при этом основным показанием является ригидность шейки матки (22,9%). Нарушение местного иммунитета (снижение sIgA, повышение IgM и ИЛ-6) свидетельствует о стойком нарушении барьерной функции шейки матки после коагуляции. Беременность у женщин с СКШМ требует индивидуального перинатального плана ведения, включающего УЗИ-мониторинг длины шейки матки, профилактику ИЦН, санацию микрофлоры влагалища и своевременное определение тактики родоразрешения.

Список литературы:

1. Адамян Л.В. и др. Доброкачественные и предраковые заболевания шейки матки с позиции профилактики рака. Клинические рекомендации. М., 2017.
2. Бадретдинова Ф.Ф., Коргунова В.В. Репродуктивная функция женщин после деструктивных операций на шейке матки // Акушерство, гинекология и репродукция. 2015. №1. С. 54–58.
3. Овсянникова Т.В., Куликов И.А., Павлович С.В. Заболевания шейки матки: современный взгляд. МЕДпресс-информ, 2018.
4. Союнов М.А., Коган А.В. Современные методы диагностики доброкачественных заболеваний шейки матки // Акушерство и гинекология: новости, мнения, обучение. 2022. Т.10, №3. С. 78–81.
5. Фириченко С.В. и др. Удаление части шейки матки и риск преждевременных родов // Нац. конгресс «Онкология репродуктивных органов». М., 2016.
6. Bentivegna E. et al. Reproductive and oncologic outcomes after fertility-sparing surgery for early stage cervical cancer // Fertility and Sterility. 2020. Vol. 113(4). P. 685–703.
7. Castanon A. et al. Risk of preterm delivery with increasing depth of excision for CIN in England // BMJ. 2014. Vol. 349. P. g6223.
8. Kyrgiou M. et al. Adverse obstetric outcomes after local treatment for cervical preinvasive and early invasive disease // BMJ. 2016. Vol. 354. P. i3633.
9. Liu Y. et al. Impact of cervical conization on pregnancy outcomes // BMC Pregnancy and Childbirth. 2023. Vol. 23(1). P. 123.
10. Nam K.H. et al. Pregnancy outcome after cervical conization: risk factors for preterm delivery // J Gynecol Oncol. 2010. Vol. 21(4). P. 225–229.
11. Obut M. et al. Factors affecting obstetric outcomes in patients who underwent conization due to CIN 2–3 // J Turk Ger Gynecol Assoc. 2024. Vol. 25(4). P. 238–246.
12. Santesso N. et al. Systematic reviews of benefits and harms of cryotherapy, LEEP, and cold knife conization // Int J Gynaecol Obstet. 2015. Vol. 131(3). P. 266–271.

Для цитирования: Абдукахарова Д.А., Аскарлова З.З. Клинико-прогностическая оценка репродуктивной функции после коагуляции шейки матки // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 4(24). – С. 457–461. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19568224>

БОШ МИЯДА ҚОН АЙЛАНИШИНИНГ СУРУНКАЛИ БУЗИЛИШЛАРИДА ЗАМОНАВИЙ РЕАБИЛИТАЦИЯ УСУЛЛАРИНИНГ КЛИНИК ВА КОГНИТИВ САМАРАДОРЛИГИ**Музаффарова Н.Ш., Гулмуродов Б.Н.**

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Бош миёда қон айланишининг сурункали бузилишлари замонавий неврологиянинг энг долзарб муаммоларидан бири бўлиб, аҳоли ўртасида когнитив пасайиши, иш қобилиятининг йўқолиши ва ҳаёт сифати пасайишининг асосий сабабларидан ҳисобланади. Аҳолининг қариши, юрак-қон томир касалликларининг кўпайиши ва стресс омиларининг ортиши ушбу патологиянинг кенг тарқалишига олиб келмоқда. Сўнгги йилларда ушбу ҳолатларни даволашда фақат медикаментоз ёндашув эмас, балки замонавий нейрореабилитация усулларини қўллашга катта эътибор қаратилмоқда. Шу боис, сурункали миё ишемиясида клиник ва когнитив бузилишларни тиклашга қаратилган самарали реабилитация усулларини ишлаб чиқиш ва баҳолаш бугунги кун тиббиётининг муҳим вазифаларидан бири ҳисобланади.

Калим сўзлар: бош миё ишемияси, сурункали қон айланиш бузилиши, нейрореабилитация, когнитив бузилишлар, вертебробазилар етишмовчилиқ, ҳаёт сифати, неврологик симптомлар, витамин D, литий, реабилитация самарадорлиги.

CLINICAL AND COGNITIVE EFFECTIVENESS OF MODERN REHABILITATION METHODS IN CHRONIC CEREBRAL CIRCULATORY DISORDERS**Muzaffarova N.Sh., Gulmurodov B.N.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Chronic cerebral circulatory disorders represent one of the most pressing challenges in modern neurology, being a leading cause of cognitive decline, reduced working capacity, and decreased quality of life. The global aging of the population, increasing prevalence of cardiovascular diseases, and rising psychosocial stress contribute to the growing burden of this condition. In recent years, there has been a shift from purely pharmacological treatment toward the integration of modern neurorehabilitation strategies. Therefore, the development and evaluation of effective rehabilitation approaches aimed at improving clinical and cognitive outcomes in patients with chronic cerebral ischemia remain a priority in contemporary medical research.

Keywords: chronic cerebral ischemia, cerebral circulatory disorders, neurorehabilitation, cognitive impairment, vertebrobasilar insufficiency, quality of life, neurological symptoms, vitamin D, lithium, rehabilitation effectiveness.

КЛИНИЧЕСКАЯ И КОГНИТИВНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ РЕАБИЛИТАЦИИ ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЯХ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ**Музаффарова Н.Ш., Гулмуродов Б.Н.**

Самарқандский государственный медицинский университет, г. Самарқанд, Узбекистан

Резюме. Хронические нарушения мозгового кровообращения являются одной из наиболее актуальных проблем современной неврологии, занимая ведущее место среди причин когнитивных расстройств, снижения трудоспособности и качества жизни населения. В условиях старения популяции, роста сердечно-сосудистых заболеваний и увеличения психоэмоциональной нагрузки распространённость данной патологии неуклонно возрастает. В последние годы особое внимание уделяется не только медикаментозному лечению, но и внедрению современных методов нейрореабилитации. В связи с этим разработка и оценка эффективности комплексных реабилитационных подходов, направленных на восстановление клинических и когнитивных функций, представляет собой одну из ключевых задач современной медицины.

Ключевые слова: хроническая ишемия мозга, нарушения мозгового кровообращения, нейрореабилитация, когнитивные нарушения, вертебробазиллярная недостаточность, качество жизни, неврологические симптомы, витамин D, литий, эффективность реабилитации.

Кириш. Бош миёда қон айланишининг сурункали бузилишлари замонавий неврологиянинг энг долзарб муаммоларидан бири ҳисобланади. Ушбу патология аҳоли ўртасида кенг тарқалган бўлиб, когнитив функцияларнинг пасайиши, неврологик дефицитнинг ривожланиши ва беморларнинг ҳаёт сифати ёмонлашишига олиб келади. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти маълумотларига кўра, сурункали миё ишемияси ва у билан боғлиқ ҳолатлар ногиронлик ва меҳнат қobiliятини йўқотишнинг етакчи сабабларидан бири сифатида қайд этилмоқда.

Сўнгги йилларда аҳолининг қариши, юрак-қон томир касалликларининг ортиши, артериал гипертензия, атеросклероз ва метаболлик синдром каби хавф омилларининг кенг тарқалиши ушбу касалликнинг янада кўпайишига сабаб бўлмоқда. Шу билан бирга, сурункали қон айланиш бузилишлари фақат соматик эмас, балки психоэмоционал ва когнитив соҳада ҳам чуқур ўзгаришларга олиб келиши билан тавсифланади.

Анъанавий даволаш усуллари асосан медикаментоз терапияга қаратилган бўлса-да, уларнинг самарадорлиги ҳар доим ҳам етарли эмас. Шу муносабат билан сўнгги йилларда комплекс ёндашув — айниқса, замонавий нейрореабилитация усуллари қўллашга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Нейрореабилитация функционал тикланишни рағбатлантириш, нейропластикликни ошириш ва беморларнинг ижтимоий мослашувини яхшилашга хизмат қилади.

Айниқса, когнитив тренинг, вестибуляр реабилитация, физиотерапия ва психоэмоционал ҳолатни коррекция қилишга қаратилган усулларни комплекс равишда қўллаш юқори самара бериши мумкинлиги ҳақида маълумотлар тобора ортиб бормоқда. Шу билан бирга, нейропротектив хусусиятга эга бўлган моддалар, жумладан витамин D ва литийнинг реабилитация жараёнидаги ўрнини ўрганиш ҳам муҳим аҳамият касб этмоқда.

Шу сабабли бош миёда қон айланишининг сурункали бузилишларида замонавий реабилитация усуллари клиник ва когнитив самарадорлигини комплекс баҳолаш долзарб илмий ва амалий аҳамиятга эга.

Тадқиқотнинг мақсади: Бош миёда қон айланишининг сурункали бузилишлари кузатиладиган беморларда замонавий нейрореабилитация усуллари клиник, неврологик ва когнитив ҳолатга таъсирини комплекс ўрганиш, шунингдек ушбу усулларнинг самарадорлигини баҳолаш.

Тадқиқот вазифалари:

- Бош миёда қон айланишининг сурункали бузилишлари билан оғриган беморларда клиник-нeuroлогик ҳолатни баҳолаш.
- Ушбу беморларда когнитив функциялар ҳолатини замонавий шкалалар ёрдамида ўрганиш.
- Замонавий нейрореабилитация усуллари қўллаш орқали беморларнинг функционал ҳолатидаги ўзгаришларни таҳлил қилиш.
- Реабилитация жараёнида психоэмоционал ҳолат (тревога, депрессия) динамикасини баҳолаш.
- Комплекс реабилитация усуллари клиник ва когнитив самарадорлигини солиштирма таҳлил қилиш.
- Замонавий нейрореабилитация усуллари амалиётга жорий этиш бўйича тавсиялар ишлаб чиқиш.

Материаллар ва усуллар тадқиқоти. Тадқиқот клиник шароитда олиб борилиб, унда жами 151 нафар текширилувчи иштирок этди. Иштирокчилар клиник-нeuroлогик ҳолатига қараб асосий, солиштирма ва назорат гуруҳларига ажратилди. Асосий гуруҳни бош миёда қон айланишининг сурункали бузилишлари ва вертебробазилар етишмовчилик белгилари аниқланган 65 нафар бемор ташкил этди. Солиштирма гуруҳга 56 нафар бемор киритилди, назорат гуруҳини эса 30 нафар амалда соғлом шахслар ташкил қилди.

Тадқиқотга киритиш мезонлари қуйидагилардан иборат бўлди: клиник ва инструментал усуллар билан тасдиқланган бош миё ишемияси белгилари, 40 ёшдан юқори бўлиш, беморнинг тадқиқотда иштирок этишга розилиги. Чикариб ташлаш мезонларига ўтқир неврологик ҳолатлар (инсультнинг ўтқир даври), оғир соматик касалликлар, онкологик патологиялар ва декомпенсация ҳолатлари киритилди.

Асосий гуруҳ беморлари даволаш хусусиятларига қараб икки кичик гуруҳга бўлинди: 1-гуруҳ (35 нафар бемор)га стандарт терапия фонида замонавий нейрореабилитация усуллари ҳамда нейропротектив терапия (витамин D ва литий) қўлланилди; 2-гуруҳ (30 нафар бемор)га фақат стандарт терапия ва нейрореабилитация чоралари қўлланилди.

Солиштирма гуруҳ ҳам икки кичик гуруҳга ажратилди: 3-гуруҳ (30 нафар бемор) витамин D қабул қилди, 4-гуруҳ (26 нафар бемор) эса стандарт терапия билан чекланди. Назорат гуруҳи соғлом шахслардан иборат бўлиб, нормал кўрсаткичлар билан солиштириш учун хизмат қилди.

Барча беморларда комплекс текширув амалга оширилди. Клиник-неврологик ҳолат неврологик статусни баҳолаш орқали аниқланди, бунда бош айланиш, бош оғриғи, ҳаракат ва координация бузилишлари, вегетатив симптомлар эътиборга олинди. Когнитив функцияларни баҳолаш учун HADS (тревога ва депрессия даражаси), DHI (бош айланиш индекси) ва VAS (оғриқ интенсивлиги) шкалалари қўлланилди.

Инструментал текширув усуллари сифатида магнит-резонанс томография (МРТ), компьютер томографияси (КТ) ҳамда дуплекс сканерлаш қўлланилиб, бош мия тузилмалари ва қон томирлар ҳолати баҳоланди. Қўшимча равишда, гемодинамик кўрсаткичлар ва қон айланиш хусусиятлари таҳлил қилинди.

Лаборатор текширувларда қон зардобдаги биокимёвий кўрсаткичлар спектрофотометрия усулида аниқланди. Зарур ҳолларда витамин D даражаси баҳоланди.

Нейрореабилитация комплекси индивидуал ёндашув асосида ташкил этилди ва қуйидагиларни ўз ичига олди: физиотерапия усуллари, вестибуляр машқлар, когнитив тренинг, даволаш жисмоний тарбияси (ЛФК), ҳамда психоэмоционал ҳолатни барқарорлаштиришга қаратилган чора-тадбирлар.

Даволаш натижалари динамикада баҳоланди, яъни тадқиқот бошида ва даволаш курси якунида кўрсаткичлар қайта ўлчанди. Олинган маълумотлар статистик дастурлар ёрдамида қайта ишланди, натижалар ишончлилиги даражаси ($p < 0,05$) асосида баҳоланди.

Натижалар. Тадқиқот натижаларига кўра, бош мияда қон айланишининг сурункали бузилишлари билан оғриган беморларда даволашдан олдин клиник-неврологик симптомлар турли даражада намоён бўлган. Аксарият беморларда бош айланиш, бош оғриғи, ҳаракат координациясининг бузилиши, тез чарчаш, диққат пасайиши ҳамда тревога ва депрессия белгилари қайд этилди. Ушбу симптомлар айниқса вертебробазилар етишмовчилиги билан боғлиқ ҳолларда яққол ифодаланган бўлди.

Даволаш бошланишида HADS шкаласи бўйича беморларнинг катта қисмида ўрта ва юқори даражада тревога ва депрессия ҳолати аниқланди. DHI шкаласи орқали баҳоланганда, бош айланишнинг ҳаёт сифатига таъсири юқори даражада эканлиги кузатилди. VAS шкаласи бўйича бош оғриғи интенсивлиги кўпчилиги беморларда ўрта ва юқори кўрсаткичларда бўлган.

Даволаш курсидан сўнг барча гуруҳларда ижобий динамика қайд этилди, аммо ўзгаришлар даражаси қўлланилган терапияга боғлиқ равишда фарқ қилди. Асосий гуруҳнинг 1-кичик гуруҳида (замонавий нейрореабилитация ва нейропротектив терапия — витамин D ва литий қабул қилган беморлар) клиник симптомларнинг яққол камайиши кузатилди. Бош айланиш частотаси ва интенсивлиги сезиларли даражада пасайди, мувозанат бузилишлари камайди, беморларнинг юриш барқарорлиги яхшиланди. Бош оғриғи интенсивлиги VAS шкаласи бўйича сезиларли камайгани қайд этилди.

Когнитив функцияларни баҳолаш натижаларига кўра, мазкур гуруҳда диққат, хотира ва фикрлаш тезлиги яхшиланиши кузатилди. HADS шкаласи бўйича тревога ва депрессия кўрсаткичлари ишончли равишда пасайди ($p < 0,05$). DHI индекси бўйича бош айланишнинг ҳаёт сифатига таъсири камайгани аниқланди.

Асосий гуруҳнинг 2-кичик гуруҳида (фақат стандарт терапия ва реабилитация) ҳам ижобий динамика кузатилди, аммо клиник ва когнитив кўрсаткичларнинг яхшиланиши 1-гуруҳга нисбатан камроқ даражада бўлди. Симптомлар камайиши секинроқ ва тўлиқ эмаслиги кузатилди.

Солиштирма гуруҳларда таҳлил шуни кўрсатдики, витамин D қабул қилган беморларда айрим клиник ва когнитив кўрсаткичлар яхшиланиши, жумладан умумий ҳолат ва эмоционал фон барқарорлашган. Бироқ бу ўзгаришлар комплекс нейрореабилитация ва литий билан биргаликда олиб борилган даволашга нисбатан пастроқ самарадорликка эга бўлди.

Назорат гуруҳида кўрсаткичлар барқарор бўлиб, клиник ва когнитив ўзгаришлар кузатилмади, бу эса олинган натижаларнинг ишончлилигини янада тасдиқлайди.

Умуман олганда, олинган натижалар шуни кўрсатдики, замонавий нейрореабилитация усуллари нейропротектив терапия (витамин D ва литий) билан биргаликда қўллаш клиник симптомларни камайитириш, когнитив функцияларни тиклаш ва психоэмоционал ҳолатни яхшилашда энг юқори самарадорликни таъминлайди.

Хулоса. Бош мияда қон айланишининг сурункали бузилишлари клиник-неврологик, когнитив ва психоэмоционал ўзгаришлар билан кечиб, беморларнинг ҳаёт сифати ва функционал фаоллигига сезиларли салбий таъсир кўрсатиши аниқланди. Тадқиқот давомида ушбу патологияда бош айланиш, бош оғриғи, координация бузилишлари, диққат ва хотира пасайиши, шунингдек тревога ва депрессия белгилари кенг тарқалганлиги кузатилди.

Олиб борилган таҳлиллар шуни кўрсатдики, замонавий нейрореабилитация усулларини қўллаш клиник симптомларнинг камайиши, когнитив функцияларнинг яхшиланиши ва беморларнинг умумий ҳолатини барқарорлаштиришда муҳим аҳамият касб этади. Айниқса, вестибуляр реабилитация, когнитив тренинг ва физиотерапия усулларини комплекс равишда қўллаш функционал тикланиш жараёнини фаоллаштириши ва нейропластикликни ошириши билан изоҳланади.

Шу билан бирга, нейропротектив терапия (витамин D ва литий)ни реабилитация жараёнига қўшиш даволаш самарадорлигини янада ошириб, клиник-неврологик ва когнитив кўрсаткичларнинг ишончли яхшиланишига олиб келди. Мазкур ёндашув беморларда психоэмоционал ҳолатни барқарорлаштириш ва ҳаёт сифати кўрсаткичларини яхшилашда ҳам ижобий таъсир кўрсатди.

Комплекс ёндашув — яъни замонавий нейрореабилитация усуллари ва медикаментоз терапияни биргаликда қўллаш — сурункали мия ишемиясида самарали ва патогенетик асосланган даволаш йўналиши эканлиги тасдиқланди. Бундай ёндашув нафақат симптомларни камайтириш, балки касаллик прогрессиясини секинлаштириш ва беморларнинг ижтимоий фаоллигини сақлаб қолиш имконини беради.

Шу тариқа, олинган натижалар замонавий нейрореабилитация усулларини клиник амалиётга кенг жорий этиш зарурлигини кўрсатади ҳамда ушбу ёндашувни янада такомиллаштириш ва индивидуаллаштириш келгусидаги тадқиқотлар учун муҳим йўналиш бўлиб хизмат қилади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Хакимова, С. З., & Ахмедова, Ч. З. (2025). Влияние цитомегаловирусной инфекции на когнитивные функции у пациентов с хронической ишемией мозга. *Журнал гуманитарных и естественных наук*, (21 [2]), 27-30.
2. Сохиба, Х., Бахора, Х., & Муродуллаева, П. (2025). Роль Ликвородинамических Нарушений У Больных С Хронической Ишемией Головного Мозга (ДЭ). *world of Medicine: Journal of Biomedical Sciences*, 2(1), 220-225.
3. O'Brien J.T., Thomas A. Vascular dementia. *Lancet*. 2015;386(10004):1698–1706.
4. Iadecola C. The pathobiology of vascular dementia. *Neuron*. 2013;80(4):844–866.
5. World Health Organization. Global status report on dementia 2023. WHO, Geneva.
6. Gorelick P.B. et al. Vascular contributions to cognitive impairment and dementia. *Stroke*. 2017;48(2): 331–338.
7. Захаров В.В. Современные подходы к терапии когнитивных нарушений при ХНМК. *Неврология*. 2022;6(3):15–21.
8. Хамдамова Б.К., Кодиров У.А. Роль хронической церебральной гипоперфузии в развитии деменции. *Журнал неврологии*. 2024;12(2):44–51.
9. Верещагин Н.В., Морозов В.И., Гаврилова С.И. Хроническая недостаточность мозгового кровообращения и когнитивные нарушения. — М.: МЕД пресс-информ, 2020. — 312 с.
10. Гаврилова С.И., Захаров В.В. Когнитивные расстройства при хронической ишемии мозга: современные представления и подходы к терапии. // *Неврологический журнал*. — 2021. — Т.26, №5. — С. 15–22.
11. Дамулин И.В., Парфенов В.А. Хроническая ишемия мозга: диагностика, клинические проявления, лечение. // *Consilium Medicum*. — 2022. — №2. — С. 43–51.
12. Одинак М.М., Вознесенская Т.Г. Нарушения когнитивных функций при ХНМК: патогенез, диагностика и терапия. // *Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова*. — 2019. — Т.119, №7. — С. 23–30.
13. Wardlaw J.M., Smith C., Dichgans M. Small vessel disease: mechanisms and clinical implications. // *Lancet Neurology*. — 2019. — Vol.18, №7. — P. 684–696.

Иқтибос учун: Музаффарова Н.Ш., Гулмуродов Б.Н. Бош миёда қон айланишининг сурункали бузилишларида замонавий реабилитация усулларининг клиник ва когнитив самарадорлиги // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси*. — 2026. — № 4(24). — Б. 462–465. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19568371>

ЮРАК-ҚОН ТОМИР КАСАЛЛИКЛАРИ ФОНИДА СТОМАТОЛОГИК КАСАЛЛИКЛАРНИ ДАВОЛАШ ВА ПРОФИЛАКТИКА ЧОРАЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ**Муратова С.К., Хушвактов А.Б., Косимова М.О., Асролова Ж., Шербекров Б.А.**

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Ушбу кенгайтирилган обзор мақолада юрак-қон томир касалликлари (ЮҚТК) билан оғриган беморларда стоматологик касалликларнинг тарқалиши, патогенетик механизмлари, клиник хусусиятлари ҳамда даволаш ва профилактика усуллари бўйича замонавий илмий манбалар таҳлил қилинди. Периодонтал касалликлар ва атеросклероз ўртасидаги боғлиқлик яллиғланиши ва микробиологик омиллар орқали изоҳланади. Комплекс, индивидуал ва интердисциплинар ёндашув самарадорликни ошириши асосланди.

Калит сўзлар: периодонтит, юрак-қон томир касалликлари, яллиғланиш, атеросклероз, профилактика, стоматология.

IMPROVEMENT OF TREATMENT AND PREVENTION MEASURES FOR DENTAL DISEASES AMONG CARDIOVASCULAR DISEASES**Muratova S.K., Khushvaktov A.B., Kosimova M.O., Asrolova J., Sherbekov B.A.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. This extensive review article analyzes modern scientific sources on the prevalence, pathogenic mechanisms, clinical features, and treatment and prevention methods of dental diseases in patients with cardiovascular diseases (CVD). The link between periodontal diseases and atherosclerosis is explained by inflammatory and microbiological factors. It was substantiated that a comprehensive, individual, and interdisciplinary approach increases efficiency.

Keywords: periodontitis, cardiovascular diseases, inflammation, atherosclerosis, prevention, dentistry.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕР ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НА ФОНЕ СЕРДЕЧНО-СОСУДИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ**Муратова С.К., Хушвактов А.Б., Косимова М.О., Асролова Ж., Шербекров Б.А.**

Самарқандский государственный медицинский университет, г. Самарқанд, Узбекистан

Резюме. В данной расширенной обзорной статье проанализированы современные научные источники по распространенности, патогенетическим механизмам, клиническим особенностям, а также методам лечения и профилактики стоматологических заболеваний у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ). Связь между заболеваниями пародонта и атеросклерозом объясняется воспалительными и микробиологическими факторами. Обосновано, что комплексный, индивидуальный и междисциплинарный подход повышает эффективность.

Ключевые слова: периодонтит, сердечно-сосудистые заболевания, воспаление, атеросклероз, профилактика, стоматология.

Юрак-қон томир касалликлари глобал соғлиқни сақлаш тизимида етакчи муаммолардан бири бўлиб қолмоқда [1]. Сўнгги йилларда оғиз бўшлиғи саломатлиги ва системали касалликлар ўртасидаги боғлиқликка қизиқиш ортди. Айниқса, периодонтал касалликлар ЮҚТКнинг ривожланиши ва прогрессиясида муҳим роль ўйнаши ҳақида. Мазкур обзор мақола тайёрлашда сўнгги йиллардаги халқаро илмий манбалар (PubMed, Scopus ва бошқа базалар) таҳлил қилинди. Танланган тадқиқотлар периодонтал касалликлар ва ЮҚТК ўртасидаги боғлиқликни, шунингдек даволаш ва профилактика усуллари қамраб олган.

Периодонтал касалликларда яллиғланиш жараёни асосий ўрин тутди. Яллиғланиш медиаторлари (интерлейкин-6, С-реактив оксил) қон орқали тарқалиб, эндотелий дисфункциясини келтириб чиқаради [4]. Бу эса атеросклеротик бляшкалар шаклланишига сабаб бўлади [5].

Пародонтал патогенлар (*Porphyromonas gingivalis* ва бошқалар) қонга тушиб, юрак тўқималарига таъсир қилиши мумкин [6]. Айрим тадқиқотларда ушбу бактериялар атеросклеротик бляшкаларда аниқланган [7]. Тадқиқотлар шуни кўрсатадики, оғир периодонтитга эга беморларда юрак хуружи ва инсулт хавфи юқори [8]. Шунингдек, гипертония билан оғриган беморларда оғиз гигиенаси дара-

жаси паст бўлиши кузатилади [9].ЮҚТК билан оғриган беморларда стоматологик даволашда қуйидаги жиҳатлар муҳим:

- антикоагулянт терапияни ҳисобга олиш [10];
- стрессни камайтириш (седация усуллари);
- минимал инвазив стоматология;
- инфекцияни назорат қилиш.

Периодонтал даволаш (скейлинг, кюретаж) яллиғланиш кўрсаткичларини камайтириши аниқланган [11].

Профилактика комплекс бўлиши лозим:

- кундалик оғиз гигиенаси;
- стоматолог кўригидан мунтазам ўтиш;
- антибактериал чайқов воситалари;
- соғлом турмуш тарзи (тамакидан воз кечиш, парҳез).

Бу чоралар нафақат стоматологик, балки кардиологик ҳолатни ҳам яхшилайдиган [12].

Адабиётлар таҳлили натижалари стоматологик ва юрак-қон томир касалликлари ўртасида мураккаб, кўп омилили боғлиқлик мавжудлигини кўрсатади. Яллиғланиш умумий патогенетик звено сифатида намоён бўлади. Бироқ, айрим тадқиқотларда қарама-қарши натижалар ҳам мавжуд бўлиб, бу соҳада қўшимча тадқиқотлар талаб этилади.

Интердисциплинар ёндашув — стоматолог ва кардиолог ҳамкорлиги — беморларни самарали даволашда муҳим аҳамиятга эга.

Хулоса. ЮҚТК ва стоматологик касалликлар ўртасидаги боғлиқлик илмий жиҳатдан асосланган. Периодонтал касалликларни ўз вақтида даволаш ва профилактика қилиш юрак-қон томир асоратларини камайтиришга ёрдам беради. Замонавий тиббиётда комплекс ва индивидуал ёндашув устувор аҳамиятга эга.

Адабиётлар рўйхати:

1. Beck J.D., Offenbacher S. Systemic effects of periodontitis: epidemiology of periodontal disease and cardiovascular disease // *Journal of Clinical Periodontology*. – 2005. – Vol. 32, №6. – P. 16–25.
2. Tonetti M.S., Van Dyke T.E. Periodontitis and atherosclerotic cardiovascular disease: consensus report // *Journal of Periodontology*. – 2013. – Vol. 84, №4. – P. 24–29.
3. Lockhart P.B., Bolger A.F., Papapanou P.N. et al. Periodontal disease and atherosclerotic vascular disease // *Circulation*. – 2012. – Vol. 125, №20. – P. 2520–2544.
4. Dietrich T., Sharma P., Walter C. et al. The epidemiological evidence behind the association between periodontitis and cardiovascular disease // *Journal of Clinical Periodontology*. – 2013. – Vol. 40, №14. – P. 70–84.
5. Pussinen P.J., Paju S., Mantyla P. et al. Oral infections and cardiovascular diseases // *Atherosclerosis*. – 2007. – Vol. 193, №2. – P. 222–231.
6. Humphrey L.L., Fu R., Buckley D.I. et al. Periodontal disease and coronary heart disease incidence // *Annals of Internal Medicine*. – 2008. – Vol. 149, №6. – P. 379–390.
7. Friedewald V.E., Kornman K.S., Beck J.D. et al. The American Journal of Cardiology and Journal of Periodontology editors' consensus // *American Journal of Cardiology*. – 2009. – Vol. 104, №1. – P. 59–68.
8. Scannapieco F.A. Role of oral bacteria in cardiovascular disease // *Journal of Periodontology*. – 1998. – Vol. 69, №7. – P. 841–850.
9. Sanz M., Marco Del Castillo A., Jepsen S. et al. Periodontitis and cardiovascular diseases: consensus report // *Journal of Clinical Periodontology*. – 2020. – Vol. 47, №3. – P. 268–288.
10. Bahekar A.A., Singh S., Saha S. et al. The prevalence and incidence of coronary heart disease in periodontitis // *American Heart Journal*. – 2007. – Vol. 154, №5. – P. 830–837.
11. Joshipura K.J., Rimm E.B., Douglass C.W. et al. Poor oral health and coronary heart disease // *Journal of Dental Research*. – 1996. – Vol. 75, №9. – P. 1631–1636.
12. Paraskevas S., Huizinga J.D., Loos B.G. A systematic review and meta-analyses on C-reactive protein in relation to periodontitis // *Journal of Clinical Periodontology*. – 2008. – Vol. 35, №4. – P. 277–290.
13. D'Aiuto F., Parkar M., Andreou G. et al. Periodontal therapy and endothelial function // *New England Journal of Medicine*. – 2004. – Vol. 351, №2. – P. 163–172.
14. Linden G.J., Lyons A., Scannapieco F.A. Periodontal systemic associations: review // *Journal of Clinical Periodontology*. – 2013. – Vol. 40, №14. – P. 8–19.
15. Kebschull M., Demmer R.T., Papapanou P.N. "Gum bug, leave my heart alone!" // *BMJ*. – 2010. – Vol. 340. – P. c2451.

16.Chapple I.L.C., Genco R. Diabetes and periodontal diseases: consensus report // Journal of Clinical Periodontology. – 2018. – Vol. 45, №20. – P. 106–112.

17.Nazir M.A. Prevalence of periodontal disease and systemic link // International Journal of Health Sciences. – 2017. – Vol. 11, №2. – P. 72–80.

18.Genco R.J., Van Dyke T.E. Prevention of periodontitis and systemic disease // Journal of Dental Research. – 2010. – Vol. 89, №12. – P. 139–148.

19.Lockhart P.B., Brennan M.T., Sasser H.C. et al. Bacteremia associated with tooth brushing // Circulation. – 2008. – Vol. 117, №24. – P. 3118–3125.

20.Sanz M., Ceriello A., Buysschaert M. et al. Scientific evidence on the links between periodontal diseases and systemic diseases // Journal of Clinical Periodontology. – 2018. – Vol. 45, №20. – P. 138–149.

Иқтибос учун: Муратова С.К., Хушвактов А.Б., Косимова М.О., Асророва Ж., Шербекков Б.А. Юрак-кон томир касалликлари фонида стоматологик касалликларни даволаш ва профилактика чораларини такомиллаштириш // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2026. – № 4(24). – Б. 466–468. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19568618>

ОЦЕНКА ИММУНОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ, АНГИОГЕННЫХ И КОАГУЛЯЦИОННЫХ МАРКЕРОВ У ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ И ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНОГО ТРОПОНИНА

Шарипов Ж.Р., Хамдамов Б.З.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. В работе представлены результаты комплексного клинико-лабораторного исследования 38 пациентов, проходивших амбулаторное и стационарное лечение в Бухарском областном кардиологическом диспансере. Все пациенты были разделены на две группы: I группа — больные с артериальной гипертензией без признаков ишемической болезни сердца ($n=25$); II группа — пациенты с подтверждённой ИБС, развившейся на фоне длительно текущей гипертензии ($n=13$). Целью исследования было изучение взаимосвязи между концентрацией высокочувствительного сердечного тропонина (hs-cTn) и уровнями иммунновоспалительных и ангиофибротических маркеров (VEGF A, TGF β , IFN α , IFN γ , IL-6, CRP, C3a). Проведённый анализ позволил оценить прогрессирование иммунного, ангиогенного и воспалительного ответа в зависимости от выраженности миокардиального повреждения. Полученные данные свидетельствуют о тесной связи повышения hs-cTn с активацией воспаления, ангиогенеза, фиброза и врождённого иммунного ответа, особенно выраженной у пациентов с ИБС. Это подчёркивает значимость интегральной лабораторной оценки для стратификации риска и мониторинга течения ишемической болезни сердца у больных с артериальной гипертензией.

Ключевые слова: артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, hs-cTn, ангиогенез, воспаление, иммунный ответ, лабораторная диагностика.

ASSESSMENT OF IMMUNOINFLAMMATORY, ANGIOGENIC, AND COAGULATION MARKERS IN PATIENTS WITH ARTERIAL HYPERTENSION AND ISCHEMIC HEART DISEASE DEPENDING ON HIGH-SENSITIVITY TROPONIN LEVELS

Sharipov J.R., Khamdamov B.Z.

Bukhara State Medical Institute, Bukhara, Uzbekistan

Resume. This study presents the results of a comprehensive clinical and laboratory examination of 38 patients who underwent inpatient and outpatient treatment at the Bukhara Regional Cardiology Dispensary. All participants were divided into two groups: Group I — patients with arterial hypertension without signs of ischemic heart disease ($n=25$); Group II — patients with confirmed IHD developed against the background of long-term hypertension ($n=13$). The aim of the study was to assess the association between high-sensitivity cardiac troponin (hs-cTn) levels and immune-inflammatory and angiofibrotic biomarkers (VEGF A, TGF β , IFN α , IFN γ , IL-6, CRP, C3a). The analysis revealed the progressive activation of immune, angiogenic, and inflammatory responses depending on the severity of myocardial injury. The findings demonstrate a strong correlation between elevated hs-cTn and enhanced inflammation, angiogenesis, fibrosis, and innate immunity, especially pronounced in patients with IHD. These results highlight the importance of integrated laboratory evaluation for risk stratification and monitoring of ischemic heart disease in patients with arterial hypertension.

Keywords: arterial hypertension, ischemic heart disease, hs-cTn, angiogenesis, inflammation, immune response, laboratory diagnostics.

ЙОҚОРИ СЕЗГИРЛИҚДАГИ ТРОПОНИН ДАРАЖАСИГА ҚАРАБ АРТЕРИАЛ ГИПЕРТЕНЗИЯ ВА ЮРАК ИШЕМИК КАСАЛЛИГИ БЎЛГАН БЕМОЛЛАРДА ИММУН-ЯЛИЛҒЛАНИШ, АНГИОГЕНЕЗ ВА КОАГУЛЯЦИЯ МАРКЕРЛАРИНИ БАҲОЛАШ

Шарипов Ж.Р. Хамдамов Б.З.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Ушбу мақолада Бухоро вилояти кардиология диспансерида даволанган 38 нафар беморнинг клиник ва лаборатория таҳлилларига асосланган тадқиқот натижалари келтирилган. Барча иштирокчилар 2 гуруҳга ажратилди: I гуруҳ — артериал гипертензия таъхиси қўйилган, лекин юрак ишемик касаллиги белгилари мавжуд бўлмаган беморлар ($n=25$); II гуруҳ — артериал

гипертония замирида юрак ишемик касаллиги ривожланган беморлар ($n=13$). Тадқиқотнинг мақсади юқори сезгир юрак тропонини (hs-cTn) миқдори ва иммун-воспалител ҳамда ангиофиброз маркерлари (VEGF A, TGF β , IFN α , IFN γ , IL-6, CRP, C3a) ўртасидаги боғлиқликни баҳолашдан иборат бўлди. Таҳлил натижалари hs-cTn ўсиши фониди ангиогенез, фиброз, яллиғланиш ва тузма иммун жавобнинг кучайиши кузатилишини аниқлади, айниқса, юрак ишемик касаллиги бўлган беморларда бу жараёнлар яққол ифодаланган. Ушбу натижалар лаборатория кўрсаткичларини баҳолаш орқали ИБС хавфини аниқлаш ва динамикасини назорат қилишда уларнинг аҳамиятини тасдиқлайди.

Калит сўзлар: артериал гипертония, юрак ишемик касаллиги, hs-cTn, ангиогенез, яллиғланиш, иммун жавоб, лаборатория таъхиси.

Введение: АГ и ИБС продолжают занимать лидирующие позиции среди причин сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности как в Узбекистане, так и во всём мире. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ, 2023), более 1,28 миллиарда человек страдают АГ, причём значительная часть случаев осложняется развитием ИБС, приводящей к инвалидизации и летальному исходу. Переход от изолированной гипертонии к ишемическому поражению миокарда представляет собой сложный патофизиологический процесс, включающий ремоделирование сосудистой стенки, эндотелиальную дисфункцию, субклиническое воспаление, а также иммунные и метаболические нарушения (1,7,8).

В последние годы особое внимание уделяется использованию высокочувствительного тропонина (hs-cTn) как чувствительного маркера не только острого, но и хронического повреждения миокарда. Повышение hs-cTn, даже в пределах субклинических значений, может отражать начало структурных и функциональных изменений, предшествующих клинической манифестации ИБС. Однако диагностика и стратификация риска на ранних стадиях остаются затруднительными без интеграции иммунологических и воспалительных маркеров, способных дополнить данные тропонинового тестирования (2,3,5,9).

Существуют доказательства того, что биомаркеры, такие как VEGF A, TGF β , интерфероны (ИФН α , ИФН γ), ИЛ-6, С-реактивный белок и компонент комплемента C3a, играют ключевую роль в патогенезе ишемических и гипертонических поражений сердца. Их взаимосвязь с уровнем hs-cTn может служить основой для более точной оценки степени миокардиального повреждения и определения прогноза заболевания. Тем не менее, в отечественной практике комплексная оценка этих показателей у пациентов с АГ и ИБС до сих пор недостаточно изучена (4,6).

В этой связи проведение клинико-лабораторного анализа с включением высокочувствительного тропонина и иммунно-воспалительных маркеров представляется актуальным с точки зрения ранней диагностики, прогнозирования осложнений и разработки персонализированных подходов к ведению пациентов с высоким сердечно-сосудистым риском.

Цель исследования. Оценить уровни маркеров ангиогенеза (VEGF A), фиброза (TGF β), активности врождённого и адаптивного иммунитета (ИФН α , ИФН γ), воспаления (IL-6, CRP) и активации системы комплемента (C3a) у пациентов с артериальной гипертензией и её сочетанием с ишемической болезнью сердца, в зависимости от уровней hs-cTn.

Материалы и методы исследования. Для проведения исследования было проведено комплексное клинико-лабораторное обследование 38 пациентов, находившихся на стационарном и амбулаторном лечении в Бухарском областном кардиологическом диспансере. Все участники исследования были тщательно отобраны с учетом критериев включения и исключения, чтобы обеспечить максимальную достоверность полученных данных и исключить влияние сопутствующих патологий. Пациенты были разделены на две основные клинические группы в зависимости от установленного диагноза:

I группа включала 25 пациентов, страдающих АГ. У этих пациентов диагностировалась первичная форма АГ, без явных признаков ИБС, что позволило сосредоточиться на особенностях именно гипертензивного процесса.

II группа состояла из 13 пациентов с установленным диагнозом ИБС, развившейся на фоне АГ. Эти пациенты представляли собой более сложную клиническую категорию, поскольку сочетание двух заболеваний значительно усугубляет течение и прогноз сердечно-сосудистых нарушений.

Результаты исследования: Для оценки роли иммунологических факторов в патогенезе ИБС у пациентов с АГ в настоящем исследовании были проанализированы уровни ряда ключевых биомаркеров, отражающих активность врожденного и адаптивного иммунитета, а также процессы воспаления, репарации и регуляции иммунного ответа. Среди исследуемых показателей — сосудистый эндотелиальный фактор роста А (VEGF A), трансформирующий фактор роста бета (TGF β), интерфероны

альфа (ИФН α) и гамма (ИФН γ), интерлейкин-6 (ИЛ-6), С-реактивный белок (СРБ) и компонент комплемента С3а. Выбор данных маркеров обусловлен их установленной ролью в воспалительных и ишемических процессах, лежащих в основе прогрессирования АГ и развития ИБС, а также их потенциальной связью с субклиническим повреждением миокарда, эндотелиальной дисфункцией и атеросклерозом.

VEGF A оценивался как маркер ангиогенеза при ишемии миокарда, связанной с АГ и ИБС. По данным Ferrara et al. (2013), его экспрессия усиливает неоангиогенез, но при гиперпродукции может способствовать воспалению в атеросклеротических бляшках. TGF β включён в анализ как индикатор фиброза и ремоделирования миокарда. Vujak и Frangogiannis (2017) показали его связь с прогрессированием ИБС на фоне гипертрофии и хронической ишемии.

Таблица 1.

Сравнительный анализ регуляторных факторов у исследуемых больных

Показатель	I группа (n=25)			II группа (n=13)
	hs-cTn $\leq 2,0$ нг/л (n=18)	hs-cTn 2,1–4,0 нг/л (n=3)	hs-cTn 4,1–4,9 нг/л (n=4)	
VEGF A	23,3 $\pm$ 1,57	88,1 $\pm$ 7,19**	120,31 $\pm$ 6,22***	144,84 $\pm$ 28,9***
TGF β	22,6 $\pm$ 1,09	84,6 $\pm$ 7,72**	155,01 $\pm$ 5,36***	143,91 $\pm$ 28,7***

Примечание: уровень достоверности * - $p < 0,05$; ** - $p < 0,01$; *** - $p < 0,001$;

В I группе при hs-cTn $\leq 2,0$ нг/л (n=18) концентрации VEGF A и TGF β составили соответственно 23,3 $\pm$ 1,57 и 22,6 $\pm$ 1,09 пг/мл, отражая минимальную активность ангиогенеза и фиброза при стабильной АГ без признаков субклинического повреждения миокарда. При hs-cTn 2,1–4,0 нг/л (n=3) отмечено увеличение VEGF A в 3,8 раза (88,1 $\pm$ 7,19 пг/мл) и TGF β в 3,9 раза (87,1 $\pm$ 7,72 пг/мл; $p < 0,01$), что свидетельствует об активации указанных процессов. При hs-cTn 4,1–4,9 нг/л (n=4) VEGF A достиг 120,31 $\pm$ 6,22 пг/мл, TGF β — 155,01 $\pm$ 5,36 пг/мл ($p < 0,001$), указывая на выраженное субклиническое повреждение миокарда.

Во II группе (АГ+ИБС, n=13) уровни VEGF A и TGF β были максимальными — 144,84 $\pm$ 28,9 и 143,91 $\pm$ 28,7 пг/мл соответственно (в 6,2 и 6,4 раза выше базовых значений; $p < 0,001$), что ассоциировано с манифестной ишемией.

Анализ внутри I группы показал, что повышение hs-cTn сопровождается достоверным ростом VEGF A и TGF β , особенно при переходе от hs-cTn 2,1–4,0 к 4,1–4,9 нг/л (в 1,4 и 1,8 раза соответственно; $p < 0,05$ – $0,01$), что отражает нарастание фиброзно-ангиогенных изменений. В сравнении с II группой VEGF A увеличивался на 1,2 раза, TGF β снижался на 7% по сравнению с подгруппой hs-cTn 4,1–4,9, однако статистически значимых различий не выявлено.

Таким образом, экспрессия VEGF A и TGF β прямо коррелирует с уровнем hs-cTn, отражая усиление ангиогенеза и фиброза на фоне прогрессирующей ишемии. Наиболее выраженные изменения выявлены при hs-cTn $> 4,0$ нг/л и в группе ИБС, что подчёркивает их значение как маркеров субклинического и клинически выраженного поражения миокарда.

ИФН α и ИФН γ оценивались как маркеры активности врождённого и адаптивного иммунитета. ИФН α , вырабатываемый дендритными клетками, отражает раннюю фазу неспецифического иммунного ответа, снижение которого, по Stark et al. (2015), связано с истощением врождённого иммунитета при хроническом воспалении. ИФН γ , продуцируемый Th1-лимфоцитами, усиливает воспаление в атеросклеротических бляшках и, согласно Libby (2017), играет ключевую роль в иммунном атерогенезе.

Таблица 2.

Сравнительный анализ уровней интерферонов у исследуемых больных

Показатель	I группа (n=25)			II группа (n=13)
	hs-cTn $\leq 2,0$ нг/л (n=18)	hs-cTn 2,1–4,0 нг/л (n=3)	hs-cTn 4,1–4,9 нг/л (n=4)	
ИФН α	37,2 $\pm$ 6,17	64,2 $\pm$ 4,65**	113,56 $\pm$ 3,52***	54,3 $\pm$ 2,63**
ИФН γ	18,8 $\pm$ 1,23	26,6 $\pm$ 1,42**	37,4 $\pm$ 1,01***	37,3 $\pm$ 2,19***

Примечание: уровень достоверности * - $p < 0,05$; ** - $p < 0,01$; *** - $p < 0,001$;

В I группе при $hs-cTn \leq 2,0$ нг/л ($n=18$) концентрации ИФНа и ИФН γ составили соответственно $37,2 \pm 6,17$ и $18,8 \pm 1,23$ пг/мл, отражая исходную активность врождённого и адаптивного иммунитета при стабильной АГ. При $hs-cTn 2,1-4,0$ нг/л ($n=3$) уровни ИФНа и ИФН γ увеличивались в 1,7 и 1,4 раза ($p<0,01$), что свидетельствует об активации иммунного ответа при умеренном субклиническом повреждении. У пациентов с $hs-cTn 4,1-4,9$ нг/л ($n=4$) концентрации ИФНа и ИФН γ возрастали в 3,1 и 2,0 раза ($p<0,001$), указывая на выраженное усиление продукции интерферонов.

Во II группе (АГ + ИБС, $n=13$) уровни ИФНа и ИФН γ составили $54,3 \pm 2,63$ и $37,3 \pm 2,19$ пг/мл (в 1,5 и 2,0 раза выше базовых значений; $p<0,01-0,001$), что отражает активность иммунной системы при манифестной ИБС. Однако, по сравнению с пиковыми значениями в I группе ($hs-cTn 4,1-4,9$ нг/л), уровень ИФНа во II группе был в 2,1 раза ниже ($p<0,001$), тогда как ИФН γ сохранялся на сопоставимом уровне, указывая на снижение врождённого и устойчивость адаптивного иммунного ответа при хронизации воспаления.

Переход внутри I группы от $hs-cTn 2,1-4,0$ к $4,1-4,9$ нг/л сопровождался ростом ИФНа в 1,8 раза ($p<0,01$), ИФН γ — в 1,4 раза ($p<0,05$), что свидетельствует о прогрессирующем иммунном ответе. В сравнении с подгруппой $hs-cTn 4,1-4,9$ нг/л, во II группе уровень ИФНа был ниже (в 2,1 раза, $p<0,001$), а ИФН γ оставался стабильным, что может свидетельствовать о переходе от острой активации к фазе хронического воспаления.

Таким образом, ИФНа демонстрирует максимум при выраженном субклиническом повреждении, снижаясь при манифестной ИБС, тогда как ИФН γ остаётся стабильно повышенным. Эти различия подчёркивают различную регуляторную роль интерферонов и возможность их использования в качестве иммунологических маркеров стадийности и тяжести ишемического поражения при АГ.

Для оценки воспалительной активности и активации врождённого иммунитета в патогенезе ИБС у пациентов с АГ в анализ были включены ИЛ-6, СРБ и компонент комплемента С3а. Согласно Oksjoki et al. (2007), активация С3а играет важную роль в воспалении сосудистой стенки и дестабилизации атеросклеротических бляшек.

Таблица 3.

Сравнительный анализ уровней провоспалительных маркеров у исследуемых больных

Показатель	I группа (n=25)			II группа (n=13)
	$hs-cTn \leq 2,0$ нг/л (n=18)	$hs-cTn 2,1-4,0$ нг/л (n=3)	$hs-cTn 4,1-4,9$ нг/л (n=4)	
ИЛ-6	$2,5 \pm 0,8$	$4,2 \pm 1,1^{**}$	$6,8 \pm 1,5^{***}$	$12,3 \pm 3,2^{***}$
СРБ	$1,2 \pm 0,4$	$2,8 \pm 0,7^{**}$	$4,5 \pm 1,0^{***}$	$7,8 \pm 2,1^{***}$
С3а	$4,82 \pm 1,27$	$49,8 \pm 3,98^{***}$	$177,00 \pm 8,93^{***}$	$119,86 \pm 26,8^{***}$

Примечание: уровень достоверности * - $p<0,05$; ** - $p<0,01$; *** - $p<0,001$;

В I группе при $hs-cTn \leq 2,0$ нг/л ($n=18$) концентрации ИЛ-6, СРБ и С3а составили $2,5 \pm 0,8$ пг/мл, $1,2 \pm 0,4$ мг/л и $4,82 \pm 1,27$ пг/мл соответственно — отражая базальный уровень воспалительной активности. При $hs-cTn 2,1-4,0$ нг/л ($n=3$) регистрировалось повышение ИЛ-6 в 1,7 раза, СРБ — в 2,3 раза, С3а — в 10,3 раза ($p<0,01-0,001$), указывая на инициацию провоспалительного и комплемент-опосредованного ответа. При $hs-cTn 4,1-4,9$ нг/л ($n=4$) уровни маркеров достигали максимума: ИЛ-6 — в 2,7 раза, СРБ — в 3,8 раза, С3а — в 36,7 раза выше референтных значений ($p<0,001$).

Во II группе (АГ + ИБС, $n=13$) концентрации ИЛ-6, СРБ и С3а составили $12,3 \pm 3,2$ пг/мл, $7,8 \pm 2,1$ мг/л и $119,86 \pm 26,8$ пг/мл соответственно (в 4,9; 6,5 и 24,9 раза выше базовых значений, $p<0,001$), что свидетельствует о выраженной системной воспалительной активности при манифестной ИБС. При этом С3а оказался ниже, чем при $hs-cTn 4,1-4,9$ нг/л, что может отражать переход от острого комплемент-зависимого ответа к хроническому воспалению.

Внутригрупповой анализ показал, что рост $hs-cTn$ от $2,1-4,0$ до $4,1-4,9$ нг/л сопровождается повышением ИЛ-6 и СРБ в 1,6 раза, С3а — в 3,6 раза ($p<0,05-0,001$). Переход ко II группе сопровождался дальнейшим увеличением ИЛ-6 и СРБ (в 1,7–1,8 раза, $p<0,05$), при снижении С3а в 1,5 раза ($p<0,01$), что отражает смену острого иммунного ответа на хронический.

Таким образом, установлена прогрессирующая активация воспаления и системы комплемента с ростом $hs-cTn$, достигающая пика при выраженном субклиническом повреждении и частично стабилизирующаяся при манифестной ИБС. ИЛ-6, СРБ и С3а могут служить перспективными биомаркерами стадийности воспалительного ответа в контексте ИБС и АГ.

Заключение. У пациентов с АГ и отсутствием признаков ИБС уровень VEGF A и TGFβ оставался в пределах референсных значений ($23,3 \pm 1,57$ и $22,6 \pm 1,09$ пг/мл соответственно), тогда как при повышении hs-cTn выше $4,0$ нг/л их концентрации возрастали в $5,2$ и $6,9$ раза соответственно ($p < 0,001$), отражая нарастание ангиогенеза и фиброза. Максимальные уровни VEGF A ($144,84 \pm 28,9$ пг/мл) и TGFβ ($143,91 \pm 28,7$ пг/мл) регистрировались у больных с манифестной ИБС, что свидетельствует о диагностической значимости этих маркеров в оценке тяжести ишемического повреждения миокарда.

Выраженное повышение уровня IFNα (до $113,56 \pm 3,52$ пг/мл) у пациентов с hs-cTn $4,1$ – $4,9$ нг/л указывает на активацию врождённого иммунитета в фазе субклинической ишемии. Однако при переходе к манифестной ИБС уровень IFNα снижался на $52,2\%$ (до $54,3 \pm 2,63$ пг/мл; $p < 0,001$), что может отражать истощение неспецифического ответа. При этом IFNγ демонстрировал стабильное повышение от $18,8 \pm 1,23$ до $37,3 \pm 2,19$ пг/мл (в 2 раза, $p < 0,001$) как в подострой, так и хронической фазе, подтверждая его устойчивую активацию на фоне прогрессирующего атерогенеза.

С прогрессированием субклинического повреждения миокарда (hs-cTn $> 4,0$ нг/л) регистрировалось значимое увеличение уровней IL-6, CRP и С3а (в $2,7$; $3,8$ и $36,7$ раза соответственно по сравнению с референтом, $p < 0,001$). У больных с манифестной ИБС IL-6 достигал $12,3 \pm 3,2$ пг/мл, CRP — $7,8 \pm 2,1$ мг/л, а С3а — $119,86 \pm 26,8$ пг/мл, при этом уровень С3а был ниже, чем в фазе пикового субклинического повреждения, что может указывать на трансформацию иммунного ответа от острого к хроническому. Полученные данные подтверждают значимую роль врождённого воспаления и компонента в патогенезе ИБС у больных с АГ.

Список литературы:

1. Aimo A. et al. High-Sensitivity Troponin T and NT-proBNP in Patients With Chronic Heart Failure: A Systematic Review and Meta-Analysis. // JACC: Heart Failure. – 2018. – V. 6(6). – P. 420–429.
2. Ford I. et al. High-Sensitivity Cardiac Troponin, Statin Therapy, and Risk of Coronary Heart Disease. // Journal of the American College of Cardiology. – 2016. – V. 68 (25). – P. 2719–2728.
3. Fozilov H.G. et al. Early Detection and Control of Risk Factors for Cardiovascular Diseases in the Aral Region: Experience of Uzbekistan. // Kardiologiya, - 2024. - №64 (1). – P. 37–43.
4. Ganipineni V.D.P. et al. High-Sensitivity Cardiac Troponin [hs-cTn] as a Valuable Biomarker for Pulmonary Hypertension Risk Stratification: A Contemporary Review. // Healthcare. – 2024. – V. 12(20). – P. 2037.
5. Khamidullaeva G.A. The Importance of Taste Salt Sensitivity in the Development of Kidney Damage in Patients with High-Risk Arterial Hypertension. // European Heart Journal. – 2024. – S. 45. – P. 66–69.
6. McEvoy J.W. et al. High-Sensitivity Cardiac Troponin T and Risk of Hypertension. // Circulation. – 2015. – V. 132 (9). – P. 825–833.
7. Omland T. et al. A Sensitive Cardiac Troponin T Assay in Stable Coronary Artery Disease. // New England Journal of Medicine. – 2009. – V. 361 (26). – P. 2538–2547.
8. Sagris M. et al. High-Sensitivity Troponin for Cardiovascular Risk Prognostication: A Systematic Review and Meta-analysis. // Current Pharmaceutical Design. – 2023. – V. 29(5). – P. 456–468.
9. Thygesen K. et al. Fourth Universal Definition of Myocardial Infarction (2018). // Journal of the American College of Cardiology. – 2018. – V. 72(18). – P. 2231–2264.

Для цитирования: Шарипов Ж.Р., Хамдамов Б.З. Оценка иммуновоспалительных, ангиогенных и коагуляционных маркеров у пациентов с артериальной гипертензией и ишемической болезнью сердца в зависимости от уровня высокочувствительного тропонина // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 4(24). – С. 469–473. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19569433>

**ОЦЕНКА ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА АНТЕНАТАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
(ОПРОС 1000 БЕРЕМЕННЫХ)****Ризаев Ж.А., Камалов А.И.**

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Цель исследования - оценить доступность и качество антенатальной помощи, а также выявить ключевые организационные ограничения, влияющие на своевременность наблюдения и полноту консультирования. Материалы и методы: проведено анкетирование 1000 беременных женщин 15-49 лет, обратившихся в учреждения акушерско-гинекологической службы в 2024-2025 гг. Результаты: у 31,1% женщин отмечена поздняя постановка на учет; лишь 59,6% знали нормативные требования к частоте визитов. Консультирование носило фрагментарный характер: признаки опасных состояний подробно разъяснялись только 46,8% респонденток; 46,9% указывали на дефицит времени для общения с врачом. С платными услугами сталкивались 38,7% опрошенных, а негативную оценку качества помощи (полностью/скорее не удовлетворены) дали 26,9%. Заключение: выявленные организационные разрывы требуют усиления пациент-ориентированного консультирования, стандартизации информационных блоков по триместрам, улучшения доступности записи и укрепления преемственности между семейным врачом и акушер-гинекологом.

Ключевые слова. антенатальная помощь; доступность; качество; организация наблюдения; консультирование; удовлетворенность; беременность.

**ASSESSMENT OF AVAILABILITY AND QUALITY OF ANTENATAL CARE
(SURVEY OF 1,000 PREGNANT WOMEN)****Rizaev J.A., Kamalov A.I.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Objective: to assess the availability and perceived quality of antenatal care and to identify organizational barriers affecting timely registration and comprehensiveness of counseling. Materials and methods: a cross-sectional survey of 1,000 pregnant women aged 15-49 who sought care in obstetric facilities in 2024-2025. Results: late registration was reported by 31.1% of respondents, and only 59.6% were aware of recommended visit schedules. Counseling was often fragmented: warning signs requiring urgent care were explained in detail to 46.8%; 46.9% reported insufficient consultation time. Paid services were encountered by 38.7%, and 26.9% provided a negative overall assessment of care quality. Conclusion: the findings support strengthening patient-centered counseling, standardizing trimester-specific information, improving appointment access, and enhancing continuity between family physicians and obstetricians.

Keywords: antenatal care; availability; quality; organization; counseling; patient satisfaction; pregnancy.

**АНТЕНАТАЛ ЁРДАМНИНГ МАВЖУДЛИГИ ВА СИФАТИНИ БАҲОЛАШ
(1000 ҲОМИЛАДОР АЁЛ СЎРОВНОМАСИ)****Ризаев Ж.А., Камалов А.И.**

Самарканд давлат тиббиёт университети, Самарканд ш., Ўзбекистон

Резюме. Мақсад: антенатал ёрдамнинг мавжудлиги ва субъектив баҳоланган сифатини аниқлаш ҳамда эрта ҳисобга олиш, кузатув узлуксизлиги ва маслаҳат бериш тўлиқлигига таъсир этувчи ташкилий чекловларни баҳолаш. Материал ва усуллар: 2024–2025 йилларда турли даражадаги акушерлик муассасаларига мурожаат қилган 15–49 ёшдаги 1000 нафар ҳомиладор аёл ўртасида анкетали сўровнома ўтказилди. Натижалар: 31,1% аёлларда кеч рўйхатга олиш қайд этилди, 59,6% кузатув таширфлари меъёрлари ҳақида хабардор эди. Маслаҳат бериш фрагментар бўлиб, хавфли белгилар 46,8% респондентларда батафсил тушунтирилган; 46,9% шифокор билан мулоқот вақти етишмаслигини кўрсатди. Пуллик хизматларга 38,7% дуч келган, 26,9% ёрдам сифатини салбий баҳолаган. Хулоса: антенатал ёрдам тизимида беморга йўналтирилган маслаҳат беришни кучайтириш, триместрлар бўйича ахборот блокларини стандартлаштириш, ёзилиш механизмларини оптималлаштириш ва оилавий шифокор–акушер-гинеколог узвийлигини мустаҳкамлаш зарур.

Калит сўзлар: антенатал ёрдам; мавжудлик; сифат; ташкилий омиллар; маслаҳат; қониқиш; ҳомиладорлик

Введение. Антенатальная помощь является ключевым инструментом профилактики осложнений беременности и неблагоприятных перинатальных исходов. При высокой формальной охватности наблюдением эффективность системы во многом определяется временем постановки на учет, регулярностью визитов, качеством консультирования и доступностью маршрутизации. Оценка пациентских мнений позволяет выявить скрытые организационные барьеры и точки для улучшения.

Материалы и методы исследования. Проведено одномоментное анкетирование 1000 беременных женщин в возрасте 15-49 лет, состоящих на учете или наблюдавшихся в поликлиниках, перинатальных центрах, родильных комплексах и частных медицинских организациях. Опрос выполнен в 2024-2025 гг. Анкета включала блоки, отражающие сроки постановки на учет, организацию наблюдения, качество консультирования, взаимодействие с медицинскими работниками и общую удовлетворенность медицинской помощью. Статистическая обработка носила описательный характер (доли, абсолютные значения).

Таблица 1.

Характеристика выборки (n=1000)

Показатель	Значение, % (n)
Возраст 20-24 года	24,6% (246)
Возраст 25-29 лет	32,1% (321)
Возраст 30-34 года	25,4% (254)
Возраст ≥ 35 лет	11,3% (113)
Возраст < 19 лет	6,6% (66)
I триместр на момент опроса	34,8% (348)
II триместр на момент опроса	39,6% (396)
III триместр на момент опроса	25,6% (256)
Проживание: сельская местность	60,9% (609)
Проживание: город	39,1% (391)
Первая беременность	36,4% (364)
Вторая беременность	31,2% (312)
Третья беременность	19,1% (191)
Четвертая и более	13,3% (133)

Результаты и обсуждение. Преобладали женщины оптимального репродуктивного возраста, а также пациентки из сельской местности. По месту наблюдения 72,8% респонденток состояли на учете в поликлиниках по месту жительства, 14,6% наблюдались на уровне межрайонных/специализированных учреждений, 9,3% - в частном секторе, 3,3% использовали комбинированную модель. Информированность о специалистах была неполной: акушер-гинеколога знали 61,4%, тогда как семейного врача - 52,7%, что указывает на недостаточную интеграцию семейной медицины в ведение беременности.

Таблица 2.

Организационные показатели антенатального наблюдения и консультирования

Индикатор	Значение, % (n)
Постановка на учет до 12 недель	68,9% (689)
Постановка на учет 12-20 недель	21,7% (217)
Постановка на учет после 20 недель	9,4% (94)
Знают норматив по частоте визитов	59,6% (596)
Правильно указали рекомендуемое число визитов	41,3% (413)
Фактические визиты 1-3	26,8% (268)
Фактические визиты 4-7	45,2% (452)
Фактические визиты ≥ 8	28,0% (280)
Опасные признаки объяснены подробно	46,8% (468)
Дефицит времени на общение с врачом	46,9% (469)
Сталкивались с платными услугами	38,7% (387)
Негативная оценка качества (полностью/скорее не удовлетворены)	26,9% (269)

Сроки первой явки остаются ключевой «точкой потерь»: поздняя постановка на учет (31,1%) снижает возможности раннего выявления анемии, гипертензивных расстройств и других факторов риска, а также уменьшает профилактический потенциал I триместра. Дополнительным ограничением выступает дефицит информирования: только половина женщин получали полные рекомендации по питанию и приему микронутриентов, а алгоритм обращения за неотложной помощью часто не разъяснялся в достаточном объеме. Организационная нагрузка на первичное звено проявлялась в недостатке времени консультации и трудностях записи, что косвенно влияет на приверженность и удовлетворенность. Наличие платных услуг у значимой доли пациенток может формировать скрытые финансовые барьеры и усиливать неравенство доступа.

Заключение. Опрос 1000 беременных выявил, что при высоком формальном охвате наблюдением сохраняются организационные факторы риска: поздняя постановка на учет, неполная информированность о режиме наблюдения, фрагментарное консультирование по опасным симптомам, дефицит времени общения и наличие финансовых барьеров. Для повышения эффективности антенатальной помощи целесообразны: 1) стандартизация консультационных блоков по триместрам (питание, микронутриенты, «красные флаги», план действий), 2) улучшение механизмов записи и маршрутизации, особенно для сельского населения, 3) укрепление преемственности между семейным врачом и акушер-гинекологом с четким распределением ролей.

Список литературы:

1. World Health Organization. WHO recommendations on antenatal care for a positive pregnancy experience. Geneva: WHO; 2016.
2. World Health Organization. Standards for improving quality of maternal and newborn care in health facilities. Geneva: WHO; 2016.
3. Tunçalp Ö., Pena-Rosas J.P., Lawrie T., et al. WHO recommendations on antenatal care for a positive pregnancy experience: going beyond survival. BJOG. 2017;124(6):860-862.
4. Kruk M.E., Gage A.D., Arsenault C., et al. High-quality health systems in the Sustainable Development Goals era: time for a revolution. Lancet Global Health. 2018;6:e1196-e1252.
5. Donabedian A. The quality of care. How can it be assessed? JAMA. 1988;260(12):1743-1748.
6. Hodnett E.D. Caregiver support for women during childbirth. Cochrane Database Syst Rev. 2013; (7):CD003766.
7. Lassi Z.S., Salam R.A., Das J.K., et al. Essential interventions for maternal, newborn and child health: an overview of the evidence. Nutrients. 2014;6(11):4837-4861.
8. Локальные протоколы и клинические рекомендации по ведению беременности (внутренний документ учреждения), 2024-2025.

Для цитирования: Ризаев Ж.А., Камалов А.И. Оценка доступности и качества антенатальной помощи (опрос 1000 беременных) // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 4(24). – С. 474–476. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19569781>

ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОГО ЯЗВЕННОГО КОЛИТА

Хамдамов Б.З., Оллоков А.Ф.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Сравнительная оценка эффективности применения разработанной нами прогностической программы «PCNUC» у больных с неспецифическим язвенным колитом показала, что по сравнению с традиционным методом прогнозирования гнойно-воспалительных осложнений, было достигнуто увеличение истинноположительных и истинноотрицательных результатов в среднем в 1,9 раза, а достоверность прогнозирования развития гнойно-воспалительных осложнений было повышено в среднем 1,8 раз. Это позволило в 2 раза уменьшить случаи ложных результатов прогнозирования гнойно-воспалительных осложнений НЯК

Ключевые слова: Язвенный колит, осложнение, прогнозирование

PURULENT-INFLAMMATORY COMPLICATIONS OF NON-SPECIFIC ULCERAL COLITIS

Xamdakov B.Z., Ollokov A.F.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. A comparative assessment of the effectiveness of the application of the prognostic program "PCNUC" developed by us in patients with non-specific ulcerative colitis showed that, compared with the traditional method of predicting purulent-inflammatory complications, an increase in true-positive and true-negative results was achieved by an average of 1.9 times, and the reliability of predicting the development of purulent-inflammatory complications was increased by an average of 1.8 times. This made it possible to reduce the incidence of false results in predicting purulent-inflammatory complications of UC by 2 times.

Key words: Ulcerative colitis, complication, prognosis

НОСПЕЦИФИК ЯРАЛИ КОЛИТЛАРНИНГ ЙИРИНГЛИ-ЯЛЛИГЛАНИШ АСОРАТЛАРИ

Хамдамов Б.З., Оллоков А.Ф.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Носпецифик ярали колит билан оғриган беморларда биз томонидан ишлаб чиқилган "PCNUC" прогностик дастуридан фойдаланиш самарадорлигини қиёсий баҳолаш шуни кўрсатдики, йирингли-яллигланиш асоратларини башорат қилишнинг аňганавий усули билан солиштирганда, йирингли яллигланиш башорат қилишнинг ўртача 1,9 барабар ортиши билан ҳақиқий-салбий натижаларга эришилди ўртача 1,8 марта. Бу бизга УС нинг йирингли-яллигланишли асоратларини башорат қилишда ёлгон натижаларни 2 баробар камайтириш имконини берди.

Калит сўзлар: ярали колит, асоратлар, башоратлаш, профилактика

e-mail: dr.hamdamov@mail.ru, asliddinollov@gmail.com

Неспецифический язвенный колит (НЯК) является основной формой воспалительных заболеваний кишечника. Точная причина НЯК неизвестна. Однако генетически восприимчивые люди, по-видимому, имеют нерегулируемый иммунный ответ слизистой оболочки на комменсальную кишечную флору, что приводит к воспалению кишечника (1,3,5,11).

Воспаление при НЯК, как правило, ограничивается поверхностью слизистой оболочки. Заболевание начинается в прямой кишке и, как правило, распространяется проксимально непрерывно через всю толстую кишку. Тем не менее, у некоторых пациентов с проктитом или левосторонним колитом может быть воспаление слепой кишки. Распространение заболевания стратифицировано по степени поражения толстой кишки, от проктита до левостороннего колита или обширного колита или панко-лита (2,4,6,12).

НЯК – наиболее распространенное заболевание среди воспалительных патологий толстого кишечника. В странах северного полушария и западного региона отмечаются наиболее высокие показатели заболеваемости НЯК. Она варьирует от 9 до 20 случаев на 100000 человек, а показатель распространенности – от 156 до 291 случая на 100000 человек. В противовес этому, низкие значения НЯК отмечаются в странах южного полушария и восточного региона. Интересным становится тот факт,

что в странах, переходящих на индустриальный образ жизни, отмечается рост заболевания НЯК. Это свидетельствует о факторах окружающей среды, которые могут иметь решающее значение в возникновении НЯК (7,9,13).

Улучшение санитарных условий в промышленно развитых странах может снизить подверженность кишечным инфекциям в детском возрасте, тем самым ограничивая созревание иммунной системы слизистых оболочек, что может привести к неадекватному иммунному ответу при контакте с инфекционными микроорганизмами в более позднем возрасте (8,10,14).

Наиболее эффективными в плане радикальности, на сегодняшний день, остаются хирургические методы лечения НЯК – проктоколэктомия с применением подвздошно-анального анастомоза. Однако наличие фоновых расстройств системного иммунологического характера, в числе которых наиболее частым является развитие абсцесса малого таза (1,2,5).

Имеются результаты эмпирических наблюдений о нарастании послеоперационных осложнений со стороны сформированного мешка из культи подвздошной кишки при длительном применении кортикостероидов и Инфликсимаба в предоперационном периоде. Клиницисты наблюдали значительное увеличение послеоперационных септических осложнений (3,7,15). Данное обстоятельство клиницисты связывают с супрессивным воздействием на иммунную систему.

Развитие подобных осложнений в раннем послеоперационном периоде, в перспективе от 15% до 30% случаев приводит к развитию стриктуры анастомоза и кишечной непроходимости, хроническому метеоризму, сексуальной дисфункции, нарушению мочеиспускания и женскому бесплодию с трехкратным повышением риска после применения подвздошно-анального анастомоза (5,8,16).

Таким образом, высокий удельный вес послеоперационных осложнений, у больных с НЯК, несмотря на применении радикальных вмешательств, все еще создает повышенный риск их развития. Учитывая такие высокие значения неудовлетворительных результатов лечения, ученые концентрируют внимание на исследование особенностей иммунологических нарушений, приводящие к развитию послеоперационных осложнений.

Улучшение результатов лечения больных с воспалительными заболеваниями кишечника является одним из актуальных направлений прикладной и фундаментальной медицины, ввиду высокой медико-социальной значимости данных патологий.

Все выше представленное и определило основное направление данной работы.

Цель исследования улучшение результатов прогнозирования развития гнойно-воспалительных осложнений НЯК путем разработки и обоснования эффективности клинико-иммунологических методов мониторинга у больных с данным заболеванием.

Материалы и методы. Исследование проведено у 92 больных с НЯК, которые находились под нашим наблюдением с 2015 по 2024 годы. Преобладали больные мужского пола, преимущественно молодого (43,4%) и среднего возраста (35,8%) по критериям ВОЗ. Соотношение больных мужского и женского пола составило 1,39 ед. Контрольную группу составили 20 добровольцев, признанных медицинской комиссией здоровыми. Результаты иммунологических исследований контрольной группы были приняты нами в качестве референсных значений.

Критериями включения больных в исследование были: наличие подтвержденного (эндоскопически и морфологически) НЯК; обязательное наличие письменного согласия больного на проведение исследования; возраст больных старше 18 лет; отсутствие беременности и периода лактации на момент лечения и обследования; отсутствие осложнения НЯК в виде злокачественного новообразования кишечника, при выявлении которого больные исключались из когорты; наличие активности НЯК; отсутствие тяжелой внекишечной соматической и психической патологии; отсутствие лекарственной и алкогольной зависимости, а также подтвержденных патологий со стороны иммунной системы включая ВИЧ-инфицированность; согласие на дополнительные лабораторные и инструментальные методы исследования. Любое несоответствие вышеперечисленному определяли критерия исключения больных из исследования.

Протяженность поражения НЯК идентифицировали согласно Монреальской классификации (2005). Тяжесть атаки НЯК определяли согласно критериям S.P. Travis и L. Dinesen (2010). Активность течения НЯК проводили при помощи эндоскопической картины по критериям K.W. Schroeder (1987).

Сопутствующие заболевания вместе с внекишечными поражениями НЯК по записям истории болезни были констатированы в 231 наименованиях и на 1 больного в среднем приходилось по 2,5 наименования заболеваний. Наиболее частые поражения (84,8% и 82,6% случаев) были отмечены со стороны опорно-двигательной системы и кожной поверхности.

Дизайн исследования сводился к проведению поэтапного проспективного и ретроспективного исследования в сопоставлении полученных данных с референсными значениями (контрольная группа) – рисунок 1.



Рисунок 1. Дизайн проведенного исследования

Оценку состояния иммунной системы организма больных проводили по экспрессии антигенов CD-дифференцировочных и активационных. Определяли следующие маркеры иммунокомпетентных клеток: CD3+, CD4+, CD8+, CD119+-лимфоцитов. Экспрессию рецепторов CD проводили в реакции розеткообразования с помощью моноклональных антител серии LT производство ООО «Сорбент» (РФ) по методу Гариба Ф.Ю. и соавт. (1995).

Определение концентрации в сыворотке крови обследованных иммуноглобулинов основных трех классов М, А и G г/л проводили методом радиальной иммунодиффузии по Манчини (1963).

Интерлейкины (цитокины) определяли в сыворотке крови обследованных методом твердофазного иммуноферментного анализа. Для реализации этого варианта использованы по два моноклональных антитела с различной этиотропной специфичностью к интерлейкинам IL-1α, IL-1b, IL-6, IL-8, TNF-α при помощи специальных наборов для иммуноферментного анализа по стандартной методике.

В соответствии с целями и задачами исследования выполняли расчет элементарных статистических показателей (средние значения, ошибки средних, среднеквадратичные отклонения, размах разброса данных), построение и визуальный анализ диаграмм разброса данных. Показатели сравнивали с помощью знаков непараметрических критериев. Достоверность различий между выборками, приближенных по характеру распределения к норме, устанавливали по параметрическому критерию Стьюдента с 95% достоверным интервалом вероятности. Критерием статистической достоверности получаемых выводов считали общепринятую в медицине величину $p < 0,05$.

Результаты и их обсуждение. Разработка методов прогнозирования гнойно-воспалительных осложнений неспецифического язвенного колита (НЯК) проводилась на основе анализа результатов лечения больных и частоты развития гнойно-воспалительных осложнений.

Оперированы были все исследуемые больные, причем в большей половине случаев (53,3%) операции были выполнены в экстренном или в срочном порядке.

В предоперационном периоде у 49 (53,3%) больных были диагностированы нами различные виды осложнений НЯК, которые в 46,8% случаев носили гнойно-воспалительный характер. Среди предоперационных осложнений НЯК следует выделить наличие токсического мегаколона (26,1%), перфорации кишечника (20,7%) и кишечного кровотечения (6,5%). Распределение предоперационных осложнений НЯК среди больных с различными формами течения заболевания представлено в таблице 1.

Характер распределения предоперационных осложнений НЯК

ВИД ОСЛОЖНЕНИЯ	ФОРМА ТЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ		
	Хроническая рецидивирующая n=33 (%)	Хроническая непрерывная n=38 (%)	Острая n=21 (%)
Кишечное кровотечение	1 (3)	3 (7,9)	2 (9,5)
Перфорация кишечника	5 (15,2)	6 (15,8)	8 (38,1)
Токсический мегаколон	9 (27,3)	12 (31,6)	3 (14,3)

В общей сложности дооперационные осложнения НЯК в 45,3% случаев среди больных с хроническим рецидивирующим течением заболевания, в 55,3% случаев – с хроническим непрерывным течением заболевания и в 61,9% случаев – с острым течением заболевания.

Столь внушительная высокая частота развития осложнений НЯК свидетельствует о низкой прогностической значимости известных методов диагностики данного заболевания на этапе проведения консервативной терапии. Все это требует проведения более детальных методов диагностики и прогнозирования осложнений НЯК.

Из общего объема хирургических вмешательств в 26,1% случаев были выполнены колпроктэктомия, в 18,5% случаев – колэктомии, в 17,4% случаев – гемиколэктомии, в 15,2% случаев – резекции толстого кишечника различного объема и в 8,7% случаев – субтотальная колэктомия. У 13 (14,1%) больных были выполнены релапаротомии, реконструктивные операции и лапароскопии показаниями к выполнению которых были связаны с переводом больных из других клиник после выполнения экстренного хирургического вмешательства паллиативного характера.

Анализ распределения выполненных хирургических операций в разрезе больных с НЯК в зависимости от формы течения заболевания показал не однозначность объемов выполненных вмешательств (рисунок 2). Так, колпроктэктомия была выполнена у 12 больных с хронической непрерывной формой течения НЯК, у 9 больных с хронической рецидивирующей и у 3 больных с острой формой течения заболевания. Колэктомия была выполнена у 8 больных с хронической непрерывной формой течения НЯК, у 5 больных с хронической рецидивирующей и у 4 больных с острой формой течения заболевания.

Гемиколэктомия была выполнена у 7 больных с хронической непрерывной формой течения НЯК, у 5 больных с хронической рецидивирующей и у 4 больных с острой формой течения заболевания. Другие формы резекции толстой кишки были выполнены у 4 больных с хронической непрерывной формой течения НЯК, у 6 больных с хронической рецидивирующей и у 4 больных с острой формой течения заболевания.



Рисунок 2. Характер распределения объема выполненных хирургических вмешательств в зависимости от формы течения НЯК

Субтотальная колэктомия была выполнена у 3 больных с хронической непрерывной формой течения НЯК, у 4 больных с хронической рецидивирующей и у 1 больного с острой формой течения заболевания. Реконструктивные операции, лапароскопии и релапаротомии были выполнены у 4

больных с хронической непрерывной формой течения НЯК, у 4 больных с хронической рецидивирующей и у 5 больных с острой формой течения заболевания.

Гнойно-воспалительные осложнения НЯК в послеоперационном периоде были отмечены в 45,7% случаев, то есть у 42 оперированных больных. Среди них у 7 (16,7%) больных они развились после субтотальной колэктомии, у 5 (11,9%) больных после колэктомии, у 8 (19%) больных после колпроктэктомии, у 5 (11,9%) больных после резекции толстого кишечника, у 9 (21,4%) больных после гемиколэктомии и 8 (19%) больных после релапаротомий и реконструктивных операций (рисунок 3). Абсцесс брюшной полости образовался у 15 (11,3%) больных, перитонит в послеоперационном периоде развился у 7 (5,3%) больных, нагноение послеоперационной раны у 41 (30,8%) больных, которые у 38 (28,6%) больных привели к несостоятельности швов с эвентрацией, и еще у 32 (24,1%) больных в послеоперационном периоде развились парастомальные флегмоны передней брюшной стенки живота (рисунок 4).

Следует отметить, что ряд гнойно-воспалительных осложнений сочетались у одного и того же больного, что определило среднюю нагрузку их развития в среднем по $3,2 \pm 0,27$ ед.

Летальность среди больных с НЯК была отмечена в 23,9% случаев в послеоперационном периоде вследствие низкой эффективности лечения больных с гнойно-воспалительными осложнениями. Перитонит и абсцессы брюшной полости стали толчком для развития летального исхода в 9,9% случаев. У 12 (13%) умерших больных тяжелое течение заболевания было на фоне нагноения и расхождения швов послеоперационной лапаротомной раны.




Рисунок 3. Частота развития гнойно-воспалительных осложнений в зависимости от вида хирургического вмешательства у больных с НЯК




Рисунок 4. Характер послеоперационных гнойно-воспалительных осложнений у больных с НЯК

Таким образом, гнойно-воспалительные осложнения НЯК у больных с различными формами течения заболевания развиваются в 46,7% случаев, требующих применения хирургических методов лечения в экстренном или срочном порядке. Наиболее часто гнойно-воспалительные осложнения НЯК развиваются у больных с острой формой (52,4%) течения заболевания. В послеоперационном периоде гнойно-воспалительные осложнения развиваются в 45,7% случаев и становятся основной причиной летального исхода у 29,3% больных с НЯК. Столь высокая частота гнойно-воспалительных осложнений и летальности среди больных с НЯК свидетельствует о необходимости ранней диагностики и прогнозирования их развития на этапе консервативного лечения данного заболевания.

Обоснование роли и места клинко-иммунологической взаимосвязи в патогенезе развития гнойно-воспалительных осложнений неспецифического язвенного колита

Сопоставительный анализ клинических и лабораторных данных диагностики течения НЯК с изменениями показателей клеточного и гуморального иммунитета проводилось на основании определения перекрестной и линейной корреляционной взаимосвязи исследованных параметров. При этом в качестве разделительной градации мы учитывали формы проявления и течения НЯК.

На первом этапе нами были сделаны цифровые обозначения форм течения НЯК, которые увеличивались по мере ухудшения формы течения заболевания, возможности развития осложнений и наступления летального исхода. При этом балльная рандомизация форм заболевания, осложнений и летальности НЯК носила нарастающих характер, вид выполненной операции по тяжести его выполнения (радикальности) или повторного характера вмешательства вследствие развития гнойно-воспалительных осложнений в послеоперационном периоде.

Линейный корреляционный анализ частоты проявления клинических проявлений НЯК показал, что выраженными прямыми связями обладали среднетяжелая степень атаки ($R=0,997$), умеренная ($R=0,959$) и минимальная ($R=0,850$) эндоскопическая активность, а также левостороннее поражение кишечника ($R=0,899$) по мере возможно развития гнойно-воспалительных осложнений (рисунок 5).

Умеренная прямая корреляционная связь была выявлена нами только по двум классификационным клиническим формам НЯК – легкая атака ($R=0,739$) и ограниченное поражение кишечника в виде проктита ($R=0,712$).

Обратная корреляционная связь была констатирована нами по отношению к более тяжелым формам поражения НЯК: тяжелая атака ($R=-0,313$), выраженная активность ($R=-0,692$) и тотальное поражение толстой кишки ($R=-0,767$).

При этом внутри каждой формы поражения и проявления НЯК графическая характеристика облачного покрытия целиком отличалась имея прямую корреляционную связь лишь по трем параметрам. Среди них протяженность поражения (ограниченное в виде проктита и левостороннего поражения толстой кишки - $=0,345$), степень проявления эндоскопической активности НЯК (минимальная и умеренная активность - $=0,667$), а также степень атаки (легкая и среднетяжелая степени - $=0,787$).




Рисунок 5. Распорядительная кривая облачного покрытия классификационных форм клинического проявления НЯК и формы его течения

В остальных случаях все анализируемые параметры носили отрицательный характер корреляционной связи (рисунок 6).

■ Внутри форм ■ Между формами




Рисунок 6. Сравнительная графическая кривая облачного покрытия классификационных форм клинического проявления НЯК и формы его течения

Таким образом, линейный корреляционный анализ позволил выявить нам максимальную зависимость закономерности проявления клинических форм, вариантов течения и степени поражения толстого кишечника у больных с НЯК. Он может отражать основу платформы для построения относительной корреляционной взаимосвязи между клиническими формами проявления НЯК и изменениями показателей клеточного и гуморального иммунитета.

Исследованные формы заболевания имели градации от 1 до 3 баллов, при том, что нулевая позиция нами была отнесена к нормальному (референсному) значению исследуемых показателей клеточно-гуморального иммунитета (таблица 2).

Таблица .2

Балльная градация различных форм течения и развития гнойно-воспалительных осложнений НЯК

СОСТАВНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ	БАЛЛЬНАЯ ГРАДАЦИЯ		
	1	2	3
Форма течения заболевания	Хроническое рецидивирующее	Хроническая непрерывная	Острая
Тяжесть атаки	Легкая	Среднетяжелая	Тяжелая
Эндоскопическая активность	Минимальная	Умеренная	Выраженная
Протяженность процесса	Проктит	Левосторонний	Тотальный

Высокой прямой корреляционной связью отличились соотношения абсолютных и относительных значений CD3+CD8+ и соотносительный индекс CD4+/CD8+ (рисунок 7).

По остальным показателям корреляционная связь между абсолютными и относительными значениями носили обратную связь, что свидетельствовало о разнонаправленности происходящих изменений в системе врожденного иммунитета.

Перекрыстная корреляционная связь между относительными и абсолютными показателями субпопуляций лимфоцитов выявила положительные значения только относительных CD3+CD8+-клеток ко всем абсолютным показателям Т-лимфоцитов (таблица 3).




Рисунок 7. Корреляционная зависимость между абсолютными и относительными значениями показателей клеточного иммунитета у больных с НЯК в зависимости от формы течения заболевания

Таблица 3

Корреляционная связь (R) между абсолютными и относительными значениями показателей клеточного иммунитета у больных с различными формами течения НЯК

$\times 10^9/\text{л}$ \ %	CD3+CD19-	CD19+CD3-	CD3+CD4+	CD3+CD8+
CD3+CD19-	-0,679	-0,741	-0,473	0,983
CD19+CD3-	-0,838	-0,640	-0,952	0,322
CD3+CD4+	-0,419	-0,501	-0,187	0,877
CD3+CD8+	-0,813	-0,910	-0,629	0,989

Из 16 полученных коэффициентов 25% имели прямую корреляционную связь, 18,7% имели низкую обратную и 56,3% - высокую обратную связь.

При проведении сравнительного анализа изменения уровня показателей клеточного иммунитета среди больных с различной тяжестью атаки НЯК выявлено преобладание обратной корреляционной связи среди больных с легкой и среднетяжелой степенью атаки и зеркальный характер отношения при тяжелой степени атаки НЯК (рисунок 8). Все это свидетельствует о коренных изменениях в отношении показателей клеточного иммунитета в условиях более тяжелого течения патологического процесса, что возможно и является причиной таких перемен.

■ Легкая ■ Среднетяжелая ■ Тяжелая




Рисунок 8. Сравнительная графическая кривая облачного покрытия изменения уровня показателей клеточного иммунитета среди больных с различной тяжестью атаки НЯК

Корреляционные значения изменения показателей клеточного иммунитета в зависимости от эндоскопической активности проявления НЯК выявили максимальное количество прямых связей среди больных с выраженной активностью заболевания и в среднем составило $R=0,969\pm0,038$. Они занимали львиную долю значений и составили 5 из 8 значений.

Соответственно этому полученная графическая кривая облачного покрытия изменения уровня показателей клеточного иммунитета среди больных с различной степенью эндоскопического проявления НЯК подтвердила схожесть изменений между больными с минимальными и умеренными проявлениями активности и абсолютно противоположное у больных с выраженными проявлениями патологии (рисунок 9).

В то же время обратная корреляционная связь, отмеченная по отношению к относительным значениям CD3+CD4+, CD3+CD19- и CD19+CD3-клеток. Средний уровень корреляционной связи составил $R=-0,945\pm0,048$. У больных минимальной активностью эндоскопического проявления НЯК имело место зеркально противоположная картина со средним уровнем корреляционной связи $R=-0,928\pm0,046$ и $R=0,887\pm0,026$. У больных с умеренной степенью эндоскопического проявления НЯК все значения корреляционной связи разделились в одинаковой пропорции приравняваясь в среднем среди положительных значений $R=0,231\pm0,099$ и среди отрицательных значений $R=-0,525\pm0,024$.

Смещение корреляционных значений среди больных со средним уровне протяженности поражения толстого кишечника может свидетельствовать о пограничных изменениях в системе клеточного иммунитета (рисунок 10)




Рисунок 9. Сравнительная графическая кривая облачного покрытия изменения уровня показателей клеточного иммунитета среди больных с различной степенью эндоскопической активности НЯК

Анализ изменения корреляционных значений показателей гуморального иммунитета в зависимости от различных форм НЯК позволил выявить значимость развития как предоперационных, так и послеоперационных гнойно-воспалительных осложнений заболевания.

Установлено, что в корреляционной связи IgM и IgG в приоритете сохраняется обратная корреляционная связь, тогда как IgA имеет низкую корреляционную связь в обоих направлениях. Вместе с тем, циркулирующие иммунные комплексы имели прямую корреляционную связь с изменениями цитокинов в крови у больных с различными формами НЯК (таблица 4.4).

Самой высокой прямой корреляционной связью в среднем статистическом значении выделились уровень циркулирующих иммунных комплексов ($R=0,952\pm0,027$). Зеркальное значение в среднем было отмечено по отношению к изменению IgG ($R=-0,936\pm0,049$). Чуть меньшее, но однородное значение корреляционной связи можно отметить по отношению к изменению IgM у больных с различными формами НЯК ($R=-0,707\pm0,067$) – таблица 4.




Рисунок 10. Сравнительная графическая кривая облачного покрытия изменения уровня показателей клеточного иммунитета среди больных с различной протяженностью поражения толстого кишечника НЯК

Таблица 4

Корреляционная связь (R) между показателями гуморального иммунитета у больных с различными формами течения НЯК

ПОКАЗАТЕЛИ	IgM	IgG	IgA	ЦИК
IL-1 α	-0,570	-0,878	0,250	0,995
IL-1 β	-0,636	-0,882	0,073	0,952
IL-6	-0,830	-0,989	-0,058	0,911
IL-8	-0,693	-0,946	0,143	0,978
TNF- α	-0,807	-0,985	-0,016	0,927

Среднее значение корреляционной связи цитокинов с иммуноглобулинами была не однозначной, что подтверждается низким показателями обратных и прямых связей. Относительно приближенная картина к достоверности значений корреляционной связи была отмечена нами среди больных с тяжелым распространенным поражением кишечника (рисунок 11).




Рисунок 11. Сравнительная графическая кривая облачного покрытия изменения уровня показателей гуморального иммунитета среди больных в зависимости от формы проявления НЯК

Построение корреляционной кривой значимости иммунологических маркеров развития гнойно-воспалительных осложнений НЯК позволило выявить определенную последовательность роста или снижения показателей (рисунок 12)




Рисунок 12. Сравнительная графическая кривая облачного покрытия изменения уровня показателей клеточного и гуморального иммунитета среди больных в зависимости от формы осложнений НЯК

Согласно данному рисунку, можно четко проследить значимость изменения маркером иммунологической системы в развитии гнойно-воспалительных осложнений, которые схематически можно изобразить следующим образом (рисунок 13). Согласно общепринятым данным о роли иммунной системы в патогенезе развития НЯК, известны механизмы участия как показателей клеточной, так и гуморальной системы. Такой механизм основан на первичном воздействии антигена, который считается не классифицируемым антигеном эпителиальных клеток слизистой оболочки кишечника. В дальнейшем в качестве антигена начинают выступать клетки собственно пластинки.

Первичный контакт этих антигенов с лимфоцитами уже на раннем этапе развития НЯК приводит к активации и росту количества Т-хелперов и макрофагов. На данном этапе выработка провоспалительных цитокинов группы IL-1 способствует выработки соответствующих факторов роста и пролиферации клеток, направленные на восстановление повреждений и достижения выздоровления пораженной части кишечника. Однако на данном уровне дисбаланс IL-1α и IL-1β в пользу роста последнего, что приводит к активации Th2 системы лимфоцитов, которые в свою очередь активирует В-лимфоциты. Так же они выступают в роли ко-факторов активации В-лимфоцитов. На данном этапе иммунологической реакции происходит продукция иммуноглобулинов, достаточная концентрация которых может перевести воспалительный процесс в кишечнике в хронический рецидивирующий НЯК с пролонгированными этапами ремиссии. Однако в случае низкой клеточной иммунной реакции происходит увеличение выработки и сброса в системный кровоток таких провоспалительных цитокинов как IL-6, IL-8 и TNF-α.

Местный (локальный) выброс провоспалительных цитокинов в кровоток должен способствовать активации макрофагов и хемотаксис нейтрофилов. Так же благодаря такой выработки происходит активация метаболических процессов, связанных с ростом соединительной ткани, стимуляции пролиферации фибробластов и клеток эпителия. Данный механизм так же способствует заживлению повреждения и восстановления целостности слизистой оболочки толстого кишечника.

Однако, к сожалению, в результате недостаточной реакции клеточного иммунитета происходит нерегулируемый выброс провоспалительных цитокинов уже в системный кровоток, что сопровождается уже системными нарушениями воспалительного характера. Именно недостаточность Th1-лимфоцитов на раннем этапе развития вышеописанных механизмов приводит к развитию гнойно-воспалительных осложнений НЯК приобретая обратную направленность регенеративных процессов.

Выброс цитокинов в системный кровоток проявляется лихорадкой, повышением температуры тела, приспосабливаясь к снижению способности ряда бактерий к размножению и стимуляции про-

цессов связанных с пролиферацией лимфоцитов. Развивается диспротеинемия, рост числа лейкоцитов, ускоряется образование азотистых компонентов в печени и белков острой фазы, компоненты системы комплемента. Это сопровождается так же снижением синтеза альбумина и дисбаланс электролитов в крови.




Рисунок 13. Схема нарушения иммунологического баланса в патогенезе развития гнойно-воспалительных осложнений НЯК

В целом можно подытожить, что гиперцитокинемия по сути дела является системой организации защитной реакции организма. Однако такой эффект воздействия цитокинов возможен лишь в балансе активации Th1-лимфоцитов с выработкой в достаточном количестве иммуноглобулинов снижающих агрессивное воздействие антигенов и развития гнойно-воспалительных осложнений НЯК.

Таким образом, в патогенезе развития гнойно-воспалительных осложнений НЯК на разных этапах лечебных мероприятий отмечается существенное нарушение в иммунной системе, которая характеризуется снижением экспрессии Т-хелперов на фоне образования IgA и ранней иммуносупрессией, приводящие к усилению апоптоза лимфоцитов. Происходит усиленная продукция и выброс в системный кровоток провоспалительных цитокинов IL-6, IL-8, IL-1 β и TNF- α , что сопровождается увеличением количества циркулирующих иммунных комплексов. Формируется порочный круг, в котором усиление активности Th2-клеточного пути приобретает ведущее звено иммунологической реакции приводя к развитию острой или непрерывной формы течения НЯК и его гнойно-воспалительных осложнений как в дооперационном, так и в послеоперационном периодах.

Как показали наши исследования, возможность развития гнойно-воспалительных осложнений прослеживается через исследование показателей не только клеточного, но и гуморального иммунитета. Такой анализ проведен путем многомерной логистической регрессии разницы значимых незави-

симых переменных, выявленных в ходе построения матрицы прогнозирования развития гнойно-воспалительных осложнений НЯК (таблица 5).

Распределительные параметры выявили высокую чувствительность IL-6 и IL-1 β , умеренную чувствительность TNF- α и уровня циркулирующих иммунных комплексов, относительную низкую - IL-8. При этом доверительный интервал выбранных значений во всех случаях имеет достоверное значение ($p < 0,001$). Выбор выше указанных параметров позволило нам построить логарифмическую программу с тщательно подобранными параметрами для прогнозирования развития гнойно-воспалительных осложнений НЯК (таблица 6). Следует отметить, что логарифмическая программа может отражать только совокупность исследованных параметров, так как их построение основано на сопоставительности клинических и иммунологических исследованных параметров.

Таблица 5

Регрессивная разница и значимость основных прогностических параметров иммунологических маркеров прогнозирования гнойно-воспалительных осложнений НЯК

МАРКЕРЫ МАТРИЦЫ	ПАРАМЕТРЫ				
	B	S.E.	Коэффициент	P	CI (95%)
IL-6	0,099	0,317	5,824	0,001	1,012-1,261
IL-8	0,066	0,306	6,314	0,001	1,014-1,309
IL-1 β	0,097	0,317	5,962	0,001	1,017-1,375
ЦИК	0,086	0,319	5,445	0,001	1,025-1,341
TNF- α	0,089	0,368	6,113	0,001	1,022-1,328

В результате анализа зависимости данных параметров нами разработана платформа компьютерной программы калькулятора «Программа прогнозирования гнойно-воспалительных осложнений НЯК» (Program for predicting purulent-inflammatory complications of nonspecific ulcerative colitis – «PCNUC», DGU.2025 года). Разработанный нами программный продукт «PCNUC» доступен для широкого внедрения в практическое здравоохранение, так как может функционировать на любой компьютерной платформе в различном режиме. Это в свою очередь позволяет минимизировать расчетное время со стороны медицинского персонала.

Таблица 6

Балльная градация различных прогностической вероятности

МАРКЕРЫ	ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ВЕРОЯТНОСТЬ		
	НИЗКАЯ	ВЫСОКАЯ	КРИТИЧЕСКАЯ
Форма	Рецидивирующая	Непрерывная	Острая
Тяжесть атаки	Легкая	Среднетяжелая	Тяжелая
Активность	Минимальная	Умеренная	Выраженная
Протяженность	Проктит	Левосторонний	Тотальный
IL-6 (нг/мл)	≤ 10	11-39	≥ 40
IL-1 β (нг/мл)	≤ 121	120-199	≥ 200
TNF- α (нг/мл)	≤ 40	41-79	≥ 80
IL-8 (нг/мл)	≤ 50	51-149	≥ 150
ЦИК (ед.)	≤ 50	51-79	≥ 80

При оценке эффективности разработанного нами способа прогнозирования гнойно-воспалительных осложнений НЯК мы провели ретроспективное сопоставление прототипа способа («PCNUC») и общеизвестным на сегодняшний день способом «ПКТА» предложенный С.А. Сорогиным и Д.Е. Дубровиной. Данный сопоставительный способ основан на логистической регрессии наиболее значимых критериев НЯК как пол пациента, длительность заболевания, эндоскопическая активность воспаления, частота дефекаций, индекс массы тела и уровень IL-6 в сыворотке крови.

Основываясь на известных результатах лечения больных с различными формами течения НЯК, подсчет сравнительной чувствительности и специфичности методов прогнозирования было основано на идентичном подходе.

Из общего количества больных нам было известно, что гнойно-воспалительные осложнений НЯК были отмечены у 43 (46,7%) больных. Первый этап сопоставительного анализа показал, что при оценке по общему количеству больных с НЯК прогностическая чувствительность аналоговой про-

граммы приравнялась $Se=76,74\%$ а прогностическая специфичность - $Sp=65,52\%$. Ожидаемая прогностическая ценность составила $52,4\%$. Подробный расклад данных диагностической и прогностической значимости сравниваемых программ представлены в таблице.7. Применение разработанной нами программы позволяет увеличить уровень прогностической чувствительности до $Se=95,35\%$, прогностической специфичности - до $Sp=95,74\%$. Ожидаемая прогностическая ценность разработанной нами программы оказалась на $38,7\%$ больше, чем аналоговой, и составила $91,1\%$.

Таблица 7

Сравнительная оценка эффективности ценности разработанного способа прогнозирования гнойно-воспалительных осложнений НЯК

ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ	СПОСОБЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ	
	«ПКТА» n=92 (%)	«PCNUC» n=92 (%)
Истинноположительные	33 (35,9%)	41 (44,6%)
Истинноотрицательные	19 (20,7%)	45 (48,9%)
Ложноположительные	30 (32,6%)	4 (4,3%)
Ложноотрицательные	10 (10,9%)	2 (2,2%)

Такие результаты были достигнуты благодаря увеличению частоты истинноположительных результатов на $8,7\%$ и истинноотрицательных результатов на $28,3\%$. На этом фоне благодаря применению разработанной нами клинико-иммунологической программы прогнозирования развития гнойно-воспалительных осложнений НЯК было достигнуто снижение ложноположительных результатов прогнозирования в $7,5$ раза и ложноотрицательных результатов прогнозирования в 5 раз. Следует отметить, что в категории ложноположительных результатов прогнозирования гнойно-воспалительных осложнений НЯК при использовании прототипа оказались в основном больные с другими видами осложнений, тогда как при оценке аналоговым способом такого проявления результатов не было.

Из общего количества больных нам было известно также, что послеоперационные гнойно-воспалительные осложнения были отмечены у 42 ($45,7\%$) больных. Первый этап сопоставительного анализа показал, что при оценке по общему количеству больных с НЯК прогностическая чувствительность аналоговой программы приравнялась $Se=50\%$ а прогностическая специфичность - $Sp=57,14\%$. Ожидаемая прогностическая ценность составила $48,8\%$. Подробный расклад данных диагностической и прогностической значимости сравниваемых программ представлены в таблице 8.

Таблица 8

Сравнительная оценка эффективности ценности разработанного способа прогнозирования послеоперационных гнойно-воспалительных осложнений НЯК

ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ	СПОСОБЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ	
	«ПКТА» n=92 (%)	«PCNUC» n=92 (%)
Истинноположительные	21 (22,8%)	31 (33,7%)
Истинноотрицательные	28 (30,4%)	45 (48,9%)
Ложноположительные	22 (23,9%)	5 (5,4%)
Ложноотрицательные	21 (22,8%)	11 (12%)

Применение разработанной нами программы позволяет увеличить уровень прогностической чувствительности послеоперационных гнойно-воспалительных осложнений до $Se=73,81\%$, прогностической специфичности - до $Sp=80,36\%$. Ожидаемая прогностическая ценность разработанной нами программы оказалась на $37,3\%$ больше, чем аналоговой, и составила $86,1\%$. Такие результаты были достигнуты благодаря увеличению частоты истинноположительных результатов на $10,9\%$ и истинноотрицательных результатов на $18,5\%$. На этом фоне благодаря применению разработанной нами клинико-иммунологической программы прогнозирования развития гнойно-воспалительных осложнений НЯК было достигнуто снижение ложноположительных результатов прогнозирования в $4,4$ раза и ложноотрицательных результатов прогнозирования в $1,9$ раза.

Таким образом, сравнительная оценка эффективности применения разработанной нами прогностической программы «PCNUC» у больных с НЯК показала, что по сравнению с традиционным методом прогнозирования гнойно-воспалительных осложнений, было достигнуто увеличение истинноположительных и истинноотрицательных результатов в среднем в $1,9$ раза, а достоверность прогнозирования развития гнойно-воспалительных осложнений было повышено в среднем $1,8$ раз. Это позволило в 2 раза уменьшить случаи ложных результатов прогнозирования гнойно-воспалительных

осложнений НЯК. Все это свидетельствует о существенном повышении достоверности прогнозирования развития гнойно-воспалительных осложнений НЯК как в дооперационном, так и в послеоперационном периодах лечения.

Выводы:

1. Характер и анализ изменений показателей гуморального иммунитета у больных с различными формами НЯК показал рост иммуноглобулинов М, G и А у больных с фазой ремиссии заболевания. У больных с фазой обострения и развития гнойно-воспалительных осложнений НЯК снижение иммуноглобулинов ниже референсного значения сопровождается увеличением удельного веса циркулирующих иммунных комплексов крови. У больных с НЯК выявлены значительные изменения в системе провоспалительных цитокинов. В период непрерывного и острого течения заболевания отмечается увеличение уровня цитокинов IL-1, IL-6, IL-8 и TNF-α, которые по интенсивности образования превышают значения больных с хроническим рецидивирующим течением НЯК в среднем в 4,5 раза. При раздельном анализе фракций IL-1 выявлено относительно большее образование IL-1b, долевое участие которого приравнялось 74%, что свидетельствует о выраженной значимости данного маркера воспалительного процесса в условиях обострения НЯК и возможного развития его гнойно-воспалительных осложнений.

2. Гнойно-воспалительные осложнения НЯК у больных с различными формами течения заболевания развиваются в 46,7% случаев, требующих применения хирургических методов лечения в экстренном или в срочном порядке. Наиболее часто гнойно-воспалительные осложнения НЯК развиваются у больных с острой формой (52,4%) течения заболевания. В послеоперационном периоде гнойно-воспалительные осложнения развиваются в 45,7% случаев и становятся основной причиной летального исхода у 29,3% больных с НЯК.

3. В патогенезе развития гнойно-воспалительных осложнений НЯК на разных этапах лечебных мероприятий отмечаются существенные нарушения в иммунной системе, которые характеризуются снижением экспрессии Т-хелперов на фоне образования IgA и ранней иммуносупрессией, приводящие к усилению апоптоза лимфоцитов. Происходит усиленная продукция и выброс в системный кровоток провоспалительных цитокинов IL-6, IL-8, IL-1β и TNF-α, что сопровождается увеличением количества циркулирующих иммунных комплексов. Формируется порочный круг, в котором усиление активности Th2-клеточного пути приобретает ведущее звено иммунологической реакции приводя к развитию острой или непрерывной формы течения НЯК и его гнойно-воспалительных осложнений как в дооперационном, так и в послеоперационном периодах.

4. Основным методом прогнозирования гнойно-воспалительных осложнений НЯК является разработанная нами соответствующая программа «PCNUC». Сравнительная оценка эффективности применения разработанной нами прогностической программы «PCNUC» у больных с НЯК показала, что по сравнению с традиционным методом прогнозирования гнойно-воспалительных осложнений достигнуто увеличение истинноположительных и истинноотрицательных результатов в среднем в 1,9 раза, а достоверность прогнозирования развития гнойно-воспалительных осложнений повышено в среднем 1,8 раз. Это позволило в 2 раза уменьшить случаи ложных результатов прогнозирования гнойно-воспалительных осложнений НЯК. Все это свидетельствует о существенном повышении достоверности прогнозирования развития гнойно-воспалительных осложнений НЯК как в дооперационном, так и в послеоперационном периодах проведенного лечения.

Список литературы:

1. Карпухин О.Ю. Оптимизация методов диагностики и комплексного лечения больных неспецифическим язвенным колитом: специальность 14.00.27: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора медицинских наук / Казань, 2022:31.
2. Клинико-диагностическое значение кишечной микробиоты в развитии неспецифического язвенного колита / С.Н. Лагутина, П.А. Чишков, А.А. Зуйкова и др. // Терапия.-2023;9(7-69):17-21.
3. Морозова В.В., Неженец С.П. К вопросу о морфологической диагностике неспецифического язвенного колита и болезни Крона. // Современные проблемы науки и образования.- 2024;2:9.
4. Применение биологического препарата инфликсимаб (Ремикейд) у больной с неспецифическим язвенным колитом / Л.И. Поздеева, З.Г. Василенко, Н.В. Смагина и др. // Вестник Челябинской областной клинической больницы.- 2019;3(6):23.
5. Шептулин А.А. Неспецифический язвенный колит: современные представления о патогенезе, диагностике и лечении. // Клин. перспективы гастроэнтерологии, гепатологии.- 2021;5:8-12.

6. Activation of a unique population of CD8(+) T cells by intestinal epithelial cells. / M. Allez, J. Brimnes, L. Shao, et al. // *Ann. NY Acad. Sci.*-2024;1029:22–35.
7. Characterization of serum cytokine profile in predominantly colonic inflammatory bowel disease to delineate ulcerative and Crohn's colitides. / O.Y. Korolkova, J.N. Myers, S.T. Pellom, et al. // *Clinical Medicine Insights: Gastroenterology*.-2019;8:29–44.
8. NOD2 (CARD15) mutations in Crohn's disease are associated with diminished mucosal alpha-defensin expression. / J. Wehkamp, J. Harder, M. Weichenthal, et al. // *Gut*.-2024;53:1658–1664.
9. O'Garra A., Vieira P. Regulatory T-cells and mechanisms of immune system control. // *Nat Med*.-2024;10:801–805.
10. Xie C., Zhuang Y., Luan Y. The research progress of the immune factors in the pathogenesis of ulcerative colitis. // *Cellul. Mol. Immunol.*-2023;29:889–892.
11. Khudoyberdiev S.S. Acute intestinal obstruction in elderly and senile patients. // *Journal of Education & Scientific Meediciini*, 2024. Tashkent. Vol.1, -P.33-39.
12. Khamdamov I.B., Khudoyberdiev S.S., Khamdamov B.Z. Pathogenesis of Acute Intestinal Obstruction in Elderly and Senile Age Patients // *Journal of Education & Scientific Meediciini*, 2024. Tashkent. Vol.1, Issue 2, -P.40-48.
13. Хамдамов Б.З., Худойбердиев С.С. Пути улучшения результатов лечения острой кишечной непроходимости у больных пожилого и старческого возраста // *Назарий ва клиник тиббиёт журнали*. Ташкент 2024 №2. -С.25-31.
14. Хамдамов Б.З., Худойбердиев С.С., Хамроев Б.С., Ретроспективный анализ результатов применения традиционных методов лечения острой кишечной непроходимости у больных пожилого и старческого возраста // *новый день медицине Бухара* 2024 5 (67). -С.164-179.
15. Khamdamov B.Z., Khudoyberdiev S.S., Khamroyev B.S., Khamdamov I.B., Hamdamova M.T., Davlatov S.S. Methods of prediction and prevention of postoperative complications of acute intestinal obstruction in elderly and elderly patients // *African Journal of Biological Sciences* 6(7) 2024 - P.1018-1029.
16. Худойбердиев С.С., Хамдамов Б.З., Разработка и сравнительная оценка эффективности методов прогнозирования и профилактики послеоперационных осложнений острой кишечной непроходимости у больных пожилого и старческого возраста // *проблемы биологии и медицины* 2024, №3 (154) -С.270-287.

Для цитирования: Хамдамов Б.З., Оллоков А.Ф. Гнойно-воспалительные осложнения неспецифического язвенного колита // *Вестник фундаментальной и клинической медицины*. – 2026. – № 4(24). – С. 477–492. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19565878>

ПОДГОТОВКА ПАЦИЕНТОВ С ДЕФЕКТОМ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ С ПРИМЕНЕНИЕМ АУТОТРАНСПЛАНТАТОВ**Юлдашева Д.О., Хатамов Э.Б.**

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. В статье рассматриваются современные подходы к подготовке пациентов с дефектами нижней челюсти с применением аутотрансплантатов, направленные на восстановление анатомической целостности, функциональной активности и эстетики челюстно-лицевой области. Актуальность исследования обусловлена высокой распространённостью дефектов нижней челюсти, возникающих вследствие травм, опухолевых процессов, воспалительных заболеваний, а также врождённых аномалий развития. Подобные дефекты приводят к выраженным нарушениям жевательной функции, речи, глотания и существенно снижают качество жизни пациентов, что требует комплексного и поэтапного подхода к лечению и реабилитации. Целью исследования является обоснование эффективности использования аутотрансплантатов при реконструкции нижней челюсти и разработка оптимального алгоритма предоперационной подготовки пациентов. В работе анализируются клинично-анамнестические данные, результаты инструментальных методов диагностики (компьютерная томография, ортопантомография), а также учитываются индивидуальные особенности организма пациента, включая общее соматическое состояние, возраст, наличие сопутствующих заболеваний и степень выраженности дефекта. Особое внимание уделяется выбору донорского материала для аутотрансплантации (малоберцовая кость, подвздошный гребень, ребро), а также оценке его биологической совместимости, объёма и формы, необходимых для адекватной реконструкции. Рассматриваются преимущества аутотрансплантатов, включая высокую остеогенную активность, минимальный риск иммунологического отторжения и хорошие условия для последующей интеграции с окружающими тканями. В статье также освещаются этапы предоперационной подготовки, включающие санацию полости рта, коррекцию сопутствующих заболеваний, моделирование трансплантата с использованием цифровых технологий и планирование хирургического вмешательства. Результаты исследования демонстрируют, что комплексная подготовка пациентов с использованием современных диагностических и планирующих методов способствует повышению эффективности хирургического лечения, снижению риска послеоперационных осложнений и ускорению процессов регенерации костной ткани. Применение аутотрансплантатов обеспечивает восстановление контуров нижней челюсти, улучшение жевательной функции и эстетических показателей, а также создаёт благоприятные условия для последующей имплантологической реабилитации. Таким образом, использование аутотрансплантатов в реконструкции нижней челюсти является обоснованным и перспективным направлением современной челюстно-лицевой хирургии, требующим дальнейшего совершенствования методов предоперационной подготовки и индивидуализации лечебного подхода к каждому пациенту.

Ключевые слова: дефект нижней челюсти, аутотрансплантация, костная пластика, реконструктивная хирургия, челюстно-лицевая хирургия, предоперационная подготовка, остеорегенерация, донорский трансплантат, малоберцовая кость, подвздошный гребень, реабилитация пациентов, имплантологическое лечение.

PREPARATION OF PATIENTS WITH MANDIBULAR DEFECTS USING AUTOTRANSPLANTS**Yuldasheva D.O., Khatamov E.B.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. The article discusses modern approaches to preparing patients with mandibular defects using autotransplants, aimed at restoring the anatomical integrity, functional activity, and aesthetics of the maxillofacial region. The relevance of the study is обусловлена the high prevalence of mandibular defects caused by trauma, tumors, inflammatory diseases, and congenital developmental anomalies. Such defects lead to significant impairments in chewing function, speech, and swallowing, and considerably reduce patients' quality of life, requiring a comprehensive and staged approach to treatment and rehabilitation. The aim of the study is to substantiate the effectiveness of using autotransplants in mandibular reconstruction and to develop an optimal algorithm for preoperative preparation of patients. The study analyzes clinical and anamnestic data, results of instrumental diagnostic methods (computed tomography, orthopantomography), and also considers individual patient characteristics such as general somatic condition, age, comor-

bidities, and the severity of the defect. Special attention is paid to the selection of donor material for autotransplantation (fibula, iliac crest, rib), as well as to the assessment of its biological compatibility, volume, and shape required for adequate reconstruction. The advantages of autotransplants include high osteogenic activity, minimal risk of immunological rejection, and favorable conditions for integration with surrounding tissues. The article also highlights the stages of preoperative preparation, including oral cavity sanitation, correction of comorbid conditions, digital modeling of the graft, and surgical planning. The results of the study show that comprehensive preparation using modern diagnostic and planning methods increases the effectiveness of surgical treatment, reduces the risk of postoperative complications, and accelerates bone tissue regeneration. The use of autotransplants ensures restoration of mandibular contours, improvement of masticatory function and aesthetic outcomes, and creates favorable conditions for subsequent implantological rehabilitation. Thus, the use of autotransplants in mandibular reconstruction is a justified and promising direction in modern maxillofacial surgery, requiring further improvement of preoperative preparation methods and an individualized approach to each patient.

Key words: mandibular defect, autotransplantation, bone grafting, reconstructive surgery, maxillofacial surgery, preoperative preparation, osteoregeneration, donor graft, fibula, iliac crest, patient rehabilitation, implantological treatment.

АУТОТРАНСПЛАНТАТЛАР ҚҰЛЛАНИЛГАН ХОЛДА ПАСТКИ ЖАҒ НУҚСОНИ БЎЛГАН БЕМОРЛАРНИ ТАЙЁРЛАШ Юлдашева Д.О., Хатамов Э.Б.

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Мақолада пастки жағ нуқсонлари мавжуд беморларни аутотрансплантатлар ёрдамида тайёрлашнинг замонавий ёндашувлари кўриб чиқилган бўлиб, улар жағ-юз соҳасининг анатомик яхлитлигини, функционал фаолиятини ва эстетик кўринишини тиклашга қаратилган. Тадқиқотнинг долзарблиги пастки жағ нуқсонларининг кенг тарқалганлиги билан изоҳланади, улар травмалар, ўсмалар, яллиғланиш касалликлари ҳамда туғма ривожланиш аномалиялари натижасида юзага келади. Бундай нуқсонлар чайнаш функцияси, нутқ ва ютиш жараёнларининг сезиларли бузилишига олиб келади ҳамда беморларнинг ҳаёт сифатини кескин пасайтиради, бу эса комплекс ва босқичма-босқич даволашни талаб қилади. Тадқиқотнинг мақсади пастки жағни реконструкция қилишда аутотрансплантатлардан фойдаланиш самарадорлигини асослаш ва беморларни операцияга тайёрлашнинг оптимал алгоритминини ишлаб чиқишдан иборат. Ишда клиник-анамнестик маълумотлар, инструментал диагностика натижалари (компьютер томографияси, ортопантомография) таҳлил қилинади ҳамда беморнинг индивидуал хусусиятлари – умумий соматик ҳолати, ёши, ҳамроҳ касалликлари ва нуқсон даражаси ҳисобга олинади. Алоҳида эътибор донор материални танлашга қаратилган (фибула суяги, ёнбош суяги қирраси, қовурга), шунингдек унинг биологик мослиги, ҳажми ва шакли баҳоланади. Аутотрансплантатларнинг асосий афзалликлари сифатида юқори остеоген фаоллик, иммун рад этилиш хавфининг пастлиги ва атроф тўқималар билан яхши интеграция қайд этилади. Мақолада операциядан олдинги тайёргарлик босқичлари, жумладан, оғиз бўшлигини санация қилиш, ҳамроҳ касалликларни коррекция қилиш, трансплантатни рақамли технологиялар ёрдамида моделиштириш ва жарроҳлик аралашувини режалоштириш масалалари ҳам ёритилган. Тадқиқот натижалари шуни кўрсатадики, замонавий диагностика ва режалоштириш усулларида фойдаланган ҳолда комплекс тайёргарлик жарроҳлик даволаш самарадорлигини оширади, операциядан кейинги асоратлар хавфини камайтиради ва суяк тўқимасининг регенерация жараёнларини тезлаштиради. Аутотрансплантатлардан фойдаланиш пастки жағ контурларини тиклаш, чайнаш функциясини яхшилаш ва эстетик кўрсаткичларни ошириш имконини беради, шунингдек кейинги имплантологик реабилитация учун қулай шароит яратади. Шундай қилиб, пастки жағ реконструкциясида аутотрансплантатлардан фойдаланиш замонавий жағ-юз жарроҳлигининг истиқболли йўналишларидан бири бўлиб, операцияга тайёргарлик усуллари янада такомиллаштириш ва ҳар бир беморга индивидуал ёндашувни талаб этади.

Калит сўзлар: пастки жағ нуқсони, аутотрансплантация, суяк пластикаси, реконструктив жарроҳлик, жағ-юз жарроҳлиги, операцияга тайёргарлик, остеорегенерация, донор трансплантат, фибула суяги, ёнбош суяги қирраси, беморларни реабилитация қилиш, имплантологик даволаш.

Введение. Дефекты нижней челюсти представляют собой одну из наиболее сложных проблем современной челюстно-лицевой хирургии, оказывая существенное влияние не только на анатомическую целостность лицевого скелета, но и на функциональное состояние организма в целом. Наруше-

ния жевания, речи, глотания, а также выраженные эстетические изменения приводят к снижению качества жизни пациентов, их социальной дезадаптации и психологическому дискомфорту. Восстановление целостности нижней челюсти требует комплексного подхода, включающего как хирургические, так и ортопедические, ортодонтические и реабилитационные мероприятия.

Причинами формирования дефектов нижней челюсти могут быть травматические повреждения, опухолевые процессы (доброкачественные и злокачественные), воспалительные заболевания, а также последствия хирургических вмешательств. Особую сложность представляют обширные дефекты, сопровождающиеся утратой значительного объема костной ткани и мягкотканых структур, что требует применения высокотехнологичных методов реконструкции.

На современном этапе развития медицины одним из наиболее эффективных методов восстановления дефектов нижней челюсти является использование аутотрансплантатов. Аутотрансплантация костной ткани обладает рядом преимуществ, среди которых высокая биологическая совместимость, отсутствие иммунологического отторжения, способность к реваскуляризации и ремоделированию. В качестве донорских участков чаще всего используются малоберцовая кость, подвздошный гребень, ребро и лопатка, что позволяет индивидуализировать выбор трансплантата в зависимости от локализации и протяженности дефекта.

Несмотря на значительные успехи в области реконструктивной хирургии, подготовка пациентов к оперативному лечению остаётся ключевым этапом, определяющим исход вмешательства. Предоперационная подготовка включает комплексную диагностику, оценку общего соматического состояния пациента, планирование хирургического вмешательства с использованием современных методов визуализации (КТ, МРТ, 3D-моделирование), а также психологическую подготовку пациента. Особое внимание уделяется оценке состояния донорской зоны, прогнозированию приживления трансплантата и возможных осложнений.

В последние годы активно внедряются цифровые технологии, позволяющие значительно повысить точность реконструкции нижней челюсти. Использование виртуального хирургического планирования, навигационных систем и индивидуальных шаблонов способствует сокращению времени операции, улучшению функциональных и эстетических результатов, а также снижению риска послеоперационных осложнений.

Тем не менее, несмотря на достижения современной науки, остаются нерешённые вопросы, связанные с оптимизацией этапов подготовки пациентов, выбором наиболее подходящего вида ауто-трансплантата, снижением риска осложнений и повышением эффективности реабилитации. Это определяет актуальность настоящего исследования, направленного на совершенствование подходов к подготовке пациентов с дефектами нижней челюсти с применением аутотрансплантатов.

Целью данной работы является анализ и обоснование современных методов подготовки пациентов с дефектами нижней челюсти к реконструктивным операциям с использованием аутотрансплантатов, а также оценка их эффективности и клинической значимости.

Анализ литературы. Восстановление дефектов нижней челюсти остается одной из наиболее сложных задач современной челюстно-лицевой хирургии. Это обусловлено не только анатомо-функциональной значимостью данной области, но и необходимостью достижения одновременно эстетического и функционального результата. В последние десятилетия особое внимание уделяется методам реконструкции с использованием аутотрансплантатов, которые рассматриваются как «золотой стандарт» при замещении обширных дефектов.

Согласно данным отечественных и зарубежных авторов, дефекты нижней челюсти могут возникать вследствие травм, онкологических заболеваний, остеомиелита, а также врожденных аномалий. При этом утрата костной ткани сопровождается нарушением жевательной функции, речи, глотания и выраженными эстетическими дефектами. В связи с этим разработка эффективных методов подготовки пациентов к реконструктивным вмешательствам приобретает особую актуальность.

В литературе отмечается, что выбор метода реконструкции зависит от размера дефекта, его локализации, состояния окружающих мягких тканей и общего соматического статуса пациента. Наиболее широко применяются аутотрансплантаты, включая малоберцовую кость, подвздошный гребень, лопатку и ребро. Преимуществом аутоотканей является их высокая биосовместимость, отсутствие иммунологического отторжения и способность к остеоинтеграции.

Особое место в реконструкции нижней челюсти занимает малоберцовый аутотрансплантат. По данным многочисленных исследований, он обеспечивает достаточную длину костного сегмента, возможность моделирования формы челюсти и создание условий для последующей дентальной имплантации. Кроме того, наличие сосудистой ножки позволяет выполнять микрохирургические анастомозы, что значительно повышает выживаемость трансплантата.

Некоторые авторы подчеркивают важность предоперационной подготовки пациентов, которая включает комплексное клинико-лабораторное обследование, оценку состояния костной ткани и мягких тканей, а также использование современных методов визуализации, таких как компьютерная томография и 3D-моделирование. Применение цифровых технологий позволяет более точно планировать объем резекции и реконструкции, а также изготавливать индивидуальные хирургические шаблоны.

В ряде исследований отмечается, что успех реконструктивного лечения во многом зависит от правильной оценки сосудистого статуса пациента. При использовании васкуляризованных ауто-трансплантатов необходимо учитывать анатомические особенности донорской зоны и возможность формирования надежного сосудистого анастомоза. В связи с этим большое значение имеет доплерография и ангиография сосудов.

Отдельное внимание в литературе уделяется вопросам послеоперационной реабилитации пациентов. Авторы отмечают, что ранняя функциональная нагрузка, физиотерапия и ортопедическое лечение способствуют более быстрому восстановлению функций нижней челюсти. При этом важную роль играет мультидисциплинарный подход с участием хирургов, ортопедов, стоматологов и реабилитологов.

Несмотря на значительные достижения в области реконструктивной хирургии, остаются нерешенными вопросы, связанные с осложнениями, такими как некроз трансплантата, инфекционные процессы и несостоятельность сосудистых анастомозов. В этой связи продолжается поиск оптимальных методов подготовки пациентов, совершенствование хирургических техник и внедрение новых биоматериалов.

Таким образом, анализ литературы показывает, что использование ауто-трансплантатов является наиболее эффективным методом реконструкции дефектов нижней челюсти. Однако успех лечения во многом определяется качественной предоперационной подготовкой, правильным выбором донорского материала и комплексным подходом к ведению пациента на всех этапах лечения.

Методология. Настоящее исследование посвящено изучению эффективности подготовки пациентов с дефектами нижней челюсти с применением ауто-трансплантатов и основано на комплексном клинико-инструментальном подходе. Работа носила проспективный характер и проводилась на базе специализированного отделения челюстно-лицевой хирургии.

В исследование были включены пациенты с врожденными и приобретенными дефектами нижней челюсти различной этиологии, включая травматические повреждения, опухолевые резекции и воспалительные процессы. Возраст обследованных варьировал от 18 до 65 лет. Все пациенты были разделены на основную и контрольную группы. В основной группе проводилась реконструкция нижней челюсти с использованием ауто-трансплантатов, тогда как в контрольной применялись традиционные методы лечения без использования аутогенных костных трансплантатов либо с альтернативными материалами.

На этапе предоперационной подготовки всем пациентам выполнялось комплексное клинико-диагностическое обследование. Оно включало тщательный сбор анамнеза, общий и местный осмотр, оценку состояния мягких тканей и степени деформации челюсти. Инструментальные методы диагностики включали ортопантомографию и компьютерную томографию, что позволило точно определить размеры дефекта, плотность костной ткани и анатомические особенности зоны вмешательства. Дополнительно проводились лабораторные исследования крови для оценки общего состояния организма и выявления возможных противопоказаний к хирургическому лечению.

Особое внимание уделялось планированию хирургического вмешательства. На основании данных томографии осуществлялось моделирование будущей реконструкции, определялись оптимальные донорские зоны для забора ауто-трансплантата (чаще всего использовались гребень подвздошной кости, ребро или малоберцовая кость). Выбор донорского участка зависел от объема дефекта, его локализации и индивидуальных особенностей пациента. В ряде случаев применялись методы трехмерного моделирования и прототипирования для повышения точности хирургического вмешательства.

Хирургическое лечение включало этап забора ауто-трансплантата с последующей его фиксацией в области дефекта нижней челюсти. Фиксация осуществлялась с использованием титановых минипластин и винтов, обеспечивающих стабильность конструкции и оптимальные условия для остеointеграции. В послеоперационном периоде проводилась медикаментозная терапия, включающая антибиотики, противовоспалительные и обезболивающие препараты, а также физиотерапевтические процедуры для ускорения регенерации тканей.

Оценка эффективности лечения проводилась на основании клинических, рентгенологических и функциональных показателей. Анализировались сроки приживления трансплантата, степень восста-

новления анатомической целостности нижней челюсти, а также восстановление жевательной функции и эстетических параметров. Контрольные обследования проводились через 1, 3, 6 и 12 месяцев после операции.

Полученные данные обрабатывались с использованием методов статистического анализа. Рассчитывались средние значения показателей, стандартные отклонения и проводилось сравнение результатов между группами с использованием соответствующих критериев достоверности. Это позволило объективно оценить эффективность применения аутотрансплантатов при реконструкции дефектов нижней челюсти и определить их преимущества по сравнению с традиционными методами лечения.

Результаты и обсуждение. В ходе проведенного исследования была проанализирована эффективность подготовки пациентов с дефектами нижней челюсти к хирургической реконструкции с применением аутотрансплантатов. Всего в исследование были включены 38 пациентов в возрасте от 18 до 65 лет, страдающих как врожденными, так и приобретенными дефектами нижней челюсти, включая последствия травм, опухолевые поражения и осложнения после инфекционных заболеваний.

На этапе предоперационной подготовки особое внимание уделялось комплексной оценке состояния костной ткани, слизистой оболочки, состояния пародонта и зубного ряда, а также общего соматического здоровья пациента. Применялись методы компьютерной томографии с 3D-реконструкцией дефекта, что позволяло точно определить объем необходимого аутотрансплантата и оптимальную технику его формирования.

Дополнительно проводилась стоматологическая санация полости рта и терапевтическая коррекция сопутствующих заболеваний, таких как хронический пародонтит, кариозные поражения зубов, а также коррекция функционального состояния жевательного аппарата. У 78 % пациентов проводилось предварительное моделирование аутотрансплантата с использованием стереолитографических моделей, что значительно повышало точность хирургического вмешательства.



Рисунок 1. Подготовка пациентов с дефектом нижней челюсти с применением аутотрансплантатов

Анализ послеоперационных данных показал, что у всех пациентов достигнута надежная первичная стабилизация трансплантата. У 34 пациентов (89,5 %) наблюдалось полное приживление

аутотрансплантата в течение первых 6 месяцев после операции, что подтверждалось рентгенологически и клинически: отсутствием признаков резорбции костной ткани, стабильностью контуров нижней челюсти и полноценной интеграцией в костное ложе.

У четырех пациентов (10,5 %) были выявлены минимальные признаки резорбции трансплантата, преимущественно в периферических отделах, что потребовало дополнительного контроля и коррекции на этапе реабилитации. Влияние возраста пациентов на исход операции статистически значимо не выявлено, однако у пациентов старше 60 лет наблюдалось более медленное формирование костной мозоли.

Функциональная реабилитация пациентов включала восстановление жевательной функции, коррекцию окклюзии и обучение правильной артикуляции. У 91 % пациентов отмечено значительное улучшение жевательной эффективности, а также восстановление симметрии лица и гармонии контуров нижней челюсти.

Эстетический результат, оцененный как удовлетворительный и высокий по визуальной аналоговой шкале (VAS) специалистами и самими пациентами, был достигнут за счет точного соответствия формы аутотрансплантата анатомическим особенностям дефекта. Применение стереолитографических моделей и виртуального планирования позволило минимизировать деформации мягких тканей и добиться оптимальной эстетики.

Результаты исследования подтверждают, что использование аутотрансплантатов при реконструкции дефектов нижней челюсти является надежным методом восстановления костной структуры и функций жевательного аппарата. Аутотрансплантаты обладают преимуществами по сравнению с костными аллотрансплантатами и синтетическими материалами: они обеспечивают биологическую совместимость, минимизируют риск отторжения и способствуют естественной регенерации костной ткани.

Комплексная предоперационная подготовка пациентов, включающая стоматологическую санацию, оценку соматического состояния, а также моделирование аутотрансплантата, позволяет снизить риск послеоперационных осложнений и ускорить процесс интеграции трансплантата.

Следует отметить, что даже при успешной остеоинтеграции аутотрансплантата значительную роль играют ранняя и систематическая послеоперационная реабилитация, включающая физиотерапию, контроль функциональной нагрузки и обучение пациента правилам ухода за ротовой полостью.

В целом, полученные данные свидетельствуют о высокой эффективности использования аутотрансплантатов для реконструкции дефектов нижней челюсти, при условии строгого соблюдения протокола подготовки, хирургической техники и послеоперационного наблюдения. Результаты исследования могут быть рекомендованы к применению в клинической практике для пациентов с различными типами дефектов нижней челюсти, включая травматические, онкологические и врожденные поражения.

Заключение. Подготовка пациентов с дефектами нижней челюсти является сложной и многоэтапной задачей, требующей комплексного подхода со стороны стоматологов, челюстно-лицевых хирургов, ортопедов и реабилитологов. Использование аутотрансплантатов в восстановительной хирургии нижней челюсти представляет собой один из наиболее эффективных методов, обеспечивающих высокую приживаемость костного трансплантата, минимизацию риска отторжения и создание оптимальных условий для дальнейшей функциональной и эстетической реабилитации пациента.

Проведенный анализ показывает, что подготовительный этап играет решающую роль в успехе операции. Тщательное обследование пациента, включающее клиническую оценку, рентгенологические исследования и компьютерную томографию, позволяет точно определить объем костного дефекта, качество окружающих тканей и выбрать наиболее подходящий донорский участок для аутотрансплантации. Также особое значение имеет оценка соматического состояния пациента, выявление сопутствующих заболеваний и коррекция факторов риска, которые могут повлиять на процесс заживления и приживления трансплантата.

Ключевыми аспектами подготовки являются создание адекватной местной хирургической среды, планирование оптимальной формы и объема трансплантата, а также моделирование будущей функции нижней челюсти, включая восстановление прикуса, жевательной функции и эстетических параметров лица. Использование современных методов трехмерного моделирования и компьютерного планирования позволяет значительно повысить точность хирургических манипуляций и сократить сроки реабилитации.

Особое внимание следует уделять психологической подготовке пациента. Пациенты с дефектами нижней челюсти часто испытывают эмоциональный стресс, страх боли и беспокойство относительно эстетического результата. Психологическая поддержка и информирование пациента о каждом

этапе лечения способствуют снижению тревожности, повышению мотивации и соблюдению рекомендаций после операции, что напрямую отражается на исходе лечения.

Реабилитационные мероприятия после аутотрансплантации, включающие контрольные осмотры, санацию полости рта, физиотерапевтические процедуры и раннее включение функциональных нагрузок, являются неотъемлемой частью успешного восстановления. Комплексный подход позволяет достичь стабильного приживления трансплантата, нормализации функций жевания и речи, а также восстановить гармоничный внешний вид лица.

Таким образом, подготовка пациентов с дефектом нижней челюсти с применением аутотрансплантатов является многоплановым процессом, который требует интеграции современных диагностических, хирургических и реабилитационных технологий, а также междисциплинарного взаимодействия специалистов. Применение системного подхода и индивидуализированных планов лечения обеспечивает высокий уровень эффективности хирургического вмешательства, улучшает качество жизни пациентов и создаёт перспективы для дальнейшего совершенствования методов костной аутотрансплантации в челюстно-лицевой хирургии.

Список литературы:

1. А.Х. Абдуллаев, Хирургия челюстно-лицевой области. Ташкент, Узбекистан: «Медицина», 2019.
2. Б.Б. Султонов и Н.И. Юсупов, Ауто-трансплантация костных блоков при реконструкции нижней челюсти. Ташкент, Узбекистан: «Дент-Пресс», 2021.
3. Т.Я. Рашидов, М.Б. Норматов, Костная пластика в челюстно-лицевой хирургии. Ташкент, Узбекистан: «Шифокор», 2018.
4. Ж.Ж. Мирзаев, “Применение аутотрансплантатов в реконструктивной челюстно-лицевой хирургии,” Журнал челюстно-лицевой хирургии Узбекистана, т. 3, № 1, с. 15–23, 2022.
5. Н.С. Каримова, Оперативное лечение дефектов нижней челюсти. Самарканд, Узбекистан: «Best-publish», 2017.
6. Ф.Р. Рахимов, Д.Ю. Абдулазизов, “Опыт применения аутокости в лечении посттравматических дефектов нижней челюсти,” Российский медицинский журнал, т. 8, № 4, с. 45–50, 2020.
7. С.Ш. Юнусова, М.А. Комилова, Современные методы костной регенерации в стоматологии и челюстно-лицевой хирургии. Ташкент, Узбекистан: «Дент-А», 2021.
8. А.М. Хайруллаев, “Клинико-лабораторные критерии оценки результатов остеопластики нижней челюсти,” Тезисы научной конференции «Актуальные вопросы челюстно-лицевой хирургии», Ташкент, 2019, с. 78–82.
9. Л.В. Петрова, И.Б. Иванова, Костная пластика и ортопедия челюстно-лицевой области. Москва, Россия: «МЕДпресс-информ», 2018.
10. Н.И. Ганиева, “Сравнительная оценка методов челюстно-лицевой реконструкции с использованием аутотрансплантатов,” Вестник хирургии Узбекистана, т. 5, № 2, с. 30–36, 2023.
11. Ш.Х. Абдухакимов, Реконструктивные технологии в челюстно-лицевой хирургии: учебное пособие. Ташкент, Узбекистан: «Университетская книга», 2020.
12. М.С. Турсунов, С.Т. Закиров, “Оценка приживаемости аутотрансплантатов костной ткани нижней челюсти,” Журнал реконструктивной хирургии, т. 4, № 3, с. 52–59, 2021.
13. Д.Р. Эгамов, Р.Ж. Ташмухамедов, Основы челюстно-лицевой хирургии. Бухара, Узбекистан: «Медицина», 2022.
14. Е.В. Смирнова, А.Г. Лебедев, “Микрососудистая аутотрансплантация в реконструкции челюстно-лицевых дефектов,” Хирургия и реконструкция, № 7, с. 14–20, 2019.
15. Ю.М. Зенков, Костная хирургия в практике врача-стоматолога. Санкт-Петербург, Россия: «Питер», 2017.

Для цитирования: Юлдашева Д.О., Хатамов Э.Б. Подготовка пациентов с дефектом нижней челюсти с применением аутотрансплантатов // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 4(24). – С. 493–499. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19589321>

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ В ФОРМИРОВАНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Ирбутаева Л.Т.

Самаркандский государственный медицинский университет, г.Самарканд. Узбекистан

Резюме. Физическое развитие детей в возрасте 10–14 лет характеризуется интенсивным ростом и значительными изменениями в организме. В этот период каждый ребёнок развивается индивидуально, а мышцы и костная система постепенно укрепляются. Одновременно формируются навыки координации движений и физическая ловкость. Именно в этом возрасте многие дети начинают активно заниматься спортом, включая участие в командных видах, что способствует дальнейшему развитию физических и социальных качеств. При выборе вида спорта необходимо учитывать индивидуальные особенности ребёнка: занятия должны приносить удовольствие, чтобы поддерживать мотивацию и способствовать дальнейшему развитию. Несмотря на то что физическое развитие детей, не вовлечённых в спортивную деятельность, изучено достаточно подробно, отсутствует комплексное понимание процессов развития подростков-спортсменов. В частности, мало исследованы потенциальные последствия участия в командных видах спорта и влияние тренировочной нагрузки на их физическое становление.

Ключевые слова: спорт, дети, командные виды спорта, преимущество, тренировочная нагрузка.

THE EFFECTIVENESS OF PHYSICAL ACTIVITY IN THE FORMATION OF PHYSICAL DEVELOPMENT INDICATORS IN CHILDREN OF MIDDLE SCHOOL AGE.

Irbutaeva L.T.

Samarkand state medical university, Samarkand, Uzbekistan

Resume. The physical development of children between the ages of 10 and 14 is a period of intense growth and change. Every child is unique. During this age, muscles and bones become stronger. Children can develop greater motor coordination and physical agility. This is the time when many children begin playing sports or actively participating in team sports. It is important to choose a sport that is right for the individual child. A child should enjoy the sport to be motivated and continue to develop. Although the physical development of children who do not participate in sports is well documented, a comprehensive understanding of the development of adolescent athletes, including the potential effects of team sports participation and training load, is lacking.

Keywords: sport, children, team sports, advantage, training load.

ЎРТА МАКТАБ ЁШИДАГИ БОЛАЛАРДА ЖИСМОНИЙ РИВОЖЛАНИШ КЎРСАТКИЧЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШДА ЖИСМОНИЙ ФАОЛЛИКНИНГ САМАРАДОРЛИГИ.

Ирбутаева Л.Т.

Самарканд давлат тиббиёт университети, Самарканд ш., Ўзбекистон

Резюме. 10-14 ёшдаги болаларнинг жисмоний ривожланиши жадал ўсиш ва танадаги сезиларли ўзгаришлар билан тавсифланади. Бу даврда ҳар бир бола индивидуал ривожланади, мушаклари ва суяк тизими аста-секин кучаяди. Шу билан бирга, мувофиқлаштириш қобилиятлари ва жисмоний чаққонлик ривожланади. Айнан шу ёшда кўплаб болалар спорт билан, жумладан, жамоавий спорт турлари билан фаол шугуллана бошлайдилар, бу жисмоний ва ижтимоий кўникмаларни янада ривожлантиришига ёрдам беради. Спортни танлашда боланинг индивидуал хусусиятларини ҳисобга олиш керак: машғулотлар мотивацияни сақлаб қолиш ва кейинги ривожланишига ёрдам бериш учун ёқимли бўлиши керак. Спорт билан шугулланмайдиган болаларнинг жисмоний ривожланиши ҳар томонлама ўрганилган бўлса-да, ўсмир спортчиларнинг ривожланиши жараёнларини ҳар томонлама тушуниш етарли эмас. Хусусан, жамоавий спорт турлари билан шугулланишининг мумкин бўлган таъсири ва уларнинг жисмоний ривожланишига ўқув юкларининг таъсири етарлича ўрганилмаган.

Калим сўзлар: спорт, болалар, жамоавий спорт турлари, афзаллик, машғулот юки.

e-mail: lola_tulypan@mail.ru

Каждый ребёнок развивается индивидуально, и скорость его физического становления может существенно различаться. Регулярные тренировки, сбалансированное питание и полноценный отдых играют ключевую роль в поддержании и укреплении физического развития подростков, занимающихся командными видами спорта.

Командные виды спорта характеризуются многократными повторениями усилий, варьирующихся от низкой до максимальной интенсивности. В связи с этим спортсменам необходимо обладать способностью аккумулировать значительные запасы силы и мощности, что обеспечивает выполнение прыжков, спринтов, ускорений, смены направления и резких технических действий, таких как удары и броски. Исследования подтверждают, что элитные игроки демонстрируют превосходство над соперниками по ряду физических параметров. В условиях постоянно возрастающих физических требований современного спорта крайне важно, чтобы спортсмены обладали высокоразвитыми физическими показателями, обеспечивающими достижение выдающихся результатов и устойчивое развитие спортивной карьеры. Именно поэтому уровень физических качеств рассматривается как один из ключевых критериев отбора в программы подготовки лучших игроков командных видов спорта.

Для обеспечения долгосрочного развития спортсменов-подростков ключевое значение имеет знание типичных тенденций изменения физических показателей в период подросткового возраста. Такая информация позволяет эффективно отслеживать прогресс, выявлять сильные и слабые стороны, оптимизировать разработку тренировочных программ и оценивать результативность тренировочных вмешательств. Более глубокое понимание факторов, влияющих на процесс развития, способствует индивидуализации тренировочного процесса и повышению его эффективности. В данный период рост и общее развитие организма не выступают основными факторами, определяющими динамику физических показателей. Вместо этого ключевую роль играют такие процессы, как увеличение массы тела и роста, дифференциация мышечных волокон, уровни аденозинтрифосфата и креатинфосфата в состоянии покоя, повышение концентрации андрогенов, а также архитектурные изменения мышечно-сухожильного аппарата. Все эти механизмы способствуют формированию различных физических качеств. Однако влияние тренировочной нагрузки на данные процессы у детей данной возрастной группы остаётся недостаточно изученным и требует дальнейших исследований.

Адаптация к тренировочным нагрузкам у взрослых широко изучена как в контексте развития физических показателей, так и в аспекте профилактики травм. Однако уникальные реакции молодых спортсменов на тренировочные стимулы остаются недостаточно исследованными, что подчёркивает необходимость дальнейших научных изысканий в этой области. Несмотря на наличие обширных данных о физических показателях мальчиков в подростковом возрасте, систематического обзора, который комплексно обобщал бы литературу о спортсменах командных видов спорта и включал бы как мальчиков, так и девочек, в настоящее время не существует. Этот пробел в знаниях является значительным, учитывая, что исследования детей, не занимающихся спортом, последовательно демонстрируют выраженные различия в развитии между полами на ранних и поздних стадиях подросткового периода.

Результаты исследований среди детей, не занимающихся спортом, показывают, что мальчики, как правило, демонстрируют большее улучшение физических показателей в подростковом возрасте, в то время как девочки часто достигают лучших показателей вскоре после полового созревания; обычно в возрасте 13–15 лет. Эти различия могут быть объяснены, среди прочего, более длительными и мощными процессами развития и взросления, влияющими на физическое развитие мальчиков. Однако остается неясным, справедливы ли эти закономерности для спортсменов, занимающихся командными видами спорта. Если спортсмены командных видов спорта следуют схожим траекториям развития, их естественное развитие может замедлиться в позднем подростковом возрасте. Это может подчеркнуть необходимость более целенаправленной программы физической подготовки, чтобы адекватно подготовить их к требованиям старшего звена. Таким образом, основной целью этого систематического обзора было изучение развития физических показателей в подростковом возрасте у спортсменов командных видов спорта как у мальчиков, так и у девочек.

Также исследовалось влияние тренировочной нагрузки на развитие физических качеств. Независимо друг от друга, двумя основными рецензентами были оценены состояния с использованием «инструмента оценки качества для наблюдательных когортных и перекрестных исследований», разработанного Национальным институтом сердца, легких и крови (NHLB, 2021). В процессе отбора и анализа исследований некоторые вопросы были изменены, а часть исключена ввиду их неактуальности. Возникшие расхождения или конфликты решались посредством обсуждения, либо с привлечением третьего рецензента в случаях, когда согласие не удавалось достичь. Поскольку в обзор были включены как поперечные, так и продольные исследования, следует отметить, что отдельные вопро-

сы (например, 7 и 13) относились исключительно к продольным дизайнам. Это различие обусловило потенциальное начисление до семи баллов для поперечных исследований и до девяти баллов для продольных.

Все данные были проанализированы с использованием описательной статистики и представлены в виде годовых различий между возрастными группами. Для анализа были выбраны следующие тесты для каждой физической характеристики, поскольку они являются наиболее часто используемыми:

- Спринт: 10 и 30 м.
- Вертикальный прыжок: прыжок против хода движений.
- Прерывистая выносливость; Тесты YYIR – это простой метод проверки способности спортсмена выполнять повторяющиеся высокоинтенсивные упражнения и многоступенчатое испытание на дистанции 20 м.

- Способность изменения направления: ловкость - челночный бег 10 м x 5 м и челночный бег 5 м x 10 м.

- Сила верхней части тела: захват.

- Сила нижней части тела: большое разнообразие тестов на силу нижней части тела во включенных исследованиях привело к необходимости включения нескольких разных тестов. Интересно отметить, что у девочек, не занимающихся спортом, обычно наблюдается снижение максимальной скорости потребления кислорода (VO_{2max}) при физической нагрузке примерно в возрасте 14–15 лет. Однако результаты одного исследования показали, что показатели периодической выносливости продолжают улучшаться до 16 лет, аналогично мальчикам. Эти данные согласуются с наблюдениями Тённессен и соавт. (2015), которые сообщили о росте результатов девочек в лёгкой атлетике на дистанции 800 м даже до 18 лет. Интересно отметить, что у девочек, не занимающихся спортом, обычно наблюдается снижение максимальной скорости потребления кислорода (VO_{2max}) при физической нагрузке примерно в возрасте 14–15 лет. Однако результаты одного исследования показали, что показатели периодической выносливости продолжают улучшаться до 16 лет, аналогично мальчикам. Эти данные согласуются с наблюдениями Тённессен и соавт. (2015), которые сообщили о росте результатов девочек в лёгкой атлетике на дистанции 800 м даже до 18 лет.

Различия в результатах могут быть связаны с особенностями применяемых тестов. Недавнее исследование Ландграффа и соавт. показало, что в подростковом возрасте наблюдаются расхождения между динамикой максимальной скорости потребления кислорода (VO_{2max}) и показателями выносливости: производительность продолжала улучшаться, тогда как значения VO_{2max} при физической нагрузке оставались неизменными. Учитывая, что тесты YYIR1 и многоэтапный фитнес-тест, рассмотренные в данном обзоре, основаны на показателях производительности (то есть зависят от совокупности физических характеристик), это может объяснять выявленные различия между развитием VO_{2max} у детей, не занимающихся спортом, и показателями выносливости у спортсменов. Таким образом, на уровень производительности влияют не только значения VO_{2max} , но и дополнительные факторы, включая специфическую адаптацию мышечной системы, которая может быть более восприимчива к тренировочным воздействиям.

В данном обзоре было отмечено постепенное улучшение большинства физических показателей у подростков, занимающихся командными видами спорта, как у девочек, так и у мальчиков, что в значительной степени связано с процессами роста и развития. В раннем подростковом возрасте наблюдается стабильное и быстрое развитие, однако к позднему подростковому периоду оно, по-видимому, замедляется. Девочки демонстрируют более медленные темпы развития по сравнению с мальчиками, что может быть объяснено различиями в биологическом созревании: мальчики получают преимущество благодаря большему увеличению уровня тестостерона и удлинению конечностей. Несмотря на то что группы в данном обзоре были структурированы по хронологическому возрасту, использование показателей биологического возраста могло бы предоставить дополнительную информацию для более глубокого понимания роли созревания в физическом развитии подростков-спортсменов. Будущие исследования следует направить на включение показателей взросления, чтобы обеспечить более точное представление о влиянии процессов созревания на продольное развитие физических характеристик у спортсменов командных видов спорта. Учитывая ограниченность исследований, посвящённых влиянию тренировочной нагрузки и участия в командных видах спорта на долгосрочное физическое развитие подростков, окончательные выводы о характере этих воздействий сделать затруднительно.

Для углубления понимания данной темы будущие исследования должны включать комплексные измерения тренировочной нагрузки при анализе изменений физических показателей у спортсменов-подростков, занимающихся командными дисциплинами.

Список литературы:

1. Ёкутхон К. Особенности питательного статуса у подростков, занимающихся различными видами спортивной деятельности //Журнал биомедицины и практики. – 2022. – Т. 7. – №. 5.
2. Худойкулова Ф. В. и др. Строеие, возрастные особенности и функции гормонов. педагог, 1 (5), 681-688. – 2023.
3. Ирбутаева Л.Т. Features of Physical Development of Children 10-14 Years Old, Involved and Not Involved in Sports Best journal of innovation in science, research and development, 3 (2), 247-251.- 2024
4. Irbutayeva Lola Tashbekovna. Bioimpedansometry Parameters for Schoolchildren Involved in Sports Sections Best journal of innovation in science, research and development, 3 (2), 243-246.- 2024
5. Мавлянова З. Ф., Махмудов С. М., Тохтиев Ж. Б. Морфофункциональный статус и динамика физической подготовленности лиц, занимающихся национальным видом спорта кураш //журнал биомедицины и практики. – 2022. – Т. 7. – №. 1.
6. Мамашарифович М. С. Функциональное состояние кардиореспираторной системы спортсменов, занимающихся плаванием //Янги узбекистонда миллий тараккият ва инновасиялар. – 2022. – С. 313-317.
7. Матмуродов Р. Ж., Умирова С. М. Результаты применения комбилепена табса в лечении диабетической полинейропатии у лиц молодого возраста //Journal of cardiorespiratory research. № SI-1. – 2021.
8. Бурханова Г., Мавлянова З., Ким О. Влияние спортивного питания на физическое развитие детей и подростков с повышенной физической нагрузкой //Журнал проблемы биологии и медицины. – 2017. – №. 4 (97). – С. 24-26.
9. Камилова Р. Т. и др. Оценка влияния систематических занятий волейболом на соматотипологические особенности организма //Вестник Казахского национального медицинского университета. – 2016. – №. 4. – С. 212-218.
10. Камалова Ё. Изучение темперамента спортсменов занимающихся футболом и баскетболом //Журнал биомедицины и практики. – 2021. – Т. 1. – №. 1. – С. 276-280.
11. Матмуродов Р. Ж., Умирова С. М. Коронавирус инфекциясининг диабетик полинейропатия ривожланишидаги роли ва унинг комплемент тизимидаги таъсири //Тошкент-2021. Биомедицина ва амалиёт журнали. – Т. 6.
12. Бурханова Г., Ким О. Оценка физической работоспособности юных спортсменов с повышенными физическими нагрузками //Журнал вестник врача. – 2018. – Т. 1. – №. 2. – С. 25-28.
13. Баратова С., Ким О., Мавлянова З. Оценка антропометрических показателей и гармоничности физического развития спортсменок //Журнал вестник врача. – 2019. – Т. 1. – №. 4. – С. 40-42.
14. Савард К., Халс М., Моррис Дж.Г., Готто Х., Сандерленд К., Невилл М.Э. Продольное физическое развитие будущих профессиональных футболистов мужского пола: значение для выявления и развития талантов? Front Sports Act Living. 2020;2.
15. Зив Г., Лидор Р. Физические характеристики, физиологические характеристики и поведение гандболистов на площадке: обзор. Eur J Sport Sci. 2009;9(6):375–86.
16. Лотурко И., Бишоп С., Фрейтас Т.Т., Перейра Л.А., Джеффрис И. Производство вертикальной силы в футболе: механические аспекты и прикладные стратегии обучения. Strength Cond J. 2020;42(2):6–15.
17. Вэнь Н., Далбо В.Дж., Бургос Б., Пайн Д.Б., Сканлан А.Т. Силовое тестирование в баскетболе: текущая практика и будущие рекомендации. J Сила Конд Рез. 2018;32(9):2677–91
18. Базна-Райя А., Сориано-Мальдонадо А., Родригес-Перес М.А., Гарсиа-Де-Алькарас А., Ортега-Бесерра М., Хименес-Рейес П. и др. Профиль сила-скорость как определяющий фактор скорости подачи и подачи мяча у волейболистов-мужчин высшего уровня. ПЛОС Один. 2021;16(4):249612.
19. Ребело А., Брито Дж., и др. Антропометрические характеристики, физическая подготовленность и технические характеристики футболистов до 19 лет в зависимости от соревновательного уровня и позиции на поле. Int J Sports Med. 2013;34(4):312–7.

Для цитирования: Ирбутаева Л.Т. Эффективность двигательной активности в формировании показателей физического развития детей среднего школьного возраста // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 4(24). – С. 500–503. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19589475>

КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗЛИЧНЫХ КЛИНИЧЕСКИХ ФОРМ КРАСНОГО ПЛОСКОГО ЛИШАЯ**Абдуллаев Х.Д.**

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Актуальность. Красный плоский лишай относится к хроническим иммуновоспалительным дерматозам, характеризующимся клиническим полиморфизмом, рецидивирующим течением и трудностями дифференциальной диагностики. Цель исследования — изучить клинимоρφологические особенности различных клинических форм красного плоского лишая. Обследованы 78 пациентов с клинически и морфологически верифицированным красным плоским лишаем, разделённых на 4 группы: с типичной, гипертрофической, экссудативно-гиперемической и пигментной формами заболевания. Всем больным проводили клиническое обследование и гистологическое исследование биоптатов кожи с оценкой основных морфологических изменений. Установлено, что различные клинические формы красного плоского лишая отличаются по характеру клинических проявлений и степени выраженности морфологических изменений кожи. Типичная форма сопровождалась классической лихеноидной картиной, гипертрофическая — выраженными гиперкератотическими и акантотическими изменениями, экссудативно-гиперемическая — преобладанием воспалительно-сосудистого компонента, пигментная — выраженной пигментной инконтиненцией. Показано, что комплексный клинимоρφологический подход повышает точность диагностики и позволяет обосновать дифференцированную лечебную тактику.

Ключевые слова: красный плоский лишай, клинические формы, морфологические особенности, диагностика, гистология.

CLINICAL AND MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF VARIOUS CLINICAL FORMS OF FLAT RED SKIN**Abdullayev X.D.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Relevance. Lichen planus refers to chronic immuno-inflammatory dermatoses characterized by clinical polymorphism, recurrent course, and difficulties in differential diagnosis. The aim of the study is to study the clinical and morphological features of various clinical forms of scarlet fever. 78 patients with clinically and morphologically verified flat red fever were examined, divided into 4 groups: typical, hypertrophic, exudative-hyperemic, and pigmented forms of the disease. All patients underwent a clinical examination and histological examination of skin biopsies, assessing the main morphological changes. It has been established that various clinical forms of scarlet fever differ in the nature of clinical manifestations and the degree of severity of morphological changes in the skin. The typical form was accompanied by a classic lichenoid picture, hypertrophic - pronounced hyperkeratotic and acanthotic changes, exudative-hyperemic - predominance of the inflammatory-vascular component, pigmentary - pronounced pigmentary incontinence. It has been shown that a comprehensive clinical and morphological approach increases diagnostic accuracy and allows for the justification of differentiated treatment tactics.

Keywords: red flat leprosy, clinical forms, morphological features, diagnosis, histology.

ҚИЗИЛ ЯССИ ТЕМИРАТКИНИНГ ТУРЛИ КЛИНИК ШАКЛЛАРИНИНГ КЛИНИК-МОРФОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ.**Абдуллаев Х.Д.**

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Долзарблиги. Қизил ясси темиратки сурункали иммун яллигланиш дерматозларига мансуб бўлиб, клиник полиморфизм, қайталанувчи кечии ва қиёсий таъхислаш қийинчиликлари билан кечади. Тадқиқотнинг мақсади қизил ясси темираткининг турли клиник шаклларининг клиник-морфологик хусусиятларини ўрганишдан иборат. Клиник ва морфологик жиҳатдан тасдиқланган қизил ясси темиратки билан оғриган 78 нафар бемор текиширилди, улар 4 гуруҳга бўлинди: касалликнинг типик, гипертрофик, экссудатив-гиперемик ва пигментли шакллари. Барча беморларда асосий морфологик ўзгаришларни баҳолаш билан клиник текиширув ва тери биоптатларининг гистологик текишируви ўтказилди. Қизил ясси темираткининг турли клиник шакллари клиник кўринишларнинг

табиати ва теридаги морфологик ўзгаришларнинг ифодаланиш даражаси билан фарқ қилиши аниқланди. Типик шакли классик лихеноид манзара, гипертрофик - яққол гиперкератотик ва акантотик ўзгаришлар, экссудатив-гиперемик - яллиғланиш-томир компонентининг устунлиги, пигментли - яққол пигментли инконтиненсия билан кечган. Комплекс клиник-морфологик ёндашув диагностика аниқлигини ошириши ва дифференциал даволаш тактикасини асослаш имконини бериши кўрсатилган.

Калит сўзлар: қизил ясси темиртки, клиник шакллари, морфологик хусусиятлари, диагностикаси, гистологияси.

Введение: Красный плоский лишай (КПЛ) относится к хроническим иммуновоспалительным дерматозам, характеризующимся поражением кожи, слизистых оболочек, ногтей и волосяных фолликулов, клиническим полиморфизмом, склонностью к рецидивирующему течению и существенным снижением качества жизни пациентов. В современной литературе КПЛ рассматривается как Т-клеточно-опосредованное воспалительное заболевание, в развитии которого важную роль играют цитотоксические иммунные реакции, направленные против базальных кератиноцитов, а также нарушения взаимодействия между эпидермисом и дермой [1–4]. Эти данные подтверждаются современными обзорами и клинко-морфологическими исследованиями, где подчеркивается иммунный характер заболевания и его выраженная клиническая гетерогенность.

Особый интерес представляет многообразие клинических форм КПЛ. Наряду с типичной папулёзной формой, в дерматологической практике встречаются гипертрофическая, пигментная, атрофическая, буллёзная, фолликулярная, эрозивно-язвенная и другие варианты заболевания [3, 5, 6]. Каждая из этих форм имеет собственные особенности клинической картины, локализации, длительности течения и выраженности субъективной симптоматики. Именно клинический полиморфизм нередко затрудняет своевременную диагностику и требует углублённого сопоставления объективных проявлений болезни с морфологической картиной поражённой кожи. Это особенно важно при атипичных вариантах КПЛ, которые могут имитировать другие папулосквамозные и лихеноидные дерматозы.

Морфологическое исследование кожи сохраняет ключевое значение в подтверждении диагноза КПЛ. Наиболее типичными гистологическими признаками заболевания считаются гиперкератоз, гипергранулёз, акантоз, вакуольная дегенерация клеток базального слоя, наличие коллоидных телец и полосовидный лимфоцитарный инфильтрат в области дермоэпидермального соединения [2, 4, 7]. Вместе с тем степень выраженности этих признаков может существенно варьировать в зависимости от клинической формы заболевания, длительности его течения и активности воспалительного процесса. По данным современных наблюдений, при гипертрофических вариантах преобладают признаки выраженной эпидермальной гиперплазии и гиперкератоза, тогда как при пигментных формах более заметны явления базального повреждения и пигментной инконтиненции [7–9].

В последние годы интерес к изучению клинко-морфологических особенностей КПЛ значительно возрос в связи с необходимостью более точной стратификации клинических вариантов заболевания, совершенствования дифференциальной диагностики и выбора персонализированной терапии [1, 4, 10]. Современные обзоры указывают, что углублённое понимание морфологических паттернов КПЛ имеет не только диагностическое, но и патогенетическое значение, поскольку позволяет точнее интерпретировать активность иммуновоспалительного процесса и оценивать возможные терапевтические мишени [1, 4]. Однако, несмотря на имеющиеся публикации, вопросы сопоставления клинических вариантов КПЛ с их морфологическими особенностями остаются недостаточно систематизированными, особенно применительно к рутинной дерматовенерологической практике.

Таким образом, изучение клинко-морфологических особенностей различных клинических форм красного плоского лишая представляет несомненный научный и практический интерес. Выявление специфических морфологических признаков, ассоциированных с отдельными вариантами заболевания, позволит повысить точность диагностики, улучшить дифференциально-диагностический подход и обосновать более рациональную лечебную тактику. На этом основании настоящее исследование направлено на комплексную оценку клинических и морфологических характеристик различных форм КПЛ.

Цель исследования: изучить клинко-морфологические особенности различных клинических форм красного плоского лишая и определить наиболее значимые клинко-диагностические и морфологические критерии, характеризующие особенности течения и активности патологического процесса.

Материалы и методы исследования: Исследование проведено на базе специализированного дерматовенерологического отделения. Обследованы 78 пациентов с клинически и морфологически

верифицированным красным плоским лишаем в возрасте от 19 до 67 лет (средний возраст — $44,1 \pm 1,8$ года), из них 45 женщин и 33 мужчины. Контрольную группу составили 20 практически здоровых лиц, сопоставимых по полу и возрасту.

В зависимости от клинической формы заболевания пациенты были распределены на 4 группы: с типичной формой — 28 больных, гипертрофической — 17, экссудативно-гиперемической — 15, пигментной — 18.

Критериями включения являлись клинически подтверждённый красный плоский лишай, возраст старше 18 лет и информированное согласие пациента. Критериями исключения служили тяжёлая сопутствующая соматическая патология в стадии декомпенсации, острые инфекции, онкологические и активные аутоиммунные заболевания, беременность, а также системная иммуносупрессивная терапия менее чем за 4 недели до исследования.

Всем пациентам проводили клиническое обследование с оценкой жалоб, анамнеза, локализации и распространённости высыпаний, а также характера морфологических элементов. Для морфологической верификации выполняли биопсию кожи из очагов поражения. Гистологические препараты окрашивали гематоксилином и эозином. Оценивали выраженность гиперкератоза, гранулёза, акантоза, вакуольной дегенерации базального слоя, воспалительного инфильтрата, сосудистых изменений, отёка дермы и пигментной инконтиненции.

Степень морфологических изменений определяли полуколичественно по трёхбалльной шкале. Статистическую обработку данных проводили с использованием вариационной статистики с вычислением средней величины (M) и стандартной ошибки (m). Достоверность различий определяли по критерию Стьюдента при $p < 0,05$.

Результаты исследования: В ходе исследования установлено, что клиническое течение красного плоского лишая характеризовалось выраженным полиморфизмом проявлений в зависимости от формы заболевания. Наиболее часто наблюдалась типичная форма, выявленная у 28 (35,9%) пациентов. Она проявлялась множественными плоскими полигональными папулами розовато-фиолетового цвета с блестящей поверхностью, умеренной инфильтрацией и склонностью к группировке. Наиболее частой локализацией высыпаний были сгибательные поверхности предплечий, область лучезапястных суставов, поясничная область и передняя поверхность голеней. У большинства пациентов этой группы отмечался зуд умеренной интенсивности.

Гипертрофическая форма красного плоского лишая диагностирована у 17 (21,8%) больных. Для данной формы были характерны плотные инфильтрированные бляшки буровато-красного цвета с выраженным гиперкератозом, шероховатой поверхностью и явлениями лихенификации. Очаги чаще локализовались на голених и сопровождалась наиболее интенсивным зудом. У больных этой группы заболевание отличалось более длительным и торпидным течением по сравнению с другими клиническими вариантами.

Экссудативно-гиперемическая форма выявлена у 15 (19,2%) пациентов и характеризовалась яркой воспалительной окраской очагов, выраженной гиперемией, отёчностью тканей и наличием признаков экссудации. У части больных наблюдались расчёсы и вторичные экскориации, обусловленные выраженными субъективными ощущениями зуда и жжения. Высыпания чаще локализовались на коже туловища и конечностей.

Пигментная форма красного плоского лишая установлена у 18 (23,1%) больных. Её отличительной особенностью было наличие очаговой или диффузной гиперпигментации коричневого и серо-коричневого оттенка, иногда в сочетании с малозаметными папулёзными элементами. Чаще поражались кожа туловища, шеи, подмышечные области и сгибательные поверхности конечностей. Субъективные жалобы в данной группе были менее выражены, чем у пациентов с гипертрофической и экссудативно-гиперемической формами.

Морфологическое исследование показало, что у пациентов с типичной формой красного плоского лишая преобладали классические гистологические признаки заболевания: компактный гиперкератоз, очаговый гипергранулёз, неравномерный акантоз, вакуольная дегенерация клеток базального слоя и полосовидный лимфогистиоцитарный инфильтрат в верхних отделах дермы. Эти изменения соответствовали традиционной морфологической картине лихеноидного воспаления.

При гипертрофической форме наиболее выраженными оказались признаки хронической эпидермальной пролиферации. Морфологически определялись резко выраженный гиперкератоз и акантоз, удлинение эпидермальных выростов, массивные роговые наслоения и плотный воспалительный инфильтрат в сосочковом слое дермы. У части больных отмечались признаки умеренной пигментной инконтиненции. Данные изменения отражали хроническое и упорное течение патологического процесса.

У пациентов с экссудативно-гиперемической формой преобладали признаки активного воспаления. Морфологическая картина включала выраженную вакуольную дегенерацию базального слоя, расширение сосудов сосочкового слоя дермы, периваскулярные воспалительные инфильтраты и интерстициальный отёк. В отдельных случаях выявлялись признаки частичной дезорганизации дермо-эпидермального соединения, что указывало на высокую активность воспалительного процесса.

Пигментная форма характеризовалась преобладанием морфологических признаков нарушения пигментного обмена. Наиболее типичными были выраженная пигментная инконтиненция, наличие меланофагов в верхних отделах дермы и очаговое повреждение клеток базального слоя. При этом гиперкератоз и акантоз были выражены слабее, чем при гипертрофической форме, а воспалительный инфильтрат сохранял умеренный полосовидный характер.

Сравнительный анализ показал, что каждая клиническая форма красного плоского лишая имела определённые клинко-морфологические особенности. Для типичной формы были характерны классические папулёзные элементы и стандартная лихеноидная морфологическая картина; для гипертрофической — выраженные гиперкератотические и акантотические изменения; для экссудативно-гиперемической — преобладание сосудисто-воспалительного компонента; для пигментной — доминирование пигментной инконтиненции и дисхромических нарушений.

Таким образом, результаты исследования показали, что клинические формы красного плоского лишая различаются не только по внешним проявлениям, но и по глубине и характеру морфологических изменений кожи. Выявленные особенности имеют важное значение для уточнения клинического варианта заболевания, повышения точности диагностики и выбора дифференцированной лечебной тактики.

Выводы: Проведённое исследование показало, что красный плоский лишай характеризуется выраженным клиническим и морфологическим полиморфизмом, а различные его клинические формы имеют специфические особенности течения и тканевых изменений. Типичная форма сопровождается классической лихеноидной морфологической картиной, гипертрофическая — выраженными гиперкератотическими и акантотическими изменениями, экссудативно-гиперемическая — преобладанием активного воспалительно-сосудистого компонента, а пигментная — значительной пигментной инконтиненцией и дисхромическими нарушениями. Это подтверждает, что клиническая форма заболевания тесно связана с характером морфологических изменений кожи.

Установлено, что морфологическое исследование кожи имеет важное диагностическое значение при красном плоском лишае, особенно при атипичных и клинически сходных вариантах заболевания. Сопоставление данных клинического осмотра с результатами гистологического анализа позволяет более точно верифицировать форму дерматоза, оценить активность патологического процесса и провести дифференциальную диагностику с другими хроническими воспалительными и папулоквамозными заболеваниями кожи. Выявленные клинко-морфологические закономерности расширяют представления о патогенетических особенностях заболевания и его вариантах.

Таким образом, комплексный клинко-морфологический подход к оценке различных клинических форм красного плоского лишая способствует повышению точности диагностики и обоснованию дифференцированной лечебной тактики. Полученные результаты могут быть использованы в практической дерматовенерологии для улучшения диагностики заболевания, уточнения характера его течения и выбора наиболее рациональных методов наблюдения и терапии у данной категории пациентов.

Список литературы:

1. Tekin B., Xie F., Lehman J.S. Lichen Planus: What is New in Diagnosis and Treatment? *American Journal of Clinical Dermatology*. 2024;25(5):747–761. doi:10.1007/s40257-024-00878-9.
2. Pathave H.S., Nikam V., Dongre A., Khopkar U. A Retrospective Study of Skin Biopsies of 184 Cutaneous Lichen Planus Patients. *Turkish Journal of Dermatology*. 2022;16(2):38–43. doi:10.4274/tjd.galenos.2021.11621.
3. Gorouhi F., Davari P., Fazel N. Cutaneous and mucosal lichen planus: a comprehensive review of clinical subtypes, risk factors, diagnosis, and prognosis. *The Scientific World Journal*. 2014;2014:742826. doi:10.1155/2014/742826.
4. Alarcón I., González-Cantero Á., De Las Heras E., Daudén E. Overview of lichen planus pathogenesis and review of possible future therapies. *JAAD Reviews*. 2025;3(2). doi:10.1016/j.jadr.2025.100043.
5. Wagner G., Rose C., Sachse M.M. Clinical variants of lichen planus. *Journal der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft*. 2013;11(4):309–319. doi:10.1111/ddg.12031.
6. Dalmau J., Carrozzo M., Gaeta G.M., et al. Oral Lichen Planus: An Update on Diagnosis and Management. *American Journal of Clinical*

Dermatology. 2023;24(6):859–878.
doi:10.1007/s40257-023-00814-3.

7. Poudel J. A histopathological study of lichen planus and variants. Journal of Pathology of Nepal. 2025;15(1):2266–2271.
doi:10.3126/jpn.v15i1.71354.

8. Dixit S., Jain P., Jain S., Sardana K., Chugh S., Bansal S. Introducing a novel histopathological scoring system to assess disease activity and chronicity in cutaneous lichen planus: A proposal. Journal of Cutaneous Pathology. 2023;50(10):843–850. doi:10.1111/cup.14478.

9. Arora S.K., Chhabra S., Saikia U.N., Dogra S., Minz R.W. Lichen planus: A clinical and immuno-histological analysis. Indian Journal of Dermatology. 2014;59(3):257–261.
doi:10.4103/0019-5154.131389.

10. Vičić M., Kaštelan M., Brajac I., et al. Comprehensive Insight into Lichen Planus Immunopathogenesis. International Journal of Molecular Sciences. 2023;24(3):3038.
doi:10.3390/ijms24033038.

Для цитирования: Абдуллаев Х.Д. Клинико-морфологические особенности различных клинических форм красного плоского лишая // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 4(24). – С. 504–508 doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19589566>

КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИНФЕКЦИОННЫХ ДЕРМАТОЗОВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ**Нарзикулов Р.М.¹, Пак У.И.²**¹Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан²Самаркандский областной филиал Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра дерматовенерологии и косметологии, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Актуальность. Инфекционные дерматозы остаются актуальной проблемой современной дерматовенерологии в связи с высокой распространённостью и контагиозностью. Цель исследования. Изучить клинико-эпидемиологические особенности инфекционных дерматозов в современных условиях, определить структуру заболеваемости, факторы риска и особенности клинического течения. Материалы и методы. Обследованы 86 пациентов с инфекционными дерматозами в возрасте от 18 до 65 лет. Применялись клинико-anamnestический, дерматологический, лабораторный и статистический методы исследования. Диагноз верифицировали с использованием микроскопических, бактериологических и стандартных клинико-лабораторных методов. Результаты. Установлено, что в структуре инфекционных дерматозов преобладали грибковые формы (45,3%), бактериальные составили 31,4%, паразитарные — 23,3%. Наиболее часто заболевания встречались у лиц молодого и среднего возраста. Основными факторами риска были несоблюдение личной гигиены, тесные бытовые контакты, сопутствующая соматическая патология и самолечение. Для инфекционных дерматозов были характерны клинический полиморфизм, стёртые формы и склонность к рецидивированию. Заключение. Инфекционные дерматозы сохраняют высокую клинико-эпидемиологическую значимость и требуют совершенствования ранней диагностики, профилактики и комплексного подхода к лечению.

Ключевые слова: инфекционные дерматозы, эпидемиология, клиника, факторы риска.

CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL FEATURES OF INFECTIOUS DERMATOSES IN MODERN CONDITIONS**Narzikulov R.M.¹, Pak U.I.²**¹Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan²Samarkand Regional Branch of the Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Dermatovenereology and Cosmetology, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Relevance. Infectious dermatoses remain a pressing problem in modern dermatovenereology due to their high prevalence and contagiousness. Purpose of the research. To study the clinical and epidemiological features of infectious dermatoses in modern conditions, to determine the structure of morbidity, risk factors, and clinical course features. Materials and methods. 86 patients with infectious dermatoses aged 18 to 65 years were examined. Clinical-anamnetic, dermatological, laboratory, and statistical research methods were used. The diagnosis was verified using microscopic, bacteriological, and standard clinical and laboratory methods. Results. It was established that fungal forms predominated in the structure of infectious dermatoses (45.3%), bacterial forms constituted 31.4%, and parasitic forms - 23.3%. The most common diseases were found in young and middle-aged individuals. The main risk factors were poor personal hygiene, close household contacts, concomitant somatic pathology, and self-treatment. For infectious dermatoses, clinical polymorphism, blurred forms, and a tendency to recurrence were characteristic. Conclusion. Infectious dermatoses retain their high clinical and epidemiological significance and require improved early diagnosis, prevention, and a comprehensive treatment approach.

Keywords: infectious dermatoses, epidemiology, clinical presentation, risk factors.

ЗАМОНАВИЙ ШАРОИТДА ИНФЕКЦИОН ДЕРМАТОЗЛАРИНИНГ КЛИНИК-ЭПИДЕМИОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ.**Нарзикулов Р.М.¹, Пак У.И.²**¹Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон²Республика ихтисослаштирилган дерматовенерология ва косметология илмий-амалий тиббиёт марказининг Самарқанд вилояти филиали, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Долзарблиги. Юқумли дерматозлар юқори тарқалганлиги ва юқумлилиги туфайли за-

монавий дерматовенерологиянинг долзарб муаммоси бўлиб қолмоқда. Уларнинг тарқалишига ижтимоий-гигиеник, миграцион ва коморбид омиллар таъсир кўрсатади. Тадқиқотнинг мақсади. Замонавий шароитда инфекцион дерматозларнинг клиник-эпидемиологик хусусиятларини ўрганиш, касалланиш структураси, хавф омиллари ва клиник кечиш хусусиятларини аниқлаш. Материалы и методы. Юқумли дерматозлар билан касалланган 18 ёшдан 65 ёшгача бўлган 86 нафар бемор текширилди. Тадқиқотда клиник-анамнестик, дерматологик, лаборатор ва статистик усуллардан фойдаланилган. Таххис микроскопик, бактериологик ва стандарт клиник-лаборатор усуллар ёрдамида тасдиқланди. Натижалар. Аниқланишича, инфекцион дерматозлар структурасида замбуруғли шакллар устунлик қилган (45,3%), бактериал шакллар 31,4%, паразитар шакллар 23,3%. Касалликлар кўпинча ёш ва ўрта ёшдаги шахсларда учраган. Асосий хавф омиллари шахсий гигиенага риоя қилмаслик, яқин маиший алоқалар, ҳамроҳ соматик патология ва ўз-ўзини даволаш эди. Юқумли дерматозлар учун клиник полиморфизм, ўчирилган шакллар ва қайталанишга мойиллик хос бўлган. Хулоса. Юқумли дерматозлар юқори клиник-эпидемиологик аҳамиятини сақлаб қолмоқда ва эрта таххислаш, олдини олиш ва даволашга комплекс ёндашувни такомиллаштиришни талаб қилади.

Калит сўзлар: инфекцион дерматозлар, эпидемиология, клиникаси, хавф омиллари, диагностикаси.

Введение: Инфекционные дерматозы остаются одной из наиболее актуальных проблем современной дерматовенерологии ввиду их широкой распространённости, контагиозности, клинического полиморфизма и склонности к затяжному или рецидивирующему течению. В структуре заболеваний кожи существенное место занимают бактериальные, грибковые и паразитарные поражения, которые встречаются в различных возрастных группах и нередко приобретают важное медико-социальное значение [1–4]. По данным Всемирной организации здравоохранения, дерматофитии относятся к числу наиболее распространённых грибковых заболеваний кожи, а чесотка продолжает оставаться значимой глобальной проблемой общественного здравоохранения [1, 2].

В современных условиях эпидемиология инфекционных дерматозов претерпевает определённые изменения под влиянием урбанизации, миграционных процессов, скученности проживания, изменения санитарно-гигиенических условий, роста числа пациентов с иммунокомпрометированными состояниями, сахарным диабетом, ожирением и другими хроническими заболеваниями [3, 5, 6]. Дополнительное значение имеют бесконтрольное применение антибактериальных и наружных комбинированных препаратов, а также нарастающая проблема устойчивости возбудителей к противомикробной терапии [5, 7].

Особое место в структуре инфекционных дерматозов занимают поверхностные микозы, которые, по современным оценкам, формируют значительную долю всех грибковых поражений кожи. Согласно данным ВОЗ, ringworm (tinea) составляет примерно половину из ориентировочно 650 миллионов грибковых инфекций кожи в мире [1]. Современные обзоры подчёркивают, что инфекции, вызванные дерматофитами, остаются наиболее распространёнными грибковыми заболеваниями человека и всё чаще сопровождаются изменением клинических проявлений и ростом антифунгальной резистентности [5, 7, 8].

Не менее важную группу составляют бактериальные дерматозы, прежде всего импетиго и другие пиодермии. По данным CDC, импетиго представляет собой распространённую поверхностную бактериальную инфекцию кожи, вызываемую преимущественно *Staphylococcus aureus* и *Streptococcus pyogenes* [9, 10]. В клинической практике бактериальные дерматозы сохраняют высокую частоту, особенно у детей, лиц с микротравмами кожи, нарушением кожного барьера и неблагоприятными гигиеническими условиями [9–11].

Чесотка также сохраняет высокую эпидемиологическую значимость. ВОЗ указывает, что в любой момент времени чесоткой поражены более 200 миллионов человек в мире [2]. Современные систематические обзоры показывают выраженную вариабельность распространённости чесотки в различных регионах, а её рост тесно связан с социально-экономическими трудностями, скученностью, миграцией, вынужденным переселением и ограниченным доступом к медицинской помощи [2, 4, 12].

Следует отметить, что современные инфекционные дерматозы нередко отличаются атипичным или стёртым течением. Самолечение, нерациональное использование топических кортикостероидов и комбинированных препаратов, а также наличие сопутствующей соматической патологии могут изменять классическую клиническую картину, затрудняя своевременную диагностику [5, 7, 8]. На этом фоне возрастает значение комплексной клинико-эпидемиологической оценки инфекционных поражений кожи, направленной на выявление факторов риска, особенностей течения и причин хронизации процесса [5, 6, 8].

Таким образом, высокая распространённость инфекционных дерматозов, изменчивость их клинической картины, влияние современных социальных и медицинских факторов на эпидемиологию заболевания, а также необходимость совершенствования ранней диагностики и профилактики определяют актуальность изучения клинико-эпидемиологических особенностей инфекционных дерматозов в современных условиях.

Цель исследования: изучить клинико-эпидемиологические особенности инфекционных дерматозов в современных условиях, определить структуру заболеваемости, основные факторы риска, характер клинического течения и наиболее значимые тенденции их распространения.

Материалы и методы исследования: Исследование выполнено в формате открытого клинико-эпидемиологического наблюдательного исследования на базе специализированного дерматовенерологического отделения. В исследование были включены 86 пациентов с инфекционными дерматозами, находившихся на амбулаторном и стационарном обследовании и лечении в современный период наблюдения.

В зависимости от нозологической формы все обследованные были распределены на 3 основные группы: пациенты с бактериальными дерматозами, пациенты с грибковыми дерматозами и пациенты с паразитарными дерматозами. Возраст больных составил от 18 до 65 лет. Среди обследованных были лица обоего пола. Отбор пациентов проводили на основании клинических и анамнестических данных, а также результатов дополнительных методов исследования.

Критериями включения в исследование являлись: наличие клинически подтверждённого инфекционного дерматоза, возраст старше 18 лет, информированное согласие пациента на участие в исследовании.

Критериями исключения служили: тяжёлые декомпенсированные соматические заболевания, выраженные иммунодефицитные состояния, онкологические заболевания в активной стадии, отказ пациента от участия в исследовании.

Всем пациентам проводили комплексное обследование, включавшее сбор жалоб, анамнеза заболевания и жизни, оценку эпидемиологического анамнеза, дерматологический осмотр, анализ локализации, распространённости и морфологических особенностей кожного процесса. Особое внимание уделяли длительности заболевания, возможным путям инфицирования, сезонности возникновения, наличию семейных и бытовых контактов, санитарно-гигиеническим условиям, сопутствующей соматической патологии и ранее проводимому лечению.

Для верификации диагноза использовали общеклинические, лабораторные и специальные дерматологические методы исследования. При подозрении на грибковые дерматозы проводили микроскопическое исследование патологического материала с кожи, волос и ногтей. При бактериальных поражениях кожи диагноз устанавливали на основании клинической картины, при необходимости с применением бактериологического исследования отделяемого. При подозрении на чесотку использовали клинические критерии и стандартные методы лабораторного подтверждения.

В ходе исследования оценивали следующие показатели: нозологическую структуру инфекционных дерматозов, возрастно-половые особенности, сезонность заболеваемости, частоту отдельных клинических форм, ведущие факторы риска, особенности течения, частоту осложнений и рецидивов.

Статистическую обработку полученных результатов проводили с использованием методов вариационной статистики. Количественные показатели представляли в виде среднего арифметического значения и стандартной ошибки среднего ($M \pm m$), качественные признаки — в виде абсолютных значений и процентов. Для оценки достоверности различий использовали критерий Стьюдента и χ^2 . Различия считали статистически значимыми при $p < 0,05$.

Результаты исследования: В ходе исследования проведён анализ клинико-эпидемиологических особенностей инфекционных дерматозов у 86 пациентов. Установлено, что в общей структуре инфекционных поражений кожи наибольшую долю составили грибковые дерматозы, которые были выявлены у 39 (45,3%) больных. Бактериальные дерматозы диагностированы у 27 (31,4%) пациентов, а паразитарные дерматозы — у 20 (23,3%) обследованных.

При анализе возрастного состава установлено, что наибольшее число случаев инфекционных дерматозов приходилось на лиц молодого и среднего возраста. Наиболее часто заболевания регистрировались в возрастной группе 18–35 лет, что было связано с более высокой социальной активностью, частыми бытовыми и профессиональными контактами, а также большей вероятностью посещения мест общего пользования. У пациентов старших возрастных групп чаще встречались грибковые поражения кожи, особенно микозы стоп и онихомикозы, что, вероятно, связано с наличием сопут-

ствующей соматической патологии, метаболических нарушений и длительным хроническим течением заболевания.

Изучение нозологической структуры показало, что среди бактериальных дерматозов наиболее часто встречались импетиго, фолликулиты и фурункулёз, тогда как в группе грибковых поражений преобладали микозы гладкой кожи, микозы стоп и онихомикозы. В группе паразитарных дерматозов основную часть случаев составила чесотка, в том числе в ряде наблюдений с осложнённым течением за счёт вторичного инфицирования и экзематизации.

Анализ сезонности позволил установить, что бактериальные и грибковые дерматозы чаще регистрировались в весенне-летний период, когда повышаются потоотделение, мацерация кожи, частота микротравм и риск инфицирования. В то же время чесотка чаще выявлялась в осенне-зимний период, что, вероятно, связано с более тесным бытовым контактом в закрытых помещениях и повышением риска внутрисемейного распространения заболевания.

При изучении факторов риска установлено, что важнейшее значение в развитии инфекционных дерматозов имели несоблюдение правил личной гигиены, наличие тесных бытовых контактов, посещение бань, бассейнов, спортивных залов, а также наличие сопутствующей соматической патологии. У части пациентов выявлялись такие предрасполагающие состояния, как сахарный диабет, ожирение, хронические заболевания желудочно-кишечного тракта и эндокринные нарушения. Значительная часть больных до обращения к врачу использовала различные наружные средства самостоятельно, что нередко приводило к изменению клинической картины заболевания и затрудняло своевременную диагностику.

Клинический анализ показал, что инфекционные дерматозы в современных условиях нередко характеризуются полиморфизмом проявлений, склонностью к затяжному течению и рецидивированию. У 34,9% пациентов отмечалось рецидивирующее течение заболевания, а у 26,7% больных имело место позднее обращение за специализированной помощью. У таких пациентов чаще наблюдались более распространённые формы поражения, присоединение вторичной инфекции, усиление воспалительной реакции и выраженный зуд.

У больных грибковыми дерматозами нередко выявлялись стёртые и малосимптомные формы, особенно после самостоятельного применения комбинированных мазей. У пациентов с бактериальными дерматозами чаще отмечались признаки острого воспаления, болезненность, гнойное отделяемое и локальная гиперемия. В случаях чесотки наряду с типичными проявлениями у ряда больных наблюдались атипичные формы, сопровождающиеся расчёсами, экзематизацией и вторичной пиодермией.

Таким образом, результаты исследования показали, что в современных условиях инфекционные дерматозы сохраняют высокую распространённость, характеризуются преобладанием грибковых форм, клиническим полиморфизмом, влиянием социальных, гигиенических и коморбидных факторов, а также тенденцией к затяжному и рецидивирующему течению.

Выводы: Проведённое исследование показало, что инфекционные дерматозы в современных условиях сохраняют высокую клиническую и эпидемиологическую значимость, занимая важное место в структуре дерматологической заболеваемости. Ведущие позиции среди обследованных пациентов занимали грибковые дерматозы, несколько реже встречались бактериальные и паразитарные поражения кожи. Установлено, что распространённость инфекционных дерматозов определяется не только биологическими свойствами возбудителя, но и комплексом социальных, гигиенических и медико-биологических факторов.

Выявлено, что для современных инфекционных дерматозов характерны клинический полиморфизм, наличие стёртых и атипичных форм, склонность к затяжному и рецидивирующему течению, а также более частое развитие осложнений при позднем обращении за медицинской помощью. Существенную роль в формировании и поддержании патологического процесса играют несоблюдение правил личной гигиены, тесные бытовые контакты, посещение мест общего пользования, сопутствующая соматическая патология и нерациональное самолечение, способствующее изменению клинической картины заболевания.

Полученные результаты подтверждают необходимость дальнейшего совершенствования системы ранней диагностики инфекционных дерматозов, своевременной верификации диагноза и проведения целенаправленных профилактических мероприятий. В практической дерматовенерологии важное значение имеет комплексный клинико-эпидемиологический подход к оценке каждого случая, позволяющий учитывать факторы риска, особенности течения заболевания и вероятность рецидива, что способствует повышению эффективности лечебно-профилактической помощи пациентам.

Список литературы:

1. World Health Organization. Ringworm (tinea) [Электронный ресурс]. Geneva: WHO; 2025. URL: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ringworm-%28tinea%29>.
2. World Health Organization. Scabies [Электронный ресурс]. Geneva: WHO; 2023. URL: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/scabies>.
3. Galili E., Taieb A., Shemer A., Leor G., Lyakhovitsky A., Barzilai A., Baum S. Epidemiology and Trends of Cutaneous Fungal Infections (2019–2022) in Israel: A Single Tertiary-Center Study // *Journal of Fungi*. 2025. Vol. 11, No. 4. Art. 320. doi: 10.3390/jof11040320.
4. Chanyachailert P., Leeyaphan C., Bunyaratavej S. Cutaneous Fungal Infections Caused by Dermatophytes and Non-Dermatophytes: An Updated Comprehensive Review of Epidemiology, Clinical Presentations, and Diagnostic Testing // *Journal of Fungi (Basel)*. 2023. Vol. 9, No. 6. Art. 669. doi: 10.3390/jof9060669.
5. Kruithoff C., Eilers D., Jones A., et al. Dermatophyte Infections Worldwide: Increase in Incidence and Associated Antifungal Resistance // *Life*. 2024. Vol. 14, No. 1. Art. 1. doi: 10.3390/life14010001.
6. Gupta A.K., Mann A., Ravi S.P., Wang T. An update on antifungal resistance in dermatophytosis // *Expert Opinion on Pharmacotherapy*. 2024. Vol. 25, No. 5. P. 511–519. doi: 10.1080/14656566.2024.2343079.
7. Zheng C., He W., Tan J., et al. Retrospective Epidemiological Analyses of 12,976 Culture-Positive Superficial Fungal Infections in Shanghai, East China // *Mycoses*. 2026. doi: 10.1111/myc.70164.
8. Centers for Disease Control and Prevention. Clinical Guidance for Group A Streptococcal Impetigo [Электронный ресурс]. Atlanta: CDC; 2025. URL: <https://www.cdc.gov/group-a-strep/hcp/clinical-guidance/impetigo.html>.
9. Centers for Disease Control and Prevention. About Impetigo [Электронный ресурс]. Atlanta: CDC; 2025. URL: <https://www.cdc.gov/group-a-strep/about/impetigo.html>.
10. Nardi N.M., Schmitz S.M., Shaikh F. Impetigo // *StatPearls [Internet]*. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2023. URL: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK430974/>.
11. Gupta S., Thornley S., et al. Prevalence and determinants of scabies: A global systematic review and meta-analysis // *Tropical Medicine & International Health*. 2024. Vol. 29, No. 12. P. 1006–1017. doi: 10.1111/tmi.14058.
12. Mitchell E., Wallace M., Marshall J., Whitfeld M., Romani L. Scabies: current knowledge and future directions // *Frontiers in Tropical Diseases*. 2024. Vol. 5. Art. 1429266. doi: 10.3389/fitd.2024.1429266

Для цитирования: Нарзикулов Р.М., Пак У.И. Клинико-эпидемиологические особенности инфекционных дерматозов в современных условиях // *Вестник фундаментальной и клинической медицины*. – 2026. – № 4(24). – С. 509–513. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19589609>

РЕВМАТОЛОГИК КАСАЛЛИКЛАР ШАКЛЛАНИШИНИНГ ХАВФ ОМИЛЛАРИНИ КОМПЛЕКС БАҲОЛАШ

Ризаев Ж.А., Шодикулова Г.З., Пулатов У.С., Хасанов О.Г.

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Мазкур мақолада ревматологик касалликлар шаклланишининг хавф омиллари комплекс тарзда ўрганилган. Тадқиқот 2022–2025 йилларда Самарқанд вилоятида ўтказилиб, 817 нафар бемор ва 204 нафар назорат гуруҳи иштирок этган. Натижалар ревматологик касалликлар таркибида остеоартроз, ревматоид артрит ва сурункали ревматик юрак касалликлари етакчи ўринни эгаллашни кўрсатди. Асосий хавф омиллари сифатида ёш (49 ёшдан катта), аёл жинси, ирсий мойиллик, инфекцион омиллар, метаболик бузилишлар ва гиподинамия аниқланган. Шунингдек, касаллик ривожланиш хавфини баҳолаш учун 12 та предиктордан иборат балли прогностик шкала ишлаб чиқилган бўлиб, у эрта диагностика ва профилактикада муҳим аҳамият касб этади.

Калим сўзлар: ревматологик касалликлар, хавф омиллари, остеоартроз, ревматоид артрит, эпидемиология, ирсий мойиллик, метаболик бузилишлар, гиподинамия, прогностик шкала, эрта диагностика.

COMPREHENSIVE ASSESSMENT OF RISK FACTORS FOR THE DEVELOPMENT OF RHEUMATOLOGIC DISEASES

Rizayev J.A., Shodikulova G.Z., Pulatov U.S., Khasanov O.G.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. This article presents a comprehensive assessment of risk factors associated with the development of rheumatologic diseases. The study was conducted in the Samarkand region during 2022–2025 and included 817 patients and 204 individuals in the control group. The results showed that osteoarthritis, rheumatoid arthritis, and chronic rheumatic heart disease occupy leading positions in the structure of rheumatologic conditions. The main risk factors identified include age over 49 years, female gender, genetic predisposition, infectious factors, metabolic disorders, and physical inactivity. In addition, a prognostic scoring scale consisting of 12 predictors was developed, which enables the assessment of disease risk and plays an important role in early diagnosis and prevention.

Keywords: Rheumatologic diseases, risk factors, osteoarthritis, rheumatoid arthritis, epidemiology, genetic predisposition, metabolic disorders, physical inactivity, prognostic scale, early diagnosis.

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ФАКТОРОВ РИСКА ФОРМИРОВАНИЯ РЕВМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Ризаев Ж.А., Шодикулова Г.З., Пулатов У.С., Хасанов О.Г.

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. В данной статье проведена комплексная оценка факторов риска формирования ревматологических заболеваний. Исследование выполнено в 2022–2025 годах в Самаркандской области с участием 817 пациентов и 204 человек контрольной группы. Результаты показали, что в структуре ревматологических заболеваний ведущие позиции занимают остеоартроз, ревматоидный артрит и хроническая ревматическая болезнь сердца. В качестве основных факторов риска выявлены возраст старше 49 лет, женский пол, наследственная предрасположенность, инфекционные факторы, метаболические нарушения и гиподинамия. Также разработана балльная прогностическая шкала, включающая 12 предикторов, которая позволяет оценивать риск развития заболеваний и имеет важное значение для ранней диагностики и профилактики.

Ключевые слова: Ревматологические заболевания, факторы риска, остеоартроз, ревматоидный артрит, эпидемиология, наследственная предрасположенность, метаболические нарушения, гиподинамия, прогностическая шкала, ранняя диагностика.

Ҳозирги вақтда ревматик касалликлар замонавий соғлиқни саклашнинг энг муҳим тиббий-ижтимоий муаммоларидан бири сифатида қараладичунки улар кенг тарқалган, сурункали прогрессив кечилишга эга, оғриқ синдроми, функционал фаолликнинг пасайиши, ҳаёт сифатининг ёмонлашиши, беморларнинг меҳнат қобилиятини эрта йўқотиши ва ногиронлиги билан бирга келади, шунингдек,

соғлиқни сақлаш тизимига сезиларли юкни шакллантиради. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти маълумотларига кўра,..."дунёда 1,71 миллиардга яқин одам суяк-мушак касалликларидан азият чекади, шу билан бирга, остеоартрит ва ревматоид артрит 528 ва 18 миллион кишида қайд этилган бўлиб, мос равишда 19 миллион ва 2,4 миллион ҳолатда ногиронликка олиб келади".

Дунёда ревматик касалликлар эпидемиологияси, клиник кечиш хусусиятлари ва ихтисослаштирилган ёрдамни ташкил этиш масалаларига бағишланган кўплаб тадқиқотлар олиб борилмоқда. Шу билан бирга, ревматик касалликлар тарқалишининг минтакавий хусусиятлари, шунингдек, тиббий ёрдам кўрсатишнинг турли босқичларида ревматологик хизматнинг ҳолати тўғрисида етарлича умумлаштирилган маълумотлар мавжуд эмас. Ҳозирги кунга қадар ревматологик ёрдам сифатини комплекс баҳолаш, ташкилий нуқсонларни эрта аниқлаш, маршрутлаш, диагностика, диспансер кузатуви ва беморларни рақамли кузатиб боришни такомиллаштириш бўйича аниқ ёндашувлар шакллانмаган. Шу муносабат билан ревматологик хизматни баҳолаш, прогнозлаш ва оптималлаштиришнинг комплекс тизимини ишлаб чиқиш замонавий ревматология ва соғлиқни сақлашни ташкил этишнинг муҳим илмий ва амалий муаммосини ҳал қилиш ҳисобланади.

Ушбу тадқиқот комплекс хусусиятга эга бўлиб, ревматологик касалликларнинг ўзига хос хусусиятларини ўрганиш ва минтакавий даражада ревматологик хизмат фаолияти самарадорлигини баҳолашга қаратилган клиник-эпидемиологик ва ташкилий-таҳлилий босқичларни ўз ичига олган.

Тадқиқот материаллари ва усуллари: Тадқиқот 2022-2025-йилларда Ўзбекистон Республикасининг Самарқанд вилоятида ўтказилган ва ревматик касалликлар билан оғриган беморларнинг клиник маълумотларини таҳлил қилишни, шунингдек, ихтисослаштирилган ревматологик ёрдам кўрсатишнинг ташкилий параметрларини баҳолашни ўз ичига олган.

Тадқиқот кетма-кет бир неча босқичда амалга оширилди.

Биринчи босқичда патологиянинг ривожланиши ва авж олиши учун хавф омилларини аниқлаш мақсадида ревматик касалликлар билан оғриган беморларнинг клиник ва анамнестик маълумотларини тўплаш ва таҳлил қилиш амалга оширилди.

Ревматологик касалликлар ривожланишининг хавф омилларини комплекс баҳолаш ва уларнинг статистик ва клиник аҳамиятини аниқлаш учун иккита кузатув гуруҳини шакллантириш билан қиёсий клиник-эпидемиологик тадқиқот ўтказилди.

Асосий гуруҳни Самарқанд вилояти даволаш-профилактика муассасаларида амбулатор ёки статсионар кузатувда бўлган ревматологик касалликлар аниқланган 817 нафар бемор ташкил этди. Ревматологик касаллик ташхиси шикоятлар ва касаллик анамнези таҳлили, объектив клиник кўрик натижалари, яллиғланиш фаоллигининг лаборатор кўрсаткичлари ва инструментал тадқиқот усуллари маълумотларини ўз ичига олган комплекс клиник-диагностик баҳолаш асосида қўйилди. Ташхисларни текшириш ревматик касалликларни ташхислаш бўйича амалдаги халқаро таснифлаш мезонлари ва клиник тавсияларга мувофиқ амалга оширилди.

Тадқиқот натижалари: Таққослаш гуруҳини ревматологик касалликларнинг клиник ва инструментал тасдиқланган белгилари бўлмаган 204 нафар бемор ташкил этди. Кўрсатилган шахслар таянч-ҳаракат тизими патологияси билан боғлиқ бўлмаган касалликлар бўйича профилактик кўриқдан ёки текширувдан ўтказилган.

Тақсимланиш таҳлили бўғимларнинг дегенератив ва сурункали яллиғланиш касалликлари етакчи ўринни эгаллашини кўрсатди. Энг катта улушни 236 ҳолатда (28,9%) остеоартроз ташкил этди, бу ревматологик патологиянинг умумий тузилишида дегенератив-дистрофик жараёнларнинг устунлигини кўрсатади. Тарқалиши бўйича иккинчи ўринни ревматоид артрит эгаллайди - 204 нафар бемор (25,0%), бу касалликнинг шаклланишида аутоиммун яллиғланиш компонентининг муҳим ролини таъкидлайди.

Сурункали ревматик юрак касаллиги текширилган 188 нафар беморда (23,0%) аниқланган бўлиб, учраш частотаси бўйича учинчи гуруҳни ташкил қилади ва юрак-қон томир тизимининг постревматик шикастланишларининг долзарблиги сақланиб қолишини акс эттиради. Остеопороз 74 беморда (9,1%) қайд этилган, бу унинг метаболик асорат ва мустақил ревматологик муаммо сифатида аҳамиятини тасдиқлайди. Камроқ тарқалган шакллارга реактив артропатиялар - 37 ҳолат (4,5%), подагра - 23 ҳолат (2,8%), ўткир ревматик иситма - 20 ҳолат (2,4%) ва қайталанувчи ревматик иситма - 10 ҳолат (1,2%) киради. Бириктирувчи тўқиманинг тизимли касалликлари ва спондилоартритлар сезиларли даражада камроқ улушни ташкил этди: тизимли қизил югурик - 11 бемор (1,3%), анкилозловчи спондилит - 6 бемор (0,7%), тизимли склеродермия - 5 бемор (0,6%). Псориатик артрит, Бехчет касаллиги, тизимли васкулитлар ва дерматомиозит камдан кам (0,12-0,24%) учради.

Асосий гуруҳдаги ревматологик касалликлар таркиби (n=817)

№	Нозология	Абс.	%
1.	остеоартроз	236.	28,9
2.	ревматоид артрит	204.	25,0
3.	Сурункали ревматик юрак касаллиги	188.	23,0
4.	Остеопороз	74.	9,1
5.	реактив артропатия	37.	4,5
6.	Подагра	23.	2,8
7.	ўткир ревматик иситма	20.	2,4
8.	қайталанувчи ревматик иситма	10.	1,2;
9.	СКВ	11.	1,3
10.	Анкилозловчи спондилит	6.	0,7
11.	Тизимли склеродермия	5.	0,6
12.	Псориатик артрит	2.	0,24
13.	Бехчет касаллиги	1.	0,12
14.	Тизимли васкулитлар	1.	0,12
15.	Дерматомиозит	1.	0,12

Демографик кўрсаткичлар таҳлили гуруҳлар ўртасида ёш ва жинс бўйича статистик жиҳатдан сезиларли фарқларни кўрсатди. 49 ёшдан катта шахслар асосий гуруҳда 56,4% ва таққослаш гуруҳида 44,1% ($\chi^2=9,95$; $P<0,01$; $OR=1,64$). Бу эса катта ёш тоифасида ревматологик касалликлар шаклланиши эҳтимоли юқори эканлигидан далолат беради. Аксинча, 49 ёшгача бўлган ёш паст хавф билан боғлиқ эди ($OR=0,61$; $P<0,01$), бу ёшликнинг протектив аҳамиятини кўрсатади.

Жинсий белги бўйича ревматологик патологиянинг ривожланиши билан аёл жинсининг аҳамиятли ассотсиатсияси аниқланди. Асосий гуруҳда аёллар 63,8% ни ташкил этган бўлса, таққослаш гуруҳида - 51,5% ($\chi^2=10,41$; $P<0,01$; $OR=1,66$). Эркакларда эса, аксинча, ревматологик касалликлар эҳтимоли пастлиги билан тавсифланган ($OR=0,60$; $P<0,01$). Олинган маълумотлар аёллар орасида аутоиммун ва дегенератив ревматик касалликларнинг кенг тарқалганлиги ҳақидаги замонавий ғояларга мос келади. Яшаш жойи статистик жиҳатдан аҳамиятли фарқларни кўрсатмади ($P>0,5$), бу эса ушбу тадқиқот доирасида ҳудудий омилни мустақил хавф детерминанти сифатида истисно қилиш имконини беради. Таълим даражаси ҳам ревматологик касалликларнинг шаклланиши билан ишончли боғлиқликни кўрсатмади ($P>0,2-0,5$), бу таълим ҳолати ва ревматик патологиянинг ривожланиши ўртасида тўғридан тўғри боғлиқлик йўқлигини кўрсатади.

Иш билан бандлик тури статистик жиҳатдан сезиларли фарқларни аниқламади ($P>0,05$), аммо асосий гуруҳда жисмоний меҳнат билан шуғулланувчилар улушининг юқори бўлиш тенденцияси кузатилди (63,4% ва 56,4%; $OR=1,34$), бу касбий юкларнинг таянч-ҳаракат тизимига потенциал таъсирини кўрсатиши мумкин. Ижтимоий мақом таҳлил қилинганда, ишловчилар асосий гуруҳда сезиларли даражада кам учраганлиги аниқланди (53,6% ва 62,3%; $\chi^2=4,94$; $P<0,05$; $OR=0,70$), бу ревматологик касалликлар туфайли меҳнат қобилиятининг пасайишини акс эттириши мумкин. Ишсизлик ва пенсия ҳолати статистик жиҳатдан аҳамиятли боғлиқликни кўрсатмади.

Моддий-маиший шароитлар ва зичлик шароитида яшаш гуруҳлар ўртасида сезиларли фарқларни аниқламади ($P>0,05$), гарчи зичлик омили учун хавфнинг ошиш тенденцияси қайд этилган ($OR=1,42$).

Ирсий мойиллик таҳлили (3-жадвал) ревматологик ва аутоиммун касалликларнинг оилавий анамнези ва текширилганларда ревматологик патологиянинг шаклланиши ўртасида статистик жиҳатдан аҳамиятли боғлиқликлар мавжудлигини кўрсатди. Биринчи авлод қариндошларида ревматологик касалликларнинг мавжудлиги асосий гуруҳда 34,3% ва таққослаш гуруҳида 18,1% сезиларли даражада кўпроқ учраганлиги аниқланди ($\chi^2=19,85$; $P<0,001$; $OR=2,35$). Олинган OR кўрсаткичи тегишли оилавий оғирлик мавжуд бўлганда ревматологик касалликлар ривожланиш хавфининг икки баравардан кўпроқ ошишини кўрсатади.

Демографик ва ижтимоий-маиший омилларнинг қиёсий тавсифи

Кўрсаткич	Асосий гуруҳ (n=817)		Таққослаш гуруҳи (n=204)		хи ²	Р	ЁКИ
	Абс.	%	Абс.	%			
49 ёшгача	356.	43,6	114.	55,9	9,95	<0,01	0,61
49 ёшдан катта	461.	56,4	90.	44,1	9,95	<0,01	1,64
Эркак жинси	296.	36,2	99.	48,5	10,41	<0,01	0,60
Аёл жинси	521.	63,8	105.	51,5	10,41	<0,01	1,66
Яшаш жойи: шаҳар	443.	54,2	112.	54,9	0,03	>0,5	0,97
қишлоқ жойлар	374.	45,8	92.	45,1	0,03	>0,5	1,03
Таълим даражаси: тўлиқсиз ўрта	55.	6,7	17.	8,3	0,64	>0,2	0,79
ўртача	430.	52,6	99.	48,5	1,10	>0,2	1,18
олий	332.	40,6	88.	43,1	0,42	>0,5	0,90
Бандлик тури: ақлий меҳнат	299.	36,6	89.	43,6	3,42	>0,05	0,75
жисмоний меҳнат	518.	63,4	115.	56,4	3,42	>0,05	1,34
Ижтимоий мақоми: ишлайдиган	438.	53,6	127.	62,3	4,94	<0,05	0,70
ишсиз	157.	19,2	32.	15,7	1,35	>0,2	1,28
пенсионер	222.	27,2	45.	22,1	2,21	>0,1	1,32
Моддий-маиший ша- роитлар: қоникарли	748.	91,6	189.	92,6	0,26	>0,5	0,86
қоникарсиз.	69.	8,4	15.	7,4	0,26	>0,5	1,16
Шароитда яшаш зе- рикарли.	176.	21,5	33.	16,2	2,89	>0,05	1,42

Изоҳ: Р - Пирсоннинг χ^2 мезонига кўра фарқларнинг ишончилиги

2-жадвалда хавф шкаласига киритиш учун кўп омилли клиник-эпидемиологик таҳлил натижалари бўйича танланган энг муҳим омиллар келтирилган. Рўйхатга ревматологик патологиянинг шаклланишида уларнинг патогенетик ролини акс эттирувчи статистик ишончиликка ($P<0,05$) ва клиник асосланганликка эга бўлган кўрсаткичлар киритилган. Модификацияланмайдиган омиллар орасида 49 ёшдан катта ёш ишончли аҳамиятга эга ($\chi^2=9,95$; $P<0,01$; $OR=1,64$) ва аёл жинси ($\chi^2=10,41$; $P<0,01$; $OR=1,66$). Ушбу кўрсаткичлар катта ёшдаги гуруҳларда ва аёллар орасида ревматологик касалликларнинг кўпроқ тарқалишининг маълум эпидемиологик қонуниятини акс эттиради.

Биринчи қариндошлик қаторидаги ревматологик касалликлар бўйича ирсий мойиллик хавфнинг икки баравар ошишини кўрсатди ($\chi^2=19,85$; $P<0,001$; $OR=2,35$), бу генетик мойилликнинг ролини тасдиқлайди. Инфекцион омиллар ҳам катта ҳисса қўшади. Юқори нафас йўллариининг такрорий инфекциялари $OR=2,23$ ($P<0,001$) билан тавсифланади, сурункали инфекция ўчоқларининг мавжудлиги эса янада аниқроқ ассотсиатсияни кўрсатди ($OR=3,72$; $P<0,001$). Ушбу маълумотлар аутоиммун механизмларнинг фаоллашувида персистирловчи антиген стимуляциясининг мумкин бўлган кўзгатувчи ролини кўрсатади.

Коморбид метаболик бузилишлар ҳам прогностик аҳамиятга эга. Семизлик хавфни 1,56 баравар ($P<0,05$), қандли диабет - икки баравардан кўпроқ оширади ($OR=2,06$; $P<0,01$), артериал гипертензия - 1,63 марта ($P<0,01$). Аниқланган ассотсиатсиялар ревматик патологиянинг патогенетик асоси сифатида тизимли яллиғланиш фонини ва эндотелиал дисфункцияни акс эттиради.

Хулқ-атвор ва механик омилларга гиподинамия ($OR=1,77$; $P<0,001$), бўғим-бойлам аппарати жароҳатлари ($OR=2,30$; $P<0,001$) ва таянч-ҳаракат тизими деформатсиялари ($OR=2,03$; $P<0,001$), бу касалликнинг ривожланишида биомеханик ва метаболик механизмларнинг аҳамиятини тасдиқлайди. Анамнезидаги асоратлар билан оғир COVID-19 энг аниқ боғлиқликни кўрсатди ($\chi^2=31,69$; $P<0,001$; $OR=6,34$), бу оғир вирусли инфекциядан кейин аутоиммун жараёнларнинг фаоллашувининг юқори эҳтимолини кўрсатади.

**Ревматологик касалликлар ривожланиш хавфини шакллантиришнинг танланган мустақил
прогностик мезонлари**

№	Омил	χ^2	P	ЁКИ
1.	49 ёшдан катта	9,95	<0,01	1,64
2.	Аёл жинси	10,41	<0,01	1,66
3.	1-тармоқдаги қариндошларда ревматологик касалликлар	19,85	<0,001	2,35
4.	Юқори нафас йўллариининг қайталанувчи инфекциялари	14,03	<0,001	2,23
5.	Сурункали инфекция ўчоқлари	20,16	<0,001	3,72
6.	Семизлик / ортикча вазн	6,53	<0,05	1,56
7.	Қандли диабет	7,02	<0,01	2,06
8.	артериал гипертензия	8,16	<0,01	1,63
9.	Гиподинамия	11,73	<0,001	1,77
10.	Бўғим-боғлам аппаратининг шикастланиши	13,48	<0,001	2,30
11.	ОДА деформатсиялари	12,53	<0,001	2,03
12.	Анамнезда асоратлар билан оғир COVID	31,69	<0,001	6,34

Ревматологик касалликлар шаклланиш хавфи юқори бўлган шахсларни эрта аниқлаш воситасини ишлаб чиқиш мақсадида ревматологик патология мавжудлиги билан статистик аҳамиятли боғлиқликни кўрсатган омилларни босқичма-босқич танлаш амалга оширилди, қулайлик ва шкаладан амалда фойдаланиш учун бир қатор омиллар умумий омилга бирлаштирилди.

Шкалага предикторларни киритиш учун қуйидаги мезонлар асос қилиб олинди: $\chi^2 > 3,86$, $OR \geq 1,0$, $P < 0,05$. Юқори ассотсиатсия кучига эга бўлган омиллар ($OR \geq 2,0$) клиник жиҳатдан аҳамиятли предикторлар сифатида кўриб чиқилди ва шкалани шакллантиришда катта улушга эга бўлди.

Балли градация хавф стратификациясининг валидатсияланган клиник воситалари аналогияси бўйича ўтказилди: $OR\ 1,50-1,99$ - 1 балл; $OR\ 2,00-3,99$ - 2 балл; $OR \geq 4,00$ - 3 балл

Жадвалда патология мавжудлиги билан статистик аҳамиятли боғлиқликни ($P < 0,05$) ва имкониятлар нисбати кўрсаткичи бўйича клиник аҳамиятлиликини кўрсатган омиллар асосида шакллантирилган ревматологик касалликлар ривожланиш хавфи стратификациясининг ишлаб чиқилган балл шкаласи келтирилган. Шкала таркибига демографик, ирсий, инфекцион, метаболик, биомеханик ва инфекциядан кейинги иммун механизмларни акс эттирувчи 12 та предиктор киритилган.

Модификацияланмайдиган омилларга 49 ёшдан катта ёш ($OR=1,64$) ва аёл жинси ($OR=1,66$) киритилган бўлиб, уларнинг ҳар бирига 1 баллдан берилган, бу уларнинг ўртача ассотсиатсия кучини акс эттиради. Биринчи авлоднинг ревматологик касалликлари бўйича ирсий мойиллик ($OR=2,35$) яққол прогностик аҳамиятга эга омил сифатида 2 балл олди. Инфекцион-яллиғланиш компоненти юқори нафас йўллариининг қайталанувчи инфекциялари ($OR=2,23$) ва сурункали инфекция ўчоқлари ($OR=3,72$) билан ифодаланади. Иккала предиктор ҳам 2 балл билан баҳоланади, бу эса ревматик патологиянинг шаклланишида сурункали антиген стимуляцияси ва иммун дисрегуляциясининг ролини тасдиқлайди. Метаболик блок семизлик (1 балл), қандли диабет (2 балл) ва артериал гипертензияни (1 балл) ўз ичига олади, бу тизимли яллиғланиш, эндотелиал дисфункция ва метаболик синдромнинг ҳиссасини акс эттиради. Функционал-механик омиллар - гиподинамия (1 балл), бўғим-боғлам аппарати жароҳатлари (2 балл) ва таянч-ҳаракат аппарати деформатсиялари (2 балл) бўғим патологиясининг ривожланишида биомеханик зўриқиш ва структуравий беқарорликнинг ролини кўрсатади.

Шкалага энг катта ҳисса асоратлар билан оғир COVID-19 ($OR=6,34$) қўшади, унга 3 балл берилди, бу оғир вирусли инфекциядан кейин сезиларли иммун-яллиғланиш фаоллашуви ва аутоиммун механизмларнинг потенсиал ишга тушишини акс эттиради.

Шкала бўйича балларнинг максимал йигиндиси 20 ни ташкил этади, бу эса ревматологик касалликлар ривожланишининг умумий хавфини миқдорий баҳолаш имконини беради. Шкаланинг кумулятив табиати ревматик патологиянинг кўп омилли табиатини акс эттиради ва профилактик кузатув ва ўз вақтида ревматологга юбориш учун беморларни эрта клиник стратификация қилиш имкониятини таъминлайди.

Ревматологик касалликлар ривожланишининг прогностик хавф шкаласи

Башоратчи	x ₂ ;	P	ЎКИ	Балл
49 ёшдан катта	9,95	<0,01	1,64	1.
Аёл жинси	10,41	<0,01	1,66	1.
1-тармоқдаги қариндошларда ревматологик касалликлар	19,85	<0,001	2,35	2.
Ретсидивланувчи БЎБ инфекциялари	14,03	<0,001	2,23	2.
Сурункали инфекция ўчоқлари	20,16	<0,001	3,72	2.
Семизлик / ортиқча вазн	6,53	<0,05	1,56	1.
Қандли диабет	7,02	<0,01	2,06	2.
артериал гипертензия	8,16	<0,01	1,63	1.
Гиподинамия	11,73	<0,001	1,77	1.
Бўғим-боғлам аппаратининг шикастланиши	13,48	<0,001	2,30	2.
Таянч-ҳаракат тизими деформациялари	12,53	<0,001	2,03	2.
Оғир COVID-19 асоратлари билан	31,69	<0,001	6,34	3.
Максимал балл:	20.			

Ишлаб чиқилган шкаладан фойдаланиш босқичма-босқич амалга оширилади ва 3.2.2-жадвалда келтирилган 12 та предикторнинг ҳар бирининг мавжудлигини кетма-кет баҳолашни ўз ичига олади. Тегшли белги аниқланганда, беморга омил ассотсиациясининг кучига (имкониятлар нисбатига) қараб белгиланган балл миқдори берилади. Агар белги бўлмаса, балл берилмайди.

Барча мезонлар баҳолангандан сўнг баллар қўшилади. Олинган якуний сумма ревматологик патология шаклланишининг индивидуал хавфининг интеграл даражасини акс эттиради.

Шкала соғлиқни сақлашнинг бирламчи бўғини даражасида, профилактик кўриклар, диспансеризация ва скрининг дастурлари доирасида қўллаш учун мўлжалланган. Ундан фойдаланиш қуйидагиларга имкон беради:

- касалликнинг бошланиш эҳтимоли юқори бўлган беморлар гуруҳини ажратиш;
- чуқурлаштирилган лаборатория ва инструментал текширув зарурлигини аниқлаш;
- динамик кузатишнинг индивидуал стратегиясини шакллантириш;
- беморни ўз вақтида ревматологга юбориш.

Усул қўллашнинг соддалиги билан ажралиб туради, мураккаб ҳисоб-китобларни талаб қилмайди ва клиник текширув рўйхати сифатида ишлатилиши мумкин. Жадвалда клиник талқин ва тавсия этилган даволаш тактикаси билан умумий балл кўрсаткичининг градацияси келтирилган.

0-4 балл оралиғи паст хавфга тўғри келади. Ревматологик патологиянинг шаклланиши эҳтимоли жуда кам. Беморга стандарт динамик кузатув ва модификацияланган хавф омилларини тузатиш кўрсатилган.

5-9 балл йиғиндиси ўртача хавфни тавсифлайди. Ушбу гуруҳда ревматологик касалликнинг бошланиш эҳтимоли юқори. Чуқурлаштирилган клиник-лаборатор текширув, яллиғланиш маркерлари ва аутоиммун фаоллик скрининги, шунингдек, камида 6-12 ойда бир марта динамик кузатув тавсия этилади.

10-14 балл кўрсаткичлари юқори хавфни акс эттиради. Яқин келажакда ревматологик патологиянинг намоён бўлиш эҳтимоли сезиларли даражада ошади. Беморга ревматолог маслаҳати, кенгайтирилган иммунологик скрининг, метаболик ва юқумли омилларни фаол тузатиш кўрсатилган.

≥15 балл йиғиндиси жуда юқори хавфга тўғри келади. Ушбу тоифа аутоиммун ёки яллиғланишли ревматологик касаллик ривожланишининг юқори эҳтимоли билан тавсифланади. Ихтисослаштирилган марказда кузатиш, кенгайтирилган лаборатория ва асбоб-ускуналар диагностикасини ўтказиш ва ҳолатни мунтазам мониторинг қилиш билан профилактика стратегиясини амалга ошириш зарур.

Шундай қилиб, шкала хавфнинг миқдорий табақаланишини амалга ошириш ва тиббий ёрдамнинг турли даражаларида беморларни олиб боришнинг клиник жиҳатдан асосланган тактикасини шакллантириш имконини беради.

БТДДа ОА ноҳуш кечишининг прогностик шкаласини талқин қилиш

Баллар суммаси	Хулоса	Клиник талқин ва тактика
0-4	Паст тавак-калчилик	Ревматологик патологиянинг шаклланиши эҳтимоли жуда кам. Стандарт кузатув, ўзгартириладиган хавф омилларини тузатиш тавсия этилади.
5-9	Ўртача хавф	Ревматологик касалликнинг бошланиш эҳтимоли юқори. Чуқурлаштирилган текширув, яллиғланиш маркерларининг лаборатория скрининги, 6-12 ойда 1 марта динамик кузатув кўрсатилган.
10-14.	Юқори хавф	Яқин йилларда ревматологик патологиянинг намоён бўлиш эҳтимоли юқори. Ревматолог маслаҳати, иммунологик скрининг, метаболик ва инфекция омиллари фаол коррексия қилиш тавсия этилади.
≥15	Жуда юқори хавф	Аутоиммун ёки яллиғланишли ревматологик касаллик ривожланиш эҳтимоли юқори. Ихтисослаштирилган марказда кузатиш, кенгайтирилган лаборатор-инструментал диагностика ва профилактик даволаш стратегияси кўрсатилган.

Хулоса. Мазкур тадқиқот натижалари ревматологик касалликлар кўп омили ва мураккаб патогенезга эга эканлигини яна бир бор тасдиқлади. Аниқланган асосий хавф омиллари — 49 ёшдан катта бўлиш, аёл жинси, ирсий мойиллик, сурункали ва тақрорланувчи инфекциялар, метаболик бузилишлар (семизлик, қандли диабет, артериал гипертензия), шунингдек гиподинамия ва таянч-ҳаракат тизими шикастланишлари касаллик ривожланишида муҳим рол ўйнайди. Тадқиқот доирасида ишлаб чиқилган 12 та предиктордан иборат балли прогностик шкала ревматологик касалликлар хавфини индивидуал даражада баҳолаш имконини беради. Ушбу шкала ёрдамида беморларни паст, ўрта, юқори ва жуда юқори хавф гуруҳларига ажратиш, уларни эрта босқичда аниқлаш ҳамда мақсадли профилактик ва диагностик чораларни қўллаш мумкин. Шунингдек, мазкур ёндашув бирламчи тиббий ёрдам бўғинида қўллаш учун қулай бўлиб, мураккаб ҳисоб-китобларни талаб қилмайди ва амалиётда кенг жорий этиш имкониятига эга. Бу эса ревматологик касалликларни эрта аниқлаш, уларнинг оғир асоратларини камайтириш, беморларнинг ҳаёт сифатини яхшилаш ҳамда соғлиқни сақлаш тизимида тушадиган юкни камайтиришга хизмат қилади. Умуман олганда, тадқиқот натижалари ревматологик хизматни такомиллаштириш, профилактика стратегияларини ишлаб чиқиш ва клиник қарор қабул қилиш жараёнини оптималлаштиришда муҳим илмий-амалий аҳамиятга эга.

Адабиётлар рўйхати:

1. Абдрахманова А. И., Зарипова Ф. А., Амиров Н. Б. Расстройства тревожно-депрессивного спектра при ревматических заболеваниях //Вестник современной клинической медицины. - 2020. - Т. 13. - №. 1. - С. 61-65.
2. Авдеева А. С. Маркеры воспаления при ревматических заболеваниях //Научно-практическая ревматология. - 2022. - Т. 60. - №. 6. - С. 561-569.
3. Лиля А. М., Лила В. А. Социальная значимость и экономические последствия ревматических заболеваний //Гигиена и санитария. - 2017. - Т. 96. - №. 4. - С. 387-392.
4. Лисицына Т. А., Вельтищев Д. Ю., Насонов Е. Л. Стрессовые факторы и депрессивные расстройства при ревматических заболеваниях //Научно-практическая ревматология. - 2013. - Т. 51. - №. 2. - С. 98-103.
5. Прокаева П. А. и др. Опыт применения стандартов лабораторной диагностики ревматических заболеваний в клинической практике //Клиническая лабораторная диагностика. - 2016. - Т. 61. - №. 11. - С. 787-789.
6. Решетникова И. В., Камаев И. А. Некоторые аспекты распространенности заболеваний крупных суставов у населения в современных условиях //Актуальные проблемы управления здоровьем населения. - 2019. - С. 251-255.
7. Саатова Г. М., Ганиева А. И. Медико-экономическая оценка альтернативных лечебных программ в ревматологии //Вестник Ошского государственного университета. - 2020. - №. 2-5. - С. 86-96.

Иктибос учун: Ризаев Ж.А., Шодикулова Г.З., Пўлатов У.С., Хасанов О.Ф. Ревматологик касалликлар шаклланишининг хавф омилларини комплекс баҳолаш // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2026. – № 4(24). – Б. 514–520. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19603495>

РЕПРОДУКТИВ ЁШДАГИ АЁЛЛАРДА АДЕНОМИОЗНИНГ ЭРТА ДИАГНОСТИКАСИДА КОМПРЕССИОН ЭЛАСТОГРАФИЯ УСУЛИНИНГ САМАРАДОРЛИГИ

Қобилжонова С.К., Аскарова З.З.

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Мақсад. Репродуктив ёшдаги аёлларда аденомиознинг эрта диагностикасида компрессион эластография усулининг самарадорлигини баҳолаш ва анъанавий ультратовуш текшируви (УТТ) билан солиштирма таҳлилни ўтказиш. Материал ва усуллар. Тадқиқотга жами 68 нафар репродуктив ёшдаги (20–45 ёш) аёл жалб этилди. Беморлар 2 та гуруҳга бўлинди: I гуруҳ (асосий, n=33) — комплекс даволаш (стандарт терапия + иммунодепрессантлар + магнитотерапия + компрессион эластография назорати) олган аёллар; II гуруҳ (таққослаш, n=38) — стандарт даволаш олган аёллар. Барча беморларда трансвагинал УТТ, компрессион эластография (Strain Ratio ҳисоблаш билан) ва МРТ текшируви ўтказилди. Натижалар. Компрессион эластография усулининг аденомиоз I–II даражасини аниқлашдаги сезгирлиги 89,4%, ўзига хослиги 92,1%, аниқлиги 90,7% ни таъкил этди. Анъанавий УТТ учун бу кўрсаткичлар мос равишда 72,5%, 78,3% ва 75,4% бўлди. УТТ ва эластографиянинг биргаликда қўлланилиши таъхис сезгирлигини 95,8% гача оширди. Strain Ratio кўрсаткичи аденомиоз I даражасида $2,34 \pm 0,28$, II даражасида $3,87 \pm 0,41$ ни таъкил этиб, нормадаги $1,05 \pm 0,15$ дан статистик жиҳатдан сезиларли фарқланди ($p < 0,01$). Хулоса. Компрессион эластография репродуктив ёшдаги аёлларда аденомиознинг эрта ва аниқ диагностикасида юқори самарадорликка эга усул бўлиб, анъанавий УТТ билан биргаликда қўлланилганда таъхис аниқлигини сезиларли оширади.

Калит сўзлар: аденомиоз, компрессион эластография, Strain Ratio, ультратовуш текшируви, репродуктив ёш, эрта диагностика, магнитотерапия, иммунодепрессантлар.

EFFECTIVENESS OF COMPRESSION ELASTOGRAPHY IN THE EARLY DIAGNOSIS OF ADENOMYOSIS IN WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE

Kobiljonova S.K., Askarova Z.Z.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Aim. To evaluate the effectiveness of compression elastography in the early diagnosis of adenomyosis in women of reproductive age and to conduct a comparative analysis with conventional ultrasound examination (US). Material and methods. The study included 68 women of reproductive age (20–45 years). The patients were divided into 2 groups: Group I (main, n=33) — women who received complex treatment (standard therapy + immunosuppressants + magnetotherapy + monitoring with compression elastography); Group II (comparison, n=38) — women who received only standard treatment. All patients underwent transvaginal ultrasound, compression elastography (with Strain Ratio calculation) and MRI examination. Results. The sensitivity of compression elastography in detecting adenomyosis of I–II degree was 89.4%, specificity — 92.1%, accuracy — 90.7%. For conventional ultrasound, these indicators were 72.5%, 78.3% and 75.4%, respectively. The combined use of ultrasound and elastography increased the diagnostic sensitivity to 95.8%. The Strain Ratio index in adenomyosis of I degree was 2.34 ± 0.28 , in II degree — 3.87 ± 0.41 , which statistically significantly differed from the norm (1.05 ± 0.15) ($p < 0.01$). Conclusion. Compression elastography is a highly effective method for early and accurate diagnosis of adenomyosis in women of reproductive age. When used in combination with conventional ultrasound, it significantly improves the accuracy of diagnosis.

Keywords: adenomyosis, compression elastography, Strain Ratio, ultrasound examination, reproductive age, early diagnosis, magnetotherapy, immunosuppressants.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕТОДА КОМПРЕССИОННОЙ ЭЛАСТОГРАФИИ В РАННЕЙ ДИАГНОСТИКЕ АДЕНОМИОЗА У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА

Қобилжонова С.К., Аскарова З.З.

Самарқандский государственный медицинский университет, г. Самарқанд, Узбекистан

Резюме. Цель. Оценить эффективность метода компрессионной эластографии в ранней диагностике аденомиоза у женщин репродуктивного возраста и провести сравнительный анализ с традиционным ультразвуковым исследованием (УЗИ). Материал и методы. В исследование было вклю-

чено 68 женщин репродуктивного возраста (20–45 лет). Пациентки были разделены на 2 группы: I группа (основная, n=33) — женщины, получавшие комплексное лечение (стандартная терапия + иммунодепрессанты + магнитотерапия + контроль с помощью компрессионной эластографии); II группа (сравнительная, n=38) — женщины, получавшие только стандартное лечение. Всем пациенткам проводилось трансвагинальное УЗИ, компрессионная эластография (с расчетом Strain Ratio) и МРТ-исследование. Результаты. Чувствительность компрессионной эластографии в выявлении аденомиоза I–II степени составила 89,4%, специфичность — 92,1%, точность — 90,7%. Для традиционного УЗИ эти показатели были соответственно 72,5%, 78,3% и 75,4%. Совместное применение УЗИ и эластографии повысило чувствительность диагностики до 95,8%. Показатель Strain Ratio при аденомиозе I степени составил $2,34 \pm 0,28$, при II степени — $3,87 \pm 0,41$, что статистически значимо отличалось от нормы ($1,05 \pm 0,15$) ($p < 0,01$). Вывод. Компрессионная эластография является высокоэффективным методом ранней и точной диагностики аденомиоза у женщин репродуктивного возраста. При совместном применении с традиционным УЗИ она существенно повышает точность диагностики.

Ключевые слова: аденомиоз, компрессионная эластография, Strain Ratio, ультразвуковое исследование, репродуктивный возраст, ранняя диагностика, магнитотерапия, иммунодепрессанты.

e-mail: sabina.qobiljonova@gmail.com

Кириш. Аденомиоз — бу бачадоннинг ички шиллик қавати (эндометрий) элементларининг мушак қавати (миометрий) ичига ўсиб кириши билан тавсифланадиган сурункали гинекологик касаллик бўлиб, репродуктив ёшдаги аёлларнинг 10–15% ида учрайди [1, 5, 45]. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти маълумотларига кўра, бутун дунё бўйича тахминан 176 миллион аёл эндометриоз билан оғриган бўлиб, аденомиоз эндометриознинг энг кенг тарқалган шакли сифатида 70–90% ни ташкил қилади [53]. Аденомиоз кучли ҳайз қон кетиш (менорагия), оғрикли ҳайз кўриш (дисменорея), сурункали чанок оғриғи ва бепуштлиқ билан тавсифланиб, аёлларнинг ҳаёт сифатини сезиларли пасайтиради [45, 50]. Касаллик кўпинча 40–50 ёшли аёлларда аниқланса-да, охириги йилларда ёш репродуктив ёшдаги аёллар орасида ҳам тобора кўпроқ қайд этилмоқда [70].

Аденомиозни эрта аниқлаш репродуктив функцияни сақлаш ва ўз вақтида даволашни бошлаш учун муҳим аҳамиятга эга. Аъъанавий ташхислаш усуллари — трансвагинал ультратовуш текшируви (ТВУТТ) ва магнит-резонанс томография (МРТ) — кенг қўлланилса-да, аденомиознинг бошланғич босқичларида уларнинг сезгирлиги чекланган бўлиб қолмоқда [85]. ТВУТТ ёрдамида I даражали аденомиозни аниқлаш сезгирлиги 88,5% ни ташкил этса-да, ушбу кўрсаткич текширувчининг тажрибаси ва аппарат сифатига кўп жиҳатдан боғлиқ [4, 32]. Охириги йилларда тўқималарнинг эластиклигини (қаттиқлигини) ноинвазив баҳолаш имконини берувчи компрессион эластография усули тиббиёт амалиётида кенг жорий этилмоқда [27]. Ушбу усул тўқиманинг механик хусусиятларидаги ўзгаришларни аниқлаш орқали патологик жараёнларни эрта босқичда ташхислаш имкониятини яратади. Аденомиозда миометрий тузилмасининг ўзгариши, фиброз ва эндометриоид ўчоқларнинг шаклланиши тўқима қаттиқлигининг ошишига олиб келади, бу эса эластография ёрдамида аниқланиши мумкин. Бироқ, аденомиозни ташхислашда компрессион эластографиянинг қўлланилишига бағишланган тадқиқотлар ҳали етарли даражада олиб борилмаган. Айниқса, Ўзбекистонда ушбу усулнинг аденомиоз диагностикасидаги ўрни ўрганилмаган. Шу сабабли, мазкур тадқиқот репродуктив ёшдаги аёлларда аденомиознинг эрта диагностикасида компрессион эластография усулининг самарадорлигини баҳолашга қаратилган.

Тадқиқотнинг мақсади: Репродуктив ёшдаги аёлларда аденомиоз касаллигини эрта ташхислашда компрессион эластография усулининг самарадорлигини баҳолаш ва комплекс даволаш натижаларига таъсирини ўрганиш.

Тадқиқот вазифалари:

1. Аденомиоз ривожланишининг хавф омилларини аниқлаш ва беморларнинг клиник-анамнестик хусусиятларини ўрганиш.
2. Компрессион эластография усулининг аденомиозни аниқлашдаги сезгирлиги, ўзига хослиги ва аниқлигини баҳолаш.
3. Strain Ratio кўрсаткичининг аденомиоз даражаси билан боғлиқлигини аниқлаш.
4. Комплекс даволаш (иммунодепрессантлар + магнитотерапия) натижаларини эластография ёрдамида динамик назорат қилиш.

Материал ва усуллар. Тадқиқот Самарқанд давлат тиббиёт университети 1-сонли кўп тармоқли клиникасида 2024–2027 йилларда ўтказилди. Тадқиқот проспектив, қиёсий клиник кузатув

форматида режалаштирилди ва Жаҳон тиббиёт ассоциациясининг Хелсинки декларациясида баён этилган этик тамойилларга мувофиқ амалга оширилди. Тадқиқот протоколи университетнинг этика қўмитаси томонидан тасдиқланди.


Тадқиқотга жами 68 нафар репродуктив ёшдаги (20–45 ёш) аёл жалб этилди. Беморлар қуйидаги гуруҳларга бўлинди:

I гуруҳ (асосий, n=33) — аденомиоз касаллигида комплекс даво тайинланган аёллар (стандарт терапия + иммунодепрессантлар + паст частотали магнитотерапия + компрессион эластография назорати);

II гуруҳ (таққослаш, n=38) — стандарт даволаш олган аёллар.

Тадқиқотга қўшиш мезонлари: аденомиознинг I ва II даражаси; репродуктив ёшдаги аёллар; аёлнинг ёзма розилиги.

Тадқиқотдан чиқариб ташлаш мезонлари: аденомиознинг III даражаси; ҳар қандай локализациядаги ёмон сифатли ўсма; фаол қон кетиш; ҳомиладорлик.



1-расм. Текширилган аёлларнинг ёшига қараб тақсимланиши

Текширилган аёлларнинг ўртача ёши I гуруҳда $32,4 \pm 4,2$ йил, II гуруҳда $31,8 \pm 3,9$ йил бўлиб, гуруҳлар ўртасида ёш бўйича статистик жиҳатдан сезиларли фарқ топилмади ($p > 0,05$).

1-жадвал

Текшириш гуруҳларида ёшига қараб тақсимлаш

Гуруҳ	Ўртача ёш, йил (mean $\pm$ SD)	p-қиймат
I гуруҳ (n=33)	$32,4 \pm 4,2$	
II гуруҳ (n=38)	$31,8 \pm 3,9$	$> 0,05$

2-жадвал

Текшириш гуруҳларида репродуктив анамнези

Кўрсаткич	I гуруҳ	II гуруҳ	p-қиймат
Ўртача туғиш сони	$1,8 \pm 0,6$	$1,7 \pm 0,5$	$> 0,05$
Ўртача абортлар сони	$0,4 \pm 0,2$	$0,5 \pm 0,3$	$> 0,05$
Бачадон бўйни жароҳатлари, %	40%	42%	$> 0,05$

Текшириш усуллари. Барча беморларда қуйидаги текширувлар ўтказилди:

Лаборатор текширувлар: умумий қон таҳлили (гемоглобин, эритроцитлар, лейкоцитлар), умумий сийдик таҳлили, биокимёвий қон таҳлили. Қон намунаси эрталаб, оч қоринга, соат 8:00–10:00 да, кубитал венадан олинди.

Инструментал текширувлар: Кичик чанок аъзоларининг комплекс ультратовуш текшируви трансвагинал ва трансабдоминал датчиклар ёрдамида «Sone-Score-30» (Германия), «ALOKA» (Япо-

ния) аппаратларида ўтказилди. Бачадон ўлчамлари, миометрий тузилиши, ўтиш зонасининг қалинлиги, гипоезоген кўшилмалар мавжудлиги баҳоланди.

Компрессион эластография: Ультратовуш текшируви билан бир вақтда компрессион эластография усули қўлланилди. Тўқиманинг эластиклик (қаттиқлик) хусусиятлари рангли харита (эластограмма) кўринишида визуаллаштирилди: яшил — юмшоқ тўқима, сариқ — ўртача қаттиқлик, қизил/қўқ — қаттиқ тўқима. Ҳар бир текширувда Strain Ratio (SR) кўрсаткичи ҳисобланди — бу аденомиоз ўчоғидаги тўқиманинг деформация нисбати атрофдаги нормал миометрийга нисбатан аниқланди.


МРТ текшируви: Магнит-резонанс томография Самарқанд давлат тиббиёт университети 1-сонли клиникасида турли текисликларда (аксиал, сагиттал, фронтал) ўтказилди. Аденомиознинг даражаси ва тарқалиши аниқланди.

Магнитотерапия: I гуруҳ беморларида паст частотали магнитотерапия «УМТВП-Мадин» қурилмасида қуйидаги параметрлар билан ўтказилди: частота — 100 Гс, майдон шакли — синусоидал, магнит индукцияси — 3,5 мТ, ҳар бир процедура давомийлиги — 15 дақиқа, даволаш курси — 10 кунлик.

Статистик таҳлил. Олинган натижаларга статистик ишлов бериш Statistica 12.0 ва Microsoft Excel 2007 дастурлари ёрдамида амалга оширилди. Нормал тақсимланган маълумотлар учун Стюдентнинг t-мезони, нормал тақсимланмаган маълумотлар учун Манн-Уитни мезони қўлланилди. Фарқлар $p < 0,05$ да статистик жиҳатдан сезиларли деб баҳоланди.

Натижа ва муҳокама. Тадқиқот натижалари шуни кўрсатдики, компрессион эластография усули аденомиознинг эрта босқичларини аниқлашда анъанавий УТТ га нисбатан сезиларли устунликка эга. Қуйида асосий натижалар батафсил келтирилади.

Диагностик самарадорлик. Компрессион эластография усулининг аденомиоз I–II даражасини аниқлашдаги сезгирлиги 89,4% ни, ўзига хослиги 92,1% ни, аниқлиги эса 90,7% ни ташкил этди. Бу кўрсаткичлар анъанавий УТТ натижаларидан (мос равишда 72,5%, 78,3% ва 75,4%) статистик жиҳатдан сезиларли юқори бўлди ($p < 0,01$). Айниқса муҳими шундаки, УТТ ва компрессион эластографиянинг биргаликда қўлланилиши ташхис сезгирлигини 95,8% гача оширди.




2-расм. Аденомиозни ташхислаш усуллариининг сезгирлиги

3-жадвал

Ташхис усуллариининг солиштирма самарадорлиги


Кўрсаткич	УТТ	Эластография	УТТ + эластография	p-қиймат
Сезгирлик, %	72,5	89,4	95,8	<0,01
Ўзига хослик, %	78,3	92,1	93,5	<0,01
Аниқлик, %	75,4	90,7	94,6	<0,01
ИБҚ, %	76,9	91,5	94,2	<0,01
СБҚ, %	73,8	90,1	95,1	<0,01

Изоҳ: ИБҚ — ижобий башоратлаш қиймати; СБҚ — салбий башоратлаш қиймати.



3-расм. Ташхис усулларининг солиштирама самарадорлиги

Strain Ratio кўрсаткичлари. Компрессион эластография ёрдамида ҳисобланган Strain Ratio кўрсаткичи аденомиоз даражасига қараб сезиларли ўзгарди. Нормал миометрийда $SR 1,05 \pm 0,15$ ни ташкил этса, аденомиоз I даражасида бу кўрсаткич $2,34 \pm 0,28$ га, II даражасида эса $3,87 \pm 0,41$ га ошди ($p < 0,01$). Бу натижалар аденомиоз ривожланиши билан миометрий тўқимасининг қаттиқлиги ортиб боришини тасдиқлайди.




4-расм. Аденомиоз даражасига қараб Strain Ratio кўрсаткичлари

4-жадвал


Аденомиоз даражасига қараб Strain Ratio кўрсаткичлари

Гуруҳ	SR (mean $\pm$ SD)	Фарқ нормадан	р-қиймат
Норма	$1,05 \pm 0,15$	—	—
I даража	$2,34 \pm 0,28$	+1,29	<0,01
II даража	$3,87 \pm 0,41$	+2,82	<0,01

Клиник кўрсаткичларнинг ўзгариши. Тадқиқот давомида комплекс даволаш олган I гуруҳда клиник симптомлар сезиларли яхшиланди. Оғриқ синдроми (VAS шкаласи бўйича) ўртача $7,8 \pm 1,2$ дан $3,2 \pm 0,9$ гача камайди ($p < 0,01$). Таққослаш гуруҳида эса бу кўрсаткич $7,5 \pm 1,1$ дан $5,6 \pm 1,0$ гача камайди ($p < 0,05$). Дисменорея интенсивлиги I гуруҳда $6,5 \pm 1,0$ дан $2,8 \pm 0,8$ гача пасайди, менорагиялар давомийлиги эса $8,2 \pm 1,5$ кундан $5,1 \pm 1,2$ кунгача қисқарди.



5-расм. Эластография бўйича тўқима қаттиқлиги тақсимооти



6-расм. Даволашдан олдин ва кейин клиник кўрсаткичлар

5-жадвал

Даволашдан олдин ва кейин клиник симптомларнинг ўзгариши

Клиник симптом	Гуруҳ	Бошланиш	Даво охири	p-қиймат
Оғриқ (VAS)	I гуруҳ	$7,8 \pm 1,2$	$3,2 \pm 0,9$	$<0,01$
	II гуруҳ	$7,5 \pm 1,1$	$5,6 \pm 1,0$	$<0,05$
Дисменорея	I гуруҳ	$6,5 \pm 1,0$	$2,8 \pm 0,8$	$<0,01$
	II гуруҳ	$6,3 \pm 1,2$	$4,7 \pm 1,1$	$<0,05$
Менорагия (кун)	I гуруҳ	$8,2 \pm 1,5$	$5,1 \pm 1,2$	$<0,01$
	II гуруҳ	$7,9 \pm 1,4$	$6,5 \pm 1,3$	$<0,05$

Муҳокама. Олинган натижалар компрессион эластографиянинг аденомиозни эрта ташхислашда юқори имкониятларга эга эканлигини кўрсатади. Săsăran V. ва ҳаммуаллифлар (2022) [27] томонидан ўтказилган тадқиқотда эластография ёрдамида бачадон миомаси ва аденомиозни бир вақтда аниқлаш мумкинлиги кўрсатилган. Бизнинг натижаларимиз ушбу маълумотларни тасдиқлайди ва янада кенгайтиради.

Biasioli A. ва ҳаммуаллифлар (2024) [4] инновацион ультратовуш мезонларини аденомиоз ташхисида қўллаш самарадорлигини ўрганиб, анъанавий мезонларга нисбатан юқори сезгирлик

кўрсаткичларига эришганлар. Бизнинг тадқиқотимизда ҳам компрессион эластографиянинг қўшимча мезон сифатида қўлланилиши ташхис аниқлигини сезиларли оширганлиги қайд этилди.

Moawad G. ва ҳаммуаллифлар (2023) [22] аденомиозни ташхислаш ва таснифлашнинг замонавий усулларини шарҳлаб, ноинвазив усулларнинг ривожланиши ушбу касалликни эрта аниқлаш имкониятларини кенгайтираётганини таъкидлаганлар. Бизнинг тажрибамиз ҳам бу фикрни қўллаб-қувватлайди — компрессион эластография қўлланилганда аденомиознинг I даражаси 89,4% ҳолатда тўғри аниқланди, бу анъанавий УТТ натижасидан (72,5%) 16,9% га юқори.

Шунингдек, тадқиқотимизда Strain Ratio кўрсаткичининг аденомиоз даражаси билан яққол корреляцияси аниқланди. $SR > 2,0$ қиймати аденомиознинг I даражасини, $SR > 3,5$ эса II даражасини юқори аниқлик билан башорат қилиш имконини берди. Бу маълумот клиник амалиётда аденомиоз даражасини инвазив усулларсиз аниқлашда қўл келиши мумкин.

Комплекс даволаш (стандарт терапия + иммунодепрессантлар + магнитотерапия) натижалари шуни кўрсатдики, I гуруҳда оғриқ синдроми 59% га, дисменорея 57% га камайди, бу таққослаш гуруҳидаги натижалардан (мос равишда 25% ва 25%) сезиларли юқори бўлди. Эластография ёрдамида даволаш динамикасини объектив кузатиш мумкин бўлди — SR кўрсаткичи даволашдан кейин I гуруҳда ўртача 18% га пасайди.

Ўзбекистонда Жўраева Г.Б. ва Исраилов Р.И. [15] аденомиоз ва эндометриознинг клиник-морфологик хусусиятларини ўрганган бўлса, Абдурахманова С.И. [38] бачадон миомаси ва аденомиоз биргаликда келишида даволаш алгоритминини ишлаб чиққан. Бизнинг тадқиқотимиз ушбу ишларни компрессион эластография усулининг ташхисий имкониятларини ўрганиш билан тўлдиради.

Хулоса:

1. Компрессион эластография усули репродуктив ёшдаги аёлларда аденомиознинг I–II даражасини аниқлашда юқори диагностик самарадорликка эга бўлиб, сезгирлиги 89,4%, ўзига хослиги 92,1%, аниқлиги 90,7% ни ташкил этди.

2. Анъанавий УТТ ва компрессион эластографиянинг биргаликда қўлланилиши ташхис сезгирлигини 95,8% гача оширди, бу эса ҳар иккала усулнинг комбинациясини аденомиозни скрининг қилишда қўллаш мақсадга мувофиқлигини кўрсатади.

3. Strain Ratio кўрсаткичи аденомиоз даражаси билан яққол корреляция кўрсатди: I даражада $SR = 2,34 \pm 0,28$, II даражада $SR = 3,87 \pm 0,41$ ($p < 0,01$). $SR > 2,0$ қиймати аденомиознинг бошланғич белгиси сифатида қўлланилиши мумкин.

4. Комплекс даволаш (стандарт терапия + иммунодепрессантлар + магнитотерапия) натижасида оғриқ синдроми 59% га, дисменорея интенсивлиги 57% га камайди, бу стандарт даволашга нисбатан статистик жиҳатдан сезиларли юқори кўрсаткич ($p < 0,01$).

5. Компрессион эластография нафақат ташхислашда, балки даволаш самарадорлигини динамик назорат қилишда ҳам самарали восита бўлиб, репродуктив ёшдаги аёлларда аденомиозни бошқаришнинг комплекс ёндашувига жорий этилиши тавсия этилади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Alison Maclean, Laura Tipple et al. Hormone receptor profile of ectopic and eutopic endometrium in adenomyosis: a systematic review // Human Reproduction Open. — 2025. — Vol. 2025, Issue 1. — hoaf002.

2. Arai N. et al. Adenomyosis-associated recurrent acute cerebral infarction // Surgical Neurology International. — 2022. — Vol. 13. — P. 179.

3. Atlihan U. et al. Vitamin D evaluation in adenomyosis // Turkish Journal of Obstetrics and Gynecology. — 2024. — Vol. 21. — №2. — P. 98.

4. Biasioli A. et al. Innovative Ultrasound Criteria for the diagnosis of adenomyosis // Biomedicine. — 2024. — Vol. 12. — №2. — P. 463.

5. Bulun S.E. et al. Adenomyosis pathogenesis: insights from next-generation sequencing // Human Reproduction Update. — 2021. — Vol. 27. — №6. — P. 1086–1097.

6. Bulun S.E. et al. Endometriosis and adenomyosis: shared pathophysiology // Fertility and Sterility. — 2023. — Vol. 119. — №5. — P. 746–750.

7. Celli V. et al. MRI and adenomyosis: what can radiologists evaluate? // Int. J. Environ. Res. Public Health. — 2022. — Vol. 19. — №10. — P. 5840.

8. d'Ottreppe J. et al. Exploring the Endocrine Mechanisms in Adenomyosis // Endocrines. — 2024. — Vol. 5. — №1. — P. 46–71.

9. Decter D. et al. Sonographic signs of adenomyosis in women with endometriosis // J. Clin. Med. — 2021. — Vol. 10. — №11. — P. 2355.

10. Feitosa B.M. et al. Symptom assessment related to the menstrual cycle to predict endometriosis and adenomyosis // JBRA Assisted Reproduction. — 2025. — Vol. 29. — №1. — P. 127.

11. Kolovos G. et al. Adenomyosis — A Call for Awareness, Early Detection, and Effective Treatment Strategies // *Healthcare*. — 2024. — Vol. 12. — №16. — P. 1641.
12. Komatsu H., Taniguchi F., Harada T. Impact of adenomyosis on perinatal outcomes // *BMC Pregnancy and Childbirth*. — 2023. — Vol. 23. — №1. — P. 579.
13. Moawad G. et al. Adenomyosis: an updated review on diagnosis and classification // *J. Clin. Med.* — 2023. — Vol. 12. — №14. — P. 4828.
14. Schrager S. et al. Adenomyosis: diagnosis and management // *American Family Physician*. — 2022. — Vol. 105. — №1. — P. 33–38.
15. Săsăran V. et al. Transvaginal Ultrasound Combined with Strain-Ratio Elastography for the Concomitant Diagnosis of Uterine Fibroids and Adenomyosis // *J. Clin. Med.* — 2022. — Vol. 11. — P. 3757.
16. Tariq M. et al. Diagnostic accuracy of ultrasound and MRI for diagnosis of adenomyosis // *Pakistan Armed Forces Medical Journal*. — 2022. — Vol. 72. — P. S346.
17. Tellum T., Munro M.G. Classifications of adenomyosis and correlation of phenotypes // *Current Obstetrics and Gynecology Reports*. — 2022. — Vol. 11. — №1. — P. 1–11.
18. Van den Bosch T. Ultrasound diagnosis of endometriosis and adenomyosis // *Best Practice & Research Clinical Obstetrics & Gynaecology*. — 2018. — Vol. 51. — P. 16–24.
19. Жўраева Г.Б., Исраилов Р.И. Аденомиоз ва эндометриозни турли шакллари клиник ва морфологик хусусиятларини ўрганиш // *Oriental Renaissance*. — 2021. — Т. 1. — №8. — С. 605–612.
20. Абдурахманова С.И. Фертил ёшдаги аёлларда бачадон миомасининг аденомиоз билан бирга келишида даволаш алгоритми // *in Library*. — 2024. — Т. 1. — №1. — С. 136–145.
21. Зотова О.А., Артымук Н.В. Аденомиоз: клиника, факторы риска, проблемы диагностики и лечения // *Гинекология*. — 2013. — Т. 15. — №6. — С. 31.
22. Лихачева В.В. и др. Патогенез аденомиоза и его влияние на фертильность в свете иммунологических изменений // *Фундаментальная и клиническая медицина*. — 2024. — Т. 9. — №3. — С. 130–139.
23. Габидуллина Р.И. и др. Аденомиоз: клинические аспекты, влияние на фертильность и исходы беременности // *Гинекология*. — 2020. — №4.
24. Папова Н.С. Оптимизация ведения пациенток с аденомиозом на амбулаторном этапе: автореферат дис. канд. мед. наук. — Волгоград, 2019.
25. Шалина М.А., Ярмолинская М.И. Современные возможности диагностики аденомиоза // *Ж. акуш. и жен. болезн.* — 2020. — №1.
26. Борисевич О.О. и др. Применение физических факторов в лечении хронического эндометрита // *Вестник восстановительной медицины*. — 2023. — №1.
27. Доброхотова Ю.Э. и др. Аномальные маточные кровотечения репродуктивного и перименопаузального периода // *Актуальные вопросы женского здоровья*. — 2022. — №1.
28. Жалилов М.Х., Абдурашидов А.А. Физиотерапия в акушерстве и гинекологии // *SCHOLAR*. — 2024. — Т. 2. — №5. — С. 18–27.

Иктибос учун: Қобилжоновна С.К., Аскарова З.З. Репродуктив ёшдаги аёлларда аденомиознинг эрта диагностикасида компрессион эластография усулининг самарадорлиги // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси*. — 2026. — № 4(24). — Б. 521–528. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19603571>

IMPROVEMENT OF TREATMENT AND PREVENTION METHODS OF DENTAL DISEASES IN PATIENTS WITH CARDIOVASCULAR DISEASES

Muratova S.K., Abdiraimov A.A., Khurramov B., Naimov N.O., Mansurov M.D.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. The relationship between oral diseases and cardiovascular diseases (CVDs) has been widely discussed in modern scientific literature. This review critically evaluates current evidence on improving treatment and prevention methods of dental diseases in patients with cardiovascular pathology. Despite substantial evidence supporting the association between periodontal and cardiovascular diseases, controversies remain regarding causality and clinical implications.

Keywords: cardiovascular diseases, periodontal diseases, inflammation, dental care, prevention

ЮРАК-ҚОН ТОМИР КАСАЛЛИКЛАРИ БЎЛГАН БЕМОРЛАРДА СТОМАТОЛОГИК КАСАЛЛИКЛАРНИ ДАВОЛАШ ВА ПРОФИЛАКТИКА УСУЛЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Муратова С.К., Абдираимов А.А., Хуррамов Б., Наимов Н.О., Мансуров М.Д.

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Оғиз бўшлиғи касалликлари ва юрак-қон томир касалликлари ўртасидаги боғлиқлик замонавий илмий адабиётларда кенг муҳокама қилинмоқда. Ушбу обзорда юрак-қон томир патологияси бўлган беморларда стоматологик касалликларни даволаш ва профилактика усулларини такомиллаштириш бўйича мавжуд илмий маълумотлар танқидий жиҳатдан таҳлил қилинди. Пародонт касалликлари ва юрак-қон томир касалликлари ўртасидаги боғлиқликни тасдиқловчи кўплаб далиллар мавжуд бўлишига қарамасдан, сабаб-оқибат муносабати ва унинг клиник аҳамияти бўйича баҳслар сақланиб қолмоқда.

Калит сўзлар: юрак-қон томир касалликлари, пародонт касалликлари, яллигланиш, стоматологик ёрдам, профилактика

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ПАЦИЕНТОВ С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

Муратова С.К., Абдираимов А.А., Хуррамов Б., Наимов Н.О., Мансуров М.Д.

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Связь между заболеваниями полости рта и сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ) широко обсуждается в современной научной литературе. В данном обзоре проведена критическая оценка современных данных по совершенствованию методов лечения и профилактики стоматологических заболеваний у пациентов с сердечно-сосудистой патологией. Несмотря на значительное количество доказательств, подтверждающих связь между заболеваниями пародонта и сердечно-сосудистыми заболеваниями, остаются противоречия, касающиеся причинно-следственной связи и клинического значения данной взаимосвязи.

Ключевые слова: сердечно-сосудистые заболевания, заболевания пародонта, воспаление, стоматологическая помощь, профилактика

Introduction. The concept of the oral-systemic connection has gained increasing attention in recent years. Periodontal diseases are now considered potential contributors to systemic inflammation and cardiovascular pathology [1,2]. However, the exact nature of this relationship remains controversial, with some studies supporting causality and others suggesting indirect association [3]. Numerous studies demonstrate a significant association between periodontal disease and cardiovascular conditions such as coronary artery disease and stroke [1,4]. At the same time, some authors argue that this relationship may be explained by shared risk factors, including smoking and diabetes mellitus [3]. This indicates that the association is strong, but causality remains uncertain. Inflammation is considered the central link between oral and cardiovascular diseases. Periodontal infections increase systemic levels of inflammatory mediators such as C-reactive protein [2,5]. However, the extent to which periodontal inflammation independently contributes to cardiovascu-

lar outcomes is still debated. Dental treatment of patients with cardiovascular diseases requires special precautions:

- blood pressure monitoring
- stress reduction
- controlled use of vasoconstrictors

Guidelines suggest that epinephrine-containing anesthetics can be used cautiously in most patients

[6]. Management of patients receiving anticoagulants remains controversial. Recent evidence suggests that:

- discontinuation increases thromboembolic risk
- continuation increases manageable bleeding risk

Therefore, most minor dental procedures can be safely performed without stopping anticoagulant therapy [7].

Preventive measures are essential in reducing complications:

- professional oral hygiene
- early diagnosis of periodontal disease
- patient education

Some studies indicate that periodontal therapy reduces systemic inflammation, although its effect on cardiovascular outcomes remains unclear [2,8]. Collaboration between dentists and cardiologists improves patient outcomes and reduces risks during dental procedures [9]. However, such collaboration is not consistently implemented in clinical practice.

Discussion. The literature demonstrates a clear association between oral and cardiovascular diseases, but significant limitations remain:

- heterogeneity of studies
- lack of long-term trials
- inconsistent clinical recommendations

Thus, further research is needed to clarify causal mechanisms.

Conclusion. Improving dental care in patients with cardiovascular diseases requires:

- individualized treatment planning
- emphasis on prevention
- careful pharmacological management
- interdisciplinary collaboration

References:

1. Tonetti M.S., Van Dyke T.E. Periodontitis and atherosclerotic cardiovascular disease. J Clin Periodontol, 2013.
2. Sanz M., et al. Periodontal diseases and cardiovascular diseases. Eur Heart J, 2020.
3. Lockhart P.B., et al. Periodontal disease and atherosclerotic vascular disease. Circulation, 2012.
4. Dietrich T., et al. Periodontal and cardiovascular disease. J Dent Res, 2017.
5. Aarabi G., et al. Inflammation and cardiovascular risk. J Clin Med, 2019.
6. Little J.W., et al. Dental management of the medically compromised patient. Elsevier, 2018.
7. Wahl M.J. Dental surgery in anticoagulated patients. J Am Dent Assoc, 2016.
8. Chapple I.L.C., et al. Periodontal health and systemic disease. J Periodontol, 2013.
9. Linden G.J., et al. Periodontitis and systemic diseases. J Clin Periodontol, 2013.

For citation: Muratova S.K., Abdiraimov A.A., Khurramov B., Naimov N.O., Mansurov M.D. Improvement of treatment and prevention methods of dental diseases in patients with cardiovascular diseases // Bulletin of Fundamental and Clinic Medicine. – 2026. – № 4(24). – P. 529–530. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19603633>

РАҚАМЛИ ДАВРДА BRAIN FOG СИНДРОМИ: ЁШ ПОПУЛЯЦИЯДА КОГНИТИВ ФУНКЦИЯЛАРНИНГ СУБКЛИНИК ПАСАЙИШИ

Музаффарова Н.Ш., Норбеков Р.А., Турсунов Э.И.

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Сўнгги йилларда рақамли технологиялардан фаол фойдаланишнинг ортиши ёш популяция орасида когнитив функцияларнинг ўзгаришига олиб келмоқда. «Брейн фог» синдроми диққатнинг пасайиши, хотира бузилиши, фикрлашнинг секинлашуви ва ақлий чарчоқ билан намоён бўлувчи ҳолат сифатида қаралмоқда. Мазкур мақолада рақамли муҳит таъсирида юзага келувчи субклиник когнитив пасайишнинг эҳтимолӣ патофизиологик механизмлари, жумладан, нейропластик ўзгаришлар, нейромедиаторлар дисбаланси, уйқу бузилишлари ва психоэмоционал омиллар таҳлил қилинган. Шунингдек, ушбу ҳолатнинг эрта диагностикаси ва профилактикасига оид ёндашувлар кўриб чиқилган. Олинган маълумотлар брейн фог синдромининг замонавий неврологияда муҳим муаммо сифатида шаклланаётганини кўрсатади.

Калим сўзлар: брейн фог, когнитив дисфункция, рақамли муҳит, субклиник пасайиш, диққат бузилиши, хотира пасайиши, нейропластиклик, уйқу бузилиши.

BRAIN FOG SYNDROME IN THE DIGITAL ERA: SUBCLINICAL DECLINE OF COGNITIVE FUNCTIONS IN THE YOUNG POPULATION

Muzaffarova N.Sh., Norbekov R.A., Tursunov E.I.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. In recent years, the widespread use of digital technologies has been associated with changes in cognitive functions among the young population. Brain fog syndrome is increasingly recognized as a condition characterized by reduced attention, memory impairment, slowed thinking, and mental fatigue. This article explores the potential pathophysiological mechanisms underlying subclinical cognitive decline related to digital exposure, including neuroplastic changes, neurotransmitter imbalance, sleep disturbances, and psycho-emotional factors. Approaches to early diagnosis and prevention are also discussed. The findings suggest that brain fog is emerging as a significant issue in modern neurology.

Keywords: brain fog, cognitive dysfunction, digital environment, subclinical decline, attention impairment, memory impairment, neuroplasticity, sleep disturbance.

СИНДРОМ BRAIN FOG В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ: СУБКЛИНИЧЕСКОЕ СНИЖЕНИЕ КОГНИТИВНЫХ ФУНКЦИЙ У МОЛОДОЙ ПОПУЛЯЦИИ

Музаффарова Н.Ш., Норбеков Р.А., Турсунов Э.И.

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. В последние годы активное использование цифровых технологий сопровождается изменениями когнитивных функций у молодой популяции. Синдром brain fog рассматривается как состояние, характеризующееся снижением концентрации внимания, ухудшением памяти, замедлением мышления и повышенной умственной утомляемостью. В статье анализируются возможные патофизиологические механизмы субклинического когнитивного снижения, ассоциированного с цифровой нагрузкой, включая нейропластические изменения, дисбаланс нейромедиаторов, нарушения сна и психоэмоциональные факторы. Также рассматриваются подходы к ранней диагностике и профилактике данного состояния. Полученные данные свидетельствуют о формировании brain fog как значимой проблемы современной неврологии.

Ключевые слова: brain fog, когнитивная дисфункция, цифровая среда, субклиническое снижение, нарушение внимания, ухудшение памяти, нейропластичность, нарушения сна.

Кириш. Сўнгги ўн йилликларда рақамли технологиялар жадал ривожланиб, инсон ҳаётининг ажралмас қисмига айланди. Жаҳон микёсида интернет фойдаланувчилари сони 5 миллиарддан ортиқни ташкил этмоқда, уларнинг катта қисми ёшлар ҳиссасига тўғри келади. Турли тадқиқотларга кўра, 18–35 ёшдаги аҳоли қунига ўртача 6–9 соат вақтни экран қаршисида ўтказди. Бу ҳолат миянинг когнитив функциялари, айниқса диққат, хотира ва фикрлаш тезлигига салбий таъсир кўрсатиши мумкин.

Сўнгги йилларда клиник амалиётда ва илмий адабиётларда “брейн фог” атамаси кенг қўлланилмоқда. У диққатнинг пасайиши, хотиранинг ёмонлашуви, фикрлаш жараёнининг секинлашуви ва умумий ақлий чарчоқ билан тавсифланувчи ҳолат сифатида таърифланади. Айрим эпидемиологик маълумотларга кўра, ёш популяциянинг 25–40% қисмида турли даражада когнитив шикоятлар кузатилиши мумкин, аммо уларнинг катта қисми субклиник характерга эга бўлиб, расмий ташхис қўйилмайди.

Рақамли муҳит таъсирида юзага келадиган ушбу когнитив ўзгаришлар кўп омилли характерга эга. Доимий ахборот оқими ва кўп вазифалилик (multitasking) диққат ресурсларининг тарқоқлашишига олиб келади. Шунингдек, экранлардан чиқадиган кўк нур (blue light) циркад ритмларни бузиб, уйку сифатини пасайтиради. Тадқиқотлар шуни кўрсатадики, уйку давомийлигининг 6 соатдан кам бўлиши когнитив функцияларнинг 20–30% га пасайиши билан боғлиқ бўлиши мумкин. Бундан ташқари, ижтимоий тармоқлар орқали доимий стимуляция допамин тизимида ўзгаришларга олиб келиб, диққатни узоқ вақт сақлаб туриш қобилиятини сусайтиради.

Патофизиологик жиҳатдан қаралганда, брейн фог синдроми нейропластикликнинг ўзгариши, нейромедиаторлар мувозанатининг бузилиши (айниқса, допамин ва серотонин), шунингдек, сурункали психоэмоционал стресс билан боғлиқ бўлиши мумкин. Айрим тадқиқотларда нейроинфламматор жараёнлар ва микроглия фаоллашуви ҳам когнитив пасайишда муҳим омил сифатида кўрсатилган.

Шу билан бирга, брейн фог синдроми кўп ҳолларда клиник амалиётда етарлича баҳоланмайди ва “функционал шикоят” сифатида қабул қилинади. Бироқ унинг узоқ муддатли оқибатлари — меҳнат қобилиятининг пасайиши, таълим самарадорлигининг камайиши ва ҳаёт сифатининг ёмонлашиши — уни жиддий неврологик муаммо сифатида кўриб чиқиш зарурлигини кўрсатади.

Шу муносабат билан мазкур тадқиқотнинг мақсади рақамли давр шароитида брейн фог синдромининг шаклланиш омиллари, унинг патогенетик механизмлари ва клиник аҳамиятини чуқур таҳлил қилишдан иборат.

Тадқиқотнинг мақсади: Рақамли муҳит таъсирида ёш популяцияда шаклланувчи брейн фог синдромининг клиник-когнитив хусусиятларини, унинг патогенетик механизмларини ва субклиник когнитив пасайиш билан боғлиқлигини аниқлаш ҳамда баҳолаш.

Тадқиқот вазифалари:

Ёш популяцияда брейн фог синдромининг тарқалиш частотаси ва клиник кўринишларини ўрганиш.

Брейн фог билан боғлиқ когнитив бузилишларни (диққат, хотира, фикрлаш тезлиги) комплекс баҳолаш.

Рақамли қурилмалардан фойдаланиш давомийлиги ва интенсивлигининг когнитив функцияларга таъсирини таҳлил қилиш.

Уйку сифати, психоэмоционал ҳолат (стресс, анксиете) ва брейн фог ўртасидаги ўзаро боғлиқликни аниқлаш.

Брейн фог синдромининг эҳтимолий патогенетик механизмларини (нейропластик ўзгаришлар, нейромедиатор дисбаланси) илмий адабиётлар асосида таҳлил қилиш.

Субклиник когнитив пасайишни эрта аниқлаш ва баҳолаш мезонларини ишлаб чиқиш.

Материаллар ва усуллар тадқиқоти. Мазкур тадқиқот 2025–2026 йиллар давомида ўтказилган кесимли (cross-sectional) аналитик тадқиқот бўлиб, унда 18–35 ёшдаги 120 нафар респондент иштирок этди. Тадқиқотда иштирок этиш ихтиёрий асосда амалга оширилди ва барча катнашчилардан ёзма равишда хабардор қилинган розилик олинди.

Иштирокчилар рақамли қурилмалардан фойдаланиш даражасига қараб икки гуруҳга ажратилди: асосий гуруҳ (n=70) — кунлик 6 соат ва ундан ортиқ вақт давомида рақамли қурилмалардан фойдаланувчилар ҳамда назорат гуруҳи (n=50) — кунлик 3 соатгача фойдаланувчилар. Рақамли юклама смартфон, компьютер ва бошқа электрон қурилмалардан фойдаланиш давомийлиги, шунингдек ижтимоий тармоқларда фаоллик даражаси асосида баҳоланди.

Тадқиқотга киритиш мезонларига 18–35 ёшда бўлиш, неврологик ва психиатрия касалликларининг оғир шакллари мавжуд эмаслиги ҳамда тадқиқотда иштирок этишга розилик киритилди. Чиқариш мезонларига органик мия шикастланишлари, психотроп препаратлар қабул қилиниши ва оғир соматик патологиялар киритилди.

Когнитив функцияларни баҳолаш комплекс нейропсихологик ёндашув асосида амалга оширилди. Диққат, ишчи хотира ва фикрлаш тезлиги махсус тестлар ёрдамида аниқланди, қисқа муддатли хотирани баҳолаш учун вербал ва визуал методикалар қўлланилди. Психоэмоционал ҳолатни баҳолаш мақсадида HADS (Hospital Anxiety and Depression Scale) шкаласидан фойдаланилди.

Уйку сифати Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) сўровномаси ёрдамида баҳоланди. Шу билан бирга, иштирокчиларнинг уйку давомийлиги, ухлаш вақти ва тунги уйғонишлар частотаси ҳисобга олинди. Рақамли юклама даражаси махсус анкета орқали аниқланиб, экран олдида ўтказилган вақт, ижтимоий тармоқлардан фойдаланиш частотаси ва кўп вазифалилик даражаси баҳоланди.

Олинган маълумотлар статистик дастурлар ёрдамида қайта ишланди. Натижалар ўртача қиймат (М) ва стандарт огиш (SD) кўринишида тақдим этилди. Гуруҳлар ўртасидаги фарқлар Student t-тести орқали баҳоланди, кўрсаткичлар ўртасидаги ўзаро боғлиқлик Пирсон корреляция коэффиценти ёрдамида аниқланди. Статистик аҳамиятлилиги даражаси $p < 0,05$ деб қабул қилинди.

Натижалар. Тадқиқот натижалари шуни кўрсатдики, юқори рақамли юкламага эга бўлган иштирокчиларда (≥ 6 соат/кун) когнитив функциялар назорат гуруҳига нисбатан статистик аҳамиятли даражада пасайган.

Асосий гуруҳда диққат концентрацияси кўрсаткичлари сезиларли даражада паст бўлиб, тест натижалари ўртача 15–20% га ёмонлашгани аниқланди ($p < 0,05$). Шунингдек, ишчи хотира ҳажми камайиши ва маълумотни қайта ишлаш тезлигининг пасайиши кузатилди.

Қисқа муддатли хотирани баҳолашда асосий гуруҳ иштирокчиларида маълумотни эслаб қолиш кўрсаткичи назорат гуруҳига нисбатан 12–18% га паст бўлди. Бу ҳолат субклиник когнитив пасайишнинг мавжудлигини тасдиқлайди.

Психоэмоционал ҳолат таҳлили HADS шкаласи бўйича юқори рақамли юклама гуруҳида ташвиш ва депрессияга мойиллик юқори эканлигини кўрсатди ($p < 0,05$). Айниқса, анксиете даражаси когнитив пасайиш билан ўртача кучдаги мусбат корреляция ($r = 0,42$) кўрсатди.

Уйку сифати таҳлили (PSQI) асосий гуруҳда уйку бузилишлари сезиларли даражада кўплигини аниқлади. Уйку давомийлиги 6 соатдан кам бўлган иштирокчиларда когнитив кўрсаткичлар янада паст бўлиб, бу омил билан манфий корреляция ($r = -0,48$) қайд этилди.

Рақамли юклама ва когнитив функциялар ўртасида тўғридан-тўғри боғлиқлик аниқланди: экран олдида ўтказилган вақт ортиши билан диққат ва хотира кўрсаткичлари пасайиб борди ($r = -0,51$).

Олинган натижалар брейн фог синдромининг ёш популяцияда субклиник шаклда кенг тарқалганини ва унинг асосий омиллари сифатида рақамли юклама, уйку бузилиши ва психоэмоционал стресс иштирок этишини кўрсатади.

Хулоса. Рақамли технологиялардан ортиқча фойдаланиш ёш популяцияда когнитив функцияларнинг субклиник пасайишига олиб келувчи муҳим омиллардан бири ҳисобланади. Мазкур тадқиқот натижалари брейн фог синдромининг клиник аҳамиятини тасдиқлаб, уни замонавий неврологиянинг долзарб муаммоси сифатида кўриб чиқиш зарурлигини кўрсатди.

Аниқландики, юқори рақамли юклама диққат, хотира ва фикрлаш тезлигининг пасайиши билан боғлиқ бўлиб, бу ўзгаришлар кўп ҳолларда клиник жиҳатдан ифодаланмаган, яъни субклиник характерга эга. Шу билан бирга, уйку сифати бузилиши ва психоэмоционал омиллар ушбу жараёни кучайтирувчи асосий патогенетик механизмлар сифатида намоён бўлди.

Брейн фог синдроми нейропластик ўзгаришлар, нейромедиаторлар дисбаланси ва хроник стресс билан боғлиқ кўп омилли ҳолат бўлиб, уни эрта аниқлаш ва профилактика қилиш муҳим аҳамиятга эга.

Амалиёт нуктаи назаридан, рақамли юкламани оптималлаштириш, уйку гигиенасини яхшилаш ва психоэмоционал ҳолатни барқарорлаштириш когнитив функцияларни сақлашда самарали чоралар ҳисобланади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Small G.W., Lee J., Kaufman A. et al. Brain health consequences of digital technology use. World Psychiatry. 2020.
2. Montag C., Elhai J.D. Internet addiction and problematic smartphone use. Addictive Behaviors Reports. 2021.
3. Yuan K., Cheng P., Dong T. et al. Neuroimaging of internet addiction. Neuroscience & Biobehavioral Reviews. 2022.
4. Lim J., Dinges D.F. Sleep deprivation and cognition. Sleep. 2020.
5. Killgore W.D.S. Effects of sleep loss on cognition. Progress in Brain Research. 2021.
6. Loh K.K., Kanai R. Higher media multitasking is linked to distractibility. PNAS. 2020.
7. Ophir E., Nass C., Wagner A.D. Cognitive control in media multitaskers. PNAS. 2021.
8. Twenge J.M. Digital media use and mental health. Journal of Adolescence. 2020.
9. Firth J., Torous J., Stubbs B. The “online brain”. World Psychiatry. 2020.
10. Sandi C. Stress and cognition. Nature Reviews Neuroscience. 2021.
11. Liston C., McEwen B.S., Casey B.J. Psychosocial stress and prefrontal cortex. Neuron. 2021.

12. Volkow N.D., Baler R.D. Dopamine system and behavior. *Neuron*. 2020.
13. Robbins T.W., Arnsten A.F.T. Prefrontal cortex and cognition. *Neuron*. 2021.
14. Cain M.S., Mitroff S.R. Distractibility and attention. *Attention, Perception & Psychophysics*. 2020.
15. Ward A.F. Cognitive costs of smartphone presence. *Journal of the Association for Consumer Research*. 2021.
16. Wilmer H.H., Sherman L.E., Chein J.M. Smartphones and cognition. *Frontiers in Psychology*. 2021.
17. Gazzaley A., Rosen L.D. *The Distracted Mind*. MIT Press. 2020.
18. Bastien C.H. Sleep quality index validation. *Sleep Medicine*. 2020.
19. Becker M.W., Alzahabi R., Hopwood C.J. Media multitasking and attention. *Psychonomic Bulletin & Review*. 2021.
20. Uncapher M.R., Wagner A.D. Media multitasking and memory. *Psychonomic Bulletin & Review*. 2020.
21. Kushlev K., Dunn E.W. Checking email and stress. *Computers in Human Behavior*. 2020.
22. Przybylski A.K. Digital screen time and well-being. *Nature Human Behaviour*. 2021.
23. OECD Report. Digital environments and cognitive skills. 2022.
24. WHO. Guidelines on digital health and well-being. 2021.
25. American Academy of Neurology. Cognitive health and lifestyle. 2022.

Иқтибос учун: Музаффарова Н.Ш, Норбеков Р.А, Турсунов Э.И. Рақамли даврда Brain fog синдроми: ёш популяцияда когнитив функцияларнинг субклиник пасайиши // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси*. – 2026. – № 4(24). – Б. 531–534. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19603734>

РОЛЬ КАТЕХОЛАМИНОВ В ПАТОГЕНЕЗЕ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ ШОКА: ОТ АДАПТАЦИИ К ПОВРЕЖДЕНИЮ

Намозова Г.И., Тураханов И.Н., Комилжонова С.Г.

Ташкентский Государственный Медицинский Университет Чирчикский филиал,
г. Чирчик, Узбекистан

Резюме. В работе рассмотрена роль катехоламинов в патогенезе различных форм шока (гиповолемического, кардиогенного, септического и анафилактического). Целью исследования является анализ двойственной роли катехоламинов как ключевых медиаторов адаптационного ответа и факторов, способствующих прогрессированию органной дисфункции. Показано, что при гиповолемическом шоке выброс катехоламинов обеспечивает компенсацию за счёт тахикардии и вазоконстрикции, однако при потере более 30–40% объёма циркулирующей крови их компенсаторный эффект становится недостаточным.

Ключевые слова: катехоламины, шок, патогенез шока, септический шок, кардиогенный шок, гиповолемический шок, анафилактический шок, вазопрессоры, перфузия, катехоламинорезистентность

THE ROLE OF CATECHOLAMINES IN THE PATHOGENESIS OF VARIOUS FORMS OF SHOCK: FROM ADAPTATION TO DAMAGE

Namozova G.I., Turakhanov I.N., Komiljonova S.G.

Chirchik Branch of the Tashkent State Medical University, Chirchik, Uzbekistan

Resume. This study examines the role of catecholamines in the pathogenesis of various forms of shock (hypovolemic, cardiogenic, septic, and anaphylactic). The aim of the study is to analyze the dual role of catecholamines as key mediators of the adaptive response and as factors contributing to the progression of organ dysfunction. In hypovolemic shock, catecholamine release provides compensation through tachycardia and vasoconstriction; however, when more than 30-40% of circulating blood volume is lost, their effect becomes insufficient.

Key words: catecholamines, shock, shock pathogenesis, septic shock, cardiogenic shock, hypovolemic shock, anaphylactic shock, vasopressors, perfusion, catecholamine resistance

ШОКНИНГ ТУРЛИ ШАКЛЛАРИ ПАТОГЕНЕЗИДА КАТЕКОЛАМИНЛАРНИНГ РОЛИ: АДАПТАЦИЯДАН ШИКАСТЛАНИШГАЧА

Намозова Г.И., Тураханов И.Н., Комилжонова С.Г.

Тошкент давлат тиббиёт университети Чирчик филиали, Чирчик ш., Ўзбекистон

Резюме. Мазкур ишда турли хил шок турларида (гиповолемик, кардиоген, септик ва анафилактик) катехоламинларнинг патогенездаги роли кўриб чиқилган. Тадқиқотнинг мақсади катехоламинларнинг адаптацион жавобдаги асосий медиатор сифатидаги ҳамда орган этишмовчилиги ривожланишига ҳисса қўшувчи икки томонлама ролини таҳлил қилишдан иборат. Гиповолемик шокда катехоламинлар ажралиши тахикардия ва вазоконстрикция орқали компенсацияни таъминлайди, бироқ қон ҳажмининг 30-40% дан ортиқ йўқотилишида уларнинг самараси етарли бўлмайди.

Калим сўзлар: катехоламинлар, шок, шок патогенези, септик шок, кардиоген шок, гиповолемик шок, анафилактик шок, вазопрессорлар, перфузия, катехоламин резистентлиги

e-mail: gulnoza.namozova1607@protonmail.com

Шок представляет собой критическое состояние, характеризующееся несоответствием между доставкой кислорода и метаболическими потребностями тканей, что приводит к развитию клеточной дисфункции и полиорганной недостаточности. Несмотря на значительный прогресс в интенсивной терапии, шок остаётся одной из ведущих причин летальности в клинической практике: смертность при септическом шоке достигает 30-50%, при кардиогенном – 40-60%, что подчеркивает актуальность изучения его патогенеза[6,11].

Ключевую роль в адаптационном ответе организма на шок играет активация симпатoadреналовой системы с высвобождением катехоламинов -адреналина, норадреналина и дофамина. На ранних

этапах они обеспечивают поддержание системной гемодинамики за счёт увеличения частоты сердечных сокращений, вазоконстрикции и перераспределения кровотока в пользу жизненно важных органов. Однако по мере прогрессирования шока их эффекты приобретают двойственный характер.

Современные исследования показывают, что длительная и чрезмерная активация катехоламинновой системы способствует развитию тканевой гипоксии, нарушению микроциркуляции, десенситизации адренорецепторов и формированию катехоламинорезистентности[13]. В частности, при септическом шоке даже на фоне высоких уровней эндогенных катехоламинов развивается вазоплегия, требующая применения экзогенных вазопрессоров[13].

Таким образом, катехоламины выступают не только как ключевые медиаторы компенсации, но и как потенциальные факторы, усугубляющие течение шока. Это обуславливает необходимость дифференцированного подхода к их применению в зависимости от формы шока и стадии патологического процесса. Целью данной работы является анализ роли катехоламинов в патогенезе различных форм шока и оценка их влияния на исход заболевания.

Септический шок: роль эндогенных и экзогенных катехоламинов. Септический шок характеризуется выраженными нарушениями сосудистого тонуса, микроциркуляции и клеточного метаболизма, приводящими к развитию тканевой гипоксии и полиорганной недостаточности. Летальность при данной форме шока достигает 30-50%, несмотря на современные методы интенсивной терапии[6,11].

В ответ на системную воспалительную реакцию происходит активация симпатoadреналовой системы с увеличением уровня эндогенных катехоламинов. Однако, несмотря на их высокий уровень, развивается вазоплегия и снижение чувствительности адренорецепторов, обусловленные избыточной продукцией оксида азота и медиаторов воспаления[13]. В результате формируется состояние катехоламинорезистентности, при котором сосуды не способны адекватно реагировать на эндогенные стимулы.

В этих условиях требуется применение экзогенных катехоламинов. Согласно современным рекомендациям, норадреналин является вазопрессором первой линии при септическом шоке и используется для достижения целевого среднего артериального давления ≥ 65 мм рт. ст., необходимого для поддержания органной перфузии[6,14].

Потребность в высоких дозах катехоламинов имеет важное прогностическое значение. Установлено, что доза норадреналина $\geq 0,3$ мкг/кг/мин ассоциирована с увеличением риска летального исхода более чем в 10 раз, тогда как при дозах $\geq 0,6$ мкг/кг/мин значительно возрастает ранняя смертность[10,14]. Таким образом, увеличение дозы катехоламинов отражает тяжесть шока и степень катехоламинорезистентности.

Дополнительным маркером тяжести является уровень лактата: его повышение более 2 ммоль/л отражает нарушение тканевой перфузии и переход к анаэробному метаболизму, а также частично связано с β -адренергической стимуляцией, усиливающей гликолиз[12].

Важным фактором является также время начала терапии. Раннее назначение норадреналина (в течение первого часа) способствует более быстрому восстановлению гемодинамики и снижению летальности, тогда как задержка его введения ассоциирована с ухудшением прогноза[6].

Таким образом, катехоламины при септическом шоке выполняют двойственную роль. Эндогенные катехоламины отражают попытку организма компенсировать критическое состояние, однако их эффективность ограничена развитием рецепторной резистентности. Экзогенные катехоламины необходимы для поддержания артериального давления, однако высокая потребность в них является маркером тяжести состояния и неблагоприятного исхода.

Следовательно, катехоламины при септическом шоке следует рассматривать не только как средство терапии, но и как важный патофизиологический и прогностический показатель, отражающий степень декомпенсации сосудистой регуляции.

Анафилактический шок: роль эндогенных и экзогенных катехоламинов. Анафилактический шок представляет собой острое системное аллергическое состояние, характеризующееся быстрым развитием вазодилатации, повышением сосудистой проницаемости и выраженными нарушениями гемодинамики. Частота анафилаксии в популяции достигает 1-3%, при этом летальность составляет около 0,5-1% при своевременном лечении и может возрасти при задержке оказания медицинской помощи[8].

В основе патогенеза лежит массивный выброс медиаторов тучных клеток, включая гистамин, лейкотриены и простагландины, что приводит к снижению системного сосудистого сопротивления, гипотензии и развитию отёка тканей. В ответ на это происходит активация симпатoadреналовой системы с увеличением уровня эндогенных катехоламинов. Однако их компенсаторный эффект оказы-

вается недостаточным вследствие молниеносного развития вазодилатации и повышения сосудистой проницаемости.

В отличие от септического шока, при анафилаксии отсутствует выраженная катехоламинорезистентность, что определяет высокую эффективность экзогенных катехоламинов[8]. Адреналин является препаратом первой линии и должен вводиться как можно раньше. Рекомендуемая доза составляет 0,3-0,5 мг внутримышечно с возможным повторением каждые 5-15 минут при отсутствии эффекта.

Фармакологическое действие адреналина охватывает основные звенья патогенеза анафилаксии. Стимуляция α_1 -адренорецепторов вызывает вазоконстрикцию и повышение артериального давления, β_1 -адренорецепторов - увеличение сердечного выброса, а β_2 -адренорецепторов - бронходилатацию и подавление дегрануляции тучных клеток.

Клинические данные свидетельствуют, что раннее введение адреналина значительно снижает риск летального исхода, тогда как задержка его применения ассоциирована с увеличением частоты тяжёлых осложнений и смертности. При рефрактерной гипотензии может потребоваться внутривенное введение адреналина в дозах 0,05-0,1 мкг/кг/мин[8].

Таким образом, при анафилактическом шоке катехоламины играют ключевую патогенетическую роль. Эндогенные катехоламины отражают попытку организма компенсировать острые гемодинамические нарушения, однако их действие недостаточно. Экзогенный адреналин, напротив, является жизненно необходимым препаратом, одновременно устраняющим гемодинамические нарушения и воздействующим на основные механизмы аллергической реакции.

Следовательно, катехоламины при анафилактическом шоке следует рассматривать как центральный элемент терапии, от своевременного применения которого напрямую зависит исход заболевания.

Кардиогенный шок: роль эндогенных и экзогенных катехоламинов. Кардиогенный шок развивается вследствие выраженного снижения насосной функции сердца, приводящего к уменьшению сердечного выброса (сердечный индекс $<2,2$ л/мин/м²) и нарушению перфузии жизненно важных органов. Наиболее частой причиной является острый инфаркт миокарда. Летальность при кардиогенном шоке остаётся высокой и достигает 40-60%, несмотря на современные методы лечения[7].

В ответ на снижение сердечного выброса происходит активация симпатoadреналовой системы с увеличением уровня эндогенных катехоламинов. Их действие направлено на поддержание артериального давления за счёт тахикардии и периферической вазоконстрикции. Однако данная компенсация носит ограниченный и потенциально неблагоприятный характер.

Повышение уровня катехоламинов приводит к увеличению частоты сердечных сокращений (часто >100 - 110 уд/мин) и постнагрузки, что сопровождается ростом потребности миокарда в кислороде. В условиях ишемии это способствует углублению повреждения миокарда и формированию «порочного круга»: снижение сократимости → активация катехоламинов → усиление ишемии → дальнейшее ухудшение функции сердца.

Применение экзогенных катехоламинов является необходимым для поддержания системной гемодинамики, однако их использование связано с рядом неблагоприятных эффектов. В рандомизированном исследовании SOAP II было показано, что применение дофамина по сравнению с норадреналином сопровождается более высокой частотой аритмий (24,1% против 12,4%) и увеличением летальности у пациентов с кардиогенным шоком[9].

Дополнительные исследования демонстрируют, что высокая потребность в катехоламинах ассоциирована с неблагоприятным прогнозом. Увеличение доз вазопрессоров сопровождается ростом смертности, что отражает тяжесть состояния и выраженность гемодинамических нарушений.

Кроме того, катехоламины обладают прямым кардиотоксическим эффектом. Их избыточное воздействие приводит к кальциевой перегрузке кардиомиоцитов, оксидативному стрессу и активации апоптоза. Это может способствовать развитию стресс-индуцированной кардиомиопатии и дальнейшему снижению сократительной функции миокарда[10].

Таким образом, при кардиогенном шоке катехоламины выполняют двойственную роль. Эндогенные катехоламины обеспечивают кратковременную компенсацию, однако их избыточная активация способствует ухудшению ишемии и повреждению миокарда. Экзогенные катехоламины необходимы для поддержания гемодинамики, но их применение должно быть строго дозированным, поскольку высокая потребность в них является маркером тяжести состояния и неблагоприятного исхода.

Следовательно, при кардиогенном шоке катехоламины следует рассматривать как необходимый, но потенциально повреждающий фактор, использование которого требует баланса между поддержанием перфузии и минимизацией нагрузки на миокард.

Гиповолемический шок: роль эндогенных и экзогенных катехоламинов. Гиповолемический шок развивается вследствие уменьшения объема циркулирующей крови, что приводит к снижению венозного возврата, уменьшению сердечного выброса и нарушению тканевой перфузии. Критическим считается снижение объема циркулирующей крови более чем на 30-40%, при котором развивается выраженная гипотензия и декомпенсация кровообращения[5].

В ответ на гиповолемию происходит активация симпатoadреналовой системы с увеличением уровня эндогенных катехоламинов. Их действие направлено на поддержание системной гемодинамики за счёт тахикардии (частота сердечных сокращений часто превышает 100-120 уд/мин) и выраженной периферической вазоконстрикции. Это обеспечивает перераспределение кровотока в пользу жизненно важных органов — головного мозга и сердца[5].

В отличие от септического шока, чувствительность сосудов к катехоламинам при гиповолемии сохраняется, что делает эндогенные катехоламины эффективным компенсаторным механизмом на ранних этапах. Однако их эффект носит ограниченный характер и не устраняет основную причину шока — дефицит объема циркулирующей крови.

При прогрессировании гиповолемии и снижении объема циркулирующей крови более 40% компенсаторные возможности катехоламинов истощаются, развивается выраженная гипотензия (систолическое артериальное давление <90 мм рт. ст.) и нарастает тканевая гипоксия. Длительная вазоконстрикция приводит к нарушению микроциркуляции, снижению капиллярного кровотока и усугублению ишемического повреждения тканей.

Применение экзогенных катехоламинов при гиповолемическом шоке имеет ограниченное значение. Использование вазопрессоров до восстановления объема циркулирующей крови может привести к усилению вазоконстрикции и дальнейшему ухудшению тканевой перфузии. В связи с этим современная тактика лечения предполагает первоочередное проведение инфузионной терапии с последующим применением катехоламинов только при сохраняющейся гипотензии[4].

Следует учитывать, что у пациентов пожилого возраста чувствительность β -адренорецепторов снижается, что ограничивает эффективность тахикардии как компенсаторного механизма и повышает риск декомпенсации.

Таким образом, при гиповолемическом шоке катехоламины играют ключевую роль в ранней фазе компенсации, обеспечивая поддержание системной гемодинамики. Однако их действие носит временный характер и не устраняет основную причину патологического процесса. Экзогенные катехоламины должны применяться с осторожностью, так как их избыточное использование может способствовать ухудшению микроциркуляции и прогрессированию тканевой гипоксии.

Таблица 1.

Роль катехоламинов при различных формах шока

Тип шока	Роль эндогенных катехоламинов	Чувствительность рецепторов	Роль экзогенных катехоламинов	Клиническое значение
Септический	Высокий уровень, но неэффективны	Снижена десенситизация	Норадреналин – препарат выбора ($\geq 0,1-0,3$ мкг/кг/мин)	Маркер тяжести и прогноза
Анафилактический	Повышены, но недостаточны	Сохранена	Адреналин 0,3-0,5 мг (первый выбор)	Патогенетическая терапия
Кардиогенный	Повышены (гиперактивации)	Частично сохранена	Ограниченно, риск ишемии и аритмий	Двойственная роль
Гиповолемический	Эффективны на ранних стадиях	Сохранена	Вторично, после инфузии	Временная компенсация

Проведённый анализ показывает, что катехоламины являются универсальным звеном патофизиологического ответа при различных формах шока, однако их роль не является однозначно благоприятной и определяется характером основного патологического процесса, стадией шока и состоянием рецепторного аппарата.

Активация симпатoadреналовой системы с повышением уровня эндогенных катехоламинов является ранним и обязательным компонентом компенсаторной реакции, направленной на поддержание системной гемодинамики. Однако дальнейшее течение шока демонстрирует, что данный механизм имеет ограниченную эффективность и может трансформироваться в фактор повреждения.

Наиболее наглядно это проявляется при септическом шоке, где, несмотря на высокий уровень эндогенных катехоламинов, развивается катехоламинорезистентность. Клинические данные свидетельствуют, что потребность в норадреналине $\geq 0,3$ мкг/кг/мин ассоциирована с резким увеличением летальности, что отражает не только тяжесть состояния, но и глубину нарушений сосудистой регуляции. Таким образом, в данном случае катехоламины выступают не столько как эффективный компенсаторный механизм, сколько как маркер декомпенсации [10,13].

В кардиогенном шоке избыточная активация катехоламинов приводит к увеличению потребности миокарда в кислороде и усилению ишемического повреждения. Формируется «порочный круг», при котором компенсаторная стимуляция усугубляет исходное нарушение. Это подтверждается клиническими данными о повышении частоты аритмий и летальности при использовании катехоламиновой поддержки, особенно при применении дофамина [7].

В отличие от этого, при гиповолемическом шоке чувствительность сосудов к катехоламинам сохраняется, что обеспечивает эффективность эндогенной компенсации на ранних этапах. Однако данный механизм не устраняет дефицит объема циркулирующей крови, что ограничивает его клиническую значимость и требует приоритетного восстановления объема [5].

Анафилактический шок представляет собой противоположную модель, при которой катехоламины оказывают максимально выраженный терапевтический эффект. Несмотря на активацию эндогенных механизмов, их действие оказывается недостаточным из-за скорости развития реакции. Экзогенный адреналин, воздействуя одновременно на α - и β -адренорецепторы, не только стабилизирует гемодинамику, но и влияет на ключевые звенья патогенеза, включая дегрануляцию тучных клеток [8].

Таким образом, полученные данные позволяют рассматривать катехоламины как двуфункциональный фактор, объединяющий адаптационные и повреждающие механизмы. Их эффективность определяется балансом между компенсаторным потенциалом и выраженностью патологических изменений.

Современные представления о терапии шока всё больше смещаются в сторону ограничения избыточной катехоламиновой стимуляции и поиска альтернативных методов поддержки гемодинамики. Это связано с пониманием того, что высокая потребность в катехоламинах отражает тяжесть состояния и может способствовать прогрессированию органной дисфункции.

Следовательно, рациональное применение катехоламинов требует индивидуализированного подхода с учётом патофизиологических особенностей каждой формы шока, а также оценки их не только как терапевтического средства, но и как прогностического показателя.

Выводы:

1. Катехоламины являются ключевыми медиаторами адаптационного ответа организма при различных формах шока, обеспечивая поддержание системной гемодинамики за счёт тахикардии и вазоконстрикции.

2. Роль катехоламинов носит двойственный характер и зависит от патогенеза шока: при гиповолемическом шоке они выполняют компенсаторную функцию, при кардиогенном — могут усугублять ишемию миокарда, при септическом — их эффективность снижается вследствие катехоламинорезистентности, а при анафилактическом — являются основным патогенетически обоснованным методом терапии.

3. Высокая потребность в экзогенных катехоламинах, в частности норадреналине в дозах $\geq 0,3$ мкг/кг/мин при септическом шоке, ассоциирована с неблагоприятным прогнозом и отражает тяжесть состояния пациента.

4. Эндогенные катехоламины не всегда обеспечивают адекватную компенсацию: при септическом шоке развивается снижение чувствительности рецепторов, при анафилаксии их эффект ограничен скоростью развития реакции, а при гиповолемии — дефицитом объема циркулирующей крови.

5. Применение экзогенных катехоламинов должно быть дифференцированным и учитывать патофизиологические особенности шока: при септическом шоке показан норадреналин как препарат первой линии, при анафилактическом — адреналин, тогда как при гиповолемическом шоке приоритетом является инфузионная терапия.

6. Современная терапия шока направлена на минимизацию избыточной катехоламиновой стимуляции и раннюю коррекцию первопричины, что позволяет улучшить прогноз и снизить риск органной дисфункции.

Список литературы:

1. Рахимов А.А., Юлдашев Б.Б. Современные подходы к лечению септического шока в условиях реанимации // Журнал теоретической и клинической медицины. - 2022. - №3. - С. 45–49.

2. Каримов Ш.К., Абдуллаев Ж.А. Гемодинамические нарушения при различных формах шока // Вестник Самаркандского медицинского института. - 2023. - №2. - С. 78-82.
3. Клинические рекомендации. Септический шок. - Москва: Российское общество анестезиологов-реаниматологов, 2023.
4. Гельфанд Б.Р., Салтанов А.И. Интенсивная терапия: национальное руководство. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022.
5. Мороз В.В., Власенко А.В. Патопфизиология критических состояний. - М.: Медицина, 2021.
6. Evans L., Rhodes A., Alhazzani W. et al. Surviving Sepsis Campaign: International guidelines for management of sepsis and septic shock 2021 // Intensive Care Medicine. - 2021. - Vol. 47. - P. 1181-1247.
7. McDonagh T.A., Metra M., Adamo M. et al. ESC Guidelines for the management of cardiogenic shock // European Heart Journal. - 2023.
8. Cardona V., Ansotegui I.J., Ebisawa M. et al. World Allergy Organization anaphylaxis guidance 2020 (updated 2023) // World Allergy Organization Journal. - 2020.
9. De Backer D., Biston P., Devriendt J. et al. Comparison of dopamine and norepinephrine in the treatment of shock // New England Journal of Medicine. - 2010. - Vol. 362. - P. 779-789.
10. Dünser M.W., Ruokonen E., Pettilä V. et al. The effects of vasopressors on mortality in septic shock: a systematic review and meta-analysis // Critical Care. - 2022. - Vol. 26.
11. Cecconi M., Evans L., Levy M., Rhodes A. Sepsis and septic shock // Lancet. - 2018. - Vol. 392. - P. 75-87.
12. Singer M., Deutschman C.S., Seymour C.W. et al. The Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3) // JAMA. - 2016. - Vol. 315. - P. 801-810.
13. Levy B., Fritz C., Tahon E. et al. Vasoplegia and catecholamine resistance in septic shock // Intensive Care Medicine. - 2018. - Vol. 44. - P. 189-197.
14. Russell J.A. Vasopressor therapy in critically ill patients // New England Journal of Medicine. - 2022. - Vol. 386. - P. 163-172.

Для цитирования: Намозова Г.И., Тураханов И.Н., Комилжонова С.Г. Роль катехоламинов в патогенезе различных форм шока: от адаптации к повреждению // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 4(24). – С. 535–540. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19603892>

**СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ДИАГНОСТИКУ И ЛЕЧЕНИЕ ДИСПЛАЗИИ
ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА У НОВОРОЖДЕННЫХ****Эранов Ш.Н., Мухторов Д.С., Абдиев Н.О.**

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Дисплазия тазобедренного сустава (ДТС) является одной из наиболее актуальных проблем детской ортопедии и неонатологии, обусловленной высокой распространённостью, риском поздней диагностики и развитием тяжёлых ортопедических осложнений. Современные подходы к ведению новорожденных с ДТС основаны на раннем клинико-инструментальном скрининге и этапной лечебной тактике. В статье представлены современные методы диагностики, включая клинические тесты, ультразвуковое исследование и рентгенологические критерии, а также подробно рассмотрены консервативные и хирургические методы лечения с позиций доказательной медицины. Проведён анализ эффективности различных лечебных стратегий и обозначены перспективные направления совершенствования диагностики и терапии.

Ключевые слова: дисплазия тазобедренного сустава, новорожденные, ультразвуковая диагностика, ортопедическое лечение, детская ортопедия.

**MODERN APPROACH TO THE DIAGNOSIS AND TREATMENT OF HIP DYSPLASIA IN
NEWBORNS****Eranov Sh.N., Mukhtorov D.S., Abdiev N.O.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Developmental dysplasia of the hip (DDH) is a significant problem in pediatric orthopedics due to its high prevalence and the risk of severe long-term complications if diagnosed late. Modern management strategies rely on early clinical and instrumental screening combined with stage-based treatment approaches. This article reviews current diagnostic modalities, including clinical examination, ultrasound and radiographic criteria, and discusses conservative and surgical treatment options from the perspective of evidence-based medicine. The effectiveness of various strategies and future perspectives are also highlighted.

Keywords: developmental dysplasia of the hip, newborns, ultrasound diagnostics, orthopedic treatment, pediatric orthopedics.

**ЯНГИ ТУГИЛГАНЛАРДА ЧАНОҚ-СОН БЎГИМ ДИСПАЗИЯСИНИ ТАШХИСЛАШ ВА
ДАВОЛАШДА ЗАМОНАВИЙ ҚАРАШЛАР****Эранов Ш.Н., Мухторов Д.С., Абдиев Н.О.**

Самарканд давлат тиббиёт университети, Самарканд ш., Ўзбекистон

Резюме. Чаноқ-сон бўғими дисплазияси болалар ортопедиясида долзарб муаммолардан бири бўлиб, кеч аниқланиши оғир функционал бузилишларга олиб келиши мумкин. Ушбу мақолада янги туғилган чақалоқларда чаноқ-сон бўғими дисплазиясини аниқлаш ва даволашнинг замонавий усуллари ёритилган. Клиник текширув, ультратовуш ва рентген диагностикасининг имкониятлари, шунингдек консерватив ва жарроҳлик даволаш усуллариининг самарадорлиги таҳлил қилинади.

Калим сўзлар: чаноқ-сон бўғими дисплазияси, чақалоқ, ультратовуш диагностикаси, консерватив даволаш, ортопедия.

e-mail: sherzod.eranov@mail.ru

Введение. Дисплазия тазобедренного сустава (ДТС) по-прежнему остаётся одной из наиболее значимых и актуальных проблем детской ортопедии, поскольку занимает ведущее место среди причин формирования вторичных деформаций нижних конечностей, стойких нарушений походки и раннего развития коксартроза [1, 2]. Несмотря на значительный прогресс в диагностике и лечении, данная патология продолжает представлять серьёзную медико-социальную проблему, обусловленную как высокой распространённостью, так и риском позднего выявления.

По данным различных авторов, частота дисплазии тазобедренного сустава среди доношенных новорождённых колеблется от 1 до 3 %, однако при использовании современных методов ультразву-

кового скрининга этот показатель может достигать 10–15 %, что свидетельствует о значительном числе субклинических и пограничных форм заболевания [3, 4]. Существенную роль в развитии ДТС играют наследственная предрасположенность, тазовое предлежание плода, женский пол, гормональные факторы, а также внутриутробные механические воздействия, приводящие к нарушению нормального формирования элементов тазобедренного сустава [5, 6].

Особую обеспокоенность вызывает тот факт, что клинические проявления дисплазии в неонатальном периоде нередко носят стёртый характер, что затрудняет своевременную диагностику. Несвоевременное выявление и отсутствие адекватного лечения в ранние сроки приводят к формированию подвывихов и вывихов бедра, нарушению биомеханики тазобедренного сустава, асимметрии нагрузки на опорно-двигательный аппарат и, как следствие, необходимости выполнения сложных реконструктивных оперативных вмешательств в более старшем возрасте [7, 8].

Современные исследования убедительно показывают, что эффективность лечения напрямую зависит от сроков начала терапии: при раннем выявлении и своевременно начатом консервативном лечении благоприятные анатомо-функциональные результаты достигаются более чем в 90 % случаев [9]. В этой связи внедрение универсальных программ раннего выявления, широкое применение ультразвукового скрининга, а также совершенствование дифференцированных лечебных алгоритмов с учётом возраста ребёнка и степени выраженности дисплазии являются приоритетными задачами современной детской ортопедии и неонатологии [10].

Цель исследования. Обобщить современные данные о диагностике и лечении дисплазии тазобедренного сустава у новорожденных, оценить эффективность существующих подходов и определить оптимальные алгоритмы раннего выявления и терапии.

Материалы и методы. Проведён аналитический обзор отечественных и зарубежных научных публикаций за период 2014–2024 гг., включающих данные клинических исследований, метаанализов и официальных рекомендаций международных ортопедических обществ. В работе использованы материалы специализированных медицинских баз данных, а также национальные клинические протоколы по диагностике и лечению дисплазии тазобедренного сустава у детей.

Факторы риска разнообразны и включают как биологические, так и механические аспекты. Женский пол является одним из наиболее часто встречающихся факторов, наблюдаемым у 70–80 % детей с данным нарушением, что связано с гормональной релаксацией связочного аппарата у новорождённых девочек. Тазовое предлежание плода встречается у 20–30 % случаев и способствует повышенной механической нагрузке на тазобедренные суставы, что увеличивает вероятность их дисплазии (табл.1).

Наследственная отягощённость отмечается у 12–25 % детей и обусловлена генетически слабой соединительной тканью, повышающей риск развития нестабильности сустава. Маловодие встречается до 15 % случаев и ограничивает внутриутробную подвижность плода, что может негативно сказаться на формировании суставов. Первые роды ассоциируются с повышенным тонусом матки, что также увеличивает вероятность патологии и наблюдается до 60 % случаев. Дополнительно следует учитывать влияние внешних факторов, таких как тугое пеленание, которое может нарушать физиологическое положение бедер и усугублять предрасположенность к вывиху. Частота проявления этого фактора варьирует в зависимости от культурных и бытовых традиций ухода за ребёнком.

Таблица 1.

Факторы риска развития дисплазии тазобедренного сустава у новорожденных

Фактор риска	Частота встречаемости	Клиническое значение
Женский пол	до 70–80 %	Связан с гормональной релаксацией связочного аппарата
Тазовое предлежание	20–30 %	Повышенная механическая нагрузка на тазобедренные суставы
Наследственная отягощённость	12–25 %	Генетически обусловленная слабость соединительной ткани
Маловодие	до 15 %	Ограничение внутриутробной подвижности
Первые роды	до 60 %	Повышенный тонус матки
Тугое пеленание	вариабельно	Нарушение физиологического положения бедер

Современные подходы к диагностике. Клинический осмотр новорожденного является первым этапом диагностики. Наиболее значимыми признаками являются ограничение отведения бедра, асимметрия кожных складок, укорочение конечности, положительные симптомы Барлоу и Орталани. Однако клиническая диагностика обладает ограниченной чувствительностью, особенно при лёгких формах дисплазии (табл.2).

Таблица 2.

Клинические признаки дисплазии тазобедренного сустава в неонатальном периоде

Клинический признак	Диагностическая значимость
Симптом Барлоу	Выявление нестабильности сустава
Симптом Орталани	Подтверждение вправляемого вывиха
Ограничение отведения бедра	Наиболее устойчивый признак после 2–3 недель жизни
Асимметрия кожных складок	Низкая специфичность, вспомогательный признак
Укорочение конечности	Характерно для выраженных форм

Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов по методике Графа признано «золотым стандартом» диагностики у детей первых месяцев жизни. Метод позволяет выявить анатомические и функциональные нарушения до появления рентгенологических признаков (рис.1). Рентгенография применяется после 4–6 месяцев жизни и используется для оценки степени оссификации и положения головки бедренной кости.

Классификация Графа основана на ультразвуковых углах α и β , отражающих состояние костного и хрящевого компонентов вертлужной впадины у новорождённых, и позволяет определить степень зрелости и стабильности тазобедренного сустава.

Тип I (Ia и Ib) характеризуется нормальным или анатомически незрелым суставом. При типе Ia α -угол $\geq 60^\circ$, β -угол $< 55^\circ$, что соответствует полностью нормальному суставу; рекомендуется только наблюдение. Тип Ib имеет α -угол $\geq 60^\circ$, β -угол $\geq 55^\circ$ и отражает анатомическую незрелость; показано динамическое наблюдение, поскольку сустав может самостоятельно созреть.

Тип II (IIa и IIb) обозначает физиологическую или патологическую незрелость. При IIa (α 50–59°, $\beta \geq 55^\circ$) отмечается физиологическая незрелость до 3 месяцев, показан контроль УЗИ для мониторинга развития. Тип IIb (α 50–59°, $\beta \geq 55^\circ$) соответствует дисплазии тазобедренного сустава, что требует консервативного лечения с использованием ортопедических устройств.

Тип IIc (α 43–49°, $\beta \geq 77^\circ$) характеризует критическую дисплазию и требует срочной ортопедической коррекции для предупреждения прогрессирования патологии.

Тип D с аналогичными углами α и β отражает подвывих, и показано применение ортопедических фиксаторов для стабилизации сустава.

Тип III ($\alpha < 43^\circ$) соответствует вывиху тазобедренного сустава; тактика — закрытое вправление с последующей иммобилизацией.

Тип IV характеризуется фиксированным вывихом ($\alpha < 43^\circ$) и требует хирургического вмешательства для восстановления анатомии сустава (табл.3).

Таблица 3.

Ультразвуковая классификация дисплазии тазобедренного сустава по Графу

Тип по Графу	α -угол	β -угол	Характеристика	Тактика
Ia	$\geq 60^\circ$	$< 55^\circ$	Нормальный сустав	Наблюдение
Ib	$\geq 60^\circ$	$\geq 55^\circ$	Анатомическая незрелость	Динамическое наблюдение
IIa	50–59°	$\geq 55^\circ$	Физиологическая незрелость (до 3 мес)	Контроль УЗИ
IIb	50–59°	$\geq 55^\circ$	Дисплазия	Консервативное лечение
IIc	43–49°	$\geq 77^\circ$	Критическая дисплазия	Срочная ортопедическая коррекция
D	43–49°	$\geq 77^\circ$	Подвывих	Ортопедические фиксаторы
III	$< 43^\circ$	—	Вывих	Закрытое вправление
IV	$< 43^\circ$	—	Фиксированный вывих	Хирургическое лечение




Рис. 1. Ультразвуковая картина тазобедренного сустава, а-норма, б-дисплазия

Лечение дисплазии тазобедренного сустава. Современная концепция лечения ДТС основана на принципе ранней функциональной центровки головки бедренной кости. При лёгких формах применяются широкое пеленание и ортопедические устройства. Наиболее распространённым методом является использование стремян Павлика, обеспечивающих физиологическое положение конечностей.

Алгоритм лечебной тактики при ДТС

Ранняя диагностика (до 3 мес):

- широкое пеленание
- стремена Павлика / ортезы
- УЗ-контроль каждые 4–6 недель

Поздняя диагностика (3–6 мес):

- закрытое вправление
- гипсовая иммобилизация

Поздняя/резистентная форма (>6 мес):

- реконструктивные операции
- длительная реабилитация

При отсутствии эффекта от консервативной терапии показано закрытое вправление вывиха с последующей иммобилизацией. Хирургическое лечение применяется при тяжёлых формах, позднем выявлении и рецидивах, и включает реконструктивные операции на вертлужной впадине и проксимальном отделе бедренной кости.

Результаты и обсуждение. Анализ современных данных показывает, что ранняя диагностика дисплазии тазобедренного сустава (ДТС) у новорождённых позволяет значительно улучшить функциональные исходы и снизить риск тяжёлых ортопедических осложнений. Согласно литературным данным, применение ультразвукового скрининга по методике Графа обеспечивает выявление как выраженных, так и субклинических форм дисплазии на ранних этапах жизни, что позволяет своевременно инициировать консервативное лечение и избежать прогрессирования патологии.

Раннее начало терапии до 3 месяцев жизни, включая широкое пеленание и использование стремян Павлика или ортезов, обеспечивает положительные анатомо-функциональные результаты в более чем 90 % случаев. Контрольные УЗИ каждые 4–6 недель позволяют оценивать динамику формирования вертлужной впадины и при необходимости корректировать лечебную тактику.

Поздняя диагностика (от 3 до 6 месяцев) значительно увеличивает риск осложнений, включая формирование подвывихов и вывихов, асимметрию нагрузки на нижние конечности и нарушение биомеханики сустава. В таких случаях показано закрытое вправление с последующей иммобилизацией в гипсе. При диагностике после 6 месяцев или при резистентных формах необходимы реконструктивные хирургические вмешательства с длительной реабилитацией.

Клинический анализ факторов риска подтверждает, что женский пол, наследственная предрасположенность, тазовое предлежание, первородящие и маловодие являются наиболее значимыми предрасполагающими факторами. Дополнительно важно учитывать культурные аспекты ухода за ребёнком, такие как тугое пеленание, способное нарушить физиологическое положение бедер.

Заключение. Современные данные подтверждают, что ранняя диагностика и своевременное лечение дисплазии тазобедренного сустава у новорожденных являются ключевыми факторами профилактики инвалидизации. Комплексный подход, включающий обязательный ультразвуковой скри-

нинг и индивидуализированную лечебную тактику, позволяет достичь оптимальных функциональных результатов. Внедрение стандартных алгоритмов ультразвукового скрининга и классификации по Графу значительно снизило частоту поздно диагностируемых форм ДТС. Использование таблиц стратификации риска и этапных схем лечения повышает воспроизводимость клинических решений и улучшает функциональные исходы.

Список литературы:

1. International Hip Dysplasia Institute. Clinical Practice Guidelines, 2024.
2. Dezateux C., Rosendahl K. Developmental dysplasia of the hip. *Lancet*, 2020.
3. Weinstein S.L. Natural history of DDH. *J Bone Joint Surg*, 2022.
4. Clarke N.M. Diagnosis and management of DDH. *Bone & Joint Journal*, 2021.
5. Eranov N.F. Pediatric hip disorders: modern approaches. *Central Asian Orthopedics*, 2023.
6. Patel H. Screening for DDH. *CMAJ*, 2018.
7. Sankar W.N. Treatment strategies in DDH. *J Pediatr Orthop*, 2022.
8. Гафуров, Ф. А., Эранов, Ш. Н., Ахтамов, А. А., & Холбеков, Т. Б. (2019). Результаты ранней диагностики врожденной дисплазии тазобедренного сустава у новорожденных и детей грудного возраста. In *Молодежь и медицинская наука в XXI веке* (pp. 380-381).
9. Ibrahimov, S. Y., Eranov, S. N., Mukhammadiev, E. R., Meliboyev, A. E., Gafurov, F. A., & Juraev, I. G. Triple Pelvic Osteotomy in the Treatment of Congenital Dislocation of the Hip in Children. *JournalNX*, 7(03), 1-4.
10. Эранов, Н., Ибрагимов, С., Эранов, Ш., Нарзикулов, М., & Эранов, Б. (2017). Комплексное функциональное лечение врожденного вывиха бедра у детей. *Журнал проблемы биологии и медицины*, (3 (96), 126–129.

Для цитирования: Эранов Ш.Н., Мухторов Д.С., Абдиев Н.О. Современный взгляд на диагностику и лечение дисплазии тазобедренного сустава у новорожденных // *Вестник фундаментальной и клинической медицины*. – 2026. – № 4(24). – С. 541–545. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19604026>

СОН СУЯГИ БОШЧАСИНИНГ АВАСКУЛЯР НЕКРОЗИ БЎЙИЧА АДАБИЁТЛАР ТАҲЛИЛИ**Саидов М.А., Рошан А.А., Хасанбоев С.Х.**

Миллий тиббиёт маркази, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. Сон суяги бошчасининг аваскуляр некрози (ССБАН) ортопедия ва травматологияда кенг тарқалган, кўп омилли ва клиник жиҳатдан аҳамиятли касалликлардан бири ҳисобланади. Адабиётлар таҳлили шуни кўрсатадики, ушбу патологиянинг ривожланишида қон таъминотининг бузилиши, метаболик ўзгаришлар, гормонал дисбаланс ва ташиқи хавф омиллари муҳим роль ўйнайди. Замонавий тадқиқотларда генетик омиллар, айниқса метаболик генлар полиморфизми, остеогенез ва суяк ремоделиранишига таъсир кўрсатиши таъкидланган. Эрта босқичларда клиник белгиларнинг кам ифодаланиши таъхис қўйишни қийинлаштиради, шунинг учун магнит-резонанс томография асосий диагностика усули ҳисобланади. Даволашда консерватив ва хирургик ёндашувлар қўлланилади, бироқ сўнгги йилларда персоналлаштирилган терапия ва биорегенератив технологияларга катта эътибор қаратилмоқда. Шу билан бирга, ССБАН ривожланишини олдини олишда хавф омилларини эрта аниқлаш ва уларни назорат қилиш муҳим аҳамиятга эга.

Калим сўзлар: сон суяги бошчаси, ССБАН, хирургик даволаш

LITERATURE REVIEW ON AVASCULAR NECROSIS OF THE FEMORAL HEAD**Saidov M.A., Roshan A.A., Hasanboev S.Kh.**

National Medical Center, Tashkent, Uzbekistan

Resume. Avascular necrosis of the femoral head (ANFH) is a clinically significant and multifactorial condition widely encountered in orthopedics and traumatology. Literature analysis indicates that the pathogenesis of this disorder is primarily associated with impaired blood supply to bone tissue, metabolic disturbances, hormonal imbalance, and various external risk factors. Recent studies emphasize the role of genetic determinants, particularly polymorphisms of metabolic genes, in regulating osteogenesis and bone remodeling processes. Early diagnosis remains challenging due to the paucity of clinical symptoms, while magnetic resonance imaging is considered the most sensitive diagnostic modality. Treatment strategies include both conservative and surgical approaches; however, there is a growing focus on personalized therapy and bioregenerative techniques. Early identification and management of risk factors are essential for preventing disease progression and improving patient outcomes.

Key words: femoral head, ANFH, surgical treatment

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО АВАСКУЛЯРНОМУ НЕКРОЗУ ГОЛОВКИ БЕДРЕННОЙ КОСТИ**Саидов М.А., Рошан А.А., Хасанбоев С.Х.**

Национальный медицинский центр, г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. Аваскулярный некроз головки бедренной кости (АНГБК) является одним из наиболее значимых и мультифакторных заболеваний в ортопедии и травматологии. Анализ литературы показывает, что в основе развития данной патологии лежат нарушения кровоснабжения костной ткани, метаболические и гормональные изменения, а также воздействие внешних факторов риска. В современных исследованиях особое внимание уделяется роли генетических факторов, в частности полиморфизмов метаболических генов, влияющих на процессы остеогенеза и ремоделирования кости. Ранняя диагностика заболевания затруднена из-за слабой выраженности клинических симптомов, при этом магнитно-резонансная томография является наиболее информативным методом. Лечение включает как консервативные, так и хирургические методы, однако в последние годы активно развивается персонализированный подход и применение биорегенеративных технологий. Важным направлением остается раннее выявление и контроль факторов риска с целью профилактики прогрессирования заболевания.

Ключевые слова: головка бедренной кости, АНГБК, хирургическое лечение

e-mail: info@mtm.uz, dr.roshanasvar01@gmail.com, Sultonbek265@gmail.com

Сон суяги бошчасининг аваскуляр некрози (ССБАН) ортопедия ва травматологияда долзарб муаммолардан бири бўлиб, асосан меҳнатга лаёқатли ёшдаги шахсларда учрайди ва кўп ҳолларда эрта

ногиронликка олиб келади. Касалликнинг илк босқичлари аксарият ҳолларда клиник жиҳатдан кам симптомли ёки симптомсиз кечади, шу сабабли ташхис кўпинча кеч қўйилади. Натижада беморларда суяк тўқимасида қайтмас морфологик ўзгаришлар, субхондрал синиш ва сон суяги бошчаси коллапси ривожланади. ССБАН патогенези кўп омилли бўлиб, унинг асосида маҳаллий ишемия, микроциркуляция бузилиши, эндотелиал дисфункция, гиперкоагуляция, оксидатив стресс ва суяк ремоделиншининг издан чиқиши ётади. Замонавий қарашларга кўра, касалликни фақат қон таъминоти бузилиши билан изоҳлаш етарли эмас. Метаболик синдром, семизлик, инсулинга резистентлик, дислипидемия ва эндокрин бузилишлар суяк тўқимасида ишемик-некротик жараёнларни кучайтирувчи муҳим омиллар ҳисобланади.

Метаболомиканинг аҳамияти сўнгги йилларда ССБАН патогенезини ўрганишда метаболомикага катта қизиқиш билдирилмоқда. Метаболомика организмдаги паст молекулали бирикмаларнинг сифат ва миқдорий ўзгаришларини баҳолаш орқали касалликнинг эрта биокимёвий белгиларини аниқлаш имконини беради. ССБАНда липид алмашинуви, аминокислоталар профили, энергетик метаболизм ва оксидатив стресс маркерларида ўзгаришлар кузатилиши мумкин.

Айниқса, семизлик ва инсулинга резистентлик фонида эркин ёғ кислоталари, триглицеридлар, яллиғланиш цитокинлари ва ацилкарнитинлар миқдорининг ортиши микроциркуляция бузилиши ва эндотелиал шикастланишга олиб келади. Шу жиҳатдан, метаболомик ёндашув ССБАНни нафақат локал ортопедик касаллик, балки системали метаболик-васкуляр патология сифатида баҳолашга асос яратади. ССБАН ривожланишида бир қатор экзоген ва эндоген хавф омиллари муҳим ўрин тутаяди. Улар қуйидагиларни ўз ичига олади: - глюкокортикоидларни узок муддат қабул қилиш; - спиртли ичимликларни суиистеъмол қилиш; - дислипидемия ва гиперкоагуляция ҳолатлари; - семизлик, қандли диабет ва метаболик синдром; - эндотелиал ва микротомир дисфункцияси; - ташқи муҳит токсикантлари, жумладан оғир металллар ва фталатлар; - D, C, E витаминлари ва антиоксидантлар етишмовчилиги.

Ушбу омиллар умумий ҳолда суяк бошчаси перфузиясини камайтиради, гипоксияни кучайтиради ва остеоцитлар некрозига шароит яратади. ССБАНнинг патогенезида генетик мойиллик ҳам муҳим ўрин тутаяди. Айниқса, липид ва углевод алмашинуви, яллиғланиш ва эндотелиал функцияни бошқарувчи генлар полиморфизмлари касаллик хавфини ўзгартириши мумкин. Шу жиҳатдан PPAR γ гени энг истиқболли кандидат генлардан бири сифатида қаралади.

PPAR γ адипогенез, инсулинга сезувчанлик, липид алмашинуви ва васкуляр гомеостазни тартибга солади. Унинг Pro12Ala ва C1431T полиморфизмлари метаболик синдром, дислипидемия, юрак-қон томир хавф омиллари ва эндотелиал дисфункция билан боғлиқлиги қайд этилган. Бироқ ушбу вариантларнинг айнан ССБАН патогенезидаги ўрни ҳали етарлича ўрганилмаган ва мавжуд натижалар кўп ҳолларда қарама-қаршидир. ССБАНни ташхислашда радиологик усуллар ҳал қилувчи аҳамиятга эга. Оддий рентгенография кечки босқичлардаги склероз, кистоз ўзгаришлар, субхондрал синиш ва коллапсни аниқлашда фойдали бўлса-да, эрта босқичларда сезгирлиги паст.

Магнит-резонанс томография (МРТ) ҳозирги кунда ССБАН диагностикасининг «олтин стандарти» ҳисобланади. МРТ орқали рентгенда кўринмайдиган ишемик ўзгаришлар, суяк илиги шиши, некроз зонаси ва «double line sign» каби патогномоник белгиларни аниқлаш мумкин. Компьютер томография эса субхондрал синиш, коллапс ва артикуляр юза деформациясини баҳолашда қўшимча аҳамиятга эга. ССБАНни Ficat-Arlet, Steinberg ва ARCO таснифлари бўйича босқичлаш касаллик прогрессиясини баҳолаш ва даволаш тактикасини танлашда муҳим аҳамият касб этади. Эрта босқичларда органсақловчи усуллар самарали бўлиши мумкин, кеч босқичларда эса эндопротезлаш зарурати туғилади. ССБАНнинг оғир клиник кечиши, қиммат даволаниши ва кўп ҳолларда эндопротезлашга олиб келиши уни профилактика қилишни устувор вазифага айлантиради. Айниқса, хавф гуруҳига кирувчи беморларда метаболик ҳолатни назорат қилиш, вазни меъёрлаштириш, липид профилини тўғрилаш, витамин D ва антиоксидант статусини баҳолаш, шунингдек генетик мойилликни ўрганиш муҳим аҳамиятга эга. Генетик полиморфизмларни аниқлаш хавф гуруҳларини клиник белгилари намоён бўлишидан олдин белгилаш, эрта МРТ мониторинги ва шахсий профилактика стратегияларини ишлаб чиқиш имконини бериши мумкин.

Хулоса Шундай қилиб, ССБАН кўп омилли ва патогенетик жиҳатдан гетероген касаллик бўлиб, унинг ривожланишида маҳаллий ишемик жараёнлар, тизимли метаболик бузилишлар, эндотелиал дисфункция, коагуляцион силжишлар ва генетик мойиллик ўзаро боғлиқ ҳолда иштирок этади. Замонавий маълумотлар ССБАНни фақат қон таъминоти бузилиши билан эмас, балки метаболик-васкуляр ва генетик механизмлар билан биргаликда ўрганиш зарурлигини кўрсатмоқда. Метаболомика эрта биокимёвий ўзгаришларни аниқлашда истиқболли йўналиш ҳисобланса, PPAR γ каби генлар поли-

морфизмлари касаллик хавфини баҳолашда муҳим аҳамият касб этиши мумкин. МРТ эса эрта ташхис қўйишда асосий инструментал усул бўлиб қолмоқда.

Шу боис, молекуляр-генетик, метаболомик ва радиологик ёндашувларни бирлаштирган интегратив тадқиқотлар ССБАНни эрта аниқлаш, прогрессия хавфини баҳолаш ва персоналлаштирилган профилактика ҳамда даволаш тактикаларини ишлаб чиқиш учун зарурдир.

Адабиётлар рўйхати:

1. Adekile, A. D., F. Kutlar, M. Z. Haider, and A. Kutlar. 2001. 'Frequency of the 677 C-->T mutation of the methylenetetrahydrofolate reductase gene among Kuwaiti sickle cell disease patients', *Am J Hematol*, 66: 263-6.
2. Aishwarya, R., V. S. Kulambi, S. B. Shetty, and H. K. Rao. 2025. 'Is there an Increase in Total Hip Arthroplasty Due to Osteonecrosis of Femoral Head After Covid-19 Pandemic?: A Retrospective Study Among Patients in Central Karnataka, India', *J Orthop Case Rep*, 15: 247-53.
3. An, Y., L. Zheng, S. Zhang, H. Zhang, Y. Zhang, H. Shao, W. Tong, Z. Chen, H. Yao, Z. Wen, S. Xu, Y. Li, Q. Tian, L. Cheng, W. Sun, L. Qin, and J. Xu. 2025. 'Hydrogen activates ACOD1-itaconate pathway to ameliorate steroid-associated osteonecrosis', *Biomaterials*, 323: 123428.
4. Auerbach, A. D., S. Rehman, and M. T. Kleiner. 2012. 'Selective transcatheter arterial embolization of the internal iliac artery does not cause gluteal necrosis in pelvic trauma patients', *J Orthop Trauma*, 26: 290-5.
5. Baker, C. E., K. Hajdu, E. Amaro, S. N. Moore-Lotridge, C. R. Louer, D. Ebenezer, N. L. Lempert, H. A. Cole, and J. G. Schoenecker. 2025. 'Lateral Proximal Femoral Epiphyseal Vessel Avulsion in Slipped Capital Femoral Epiphysis: A Newly Identified Mechanism of Avascularity: A Case Report', *JBJS Case Connect*, 15.
6. Beaulé, P. E., P. A. Campbell, R. Hoke, and F. Dorey. 2006. 'Notching of the femoral neck during resurfacing arthroplasty of the hip: a vascular study', *J Bone Joint Surg Br*, 88: 35-9.
7. Bhuyan, B. K. 2016. 'Early outcomes of one-stage combined osteotomy in Legg-Calve - Perthes disease', *Indian J Orthop*, 50: 183-94.
8. Blumel, S., M. Leunig, H. Manner, M. Tannast, V. M. Stetzelberger, and R. Ganz. 2022. 'Avascular femoral head necrosis in young gymnasts: a pursuit of aetiology and management', *Bone Jt Open*, 3: 666-73.
9. Bozzay, A. B., B. K. Potter, and J. A. Forsberg. 2025. 'The Transfemoral and Transhumeral OPRA (Osseoanchored Prostheses for the Rehabilitation of Amputees) Osseointegration Technique', *JBJS Essent Surg Tech*, 15.
10. Buchel, O., T. Roskams, B. Van Damme, F. Nevens, J. Pirenne, and J. Fevery. 2005. 'Nodular regenerative hyperplasia, portal vein thrombosis, and avascular hip necrosis due to hyperhomocysteinaemia', *Gut*, 54: 1021-3.
11. Cao, Z., Q. Ou, X. Pang, P. Wu, W. Du, and J. Tang. 2021. 'Comparison of free vascularized iliac bone flap grafting versus pedicled iliac bone flap grafting for treatment of osteonecrosis of the femoral head', *J Plast Reconstr Aesthet Surg*, 74: 1261-68.
12. Caruana, G., and A. Bernard. 2025. 'Avascular Necrosis of the Femoral Head Following Sliding Hip Screw Fixation in the Context of Recent Contralateral Vascular Surgery: A Report of a Rare Case', *Cureus*, 17: e92498.
13. Caunca, M. R., H. Gardener, M. Simonetto, Y. K. Cheung, N. Alperin, M. Yoshita, C. DeCarli, M. S. V. Elkind, R. L. Sacco, C. B. Wright, and T. Rundek. 2019. 'Measures of obesity are associated with MRI markers of brain aging: The Northern Manhattan Study', *Neurology*, 93: e791-e803.
14. Chen, K. Y., X. H. Li, D. Chen, S. D. Qian, R. H. Mei, Q. Li, X. F. Yu, and X. J. He. 2025. 'PPARGgamma inhibitors enhance the efficacy of statin therapy for steroid-induced osteonecrosis of the femoral head by directly inhibiting apoptosis and indirectly modulating lipoprotein subfractions', *PLoS One*, 20: e0325190.
15. Chen, W., W. Du, P. Wu, F. Yu, Y. Wang, N. Chen, and J. Tang. 2023. 'Outcomes of free vascularized iliac bone flap for severe traumatic osteonecrosis of femoral head in young adults', *Eur J Trauma Emerg Surg*, 49: 1417-24.
16. Cronin, O., D. R. Morris, P. J. Walker, and J. Golledge. 2013. 'The association of obesity with cardiovascular events in patients with peripheral artery disease', *Atherosclerosis*, 228: 316-23.
17. Cui, Y., T. Huang, Z. Zhang, Z. Yang, F. Hao, T. Yuan, and Z. Zhou. 2022. 'The potential effect of BMSCs with miR-27a in improving steroid-induced osteonecrosis of the femoral head', *Sci Rep*, 12: 21051.

Иктибос учун: Саидов М.А., Рошан А.А., Хасанбоев С.Х. Сон суяги бошчасининг аваскуляр некрози бўйича адабиётлар таҳлили // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси*. – 2026. – № 4(24). – Б. 546–548. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19604309>

ХАРАКТЕРИСТИКА ТКАНЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ БРОНХОВ И ЛЁГКИХ У БЕЛЫХ БЕСПОРОДНЫХ КРЫС ПРИ ОТСУТСТВИИ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ**Тешаев Ш.Ж., Болтаева З.Ф.**

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. В статье представлены результаты морфологического и морфометрического исследования бронхолёгочной системы у белых беспородных лабораторных крыс, находившихся в нормальных физиологических условиях. Изучены структурные особенности бронхов, альвеолярного аппарата, сосудистого русла и соединительнотканых элементов в трёх возрастных группах (6, 9 и 12 месяцев). Проведён комплексный анализ эпителиального покрова бронхов, толщины базальной мембраны, межальвеолярных перегородок, серозной оболочки и сосудистой стенки с использованием современных морфометрических методов. Установлено, что бронхи и лёгкие белых крыс в норме имеют типичное для млекопитающих строение с чётко выраженной слоистостью, развитой капиллярной сетью и отсутствием признаков воспалительных или дегенеративных процессов. С возрастом наблюдается закономерное утолщение эпителиального пласта, базальной мембраны и соединительнотканых структур при сохранении целостности архитектоники лёгочной ткани, что отражает физиологическое созревание и морфофункциональную стабилизацию органов дыхания.

Ключевые слова: бронхи, лёгкие, белые крысы, морфология, морфометрия, альвеолы, возрастные особенности.

CHARACTERIZATION OF THE TISSUE ORGANIZATION OF THE BRONCHI AND LUNGS IN WHITE OUTBRED RATS IN THE ABSENCE OF PATHOLOGICAL CHANGES**Teshayev Sh.Zh., Boltaeva Z.F.**

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. The article presents the results of morphological and morphometric studies of the bronchopulmonary system in white outbred laboratory rats kept under normal physiological conditions. Structural features of the bronchi, alveolar apparatus, vascular network, and connective tissue components were studied in three age groups (6, 9, and 12 months). A comprehensive analysis of the bronchial epithelial lining, basal membrane thickness, interalveolar septa, serous membrane, and vascular wall was carried out using modern morphometric techniques. It was found that the bronchi and lungs of white rats have a typical mammalian structure with a clearly expressed layering, a well-developed capillary network, and no signs of inflammatory or degenerative changes. With increasing age, a regular thickening of the epithelial layer, basal membrane, and connective tissue structures was observed, while maintaining the integrity of the pulmonary architecture, reflecting physiological maturation and morphofunctional stabilization of the respiratory organs.

Keywords: bronchi, lungs, white rats, morphology, morphometry, alveoli, age-related features.

ОҚ ЗОТСИЗ КАЛАМУШЛАРДА БРОНХЛАР ВА ЎПКА ТЎҚИМАЛАРИНИНГ ПАТОЛОГИК ЎЗГАРИШЛАРСИЗ ҲОЛАТДАГИ ТУЗИЛИШ ХУСУСИЯТЛАРИ**Тешаев Ш.Ж., Болтаева З.Ф.**

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Мақолада нормал физиологик шароитларда сақланган оқ зотсиз лаборатория каламушларининг бронх-ўпка тизими морфологик ва морфометрик жиҳатдан ўрганиш натижалари баён этилган. Тадқиқотда 6, 9 ва 12 ойлик учта ёш гуруҳи қамраб олинди ва уларда бронх деворининг қатламли тузилиши, альвеоляр аппарат, қон-томир тўри ҳамда бириктирувчи тўқима элементларининг структураси таҳлил қилинди. Замонавий морфометрик усуллар ёрдамида бронхиал эпителий баландлиги, базал мембрана қалинлиги, межальвеоляр септалар, сероз тоғайли қоплама ҳамда қон томир деворининг морфологик кўрсаткичлари аниқланди. Аниқланишича, оқ зотсиз каламушларнинг бронх ва ўпкалари сутэмизувчиларга хос аниқ қатламли тузилма, яхши ривожланган капилляр тармоқ ва яллиғланиш ёки дистрофик ўзгаришлар белгиларисиз ҳолатда бўлади. Ёш ортиши билан бронхиал эпителий, базал мембрана ва бириктирувчи тўқима қисмларининг муътадил қалинлашуви кузатилди, бироқ ўпка тўқимасининг архитектоникаси

сақланиб қолди. Бу эса нафас аъзоларининг физиологик этилишини ва морфофункционал барқарорлашувини акс эттиради.

Калит сўзлар: бронх, ўпка, оқ зотсиз каламуш, морфология, морфометрия, альвеола, ёшга боғлиқ хусусиятлар.

Введение: В последние годы во всём мире отмечается значительное увеличение распространённости заболеваний органов дыхания, связанных с воздействием неблагоприятных факторов окружающей среды, табачного дыма, промышленных токсикантов и никотинсодержащих продуктов орального потребления. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), более 300 миллионов человек страдают хроническими заболеваниями лёгких, а заболевания дыхательной системы входят в пятёрку ведущих причин смертности в мире. Несмотря на достижения современной пульмонологии, патогенетические механизмы повреждения дыхательной системы под влиянием токсических агентов до конца не изучены, что требует проведения экспериментальных морфологических исследований.

Белые беспородные лабораторные крысы широко применяются как универсальная экспериментальная модель в токсикологии, фармакологии и морфологии благодаря их высокой физиологической и анатомической схожести с человеком. Однако детальные сведения о возрастных морфологических и морфометрических характеристиках бронхолёгочной системы у здоровых крыс в норме остаются фрагментарными. Отсутствие унифицированных морфологических эталонов затрудняет объективную оценку структурных изменений при различных моделях интоксикаций, в частности при хроническом воздействии никотина и продуктов его метаболизма.

Изучение возрастных особенностей строения бронхов и лёгких у здоровых животных имеет важное значение для понимания закономерностей созревания и адаптации дыхательной системы, а также для выработки критериев морфологической нормы. Полученные данные могут служить контрольной базой при исследовании патологических процессов, возникающих под действием никотинсодержащих и токсических веществ, и использоваться для разработки и оценки эффективности новых методов детоксикационной терапии. Таким образом, исследование морфологических особенностей бронхолёгочной системы у белых беспородных крыс в норме является актуальной задачей современной экспериментальной морфологии и пульмонологии.

Цель исследования. Изучить морфологические и морфометрические особенности бронхов и лёгочной ткани у условно здоровых белых беспородных крыс в нормальных физиологических условиях.

Материалы и методы исследования. Для проведения исследования использованы бронхи и лёгкие 30 клинически здоровых белых беспородных лабораторных крыс обоего пола, массой 220–300 г, находившихся на стандартных условиях содержания вивария Бухарского государственного медицинского института.

Все животные были тщательно отобраны с учётом критериев исключения патологических состояний и соматических отклонений. С целью выявления возрастных особенностей морфологического строения бронхов и лёгких животные были разделены на три подгруппы в зависимости от возраста:

I группа — 10 крыс в возрасте 6 месяцев (молодые особи),

II группа — 10 крыс в возрасте 9 месяцев (половозрелые животные),

III группа — 10 крыс в возрасте 12 месяцев (зрелые особи).

Такое распределение позволило провести сравнительный анализ морфологических параметров дыхательной системы на различных этапах физиологического созревания.

Все животные содержались в одинаковых условиях: температура воздуха 21–23 °С, относительная влажность 45–60 %, естественный 12-часовой световой режим (день/ночь). Кормление осуществлялось стандартным гранулированным рационом с постоянным доступом к воде. Для исключения инфекционных осложнений животные находились под ежедневным ветеринарным наблюдением.

После достижения необходимого возраста проводился забор материала под лёгким эфирным наркозом. Лёгкие фиксировали в 10 % нейтральном формалине методом интраторакальной перфузии через трахею для сохранения естественной архитектоники альвеолярных структур.

Экспериментальные исследования выполнены в соответствии с «Европейской конвенцией по защите позвоночных животных, используемых для экспериментальных и иных научных целей» (Страсбург, 1986 г.) и одобрены локальным этическим комитетом Бухарского государственного медицинского института.

Результаты исследования: Сравнительное изучение возрастных особенностей показало, что у шестимесячных белых беспородных крыс дыхательная система характеризуется высокой степенью структурной упорядоченности и выраженной васкуляризацией. Альвеолярный аппарат представлен тонкими, равномерно распределёнными перегородками, через которые проходит плотная сеть капилляров. Межальвеолярные септы имеют толщину в среднем $8,7 \pm 0,4$ мкм, что обеспечивает оптимальное соотношение между поверхностью газообмена и плотностью соединительнотканного каркаса. Альвеолы правильной округлой формы, их диаметр варьирует в пределах 45–60 мкм, плотность на 1 мм² составляет около 7,6, что отражает высокую компактность паренхимы. Альвеолярные стенки тонкие, эластичные, не содержат утолщений или участков фиброзных изменений. Внутри просветов единично встречаются альвеолярные макрофаги (1–2 в поле зрения), располагающиеся преимущественно у основания альвеол.

Бронхи в этом возрасте имеют чёткую слоистую организацию. Слизистая оболочка покрыта многоядным мерцательным эпителием, высота которого составляет $27,7 \pm 1,3$ мкм. Бокаловидные клетки образуют около 8 % клеточной популяции эпителия, их цитоплазма умеренно базофильна, ядра крупные, округлые, располагаются эксцентрично. Базальная мембрана ровная, тонкая, толщиной 4,5 мкм; подслизистый слой содержит рыхлую соединительную ткань с отдельными фибробластами и мелкими сосудами. В толще стенки бронхов визуализируются хрящевые пластинки толщиной 54,0 мкм, окружённые гладкомышечными клетками диаметром 15,4 мкм и ядрами 5,4 мкм. Эти параметры отражают стабильность бронхиального каркаса и оптимальную эластичность стенки. Серозная оболочка лёгких в этом возрасте имеет толщину 19,0 мкм; мезотелиальные клетки низкие, плоские, их ядра вытянутые и гиперхромные. В целом, у шестимесячных крыс лёгкие обладают тонкой, но прочной структурой, обеспечивающей высокую степень растяжимости и сохранение эластичности во время дыхательных движений.




Рис. 1. Микроскопическая картина легочной ткани 6-месячной белой беспородной крысы. 1 - респирационная бронхиола; 2 - терминальные бронхиолы; 3 - альвеолы. Окраска гематоксилин-эозином. Ок.4х Об.20.

У девятимесячных животных отмечается дальнейшее морфофункциональное совершенствование лёгочной ткани. Альвеолярный аппарат сохраняет равномерное строение, но наблюдается лёгкое увеличение толщины межальвеолярных перегородок до 9,0 мкм, что обусловлено умеренным усилением соединительнотканного компонента. Плотность альвеол несколько снижается (до 7,3 на мм²), однако их форма и соотношение площади к толщине перегородок остаются физиологическими. В просветах альвеол единично определяются макрофаги, не содержащие признаков деградации. Альвеолярный эпителий представлен преимущественно альвеолоцитами I типа, которые образуют тонкий барьер, и меньшим количеством альвеолоцитов II типа, имеющих более плотную цитоплазму. Толщина серозной оболочки возрастает до 19,5–19,7 мкм, а мезотелиальные клетки становятся несколько выше (4,2 мкм), что свидетельствует о постепенном укреплении внешнего покровного барьера.

Слизистая оболочка бронхов в этом возрасте также претерпевает возрастные изменения. Высота эпителия увеличивается до 28,1 мкм, число бокаловидных клеток — до 8,5 %, что отражает более активную секреторную функцию. Базальная мембрана утолщается до 4,7 мкм, подслизистая соедини-

тельная ткань становится несколько плотнее. Мышечная пластинка бронхов увеличивается в толщине до 75 мкм, диаметр гладкомышечных клеток достигает 15,6 мкм, а их ядра 5,5 мкм. Эти показатели отражают постепенное укрепление бронхиального стенового аппарата. Сосудистое русло характеризуется равномерной полнокровностью без признаков венозного застоя; толщина стенки артериол составляет 7,7 мкм, периваскулярный collagen — 11 %. Плотная капиллярная сеть сохраняется в межальвеолярных перегородках, обеспечивая полноценную перфузию. БАЛТ представлен в виде мелких клеточных скоплений без тенденции к гиперплазии.




Рис. 2. Микроскопическая картина легочной ткани 9- месячной белой беспородной крысы. 1 - респираторная бронхиола; 2 - терминальные бронхиолы; 3 - альвеолы. Окраска гематоксилин-эозином. Ок.4х Об.20.

С возрастом до 9 месяцев отмечается и незначительное утолщение хрящевых пластинок бронхов (55,0 мкм) и мышечного слоя, что повышает устойчивость бронхиальных стенок к колебаниям внутригрудного давления. Высота складок слизистой оболочки увеличивается до 63,5 мкм, что улучшает адаптивную подвижность бронхов при дыхательных движениях. Все выявленные изменения имеют характер физиологической возрастной адаптации и не носят патологического характера.

У двенадцатимесечных крыс бронхолёгочная система характеризуется полной морфологической зрелостью. Паренхима лёгких сохраняет чётко выраженную альвеолярную архитектуру, однако в сравнении с молодыми особями прослеживаются признаки умеренного утолщения соединительнотканых элементов. Межальвеолярные перегородки достигают 9,4 мкм, а толщина соединительнотканых пластинок — 56,5 мкм. Плотность альвеол составляет 7,0 на мм², что сопровождается незначительным увеличением площади альвеолярных просветов без признаков эмфизематозных изменений. Серозная оболочка уплотняется до 20 мкм, мезотелиальные клетки приобретают более выраженный кубический контур, их ядра становятся крупнее и занимают центральное положение. Подсерозная соединительная ткань умеренно васкуляризована, содержит единичные фибробласты и пучки эластических волокон, ориентированных параллельно поверхности органа.

Бронхи у двенадцатимесечных животных отличаются большей толщиной стенок и более выраженной складчатостью слизистой оболочки. Высота эпителия увеличивается до 28,6 мкм, а доля бокаловидных клеток достигает 9 %. Цитоплазма бокаловидных клеток богата мукоидным секретом, ядра сдвинуты к базальной части клеток. Реснитчатые элементы равномерно распределены по поверхности, их реснички сохраняют чёткую ориентацию. Базальная мембрана утолщается до 5,0 мкм, а мышечная пластинка достигает 77 мкм. Диаметр гладкомышечных клеток 15,8 мкм, ядра 5,6 мкм; миоциты располагаются в несколько слоёв, формируя концентрические пучки.

Хрящевые пластинки в стенке бронхов хорошо развиты, чётко отграничены от окружающей ткани, что способствует сохранению формы бронхиального просвета. Толщина стенки артериол достигает 8,0 мкм, сосуды умеренно наполнены кровью. Периваскулярный collagen увеличивается до 12 %, однако выраженных признаков склерозирования не отмечается. Лимфоидные образования бронхиально-ассоциированной ткани остаются в пределах нормы, не проявляя гиперпластических изменений.

В целом микроскопическая структура лёгких у двенадцатимесечных животных отражает зрелое функциональное состояние дыхательной системы, при котором поддерживается баланс между эла-

стическими и коллагеновыми компонентами, а также оптимальное соотношение между площадью альвеолярных полей и толщиной межальвеолярных перегородок.




Рис. 3. Микроскопическая картина легочной ткани 12- месячной белой беспородной крысы. 1 - респираторная бронхиола; 2 - терминальные бронхиолы; 3 - альвеолы. Окраска гематоксилин-эозином. Ок.4х Об.20.

Сравнительный анализ морфометрических данных трёх возрастных категорий показывает постепенное возрастное утолщение большинства морфологических структур при сохранении их функциональной организации. Так, высота мезотелия увеличивается с 4,0 до 4,3 мкм, толщина серозной оболочки — с 19 до 20 мкм, высота бронхиального эпителия — с 27,7 до 28,6 мкм, толщина базальной мембраны — с 4,5 до 5,0 мкм, мышечной пластинки — с 73 до 77 мкм. Незначительное утолщение межальвеолярных перегородок и соединительнотканых пластинок отражает нормальные процессы созревания коллагенового матрикса и повышение механической устойчивости бронхолёгочной ткани. При этом доля фиброзного компонента в общей структуре лёгких не превышает 4 %, а сосудистая стенка и периваскулярная зона сохраняют тонкое строение, что исключает наличие даже минимальных признаков склерозирования.

Лёгочная ткань у всех возрастных групп характеризуется равномерной васкуляризацией, отсутствием признаков полнокровия и отёка. Кровеносные сосуды сопровождаются тонкими прослойками соединительной ткани; капиллярная сеть межальвеолярных перегородок равномерна и не имеет расширений. Эндотелиальные клетки сохраняют типичную уплощённую форму, их ядра вытянутые, с мелкозернистым хроматином. Никаких морфологических признаков гипоксии, воспалительной инфильтрации или пролиферации сосудистого эндотелия не выявлено.

Таким образом, совокупность морфологических данных свидетельствует о том, что лёгкие и бронхи белых беспородных крыс в возрасте 6–12 месяцев находятся в состоянии анатомической и функциональной зрелости. Отмечаемые возрастные изменения носят постепенный и физиологический характер, не сопровождаясь нарушением архитектоники и гистологической организации тканей. Утолщение отдельных структурных элементов — эпителиального пласта, базальной мембраны, мышечного слоя и межальвеолярных перегородок — является отражением возрастного укрепления тканевых структур и повышения устойчивости дыхательной системы к физическим нагрузкам и внешним воздействиям. Сохранение гармоничного соотношения между бронхиальными, сосудистыми и альвеолярными элементами, а также отсутствие клеточной атипии, воспаления и фиброзирования позволяют рассматривать данные показатели как норму морфологического состояния бронхолёгочной системы белых беспородных крыс в зрелом физиологическом возрасте.

Заключение. Морфологическая организация бронхов и лёгких белых беспородных крыс в норме характеризуется чёткой архитектоникой воздухоносных путей и альвеолярного аппарата, сохранением структурной упорядоченности тканей, равномерной васкуляризацией и отсутствием признаков воспаления или дистрофии, что отражает анатомическую и функциональную зрелость дыхательной системы в возрасте от 6 до 12 месяцев.

Возрастные изменения в пределах физиологической нормы проявляются постепенным утолщением эпителиального слоя, базальной мембраны, межальвеолярных перегородок и мышечной пластинки бронхов, умеренным увеличением размеров альвеол и незначительным снижением их плотно-

сти. Эти процессы отражают физиологическое укрепление структурных компонентов и адаптацию бронхолёгочной ткани к функциональной нагрузке.

Морфометрические показатели (высота мезотелия 4,0–4,3 мкм, толщина серозной оболочки 19–20 мкм, эпителия бронхов 27,7–28,6 мкм, базальной мембраны 4,5–5,0 мкм, межалвеолярных перегородок 8,7–9,4 мкм) могут рассматриваться как эталонные параметры морфологической нормы для оценки изменений при моделировании хронических интоксикаций и последующей детоксикационной терапии.

Список литературы:

1. Агапов Б.А., Лукьянова Е.М. Морфология лёгких лабораторных животных в норме и при действии токсических веществ. — М.: Медицина, 2018. — 220 с.
2. Бенедиктов И.И., Саркисов Д.С. Морфологические основы патологии органов дыхания. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. — 312 с.
3. Меньшиков В.В., Костылев С.В. Морфогенез альвеолярного аппарата у лабораторных животных. // Архив анатомии, гистологии и эмбриологии. — 2019. — Т.128, №2. — С. 45–52.
4. Титова Н.А., Павлова Е.Н., Белова О.В. Возрастные особенности строения лёгких у белых крыс в норме. // Морфология. — 2021. — Т.160, №3. — С. 64–70.
5. Кутателадзе А.Г. Микроскопическая анатомия лёгких. — Л.: Наука, 2016. — 278 с.
6. Пашинян Г.А., Сорокина О.А. Морфологические и морфометрические характеристики бронхов у лабораторных крыс. // Вестник морфологии человека. — 2020. — Т.26, №1. — С. 81–88.
7. Нуралиев Н.А., Бектимиров А.М., Алимова М.Г., Суванов К.Ж. Правила и методы работы с лабораторными животными при микробиологических и иммунологических исследованиях. — Метод. пособие. — Ташкент: МЗ РУз, 2016. — 42 с.
8. World Health Organization. Global report on trends in prevalence of tobacco smoking 2000–2025. — 4th ed. — Geneva: WHO, 2021. — 128 p.

Для цитирования: Тешаев Ш.Ж., Болтаева З.Ф. Характеристика тканевой организации бронхов и лёгких у белых беспородных крыс при отсутствии патологических изменений // Вестник фундаментальной и клинической медицины. — 2026. — № 4(24). — С. 549–554. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19604400>

НОАЛКОГОЛ ЁҒЛИ ЖИГАР КАСАЛЛИГИДА ЛИПИД АЛМАШИНУВИ БУЗИЛИШЛАРИНИНГ ГЕНЕТИК ДЕТЕРМИНАНТЛАРИ: ЗАМОНАВИЙ АДАБИЁТЛАР ТАҲЛИЛИ

Зокиров В.З.¹, Файзуллаева Г.И.²

¹Зармед университети тиббиёт ва биоинженерия институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

²Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Мақолада ноалкогол ёғли жигар касаллиги (NYJK) да липид алмашинуви бузилишларининг генетик детерминантлари бўйича замонавий адабиётлар таҳлили келтирилган. Таҳлилда липид метаболизмини бошқарувчи PNPLA3, TM6SF2, MBOAT7, PCSK9 ва ADIPOQ генларининг полиморфизмлари, уларнинг липид профили, инсулинрезистентлик ва касаллик прогрессиясига таъсири ёритилган. Ўзбек популяциясида ADIPOQ +276G>T ва PNPLA3 генларининг НЙЖКга мойиллик билан алоқадорлиги кўрсатилган тадқиқотлар натижалари умумлаштирилган. Адабиётлар шарҳи генетик маркерларни касалликнинг эрта диагностикаси ва персонализациялашган даволаш учун қўллаш истиқболларини асослайди.

Калим сўзлар: ноалкогол ёғли жигар касаллиги, липид алмашинуви, генетик полиморфизм, PNPLA3, TM6SF2, PCSK9, ADIPOQ, персонализациялашган тиббиёт.

GENETIC DETERMINANTS OF LIPID METABOLISM DISORDERS IN NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE: A CONTEMPORARY LITERATURE REVIEW

Zokirov V.Z.¹, Fayzullayeva G.I.²

¹Institute of Medicine and Bioengineering, Zarmed University, Bukhara, Uzbekistan

²Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sina, Bukhara, Uzbekistan

Resume. This article presents a contemporary literature review on genetic determinants of lipid metabolism disorders in non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD). The analysis covers polymorphisms of PNPLA3, TM6SF2, MBOAT7, PCSK9, and ADIPOQ genes and their effects on lipid profile, insulin resistance, and disease progression. Studies conducted in the Uzbek population demonstrating the association of ADIPOQ +276G>T and PNPLA3 polymorphisms with NAFLD susceptibility are summarized. The review substantiates the prospects of utilizing genetic markers for early diagnosis and personalized treatment of NAFLD.

Keywords: non-alcoholic fatty liver disease, lipid metabolism, genetic polymorphism, PNPLA3, TM6SF2, PCSK9, ADIPOQ, personalized medicine.

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ НАРУШЕНИЙ ЛИПИДНОГО ОБМЕНА ПРИ НЕАЛКОГОЛЬНОЙ ЖИРОВОЙ БОЛЕЗНИ ПЕЧЕНИ: АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Зокиров В.З.¹, Файзуллаева Г.И.²

¹Институт медицины и биоинженерии Университета Zarmed, г. Бухара, Узбекистан

²Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. В статье представлен анализ современной литературы по генетическим детерминантам нарушений липидного обмена при неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП). Проанализированы полиморфизмы генов PNPLA3, TM6SF2, MBOAT7, PCSK9 и ADIPOQ, их влияние на липидный профиль, инсулинорезистентность и прогрессирование заболевания. Обобщены результаты исследований в узбекской популяции, продемонстрировавших ассоциацию полиморфизмов ADIPOQ +276G>T и PNPLA3 с предрасположенностью к НАЖБП. Обзор обосновывает перспективы применения генетических маркеров для ранней диагностики и персонализированного лечения.

Ключевые слова: неалкогольная жировая болезнь печени, липидный обмен, генетический полиморфизм, PNPLA3, TM6SF2, PCSK9, ADIPOQ, персонализированная медицина.

Кириш. Ноалкогол ёғли жигар касаллиги (NYJK) гепатоцитларда триглицеридларнинг ортиқча тўпланиши билан характерланадиган, спиртли ичимликлар истеъмоли ёки бошқа иккиламчи этиологик омиллар билан боғлиқ бўлмаган сурункали касалликлар спектрини ифодалайди [1]. Глобал мета-таҳлиллар НЙЖКнинг дунё аҳолисининг 25–30 фоизда учраб, айрим ҳудудларда (Шимолий

Америка, Яқин Шарқ) 35–40 фоизга етишини кўрсатмоқда [2]. Касаллик оддий стеатоздан NASH, фиброз, цирроз ва гепатоселлюляр карсиномага қадар прогрессив кечишга эга бўлиб, метаболик синдромнинг жигар компоненти сифатида қаралади [3].

Сўнгги ўн йилликда НЙЖКнинг нафақат жигар касаллиги, балки тизимли метаболик бузилишнинг муҳим таркибий қисми эканлиги исботланди. Муҳими, NYJK билан оғриган беморлардаги ўлим кўрсаткичининг асосий сабаби жигар етишмовчилиги эмас, балки кардиоваскуляр асоратлар ҳисобланади [4]. Бу эса липид алмашинуви бузилишларини нафақат жигар, балки бутун организм миқёсида ўрганиш зарурлигини кўрсатади.

Замонавий тадқиқотлар касаллик ривожланишида инсулинрезистентлик, оксидловчи стресс ва яллиғланиш билан бир қаторда генетик омилларнинг ҳал қилувчи аҳамиятга эга эканлигини тасдиқлайди [5, 6]. Липид метаболизмини бошқарувчи генлар полиморфизмлари гепатоцитларда ёғ тўпланиши, липопротеинлар метаболизми ва яллиғланиш жараёнларига бевосита таъсир кўрсатади. Турли этник гуруҳларда олиб борилган тадқиқотлар НЙЖКга генетик мойилликнинг популяцияга хос хусусиятларга эга эканлигини кўрсатиб, "Ethnic-Specific Genetic Associations" феноменини тасдиқлаган [7].

Ушбу мақоланинг мақсади НЙЖКда липид алмашинуви бузилишларининг генетик детерминантларига оид замонавий адабиётларни тизимли таҳлил қилиш, асосий номзод генларнинг ролини ёритиш ҳамда ўзбек популяциясида олиб борилган дастлабки тадқиқотлар натижаларини умумлаштиришдир.

Липид алмашинуви бузилиши – НЙЖКнинг патогенетик асоси. NYJK патогенези замонавий тушунчалар бўйича "multiple-hit" модели асосида изоҳланади, бунда бир вақтнинг ўзида инсулинрезистентлик, липотоксиклик, оксидловчи стресс, митохондриял дисфункция, ичак микробиотаси бузилиши ва генетик предрасположенность иштирок этади [3, 8]. Инсулинрезистентлик шароитида IRS-1/PI3K/Akt каскадлари издан чиқиб, жигарда de novo липогенез (DNL) кучаяди. SREBP-1c ва ChREBP транскрипцион факторларининг фаоллашуви липид синтезини оширади, ёғ тўқимасида гормон-сезгир липаза фаоллашиб, эркин ёғ кислоталари портал қон орқали жигарга келиб, триглицеридлар синтезини кучайтиради [1, 9].

Липотоксиклик натижасида диацилглицероллар, серамидлар ва эркин холестерин ҳосил бўлиб, PKC, JNK ва IKKβ сигнал йўллари фаоллаштириб, инсулин сигнализациясини бузади [3]. Митохондриял дисфункция ёғ кислоталарининг β-оксидланishi кучайиши натижасида реактив кислород шакллари (ROS) ортиқча ҳосил қилади, бу эса липид пероксидацияси ва гепатоцитлар шикастланишига олиб келади [9, 10].

НЙЖКда липид профилининг бузилиши атероген дислипидемия шаклида намоён бўлади: триглицеридлар ошади, кичик ва зич LDL заррачалари кўпаяди, HDL пасаяди. Бу ўзгаришлар кардиоваскуляр хавфни сезиларли ошириб, касалликнинг тизимли характери тасдиқлайди [4, 11].

Липид метаболизмини бошқарувчи номзод генлар. Сўнгги икки ўн йилликда НЙЖКга мойилликни белгилайдиган бир қатор генлар аниқланган. 1-жадвалда асосий номзод генлар ва уларнинг функционал хусусиятлари жамланган.

1-жадвал.

НЙЖКда липид алмашинувига таъсир кўрсатувчи асосий генетик вариантлар

Ген	Полиморфизм	Функцияси	НЙЖКга таъсири
PNPLA3	I148M (rs738409)	TG парчаланиши	Стеатоз, фиброз прогрессияси
TM6SF2	E167K (rs58542926)	VLDL секресияси	Жигар ёғланиши ↑, қон липиди ↓
MBOAT7	rs641738	Фосфолипид ремоделинг	Фиброз хавфи ↑, яллиғланиш ↑
PCSK9	Турли вариантлар	LDL-R деградацияси	LDL ↑, атеросклероз хавфи ↑
ADIPOQ	+276G>T (rs1501299)	Адипонектин синтези	IR ↑, липид дисбаланс ↑

PNPLA3 гени. 2008-йилда Ромео ва ҳамкасблар томонидан аниқланган I148M варианты НЙЖКда энг кўп ўрганилган генетик омил ҳисобланади. У гепатоцитларда триглицеридлар парчала-

нишини бузиб, липид томчиларининг тўпланишига олиб келади [12]. Ўзбекистонда Собирова Г.Н. (2017) тадқиқотида PNPLA3 генининг GG гомозигот полиморфизми ўзбек миллатига мансуб беморларда аниқланган [7, 14].

TM6SF2 гени. E167K варианты жигардан VLDL экспортини камайтиради, натижада жигар ёғланади. Парадоксал тарзда бу вариант қонда липид даражасини пасайтириб, кардиоваскуляр хавфни камайтирадиган бўлса-да, жигар фибрози ривожланишини тезлаштиради [15].

MBOAT7 гени. Pс641738 варианты фосфолипидлар ремоделинг жараёнида иштирок этиб, NYJK ва илғор фиброз ривожланиши хавфини оширади [16].

PCSK9 – липид алмашинуви ва кардиоваскуляр хавфнинг генетик регулятори. PCSK9 оксигени гепатоцитларда синтезланиб, LDL рецепторларини лизосомал деградацияга ёналтиради, натижада жигар юзасида LDL рецепторлар сони камайиб, қонда LDL даражаси ортади [17]. Сўнгги тадқиқотлар НЙЖКга чалинган беморларда PCSK9 экспрессиясининг сезиларли ошганлигини кўрсатди [4, 18]. Ҳозирги кунда PCSK9 ингибиторлари (эволокумаб, алирокумаб) клиник амалиётда қўлланилмоқда [17, 19].


ADIPOQ гени – инсулинрезистентлик ва липид дисбалансининг генетик асоси. ADIPOQ гени адипонектин оксигенини кодлайди. Адипонектин антиатероген, яллиғланишга қарши ва инсулин сезгирлигини оширувчи хусусиятларга эга бўлиб, унинг камайиши метаболик бузилишларни чуқурлаштиради [20]. Ўзбек популяциясида Иминова Д.А. (2019) тадқиқотида 110 нафар бемор ва 49 нафар соғлом шахсларда ADIPOQ +276G>T полиморфизми ўрганилган. Асосий натижалар 2-жадвалда келтирилган.

2-жадвал.


Ўзбек популяциясида ADIPOQ +276G>T полиморфизмининг NYJK билан ассоциацияси

Кўрсаткич	Беморлар	Назорат	p / OR (95% CI)
GG генотип	22,3%	55,1%	p<0,001
GT генотип	56,4%	30,6%	OR=2,93 (1,41–6,09)
TT генотип	21,3%	14,3%	OR=1,62 (0,63–4,15)
T аллел	49,5%	29,6%	OR=2,33 (1,39–3,92)
G/T+T/T (dominant)	77,7%	44,9%	OR=4,27 (2,03–8,97)


Жадвалдан кўриниб турибдики, беморларда GT-гетерозигот генотипининг устуворлиги (56,4%) ва T алелнинг тўпланиши аниқланган. Доминант модел бўйича G/T+T/T генотип ташувчиларда касалланиш хавфи G/G генотипига нисбатан 4 мартадан ортиқ ошган [24].




1-расм. ADIPOQ +276G>T полиморфизми: беморлар ва назорат гуруҳи таққослама диаграммаси



2-расм. ADIPOQ +276G>T полиморфизми — 3D диаграмма



3-расм. ADIPOQ +276G>T генотип тақсимои (доирали диаграмма)



4-расм. ADIPOQ +276G>T — касалланиш хавфи (OR ва 95% CI)

Генетик тадқиқотларда этник контекст ва ўзбек популяцияси. НЙЖКнинг генетик архитектураси популяцияларга хос хусусиятларга эга. Ўзбекистонда Собирова Г.Н. томонидан PNPLA3, Иминова Д.А. томонидан ADIPOQ генларининг ўрганилиши муҳим қадамлар ҳисобланади [7, 14, 24]. Бирок, PCSK9, TM6SF2, MBOAT7 генларининг ўзбек популяциясида ўрганилиши ҳали амалга оширилмаган. Зокиров В.З. (2026) томонидан режалаштирилган DSc тадқиқотида 240 нафар бемор ишти-

рокида PCSK9 гени мутациялари ва уларнинг кардиоваскуляр ўзгаришлар билан боғлиқлиги ўрганилиши мўлжалланмоқда [18].

Персонализациялашган даволаш истиқболлари. Генетик маркерлар асосида риск стратификацияси касаллик кечишини прогнозлаш ва индивидуал даволаш тактикасини танлаш имконини беради [5, 6]. PCSK9 ингибиторлари ва siRNA технологияси (инклизиран) липид алмашинувини ген даражасида коррекция қилиш имконини яратмоқда [17, 19].

Хулоса. Замонавий адабиётлар таҳлили НЙЖКда липид алмашинуви бузилишларининг генетик детерминантлари муҳим рол ўйнашини тасдиқлайди. PNPLA3, TM6SF2, MBOAT7 генларининг полиморфизмлари гепатоцитларда липид тўпланиши ва фиброзга бевосита таъсир кўрсаца, PCSK9 гени липид алмашинуви ва кардиоваскуляр хавфнинг мустақил регулятори сифатида намоён бўлади. ADIPOQ генининг полиморфизмлари инсулинрезистентлик ва липид профили бузилишлари билан ҳамбарчас боғлиқ. Ўзбек популяциясида ADIPOQ +276G>T ва PNPLA3 генларининг НЙЖКга мойиллик билан алоқадорлиги кўрсатилган бўлса-да, PCSK9, TM6SF2 ва бошқа генлар ҳали ўрганилмаган. Бу эса келгусида ушбу генетик маркерларни кенг ўрганиш, касалликнинг эрта диагностикаси ва персонализациялашган даволаш стратегияларини ишлаб чиқиш зарурлигини кўрсатади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Younossi Z.M. et al. Global epidemiology of NAFLD // *Hepatology*. – 2016. – Vol. 64(1). – P. 73–84.
2. Estes C. et al. Modeling NAFLD disease burden // *J Hepatol*. – 2018. – Vol. 69(4). – P. 896–904.
3. Friedman S.L. et al. Mechanisms of NAFLD development // *Nat Med*. – 2018. – Vol. 24(7). – P. 908–922.
4. Byrne C.D., Targher G. NAFLD: A multi-system disease // *J Hepatol*. – 2015. – Vol. 62. – P. S47–S64.
5. Sookoian S., Pirola C.J. Genetics of NAFLD // *Semin Liver Dis*. – 2019. – Vol. 39(2). – P. 124–140.
6. Sookoian S., Pirola C.J. Precision medicine in NAFLD // *Curr Pharm Des*. – 2020. – Vol. 26(10). – P. 1113–1125.
7. Иминова Д.А. PhD дисс. автореферати. – Тошкент, 2019. – 48 б.
8. Iminova D.A. et al. // *Am J Med Med Sci*. – 2019. – V.2(12). – P. 464–466.
9. Buzzetti E. et al. Multiple-hit pathogenesis of NAFLD // *Metabolism*. – 2016. – Vol. 65(8). – P. 1038–1048.
10. Fan J.G. et al. Obesity and NAFLD in Asia // *J Hepatol*. – 2017. – Vol. 67(4). – P. 862–873.
11. Marra F. et al. Lipotoxicity in NASH // *J Hepatol*. – 2018. – Vol. 68(2). – P. 280–295.
12. Targher G. et al. NAFLD and cardiovascular risk // *Gut*. – 2020. – Vol. 69(9). – P. 1691–1705.
13. Mantovani A. et al. // *J Clin Med*. – 2021. – Vol. 10(9). – Article 1834.
14. Romeo S. et al. PNPLA3 and NAFLD // *Nat Genet*. – 2008. – Vol. 40(12). – P. 1461–1465.
15. Dongiovanni P. et al. PNPLA3 I148M role // *Hepatology*. – 2018. – Vol. 68(6). – P. 2030–2040.
16. Zokirov V. Z. Chronic liver disease and covid-2019 (literature review and own data) // *research journal of trauma and disability studies*. – 2022. – T. 1. – №. 4. – C. 24-29.
17. Zokirov V. Z. Comparative analysis of the results of laboratory-biochemical analysis in middle-aged and elderly patients with non-alcoholic fatty liver disease after covid-19 // *Art of Medicine. International Medical Scientific Journal*. – 2022. – T. 2. – №. 1.
18. Zokirov V. Z. COVID 19 o'tkazgan va o'tkazmagan jigarning noalkagol yog'xastaligi bilan og'rgan bemorlar klinikasi va laborator tahlillarining solishtirma tahlili // *Scientific progress*. – 2022. – T. 3. – №. 1. – C. 670-675.
19. VohidZoyit o'g'li Z. a comparative assessment of the biochemical analysis of the course of non-alcoholic fatty liver disease in patients with covid-19 // *integration of science, education and practice. Scientific-methodical journal*. – 2022. – T. 3. – №. 4. – C. 176-180.
20. Zokirov V. Z. Assessment Of Comparative Analysis Of The Course Of Non-Alcoholic Fatty Liver Disease In Middle-Aged And Elderly Patients Who Suffer Covid-19 Through Ultrasound Elastometry (Via Fibroscan) // *International Journal of Formal Education*. – 2022. – T. 1. – №. 4. – C. 1-5.

Иқтибос учун: Зокиров В.З., Файзуллаева Г.И. Ноалкогол ёғли жигар касаллигида липид алмашинуви бузилишларининг генетик детерминантлари: замонавий адабиётлар таҳлили // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси*. – 2026. – № 4(24). – Б. 555–559. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19604631>

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОГНОСТИЧЕСКИХ КРИТЕРИЕВ НЕБЛАГОПРИЯТНОГО ТЕЧЕНИЯ РЕВМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ**Ризаев Ж.А., Шодикулова Г.З., Пулатов У.С., Хасанов О.Г.**

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. В данной статье изучены прогностические критерии неблагоприятного течения ревматологических заболеваний. Исследование проведено в 2022–2025 годах в Самаркандской области с участием 310 пациентов. В зависимости от характера течения заболевания пациенты были разделены на две группы: с неблагоприятным и относительно благоприятным течением. Установлено, что старший возраст, длительность симптомов до обращения к врачу, а также повышенные уровни маркеров воспаления (СОЭ, С-реактивный белок), ревматоидного фактора и АСЛО ассоциированы с неблагоприятным прогнозом. На основе ROC-анализа определены наиболее значимые прогностические показатели и их пороговые значения. Полученные результаты имеют важное значение для раннего прогнозирования и индивидуализации лечения.

Ключевые слова: Ревматологические заболевания, прогностические критерии, неблагоприятное течение, ROC-анализ, маркеры воспаления, ревматоидный фактор, С-реактивный белок, диагностика, прогноз.

DEVELOPMENT OF PROGNOSTIC CRITERIA FOR UNFAVORABLE COURSE OF RHEUMATOLOGIC DISEASES**Rizayev J.A., Shodikulova G.Z., Pulatov U.S., Khasanov O.G.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. This article investigates prognostic criteria for the unfavorable course of rheumatologic diseases. The study was conducted in the Samarkand region during 2022–2025 and included 310 patients. Depending on the clinical course, patients were divided into two groups: unfavorable and relatively favorable outcomes. The results showed that older age, longer duration of symptoms before medical consultation, and elevated levels of inflammatory markers (ESR, C-reactive protein), rheumatoid factor, and ASLO are associated with an unfavorable prognosis. ROC analysis identified the most significant prognostic indicators and their optimal threshold values. The findings are important for early prediction and personalized management of rheumatologic diseases.

Keywords: rheumatologic diseases, prognostic criteria, unfavorable course, ROC analysis, inflammatory markers, rheumatoid factor, C-reactive protein, diagnosis, prognosis.

РЕВМАТОЛОГИК КАСАЛЛИКЛАРНИНГ НОҚУЛАЙ КЕЧИШИНИНГ ПРОГНОСТИК МЕЗОНЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ**Ризаев Ж.А., Шодикулова Г.З., Пулатов У.С., Хасанов О.Г.**

Самарканд давлат тиббиёт университети, Самарканд ш., Ўзбекистон

Резюме. Мазкур мақолада ревматологик касалликларнинг ноқулай кечишини прогнозлаш мезонлари ўрганилган. Тадқиқот 2022–2025 йилларда Самарканд вилоятида ўтказилиб, 310 нафар бемор таҳлил қилинган. Беморлар касаллик кечишига қараб икки гуруҳга ажратилди: ноқулай ва нисбатан қулай кечиш. Натижалар шуни кўрсатдики, юқори ёш, касаллик белгилари давомийлигининг узунлиги, яллигланиш маркерлари (ЭЧТ, С-реактив оқсил), ревматоид фактор ва АСЛО даражаларининг ошиши ноқулай прогноз билан bogлиқ. ROC-таҳлил асосида энг муҳим прогностик кўрсаткичлар ва уларнинг оптимал чегаравий қийматлари аниқланган. Тадқиқот натижалари касаллик кечишини эрта прогнозлаш ва индивидуал ёндашувни шакллантиришда муҳим аҳамиятга эга.

Калит сўзлар: ревматологик касалликлар, прогностик мезонлар, ноқулай кечиш, ROC таҳлил, яллигланиш маркерлари, ревматоид фактор, С-реактив оқсил, диагностика, прогноз.

В настоящее время ревматические заболевания рассматриваются как одна из наиболее значимых медико-социальных проблем современного здравоохранения, поскольку они широко распространены, имеют хроническое прогрессирующее течение, сопровождаются болевым синдромом, снижением функциональной активности, ухудшением качества жизни, ранней утратой трудоспособности и инвалидизацией пациентов, а также формируют существенную нагрузку на систему здраво-

охранения. По данным Всемирной организации здравоохранения отмечается, что «...заболеваниями костно-мышечной страдают около 1,71 млрд человек в мире, при этом остеоартрит и ревматоидный артрит отмечался у 528 и 18 млн людей, вызывая инвалидность в 19 млн и 2,4 млн случаев соответственно».

Получен ряд результатов по совершенствованию диагностики ревматических заболеваний. Установлено, что при ревматоидном артрите серологические маркеры, прежде всего ревматоидный фактор, имеют важное значение для ранней верификации заболевания и выделения лиц с высоким риском его клинической манифестации (Institute of Rheumatology, Prague, Czech Republic). Показано, что ультразвуковое исследование суставов позволяет выявлять субклинический синовит и эрозивные изменения ещё до развития развернутой клинической картины, тем самым повышая точность ранней диагностики и прогноза прогрессирования воспалительного артрита (Leeds Institute of Rheumatic and Musculoskeletal Medicine; United Kingdom).

В мире проводятся исследования по разработке научно обоснованных методов организации и ведения пациентов с ревматическими заболеваниями. Проведена систематическая оценка алгоритмов раннего направления больных с воспалительным артритом, показавшая эффективность ранних артрит-клиник, стандартизированных форм направления и образовательных программ для врачей первичного звена (Centre hospitalier de l'Université de Montréal, Canada). Разработана и внедрена централизованная система анализа ревматологических направлений, позволившая повысить качество направлений, сократить системные потери и улучшить управление сроками ожидания специализированной помощи (University of Calgary, Alberta Health Services, Calgary, Canada). Полученные данные подтверждают перспективность создания комплексной системы раннего выявления, маршрутизации и организационной оценки ревматологической помощи.

Материал и методы: Работа проводилась в Самаркандской области Республики Узбекистан в период 2022-2025 гг. и включала анализ клинических данных пациентов с ревматическими заболеваниями, а также оценку организационных параметров оказания специализированной ревматологической помощи.

В рамках настоящего исследования с целью разработки критериев неблагоприятного течения ревматологических заболеваний был проведён второй этап исследования. Для его реализации из основной группы пациентов, обследованных на первом этапе работы, была сформирована выборка больных, у которых проводился углублённый анализ клинико-anamnestических, лабораторных и инструментальных показателей.

Всего для данного этапа исследования было отобрано 310 пациентов. В зависимости от характера клинического течения ревматологического заболевания все пациенты были разделены на две подгруппы.

Подгруппу 1а составили 169 пациентов с неблагоприятным течением заболевания. Критериями отнесения пациентов к подгруппе с неблагоприятным течением заболевания являлись наличие частых обострений заболевания, выраженная клиническая активность воспалительного процесса, быстрое прогрессирование структурных изменений суставов, снижение функциональной активности пациента, а также необходимость интенсификации противоревматической терапии.

Подгруппу 1б составил 141 пациент с относительно благоприятным течением ревматологической патологии. К подгруппе пациентов с относительно благоприятным течением заболевания относились больные со стабильным течением патологического процесса, редкими обострениями, отсутствием выраженного прогрессирования суставных изменений и удовлетворительным функциональным состоянием.

Оценка исследуемых показателей проводилась на основании анализа клинико-anamnestических и лабораторных данных пациентов. Клинико-anamnestическая оценка включала определение возраста пациентов и длительности симптомов заболевания до момента первичного обращения за медицинской помощью. Лабораторные показатели воспалительной активности и иммунологических изменений определялись с использованием стандартных общеклинических и биохимических методов исследования крови. Скорость оседания эритроцитов определялась методом Панченкова. Уровень С-реактивного белка определяли иммунотурбидиметрическим методом. Определение ревматоидного фактора проводилось методом иммуноферментного анализа. Уровень антистрептолизина-О определяли серологическим методом с использованием латекс-агглютинационного теста.

Результаты исследования: Уровень гемоглобина определялся в рамках общего анализа крови с использованием автоматического гематологического анализатора. Анализ данных таблицы 1 позволил провести сравнительную оценку клинико-лабораторных показателей у пациентов с неблагоприятным и относительно благоприятным течением ревматологических заболеваний. Как видно из пред-

ставленных данных, пациенты подгруппы 1а, характеризующейся неблагоприятным течением заболевания, были достоверно старше пациентов подгруппы 1б. Средний возраст в подгруппе 1а составил $53,76 \pm 0,34$ года, тогда как в подгруппе 1б $46,91 \pm 0,80$ года ($P < 0,001$). Полученные данные свидетельствуют о том, что более старший возраст может рассматриваться как один из факторов, ассоциированных с неблагоприятным течением ревматологических заболеваний.

Существенные различия между подгруппами были выявлены также по длительности симптомов заболевания до обращения к врачу. У пациентов с неблагоприятным течением заболевания данный показатель составил $5,99 \pm 0,06$ месяца, тогда как у пациентов с относительно благоприятным течением - $3,45 \pm 0,31$ месяца ($P < 0,001$). Более длительный период до начала специализированного лечения может способствовать прогрессированию воспалительного процесса и ухудшению течения заболевания. Анализ лабораторных показателей воспалительной активности показал, что у пациентов подгруппы 1а отмечались более высокие значения скорости оседания эритроцитов. Средний уровень СОЭ составил $32,46 \pm 0,38$ мм/ч, тогда как в подгруппе 1б данный показатель равнялся $23,27 \pm 0,74$ мм/ч ($P < 0,001$). Аналогичная тенденция наблюдалась и при анализе уровня С-реактивного белка. В подгруппе 1а показатель СРБ составил $22,21 \pm 0,28$ мг/л, в то время как в подгруппе 1б - $15,21 \pm 0,73$ мг/л ($P < 0,001$). Повышенные значения данных показателей отражают более выраженную системную воспалительную активность у пациентов с неблагоприятным течением заболевания.

Достоверные различия между подгруппами были выявлены и при анализе иммунологических маркеров. Так, уровень ревматоидного фактора у пациентов подгруппы 1а составил $62,93 \pm 0,87$ МЕ/мл, что существенно превышало аналогичный показатель у пациентов подгруппы 1б, где он равнялся $41,98 \pm 1,55$ МЕ/мл ($P < 0,001$). Аналогичная закономерность отмечалась и при оценке уровня антитрестопилина-О: в подгруппе 1а данный показатель составил $346,12 \pm 4,42$ МЕ/мл, тогда как в подгруппе 1б - $292,84 \pm 7,11$ МЕ/мл ($P < 0,001$). Полученные данные указывают на более выраженные иммуновоспалительные процессы у пациентов с неблагоприятным течением ревматологической патологии. При анализе уровня гемоглобина статистически значимых различий между подгруппами выявлено не было. Средний уровень гемоглобина в подгруппе 1а составил $103,13 \pm 0,89$ г/л, тогда как в подгруппе 1б - $105,43 \pm 2,23$ г/л ($P > 0,2$). Это свидетельствует о том, что данный показатель не оказывает существенного влияния на характер течения ревматологических заболеваний.

Таблица 1

Сравнение клинико-лабораторных показателей у пациентов с различным течением ревматологических заболеваний

№	Показатель	Подгруппа 1а (n=169)		Подгруппа 1б (n=141)		P
		М	м	М	м	
1	Возраст, лет	53,76	0,34	46,91	0,80	<0,001
2	Длительность симптомов до обращения к врачу, мес.	5,99	0,06	3,45	0,31	<0,001
3	СОЭ, мм/ч	32,46	0,38	23,27	0,74	<0,001
4	СРБ, мг/л	22,21	0,28	15,21	0,73	<0,001
5	РФ, МЕ/мл	62,93	0,87	41,98	1,55	<0,001
6	АСЛО, МЕ/мл	346,12	4,42	292,84	7,11	<0,001
7	Нб (гемоглобин), г/л	103,13	0,89	105,43	2,23	>0,2

Примечание: P - достоверность различий согласно критерию Стьюдента

На рисунке 1 представлена ROC-кривая, отражающая диагностическую эффективность возраста пациента в прогнозировании неблагоприятного течения ревматологических заболеваний. Площадь под ROC-кривой составила 0,861, что указывает на высокую прогностическую значимость данного показателя. В ходе ROC-анализа установлено пороговое значение возраста ≥ 51 года. При данном cut-off чувствительность составила 71,2%, специфичность - 78,2%. Возраст пациента ≥ 51 года ассоциируется с повышенной вероятностью неблагоприятного течения ревматологических заболеваний и может использоваться в качестве одного из прогностических критериев риска прогрессирования заболевания.




Рисунок 1. ROC-график диагностической эффективности возраста пациента в прогнозе ревматологического заболевания (AUC=0,861).

В таблице 2 представлены результаты ROC-анализа прогностической эффективности возраста пациента в неблагоприятном прогнозе ревматологических заболеваний с определением чувствительности и специфичности при различных пороговых значениях показателя. Как видно из представленных данных, при низких пороговых значениях возраста (39-46,5 лет) чувствительность теста достигает 100%, однако специфичность остаётся крайне низкой и варьирует от 0 до 45,1%. Это свидетельствует о высокой вероятности ложноположительных результатов при использовании данных пороговых значений. По мере увеличения порогового значения возраста наблюдается постепенное снижение чувствительности теста и одновременное увеличение специфичности. Наиболее оптимальное соотношение чувствительности и специфичности отмечается при пороговом значении возраста около 50-51 лет.

При значении возраста $\geq 50,5$ года чувствительность составляет 71,2%, а специфичность - 78,2%, что обеспечивает наилучший баланс между выявлением пациентов с неблагоприятным течением заболевания и минимизацией ложноположительных результатов. При дальнейшем увеличении порогового значения возраста специфичность продолжает возрастать и достигает 100% при значениях $\geq 54,5$ года, однако при этом существенно снижается чувствительность теста, что ограничивает практическую значимость данных пороговых уровней.

На рисунке 2 представлена ROC-кривая, характеризующая диагностическую эффективность длительности симптомов заболевания до первого обращения пациента к врачу в прогнозировании неблагоприятного течения ревматологических заболеваний. Площадь под ROC-кривой составила 0,900, что свидетельствует о высокой прогностической значимости данного показателя. В ходе ROC-анализа установлено пороговое значение длительности симптомов ≥ 5 месяцев. При данном cut-off чувствительность составила 92,5%, специфичность - 67,6%. Полученные результаты указывают, что более длительный период от появления первых симптомов заболевания до обращения за медицинской помощью ассоциируется с повышенной вероятностью неблагоприятного течения ревматологических заболеваний. Длительность симптомов ≥ 5 месяцев может рассматриваться как один из прогностических критериев риска прогрессирования ревматологической патологии.

Таблица 2.

Прогностическая эффективность возраста (в годах) в неблагоприятном прогнозе ревматологических заболеваний

Пороговое значение $\geq$	Чувствительность (%)	Специфичность (%)
39	100	0
40,5	100	7,7
41,5	100	16,9
42,5	100	21,1
43,5	100	26,1
44,5	100	30,3
45,5	100	36,6
46,5	100	45,1
47,5	93,5	50,7
48,5	88,2	61,3
49,5	80	69
50,5	71,2	78,2
51,5	64,7	85,2
52,5	55,9	90,1
53,5	47,6	95,1
54,5	41,8	100
55,5	35,9	100
56,5	31,8	100
57,5	23,5	100
58,5	19,4	100
59,5	16,5	100
60,5	8,8	100
62	0	100




Рисунок 2. ROC-график диагностической эффективности длительности симптомов до первого обращения к врачу в прогнозе ревматологического заболевания ($AUC=0,900$).

В таблице 3 представлены результаты ROC-анализа прогностической эффективности длительности симптомов заболевания до первого обращения пациента к врачу при неблагоприятном прогнозе.

зе ревматологических заболеваний. Анализ представленных данных показывает, что при низких пороговых значениях длительности симптомов (0-3,5 месяца) чувствительность теста сохраняется на уровне 100%, однако специфичность остаётся низкой и варьирует от 0 до 54,9%. Это указывает на высокую вероятность ложноположительных результатов при использовании данных пороговых значений. С увеличением порогового значения длительности симптомов отмечается постепенное снижение чувствительности и одновременное увеличение специфичности диагностического теста. Наиболее оптимальное соотношение чувствительности и специфичности наблюдается при пороговом значении $\geq 4,5$ месяца, при котором чувствительность составляет 92,5%, а специфичность - 67,6%. При дальнейшем увеличении порогового значения ($\geq 5,5$ месяца) специфичность возрастает до 85,9%, однако чувствительность снижается до 67,6%. При значении $\geq 6,5$ месяца специфичность достигает 100%, но чувствительность резко уменьшается до 31,8%, что ограничивает практическое использование данного порогового значения.

Таблица 3.

Прогностическая эффективность длительности симптомов до первого обращения к врачу в неблагоприятном прогнозе ревматологических заболеваний

Пороговое значение $\geq$	Чувствительность (%)	Специфичность (%)
0	100	0
1,5	100	13,4
2,5	100	32,4
3,5	100	54,9
4,5	92,5	67,6
5,5	67,6	85,9
6,5	31,8	100
8	0	100

На рисунке 3 представлена ROC-кривая, отражающая диагностическую эффективность скорости оседания эритроцитов в прогнозировании неблагоприятного течения ревматологических заболеваний. Площадь под ROC-кривой составила 0,919, что свидетельствует о высокой прогностической значимости данного лабораторного показателя. В ходе ROC-анализа установлено пороговое значение СОЭ ≥ 27 мм/ч. При данном cut-off чувствительность составила 85,3%, специфичность - 72,5%. Повышение уровня СОЭ ≥ 27 мм/ч ассоциируется с повышенной вероятностью неблагоприятного течения ревматологических заболеваний и может рассматриваться в качестве одного из лабораторных прогностических критериев риска прогрессирования ревматологической патологии.




Рисунок 3. ROC-график диагностической СОЭ в прогнозе ревматологического заболевания (AUC=0,919).

В таблице 4.4 представлены результаты ROC-анализа прогностической эффективности скорости оседания эритроцитов при неблагоприятном прогнозе ревматологических заболеваний. Анализ представленных данных показывает, что при низких пороговых значениях СОЭ (16-24,5 мм/ч) чувствительность теста сохраняется на уровне 100%, однако специфичность остаётся низкой и постепенно увеличивается от 0 до 62%. Это указывает на высокую вероятность ложноположительных результатов при использовании данных пороговых значений. С увеличением порогового значения СОЭ отмечается постепенное снижение чувствительности и одновременное увеличение специфичности диагностического теста. Наиболее сбалансированное соотношение чувствительности и специфичности наблюдается при пороговом значении $\geq 26,5$ мм/ч, при котором чувствительность составляет 85,3%, а специфичность - 72,5%.

При дальнейшем увеличении порогового значения СОЭ специфичность продолжает возрастать. Так, при значении $\geq 27,5$ мм/ч специфичность достигает 81,7%, а при $\geq 28,5$ мм/ч - 92,3%. Однако при этом отмечается снижение чувствительности теста, что ограничивает практическое использование более высоких пороговых значений.

Таблица 4.

Прогностическая эффективность СОЭ в неблагоприятном прогнозе ревматологических Заболеваний

Пороговое значение $\geq$	Чувствительность (%)	Специфичность (%)
16	100	0
17,5	100	6,3
18,5	100	13,4
19,5	100	21,1
20,5	100	27,5
21,5	100	36,6
22,5	100	45,1
23,5	100	51,4
24,5	100	62
25,5	90,6	68,3
26,5	85,3	72,5
27,5	77,6	81,7
28,5	69,4	92,3
29,5	65,9	95,1
30,5	59,4	100
31,5	54,7	100
32,5	48,8	100
33,5	44,7	100

На рисунке 4 представлена ROC-кривая, отражающая диагностическую эффективность уровня С-реактивного белка в прогнозировании неблагоприятного течения ревматологических заболеваний. Площадь под ROC-кривой составила 0,894, что указывает на высокую прогностическую значимость данного лабораторного показателя. В ходе ROC-анализа установлено пороговое значение уровня С-реактивного белка $\geq 18,5$ мг/л. При данном cut-off чувствительность составила 80,0%, специфичность - 75,4%. Повышение уровня С-реактивного белка $\geq 18,5$ мг/л ассоциируется с повышенной вероятностью неблагоприятного течения ревматологических заболеваний и может рассматриваться в качестве одного из лабораторных прогностических критериев риска прогрессирования ревматологической патологии.

В таблице 5 представлены результаты ROC-анализа прогностической эффективности уровня С-реактивного белка при неблагоприятном прогнозе ревматологических заболеваний. Анализ представленных данных показывает, что при относительно низких пороговых значениях С-реактивного белка (17-17,55 мг/л) чувствительность диагностического теста остаётся высокой и составляет 84,7-88,8%, однако специфичность при этом остаётся умеренной и варьирует в пределах 64,8-68,3%. С увеличением порогового значения С-реактивного белка наблюдается постепенное снижение чувствительности и одновременное повышение специфичности теста. Наиболее оптимальное соотношение

чувствительности и специфичности отмечается при пороговом значении $\geq 18,45$ мг/л, при котором чувствительность составляет 80,0%, а специфичность - 75,4%.




Рисунок 4. ROC-график диагностической эффективности С-реактивного белка в прогнозе ревматологического заболевания (AUC=0,894).

При дальнейшем увеличении порогового значения С-реактивного белка специфичность продолжает возрастать и достигает 83,1% при значении $\geq 19,85$ мг/л, однако при этом чувствительность снижается до 68,8%, что ограничивает практическое использование более высоких пороговых значений. Полученные результаты свидетельствуют о том, что повышение уровня С-реактивного белка ассоциируется с повышенной вероятностью неблагоприятного течения ревматологических заболеваний. Оптимальным прогностическим пороговым значением данного показателя является уровень С-реактивного белка около 18,5 мг/л.

На рисунке представлена ROC-кривая, отражающая диагностическую эффективность ревматоидного фактора в прогнозировании неблагоприятного течения ревматологических заболеваний. Площадь под ROC-кривой составила 0,930, что указывает на очень высокую прогностическую значимость данного лабораторного показателя. В ходе ROC-анализа установлено пороговое значение ревматоидного фактора $\geq 51,5$ МЕ/мл. При данном cut-off чувствительность составила 78,2%, специфичность - 85,2%. Повышение уровня ревматоидного фактора $\geq 51,5$ МЕ/мл ассоциируется с повышенной вероятностью неблагоприятного течения ревматологических заболеваний и может рассматриваться как один из наиболее информативных лабораторных прогностических критериев риска прогрессирования ревматологической патологии.

В таблице 6 представлены итоговые результаты ROC-анализа прогностических критериев неблагоприятного течения ревматологических заболеваний. Наиболее высокой прогностической значимостью характеризовался ревматоидный фактор. Площадь под ROC-кривой составила 0,930, что свидетельствует о высокой диагностической информативности данного показателя. Оптимальным пороговым значением ревматоидного фактора определён уровень $\geq 51,5$ МЕ/мл, при котором чувствительность составила 78,2%, а специфичность - 85,2%. Высокую прогностическую значимость продемонстрировал также показатель скорости оседания эритроцитов. Значение AUC составило 0,919, а оптимальным пороговым значением был уровень СОЭ ≥ 27 мм/ч. При данном значении чувствительность составила 85,3%, специфичность - 72,5%.

Значимым прогностическим критерием оказалась длительность симптомов заболевания до первого обращения пациента к врачу. Значение AUC составило 0,900. При пороговом значении ≥ 5 месяцев чувствительность теста достигала 92,5%, а специфичность - 67,6%. С-реактивный белок также продемонстрировал высокую прогностическую значимость. Площадь под ROC-кривой составила 0,894. Пороговое значение $\geq 18,5$ мг/л обеспечивало чувствительность 80,0% и специфичность 75,4%.

Возраст пациента также показал достаточно высокую диагностическую значимость в прогнозировании неблагоприятного течения заболевания. Значение AUC составило 0,861. При пороговом значении возраста ≥ 51 года чувствительность составила 71,2%, специфичность - 78,2%. Уровень антистрептолизина-О характеризовался умеренной прогностической значимостью. Значение AUC составило 0,762. Пороговое значение $\geq 321,5$ МЕ/мл обеспечивало чувствительность 62,9% и специфичность 71,8%.

Таблица 5.

Прогностическая эффективность С-реактивного белка в неблагоприятном прогнозе ревматологических заболеваний

Пороговое значение $\geq$	Чувствительность (%)	Специфичность (%)
17,35	86,5	67,6
17,45	85,3	67,6
17,55	84,7	68,3
17,65	84,7	69
17,75	83,5	70,4
17,85	81,8	70,4
18	81,2	70,4
18,2	80	71,8
18,35	80	72,5
18,45	80	75,4
18,55	79,4	76,1
18,65	78,8	76,1
18,75	78,2	76,1
18,85	77,6	76,8
18,95	77,1	76,8
19,05	75,3	78,2

Наименьшей прогностической информативностью обладал уровень гемоглобина. Значение AUC составило 0,442, что свидетельствует о низкой диагностической значимости данного показателя. Несмотря на установленное пороговое значение $\leq 99,5$ г/л, чувствительность составила 60,6%, а специфичность - лишь 32,4%, что не позволяет рассматривать данный показатель в качестве надёжного прогностического критерия.

Таблица 6

Итоговая таблица прогностических критериев неблагоприятного течения ревматологических заболеваний

№	Параметры	AUC	Порог. значение	Чувствит. (%)	Специфич. (%)
1	Возраст, лет	0,861	≥ 51	71,2	78,2
2	Длитель. симптомов до обращения к врачу, мес.	0,900	≥ 5	92,5	67,6
3	СОЭ, мм/ч	0,919	≥ 27	85,3	72,5
4	СРБ, мг/л	0,894	$\geq 18,5$	80,0	75,4
5	РФ, МЕ/мл	0,930	$\geq 51,5$	78,2	85,2
6	АСЛО, МЕ/мл	0,762	$\geq 321,5$	62,9	71,8
7	Нб (гемоглобин), г/л	0,442	$\leq 99,5$	60,6	32,4

Заключение. Результаты проведённого исследования показали, что клинико-лабораторные показатели играют ключевую роль в прогнозировании неблагоприятного течения ревматологических заболеваний. Установлено, что более старший возраст пациентов, длительный период от появления симптомов до обращения за медицинской помощью, а также повышенные уровни маркеров воспаления (СОЭ, С-реактивный белок), ревматоидного фактора и антистрептолизина-О достоверно ассоциированы с высоким риском неблагоприятного течения заболевания. На основании ROC-анализа были определены оптимальные пороговые значения указанных показателей, что позволило подтвердить их высокую диагностическую и прогностическую значимость. Наибольшей информативностью облада-

ли ревматоидный фактор и скорость оседания эритроцитов, что делает их важными критериями при оценке риска прогрессирования заболевания. Полученные результаты имеют важное практическое значение, поскольку позволяют осуществлять раннюю стратификацию пациентов по степени риска, своевременно выявлять группы с неблагоприятным прогнозом и разрабатывать индивидуализированные подходы к лечению. Внедрение данных критериев в клиническую практику способствует повышению эффективности медицинской помощи, снижению частоты осложнений и улучшению качества жизни пациентов.

Список литературы:

1. Чилилов А. М. и др. Эпидемиология ревматоидных артритов в российской федерации в 2015-2024 гг //Современные проблемы здравоохранения и медицинской статистики. - 2025. - №. 3. - С. 485-504.
2. Шакирова Д. Х. и др. Проблемы лечения ревматических заболеваний генно-инженерными биологическими препаратами //Фармация. - 2020. - Т. 69. - №. 7. - С. 40-45.
3. Шукурова С. М. и др. Медико-социальная значимость ревматических заболеваний //Вестник Авиценны. - 2012. - №. 4 (53). - С. 163-168.
4. Abhishek A., Doherty M. Diagnosis and clinical presentation of osteoarthritis //Rheumatic Disease Clinics. - 2013. - Т. 39. - №. 1. - С. 45-66.
5. Abramoff B., Caldera F. E. Osteoarthritis: pathology, diagnosis, and treatment options //Medical Clinics. - 2020. - Т. 104. - №. 2. - С. 293-311.
6. Abuova A. S. et al. Modern aspects of epidemiology of ankylosing spondyloarthritis. Review //Наука и здравоохранение. - 2023. - Т. 25. - №. 6. - С. 199-206.
7. Aletaha D., Smolen J. S. Diagnosis and management of rheumatoid arthritis: a review //Jama. - 2018. - Т. 320. - №. 13. - С. 1360-1372.
8. Alharthi A. H. et al. Laboratory markers of inflammation: CRP and ESR in clinical practice //Journal of International Crisis and Risk Communication Research. - 2024. - Т. 7. - №. S8. - С. 2376.
9. Alivernini S., Firestein G. S., McInnes I. B. The pathogenesis of rheumatoid arthritis //Immunity. - 2022. - Т. 55. - №. 12. - С. 2255-2270.
10. Almutairi K. et al. The global prevalence of rheumatoid arthritis: a meta-analysis based on a systematic review //Rheumatology international. - 2021. - Т. 41. - №. 5. - С. 863-877.
11. Anderson J. et al. Rheumatoid arthritis disease activity measures: American College of Rheumatology recommendations for use in clinical practice //Arthritis care & research. - 2012. - Т. 64. - №. 5. - С. 640-647.

Для цитирования: Ризаев Ж.А., Шодикулова Г.З., Пулатов У.С., Хасанов О.Г. Формирование прогностических критериев неблагоприятного течения ревматологических заболеваний // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 4(24). – С. 560–569. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19604718>

МЕТАБОЛИК СИНДРОМ БИЛАН ОҒРИГАН БЕМОРЛАРДА СУРУНКАЛИ БУЙРАК КАСАЛЛИГИНИНГ ЭРТА БОСҚИЧЛАРИНИ АНИҚЛАШДА ЦИСТАТИН-С, НГАЛ ВА МИКРОАЛБУМИНУРИЯ МАРКЕРЛАРИНИНГ ҚИЁСИЙ ДИАГНОСТИК АҲАМИЯТИ

Исмадова М.Н., Исроилов И.И.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Мақсад – метаболик синдром (МС) фонида сурункали буйрак касаллиги (СБК) нинг эрта босқичларини аниқлашда систатин-С, нейтрофил желатиназага ассотсиацияланган липокалин (НГАЛ) ва микроалбуминурия (МАУ) маркерларининг қиёсий диагностик самарадорлигини баҳолаш. Материал ва усуллар: Тадқиқотга 2023–2025 йилларда Бухоро вилоят кўп тармоқли тиббиёт маркази нефрология бўлимида кузатувга олинган 18–65 ёшдаги 150 нафар шахс жалб этилди: I гуруҳ – МС ва СБК (Г3а–Г3б) мавжуд 55 бемор, II гуруҳ – фақат МС мавжуд 50 бемор, III гуруҳ (назорат) – 50 соғлом кўнгилли. Барча текширувчиларда қон зардобиди систатин-С (иммунонефелометрия), НГАЛ (ЕЛИСА), креатинин (ензимавий), сийдикда албумин/креатинин нисбати (АКН) аниқланди, ГФР СКД-ЭПИ (систатин-С асосида) формуласи билан ҳисобланди. Натижалар: I гуруҳда систатин-С $1,92 \pm 0,28$ мг/л, НГАЛ $168,4 \pm 24,6$ нг/мл, МАУ $94,3 \pm 15,7$ мг/л бўлди (барчаси назоратга нисбатан $p < 0,001$). РОС таҳлилида систатин-С энг юқори АУС=0,93 ко‘рсатди; НГАЛ АУС=0,89, МАУ АУС=0,86 ташиқил этди. Учала маркерни бирлаштирган комбинатсияланган модел АУС=0,96 га етди. Хулоса: Цистатин-С МС фонида СБК ни эрта аниқлашда энг ишончли якка маркер бўлиб, учта маркернинг интеграцияси диагностик аниқликни янада оширади.

Калит сўзлар: метаболик синдром, сурункали буйрак касаллиги, цистатин-С, НГАЛ, микроалбуминурия, гломеруляр филтратсия тезлиги, РОС таҳлил, диагностик маркерлар.

COMPARATIVE DIAGNOSTIC VALUE OF CYSTATIN-C, NGAL AND MICROALBUMINURIA MARKERS IN EARLY DETECTION OF CHRONIC KIDNEY DISEASE IN PATIENTS WITH METABOLIC SYNDROME

Ismatova M.N., Isroilov I.I.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. To evaluate the comparative diagnostic performance of cystatin C, neutrophil gelatinase-associated lipocalin (NGAL), and microalbuminuria (MAU) in the early detection of chronic kidney disease (CKD) in patients with metabolic syndrome (MS). Materials and Methods: The study included 150 individuals aged 18–65 years who were observed in the nephrology department of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center during 2023–2025. The participants were divided into three groups: Group I – 55 patients with MS and CKD (G3a–G3b); Group II – 50 patients with MS only; Group III (control) – 50 healthy volunteers. In all participants, serum levels of cystatin C (immunonephelometry), NGAL (ELISA), and creatinine (enzymatic method) were measured. The urine albumin-to-creatinine ratio (ACR) was also determined. Glomerular filtration rate (GFR) was calculated using the CKD-EPI formula based on cystatin C. Results: In Group I, cystatin C was 1.92 ± 0.28 mg/L, NGAL was 168.4 ± 24.6 ng/mL, and MAU was 94.3 ± 15.7 mg/L (all significantly higher compared to the control group, $p < 0.001$). ROC analysis showed that cystatin C had the highest diagnostic value with an AUC of 0.93; NGAL had an AUC of 0.89, and MAU had an AUC of 0.86. The combined model incorporating all three markers achieved an AUC of 0.96. Conclusion: Cystatin C is the most reliable single marker for the early detection of CKD in patients with metabolic syndrome, while the integration of all three markers significantly improves diagnostic accuracy.

Keywords: metabolic syndrome, chronic kidney disease, cystatin-C, NGAL, microalbuminuria, GFR, ROC analysis, diagnostic markers.

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЦИСТАТИНА-С, NGAL И МИКРОАЛЬБУМИНУРИИ В РАННЕЙ ДИАГНОСТИКЕ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК У БОЛЬНЫХ С МЕТАБОЛИЧЕСКОМ СИНДРОМОМ

Исмадова М.Н., Исроилов И.И.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Цель: Оценить сравнительную диагностическую эффективность цистатина С, липокалина, ассоциированного с нейтрофильной желатиназой (NGAL), и микроальбуминурии (МАУ) в

ранней диагностике хронической болезни почек (ХБП) на фоне метаболического синдрома (МС). Материалы и методы: В исследование были включены 150 человек в возрасте 18–65 лет, наблюдавшиеся в 2023–2025 гг. в нефрологическом отделении Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. Участники были разделены на три группы: I группа – 55 пациентов с МС и ХБП (G3a–G3b); II группа – 50 пациентов только с МС; III группа (контроль) – 50 здоровых добровольцев. У всех обследуемых определяли уровень цистатина С в сыворотке крови (иммунонефелометрия), NGAL (ИФА), креатинина (ферментативный метод), а также соотношение альбумин/креатинин в моче (АКН). Скорость клубочковой фильтрации (СКФ) рассчитывали по формуле СКД-EPI на основе цистатина С. Результаты: В I группе уровень цистатина С составил $1,92 \pm 0,28$ мг/л, NGAL – $168,4 \pm 24,6$ нг/мл, МАУ – $94,3 \pm 15,7$ мг/л (все показатели достоверно выше по сравнению с контрольной группой, $p < 0,001$). ROC-анализ показал, что наибольшую диагностическую ценность имеет цистатин С с $AUC = 0,93$; для NGAL AUC составила 0,89, для МАУ – 0,86. Комбинированная модель с использованием всех трёх маркеров достигла $AUC = 0,96$. Заключение: Цистатин С является наиболее надёжным одиночным маркером для ранней диагностики ХБП на фоне метаболического синдрома, а интеграция всех трёх маркеров значительно повышает диагностическую точность.

Ключевые слова: метаболический синдром, ХБП, цистатин-С, NGAL, микроальбуминурия, СКФ, ROC-анализ, биомаркеры.

Кириш. Метаболик синдром (МС) бугунги кунда жаҳон аҳолисининг 20–35 фоизини қамраб олган, кўп компонентли клиник ҳолат бўлиб, унинг асосий таркибий қисмларига марказий семизлик, инсулинрезистентлик, артериал гипертензия ва атероген дислипидемия киради [1, 2]. Сўнгги ўн йилликда МС ва сурункали буйрак касаллиги (СБК) ўртасидаги патогенетик боғлиқликка оид далиллар сезиларли тўпланган: гипергликемия, оксидловчи стресс ва эндотелиал дисфункция буйрак гломеруляр аппаратида бевосита шикастловчи тасир кўрсатади [3, 4]. КДИГО 2024 тавсияларига кўра, СБК эрта аниқлаш ва прогрессиясини секинлаштириш нефрологиянинг устувор ёналиши ҳисобланади [5].

Ананавий диагностик маркер сифатида кенг қўлланилаётган серум креатинини буйрак функциясини 40–50 фоизга пасайгандагина ишончли ўзгаради, яни касалликнинг илк босқичларида “кўр зона” ҳосил қилади [6]. Шу сабабли сўнгги йилларда систатин-С, нейтрофил желатиназага ассотсиацияланган липокалин (НГАЛ) ва микроальбуминурия (МАУ) каби биомаркерлар субклиник буйрак шикастланишини эрта аниқлаш воситаси сифатида фаол ўрганилмоқда [7, 8]. Бироқ МС популяциясида ушбу маркерларнинг қиёсий диагностик самарадорлигига оид малумотлар ҳали етарли эмас, айниқса Марказий Осиё минтақасида бундай тадқиқотлар кам ўтказилган.

Шу асосда тадқиқотимизнинг мақсади – МС фонида СБК нинг эрта босқичларини аниқлашда систатин-С, НГАЛ ва МАУ маркерларининг қиёсий диагностик қийматини баҳолаш ва клиник амалиёт учун оптимал биомаркер панелини шакллантиришдан иборат бўлди.

Материал ва усуллар. Тадқиқот Бухоро вилоят кўп тармокли тиббиёт маркази нефрология бўлимида 2023-йил сентябридан 2025-йил мартгача ўтказилди. Тадқиқотга 18–65 ёшдаги жами 150 нафар шахс жалб этилди ва улар қуйидаги гуруҳларга ажратилди: I гуруҳ (асосий) – МС ва СБК (КДИГО бўйича G3a–G3b босқич, ГФР 30–59 мл/мин/1,73 м²) мавжуд 55 нафар бемор (ўртача ёши $52,8 \pm 7,4$ йил, 56,4% эркаклар); II гуруҳ (таққослаш) – МС мавжуд, аммо СБК аниқланмаган 50 нафар бемор (ўртача ёши $50,3 \pm 6,9$ йил); III гуруҳ (назорат) – соматик жихатдан соғлом 50 нафар кўнгилли (ўртача ёши $48,7 \pm 7,1$ йил). МС ташхиси ИДФ (2005) мезонлари, СБК ташхиси КДИГО (2024) таснифи асосида қўйилди.

Истисно мезонлари: 1-тип қандли диабет, ўткир буйрак шикастланиши, аутоиммун нефропатиялар, онкологик касалликлар, ҳомиладорлик, сўнгги 3 ой ичида нефротоксик дорилар қабул қилиш. Барча иштирокчилардан ёзма розиллик олинди, тадқиқот протоколи БухДТИ қошидаги биоэтика кенгаши томонидан мақулланди (баённома № 7, 2023-йил 15-август).

Лаборатор текширувлар: Қон зардобиди систатин-С иммунонефелометрик усулда (Сиеменс БН ПроСпес), НГАЛ ЭЛИСА усулида (БиоПорто Диагностисс тўплами), креатинин энзимавий (Жаффе) усулда, глюкоза, умумий холестерин (УХ), триглитсеридлар (ТГ), ЮЗТЛ холестерини, ПЗТЛ холестерини стандарт биокимёвий анализаторда аниқланди. Сийдикда албумин ва креатинин нисбати (АКН, мг/г) имунотурбидиметрик усулда ўлчанди. ГФР СКД-ЭПИ (2021, систатин-С асосида) формуласи билан ҳисобланди. Инсулинрезистентлик ХОМА-ИР индекси орқали баҳоланди.

Статистик таҳлил: Малумотлар СПСС 26.0 дастурида ишланди. Тақсимот нормаллик Шапиро–W илк тести билан текширилди. Гуруҳлараро фарқлар учун АНОВА ва пост-ҳос Тукей тести, ноннормал тақсимотда Крускал–Уоллис тести қўлланилди. Коррелятсион боғлиқлик Спирман р коеффициенти билан баҳоланди. Диагностик самарадорлик РОС таҳлил, оптимал чегаралар Ёуден

индекси, маркерлар комбинатсияси логистик регрессия модели орқали аниқланди. $p < 0,05$ статистик аҳамиятли деб қабул қилинди.

Тадқиқот натижалари. Текширилган гуруҳларнинг клиник-метаболик характеристикаси 1-жадвалда келтирилган.

1-жадвал.

Гуруҳларнинг клиник-метаболик ко'рсаткичлари ($M \pm m$)

Кўрсаткич	I гуруҳ (МС+СБК) n=55	II гуруҳ (МС) n=50	III гуруҳ (Назо- рат) n=50	p (I– II)
ТВИ ($\text{кг}/\text{м}^2$)	33,1 $\pm$ 3,6*	31,4 $\pm$ 3,2*	23,8 $\pm$ 2,5	<0,001
Бел айланаси (см)	112,4 $\pm$ 8,1*	107,6 $\pm$ 7,3*	86,2 $\pm$ 6,1	<0,001
Систолик ҚБ (мм Ҳг)	152,7 $\pm$ 11,4*	144,8 $\pm$ 9,6*	119,3 $\pm$ 7,8	<0,001
Глюкоза (ммол/л)	7,6 $\pm$ 1,3*	7,1 $\pm$ 1,1*	4,9 $\pm$ 0,6	<0,001
ҲОМА-ИР	5,8 $\pm$ 1,4*	4,9 $\pm$ 1,2*	1,8 $\pm$ 0,5	<0,001
УХ (ммол/л)	6,7 $\pm$ 1,0*	6,2 $\pm$ 0,9*	4,4 $\pm$ 0,7	<0,001
ТГ (ммол/л)	2,8 $\pm$ 0,7*	2,3 $\pm$ 0,6*	1,1 $\pm$ 0,3	<0,001
ПЗТЛ (ммол/л)	0,91 $\pm$ 0,14*	0,98 $\pm$ 0,16*	1,42 $\pm$ 0,18	<0,001

*Изоҳ: назорат гуруҳига нисбатан ишончли фарқ ($p < 0,05$).

1-жадвалдан ко'риниб турибдики, МС мавжуд гуруҳларда барча метаболик ко'рсаткичлар назоратдан сезиларли фарқланган. I гуруҳда инсулинрезистентлик энг юкори даражада ифодаланиб (ҲОМА-ИР 5,8 $\pm$ 1,4), бу буйрак шикастланиши билан метаболик бузилишларнинг синергистик алоқасини тасдиқлайди. II гуруҳда ҳам метаболик о'згаришлар мавжуд бо'лган, аммо буйрак функцияси сақланганлигини ҳисобга олсак, компенсатор механизмлар ҳали фаол эканлиги ко'ринади.

Буйрак функциясини акс эттирувчи асосий лаборатор ко'рсаткичлар 2-жадвалда келтирилган.

2-жадвал.

Буйрак функцияси маркерлари ($M \pm m$)

Кўрсаткич	I гуруҳ (МС+СБК)	II гуруҳ (МС)	III гуруҳ (Назо- рат)	p (I–III)
Креатинин ($\mu\text{мол}/\text{л}$)	162,3 $\pm$ 19,7*	88,4 $\pm$ 10,6	76,8 $\pm$ 8,9	<0,001
ГФР ($\text{мл}/\text{мин}/1,73 \text{ м}^2$)	48,6 $\pm$ 9,2*	89,7 $\pm$ 10,8	106,3 $\pm$ 11,4	<0,001
Систатин-С ($\text{мг}/\text{л}$)	1,92 $\pm$ 0,28*	1,14 $\pm$ 0,22*†	0,78 $\pm$ 0,15	<0,001
НГАЛ ($\text{нг}/\text{мл}$)	168,4 $\pm$ 24,6*	98,7 $\pm$ 16,3*†	52,1 $\pm$ 9,8	<0,001
МАУ – АҚН ($\text{мг}/\text{г}$)	94,3 $\pm$ 15,7*	38,6 $\pm$ 9,4*†	8,7 $\pm$ 3,2	<0,001

*назоратга нисбатан $p < 0,05$; I гуруҳга нисбатан $p < 0,05$.

I гуруҳда ГФР о'ртача 48,6 $\pm$ 9,2 $\text{мл}/\text{мин}/1,73 \text{ м}^2$ ни ташкил этиб, СБК ГЗб босқичига мос келди. Диққатга сазовор томони шундаки, II гуруҳда (фақат МС) ҳам систатин-С (1,14 $\pm$ 0,22 $\text{мг}/\text{л}$), НГАЛ (98,7 $\pm$ 16,3 $\text{нг}/\text{мл}$) ва МАУ (38,6 $\pm$ 9,4 $\text{мг}/\text{г}$) назоратга нисбатан ишончли юкори бўлди, ҳолбуки ГФР ва креатинин меёрида эди. Бу ҳолат II гуруҳдаги беморларнинг бир қисмида субклиник буйрак шикастланиши мавжуд бўлиши мумкинлигини ва ананавий маркерлар бу ўзгаришларни “кўра олмаслигини” кўрсатади.

Корреляцион таҳлил натижалари 3-жадвалда келтирилган.

Систатин-С ГФР билан энг кучли тесқари коррелятсияга эга бўлди ($r = -0,79$; $p < 0,001$), ундан кейин НГАЛ ($r = -0,72$) ва креатинин ($r = -0,74$) турди. ҲОМА-ИР ва систатин-С ўртасидаги тўғри коррелятсия ($r = 0,61$) инсулинрезистентликнинг буйрак шикастланишига бевосита тасирини акс эттиради. ТВИ ва НГАЛ ўртасидаги алоқа ($r = 0,53$) семизликнинг тубуляр шикастланиш маркерига тасирини кўрсатади.

Биомаркерлар ва ГФР о'ртасидаги коррелятсион боғ'лиқлик (Спирман р; n=150)

Кўрсаткичлар жуфтлиги	r	p	Изоҳ
Систатин-С – ГФР	-0,79	<0,001	Кучли тескари
НГАЛ – ГФР	-0,72	<0,001	Кучли тескари
МАУ (АКН) – ГФР	-0,66	<0,001	Ўртача-кучли тескари
Креатинин – ГФР	-0,74	<0,001	Кучли тескари
ХОМА-ИР – систатин-С	0,61	<0,001	Ўртача тўғри
ТВИ – НГАЛ	0,53	<0,001	Ўртача тўғри
ТГ – МАУ	0,48	<0,001	Ўртача тўғри

Маркерларнинг диагностик самарадорлиги ROC таҳлили натижалари 4-жадвалда келтирилган.

Биомаркерларнинг диагностик самарадорлиги (ROC таҳлил)

Маркер	AUC (95% СИ)	Оптимал чегара	Сезгирлик (%)	Хослик (%)	Ёуден индекси
Систатин-С	0,93 (0,89–0,97)	>1,38 мг/л	91	85	0,76
НГАЛ	0,89 (0,84–0,94)	>124 нг/мл	84	81	0,65
МАУ (АКН)	0,86 (0,80–0,92)	>48 мг/г	80	78	0,58
Креатинин	0,81 (0,74–0,88)	>115 µмол/л	74	72	0,46
Комбинатсия*	0,96 (0,93–0,99)	—	93	91	0,84

*Комбинатсия: систатин-С + НГАЛ + МАУ логистик регрессия модели.

Якка маркерлар ичида систатин-С энг юқори AUC=0,93 ни кўрсатиб, сезгирлиги 91%, хослиги 85% бўлди. НГАЛ тубуляр шикастланишни ифодаловчи маркер сифатида AUC=0,89, МАУ эса гломеруляр ўтказувчанлик бузилишини акс эттирувчи маркер сифатида AUC=0,86 ташкил этди. Анавий креатинин нисбатан паст диагностик аниқликка эга бўлди (AUC=0,81). Энг муҳими, учала замонавий маркерни (систатин-С, НГАЛ, МАУ) логистик регрессия моделига бирлаштириш AUC=0,96 га етказди, бу якка маркерларнинг ҳар бирига нисбатан сезиларли юқори (ДеЛонг тести, $p<0,01$). Ушбу натижа турли патогенетик механизмларни акс эттирувчи маркерларнинг биргаликда қўлланиши диагностик аниқликни синергистик тарзда оширишини кўрсатади.

II гуруҳдаги 50 беморнинг ичида систатин-С>1,38 мг/л бўлган 11 нафар (22%) аниқланди; ушбу беморларнинг барчасида НГАЛ ҳам меёрдан юқори бўлди. 6 ойлик кузатув давомида уларнинг 7 нафарида (63,6%) ГФР пасайиши қайд этилиб, СБК Г3а босқичига ўтиши тасдиқланди. Бу натижа систатин-С ва НГАЛ нинг предиктор (башоратловчи) сифатидаги аҳамиятини кўрсатади.

Муҳокама. Олинган натижалар систатин-С маркерининг МС фонида СБК ни эрта аниқлашда креатининдан устун эканлигини тасдиқлайди, бу Дхарнидхарка ва ҳамкасбларининг (2022) мета-таҳлили натижалари билан мос келади [9]. Систатин-С нинг афзаллиги шундаки, у гломеруляр филтратсиянинг нозик ўзгаришларини мушак массаси, жинс ва овқатланиш тартибидан мустақил ҳолда акс эттиради, МС беморлари учун бу хусусият алоҳида аҳамиятга эга, чунки ушбу популяцияда тана таркиби ва мушак-ёғ нисбати сезиларли ўзгарган бўлади [10].

НГАЛ нинг юқори диагностик қиймати (AUC=0,89) тубулоинтерстициал шикастланиш МС фонида эрта бошланишини тасдиқлайди. Ҳаасе ва ҳамкасбларининг (2023) тадқиқоти ҳам шуни кўрсатганки, НГАЛ проксимал каналчалар шикастланишининг биринчи соатларидаёқ сийдик ва қон зардобидида ошади [11]. Бизнинг натижаларимизда НГАЛ нинг ТВИ билан ўртача коррелятсияси ($p=0,53$) семизликнинг тубуляр аппаратга бевосита тасирини ифодаловчи янги далил сифатида кизиқарли.

Комбинатсиялашган моделнинг AUC=0,96 га етиши шуни кўрсатадики, битта маркер билан чекланмасдан, гломеруляр (систатин-С, МАУ) ва тубуляр (НГАЛ) шикастланиш йўллари бир вақт-

да баҳоловчи панел қўлланилса, диагностик аниқлик сезиларли ошади. Бу ёндашув айниқса МС каби кўп омилли патологияларда, буйракнинг турли структураларини параллел шикастловчи ҳолатда ўзини оқлайди. Шундай қилиб, ушбу учлик панел МС популяциясида скрининг воситаси сифатида тавсия этилиши мумкин.

II гуруҳдаги беморларнинг 22 фоизида систатин-С меърдан юқори бўлиши ва уларнинг аксариятида 6 ой ичида ГФР пасайиши кузатилиши ушбу маркернинг нафақат диагностик, балки прогностик қийматга эга эканлигини кўрсатади. Бу натижа МС билан касалланган беморларни диспансер кузатувида систатин-С ни мунтазам мониторинг қилиш зарурлигини асослайди.

Тадқиқотнинг чекловлари: нисбатан кичик намуна ҳажми, бир марказли дизайн ва қисқа кузатув даври. Келгусида кўп марказли, проспектив дизайндаги тадқиқотларда ушбу натижаларни тасдиқлаш зарур.

Хулоса:

1. МС билан касалланган беморларда систатин-С, НГАЛ ва МАУ кўрсаткичлари ананавий креатининдан анча эрта буйрак функцияси бузилишини аниқлаш имконини беради; систатин-С яқка маркер сифатида энг юқори диагностик аниқликка эга ($AUC=0,93$; сезгирлик 91%, хослик 85%).

2. Систатин-С, НГАЛ ва МАУ ни бирлаштирган комбинатсиялашган диагностик панел энг юқори аниқлик кўрсатди ($AUC=0,96$; сезгирлик 93%, хослик 91%), бу эса клиник амалиётда МС беморлари орасида СБК ни эрта аниқлаш алгоритми сифатида қўлланилиши мумкин.

3. Фақат МС мавжуд беморларнинг 22 фоизида систатин-С меърдан юқори бўлиши ва 6 ой ичида уларнинг аксариятида ГФР пасайиши кузатилиши ушбу маркернинг прогностик қийматини тасдиқлайди.

4. МС фонида СБК профилактикаси ва эрта аниқлаш мақсадида систатин-С, НГАЛ ва МАУ дан иборат биомаркер панелини бирламчи тиббий ёрдам босқичида жорий этиш, скрининг протоколларини ишлаб чиқиш ва диспансер кузатувини такомиллаштириш тавсия этилади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Alberti K.G.M.M., Eckel R.H., Grundy S.M. et al. Harmonizing the metabolic syndrome: a joint interim statement // *Circulation*. – 2009. – Vol. 120. – P. 1640–1645.
2. Saklayen M.G. The global epidemic of the metabolic syndrome // *Curr Hypertens Rep*. – 2018. – Vol. 20(2). – P. 12.
3. Thomas G., Sehgal A.R., Kashyap S.R. et al. Metabolic syndrome and kidney disease: a systematic review and meta-analysis // *Clin J Am Soc Nephrol*. – 2011. – Vol. 6. – P. 2364–2373.
4. Garofalo C., Borrelli S., Minutolo R. et al. A systematic review and meta-analysis suggests obesity predicts onset of chronic kidney disease // *Kidney Int*. – 2017. – Vol. 91. – P. 519–524.
5. Zokirov V. Z. Chronic liver disease and covid-2019 (literature review and own data) // *research journal of trauma and disability studies*. – 2022. – T. 1. – №. 4. – C. 24–29.
6. Zokirov V. Z. Comparative analysis of the results of laboratory-biochemical analysis in middle-aged and elderly patients with non-alcoholic fatty liver disease after covid-19 // *Art of Medicine. International Medical Scientific Journal*. – 2022. – T. 2. – №. 1.
7. Zokirov V. Z. COVID 19 o'tkazgan va o'tkazmagan jigarning noalkagol yog'xastaligi bilan og'rigan bemorlar klinikasi va laborator tahlillarining solishtirma tahlili // *Scientific progress*. – 2022. – T. 3. – №. 1. – C. 670–675.
8. Ferguson M.A., Waikar S.S. Established and emerging markers of kidney function // *Clin Chem*. – 2012. – Vol. 58(4). – P. 680–689.
9. Dharnidharka V.R., Kwon C., Stevens G. Serum cystatin C is superior to serum creatinine as a marker of kidney function: a meta-analysis // *Am J Kidney Dis*. – 2022. – Vol. 40(2). – P. 221–226.
10. Stevens L.A., Schmid C.H., Greene T. et al. Factors other than GFR affecting serum cystatin C levels // *Kidney Int*. – 2009. – Vol. 75. – P. 652–660.
11. Haase M., Bellomo R., Devarajan P. et al. Accuracy of NGAL in diagnosis and prognosis in acute kidney injury: a systematic review // *Am J Kidney Dis*. – 2023. – Vol. 54(6). – P. 1012–1024.
12. Ismatova M.N., Isroilov I.I. Metabolik sindrom fonida buyrak funksiyasi o'zgarishlarining klinik-laborator xususiyatlari // *Buxoro tibbiyot jurnali*. – 2024. – № 3. – B. 45–51.

Иктибос учун: Исматова М.Н., Исроилов И.И. Метаболик синдром билан оғриган беморларда сурункали буйрак касаллигининг эрта босқичларини аниқлашда цистатин-С, НГАЛ ва микроалбуминурия маркерларининг қиёсий диагностик аҳамияти // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси*. – 2026. – № 4(24). – Б. 570–574. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19625759>

**ТУГМА ЮРАК НУҚСОНЛАРИНИ СЕКЦИОН ТАҲЛИЛ ОРҚАЛИ АНИҚЛАШ, УЛАРНИНГ
УЧРАШ ЧАСТОТАСИ ВА МОРФОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИНИ ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ****Исмоилов Ж.М., Мусурмонова М.С.**

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Тугма юрак нуқсонлари перинатал ва чақалоқлар ўлимнинг етакчи сабабларидан бири бўлиб, туғма ривожланиш аномалиялари таркибида муҳим ўрин тутади. Клиник-инструментал диагностиканинг муваффақиятларига қарамай, аутопсия текшируви туғма юрак нуқсонларини текшириш ва ёндош патоморфологик ўзгаришлар даражасини баҳолашнинг "олтин стандарти" бўлиб қолмоқда. Ушбу ишда туғма юрак нуқсонларининг учраш частотасини аниқлаш ва аутопсия текшируви маълумотлари асосида миокард, клапан аппарати ва магистрал қон томирлардаги морфологик ўзгаришларни таҳлил қилиш натижалари келтирилган. Аутопсия таҳлили туғма юрак нуқсонларининг тузилишини объектив баҳолашга, уларнинг нохуш кечиш механизмларини аниқлашга ва ўлимнинг бевосита сабабларини аниқлашга имкон беради.

Калит сўзлар: туғма юрак нуқсонлари; аутопсия; патоморфология; миокард; гемодинамик бузилишлар; перинатал ўлим; морфологик диагностика.

**IDENTIFICATION OF CONGENITAL HEART DEFECTS THROUGH SECTIONAL ANALYSIS,
ANALYSIS OF THEIR FREQUENCY AND MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS****Ismailov J.M., Musurmonova M.S.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan.

Resume. Congenital heart defects are one of the leading causes of perinatal and infant mortality and occupy an important place in the structure of congenital developmental anomalies. Despite successes in clinical and instrumental diagnostics, congenital heart examination remains the "golden standard" for examining heart defects and assessing the degree of associated pathomorphological changes. This work presents the results of determining the frequency of congenital heart defects and analyzing morphological changes in the myocardium, valvular apparatus, and main vessels based on autopsy data. Special attention is paid to the identification of secondary adaptive-dystrophic and sclerotic changes formed as a result of chronic hemodynamic disorders. Atopic analysis allows for an objective assessment of the structure of congenital heart defects, determining the mechanisms of their origin, and establishing the immediate causes of death.

Keywords: congenital heart defects; autopsy; pathomorphology; myocardium; hemodynamic disorders; perinatal death; morphological diagnostics.

**ВЫЯВЛЕНИЕ ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ СЕРДЦА С ПОМОЩЬЮ СЕКЦИОННОГО
АНАЛИЗА И ИХ ЧАСТОТЫ ВСТРЕЧАЕМОСТИ И МОРФОЛОГИЧЕСКИХ
ОСОБЕННОСТЕЙ****Исмаилов Ж.М., Мусурмонова М.С.**

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Врожденные пороки сердца являются одной из ведущих причин перинатальной и младенческой смертности и занимают важное место в структуре врожденных аномалий развития. Несмотря на успехи в клинико-инструментальной диагностике, освидетельствование на врожденном сердце остается "золотым стандартом" для обследования пороков сердца и оценки степени сопутствующих патоморфологических изменений. В данной работе представлены результаты анализа морфологических изменений миокарда, клапанного аппарата и магистральных сосудов на основе определения частоты встречаемости врожденных пороков сердца и данных аутопсийного исследования. Атопический анализ позволяет объективно оценить структуру врожденных пороков сердца, определить механизмы их возникновения и определить непосредственные причины смерти.

Ключевые слова: врожденные пороки сердца; аутопсия; патоморфология; миокард; гемодинамические нарушения; перинатальная смерть; морфологическая диагностика.

e-mail: ismoilov-jasur@bk.ru.

Кириш. Туғма юрак нуқсонлари (ТЮН) эмбриогенез даврида шаклланадиган юрак ва магистраль томирларнинг анатомик нуқсонлари бўлиб, юрак ичи ва тизимли гемодинамиканинг бузилишига олиб келади. Туғма ривожланиш аномалиялари тузилмасида ТЮН етакчи ўринни эгаллайди ва перинатал ҳамда чақалоқлар ўлимининг асосий сабабларидан бири ҳисобланади [2,6].

Морфологик нуқтаи назардан ТЮН юқори ўзгарувчанлик билан тавсифланади, бу кардиогенез, камералар септатсияси, клапан аппарати ва магистраль томирларнинг шаклланиши жараёнларини ўз ичига олган юракнинг эмбрионал ривожланишининг мураккаблиги билан боғлиқ. Ушбу босқичларнинг ҳар биридаги бузилишлар барқарор анатомик нуқсонларнинг шаклланишига олиб келади [1].

Кўплаб эпидемиологик тадқиқотлар маълумотларига кўра, дунёда ТЮНнинг ўртача частотаси ҳар 1000 тирик туғилган чақалоққа 8-10 ҳолатни ташкил қилади. Шу билан бирга, сўнгги ўн йилликларда қайд этилган тарқалишнинг ўсиш тенденцияси кузатишмоқда, бу кўп жиҳатдан пренатал ва постнатал диагностика усуллари тақомиллаштириш, шунингдек, нуқсонларнинг энгил шакллари киритиш мезонларини кенгайтириш билан боғлиқ [3,5].

Европа туғма аномалиялар регистрлари (ЭУРОСАТ) маълумотларига кўра, ТЮНнинг умумий тарқалиши нисбатан барқарор бўлиб қолмоқда ва барча туғилишлар, шу жумладан тирик туғилиш ва ўлик туғилишлар учун 5,5-6,0 оралиғида ўзгариб туради. Ривожланаётган мамлакатларда кўпинча кўрсаткичлар пасайтириб кўрсатилади, бу эса ихтисослаштирилган диагностика имкониятларининг чекланганлиги билан боғлиқ [4,11,15].

ТЮНнинг клиник аҳамияти бўйича тақсимланиши алоҳида эътиборга лойиқ. Ҳаётнинг дастлабки ҳафталарида жарроҳлик йўли билан тузатишни талаб қиладиган критик ТЮН деб аталадиган ҳолатлар барча ҳолатларнинг 25-30% ни ташкил қилади ва эрта ўлимга асосий ҳисса қўшади. Туғма юрак нуқсонлари (ТЮН) туғма аномалияларнинг энг кенг тарқалган гуруҳи бўлиб, перинатал ва чақалоқлар касалланиши ва ўлимининг сезиларли улушини ташкил қилади. Йирик мета-таҳлилларга кўра, дунё бўйича ТЮНнинг ўртача частотаси 1000 тирик туғилган чақалоққа 8-9 атрофида бўлиб, 2010-2017 йилларда 1000 га ~9,41 га етган. Динамикада кўрсаткичларнинг қайд этилган ўсиши кўп жиҳатдан нафақат аниқланишнинг ҳақиқий ўсиши, балки диагностиканинг яхшиланиши (шу жумладан, эхокардиография), скринингнинг кенгайиши, рўйхатга олиш ёндашувларининг ўзгариши ва "енгил" шаклларнинг (масалан, тўсиқларнинг кичик нуқсонлари) киритилиши билан боғлиқ [7-9,12-15].

Европа учун популяция регистри маълумотлари 2015-2023 йиллар давомида умумий тарқалишнинг барқарорлигини кўрсатади: 10 000 туғилишга 57,1 (шу жумладан тирик туғилиш ва ўлик туғилиш), ишончли ўсиш тенденцияси йўқ.

Адабиётларда ТЮНнинг кўп омилли табиати таъкидланади: генетик омиллар (хромосома аномалиялари, микроделетсиялар, мутациялар), эмбрионал ривожланишнинг бузилиши (жумладан, асаб тожи ҳужайраларининг миграцияси ва "иккиламчи юрак майдони"нинг шаклланиши), шунингдек, ташқи омилларнинг таъсири (инфекциялар, тератогенлар, ондаги метабolik бузилишлар). Конотрункал нуқсонлар гуруҳи учун чиқиш йўлини шакллантириш ва уни аорта ва ўпка компонентларига ажратишнинг бузилиши асосий ҳисобланади [6].

ТЮНдаги патоморфологик ўзгаришларни икки текисликда кўриб чиқиш мақсадга мувофиқдир: Бирламчи анатомик нуқсон (нуқсоннинг морфологик субстрати): тўсиқ нуқсони, клапан стенози/атрезияси, магистраль томирларнинг транспозицияси, сақланиб қолган эмбрионал алоқалар ва бошқалар. Сурункали босим/ҳажмнинг ҳаддан ташқари юкланиши, гипоксемия ва ўпкада қон оқимининг бузилиши натижасида юзага келадиган юрак ва қон томирларининг иккиламчи ремоделлаштирувчи ўзгаришлари. Типик иккиламчи ўзгаришлар қаторига қуйидагилар киради: миокард гипертрофияси (босим билан ортиқча юкламада концентрик ва ҳажм билан ортиқча юкламада эксцентрик); бўшлиқларнинг кенгайиши, эндокардиал фиброэластоз (алоҳида ортиқча юклама шаклларида ва чақалоқларда); клапан аппаратининг ремоделланиши (фиброз, миксоматоз дегенерация/дисплазия, табақаларнинг қалинлашиши); узок муддатли гипоксемия/ортиқча юкламада коронар қон оқимининг ўзгариши ва ўчоқли миокардиал фиброз (бола нуқсони ва ҳаёт давомийлигига қараб). Адабиётлар таҳлили шуни кўрсатадики, туғма юрак нуқсонлари замонавий тиббиётнинг асосий муаммоларидан бири бўлиб қолмоқда. Юқори тарқалиш, морфологик хилма-хиллик ва оғир иккиламчи ўзгаришлар уларнинг неонатология, кардиохирургия ва патологик анатомия учун аҳамиятини белгилайди. ТЮНда патоморфологик ўзгаришларни ҳар томонлама ўрганиш нуқсонларнинг шаклланиш механизмларини чуқурроқ тушуниш ва ташхислаш ҳамда даволашга замонавий ёндашувларни асослаш имконини беради [13-15].

Тадқиқот мақсади: Самарқанд вилояти болалар кўп тармоқли тиббиёт марказида вафот этган болалар ўртасида туғма юрак нуқсонлари учраш даражасини ва энг кўп турининг патоморфологик ўзгаришини аниқлаш.

Тадқиқот манбаи ва усуллари. Самарқанд вилояти болалар кўп тармоқли тиббиёт марказида 2024-2025 йиллар давомида вафот этган марҳум беморларнинг касаллик тарихи ва аутопсион текширувдан ўтказилганларни патологоанатомик хулосалари, юракнинг турли соҳаларидан олинган тўқима бўлақчалари олинди. Юрак туғма нуқсонларида юракда юзага келадиган ўзгаришларни макроскопик баҳолаш учун – унинг ташқи тузилиши, шакли, оғирлиги, қаватларнинг қалинлиги, бўшлиқларни ўлчамлари ҳамда алоҳида тарзда нуқсонга катта эътибор берилди. Аутопсион текшириш давомида юракдан олинган тўқима бўлақчалари ананавий гистологик ишлов берилгандан кейин гематоксилин эозин ва Ван Гизон усулларда бўйлиб микроскопик текширувлар олиб борилди.


Таҳлил натижалари. Ўтказилган таҳлил натижаларига кўра 2024-2025 йилда Самарқанд вилояти болалар кўп тармоқли тиббиёт марказида 335 та болалар ўлими қайд этилган бўлиб шундан 252 таси патологоанатомик текширувдан ўтказилган. Вафот этган беморларни касалликлар назологияси бўйича таҳлил қилганда уларни 58 таси юрак туғма нуқсонлари натижасида содир бўлганлиги аниқланди. Юрак туғма нуқсонлари турлари бўйича эса қуйидагиларни ташкил қилди: қоринчалар орасидаги тўсиқнинг нуқсони 21 та, бўлмачалар орасидаги тўсиқ нуқсони 8 та, қоринча ва бўлмачалар орасидаги тўчиқнинг нуқсони 7 та, Батталов йўлининг битмаганлиги 18 та, магистрал қон томирлар тропозицияси 5 та, Фалло триадаси 1 та, Фалло Тетрадаси 5 та ҳолатларда қайд этилди. Юрак туғма нуқсони натижасида вафот этган беморларни жинс бўйича таҳлил қилганда уларни 36 таси 62% ўғил болаларни, 22 таси 38% қиз болаларни ташкил қилди. Касаллик тарихи маълумотлари бўйича вафот этган беморларни оналари ҳомиладорлик даври айниқса ҳомиладорликни биринчи уч ойлигида ўткир респиратор вирусли касалликлари, пиелонефрит, камқонлик касалликлари билан азият чекишган. Оналарни ёшларни солиштира таҳлил олиб борилганда уларни аксарияти 3-4 баъзиларида 6 ҳомиладорлик бўлиб ёшлари 30-35 лар атрофида эканлиги қайд этилди. Ачинарли ҳолат шундаки 16 та ҳолатда беморларда туғма юрак нуқсонлари бошқа касалликлар сабабли шифохона мурожат қилган ҳолатлар аниқланган бўлсада 28 та ҳолатда туғма нуқсон 3 ойликдан кейин аниқланган қолган ҳолатларда эса туғма нуқсон туғилгандан кейин дастлабки кунларда аниқланган. Аниқланган сўнг беморлар диспансер назоратида туриб доимий равишда кардиолог ва участка педиатри назоратида туришган. Юрак туғма нуқсони сабабли вафот этган беморларни ёши бўйича таҳлил ўтказилганда уларни 41 таси яъни 71% 1 ёшгача бўлганларни ташкил қилиб, шундан 3 ойгача 19 та, 6 ойгача 6 тани, 9 ойликгача 7 тани 12 ойликгача эса 8 тани ташкил этган бўлча қолган 18 та ҳолат 1 ёшдан катталарни ташкил қилади. Ушбу беморларни кўпчилиги шифохонада юрак туғма нуқсонлари сабабли юзага келган юқори ва паски нафас олиш тизимининг яллиғланиши касалликлари туфайли стационарда оғир аҳволда мурожат қилишган ва ўртача 8 кун давомида ётиб даволаниш давомида юзага келган асоратлар сабабли вафот этишган. Беморлар стационарда даволаниш давомида энг камида 16 соатдан 30 кунгача ётишган ва реанимацион чора тадбирлар билан биргаликда симптоматик, этиотроп, инфузион, кислородотерапия, юрак фаолияти яхшилайдиган препаратлар қабул қилиб боришган. 23 та ҳолатда аниқланган туғма юрак нуқсонлари жарроҳлик амалиёти орқали бартараф этилишига қарамасдан уларда ўлим ҳолатлари кузатилган. Патологоанатомик хулосаларни таҳлил қилганда ушбу вафот этган беморлари аксарияти икки томонлама димланган сероз геморрагик пневмония, серозли йирингли бронхопневмония, ўпка гипертензияси, ички аъзоларни ўткир ва сурункали веноз димланиш, ўпканинг кўнғир индурацияси, мускат жигари, гипоксия натижасида ўткир бўйрак етишмовчилиги асоратлари туфайли вафот этишган.

Юқоридаги маълумотлардан келиб чиққан ҳолда юрак туғма нуқсонлари патоморфологик ўзгаришларни энг кўп учрайдиган турларни кўриб чиқишга қарор қилдик. Шулардан бири қоринчалараро тўсиқ нуқсони бўлиб, ташқи кўрикда юрак ўлчамлари катталашган, унинг оғирлиги ёш меъёридан ортиқ. Юрак конфигурацияси асосан чап, касаллик узок давом этганда эса ўнг бўлимларнинг яққол кенгайиши ва гипертрофияси ҳисобига ўзгарган. Эпикард силлиқ, ялтироқ, айрим жойларида ўртача веноз тўлақонлик аниқланиши мумкин. Юрак бўшлиқлари очилганда қоринчалараро тўсиқ нуқсони аниқланади, у кўпинча перимембраноз бўлимда, камроқ - тўсиқнинг мушак қисмида жойлашади. Нуқсон юмалоқ ёки овал шаклда бўлиб, унинг четлари зич, кўпинча қалинлашган ва фиброз ўзгаришга учраган. Нуқсоннинг ўлчамлари кенг чегараларда ўзгариб туради ва гемодинамик бузилишлар даражасини белгилайди. Чап қоринча одатда катталашган, унинг девори қалинлашган, бу сурункали ҳажмий ортиқча юкланиш шароитида миокард гипертрофиясини кўрсатади. Чап қоринча бўшлиғи ўртача кенгайган бўлиши мумкин. Миокард зич консистенцияли,

кесилганда кизил-кўнгир рангда бўлади. Ўнг қоринча ҳам сезиларли даражада чапга оқишда катталашган; унинг деворининг қалинлашиши ва бўшлиғининг кенгайиши қайд этилади, бу кичик қон айланиш доирасидаги босимнинг ошиши туфайли иккиламчи гипертрофия ва дилатация ривожланишини акс эттиради. Ўнг қоринчанинг трабекуляр нақши кучайган. Нуксон соҳасидаги тўсиқ юпқалашган, баъзи ҳолларда деформацияланган, тешик четларида фиброз қалинлашиш белгилари мавжуд. Юракнинг клапан аппарати одатда морфологик жиҳатдан сақланиб қолинган, аммо перимембраноз нуксонларда қоннинг турбулент оқими билан боғлиқ бўлган трикуспидал ёки аорта клапанлари табақаларининг иккиламчи деформацияси кузатилади. Сўргичсимон мускуллар ва хордалар кўпинча гипертрофияланган, юрак бўлмачалари, айниқса чап бўлмача, кичик қон айланиш доирасидан қон оқиб келиши кўпайиши натижасида ўртача кенгайишга учраган. Бўшлиқлар эндокарди силлиқ, баъзи жойларда қалинлашган.


Миокардни микроскопик текширишда кардиомиоцитларнинг яққол гипертрофияси аниқланади, асосан чап қоринча деворида, сезиларли чап-ўнг оқимда эса ўнг қоринча ҳам. Кардиомиоцитлар кўндалангига катталашган, узунчоқ шаклга эга, цитоплазмаси интенсив эозинофил бўйланган. Кардиомиоцитларнинг ядролари йирик, гиперхром, кўпинча чўзинчоқ ёки тўғри бурчакли шаклга эга бўлиб, полиплоидия белгилари билан намоён бўлади, бу миокарднинг сурункали ортикча юкламага компенсатор реакциясини акс эттиради. Айрим хужайраларда миофибриллалар диссоциацияга учраб, нотекис жойлашади ва донатор дистрофияга учраган жойлар кўзга ташланади. Мушаклараро оралиқ тўқимасида ўртача ифодаланган интерстициал шиш, хужайралараро бўшлиқларнинг кенгайиши ва капиллярларнинг тўлақонлиги аниқланади. Бир қатор кўриш майдонларида сурункали гипоксик-яллиғланиш реакциясидан далолат берувчи ўчоқли периваскуляр лимфогистиоцитар инфильтратлар қайд этилади (1 расм).

Ван Гизон бўйича бўйланганда миокардда оралиқ тўқимасининг фиброз ўзгаришлари аниқ кўринади. Коллаген толалар тўқ кизил рангга бўйлади ва асосан периваскуляр ҳамда гипертрофияланган кардиомиоцитлар тутамлари орасида жойлашади (2 расм). Ўчоқли ва диффуз интерстициал фиброз қайд этилади, унинг ифодаланиш даражаси гемодинамик бузилишларнинг давомийлиги билан боғлиқ. Микронекрозлар соҳасида дағал толали бириктирувчи тўқима ўсиб кетган ўринбосар фиброз ўчоқлари кўзга ташланади, бу нарсa миокарднинг сурункали тарзда зарарланганидан дарак беради. Миокарднинг қон томир оқими мушак қатламининг гиперплазияси ва интиманинг фиброз ўзгаришлари туфайли майда артериялар ва артериолалар деворларининг қалинлашиши билан тавсифланади, бу эса миокард ишемизациясини кучайтиради ва дистрофик жараёнларнинг ривожланишига ёрдам беради.



1-расм. Қоринчалараро тўсиқ нуксонидан вафот бемор миокард қаватидаги патоморфологик ўзгаришлари. Гематоксилин эозин билан бўйланган. ок.10.06.40.

Қоринчалараро тўсиқ нуксонида аниқланган миокарднинг микроскопик ўзгаришлари патогенетик жараёнларнинг кетма-кетлигини акс эттиради, жумладан: сурункали ортикча юкламага жавобан кардиомиоцитларнинг компенсатор гипертрофияси; миокарднинг гипоксик ва дистрофик қайта тузилишининг ривожланиши; интерстициал ва ўрнини босувчи фибрознинг шаклланиши; юрак қисқарувчанлик функциясининг прогрессив пасайиши аниқланди.




2-расм. Қоринчалараро тўсиқ нуқсонидан вафот бемор миокард қаватидаги патоморфологик ўзгаришлари. Ван Гизон усулида бўялган. ок.10.об.40.

Бўлмачалар орасидаги юрак туғма нуқсониди ташқи кўрикда юрак ўлчамлари катталашган, унинг оғирлиги ёш меъёридан ортиқ. Юрак конфигурацияси асосан ўнг бўлимларнинг катталашishi хисобига ўзгарган. Юрак шарсимон ёки ўртача кенгайган шаклга киради. Эпикард силлиқ, ялтироқ, айрим жойларида яққол веноз тўлақонлик кузатилади, фибрин ўчоқлари ёки битишмалар аниқланмайди. Юрак бўшлиқлари очилганда бўлмачалараро тўсиқ нуқсони аниқланади, у кўпинча овал дарча соҳасида, камроқ - бирламчи тўсиқ соҳасида жойлашгани аниқланди. Нуқсон юмалоқ ёки овал шаклга эга бўлиб, унинг четлари текис ёки ўртача қалинлашган, зич, баъзан фиброз қайта қуриш жойлари билан ажралиб туради. Нуқсоннинг ўлчамлари ҳар хил бўлиб, юрак ичи гемодинамик бузилишларининг оғирлигини сезиларли даражада белгилайди. Ўнг бўлмача сезиларли даражада кенгайган, унинг девори қалинлашган, бу сурункали ҳажмли зўриқишдан далолат беради. Ўнг бўлмача бўшлиғи кенгайган, эндокард силлиқ, баъзи жойларда ўртача қалинлашган. Ўнг бўлмача қулоғида трабекуляр нақш кучайган. Ўнг қоринчанинг ҳажми ҳам катталашган, унинг бўшлиғи кенгайган, девори қалинлашган, бу қон билан тўлишнинг ошиши ва прогрессив ўпка гипертензияси туфайли миокарднинг иккиламчи гипертрофияси ривожланишини акс эттиради. Ўнг қоринча трабекулалари яққол ифодаланган, сўрғичсимон мушаклар катталашган. Чап бўлмача ва чап қоринча одатда камроқ даражада ўзгарган бўлади. Чап бўлмача ўртача даражада кенгайиши мумкин, чап қоринча эса кўпинча деворининг меъёрга яқин ўлчамлари ва қалинлигини сақлаб қолади ёки ўртача гипотрофияни намоён қилади, бу катта қон айланиш доирасига кирадиган қон ҳажмининг нисбатан камайиши билан боғлиқ. Нуқсон соҳасида бўлмачалараро тўсиқ юпқалашган, баъзи ҳолларда деформацияланган. Эндокарднинг нуқсонга ёндош қисмларида қалинлашиш ва фиброз қайта қуриш белгилари аниқланиши мумкин, бу қоннинг узоқ вақт давомида турбулент оқими билан боғлиқ. Юракнинг клапан аппарати кўп ҳолларда морфологик жиҳатдан сақланиб қолади. Бироқ, остиум примум туридаги нуқсонларда кўпинча атриовентрикуляр клапанларнинг иккиламчи ўзгаришлари, шу жумладан табақаларнинг деформацияси ва фиброз ҳалқаларнинг кенгайиши аниқланади, бу эса нисбий клапан етишмовчилиги билан бирга кузатилиши мумкин.


Магистрал томирлар одатда қўпол туғма аномалияларга эга эмас. Бироқ, ўпка артерияси кўпинча кенгайган, унинг девори қалинлашган бўлиб, бу узоқ вақт давомида мавжуд бўлган чап томонлама қон шунтлашда ўпка гипертензиясининг ривожланишини акс эттиради.

Миокардни микроскопик текширишда кардиомиоцитларнинг яққол гипертрофияси аниқланади, асосан чап қоринча деворида, сезиларли чап-ўнг оқимда эса ўнг қоринча ҳам. Кардиомиоцитлар кўндалангига катталашган, узунчоқ шаклга эга, цитоплазмаси интенсив эозинофил бўялган, ядролари йирик, гиперхром, кўпинча чўзинчоқ ёки тўғри бурчакли шаклга эга бўлиб, полиплоидия белгилари билан намоён бўлади, бу миокарднинг сурункали ортиқча юкламага компенсатор реакциясини акс эттиради. Айрим хужайраларда миофибриллалар диссоциацияга учраб, нотекис жойлашади ва донатор дистрофияга учраган жойлар кўзга ташланади. Мушаклараро оралик тўқимасида ўртача ифодаланган интерстициал шиш, хужайралараро бўшлиқларнинг кенгайиши ва капиллярларнинг тўлақонлиги аниқланади (3 расм). Ван Гизон бўйича бўялганда миокардда оралик тўқимасининг фиброз ўзгаришлари аниқ кўринади. Коллаген толалар тўқ қизил рангга бўялган ва асосан периваскуляр ҳамда гипертрофияланган кардиомиоцитлар тутамлари орасида жойлашган.

Ўчоқли ва диффуз интерстициал фиброз қайд этилади (4 расм). Миокарднинг қон томир оқими мушак қатламининг гиперплазияси ва интиманинг фиброз ўзгаришлари туфайли майда артериялар ва артериолалар деворларининг қалинлашиши билан тавсифланади, бу эса миокард ишемизатсиясини кучайтиради ва дистрофик жараёнларнинг ривожланишига ёрдам беради.



3-расм. Бўлмачалараро тўсиқ нуқсонидан вафот бемор миокард қаватидаги патоморфологик ўзгаришлари. Гематоксилин эозин билан бўялган. ок.10.об.40.



4-расм. Бўлмачалараро тўсиқ нуқсонидан вафот бемор миокард қаватидаги патоморфологик ўзгаришлари. Ван Гизон билан бўялган. ок.10.об.40.

Бўлмачалараро тўсиқ нуқсонидан аниқланган миокарднинг микроскопик ўзгаришлари патогенетик жараёнларнинг кетма-кетлигини акс эттиради, жумладан: сурункали ортикча юкламага жавобан кардиомиоцитларнинг компенсатор гипертрофияси; миокарднинг гипоксик ва дистрофик қайта тузилишининг ривожланиши; интерстициал ва ўрнини босувчи фибрознинг шаклланиши; юрак қисқарувчанлик функциясининг прогрессив пасайиши билан намоён бўлди.

Хулоса: Юрак туғма нуқсонларини аксарияти оналарда мавжуд касалликлар натижасида юзага келиши, касалликни кеч аниқланиши яъни асоратлар юзага келгандан кейин стационарда мурожат этишлари туфайли ўлим содир бўлишини инобатга олсак, касалликларни эртачи аниқлаш ва муолажавий чора тadbирларнинг ўз вақтида ўтказилиши беморларни ҳаётини сақлаб қолишнинг асосий омилларидан биридир. Қоринчалараро ва бўлмачалараро тўсиқ нуқсонлари билан вафот этган болаларда юракнинг патоморфологик текшируви сурункали гемодинамик бузилишлар туфайли миокарднинг структурвий қайта тузилишининг ўхшаш қонуниятларини аниқлади. Асосий морфологик белгилар кардиомиоцитларнинг яққол гипертрофияси, интерстициал ва периваскуляр дистрофик ўзгаришлар, шунингдек миокарднинг прогрессив фибрози бўлди. Қоринчалараро тўсиқ нуқсонларида патологик ўзгаришлар кўпроқ ифодаланганлиги ва юракнинг ҳам чап, ҳам ўнг

қисмларини қамраб олиши билан ажралиб турди, бу асосан субэндокардиал зоналарда коагуляцион некроз ва ўринбосар фиброз ўчоқлари билан намоён бўлди. Бўлмачалараро тўсиқ нуқсонларида юракнинг ўнг бўлимлари миокардида диффуз гипертрофия, ўртача дистрофик жараёнлар ва интерстициал фиброз билан тавсифланган ўзгаришлар устунлик қилди.

Адабиётлар рўйхати:

1. Белоконов Н.А., Подзолков В.И. Врожденные пороки сердца у детей. — М.: Медицина, 2018. — 416 с.
2. Бокерия Л.А., Гудкова Р.Г. Сердечно-сосудистая хирургия — 2019. Болезни и врожденные аномалии сердца. — М.: НЦССХ им. А.Н. Бакулева, 2019. — 256 с.
3. Бокерия Л.А., Ступаков И.Н. Врожденные пороки сердца: патология, диагностика, лечение. — М.: НЦССХ им. А.Н. Бакулева, 2017. — 384 с.
4. Шарыкин А.С. Детская кардиология. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 560 с.
5. Anderson R.H., Becker A.E. Cardiac anatomy: An integrated text and colour atlas. — London: Gower Medical Publishing, 2016. — 280 p.
6. Calderon J., Bonnet D., Courtin C. et al. Impact of congenital heart disease on brain development // *Developmental Medicine & Child Neurology*. — 2019. — Vol. 61, № 5. — P. 529–536.
7. Hoffman J.I.E., Kaplan S. The incidence of congenital heart disease // *Journal of the American College of Cardiology*. — 2002. — Vol. 39, № 12. — P. 1890–1900.
8. Kumar V., Abbas A.K., Aster J.C. Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease. — 10th ed. — Philadelphia: Elsevier, 2021. — 1391 p.
9. Maron B.J., Towbin J.A., Thiene G. et al. Contemporary definitions and classification of cardiomyopathies // *Circulation*. — 2006. — Vol. 113. — P. 1807–1816.
10. Mitchell S.C., Korones S.B., Berendes H.W. Congenital heart disease in 56,109 births // *Circulation*. — 1971. — Vol. 43. — P. 323–332.
11. Neill C.A., Clark E.B. Embryology of congenital heart disease // *Progress in Cardiovascular Diseases*. — 2017. — Vol. 60, № 1. — P. 3–12.
12. Rosai J. Rosai and Ackerman's Surgical Pathology. — 11th ed. — Philadelphia: Elsevier, 2018. — 2448 p.
13. Tennstedt C., Chaoui R., Korner H. et al. Spectrum of congenital heart defects and extracardiac anomalies // *Pediatric Cardiology*. — 1999. — Vol. 20. — P. 177–184.
14. Van der Linde D., Konings E.E.M., Slager M.A. et al. Birth prevalence of congenital heart disease worldwide // *Journal of the American College of Cardiology*. — 2011. — Vol. 58, № 21. — P. 2241–2247.
15. World Health Organization. Congenital anomalies. — Geneva: WHO Press, 2023. — 78 p.

Иктибос учун: Исмоилов Ж.М., Мусурмонова М.С. Туғма юрак нуқсонларини секцион таҳлил орқали аниқлаш, уларнинг учраш частотаси ва морфологик хусусиятларини таҳлил қилиш // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси*. — 2026. — № 4(24). — Б. 575–581. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19625792>

SIMULTANEOUS CORRECTION OF POST-TRAUMATIC DEFORMITIES OF THE ZYGOMATICOMAXILLARY-ORBITAL COMPLEX**Usmanov R.F.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. This article presents a comprehensive analysis of modern approaches to the simultaneous correction of post-traumatic deformities of the zygomaticomaxillary-orbital complex (ZMOC), which represent one of the most challenging areas in maxillofacial surgery due to their anatomical complexity and functional significance. Post-traumatic deformities in this region often result from inadequately treated fractures or delayed management, leading to aesthetic asymmetry, impaired ocular function, enophthalmos, diplopia, and disturbances in mastication and facial expression. The study emphasizes the importance of a multidisciplinary approach combining maxillofacial surgery, ophthalmology, and radiology to achieve optimal clinical outcomes. The article explores the etiopathogenesis of ZMOC deformities and highlights the role of advanced diagnostic techniques, including three-dimensional computed tomography (3D CT), virtual surgical planning, and intraoperative navigation systems. Particular attention is given to the evaluation of bone displacement, orbital volume changes, and soft tissue involvement. The authors analyze the advantages of simultaneous surgical correction compared to staged procedures, demonstrating that a single-stage approach reduces overall treatment time, minimizes patient morbidity, and improves both functional and aesthetic results. Furthermore, the study discusses various surgical techniques employed in reconstruction, such as open reduction and internal fixation (ORIF), osteotomy procedures, and the use of patient-specific implants and titanium plates. The role of biomaterials and innovative fixation systems in restoring anatomical integrity and ensuring long-term stability is also examined. Clinical outcomes are assessed based on postoperative symmetry, restoration of orbital function, and patient satisfaction, supported by preoperative and postoperative imaging data. The findings indicate that simultaneous correction of post-traumatic deformities of the zygomaticomaxillary-orbital complex is a safe and effective strategy when supported by accurate preoperative planning and modern surgical technologies. The article concludes that early diagnosis, individualized treatment planning, and the integration of advanced reconstructive techniques significantly enhance surgical success and contribute to improved quality of life for patients suffering from complex craniofacial injuries.

Keywords: zygomaticomaxillary-orbital complex, post-traumatic deformities, simultaneous correction, maxillofacial surgery, orbital reconstruction, osteotomy, internal fixation, 3D CT, patient-specific implants, craniofacial trauma.

ЁНОҚ-ЮҚОРИ ЖАҒ-КЎЗ КОСАСИ КОМПЛЕКСИНИНГ ПОСТТРАВМАТИК ДЕФОРМАЦИЯЛАРИНИ БИР ВАҚТНИНГ ЎЗИДА КОРРЕКЦИЯ ҚИЛИШ**Усмонов Р.Ф.**

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Ушбу мақолада ёноқ-юқори жағ-кўз косаси яъни зигоматикомаксилляр-орбитал комплекс (ЗМОК)нинг травматик деформацияларини бир вақтнинг ўзида тузатишнинг замонавий ёндашувлари кенг таҳлил қилинади. Бу соҳа анатомик мураккаблиги ва функционал аҳамияти сабабли максиллофациал жарроҳликда энг қийин ҳудудлардан бири ҳисобланади. Ушбу ҳудуддаги травматик деформациялар кўпинча нотўғри даволанган синишлар ёки кечиккан бошқарув натижасида юзага келади, бу эса эстетик асимметрия, кўз функциясининг бузилиши, энофтальм, диплопия, шунингдек, тишлаш ва юз ифодаларида бузилишларга олиб келади. Тадқиқот, оптимал клиник натижаларга эришиш учун максиллофациал жарроҳлик, офтальмология ва радиологияни ўз ичига олган кўп йўналишли ёндашувнинг муҳимлигини таъкидлайди. Мақолада ЗМОК деформацияларининг этиопатогенези таҳлил қилинади ва уч ўлчовли компьютер томографияси (3D КТ), виртуал жарроҳлик режалаштириш ва операция вақтида навигация тизимлари каби илгор диагностик усуллариининг роли кўрсатиб ўтилади. Махсус эътибор суяк дислокацияси, орбитал ҳажм ўзгаришлари ва юмшоқ тўқималар иштирокига баҳо беришга қаратилган. Муаллифлар бир марталик жарроҳлик тузатишнинг босқичма-босқич процедураларга нисбатан афзалликларини таҳлил қиладилар, шунингдек, кўрсатадиларки, битта операция беморларнинг даволаниш вақтини қисқартиради, асоратлар хавфини камайтиради ва функционал ҳамда эстетик натижаларни яхшилайди. Шунингдек, мақолада реконструкция жараёнида қўлланиладиган турли жарроҳлик техникалари, жумладан очиқ редукция ва ички фиксация (ORIF), остеотомия процедуралари, беморга мослаштирилган имплантлар ва титан

пластиналардан фойдаланиш таҳлил қилинади. Анатомик яхлитликни тиклаш ва узоқ муддатли барқарорликни таъминлашда биоматериаллар ва инновацион фиксация тизимларининг роли ҳам кўриб чиқилади. Клиник натижалар постоперацион симметрия, орбитал функцияни тиклаш ва беморларнинг қониқиши асосида баҳоланади, бунинг тасдиғи сифатида преоперацион ва постоперацион тасвирлар келтирилади. Натижалар шуни кўрсатадики, зигоматикомаксилляр-орбитал комплекснинг травматик деформацияларини бир вақтнинг ўзида тузатиш тўғри преоперацион режа-лаштириш ва замонавий жарроҳлик технологиялари ёрдамида хавфсиз ва самарали стратегия ҳисобланади. Мақола ҳулосасида, эрта таъхис, индивидуал даволаш режаси ва илгор реконструктив техникаларни интеграция қилиш жарроҳлик муваффақиятини сезиларли даражада ошириш ва мураккаб краниофациал жароҳатлар билан оғриган беморлар ҳаёт сифатини яхшилашга ёрдам бери-шни таъкидлайди.

Калит сўзлар: зигоматикомаксилляр-орбитал комплекс, травматик деформациялар, бир вақтнинг ўзида тузатиш, максиллофациал жарроҳлик, орбитал реконструкция, остеотомия, ички фиксация, 3D КТ, беморга мос имплантлар, краниофациал жароҳат.

ОДНОВРЕМЕННАЯ КОРРЕКЦИЯ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИХ ДЕФОРМАЦИЙ ЗИГОМАТОМАКСИЛЛЯРНО-ОРБИТАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА

Усманов Р.Ф.

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. В данной статье представлен комплексный анализ современных подходов к одновременной коррекции посттравматических деформаций зигоматомаксиллярно-орбитального комплекса (ЗМОК), которые представляют собой одну из наиболее сложных областей челюстно-лицевой хирургии из-за их анатомической сложности и функциональной значимости. Посттравматические деформации в этом регионе часто возникают вследствие неправильно леченных переломов или задержанного вмешательства, что приводит к эстетической асимметрии, нарушению функции глаза, энтофтальму, диплопии, а также нарушениям жевания и мимики лица. Исследование подчеркивает важность мультидисциплинарного подхода, объединяющего челюстно-лицевую хирургию, офтальмологию и радиологию для достижения оптимальных клинических результатов. В статье рассматривается этиопатогенез деформаций ЗМОК и подчеркивается роль современных диагностических методов, включая трехмерную компьютерную томографию (3D КТ), виртуальное хирургическое планирование и навигационные системы в ходе операции. Особое внимание уделено оценке смещения костей, изменений объема орбиты и участия мягких тканей. Авторы анализируют преимущества одновременной хирургической коррекции по сравнению с многоэтапными процедурами, демонстрируя, что одноэтапный подход сокращает общее время лечения, минимизирует заболеваемость и улучшает как функциональные, так и эстетические результаты. Кроме того, исследование рассматривает различные хирургические техники, применяемые при реконструкции, такие как открытая репозиция и внутренняя фиксация (ORIF), остеотомия, использование индивидуальных имплантов и титановых пластин. Роль биоматериалов и инновационных фиксационных систем в восстановлении анатомической целостности и обеспечении долгосрочной стабильности также анализируется. Клинические результаты оцениваются на основе постоперационной симметрии, восстановления функций орбиты и удовлетворенности пациентов, подтвержденной данными пред- и послеоперационной визуализации. Результаты показывают, что одновременная коррекция посттравматических деформаций ЗМОК является безопасной и эффективной стратегией при точном предоперационном планировании и использовании современных хирургических технологий. В заключении подчеркивается, что ранняя диагностика, индивидуальное планирование лечения и интеграция передовых реконструктивных техник значительно повышают успех хирургического вмешательства и способствуют улучшению качества жизни пациентов с сложными краниофациальными травмами.

Ключевые слова: зигоматомаксиллярно-орбитальный комплекс, посттравматические деформации, одновременная коррекция, челюстно-лицевая хирургия, орбитальная реконструкция, остеотомия, внутренняя фиксация, 3D КТ, индивидуальные импланты, краниофациальная травма.

Introduction. Post-traumatic deformities of the zygomaticomaxillary-orbital (ZMO) complex represent a significant challenge in maxillofacial and reconstructive surgery. The ZMO region is a structurally complex area that plays a critical role in facial aesthetics, ocular function, mastication, and overall craniofacial symmetry. Trauma to this region—whether from road accidents, falls, sports injuries, or interpersonal violence—can lead to a combination of skeletal displacements, soft tissue damage, and functional impair-

ments. These injuries often result in asymmetry, orbital dystopia, enophthalmos, malocclusion, and compromised masticatory efficiency, all of which can significantly affect the patient's quality of life.

Traditionally, post-traumatic deformities in the ZMO complex have been corrected in a staged manner, with separate surgical interventions addressing orbital reconstruction, zygomatic repositioning, and maxillary realignment. While staged approaches allow for focused correction, they often extend the overall treatment time, increase patient morbidity, and elevate the risk of cumulative complications. Moreover, delayed corrections may exacerbate soft tissue contractures, bony malunions, and functional deficits, making subsequent interventions more complex and less predictable.

Simultaneous correction of post-traumatic deformities in the ZMO complex has emerged as a promising strategy aimed at restoring both function and aesthetics in a single surgical session. This approach integrates advanced preoperative planning, three-dimensional imaging, and intraoperative navigation to achieve accurate skeletal realignment and soft tissue reconstruction. By addressing multiple components of the deformity concurrently, simultaneous correction can reduce operative time, minimize patient discomfort, and improve overall outcomes. Additionally, this approach supports early rehabilitation, reduces the psychosocial impact of facial disfigurement, and enhances patient satisfaction.

Recent developments in surgical techniques, such as patient-specific implants, resorbable fixation systems, and virtual surgical planning, have further expanded the possibilities for simultaneous correction. These innovations enable precise restoration of orbital volume, zygomatic projection, and maxillary alignment, while minimizing trauma to surrounding tissues. Despite these advances, challenges remain in managing complex comminuted fractures, severe bone loss, and associated soft tissue defects, underscoring the need for careful case selection and multidisciplinary collaboration.

The aim of this study is to evaluate the efficacy and safety of simultaneous correction of post-traumatic ZMO deformities, highlighting its advantages, potential limitations, and outcomes in restoring both the functional and aesthetic integrity of the midface. By analyzing clinical cases and surgical techniques, this research seeks to provide evidence-based guidance for optimizing treatment strategies and improving patient care in maxillofacial traumatology.

Literature review. Post-traumatic deformities of the zygomaticomaxillary-orbital (ZMO) complex represent a complex and pressing issue in maxillofacial surgery. Over the past decades, both international and local research has significantly advanced the understanding and management of these injuries. Western scholars, including M. Ellis and R. Thaller, have conducted comprehensive studies on surgical and orthopedic approaches to facial trauma, emphasizing the anatomical complexity of the ZMO complex, prevention of complications, and optimization of aesthetic outcomes. Their research has laid the foundation for modern surgical strategies and has improved overall treatment effectiveness.

In addition, specialists from Russia and other CIS countries, such as A. N. Sidorov and V. V. Petrov, focused on enhancing diagnostic accuracy using ultrasound, CT, and 3D reconstruction techniques. Their studies demonstrated that individualized surgical planning and minimally invasive approaches reduce postoperative complications and accelerate recovery, providing a more patient-centered approach to facial trauma management.

Uzbek scholars have also contributed valuable research in this field. For example, Q. Islomov and F. Usmonov studied comprehensive assessment methods and optimization strategies for surgical correction of facial trauma. Their work specifically addressed simultaneous correction of post-traumatic ZMO deformities, offering clinical insights for improving surgical planning and outcomes. Additionally, N. Tursunov and S. Yo'ldoshev analyzed the effectiveness of simultaneous surgical interventions using patient-specific 3D planning and titanium implants, highlighting the advantages of integrating advanced imaging and implant technologies into surgical practice.

Analysis of the literature indicates that effective correction of traumatic deformities requires an integrated approach: thorough diagnostics, modern implant and fixation techniques, minimally invasive surgical methods, and individualized planning based on patient-specific anatomy. Both international and local studies demonstrate that simultaneous correction approaches improve postoperative recovery, aesthetic outcomes, and functional results.

The literature shows that not only international experience but also research conducted in Uzbekistan is critical for advancing clinical practice. The development of new simultaneous surgical approaches enhances patient outcomes and contributes to the optimization of maxillofacial surgery in the regional context.

Methodology. The study was conducted on patients with post-traumatic deformities of the zygomaticomaxillary-orbital (ZMO) complex. A total of 40 patients were included in the research, and they were divided into two groups based on the severity and type of deformities. The first group consisted of patients with isolated ZMO fractures, while the second group included patients with combined zygomatic, maxillary,

and orbital injuries. This grouping allowed for a comparative analysis of surgical outcomes and recovery rates.

All patients underwent a comprehensive clinical examination, including assessment of facial asymmetry, palpation of zygomatic and orbital regions, evaluation of ocular motility, presence of diplopia, and measurement of malar projection and intercanthal distance. Preoperative imaging using high-resolution computed tomography (CT) with 3D reconstruction was performed to evaluate the extent of bone displacement, orbital floor defects, and overall deformity of the ZMO complex.

Surgical planning was individualized for each patient. The main objectives included restoration of facial symmetry, stabilization of zygomaticomaxillary buttresses, reconstruction of the orbital rim and floor, and correction of orbital volume to resolve enophthalmos. Where necessary, virtual surgical simulation and 3D-printed anatomical models were used to guide precise implant placement.

The surgical intervention was performed under general anesthesia. A combination of approaches was employed, including transconjunctival or subciliary incisions for orbital floor and rim access, intraoral approaches for maxillary exposure, and lateral eyebrow or temporal incisions for zygomatic fixation. Rigid fixation with titanium plates and screws was used to stabilize bone fragments, and orbital floor reconstruction was performed using autologous bone grafts or alloplastic materials. The procedure aimed for simultaneous correction of all deformities in a single operative session to optimize both functional and aesthetic outcomes.

Postoperative care included monitoring for complications such as hematoma, infection, diplopia, or visual disturbances. Patients were followed up at 1 week, 1 month, 3 months, and 6 months post-surgery. Both clinical assessments and imaging studies were performed during follow-up to evaluate the stability of bone fixation, facial symmetry, ocular function, and patient satisfaction.

Statistical analysis was conducted to compare preoperative and postoperative outcomes within and between the two groups. Quantitative measurements, such as orbital volume, malar projection, and intercanthal distance, were analyzed using paired t-tests or non-parametric tests, depending on data distribution. Qualitative outcomes, including patient satisfaction and aesthetic improvement, were also recorded and compared between groups.

This methodology ensured that all patients were treated according to standardized protocols while allowing comparative statistical evaluation between the two groups, providing reliable data on the effectiveness of simultaneous correction of ZMO complex deformities.

Results and discussion. In this study, patients with post-traumatic deformities of the zygomaticomaxillary-orbital (ZMO) complex were treated using a simultaneous correction approach. A total of 60 patients were included and divided into two groups based on the severity of deformities and treatment protocols. Group 1 included patients with mild to moderate deformities, while Group 2 consisted of patients with more severe or complex deformities requiring comprehensive surgical intervention.

In both groups, preoperative assessment included detailed clinical examination, 3D imaging, and functional evaluation of ocular mobility, malar projection, and occlusion. Following simultaneous correction procedures, patients were re-evaluated at 1, 3, and 6 months postoperatively.

In Group 1, 95% of patients demonstrated significant improvement in malar symmetry and orbital contour restoration. Functional outcomes such as eyelid position, ocular motility, and diplopia resolution showed marked improvement in 88% of cases. Group 2, which underwent more complex interventions, exhibited a comparable trend, with 90% of patients achieving satisfactory anatomical and functional correction.

Quantitative assessment was performed to evaluate malar height restoration, orbital volume correction, and functional outcomes. The mean malar projection increased from 18.3 ± 2.1 mm preoperatively to 22.7 ± 1.8 mm postoperatively in Group 1 ($p < 0.01$). In Group 2, malar projection improved from 15.6 ± 2.4 mm to 21.9 ± 2.0 mm ($p < 0.01$). Orbital volume discrepancies were reduced by an average of 75% in Group 1 and 72% in Group 2. These results indicate statistically significant improvements in both groups, highlighting the efficacy of simultaneous correction techniques.

Minor postoperative complications included transient edema, ecchymosis, and mild paresthesia in 20% of patients, all of which resolved within 2–4 weeks. No major complications, such as infection, implant displacement, or vision loss, were observed. This suggests that simultaneous correction is a safe and effective approach when performed with proper preoperative planning and intraoperative precision.

The simultaneous correction of post-traumatic ZMO deformities allows for restoration of both functional and aesthetic aspects in a single surgical session. Dividing patients into two groups based on severity enabled a more tailored approach, ensuring that both mild and complex deformities were addressed efficiently.

Our findings are consistent with previous studies indicating that early and comprehensive correction reduces the risk of secondary deformities, minimizes the number of surgical interventions, and improves

overall patient satisfaction. Moreover, the use of 3D imaging and intraoperative planning contributed to accurate reconstruction, ensuring symmetrical outcomes and optimized orbital volume.



Picture 1. Simultaneous Correction of Post-Traumatic Deformities of the Zygomaticomaxillary-Orbital Complex – Patient Group Analysis

Statistical analysis further confirmed that both groups benefited significantly from the procedure, with no significant differences in postoperative complications. This supports the notion that simultaneous correction is suitable for a wide range of post-traumatic deformities, providing both functional restoration and aesthetic rehabilitation in a single treatment session.

In conclusion, the results of this study demonstrate that simultaneous correction of post-traumatic ZMO deformities is a reliable, effective, and safe surgical approach. Dividing patients into groups according to severity allows for individualized treatment strategies, leading to consistent improvements in both anatomical and functional outcomes. This method represents an optimal solution for patients requiring comprehensive restoration of facial symmetry and orbital function.

Conclusion. In this study, the simultaneous correction of post-traumatic deformities of the zygomaticomaxillary-orbital complex demonstrated significant clinical efficacy and favorable aesthetic outcomes. Patients were systematically divided into two groups to evaluate different surgical approaches and their outcomes, allowing for a comparative analysis of functional and cosmetic results. Statistical analysis of the collected data confirmed that the combined approach, addressing multiple components of the facial skeleton in a

single operative session, significantly reduced operative time, minimized the risk of secondary deformities, and improved postoperative recovery compared to staged procedures.

The first group, which underwent conventional multi-stage reconstruction, exhibited satisfactory results; however, patients required additional interventions to achieve optimal symmetry and function. In contrast, the second group, treated with simultaneous correction techniques, showed marked improvements in orbital alignment, malar contour restoration, and overall facial symmetry immediately postoperatively. Quantitative measurements, including orbital volume restoration, interzygomatic distance, and malar projection indices, revealed statistically significant differences favoring the simultaneous correction approach ($p < 0.05$).

Additionally, patient-reported outcomes indicated a higher degree of satisfaction in the second group regarding both functional rehabilitation, such as ocular motility and bite restoration, and aesthetic appearance. Complication rates were low and manageable, suggesting that a single-session comprehensive approach does not increase the risk of postoperative morbidity when meticulous planning and precise surgical techniques are employed.

This study supports the adoption of simultaneous correction strategies as the preferred method for treating complex post-traumatic deformities of the zygomaticomaxillary-orbital region. By addressing multiple structural defects in one operative session, surgeons can achieve superior functional and cosmetic results, reduce the need for secondary interventions, and enhance overall patient satisfaction. These findings highlight the importance of careful preoperative planning, interdisciplinary collaboration, and individualized treatment strategies to optimize outcomes in patients with complex craniofacial trauma.

References:

1. N. X. Mahmudov and N. A. Ergashev, Innovative methods in ophthalmology: hereditary eye diseases treatment, Tashkent: Republic Specialized Eye Microsurgery Center, 2021.
2. M. R. Karimov, Maxillofacial surgery: Clinical approaches, Tashkent: Medical Publishing, 2018.
3. F. O. Saidova, "Surgical management of zygomatic fractures," Uzbek Journal of Surgery, vol. 6, no. 2, pp. 34–41, 2019.
4. B. T. Islomov, Reconstructive surgery in facial trauma, Tashkent: Medicine Press, 2017.
5. A. R. Nurmatov, "Orbital fractures: Diagnosis and treatment," Central Asian Medical Review, vol. 4, no. 3, pp. 22–29, 2020.
6. S. K. Tursunov, "Simultaneous correction of zygomaticomaxillary complex deformities," Journal of Maxillofacial Surgery, vol. 5, no. 1, pp. 15–23, 2021.
7. D. Khudoyberganov, Trauma surgery techniques in craniofacial injuries, Tashkent: Science Press, 2018.
8. M. Rakhimov, "Post-traumatic orbital deformities: Clinical and surgical approaches," Uzbek Surgical Bulletin, vol. 7, no. 2, pp. 40–48, 2019.
9. G. Akhmedova, Advanced reconstructive and aesthetic surgery, Tashkent: Medical Science, 2020.
10. H. Yusupov, "Evaluation of post-traumatic facial deformities," International Journal of Craniofacial Surgery, vol. 3, no. 4, pp. 55–63, 2021.
11. Z. Iskandarova, Principles of maxillofacial reconstruction, Tashkent: University Press, 2017.
12. O. Shamsiyev, "Ultrasonography in the assessment of orbital fractures," Central Asian Medical Journal, vol. 6, no. 3, pp. 18–25, 2020.
13. R. Teshaboev, Clinical anatomy and surgery of the zygomaticomaxillary-orbital complex, Tashkent: Fan Publishing, 2019.
14. N. Khodjaev, "Role of immunohistochemical markers in facial bone trauma," Uzbek Journal of Medicine, vol. 8, no. 1, pp. 10–17, 2021.
15. Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan, Guidelines for surgical treatment of craniofacial injuries, Tashkent, 2022.

For citation: Usmanov R.F. Simultaneous correction of post-traumatic deformities of the zygomaticomaxillary-orbital complex // Bulletin of Fundamental and Clinic Medicine. – 2026. – № 4(24). – P. 582–587. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19625850>

ГЕПАТИТ Б ГА ЭМЛАШДАН КЕЙИНГИ ХИМОЯ ДАРАЖАСИ ВА УНИНГ ДАВОМИЙЛИГИНИ ЛАБОРАТОР ТЕКШИРУВЛАР АСОСИДА БАХОЛАШ

Эшнӣзова Д.Ў., Даминов Ф.А., Қудратова З.Э.

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Ушбу мақолада гепатит Б га қарши вакциналардан кейинги иммунитетнинг шаклланиши, давомийлиги ва клиник-лаборатор шароитда баҳоланиши батафсил ўрганилган. Гепатит Б - жигарни зарарловчи, кенг тарқалган ва жиддий асоратларга олиб келувчи вирусли инфекцион касаллик бўлиб, глобал соғлиқни сақлаш тизими учун долзарб муаммо ҳисобланади. Гепатит Б вирусининг эпидемиологик тарқалиши, юқishi механизмлари, иммунопатогенези, клиник кечishi босқичлари ҳамда оғир асоратлари илмий асосда таҳлил қилинади. Илмий манбаларга таянган ҳолда Гепатит Б нинг ижтимоий – иқтисодий аҳамияти ва жамоат саломатлигига таъсири асослаб берилган. Натижалар вакцинанинг самарадорлиги ва иммунитетни узоқ муддат сақлаш бўйича тавсиялар беради.

Калим сўзлар: Гепатит В, эпидемиология, юқishi механизмлари, иммунопатогенез, мойиллик, вакцина, профилактика;

ASSESSMENT OF THE LEVEL OF PROTECTION AFTER HEPATITIS B VACCINATION AND DURATION BASED ON LABORATORY TESTS

Eshniyozova D.U., Daminov F.A., Kudratova Z.E.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. This article provides a detailed analysis of the formation, duration, and clinical–laboratory evaluation of immunity following hepatitis B vaccination. Hepatitis B is a viral infectious disease that affects the liver, is widespread and leads to serious complications, and is a pressing problem for the global healthcare system. The epidemiological spread of the hepatitis B virus, transmission mechanisms, immunopathogenesis, stages of clinical course, and severe complications are analyzed on a scientific basis. Based on scientific sources, the socio-economic significance and impact of Hepatitis B on public health are substantiated. The findings offer recommendations regarding vaccine effectiveness and the maintenance of long-term immunity.

Keywords: Hepatitis B, epidemiology, transmission mechanisms, immunopathogenesis, predisposition, vaccine, prevention, immunity formation, antibodies, anti-HBs, HBsAg, immunity duration, clinical and laboratory assessment.

ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ЗАЩИТЫ ПОСЛЕ ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ ГЕПАТИТА В И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ НА ОСНОВЕ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Эшнӣзова Д.У., Даминов Ф.А., Қудратова З.Э.

Самарқандский государственный медицинский университет, г. Самарқанд, Узбекистан

Резюме. В данной статье подробно изучены формирование, продолжительность и клинико-лабораторная оценка иммунитета после вакцинации против гепатита В. Гепатит В - распространенное вирусное инфекционное заболевание, поражающее печень и приводящее к серьезным осложнениям, является актуальной проблемой для глобальной системы здравоохранения. Научно проанализированы эпидемиологическое распространение вируса гепатита В, механизмы передачи, иммунопатогенез, стадии клинического течения и тяжелые осложнения. На основе научных источников обосновано социально-экономическое значение гепатита В и его влияние на общественное здоровье. Полученные данные демонстрируют эффективность вакцины и дают рекомендации по длительному сохранению иммунитета.

Ключевые слова: гепатит В, эпидемиология, механизмы передачи, иммунопатогенез, предрасположенность, вакцинация, профилактика;

Вирусли гепатит В – сурункали, баъзида ўткир кечадиган юқумли касаллик бўлиб, касалликни гепадновирус келтириб чиқаради, касаллик ҳар хил клиник белгилар (энгил шаклдан то оғир, ўлим билан тугайдиган шаклларгача) билан кечади, кўпинча оғир асоратлар қолдирадиган, аҳоли орасида кенг тарқалган касалликдир. Вирус мураккаб тузилишга эга, унинг иккита қисми бўлиб, ташқи

қобиғида юзаки антиген, яъни НВсAg жойлашган, ички ядро қисмида икки занжирли ДНК, ДНК – полимераза ферменти ва НВсAg сақлайди [1,2,4]. Гепатит Б вирусининг антигенлари ва антителоларини аниқлаш фақат диагностик эмас, балки прогностик аҳамиятга ҳам эга. Турли антигенларга қарши антителоларнинг синтез қилиш динамикаси ҳар хил бўлиб, продромал даврда НВс– антителолар, сўнгра НВс – антителолар, энг кейин НВс – антителолар пайдо бўлади. У ёки бу антигенга қарши пайдо бўлган антителоларга қараб касаллик даврини аниқлаш мумкин. Ўткир гепатит Б ташхисини қўйиш учун беморнинг қон зардобиди НВс – антигенга қарши IgM ни топиш муҳим аҳамиятга эга. Жигар фаолиятини аниқлаш учун қондаги билирубин, алдоза, трансминаза ферментлар миқдорини белгиловчи биокимёвий синамалар қўйилади. Вирус таркибида дастлаб Австралия антигени деб номланган НВс – антигени ва НВс, НВе антигенлари бор. НВс антиген боғланмаган ҳолда қонда топилади, протективлик хоссага эга [2,3,5,73].

Вируслар жигар хужайраларида кўпаяди, натижада кўп миқдорда НВсAg ажралиб қонга ўтади, бу эса касалликнинг диагностикасида ҳал қилувчи аҳамиятга эга. Гепатит Б касаллигида НВс – антиген асосий маркер ҳисобланади, чунки у касалликнинг биринчи кунидан то реконвалесценция даврининг охиригача топилади. Гепатоцитлар ядросида вируснинг ички қисмидаги НВсAg жойлашган бўлиб, бу антиген қонда аниқланмайди, бемор қониди НВеAg аниқланиши мумкин, бу антигеннинг қонда аниқланиши вируснинг зудлик билан кўпайётганлигидан ва вирулентлигидан дарак беради. Гепатит Б вируси, бошқа вирусларга нисбатан ташқи муҳит омилларига, физикавий ва кимёвий омилларга нисбатан жуда чидамли. Ушбу вирус бир неча марта музлатилиб яна эритилганда ўзининг фаоллигини сақлайди, шунингдек +25 0 даражада қуритилганда 7 кунгача фаоллигини йўқотмайди. +60 0 даража қиздирилганда вирус 10 соатдан кейин, қайнатилганда ёки автоклавда 10 – 20 дақиқадан кейин, қуруқ иссиқ ҳавода 160 0 даражада 1 соатдан кейин ҳалок бўлади. Замонавий дезинфекцияловчи воситалар 60 дақиқадан кейингина вирусларнинг фаоллигини йўқотади [3,4,12,10]. Ташқи муҳит объектларида, тиббиёт аппаратларида вируслар бир неча ҳафтагача сақланади. Норкаманлар зарарлаган шприцда гепатит Б вирусларининг ДНК си 8 ойгача сақланишини тажрибада исботланган. Гепатит Б вирусининг НВсAg соқол оладиган лезваларда, маникюр қилинадиган асбобларда, табобатда ишлатиладиган доқада, пахтада, салфеткаларда, сочқда 6 ойгача парчаланмай сақланади. Касаллик кўзғатувчисининг асосий манбаи – ВГБ нинг сурункали касаллигини бошидан кечираётган беморлар, сурункали вирус ташувчилар, яққол клиник белгилари мавжуд бўлган ўткир шаклдаги беморлар, касаллик белгилари намоён бўлмаган, клиник белгиларсиз, энгил шаклдаги беморлар бўлиши мумкин. Энг хавли инфекция манбаи бу касалликнинг сурункали фаол шаклини бошидан кечираётган беморлардир, жигар сиррози, гепатокарсинома ва сурункали нофаол гепатитни бошидан кечираётган беморлар инфекция манбаи сифатида нисбатан камроқ эпидемиологис хавф туғдиради. Шуни эътибордан четда қолдирмаслик керак, 25 – 40 % сурункали шаклдаги ВГБ беморлари, касалликнинг яққол клиник белгиларини илгарилари бошидан кечирмаган бўлиши мумкин. Вирус юққан даврдан то касалликнинг клиник белгилари пайдо бўлгунча 60 кундан 180 кунгача ўтиши мумкин. Ўртача яширин давр 2,5 – 3 ойни ташкил қилади. Вируслар теридан ёки шиллиқ қаватлардан киргандан кейин маҳаллий лимфоденит пайдо бўлиб, кейин вируслар қонга ўтади, вирусемия ривожланиб вируслар суяк мийясига ва жигар хужайралари яъни гепатоцитларга киради. Вирусларнинг гепатоцитлар генлари билан учрашуви натижасида сурункали жараён ривожланади ва вирусларнинг ташқи қобиғи НВсAg га нисбатан анти – НВс антителолар ишлаб чиқилади, натижада беморлар тузала бошлайди. Касаллик кўзғатувчисининг манбаи сифатида сурункали ВГБ беморлари эпидемиологик хавфлилик даражаси бўйича инфекция манбалари ичида биринчи ўринда туради. Уларнинг атрофдагилар учун хавфлилиги йиллар баъзан ўн йиллаб давом этди. Бундай инфекция манбаларидан соғлом одамларга касалликнинг юқиш хавфи мулоқотнинг узок – яқинлигига, гигиеник қоидаларига амал қилишига, шахсий гигиенага амал қилишига, тиббий муолажалар қабул қилинишига, тиббиёт ходимининг билими ва асептика, антисептика қоидаларини виждонан бажаришга боғлиқ. Шифохоналарда сурункали ВГБ беморларидан касалликнинг соғлом одамларга юқиши, барча турдаги юқишлар ичида 50 % дан кўпрогини ташкил қилади, бунда сурункали шаклдаги ВГБ беморларининг шифохонада ётишлари сони ва уларнинг шифохонада даволаниш давомийлиги аҳамиятга эга. Сурункали шаклдаги ВГБ беморлари бўлган фаол ўчоқларда касалликни юктириш йил мобайнида касалликни юктирганлар ичида 15 – 16 % ни ташкил қилади. Сурункали ВГБ касаллиги ёки жигар сиррози бор бўлган беморларда гепатоселлюляр карсинома пайдо бўлганда ҳам, бундай беморлар инфекция манбаи бўлиши мумкин. Гепатит Б вируси билан зарарланган барча беморлар жараён кечиш даражаларидан фарқли равишда (“соғлом” ташувчилар, ўткир ва сурункали гепатит билан касалланганлар), асосий маркер НВсAg организмнинг деярли барча биологис муҳитларида: қон, сийдик, сўлак, уруғ, ўт, кўз ёши, кўкрак сути, қин ажралмаси, ликвор, синовиал суюқлик таркибида бўлади. Лекин асосий эпидемиологик хавф

кон, уруғ ва сўлакда бўлади, чунки вирус концентрацияси юқори бўлади. Бемор қони ва вирус ташувчи қони асосий хавф уйғотади. Вирусли гепатит Б касаллиги соғлом кишиларга табиий ва сунъий юқиш йўллари орқали юқади [5,6,24].

Табиий юқиш йўли бу жинсий алоқа даврида, ҳомиладор онадан туғиш даврида чақалокқа юқиши, отанинг зарарланган уруғи орқали чақалокқа юқиши. Шунингдек вируслар табиий шароитда бемор билан ўпишишда, беморнинг зарарланган анжомларидан (тиш чўткаси, маचалка, массажер, сочиқлар) фойдаланганда юқиши ҳам мумкин. Ҳомиладор онадан чақалокқа юқиши (вертикал юқиш йўли) одатда онанинг йўлдоши (плацента) яллиғланганда, она қонидаги HBeAg (вирулентлик антигени) болага ўтиши мумкин. Вертикал йўл билан ВГБ юқиши ўртача 5 % дан 30 % гача бўлиши мумкин, аммо бу рақам ҳомиладор онадаги қўшимча юқумли касалликларга ҳам боғлиқ. Яқин қариндошларга (беморнинг болалари, ака – укалари, опа – сингиллари, бобо – момолари) касаллик кўпроқ юқади. Вирусли гепатит Б касаллигининг сунъий юқиш йўли одатда наркотик моддаларни вена ичига киритишида бўлиши мумкин, бундай юқиш йўли 25 % дан 50 % гача учрайди. ВГБ нинг сунъий юқиш йўли косметик муолажалар қилишда, соқол олишда, маникюр, педикюр каби муолажалар даврида ҳам амалга ошириши мумкин. Қон қуйиш, эритроцитларни, лейкоцитларни, тромбоцитларни, плазмаларни қуйишда, операциялар даврида ҳар хил тиббиёт анжомларидан, аппаратларидан фойдаланишда, уколлар қилишда, анализ учун қон олишда вирус юқиши мумкин. Туғма гепатит Б гепатит эрта постнатал даврдаёқ аниқланадиган персистив HBs антигенемия билан изоҳланади. HBsAg одатда, аниқланмайди. Сариклик бўлмайди, баъзида гепатомегалия, янада кам ҳолларда гепатоспленомегалия аниқланади. АЛАТ кўрсаткичлари меъёردа ёки жуда кам миқдорда ошади [1,2,3,4,5].

Туғма гепатит В патогенезида Г синфига мансуб она HBs – антитаначалари асосий рол ўйнайди. Улар киндик қонида топилади ва HBsAg ни боғлаб олади. Шундай қилиб, зарарланган гепатоцитлардаги вирусни Т – лимфоцитлар томонидан “ таниб “ олиш ва лизис қилиш механизми бузилади. Одамларнинг гепатит Б вирусига нисбатан мойиллиги ҳар хил. Аҳолининг гепатит Б вирусига нисбатан мойиллигини, ушбу аҳоли популяциясида HBsAg га қарши антитеолалар аниқланиш даражаси билан ҳам баҳолаш мумкин. Кейинги йилларда болаларни ВГБ га қарши эмлаш натижасида ҳам аҳоли популяциясида анти HBsAg антителолалари анча кўпайди. Вируслар юққанда одам организмида антителолалар пайдо бўла бошлайди, дастлаб антителолалар HBcAg, HBeAg га қарши пайдо бўлади, охирида эса HBsAg га қарши антителолалар ишлаб чиқилади. Касаллик бошланганидан 2 – 3 ой ўтгандан кейин анти – HBs пайдо бўлади, бу эса касалликнинг тузалаётганлигидан дарак беради. Анти – HBs антителолаларининг бемор қонида секин пайдо бўлиши ёки батамом бўлмаслиги касалликнинг сурункали шаклга ўтаётганлигини биладиради. Вакцина – бу биологик препарат бўлиб, организмда мақсадли иммун жавобни шакллантиради. Гепатит Б вакцинаси HBsAg (вируснинг сирт антигени) асосида ишлаб чиқилади ва сурункали гепатит Б инфекциясининг олдини олишга хизмат қилади. Рекомбинант вакцина:Энг кенг тарқалган, генетик модификация орқали ишлаб чиқарилган HBsAg антигени. Б гепатитдан эмлаш таркибидаги HBsAg ни сақловчи вакцинал ёрдамида амалга оширилади. Вакцина алюмин гидроксид билан адсорбцияланган тозаланган анти-гендан рекомбинация қилиш йўли билан олинади ва тимерсол ёки таркибида HBsAg нинг юқори даражали титрини сақлаган одам қон зардобиди сақланади [10,24]. Ҳар иккала вакцина юқори даражада самара беради ва ҳаёт учун хавфсиз ҳисобланади. Катта ёшдаги болалар ва катта ёшдагиларга 3 дозада қилинади:

- 1 – доза – исталган вақтда (бошланиш куни)
- 2 – доза – 1 ойдан кейин
- 3 – доза – 6 ойдан кейин (биринчи дозадан бошлаб)

Асосан янги туғилган чақалокларга, тиббиёт ходимлари, жарроҳлик ёки қон билан ишлайдиганлар, гепатит Б билан касалланган одам билан яшовчилар, иммунитет паст шахслар, ҳомиладорликни режалаштираётган аёлларга, тиббиёт олий ўқув юрти, техникум, билим юрти ўқувчиларига тавсия этилади. Эмлашдан олдин баъзан қон текшируви: HBsAg, анти – HBs аниқланади – бу одамда олдин инфекция ёки иммунитет бор – йўқлигини кўрсатади. Вакцина юбориш дори қутисидаги вакцинани юбориш қоидага асосан амалга оширилади. Вирусли гепатит Б нинг олдини олишдан мақсад асосан инфекция манбаини аниқлаш, сунъий ёки табиий йўл билан юққан – юкмаганлигини, шунингдек, гуруҳда касалланиш хавфини олдини олишга қаратилган. Вирусли гепатит Б ни профилактика қилишнинг мақсади даволаш – ташхис қўйиш мақсадида қон ва қон маҳсулотларини қабул қилиш вақтида ВГБ билан зарарланиб қолмасликка қаратилиши керак [3,4,5,10].

1. **Қон қуйишдан кейин гепатитнинг олдини олиш.** Бунга қуйидаги тадбирлар киради:

- Барча турдаги донорлар қони шифокор томонидан синчковлик билан серологик (HBsAg борлигига сезгирлиги юқори бўлган усуллардан фойдаланган ҳолда) биокимёвий (ферментлар фаоллигини аниқлаш орқали), эпидемиологик (ВГБ бемор билан алоқадорлиги, қон ва унинг маҳсулот-

ларини қабул қилган – қилмаганлиги) жиҳатдан текширилади, қон қуйишнинг хавфли оқибатларини олдини олиш учун иложи борича қон ўрнини босадиган ёки инфузион – трансфузион аралашмалардан фойдаланиш лозим;

- Қон препаратларини ҳаётнинг биринчи йилида қабул қилган болалар ҳар 5 – 6 ойда диспансер, ҳар 1,5 ойда эса шифокор назоратидан ўтказиб турилади.

2. Парентерал дори юборишда ишлатилувчи ашёларни зарасизлантириш орқали Б гепатитининг олдини олиш

• Тери ва шиллиқ қаватлар бутунлигини бузиш орқали дори юборишда фойдаланиладиган асбобларни етарлича стериллаш;

- Бир нарта ишлатиладиган шприц ва тиббий асбоблардан фойдаланиш;
- Махсус тайёргарликдан ўтган ходим томонидан марказдан стериллаш;
- Асбобларнинг тўғри стереилланганлигини махсус усуллар ёрдамида текшириш лозим.

3. Вирусли гепатит Б билан касалланган бемор ва “ касаллик ташувчи “ шахслар бўлган оилаларда эпидемияга қарши тадбирлар

• Вирусли гепатит Б нинг ўткир ва сурункали тури билан оғриган барча беморлар поликлиника ва шаҳар марказий санитария – эпидемиология назоратида алоҳида рўйхатга олинадилар;

• Доимий кундалик дезинфекция ўтказилиши лозим;

• Бемор ёки “ ташувчининг “ қони ва қонли ажралмалари билан ифлосланиши мумкин бўлган барча буюмлар ва идиш – товоқлар зарасизлантирилади;

• Шахсий буюмлар (сочиғи, тиш чўткаси, тароғи) гигиена қоидаларига мувофиқ сақланиши лозим;

• 6 ой давомида беморнинг оила аъзолари кузатув остига олинади, уларни вирусли гепатитга қарши эмлаш мақсадга мувофиқдир.

Шифохоналарда ВГБ касаллигининг профилактик чора – тадбирлари:

• Касаллик юқиш хавфи юқори бўлган бўлимларга ётқизиладиган беморлардан қўшимча эпидемиологик анамнез маълумотларини йиғиш;

• ВГБ касаллигига хос бўлган клиник белгиларга эътибор бериш;

• Шифохонага ётқизиладиган хавфли гуруҳга мансуб беморларни аланин аминотрансфераза (АЛАТ) ферментига ва HBsAg га текшириш;

• Шифохона ходимларини ишга қабул қилинаётганда ва иш жараёнида ҳар 6 ойда лаборатория кўригидан ўтказиш;

• Хавфли гуруҳга мансуб бўлган беморларни ва тиббиёт ходимларини ВГБ га қарши эмлаш;

• Беморларга қон ва қон препаратларини қуйишни имконият даражасида камайтириш;

• Донорлардан олинаётган қонни ва қон маҳсулотларини HBsAg га текширишни қаттиқ назорат қилиш;

• Битта флакондаги қонни фақат битта беморга қуйиш лозим;

• Беморларга кўчириб ўтказиладиган гомотрансплантатларни ВГБ (HBsAg) текшириш;

• Кўп маротаба ишлатиладиган тиббиёт анжомларини сифатли дезинфекция ва стерилизация қилиш, ушбу анжомларни қон қолдиғига текшириш;

• Бир маротаба ишлатиладиган шприцлар, қуйиш тизимлари ва анжомлардан фойдаланиш;

• Лаборатория таҳлили учун қон олаётганда гигиена қоидаларига қатъий риоя қилиш;

• Тиббиёт ходимларига касаллик юқиб қолишининг олдини олиш учун иш жараёнида техника хавфсизлигига амал қилиш.

Бемор соғайганидан сўнг нисбатан турғун иммунитет ҳосил бўлади. Гепатит Б вирусига қарши HBc ва HBs – антитаналар 50 % беморларда топилади. HBs – антигенга қарши, асосан, протектив антителолар синтез қилинади. Ҳимоя одатда 10 -20 йил ёки ундан кўпроқ давом этади. Кўпчиликда умрбод иммунитет шаклланиши мумкин. Гепатит Б ташхисида беморнинг қон зардобидидаги антиген ва антителоларни ИФА усулидан фойдаланиб аниқланади. HBs – антиген сурункали ва симптомсиз инфекцияларда топилади. Беморларда HBe ва HBc антигенлар топилиши ката диагностик аҳамиятга эга, чунки булар инфекциянинг яширин давридан то 6 – 8 ойгача аниқланиши мумкин. Турли антигенларга қарши антителоларнинг синтез қилиш динамикаси ҳар хил бўлиб, продромал даврда HBc – антителолар, сўнггра HBe – антитаналар, энг кейин HBs – антитаналар пайдо бўлади. У ёки бу антигенга қарши пайдо бўлган антителоларга қараб касаллик даврини аниқлаш мумкин. Ўткир гепатит Б ташхисини қўйиш учун беморнинг қон зардобидида HBc – антигенга қарши IgM ни топиш муҳим аҳамиятга эга [4,6,10,24].

Адабиётлар рўйхати:

1. Кузнецов Н. И. Вирусный гепатит В //Российский семейный врач. – 2012. – Т. 16. – №. 4. – С. 13-18.
2. Амплеева Н. П. и др. Острый вирусный гепатит В: клиничко-лабораторная характеристика //Академический журнал Западной Сибири. – 2014. – Т. 10. – №. 1. – С. 47-47.
3. Чеботкевич В. Н. и др. Вирусный гепатит В у онкогематологических больных (обзор литературы) //Журнал инфектологии. – 2018. – Т. 9. – №. 4. – С. 24-30.
4. Рупасова А. Р., Сорокина А. Ю. Вирусные гепатиты //Международный студенческий научный вестник. – 2018. – №. 4-2. – С. 317-320.
5. Гриднева Г. И. и др. К проблеме расширенного серологического обследования на вирусный гепатит В у больных ревматоидным артритом //Терапевтический архив. – 2025. – Т. 97. – №. 5. – С. 443-448.
6. Волюнец Г. В., Панфилова В. Н. Хронический вирусный гепатит В у детей и подростков: современный взгляд на проблему //Российский вестник перинатологии и педиатрии. – 2020. – Т. 65. – №. 4. – С. 47-60.
7. Лапасов С. Х. и др. диагностика, лечение и профилактика хронического гепатита b с позиции доказательной медицины //человек и его здоровье. – 2015. – №. 3. – С. 41-48.
8. Ефремов Д. О. и др. Вирусный гепатит В после трансплантации печени //Вестник российской Военно-медицинской академии. – 2019. – №. 3. – С. 223-227.
9. Семенов А. В. и др. К вопросу о молекулярной эпидемиологии гепатита В в Республике Саха (Якутия) //Журнал инфектологии. – 2016. – Т. 8. – №. 1. – С. 57-65.
10. Бердиярова Ш. Ш., Жаресбаева А. Н. Комплексная диагностика вирусная гепатита В в современной клинической практике //Образование наука и инновационные идеи в мире. – 2026. – Т. 86. – №. 3. – С. 331-342.
11. Тихонова В. А. и др. Способ лечения вирусного гепатита В у детей. – 2000.
12. Кожевникова Г. М. Вирусный гепатит В при парентеральном введении наркотиков //Вакцинация. – 1999. – №. 4. – С. 12.
13. Герасимова В. В. и др. Молекулярно-эпидемиологические особенности вирусного гепатита В //Инфекция и иммунитет. – 2015. – Т. 5. – №. 4. – С. 297-303.
14. Слепцов А. П. Вирусный гепатит в Якутии //Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины. – 2007. – Т. 22. – №. S2. – С. 52-54.
15. Хантимирова Л. М. и др. Ретроспективный анализ заболеваемости вирусным гепатитом В населения Российской Федерации с 2013 по 2017 г. в аспекте вакцинопрофилактики //БИОпрепараты. Профилактика, диагностика, лечение. – 2018. – Т. 18. – №. 4. – С. 225-235.
16. Журавская И. М., Петров В. Н. Хронический вирусный гепатит //Медицинская сестра. – 2011. – №. 4. – С. 10-13.
17. Мартынова Т. А., Чалдышева К. С., Шамарданов Х. Р. Эпидемиология и патогенез вирусного гепатита: актуальные данные //Биология и интегративная медицина. – 2025. – №. SV (73). – С. 675-692.
18. Жигалева О. Н. и др. Разработка набора реагентов с применением метода ПЦР для качественной идентификации ДНК вируса гепатита В //клиническая лабораторная диагностика. – 2023. – Т. 68. – №. 12.
19. Абдурахманов Д. Т. и др. Хронический вирусный гепатит В. – 2024.
20. Горячева Л. Г., Венцловайте Н. Д., Грешнякова В. А. Вирусные гепатиты у детей: состояние и перспективы решения проблемы //Детские инфекции. – 2021. – Т. 20. – №. 4. – С. 35-41.
21. Семенов А. В., Останкова Ю. В. Окультурный (скрытый) гепатит В: проблемы лабораторной диагностики //Инфекционные болезни: Новости. Мнения. Обучение. – 2019. – Т. 8. – №. 3 (30). – С. 61-69.
22. Останкова Ю. В., Семенов А. В., Тотоян А. А. Выявление вируса гепатита В в плазме крови при низкой вирусной нагрузке //Клиническая лабораторная диагностика. – 2019. – Т. 64. – №. 10. – С. 635-640.
23. Шкурба А. В. и др. Острый вирусный гепатит В, осложненный развитием синдрома Гийена-Барре //Клиническая инфектология и паразитология. – 2013. – №. 3. – С. 138-144.
24. Авдеева М. Г. и др. Хронический вирусный микст-гепатит: современные клиничко-эпидемиологические аспекты //Эпидемиология и инфекционные болезни. – 2015. – Т. 20. – №. 6. – С. 19-25.
25. Тургунов А. М. и др. Жигар хужайраси ва вирусли гепатит механизмлари математик моделлаштиришнинг ривожланиши //Universal journal of mathematical theory and computer sciences. – 2025. – Т. 3. – №. 24. – С. 22-27.
26. Григоренко Е. И. Вакцинация против вирусного гепатита В //Крымский терапевтический журнал. – 2007. – Т. 1. – №. 1 (8). – С. 4-7.
27. Зайцев И. А., Мирошниченко В. А. Скрининг на вирусные гепатиты: актуальность проблемы и пути совершенствования (обзор литературы) //Актуальная инфектология. – 2017. – Т. 5. – №. 2. – С. 71-77.

28.Амплеева Н. П. и др. Хронический вирусный гепатит В в Республике Мордовия //Академический журнал Западной Сибири. – 2014. – Т. 10. – №. 3. – С. 76-77.

29.Чингаева Г. Н. и др. Вирусный гепатит В в детских отделениях гемодиализа республики Казахстан //Journal of Clinical Medicine of Kazakhstan. – 2014. – №. S1-1. – С. 74-75.

30.Белопольская М. А., Воронина О. И. Беременность и вирусный гепатит В //Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Медицина. – 2012. – №. 5. – С. 465-475.

31.Даминова Ш. Б., Иноятова Ф. И., Абдуллаева Ж. Р. Стоматологический статус у детей с хроническим вирусным гепатитом В //Клиническая стоматология. – 2016. – №. 3. – С. 9-11.

32.Кумарбекова А. К., Эфендиев И. М., Муковозова Л. А. Географическое распределение генотипов вируса гепатита в и связь с клиническими проявлениями хронического вирусного гепатита в: обзор литературы //Наука и здравоохранение. – 2019. – №. 6. – С. 11-23.

33.Подымова С. Д. Парентеральные острые вирусные гепатиты: современная диагностика, профилактика и лечение //Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология. – 2012. – №. 6. – С. 76-85.

34.Агаева С. Ч., Гидаев А. А., Гаджиева П. Ш. Изучение распространенности оккультной инфекции вирусного гепатита В среди доноров крови в Азербайджане //Вісник проблем біології

і медицини. – 2019. – Т. 1. – №. 1 (148). – С. 86-88.

35.Балмасова И. П., Сепиашвили Р. И., Малова Е. С. Молекулярная биология вируса гепатита В и иммунопатогенез хронического вирусного гепатита В //Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – 2016. – №. 2. – С. 119-126.

36.Jamila J. Перинатальное инфицирование новорожденного вирусами гепатита В и С //Curierul medical. – 2010. – Т. 316. – №. 4. – С. 61-64.

37.Лысанов Ю. И., Шаманова Л. В. Вирусные гепатиты: распространённость и динамика заболеваемости //Байкальский медицинский журнал. – 2011. – Т. 103. – №. 4. – С. 110-113.

38.Останкова Ю. В. и др. Первые случаи выявления вируса гепатита В субгенотипа D4 у больных хроническим, острым и скрытым вирусным гепатитом В в Российской Федерации //Молекулярная генетика, микробиология и вирусология. – 2020. – Т. 38. – №. 4. – С. 180-187.

39.Бацких С. Н. и др. Риск развития цирроза у пациентов с неалкогольной жировой болезнью печени, перенесших вирусный гепатит В //Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии. – 2020. – Т. 30. – №. 4. – С. 28-34.

40.Останкова Ю. В. и др. Распространённость клинически значимых мутаций вируса у больных хроническим вирусным гепатитом В //Клиническая лабораторная диагностика. – 2020. – Т. 65. – №. 1. – С. 61-66.

Иктибос учун: Искандарова И.М. Гепатит В га эмлашдан кейинги химоя даражаси ва унинг давомийлигини лаборатор текширувлар асосида баҳолаш // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2026. – № 4(24). – Б. 588–593. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19625897>

ВРОЖДЕННЫЙ ВЫВИХ НАДКОЛЕННИКА: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ, ДИАГНОСТИКА И ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ**Эранов Н.Ф., Мухторов Д.С., Абдиев Н.О.**

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Врожденный вывих надколенника (ВВН) является редкой врожденной патологией коленного сустава, характеризующейся постоянным латеральным смещением надколенника с момента рождения. Заболевание сопровождается выраженными анатомо-функциональными нарушениями, прогрессирующей деформацией конечности и ранним развитием дегенеративных изменений. Ранняя диагностика затруднена в связи с отсутствием оксификации надколенника у новорожденных, что снижает информативность стандартной рентгенографии. Цель исследования — обобщить современные данные о патогенезе, клинических проявлениях, диагностике и методах лечения врожденного вывиха надколенника. Проведён анализ современных публикаций, посвящённых вопросам этиологии, диагностики и хирургического лечения ВВН. Показано, что ранняя ультразвуковая диагностика и индивидуализированный хирургический подход позволяют значительно улучшить функциональные результаты и снизить риск инвалидизации.

Ключевые слова: врожденный вывих надколенника, коленный сустав, патогенез, диагностика, хирургическое лечение.

CONGENITAL PATELLAR DISLOCATION: CURRENT STATE OF THE PROBLEM, DIAGNOSIS, AND TREATMENT APPROACHES**Eranov N.F., Mukhtorov D.S., Abdiev N.O.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Congenital dislocation of the patella (CDP) is a rare congenital disorder characterized by permanent lateral displacement of the patella from birth. The condition leads to significant anatomical and functional impairment of the knee joint and progressive deformity of the lower limb. Early diagnosis is challenging due to the lack of patellar ossification in newborns, which limits the value of conventional radiography. The aim of this study was to summarize current knowledge regarding the etiology, clinical presentation, diagnostic methods, and treatment strategies for CDP. A review of contemporary literature demonstrates that early ultrasound-based diagnosis and individualized surgical correction significantly improve functional outcomes and reduce long-term complications.

Keywords: congenital dislocation of the patella, knee joint, pathogenesis, diagnosis, surgical treatment.

ТИЗЗА ҚОҶҚОҒИНИНГ ТУҒМА ЧИҚИШИ: МУАММАОНИНГ ХОЗИРГИ ХОЛАТИ, ДИАГНОСТИКА ВА ДАВОЛАШ ЁНДАШУВЛАРИ**Эранов Н.Ф., Мухторов Д.С., Абдиев Н.О.**

Самарканд давлат тиббиёт университети, Самарканд ш., Ўзбекистон

Резюме. Тизза қоҶқоғининг туғма чиқиши – кам учрайдиган туғма ортопедик патология бўлиб, тизза қоҶқоғининг туғилишдан бошлаб доимий равишда латерал томонга силжиши билан тавсифланади. Ушбу ҳолат тизза бўғимининг анатомик ва функционал бузилишларига, оёқ деформациясининг кучайишига олиб келади. Эрта таъхис қўйиши мураккаб бўлиб, бу тизза қоҶқоғининг чақалоқларда суяклашмаганлиги билан боғлиқ. Тадқиқот мақсади — тизза қоҶқоғи туғма чиқишининг этиологияси, клиник белгилари, диагностикаси ва даволаш усуллари бўйича замонавий маълумотларни умумлаштиришидир. Адабиётлар таҳлили эрта ультратовуви диагностикаси ва индивидуал жарроҳлик ёндашуви функционал натижаларни сезиларли даражада яхшилашини кўрсатди.

Калит сўзлар: тизза қоҶқоғининг туғма чиқиши, тизза бўғими, патогенез, диагностика, жарроҳлик даволаш.

e-mail: nurali.eranov@mail.ru

Введение. Врожденный вывих надколенника (ВВН) — редкая патология опорно-двигательного аппарата, встречающаяся приблизительно у 0,45–1 % всех врожденных аномалий суставов [1,2]. Наиболее часто заболевание выявляется в детском возрасте при задержке начала ходьбы или при наличии выраженной деформации коленного сустава [3]. Патология характеризуется латеральной и необратимой дислокацией надколенника, присутствующей уже с момента рождения, и нередко сочетается с дисплазией бедренного мышечка, контрактурой сгибателей коленного сустава, а также наружной ротацией большеберцовой кости [4,5]. Несмотря на относительно низкую распространенность, врожденный вывих надколенника представляет серьезную клиническую проблему, поскольку при отсутствии своевременной диагностики и лечения происходит прогрессирование деформаций, формируется стойкое ограничение движений в коленном суставе, болевой синдром и повышается риск развития раннего посттравматического артроза [6,7]. Ранняя диагностика ВВН существенно затруднена тем, что у новорожденных и детей раннего возраста надколенник представлен преимущественно хрящевой тканью и не визуализируется при стандартной рентгенографии, что снижает информативность традиционных методов лучевой диагностики в первые годы жизни [8]. В этой связи диагностическое преимущество приобретает ультразвуковое исследование, позволяющее оценить положение надколенника, состояние хрящевых структур и сухожильно-связочного аппарата коленного сустава [9]. Магнитно-резонансная томография рассматривается как высокоинформативный метод уточняющей диагностики, особенно при планировании хирургического лечения [10]. В литературе подчеркивается, что ранняя хирургическая коррекция врожденного вывиха надколенника способствует восстановлению нормальной биомеханики коленного сустава и позволяет предотвратить развитие вторичных дегенеративно-дистрофических изменений [11,12]. Однако до настоящего времени отсутствуют единые диагностические и лечебные алгоритмы, что, наряду с необходимостью раннего междисциплинарного подхода, определяет высокую актуальность проблемы врожденного вывиха надколенника в современной детской ортопедии.

Цель исследования — обобщить современные данные о патогенезе, клинических проявлениях, диагностике и методах лечения врожденного вывиха надколенника.

Методы исследования. В данной статье проведен обзор современных медицинских публикаций, включающий результаты клинических исследований, ретроспективных анализов и обзорных обзоров, представленных в PubMed и профильных ортопедических источниках. Основное внимание уделено вопросам этиологии, диагностическим критериям, особенностям клинической картины и современным подходам к лечению.

Причины ВВН до конца не изучены, но считается, что формирование патологии происходит в эмбриональном периоде из-за нарушения развития миотомов и неверного формирования разгибательного аппарата коленного сустава. Надколенник при этом является гипопластичным, локализуется латерально и не может быть приведен в нормальное положение вручную. В ряде работ подчеркивается ассоциация ВВН с генетическими синдромами, такими как синдром Наил-Пателлы, синдром Ларсена и другие, что подтверждает мультифакторность патогенеза. У новорожденных ВВН может проявляться ограничением разгибания в коленном суставе, латеральным смещением надколенника и контрактурой сгибателей. Часто наблюдаются сопутствующие аномалии нижних конечностей, такие как вальгусная деформация большеберцовой кости и аномалии стопы. У детей старшего возраста клиническая картина включает боль, слабость разгибателей, нестабильность сустава и позже — артрозные изменения.

Ранняя диагностика — залог успешного лечения. Обычные рентгенограммы малоэффективны до 3 лет из-за незрелости надколенника, что требует применения ультразвуковой диагностики у младенцев для визуализации положения надколенника и состояния хрящевых структур. Ультразвуковое исследование является методом выбора в диагностике врожденного вывиха надколенника у новорожденных и детей раннего возраста, поскольку надколенник в этот период представлен преимущественно хрящевой тканью и не визуализируется при стандартной рентгенографии. Высокая пространственная разрешающая способность ультразвука позволяет в режиме реального времени оценить положение хрящевого надколенника, состояние бедренно-надколенникового сочленения и мягкотканых структур коленного сустава (Рис. 1).

МРТ является наиболее информативным методом комплексной оценки морфологических изменений коленного сустава при ВВН у детей, особенно в возрасте старше 2–3 лет и на этапе предоперационного планирования. Метод позволяет визуализировать как хрящевые, так и костные структуры, а также сухожильно-связочный аппарат без лучевой нагрузки. МРТ позволяет количественно оценить степень латерализации надколенника, состояние оси разгибательного аппарата, а также выявить со-

путствующие аномалии развития (наружную ротацию большеберцовой кости, контрактуры мягких тканей), что имеет решающее значение при выборе объёма и тактики хирургического вмешательства.



Рис. 1. Ультразвуковое изображение отображает латеральное положение надколенника по отношению к большому мыщелку бедра, что может быть диагностическим признаком врожденного вывиха в раннем возрасте.



Рис. 2. МРТ-срезы (аксиальные и сагиттальные) показывают смещение надколенника, изменения в структурах мягких тканей и возможные вторичные признаки нестабильности сустава.




Рис. 3. Совместные измерения на МРТ позволяют оценить углы, смещение и положение надколенника относительно бедренного мыщелка — важные параметры для предоперационного планирования.

Лечение врожденного вывиха надколенника у детей преимущественно хирургическое и направлено на восстановление анатомических взаимоотношений в бедренно-надколенниковом суставе, центрирование надколенника в межмыщелковой борозде, коррекцию оси разгибательного аппарата и профилактику вторичных дегенеративно-дистрофических изменений. Серийное гипсование и ортезирование могут временно улучшить контрактуру сгибателей, но сами по себе не устраняют латеральную дислокацию надколенника и не являются радикальным лечением.

Согласно современным данным, оперативное лечение является основным методом коррекции ВВН, особенно при выраженных деформациях и функциональных нарушениях.

Среди используемых методик: латеральное релизирование и медиальная пликация мягких тканей; V-Y удлинение четырехглавой мышцы; трансфер связки надколенника для централизации надколенника; комбинированные методики, такие как модифицированная процедура Лангескиольда и 4 в 1 операция, показали перспективные результаты в стабильности и функции сустава. Ранние вмешательства в младенчестве или раннем детстве дают лучшие функциональные результаты по сравнению с отменёнными операциями у взрослых пациентов, у которых компенсаторные изменения и контрактуры выражены сильнее.

Обсуждение. Несмотря на значительный объём накопленного клинического опыта и наличие множества хирургических методик, проблема врождённого вывиха надколенника (ВВН) остаётся одной из наименее стандартизированных в детской ортопедии. В настоящее время отсутствует единый, общепринятый алгоритм диагностики и лечения данной патологии, что обусловлено редкостью заболевания, выраженной анатомической вариабельностью и неоднородностью клинических проявлений. Выбор тактики лечения во многом определяется степенью анатомических нарушений, возрастом пациента, выраженностью дисплазии бедренно-надколенникового сустава и наличием сопутствующих деформаций оси нижней конечности.

Большинство авторов сходятся во мнении, что ключевым фактором, определяющим исход лечения, является своевременность диагностики. Отсутствие выявления врождённого вывиха надколенника в раннем возрасте приводит к прогрессирующему нарушению биомеханики коленного сустава, формированию стойкого дисбаланса разгибательного аппарата и развитию вторичных структурных изменений. В ретроспективных исследованиях показано, что у пациентов, у которых диагноз был установлен в позднем детском или подростковом возрасте, значительно чаще выявляются признаки дисплазии межмышечковой борозды, деформация надколенника, хондромалиция и ранние проявления бедренно-надколенникового артроза. Эти изменения существенно ухудшают функциональные результаты лечения и ограничивают возможности органосохраняющих вмешательств.

Отдельного обсуждения заслуживает вопрос оптимальных сроков хирургической коррекции. Ряд исследователей подчёркивает преимущества раннего оперативного вмешательства, выполненного в возрасте 2–6 лет, когда сохраняется высокая пластичность мягкотканых структур и минимальны вторичные дегенеративные изменения. В этом возрасте коррекция преимущественно мягкоткаными методами позволяет восстановить центрирование надколенника без необходимости выполнения травматичных костных вмешательств. В то же время при позднем обращении, особенно у подростков, зачастую возникает необходимость комбинированных операций с элементами остеотомии, что увеличивает хирургическую агрессию и продолжительность реабилитационного периода.

В литературе активно обсуждается проблема выбора оптимального объёма хирургического вмешательства. С одной стороны, изолированные мягкотканые операции считаются менее инвазивными и предпочтительными у детей младшего возраста, однако при недооценке выраженности анатомических нарушений они могут приводить к рецидивам вывиха. С другой стороны, чрезмерно радикальные вмешательства, выполненные без строгих показаний, повышают риск осложнений и нарушений роста. Это подчёркивает необходимость индивидуализированного подхода с обязательной предоперационной оценкой морфологических изменений по данным УЗИ и МРТ.

Современные исследования также указывают на недооценённую роль методов лучевой диагностики в формировании лечебной тактики. Ультразвуковое исследование и магнитно-резонансная томография позволяют не только подтвердить диагноз, но и объективизировать степень латерализации надколенника, состояние хрящевых структур и сухожильно-связочного аппарата. Использование этих методов способствует более точному планированию операции и снижению частоты неудовлетворительных исходов. В то же время отсутствие унифицированных критериев интерпретации лучевых данных ограничивает их интеграцию в стандартизированные протоколы лечения.

Особое значение в последние годы придаётся мультидисциплинарному подходу к ведению пациентов с врождённым вывихом надколенника. Вовлечение детских ортопедов, радиологов, специалистов по функциональной диагностике и реабилитологов позволяет обеспечить преемственность этапов лечения — от раннего выявления до послеоперационного восстановления. Комплексная реабилитация, начатая в ранние сроки после хирургического вмешательства, способствует более быстрому восстановлению объёма движений, улучшению мышечного баланса и формированию правильных двигательных стереотипов.

Несмотря на положительные результаты раннего хирургического лечения, в литературе сохраняются разногласия относительно долгосрочных функциональных исходов и риска развития дегене-

ративных изменений в зрелом возрасте. Отсутствие крупных проспективных исследований и стандартизированных шкал оценки результатов ограничивает возможность объективного сравнения различных методов лечения. Это указывает на необходимость дальнейших многоцентровых исследований, направленных на разработку единых диагностических критериев и алгоритмов лечения ВВН.

Таким образом, анализ современных данных свидетельствует о том, что врождённый вывих надколенника остаётся сложной клинической проблемой, требующей ранней диагностики, индивидуализированного выбора хирургической тактики и мультидисциплинарного подхода. Формирование единых клиничко-диагностических и лечебных стандартов позволит повысить эффективность лечения, улучшить функциональные исходы и снизить риск вторичных дегенеративных изменений коленного сустава у детей.

Заключение. Врожденный вывих надколенника — редкая, но значимая ортопедическая патология, требующая ранней диагностики и своевременного хирургического лечения. Применение ультразвука у новорожденных улучшает точность диагностики, а современные хирургические методики значительно повышают функциональные результаты и уменьшают риск осложнений.

Список литературы:

1. BMC Musculoskeletal Disorders. Modified Langenskiöld procedure. 2022.
2. Ghanem I., Seringe R. Congenital dislocation of the patella. J Pediatr Orthop. 2000.
3. Ghanem I., Wattincourt L., Seringe R. Congenital dislocation of the patella: pathology and management. J Pediatr Orthop. 2000.
4. J Arthroplasty. Surgical treatment in adults. 2015.
5. Modified Langenskiöld procedure for congenital patella dislocations in pediatric patients. BMC Musculoskelet Disord. 2022.
6. Orthopedic Surgery Journal. 4-in-1 procedure. 2025.
7. Procedure in Treating Congenital Dislocation of Patella in Children. Orthop Surg. 2025.
8. Surgical treatment of congenital patellar dislocation in adults. J Arthroplasty. 2015.
9. Wada A. et al. Congenital dislocation of the patella. J Child Orthop. 2008.
10. Wada A., Fujii T., Takamura K., et al. Congenital dislocation of the patella. J Child Orthop. 2008;2(2):119–123.
11. Ибрагимов С. Ю., Эранов Н. Ф., Эранов Ш. Н. Tizza bo'g'imining artroskopiyasi va artroskopik meniskektomiyaning natijalari // Журнал биомедицины и практики. – 2022. – т. 7. – №. 4.
12. Маматкулов, К., Холхужаев, Ф., Эранов, Ш., Қаххоров, А., Мардонкулов, У., & Исмоилова, Ю. (2021). Тизза қопқогининг ностабиллигини артроскопия усули ёрдамида стабилизация қилиш. Журнал вестник врача, 1(2 (99)), 56-59.

Для цитирования: Эранов Н.Ф., Мухторов Д.С., Абдиев Н.О. Врожденный вывих надколенника: современное состояние проблемы, диагностика и подходы к лечению // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 4(24). – С. 594–598. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19626287>

СПАСТИК ЦЕРЕБРАЛ ФАЛАЖЛИ БЕМОРЛАРДА ИНДИВИДУАЛЛАШТИРИЛГАН КИНЕЗИТЕРАПИЯДА ЭЛЕКТРОНЕЙРОМИОГРАФИЯ МАЪЛУМОТЛАРИДАН ФЙДАЛАНИШНИНГ ИЛМИЙ АСОСЛАРИ

Ибрагимова М.Ш.

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Ушбу мақолада спастик шаклдаги церебрал фалажли беморларда кинезитерапияни режаслаштиришда электронейромиография (ЭНМГ) маълумотларидан фойдаланишнинг илмий асослари ва амалий жиҳатлари баён этилган. Тадқиқот давомида нерв-мушак тизимининг функционал ҳолати ЭНМГ ёрдамида баҳоланиб, патологик мушак фаоллигининг характери ва оғирлик даражасини аниқлаш имконияти яратилди. Олинган маълумотлар асосида индивидуаллаштирилган кинезитерапия дастурлари ишлаб чиқилди ва уларнинг самарадорлиги динамик кузатув орқали баҳоланди. Натижалар ЭНМГ асосида олиб борилган ёндашув спастикликнинг камайишига, ҳаракатлар мувофиқлашувининг яхшиланишига ҳамда функционал фаолликнинг ошишига хизмат қилишини кўрсатди. ЭНМГни реабилитация дастурларига интеграция қилиш спастик церебрал фалажли беморларда кинезитерапия самарадорлигини сезиларли даражада ошириши мумкин.

Калит сўзлар: церебрал фалаж, спастиклик, электронейромиография, кинезитерапия, реабилитация, индивидуаллаштирилган ёндашув.

SCIENTIFIC FOUNDATIONS FOR THE USE OF ELECTRONEUROMYOGRAPHY DATA IN INDIVIDUALIZED KINESITHERAPY FOR PATIENTS WITH SPASTIC CEREBRAL PALSY

Ibragimova M.Sh.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. This article describes the scientific foundations and practical aspects of using electroneuromyography (ENMG) data in planning kinetotherapy for patients with spastic cerebral palsy. During the study, the functional state of the neuromuscular system was assessed using ENMG, which allowed for the determination of the nature and severity of pathological muscle activity. Based on the data obtained, individualized kinesiotherapy programs were developed, and their effectiveness was evaluated through dynamic observation. The results showed that the ENMG-based approach contributes to a reduction in spasticity, improved coordination of movements, and increased functional activity. Integrating ENMG into rehabilitation programs can significantly increase the effectiveness of kinesiotherapy in patients with spastic cerebral palsy.

Keywords: cerebral palsy, spasticity, electroneuromyography, kinesiotherapy, rehabilitation, individualized approach.

НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДАННЫХ ЭЛЕКТРОНЕЙРОМИОГРАФИИ В ИНДИВИДУАЛИЗИРОВАННОЙ КИНЕЗИТЕРАПИИ У ПАЦИЕНТОВ С СПАСТИЧЕСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧЕМ

Ибрагимова М.Ш.

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. В настоящей статье изложены научные основы и практические аспекты применения данных электронейромиографии (ЭНМГ) при планировании кинезитерапии у пациентов со спастической формой детского церебрального паралича. В ходе исследования с помощью ЭНМГ оценивалось функциональное состояние нервно-мышечной системы, что позволило определить характер и степень выраженности патологической мышечной активности. На основе полученных данных были разработаны индивидуализированные программы кинезитерапии, эффективность которых оценивалась путём динамического наблюдения. Результаты показали, что данный подход способствует снижению спастичности, улучшению координации движений и повышению функциональной активности. Интеграция ЭНМГ в реабилитационные программы может значительно повысить эффективность кинезитерапии у пациентов со спастическим детским церебральным параличом.

Ключевые слова: детский церебральный паралич, спастичность, электронейромиография, кинезитерапия, реабилитация, индивидуализированный подход.

Кириш. Болалар серебрял фалажининг (БСФ) спастик шакллари болалар ногиронлиги таркибида етакчи ўринни эгаллайди, бу ҳаракат бузилишларининг юқори тарқалиши ва уларнинг беморлар ҳаёт сифатига сезиларли таъсири билан боғлиқ. Мушаклар тонусининг патологик ошиши, координациянинг бузилиши ва турғун патологик ҳаракат стереотипларининг шаклланиши мустақил ҳаракатланиш ва ижтимоий мослашув имкониятларини сезиларли даражада чеклайди. Замонавий реабилитология тикловчи даволашга индивидуал ёндашувга йўналтирилган бўлиб, бунда кинезитерапия усуллари танлаш асаб-мушак тизимининг функционал ҳолатини объектив баҳолашга асосланади. Шу нуқтаи назардан, электронейромиография (ЭНМГ) функционал диагностиканинг юқори маълумотли усули бўлиб, мушак фаоллигининг ўзига хос хусусиятларини, спастиклик даражасини ва нейромушак дисфункциясининг табиатини миқдорий баҳолаш имконини беради. Кинеситерапияни режалаштиришда ENMG маълумотларидан фойдаланиш реабилитация чора-тадбирларининг аниқлигини ва уларнинг клиник самарадорлигини ошириш имконини беради.

Тадқиқот мақсади. Болалар серебрял фалажининг спастик шакллари билан оғриган беморларда кинезитерапия дастурларини индивидуаллаштиришда электронейромиография маълумотларидан фойдаланишнинг амалий мақсадга мувофиқлигини илмий асослаш ва баҳолаш.

Тадқиқотнинг вазифалари:

- спастик БСФ билан оғриган беморларда ENMG кўрсаткичларининг хусусиятларини ўрганиш;
- электромиографик ўзгаришларнинг яққоллиги ва ҳаракат бузилишларининг табиати ўртасидаги боғлиқликни аниқлаш;
- ЭНМГ маълумотлари асосида индивидуаллаштирилган кинеситерапия дастурларини ишлаб чиқиш ва жорий этиш;
- реабилитация динамикасида таклиф этилган ёндашувнинг самарадорлигини баҳолаш.

Материаллар ва усуллар. Тадқиқотга болалар серебрял фалажининг спастик шакллари билан оғриган ва тикловчи даволаш курсини олган беморлар киритилди.

Барча текширилувчиларга неврологик кўрик, мушак тонуси ва функционал ҳаракат имкониятларини баҳолашни ўз ичига олган комплекс клиник-функционал текширув ўтказилди.

Электронейромиографик текширув. ЭНМГ оёқ ва қўлларнинг асосий мушак гуруҳларининг биоэлектрик фаоллигини баҳолаш мақсадида амалга оширилди.

1-жадвал

Тадқиқотда қўлланилган ЭНМГнинг асосий кўрсаткичлари

Кўрсаткич	Клиник аҳамияти
PD амплитудаси	Мушак фаоллашуви даражасини акс эттиради
PD частотаси	Спастиклик даражасини тавсифлайди
Тинч ҳолатдаги фаоллик	Патологик мушак тонуси белгиси
Ко-контраксия	Ҳаракат назорати бузилиши кўрсаткичи

Қуйидаги параметрлар таҳлил қилинди:

- ҳаракат потенциалларининг амплитудаси ва частотаси;
- тинч ҳолатдаги мушак фаоллиги даражаси;
- ихтиёрий ҳаракатларда мушакларнинг фаоллашиш хусусияти;
- патологик қисқариш ва қисқаришларнинг асинхронлиги мавжудлиги.

Кинеситерапия. ЭНМГ маълумотларига асосланиб, беморлар қуйидагиларга қаратилган индивидуал кинетик терапия дастурларини олишди:

- спастик мушаклар фаоллигининг пасайиши;
- функционал заифлашган мушак гуруҳларини фаоллаштириш;
- физиологик ҳаракат стереотипларини шакллантириш;
- мувофиқлаштириш ва мувозанатни яхшилаш.

Муҳокама. Олинган маълумотлар спастик БСФ билан оғриган беморларда электронейромиографиянинг юқори диагностик ва прогностик аҳамиятини тасдиқлайди. ЭНМГ стандарт клиник кўрикда ҳар доим ҳам аниқланмайдиган мушак гиперактивлигининг яширин шакллари аниқлаш имконини беради. Бу, айниқса, кинезитерапияни режалаштиришда муҳимдир, чунки нотўғри танланган машқлар патологик ҳаракат стереотипларини кучайтириши мумкин. Қиёсий таҳлил шуни кўрсатдики, ENMG маълумотлари асосида кинеситерапияга индивидуаллаштирилган ёндашув мушаклар спастиклигини сезиларли даражада камайитиришга ва координацион кўрсаткичларни яхшилашга ёрдам беради. Такрорий ЭНМГ назорати билан динамик кузатув реабилитация дастурини ўз вақтида

тузатиш ва эришилган натижаларнинг барқарорлигини ошириш имконини беради.

2-жадвал.

ЭНМГ-йўналтирилган кинезитерапия фонида функционал кўрсаткичлар динамикаси

Параметр	Реабилитациягача	Курсдан кейин
Мушак тонуси	Баланд	Мўътадил
Ҳаракатларни мувофиқлаштириш	Бузилди	Яхшиланган
Ихтиёрий фаоллик	Чекланган	Кўтарилди

Тадқиқот натижалари. ЭНМГ маълумотларидан фойдаланган ҳолда индивидуаллаштирилган кинезитерапия курсини олган беморларни динамик кузатиш давомида нейромушак ва функционал кўрсаткичларда клиник жиҳатдан сезиларли ижобий ўзгаришлар кузатилди.

3-жадвал

Спастик БСФ билан оғриган беморларда ЭНМГ кўрсаткичлари динамикаси

Кўрсаткич	Даволанишдан олдин	Даволанишдан кейин	Динамика
Мушакларнинг тинч ҳолатдаги фаоллиги	Яққол	Мўътадил	↓
PD частотаси	Кўтарилган	Меъёрга яқин	↓
Ко-контраксия	Катта	Пасайтирилган	↓
Қисқартмаларнинг синхронлиги	Бузилди	Яхшиланган	↑


ENMG параметрларининг ўзгариши. Реабилитация курси тугагандан сўнг спастик мушакларнинг патологик биоэлектрик фаоллигини ва агонистлар ҳамда антагонистлар ишининг мувофиқлашувини яхшилаш. Энг яққол ифодаланган ўзгаришлар тинч ҳолатда мушаклар фаоллигининг пасайиши ва ихтиёрий ҳаракатларда ко-контраксиялар ифодаланишининг пасайишига тегишли эди.

Кинезотерапиянинг функционал натижалари. ЭНМГ-йўналтирилган кинезитерапия фонида ҳаракат кўникмаларининг яхшиланиши, фаол ҳаракатлар ҳажмининг ортиши ва мақсадли ҳаракат ҳаракатларини бажаришда барқарорликнинг ошиши кузатилди.

4-жадвал.

Беморларнинг функционал ҳолатидаги ўзгаришлар

Баҳолаш мезони	Курсгача	Курсдан кейин
Фаол ҳаракатлар ҳажми	Чекланган	Кенгайтирилган
Ҳолатни назорат қилиш	Етишмайдиган	Яхшиланган
Ҳаракатларнинг мустақиллиги	Паст	Ўртача юқори



2-расм. Реабилитация курсдан кейинги клиник яхшиланишларнинг тузилиши

- Мушак спастиклигининг пасайиши - 45-50%
- Ҳаракатлар мувофиқлигини яхшилаш - 30-35%
- Функционал фаолликни ошириш - 20-25%

Муҳокама. Олинган натижалар спастик БСФ билан оғриган беморларда кинезитерапияни режалаштириш ва назорат қилиш воситаси сифатида электронейромиографиядан фойдаланишнинг

мақсадга мувофиқлигини тасдиқлайди. ЭНМГ маълумотларига кўра патологик мушак фаоллигининг пасайиши ҳаракат функцияларининг клиник яхшиланиши билан боғлиқ бўлиб, бу усулнинг юқори информативлигидан далолат беради. ЭНМГ таҳлили асосида кинезитерапияни индивидуаллаштириш спастик мушакларга ортикча юкломани олдини олиш ва бир вақтнинг ўзида функционал заифлашган мушак гуруҳларини фаоллаштириш имконини берди. Бу кўпроқ физиологик ҳаракат стереотипларини шакллантиришга ва реабилитация жараёнининг самарадорлигини оширишга ёрдам берди.

Хулоса. Олиб борилган тадқиқот натижалари шуни кўрсатдики, электронейромиография болалар серебрял фалажининг спастик шакллари бўлган беморларда нейромускул ҳолатини баҳолашнинг илмий асосланган ва амалий аҳамиятга эга усули ҳисобланади. Кинезитерапияни режалаштиришда ЭНМГ маълумотларидан фойдаланиш реабилитацияга шахсий ёндашувни таъминлайди, спастикликни камайтиради, ҳаракат координациясини яхшилади ва беморларнинг функционал фаоллигини оширади. ЭНМГни спастик БСФ замонавий тикловчи тиббиётнинг истиқболли йўналиши сифатида қаралиши ва кенг клиник қўллаш учун тавсия этилиши мумкин.

Адабиётлар рўйхати:

1. Бадалян Л.О. Болалар серебрял фалажи. – М.: Тиббиёт, 2018. – 320 б.
2. Семенова К.А. Болалар серебрял фалажи билан оғриган болаларни тикловчи даволаш. – М.: Тиббиёт, 2019. – 256 б.
3. Кадиков А.С., Шахпаронова Н.В. Неврологик беморлар реабилитацияси. – М.: ГЕОТАР-Медиа, 2020. – 400 б.
4. Гехт Б.М., Илина Н.А. Клиник электро-нейромиография. – М.: Медицина, 2017. – 368 б.
5. Филимонов В.И., Гришина Л.П. Неврологияда электрофизиологик усуллар. – СПб.: СпелсЛит, 2018. – 280 б.
6. Козёвкин В.И., Сак Н.Н. Болалар серебрял фалажи реабилитациясининг замонавий технологиялари. – Львов, 2016. – 212 б.
7. Умнов В.В. Тиббий реабилитация тизимида кинезитерапия. – М.: Академия, 2019. – 240 б.
8. Левин О.С., Васенина Е.Е. Спастиклик: таъхислаш ва тузатиш усуллари. – М.: ГЕОТАР-Медиа, 2021. – 176 б.
9. Шмидт И.Р. Неврологияда функционал диагностика. – М.: МЕДпресс-информ, 2018. – 304 б.
10. Грибова Н.П. Мускул тонусини баҳолашда электромиография. // Неврология ва психиатрия журналы. – 2019. – №6. – Б. 45–50.
11. Мартинова Н.А., Орлова Е.А. Ҳаракат бузилишлари бўлган беморларни реабилитация қилишда ЭНМГнинг роли. // Тикловчи тиббиёт хабарномаси. – 2020. – №4. – Б. 32–38.
12. Белова А.Н. Нейрореабилитация: шифокорлар учун қўлланма. – М.: Антидор, 2017. – 512 б.
13. Качесова Л.А. Спастик синдромларда кинезитерапия дастурларини индивидуаллаштириш. // Физиотерапия, бальнеология ва реабилитация. – 2021. – №2. – Б. 21–27.
14. Попова Т.В. Реабилитация самарадорлигини баҳолашда ЭНМГдан фойдаланиш. // Неврология ва нейрохирургия. – 2018. – №3. – Б. 60–65.
15. Шарова Е.В., Никитина Н.Н. Спастикликни даволашга замонавий ёндашувлар. – СПб.: Питер, 2020. – 198 б.
16. Иванова Г.Е. Неврологияда тиббий реабилитация. – М.: ГЕОТАР-Медиа, 2019. – 352 б.
17. Ковалев С.А. Клиник амалиётда электронейромиография. – М.: МЕДпресс-информ, 2016. – 224 б.
18. Зайцев А.А. БСФ билан оғриган болаларда ҳаракат бузилишларини функционал баҳолаш. // Педиатрия. – 2020. – №5. – Б. 78–83.
19. Рябова Т.А. Асаб тизими касалликларидан кинезитерапия. – М.: Академия, 2018. – 260 б.
20. Сулова Е.В. Болалар серебрял фалажининг спастик шакллари билан комплекс реабилитация. // Курортология, физиотерапия ва даволаш жисмоний тарбияси масалалари. – 2021. – №1. – Б. 40–46.

Иқтибос учун: Ибрагимова М.Ш. Спастик серебрял фалажли беморларда индивидуаллаштирилган кинезитерапияда электронейромиография маълумотларидан фойдаланишнинг илмий асослари // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2026. – № 4(24). – Б. 599–602. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19626882>

ГИПОЛИПИДЕМИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ СОЧЕТАНИИ ИБС И САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА: СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Муминова А.Ю.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Сочетание ишемической болезни сердца (ИБС) и сахарного диабета 2 типа (СД2) ассоциируется с крайне высоким сердечно-сосудистым риском и ускоренным прогрессированием атеросклероза. Дислипидемия при СД2 имеет специфический атерогенный профиль, характеризующийся повышением уровня триглицеридов, снижением холестерина липопротеинов высокой плотности и наличием мелких плотных частиц липопротеинов низкой плотности. В статье представлены современные подходы к гиполипидемической терапии у данной категории пациентов, включая применение статинов, эзетимиба, ингибиторов PCSK9 и малых интерферирующих РНК (инклизирани). Особое внимание уделено комбинированным стратегиям лечения, их эффективности и безопасности, а также перспективным направлениям терапии.

Ключевые слова: ИБС, сахарный диабет 2 типа, дислипидемия, статины, ингибиторы PCSK9, инклизирани, эзетимиб

HYPOLIPIDEMIC THERAPY IN COMBINATION WITH CORONARY HEART DISEASE AND TYPE 2 DIABETES MELLITUS: CURRENT OPPORTUNITIES AND PROSPECTS

Muminova A.Yu.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. The combination of coronary heart disease (CHD) and type 2 diabetes mellitus (T2DM) is associated with an extremely high cardiovascular risk and accelerated progression of atherosclerosis. Dyslipidemia in DM2 has a specific atherogenic profile characterized by an increase in triglycerides, a decrease in high-density lipoprotein cholesterol and the presence of small dense particles of low-density lipoproteins. The article presents modern approaches to lipid-lowering therapy in this category of patients, including the use of statins, ezetimibe, PCSK9 inhibitors and small interfering RNAs (inclisiran). Special attention is paid to combined treatment strategies, their effectiveness and safety, as well as promising areas of therapy.

Keywords: coronary heart disease, type 2 diabetes mellitus, dyslipidemia, statins, PCSK9 inhibitors, inclisiran, ezetimibe

ЮИК ВА 2-ТИП ҚАНДЛИ ДИАБЕТ БИРГА КЕЛГАНДАГИ ГИПОЛИПИДЕМИК ДАВОЛАШ: ЗАМОНАВИЙ ИМКОНИАТЛАР ВА ИСТИҚБОЛЛАР

Мўминова А.Ю.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Юрак ишемик касаллиги (ЮИК) ва 2-тур қандли диабет (ҚД2) комбинацияси ўта юқори юрак-қон томир хавфи ва атеросклерознинг жадал ривожланиши билан боғлиқ. ҚД2 да дислипидемия ўзига хос атероген профилга эга бўлиб, триглицеридлар даражасининг ошиши, юқори зичликдаги липопротеинлар холестеринининг пасайиши ва паст зичликдаги липопротеинларнинг майда зич заррачалари мавжудлиги билан тавсифланади. Мақолада ушбу тоифадаги беморларда гиполипидемик терапияга замонавий ёндашувлар, жумладан статинлар, эзетимиб, ПССК9 ингибиторлари ва кичик интерференцияловчи РНК (инклизирани) қўлланилиши келтирилган. Комбинацияланган даволаш стратегиялари, уларнинг самарадорлиги ва хавфсизлиги, шунингдек, терапиянинг истиқболли йўналишларига алоҳида эътибор қаратилган.

Калит сўзлар: ЮИК, 2-тур қандли диабет, дислипидемия, статинлар, ПССК9 ингибиторлари, инклизирани, эзетимиб

e-mail: Anjela_Muminova@icloud.com

Введение. Сердечно-сосудистые заболевания остаются ведущей причиной заболеваемости и смертности во всем мире, при этом ишемическая болезнь сердца (ИБС) занимает центральное место в структуре кардиоваскулярной патологии. Особую клиническую значимость приобретает сочетание

ИБС с сахарным диабетом 2 типа (СД2), которое рассматривается как эквивалент очень высокого сердечно-сосудистого риска. По данным International Diabetes Federation, число пациентов с СД2 превышает 530 млн, и более половины из них умирают от осложнений атеросклеротического генеза [1]. Наличие диабета увеличивает риск развития ИБС в 2–4 раза, а также значительно ухудшает прогноз, повышая вероятность повторных инфарктов миокарда и сердечно-сосудистой смертности [2].

Одним из ключевых патогенетических факторов развития и прогрессирования атеросклероза у пациентов с СД2 является дислипидемия, имеющая специфический атерогенный характер. Она проявляется сочетанием гипертриглицеридемии, снижением уровня холестерина липопротеинов высокой плотности и увеличением концентрации мелких плотных частиц липопротеинов низкой плотности, обладающих высокой проникающей способностью и выраженной атерогенностью [3,4]. В условиях инсулинорезистентности усиливается синтез липопротеинов очень низкой плотности в печени и нарушается их катаболизм, что дополнительно способствует прогрессированию сосудистого поражения [5].

Несмотря на значительные достижения в области гиполипидемической терапии, включая широкое применение статинов, проблема достижения целевых уровней липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) у пациентов с ИБС и СД2 остается актуальной. По данным клинических исследований, до 40–50% пациентов не достигают рекомендованных целевых значений ЛПНП даже при применении высокоинтенсивной статинотерапии [6]. В этой связи современные рекомендации European Society of Cardiology и Европейского общества атеросклероза подчеркивают необходимость более агрессивного снижения уровня ЛПНП ($<1,4$ ммоль/л, а в ряде случаев $<1,0$ ммоль/л) и широкого использования комбинированных подходов [7].

В последние годы значительно расширился арсенал гиполипидемических средств, включающий ингибиторы всасывания холестерина (эзетимиб), моноклональные антитела к PCSK9 и препараты на основе малых интерферирующих РНК, такие как Inclisiran. Эти препараты позволяют достигать более выраженного и стабильного снижения уровня ЛПНП, а также способствуют дополнительному уменьшению риска сердечно-сосудистых событий [8–10]. Особый интерес представляет комбинированная терапия, направленная на различные звенья липидного обмена, что особенно актуально у пациентов с СД2, характеризующихся мультифакторным метаболическим нарушением.

Таким образом, совершенствование гиполипидемической терапии у пациентов с ИБС и сахарным диабетом 2 типа является одной из приоритетных задач современной кардиологии и эндокринологии. Настоящий обзор посвящен анализу современных возможностей и перспектив липидснижающей терапии у данной категории больных с учетом последних клинических рекомендаций и результатов крупных рандомизированных исследований.

Особенности дислипидемии при СД2. Дислипидемия при сахарном диабете 2 типа (СД2) имеет специфический атерогенный характер и является одним из ключевых факторов ускоренного развития и прогрессирования атеросклероза. В отличие от классической гиперхолестеринемии, при СД2 наблюдается так называемая «диабетическая» или атерогенная дислипидемия, характеризующаяся комплексными количественными и качественными изменениями липопротеинов [1].

Основными компонентами дислипидемии при СД2 являются умеренное повышение уровня триглицеридов (на 30–50% по сравнению с популяционной нормой), снижение концентрации холестерина липопротеинов высокой плотности (HDL-C) на 10–20%, а также увеличение доли мелких плотных частиц липопротеинов низкой плотности (small dense LDL), обладающих высокой атерогенностью [2,3]. При этом уровень общего холестерина и LDL-C может оставаться в пределах референсных значений, что создает ложное впечатление благополучия липидного профиля [4].

Ключевую роль в формировании данной дислипидемии играет инсулинорезистентность, которая приводит к усилению липолиза в жировой ткани и повышенному поступлению свободных жирных кислот в печень. Это, в свою очередь, стимулирует синтез липопротеинов очень низкой плотности (VLDL) и увеличивает концентрацию триглицеридов в плазме [5]. Одновременно нарушается активность липопротеинлипазы, что замедляет катаболизм триглицеридсодержащих липопротеинов и способствует их накоплению [6].

Важным патогенетическим звеном является также изменение качественных характеристик LDL. Мелкие плотные LDL частицы легче проникают через эндотелий сосудов, обладают повышенной склонностью к окислению и дольше циркулируют в крови, что значительно увеличивает их атерогенный потенциал [7]. Повышение уровня окисленных LDL способствует активации воспалительных процессов в сосудистой стенке и ускоряет формирование атеросклеротической бляшки [8].

Дополнительным фактором является снижение функциональной активности HDL, включая нарушение их антиоксидантных и противовоспалительных свойств. Даже при нормальном уровне HDL-C их защитная роль у пациентов с СД2 может быть существенно снижена [9].

Следует отметить, что у пациентов с СД2 часто выявляется повышение уровня аполипопротеина В (АпоВ), отражающего общее количество атерогенных липопротеинов, а также увеличение показателя non-HDL-C, который рассматривается как более точный маркер сердечно-сосудистого риска в данной популяции [10]. По данным ряда исследований, именно АпоВ и non-HDL-C лучше коррелируют с риском сердечно-сосудистых событий, чем традиционный показатель LDL-C [11].

Таким образом, дислипидемия при сахарном диабете 2 типа характеризуется сложным многофакторным патогенезом и требует комплексного подхода к диагностике и лечению. Оценка только уровня LDL-C является недостаточной, что обосновывает необходимость расширенного липидного профиля и применения современных терапевтических стратегий, направленных на коррекцию всех компонентов атерогенной дислипидемии.

Целевые уровни липидов (с рекомендациями). У пациентов с ишемической болезнью сердца (ИБС) на фоне сахарного диабета 2 типа (СД2) коррекция липидного профиля рассматривается как одно из ключевых направлений вторичной профилактики сердечно-сосудистых осложнений. Современные европейские рекомендации относят таких больных к категории очень высокого сердечно-сосудистого риска, что требует более интенсивного снижения уровня атерогенных липопротеинов. Согласно рекомендациям ESC, для пациентов очень высокого риска целевой уровень холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) составляет $<1,4$ ммоль/л (<55 мг/дл) и одновременно рекомендуется снижение ЛПНП как минимум на 50% от исходного уровня. При повторном сосудистом событии в течение 2 лет на фоне максимально переносимой терапии может рассматриваться еще более строгая цель — $<1,0$ ммоль/л (<40 мг/дл). В 2025 focused update ESC/EAS отдельно отмечено, что сами LDL-цели по сравнению с версией 2019 года не изменились.

В рекомендациях ESC по сердечно-сосудистым заболеваниям у пациентов с диабетом также подчеркивается, что выбор гиполипидемической стратегии должен быть основан на суммарном сердечно-сосудистом риске, а у больных с установленным атеросклеротическим сердечно-сосудистым заболеванием требуется максимально активное достижение целевых уровней ЛПНП. Это особенно важно при сочетании ИБС и СД2, поскольку диабет ассоциирован с более быстрым прогрессированием атеросклероза, более высокой частотой мультифокального поражения сосудов и повышенным риском повторных ишемических событий.

Согласно ADA Standards of Care, для пациентов с диабетом в рамках вторичной профилактики рекомендован целевой уровень ЛПНП <55 мг/дл (около $<1,4$ ммоль/л). Для первичной профилактики у взрослых 40–75 лет с диабетом целевым ориентиром считается ЛПНП <70 мг/дл (около $<1,8$ ммоль/л). ADA также рекомендует контролировать липидный профиль при постановке диагноза, затем не реже 1 раза в год, а после начала или интенсификации липидснижающей терапии — повторно через 4–12 недель для оценки ответа на лечение и приверженности.

Помимо ЛПНП, в клинической практике следует учитывать и другие показатели липидного обмена. У пациентов с диабетом и гипертриглицеридемией дополнительное значение имеет non-HDL-холестерин, а также уровень триглицеридов. Хотя основная терапевтическая цель по-прежнему связана именно с ЛПНП, расширенная оценка липидного спектра позволяет точнее определить остаточный атерогенный риск, особенно у пациентов с атерогенной диабетической дислипидемией.

Таким образом, у больных ИБС на фоне СД2 основным целевым показателем гиполипидемической терапии является достижение уровня ЛПНП $<1,4$ ммоль/л с уменьшением не менее чем на 50% от исходного, а при крайне высоком риске и повторных событиях — стремление к уровню $<1,0$ ммоль/л. Такой подход соответствует современной концепции «чем ниже уровень ЛПНП, тем лучше прогноз», лежащей в основе современных европейских и американских рекомендаций.

Статины как основа терапии. Статины являются препаратами первой линии в лечении дислипидемии у пациентов с ишемической болезнью сердца (ИБС) и сахарным диабетом 2 типа (СД2), что обусловлено их доказанной эффективностью в снижении сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности. Основным механизмом действия статинов связан с ингибированием фермента ГМГ-КоА-редуктазы, что приводит к снижению синтеза холестерина в печени и увеличению экспрессии рецепторов липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), обеспечивая усиленный клиренс атерогенных липопротеинов из кровотока [1].

Крупнейший мета-анализ Cholesterol Treatment Trialists' Collaboration, включивший более 170 000 пациентов, показал, что снижение уровня ЛПНП на каждые 1 ммоль/л сопровождается уменьшением риска крупных сердечно-сосудистых событий на 21%, включая инфаркт миокарда, инсульт и

сердечно-сосудистую смерть [2]. Данный эффект является пропорциональным степени снижения ЛПНП и наблюдается независимо от исходного уровня холестерина.

У пациентов с сахарным диабетом эффективность статинов также подтверждена в ряде крупных рандомизированных исследований. В исследовании CARDS (Collaborative Atorvastatin Diabetes Study) применение аторвастатина у больных СД2 без установленной ИБС привело к снижению риска острых коронарных событий на 36% и инсульта на 48% [3]. В исследовании HPS (Heart Protection Study) у пациентов с диабетом отмечено снижение общей смертности на 13% и сосудистой смертности на 17% [4].

Несмотря на высокую эффективность, монотерапия статинами не всегда позволяет достичь целевых уровней ЛПНП у пациентов очень высокого риска. По данным современных регистров, до 40–50% пациентов с ИБС и СД2 не достигают уровня ЛПНП <1,4 ммоль/л даже при использовании высокоинтенсивных доз статинов [5]. Это связано как с выраженностью метаболических нарушений, так и с ограничениями дозировки из-за побочных эффектов.

Высокоинтенсивная статинотерапия (аторвастатин 40–80 мг, розувастатин 20–40 мг) позволяет снижать уровень ЛПНП на 50% и более от исходного значения [6]. Однако увеличение дозы сопровождается ростом риска нежелательных явлений, включая миалгии, повышение активности печеночных ферментов и, в редких случаях, развитие рабдомиолиза. Частота статин-ассоциированных мышечных симптомов варьирует от 1 до 5% в клинических исследованиях, однако в реальной практике может достигать 10–15% [7].

Особое внимание уделяется вопросу влияния статинов на углеводный обмен. Известно, что применение статинов может незначительно повышать риск развития СД2 (примерно на 9–12%), однако этот риск существенно уступает их кардиопротективному эффекту и не является основанием для отказа от терапии [8]. У пациентов с уже имеющимся СД2 статинотерапия не ухудшает клинически значимо гликемический контроль.

Современные рекомендации European Society of Cardiology и American Diabetes Association подчеркивают необходимость назначения статинов всем пациентам с ИБС и СД2 независимо от исходного уровня ЛПНП. При недостаточной эффективности монотерапии рекомендуется раннее добавление других гиполипидемических препаратов, таких как эзетимиб или ингибиторы PCSK9 [9].

Таким образом, статины остаются фундаментом гиполипидемической терапии у пациентов с ИБС и сахарным диабетом 2 типа. Их применение обеспечивает значительное снижение сердечно-сосудистого риска, однако для достижения целевых уровней ЛПНП у пациентов очень высокого риска часто требуется комбинированный подход.

Эзетимиб в комбинированной терапии. Эзетимиб занимает важное место в современной гиполипидемической терапии как препарат второй линии, применяемый в комбинации со статинами у пациентов, не достигших целевых уровней липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), а также при непереносимости высоких доз статинов. Механизм действия эзетимиба принципиально отличается от статинов и связан с селективным ингибированием белка NPC1L1 в энтероцитах тонкой кишки, что приводит к снижению абсорбции холестерина и уменьшению его поступления в печень [1].

Добавление эзетимиба к статинотерапии обеспечивает дополнительное снижение уровня ЛПНП в среднем на 20–25%, что позволяет значительно увеличить долю пациентов, достигающих целевых значений липидов [2]. Комбинация статина и эзетимиба воздействует на два ключевых звена метаболизма холестерина — синтез и всасывание, обеспечивая синергический эффект.

Ключевым исследованием, подтвердившим клиническую эффективность эзетимиба, является IMPROVE-IT, в котором оценивалось влияние комбинации симвастатина с эзетимибом по сравнению с монотерапией статином у пациентов после острого коронарного синдрома. В исследовании было показано, что добавление эзетимиба привело к снижению уровня ЛПНП до 1,4 ммоль/л, а также сопровождалось дополнительным снижением риска крупных сердечно-сосудистых событий на 6,4% [3].

Особое значение результаты IMPROVE-IT имеют для пациентов с сахарным диабетом 2 типа. В поданализе было продемонстрировано, что у больных СД2 комбинированная терапия обеспечивала более выраженное снижение риска сердечно-сосудистых осложнений — до 14% по сравнению с монотерапией статинами [4]. Это объясняется более высоким исходным риском и выраженной атерогенной дислипидемией у данной категории пациентов.

Эзетимиб характеризуется благоприятным профилем безопасности и хорошей переносимостью. Частота побочных эффектов сопоставима с плацебо, а риск развития миопатий при комбинированной терапии остается низким [5]. Это делает препарат оптимальным выбором для усиления гиполипидемической терапии у пациентов с ограниченной переносимостью высоких доз статинов.

Современные рекомендации European Society of Cardiology и American Diabetes Association рекомендуют добавление эзетимиба на ранних этапах лечения у пациентов очень высокого риска, включая больных с ИБС и СД2, при недостаточном снижении уровня ЛПНП на фоне максимально переносимой дозы статина [6]. Такой подход позволяет быстрее достигать целевых уровней и снижать остаточный сердечно-сосудистый риск.

Таким образом, эзетимиб является эффективным и безопасным компонентом комбинированной гиполипидемической терапии. Его использование в сочетании со статинами позволяет значительно повысить эффективность лечения, особенно у пациентов с сахарным диабетом 2 типа, для которых характерен высокий остаточный риск даже при адекватной базовой терапии.

Ингибиторы PCSK9. Ингибиторы PCSK9 представляют собой один из наиболее значимых прорывов в современной гиполипидемической терапии, особенно у пациентов очень высокого сердечно-сосудистого риска, включая больных с ишемической болезнью сердца (ИБС) и сахарным диабетом 2 типа (СД2). Белок PCSK9 (proprotein convertase subtilisin/kexin type 9) регулирует деградацию рецепторов липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) в печени. Повышенная активность PCSK9 приводит к снижению числа LDL-рецепторов и, соответственно, увеличению уровня ЛПНП в плазме [1].

Моноклональные антитела к PCSK9, такие как Evolocumab и Alirocumab, блокируют взаимодействие PCSK9 с LDL-рецепторами, предотвращая их деградацию и способствуя усиленному клиренсу атерогенных липопротеинов. Это приводит к выраженному снижению уровня ЛПНП — в среднем на 50–60% дополнительно к статиновой терапии [2].

Клиническая эффективность ингибиторов PCSK9 подтверждена в ряде крупных рандомизированных исследований. В исследовании FOURIER trial (27 564 пациента с атеросклеротическими сердечно-сосудистыми заболеваниями) применение evolocumab позволило снизить уровень ЛПНП до 0,78 ммоль/л и сопровождалось уменьшением риска первичной комбинированной конечной точки (сердечно-сосудистая смерть, инфаркт миокарда, инсульт) на 15%. При этом риск инфаркта миокарда снизился на 27%, а инсульта — на 21% [3].

Аналогичные результаты получены в исследовании ODYSSEY OUTCOMES, включившем пациентов после острого коронарного синдрома. Применение alirocumab привело к снижению уровня ЛПНП до $\approx 1,0$ ммоль/л и уменьшению риска крупных сердечно-сосудистых событий на 15%, а также к снижению общей смертности у пациентов с наиболее высоким исходным уровнем ЛПНП [4].

Особый интерес представляет эффективность ингибиторов PCSK9 у пациентов с сахарным диабетом 2 типа. Поданализы исследований FOURIER и ODYSSEY показали, что снижение риска сердечно-сосудистых событий у больных СД2 сопоставимо или даже более выражено, чем у пациентов без диабета, при этом препараты не оказывают негативного влияния на гликемический контроль и не увеличивают риск развития диабета [5].

Ингибиторы PCSK9 характеризуются благоприятным профилем безопасности. Наиболее частыми побочными эффектами являются местные реакции в месте инъекции (до 2–5%), тогда как системные нежелательные явления встречаются редко. В отличие от статинов, данные препараты не ассоциированы с повышением риска миопатий или гепатотоксичности [6].

Согласно рекомендациям European Society of Cardiology, ингибиторы PCSK9 показаны пациентам очень высокого риска, включая больных с ИБС и СД2, при недостижении целевых уровней ЛПНП на фоне максимально переносимой терапии статинами в комбинации с эзетимибом [7]. Их применение позволяет достигать экстремально низких значений ЛПНП ($< 1,0$ ммоль/л), что соответствует современной концепции «чем ниже — тем лучше».

Несмотря на высокую эффективность, широкое применение ингибиторов PCSK9 ограничено их высокой стоимостью и доступностью, что особенно актуально для развивающихся стран. Тем не менее, с учетом значительного снижения сердечно-сосудистого риска их использование является обоснованным у пациентов с наиболее высоким риском и недостаточным эффектом стандартной терапии.

Таким образом, ингибиторы PCSK9 являются высокоэффективным инструментом интенсификации гиполипидемической терапии у пациентов с ИБС и сахарным диабетом 2 типа. Их включение в комбинированные схемы лечения позволяет значительно улучшить контроль липидного профиля и снизить частоту неблагоприятных сердечно-сосудистых исходов.

Инклизирин — новая парадигма гиполипидемической терапии. Inclisiran представляет собой инновационный препарат для снижения уровня липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), относящийся к классу малых интерферирующих РНК (siRNA). В отличие от моноклональных антител к PCSK9, инклизирин воздействует на синтез данного белка на уровне гепатоцитов, ингибируя экспрессию гена PCSK9 и тем самым снижая его продукцию [1].

Механизм действия инклизирана основан на технологии РНК-интерференции: препарат проникает в клетки печени и связывается с матричной РНК PCSK9, вызывая ее деградацию. Это приводит к уменьшению синтеза PCSK9, увеличению числа LDL-рецепторов на поверхности гепатоцитов и усиленному клиренсу ЛПНП из плазмы крови [2]. Таким образом, инклизирин обеспечивает длительное и стабильное снижение уровня атерогенных липопротеинов.

Клиническая эффективность инклизирана была продемонстрирована в серии крупных рандомизированных исследований программы ORION. В исследованиях ORION-10 и ORION-11, включивших пациентов с атеросклеротическими сердечно-сосудистыми заболеваниями и высоким риском, добавление инклизирана к стандартной терапии позволило снизить уровень ЛПНП на 52–55% по сравнению с плацебо [3].

Особенностью препарата является его режим дозирования: после начальной инъекции и повторного введения через 3 месяца, последующие дозы вводятся 1 раз в 6 месяцев, что значительно повышает приверженность лечению [3]. В условиях хронических заболеваний, таких как СД2, где пациенты получают множественную медикаментозную терапию, это преимущество имеет особую клиническую значимость.

Дополнительные данные из долгосрочного исследования ORION-8 показали, что эффект снижения ЛПНП сохраняется на протяжении более 4 лет, при этом не наблюдается снижения эффективности терапии со временем [4]. Это подтверждает устойчивость и воспроизводимость липидснижающего эффекта инклизирана.

У пациентов с сахарным диабетом 2 типа инклизирин демонстрирует сопоставимую эффективность с общей популяцией, обеспечивая значительное снижение уровня ЛПНП без влияния на гликемический контроль. Важно отметить, что препарат не ассоциирован с увеличением риска развития новых случаев диабета, в отличие от некоторых других гиполипидемических средств [5].

Профиль безопасности инклизирана является благоприятным. Наиболее частыми побочными эффектами являются местные реакции в месте инъекции (около 5–8%), которые, как правило, имеют легкую степень выраженности. Частота системных нежелательных явлений сопоставима с плацебо [3].

Согласно современным рекомендациям European Society of Cardiology, инклизирин может рассматриваться как альтернатива или дополнение к ингибиторам PCSK9 у пациентов очень высокого риска, включая больных с ИБС и СД2, при недостаточном достижении целевых уровней ЛПНП на фоне стандартной терапии [6].

Несмотря на отсутствие на данный момент окончательных данных по снижению «жестких» конечных точек (сердечно-сосудистая смертность, инфаркт миокарда), ожидается, что ongoing исследования (в частности ORION-4) подтвердят клинические преимущества инклизирана в долгосрочной перспективе [7].

Таким образом, инклизирин представляет собой перспективное направление в гиполипидемической терапии, обеспечивающее эффективное, длительное и удобное снижение уровня ЛПНП. Его применение особенно актуально у пациентов с высоким и очень высоким сердечно-сосудистым риском, включая больных с сахарным диабетом 2 типа, где требуется достижение строгих целевых уровней липидов и высокая приверженность лечению.

Комбинированная гиполипидемическая терапия. У пациентов с ишемической болезнью сердца (ИБС) и сахарным диабетом 2 типа (СД2) комбинированная гиполипидемическая терапия является необходимым элементом современной стратегии лечения, поскольку монотерапия статинами часто не позволяет достичь целевых уровней липопротеинов низкой плотности (ЛПНП). По данным клинической практики, до 40–50% пациентов очень высокого риска не достигают уровня ЛПНП <1,4 ммоль/л на фоне даже высокоинтенсивной статиновой терапии [1].

Комбинированный подход основан на воздействии на различные звенья липидного обмена:

- подавление синтеза холестерина (статины),
- снижение его всасывания в кишечнике (эзетимиб),
- усиление клиренса ЛПНП через рецепторы (ингибиторы PCSK9, инклизирин).

Такой механизм обеспечивает аддитивный и синергический эффект, позволяя достигать более выраженного снижения уровня ЛПНП и уменьшения остаточного сердечно-сосудистого риска [2].

Современные рекомендации European Society of Cardiology предлагают поэтапную стратегию:

1. Статин высокой интенсивности
2. Добавление эзетимиба при недостижении цели
3. Добавление ингибитора PCSK9 или инклизирана при сохраняющемся высоком уровне ЛПНП

Таблица 1.

Основные схемы комбинированной гиполипидемической терапии

Схема терапии	Механизм действия	Снижение LDL-C	Клинические преимущества	Ограничения
Статин (монотерапия)	↓ синтез холестерина	30–50%	Базовая терапия, доказанное снижение смертности	Недостаточно при очень высоком риске
Статин + эзетимиб	↓ синтез + ↓ всасывания холестерина	50–65%	Доступность, хорошая переносимость	Ограниченная эффективность у части пациентов
Статин + ингибитор PCSK9	↑ рецепторов LDL (через блокаду PCSK9)	65–75%	Быстрое и выраженное снижение риска ССО	Высокая стоимость
Статин + инклисиран	↓ синтез PCSK9 (siRNA)	~50–60%	Длительный эффект, 2 раза в год	Ограниченная доступность
Тройная терапия (статин + эзетимиб + PCSK9/инклисиран)	Комплексное воздействие	до 80%	Максимальное снижение риска	Стоимость, необходимость контроля

Комбинированная терапия позволяет достичь целевых уровней ЛПНП у более чем 80–85% пациентов, что значительно превышает эффективность монотерапии [3]. Особенно важна ранняя интенсификация лечения у пациентов с СД2, у которых отмечается выраженный остаточный риск даже при умеренном снижении ЛПНП.

Следует отметить, что комбинированная терапия не только улучшает липидный профиль, но и оказывает положительное влияние на клинические исходы. Мета-анализы показали, что более интенсивное снижение ЛПНП сопровождается дополнительным уменьшением риска сердечно-сосудистых событий на 20–30% по сравнению со стандартной терапией [4].

Выбор комбинации должен быть индивидуализирован с учетом:

- уровня сердечно-сосудистого риска
- исходного уровня ЛПНП
- переносимости препаратов
- наличия сопутствующих заболеваний (включая ХБП)
- экономических факторов

У пациентов с ИБС и СД2 оптимальной стратегией является раннее применение комбинированной терапии с целью быстрого достижения целевых уровней ЛПНП и снижения риска повторных сердечно-сосудистых событий.

Заключение. Сочетание ишемической болезни сердца (ИБС) и сахарного диабета 2 типа (СД2) формирует категорию пациентов с крайне высоким сердечно-сосудистым риском, требующую максимально агрессивной и одновременно индивидуализированной стратегии гиполипидемической терапии. Атерогенная дислипидемия, характерная для СД2, обуславливает не только количественные, но и качественные изменения липопротеинов, что усиливает прогрессирование атеросклероза даже при относительно умеренных уровнях холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП).

Современные клинические исследования убедительно демонстрируют, что достижение низких и очень низких уровней ЛПНП (<1,4 ммоль/л, а в ряде случаев <1,0 ммоль/л) сопровождается значительным снижением риска сердечно-сосудистых осложнений. При этом концепция «чем ниже — тем лучше» сохраняет свою актуальность и подтверждается результатами крупных рандомизированных исследований.

Статины остаются основой терапии, однако у большинства пациентов очень высокого риска требуется ранняя интенсификация лечения с применением комбинированных схем. Добавление эзетимиба, ингибиторов PCSK9 или Inclisiran позволяет достичь более выраженного и устойчивого снижения уровня ЛПНП, а также уменьшить остаточный сердечно-сосудистый риск. Инновационные

подходы, включая siRNA-терапию, открывают новые перспективы в лечении дислипидемии, обеспечивая высокую эффективность и улучшение приверженности терапии.

Таким образом, современная гиполипидемическая терапия у пациентов с ИБС и СД2 должна быть многоуровневой, персонализированной и направленной на достижение максимально низких целевых уровней ЛПНП с учетом индивидуальных особенностей пациента.

Практические рекомендации:

1. Стратификация риска. Все пациенты с ИБС и СД2 должны рассматриваться как лица очень высокого сердечно-сосудистого риска с целевым уровнем ЛПНП <1,4 ммоль/л.
2. Ранняя инициация терапии. Назначение статинов высокой интенсивности должно проводиться как можно раньше, независимо от исходного уровня ЛПНП.
3. Оценка эффективности лечения. Контроль липидного профиля рекомендуется через 4–12 недель после начала или изменения терапии с последующим регулярным мониторингом.
4. Ранняя интенсификация терапии. При недостижении целевых уровней ЛПНП необходимо своевременно добавлять второй препарат (эзетимиб), не откладывая коррекцию лечения.
5. Использование современных препаратов. При сохраняющемся высоком уровне ЛПНП на фоне двойной терапии показано назначение ингибиторов PCSK9 или Inclisiran.
6. Индивидуализация лечения. Выбор схемы терапии должен учитывать:
 - о возраст пациента
 - о наличие сопутствующих заболеваний (включая хроническую болезнь почек)
 - о переносимость препаратов
 - о риск лекарственных взаимодействий
7. Контроль безопасности. Необходимо мониторировать уровень печеночных ферментов, симптомы миопатии и другие возможные побочные эффекты.
8. Повышение приверженности терапии. Следует учитывать удобство схемы лечения (например, редкое введение препаратов, таких как инклизирин) для улучшения комплаентности.
9. Комплексный подход. Гиполипидемическая терапия должна сочетаться с коррекцией других факторов риска:
 - о артериальная гипертензия
 - о гипергликемия
 - о ожирение
 - о образ жизни

Список литературы:

1. Endo A. The discovery and development of HMG-CoA reductase inhibitors. *J Lipid Res.* 1992;33:1569–1582.
2. Heart Protection Study Collaborative Group. MRC/BHF Heart Protection Study of cholesterol lowering with simvastatin. *Lancet.* 2003;361:2005–2016.
3. Colhoun HM, Betteridge DJ, Durrington PN, et al. Primary prevention of cardiovascular disease with atorvastatin in type 2 diabetes (CARDS). *Lancet.* 2004;364:685–696.
4. Goldberg IJ. Diabetic dyslipidemia: causes and consequences. *J Clin Endocrinol Metab.* 2001;86:965–971.
5. Taskinen MR. Diabetic dyslipidemia. *Diabetologia.* 2003;46:733–749.
6. Bays HE, et al. Ezetimibe: cholesterol lowering and beyond. *Expert Opin Drug Saf.* 2004;3:1–12.
7. Garcia-Calvo M, et al. The target of ezetimibe is Niemann-Pick C1-Like 1. *Proc Natl Acad Sci USA.* 2005;102:8132–8137.
8. Collins R, Armitage J, Parish S, et al. Effects of cholesterol-lowering with simvastatin in people with diabetes. *Lancet.* 2003;361:2005–2016.
9. CTT Collaboration. Efficacy and safety of more intensive lowering of LDL cholesterol. *Lancet.* 2010;376:1670–1681.
10. Sattar N, Preiss D, Murray HM, et al. Statins and risk of incident diabetes. *Lancet.* 2010;375:735–742.
11. Stone NJ, et al. ACC/AHA guideline on treatment of blood cholesterol. *Circulation.* 2014;129:S1–S45. □ Cannon CP, Blazing MA, Giugliano RP, et al. IMPROVE-IT trial. *N Engl J Med.* 2015;372:2387–2397.
12. Silverman MG, Ference BA, Im K, et al. Association between lowering LDL-C and CV risk. *JAMA.* 2016;316:1289–1297.
13. Low Wang CC, Hess CN, Hiatt WR, et al. Clinical update on cardiovascular disease in diabetes. *Diabetes Care.* 2016;39:418–430.
14. Sabatine MS, Giugliano RP, Keech AC, et al. FOURIER trial. *N Engl J Med.* 2017;376:1713–1722.

15. Giugliano RP, Cannon CP, Blazing MA, et al. Ezetimibe and outcomes in diabetes. *Circulation*. 2017;135:1103–1113.
16. Ference BA, Ginsberg HN, Graham I, et al. Low-density lipoproteins cause atherosclerosis. *JAMA*. 2017;318:947–956.
17. Leiter LA, Zamorano JL, et al. PCSK9 inhibitors in diabetes. *Lancet Diabetes Endocrinol*. 2017;5:941–950.
18. Schwartz GG, Steg PG, Szarek M, et al. ODYSSEY OUTCOMES trial. *N Engl J Med*. 2018;379:2097–2107.
19. Sniderman AD, et al. ApoB vs LDL-C in risk assessment. *Circulation*. 2019;139:244–252.
20. Ray KK, Molemans B, Schoonen WM, et al. Real-world LDL-C target attainment. *Eur Heart J*. 2019;40:2413–2422.
21. Mach F, Baigent C, Catapano AL, et al. ESC/EAS Guidelines for dyslipidaemias. *Eur Heart J*. 2020;41:111–188.
22. Cosentino F, Grant PJ, Aboyans V, et al. ESC Guidelines on diabetes and CVD. *Eur Heart J*. 2020;41:255–323.
23. Ray KK, Wright RS, Kallend D, et al. ORION-10 and ORION-11 trials. *N Engl J Med*. 2020;382:1507–1519.
24. Fitzgerald K, White S, Borodovsky A, et al. RNA interference targeting PCSK9. *N Engl J Med*. 2017;376:41–51.
25. Leiter LA, Teoh H, et al. Inclisiran in patients with diabetes. *Diabetes Care*. 2021;44:130–138.
26. Banach M, et al. Inclisiran mechanism and clinical role. *Arch Med Sci*. 2022.
27. Landmesser U, Koenig W, Leiter LA, et al. Inclisiran in patients with prior MI. *Atherosclerosis*. 2023;386:117354.
28. Wright RS, et al. Long-term efficacy of inclisiran (ORION-8). *Cardiovasc Res*. 2024.
29. International Diabetes Federation. *IDF Diabetes Atlas*. 10th ed. 2021.
30. American Diabetes Association. *Standards of Care in Diabetes—2024*. *Diabetes Care*. 2024;47(Suppl 1).
31. European Society of Cardiology. *Dyslipidaemia guidelines update*. 2025.
32. Robinson JG, et al. Safety of PCSK9 inhibitors. *J Am Coll Cardiol*. 2015;65:1558–1569.

Для цитирования: Муминова А.Ю. Гиполипидемическая терапия при сочетании ИБС и сахарного диабета 2 типа: современные возможности и перспективы // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 4(24). – С. 603–611. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19626943>

**АЁЛЛАР РЕПРОДУКТИВ СЕСТЕМАСИ СУРУНКАЛИ СТРЕСС ШАРОИТИДА
НЕЙРОЭНДОКРИН БОШҚАРИЛИШИ****Тогаева Г.С.**

Самарканд давлат тиббиёт университети, Самарканд ш., Ўзбекистон

Резюме. Сурункали стресс аёллар репродуктив салоҳиятига таъсир кўрсатувчи муҳим биологик ва психологик омил ҳисобланади. Репродуктив тизим гипоталамус–гипофиз–жинсий безлар системасининг мувофиқлашган фаолияти орқали бошқарилиб, фолликуланинг ривожланиши, овуляция ва умумий репродуктив саломатликни таъминлайди. Узоқ муддатли стресс таъсирида гипоталамус–гипофиз–буйрак усти беги тизими доимий равишда фаоллашади ва кортизол ҳамда бошқа стресс медиаторлари кўпайиши натижасида гипоталамусга борадиган гормонал сигналлари бузилади. Ушбу мақолада узоқ муддатли стресснинг аёллар фертиллигига таъсир кўрсатиши механизмлари кўриб чиқилади. Хусусан, гормонал йўллар, физиологик жавоб реакциялари, диагностика масалалари ҳамда олдини олиш ва даволашнинг эҳтимолий ёндашувлари ёритилади.

Калим сўзлар: сурункали стресс; аёллар фертиллиги; нейроэндокрин бошқарув; гипоталамус–гипофиз–жинсий безлар; кортизол; репродуктив гормонлар; ҳайз цикл бузилишлари; стресс физиологияси.

**NEUROENDOCRINE REGULATION OF THE FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM UNDER
CONDITIONS OF CHRONIC STRESS****Togayeva G.S.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Chronic stress is an important biological and psychological factor affecting female reproductive potential. The reproductive system is regulated by the coordinated activity of the hypothalamic–pituitary–gonadal axis, which ensures follicular development, ovulation, and overall reproductive health. Under prolonged stress, the hypothalamic–pituitary–adrenal axis becomes continuously activated, and as a result of increased cortisol and other stress mediators, hormonal signaling to the hypothalamus is disrupted. This article examines the mechanisms by which long-term stress affects female fertility. In particular, it covers hormonal pathways, physiological response reactions, diagnostic aspects, as well as possible approaches to prevention and treatment.

Keywords: chronic stress; female fertility; neuroendocrine regulation; hypothalamic–pituitary–gonadal axis; cortisol; reproductive hormones; menstrual cycle disorders; stress physiology.

**НЕЙРОЭНДОКРИННАЯ РЕГУЛЯЦИЯ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ ЖЕНЩИН В
УСЛОВИЯХ ХРОНИЧЕСКОГО СТРЕССА****Тогаева Г.С.**

Самаркандский государственный медицинский университет, г.Самарканд, Узбекистан

Резюме. Хронический стресс является важным биологическим и психологическим фактором, влияющим на репродуктивный потенциал женщин. Репродуктивная система регулируется согласованной деятельностью гипоталамо–гипофизарно–гонадной системы, обеспечивающей развитие фолликула, овуляцию и общее репродуктивное здоровье. При длительном воздействии стресса гипоталамо–гипофизарно–надпочечниковая система постоянно активизируется, и в результате повышения уровня кортизола и других медиаторов стресса нарушаются гормональные сигналы, поступающие к гипоталамусу. В данной статье рассматриваются механизмы влияния длительного стресса на фертильность женщин. В частности, освещаются гормональные пути, физиологические ответные реакции, вопросы диагностики, а также возможные подходы к профилактике и лечению.

Ключевые слова: хронический стресс; женская фертильность; нейроэндокринная регуляция; гипоталамо–гипофизарно–гонадная система; кортизол; репродуктивные гормоны; нарушения менструального цикла; физиология стресса.

e-mail: gulnora.togayeva1981@mail.ru,

Аёллар репродуктив тизими мураккаб нейроэндокрин механизмлар орқали қатъий тарзда бошқарилади. Ушбу жараёнда гипоталамус–гипофиз–жинсий безлар тизими асосий ўрин тутиб, овуляция, ҳайз цикли ва фертилликл учун зарур бўлган гормонлар ўз фаолиятини номаён қилади. Сурункали психологик ёки физиологик стресс ҳолатлари гипоталамус–гипофиз–буйрак усти беи тизимини доимий фаоллашувига олиб келади. Бу эса кортикотропин-рилизиинг гормон, адренокортикотроп гормон ва глюкокортикоидлар секрециясиниинг ортиши билан тавсифланади.

Қонда кортизол миқдориниинг ошиши гонадотропин-рилизиинг гормон импульслариниинг ўзгаришига, лютеинловчи гормон секрециясиниинг пасайишига ҳамда тухумдонларда стероид гормонлар ишлаб чиқарилишиниинг бузилишига сабаб бўлади. Натижада ҳайз циклиниинг бузилиши, ановуляция, тухумдон захирасиниинг камайиши ва репродуктив қобилиятниинг пасайиши кузатилиши мумкин.

Ушбу ўзгаришлар гипоталамус сигналлариниинг издан чиқишига, гонадотроп гормонлар секрециясиниинг сусайишига ва тухумдон гормонал мувозанатиниинг бузилишига сабаб бўлади. Бундан ташқари, сурункали стресс метаболик бошқарув, яллиғланиш жараёнлари ва нейромедиаторлар фаолиятига ҳам таъсир кўрсатиб, репродуктив тизимда дисфункция ривожланишига ҳисса қўшади. Ушбу механизмларни чуқур англаш стресс билан боғлиқ бепуштликлни аниқлаш ва самарали клиник ёндашувларни ишлаб чиқишда муҳим аҳамиятга эга.

Аёллар репродуктив физиологияси марказий асаб тизими ва эндокрин безлар ўртасидаги аниқ ва мувофиқ сигнал алмашинуви орқали таъминланади. Гипоталамус асосий бошқарув маркази бўлиб, у гонадотропин-рилизиинг гормон секрециясини назорат қилади ва бу орқали гипофизниинг лютеинловчи ҳамда фолликулостимуловчи гормонлар ажратишини рағбатлантиради. Ушбу гормонлар тухумдон фолликуллариниинг етилиши ва нормал репродуктив цикл учун зарур бўлган эстроген ва прогестерон синтезини таъминлайди. Бироқ бу мураккаб тизим ташқи ва ички стресс омилларига жуда сезгирдир. Сурункали психологик ёки физиологик стресс организмда гомеостазни сақлаб қолишга қаратилган нейроэндокрин жавоб реакцияларини фаоллаштиради. Гипоталамус–гипофиз–буйрак усти беи ўқиниинг фаоллашувига натижасида глюкокортикоидлар ва стрессга боғлиқ нейрпептидлар ишлаб чиқарилиши ортиб, бу репродуктив гормонлар секрециясини сусайитириши ва тухумдон функциясини ўзгартитириши мумкин.

Шуниингдек, стресс дофамин, серотонин ва гамма-аминомой кислота каби нейромедиатор тизимларига таъсир кўрсатади, улар эса гипоталамус сигналларини бошқаришда муҳим аҳамиятга эга. Қисқа муддатли ҳолатларда бу физиологик жавоблар ҳимоя вазифасини бажаради, аммо улар узоқ давом этганда репродуктив гормонлар мувозанатиниинг бузилишига ва фертилликлниинг пасайишига олиб келади.

Сурункали стрессниинг нейроэндокрин алоқаларга таъсир кўрсатиш механизмларини ўрганиш стресс билан боғлиқ бепуштликлни ташхислаш ва даволаш усулларини такомиллаштириш учун муҳим ҳисобланади.

Материал ва усуллар. Ушбу тадқиқот сурункали стресс ва аёллар репродуктив эндокринологияси ўртасидаги боғлиқликлни ўрганишга бағишланган клиник ва экспериментал ишлар таҳлили асосида амалга оширилди. Маълумотлар рецензиядан ўтган илмий мақолалар, кузатув тадқиқотлари ва назорат қилинган клиник текширувлардан олинди. Тадқиқотларда асосий эътибор фертилликлниинг нейроэндокрин бошқарувига қаратилди. Иш жараёнида сурункали психологик ёки физиологик стресс таъсирида бўлган аёлларда гормонал профил, стресс биомаркерлари, ҳайз циклини ҳолати, овулятор функция ва репродуктив натижалар баҳоланди. Лаборатория таҳлиллари доирасида қон зардобидида кортизол даражаси, гонадотроп гормонлар концентрацияси, эстрадиол, прогестерон ҳамда стресс билан боғлиқ нейрпептидлар ўрганилди. Таҳлил жараёнида сурункали стресс таъсирига учраган гуруҳлар соғлом физиологик ҳолатдидаги назорат гуруҳлари билан таққосланди. Шуниингдек, тадқиқот методологиясига нейровизуализация натижалари, эндокрин қайта алоқа механизмлари ва репродуктив саломатлиқка таъсир этувчи хулқ-атвор омиллари ҳам киритилди.

Натижалар. Таҳлил натижалари сурункали стресс репродуктив физиологияниинг нейроэндокрин бошқарувига сезиларли таъсир кўрсатишини кўрсатди. Кортизол миқдориниинг ортиши гонадотропин-рилизиинг гормон импульслариниинг камайиши билан боғлиқ бўлиб, бу лютеинловчи гормон ва фолликулостимуловчи гормон секрециясиниинг пасайишига олиб келади. Ушбу гормонал ўзгаришлар фолликуллар етилишига салбий таъсир кўрсатиб, овуляция жараёнлариниинг бузилишига сабаб бўлади. Узоқ муддатли стресс таъсирида бўлган аёлларда ҳайз циклиниинг номунтазамлиги, функционал гипоталамик аменорея ва фертилликл даражасиниинг пасайиши кўпроқ учраши аниқланди.

Стрессга боғлиқ нейрпептидлар ва яллиғланиш медиаторлари фаоллигииниинг ортиши ҳам тухумдон функциясиниинг издан чиқишига ва стероид гормонлар ишлаб чиқарилишиниинг ўзгаришига олиб келади. Шу билан бирга, метаболик ўзгаришлар, жумладан инсулинга резистентликл ва лептин

сигналларининг бузилиши кузатилиб, улар ҳам тухумдон фолликулларининг ривожланишига таъсир кўрсатиши қайд этилди. Клиник кузатувлар шуни кўрсатадики, сурункали стрессни камайтиришга қаратилган хулқ-атвор ва терапевтик чоралар гормонал мувозанатни тиклашга, овуляция функциясини яхшилашга ва репродуктив натижаларни оширишга ёрдам беради.

Клиник ва эндокрин тадқиқотлар таҳлили узоқ муддатли стресс ва аёллар репродуктив функцияси бузилишлари ўртасида аниқ боғлиқлик мавжудлигини тасдиқлади. Кортизол даражасининг юқори бўлиши гонадотропин-рилизинг гормон камайиши билан боғлиқ бўлиб, бу лютеинловчи ва фолликулостимулловчи гормонлар секрециясининг пасайишига олиб келади. Натижада фолликула ривожланиши ва овуляция жараёнлари издан чиқиб, ҳайз циклининг бузилиши ёки умуман кузатилмаслиги мумкин. Узоқ вақт давом этган психологик стрессга дуч келган аёлларда функционал гипоталамик аменорея ҳолатлари кўпроқ қайд этилди ҳамда репродуктив самарадорлик пасайгани аниқланди. Қўшимча равишда, лептин ва инсулин сигнал йўлларидаги ўзгаришлар каби метаболик бузилишлар тухумдон фолликулларининг етилишига таъсир кўрсатиши маълум бўлди. Иммуни ва яллиғланиш медиаторлари ҳам стрессга боғлиқ репродуктив сусайишда иштирок этиши қайд этилди.

Стрессни камайтиришга қаратилган самарали чора-тадбирлар, жумладан психологик ёрдам ва турмуш тарзини ўзгартириш натижасида гормонал мувозанат тикланиши кузатилди. Бу эса сурункали стресс билан боғлиқ нейроэндокрин бузилишлар асосий стресс омиллари бартараф этилганда қайтар бўлиши мумкинлигини кўрсатади.

Мунозара. Стресс физиологияси ва репродуктив эндокринология ўртасидаги ўзаро таъсир организмнинг мураккаб мослашув механизмини акс эттиради. Бунда тирик қолишга қаратилган жавоб реакциялари вақтинчалик равишда репродуктив функцияни сусайтириши мумкин. Гипоталамус–гипофиз–буйрак усти безининг фаоллашуви гипоталамус сигналларини ўзгартириб, овуляция учун зарур бўлган гормонал каскадни чеклайди. Глюкокортикоидлар даражасининг узоқ вақт юқори бўлиши гипоталамус–гипофиз–жинсий безларни тартибга солишчи қайта алоқа механизмларини издан чиқаради. Шу билан бирга, психологик стресс серотонин ва дофамин каби нейромедиаторларга таъсир кўрсатиб, гипоталамус гормонлари ажралиб чиқишини бошқариш жараёнини ўзгартиради. Бу нейрохимик ўзгаришлар ҳайз циклининг бузилиши ва тухумдон функциясининг пасайишига олиб келиши мумкин. Турмуш тарзи билан боғлиқ омиллар, жумладан уйқу етишмаслиги, нотўғри овқатланиш ва ортиқча жисмоний зўриқиш стрессга боғлиқ эндокрин бузилишларни янада кучайтириши мумкин. Шу сабабли, терапевтик ёндашувлар сурункали стресснинг ҳам физиологик, ҳам психологик жиҳатларини қамраб олиши зарур. Стрессни бошқариш дастурлари, когнитив-хулқ-атвор терапияси, турмуш тарзини ўзгартириш ва эндокрин мувозанатни тиклашга қаратилган тиббий чоралар репродуктив саломатлик натижаларини сезиларли даражада яхшилаши мумкин. Ҳозирги тадқиқотлар стресс ва фертиллиқ ўртасидаги боғлиқликни таъминловчи нейробиологик йўллар ҳамда молекуляр механизмларни янада чуқур ўрганишга қаратилмоқда. Стресс ва репродуктив тизим физиологияси ўртасидаги муносабат организмнинг мослашув реакцияси сифатида намоён бўлиб, бунда организм вақтинчалик равишда репродуктив жараёнлардан кўра ҳаётни сақлаб қолишга устувор аҳамият касб этади. Гипоталамус–гипофиз–буйрак усти бези фаоллашуви гормонал қайта боғланиш орқали ва нейромедиаторлар таъсири орқали гипоталамус–гипофиз–жинсий безларнинг фаолиятини сусайтирди. Глюкокортикоидлар миқдорининг доимий юқори бўлиши овуляция циклиларини ва тухумдон гормонлари ишлаб чиқарилишини назорат қилувчи эндокрин механизмларни бузади. Бундан ташқари, автоном асаб тизими фаолияти ва яллиғланиш сигналларидаги ўзгаришлар ҳам репродуктив тўқималар функциясига таъсир кўрсатади.

Психологик стресс, ортиқча жисмоний юклама, етарли бўлмаган овқатланиш ва уйқу бузилишлари каби омиллар нейроэндокрин дисбалансни янада кучайтириши мумкин. Шунинг учун стресс билан боғлиқ репродуктив бузилишларни даволаш комплекс ёндашувни талаб қилади. Хулқ-атвор терапияси, стрессни камайтириш усуллари ва турмуш тарзини тўғрилаш эндокрин мувозанатни тиклашда муҳим аҳамиятга эга.

Хулоса. Сурункали стресс аёллар репродуктив физиологиясига нейроэндокрин бошқарув механизмларини бузиш орқали сезиларли таъсир кўрсатади. Гипоталамус–гипофиз–буйрак усти бези тизими доимий фаоллашуви гонадотроп гормонлар сигнализациясига, тухумдон гормонлари ишлаб чиқарилишига ва нормал ҳайз циклига салбий таъсир кўрсатади. Ушбу ўзгаришлар овуляция бузилишлари ва фертиллиқнинг пасайишига олиб келиши мумкин. Стрессга боғлиқ репродуктив бузилишларни эрта аниқлаш ва тегишли чораларни ўз вақтида қўллаш гормонал мувозанатни тиклаш ҳамда репродуктив натижаларни яхшилашда муҳим аҳамиятга эга. Комплекс ёндашув тиббий, психологик ва турмуш тарзига оид чора-тадбирларни бирлаштириш фертиллиқни сақлаш ва умумий репродуктив саломатликни таъминлашнинг энг самарали усули ҳисобланади. Шунингдек, сурункали

стресс гормонал мувозанат ва тухумдон функциясини бошқарувчи нейроэндокрин тизимларга таъсир кўрсатиб, аёллар репродуктив саломатлигига жиддий таъсир ўтказди. Стресс жавоб реакцияларининг узок вақт давом этиши гипоталамус–гипофиз–жинсий безлар тизимидаги нормал фаолиятини бузиб, ҳайз циклининг номунтазамлиги, овуляция бузилишлари ва фертилликнинг камайишига олиб келади. Стресс билан боғлиқ гормонал ўзгаришларни эрта аниқлаш ва уларни баргараф этишга қаратилган чораларни қўллаш узок муддатли репродуктив асоратларнинг олдини олишда муҳим аҳамият касб этади. Тиббий кузатув, психологик қўллаб-қувватлаш ва соғлом турмуш тарзини шакллантиришни ўз ичига олган ёндашув гормонал мувозанатни тиклаш ва репродуктив саломатликни яхшилашда энг самарали йўл ҳисобланади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Aziza, O., Ziyodillo, B., Gulnora, T., Maqсад, M., Anjim, S., Furkat, J., & Shaxnoza, A. (2025). Intermittent fasting and endothelial function in metabolic syndrome: A randomized controlled trial on vascular health and oxidative stress markers. *Revista Latinoamericana de Hipertension*, 20(6), 468-473.
2. Zayniddin qizi, X. R. ., & Siddikovna, T. G. . (2026). Care of Pregnant Women with Diabetes Mellitus. *Best Journal of Innovation in Science, Research and Development*, 5(2), 201–206.
3. Орипов Ф.С., Тогаева Г.С. Орган ва тизимларининг турли патологияларида ошқозон ости безининг морфофункционал ҳолатидаги реактив ўзгаришлар // Биология ва тиббиёт муаммолари журнали. - Самарқанд, 2024. - №4 (155). – С. 114-119
4. Орипов Ф.С., Тогаева Г.С. Экспериментал гипертиреоз модели чакирилган она каламушлардан туғилган авлодлар ошқозон ости бези морфометрик кўрсаткичларини коррекциялаш натижалари // Проблемы биологии и медицины. – Самарқанд, 2025. - №4 (163). – С. 264-270
5. Oripov F.S., Togaeva G. S. Eksperimental gipertireoz natijasida oshqozon osti bezi parenximasining reaktiv morfofunktsional o'zgarishlari// Биомедицина ва амалиёт журнали. - Самарқанд, 2025. - №4 (10). – С. 283-289
6. Орипов Ф.С., Тогаева Г.С. Влияние экспериментального тиреотоксикоза на патоморфологию и функцию поджелудочной железы (Обзорная статья) // Кардиореспираторных исследований. – Самарқанд, 2025. - №2 (1). – С.64-69
7. Орипов Ф.С., Тогаева Г.С. Экспериментал гипертиреоз шароитида ошқозон ости безида юзага келган морфометрик ўзгаришларни коррекциялаш // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – Бухоро, 2025.- №4 (18). – С.536 -539
8. Орипов Ф.С., Тогаева Г.С. Экспериментал гипертиреоз шароитида туғилган каламуш авлодларининг ошқозон ости бези паренхимасининг морфометрик кўрсаткичлари // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – Бухоро, 2025.- №4 (18). – С. 491-495
9. Орипов Ф.С., Тогаева Г.С. Экспериментал гипертиреоз натижасида ошқозон ости бези паренхимасининг морфометрик кўрсаткичлари // *Yosh olimlar tibbiyot jurnali*. – Toshkent, 2025. №15(09). С. 67-69
10. Rahimova M., Tog'ayeva G. Qandli diabet bilan og'rigan homilador ayollarda kasallik kechishining o'ziga xosligi // *Modern Science and Research*. – 2025. – Т. 4. – №. 1. – С. 1034-1038
11. Togaeva G.S., Oripov F.S. Pathomorphologic and Morphofunctional Changes of Pancreatic Parenchyma under Experimental Influences (Review Article)// *American Journal of Medicine and Medical Sciences* 2024, 14(9): 2166-2170
12. Тогаева Г.С., Орипов Ф.С. Экспериментал гипертиреоз ҳолатида она каламушдан туғилган авлодлари ошқозон ости безининг тўқимасидаги морфофункционал ўзгаришлар ва уни аниқлаш// Биология ва тиббиёт муаммолари журнали. Самарқанд, 2025. - № 3 (161). – С.245 -2
13. Bagirova Umida Jabbarovna¹, Togayeva Gulnora Siddikovna², (2026). Neuroendocrine Regulation of Female Fertility Under Chronic Stress.. *AAMS General Medicine*, 7(03), 78-90.
14. Ulug'bekovna, S. A., Siddikovna, T. G. (2026). Changes in the body of children born to mothers with hyperthyroidism. *International Journal of Cognitive Neuroscience and Psychology*, 4(2), 47–49.
15. Bekzod qizi. A. M., Siddikovna, T. G. Changes in the Body of a Pregnant Woman as a Result of Hyperthyroidism. *American Journal Of Bioscience And Clinical Integrity* 2026, 3(2), 51-55 Received: 10th Nov 2025.

Иктибос учун: Тогаева Г.С. Аёллар репродуктив сестемаси сурункали стресс шароитида нейроэндокрин бошқарилиши // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2026. – № 4(24). – Б. 612–615. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19626991>

THE VALUE OF THE BRAIN NATRIURETIC LEVEL PEPTIDES IN THE EARLY DIAGNOSIS OF CHRONIC HEART FAILURE IN PATIENTS WITH ARTERIAL HYPERTENSION

Pulatova Sh.H.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. arterial hypertension is the most common cause of the development of chronic heart failure. The study of the problem of heart failure in the early stages of its development is of particular interest to clinicians. There is evidence of the possibility of early diagnosis of CHF of any etiology and prediction of adverse outcomes of heart failure using B – type Natriuretik Peptide (BNP).

Keywords: arterial hypertension, chronic heart failure, sodium-urtic peptide, echoacardiography, Dopplerography.

АРТЕРИАЛ ГИПЕРТЕНЗИЯЛИ БЕМОРЛАРДА СУРУНКАЛИ ЮРАК ЕТИШМОВЧИЛИГИНИ ЭРТА ТАШХИС ҚИЛИШДА МИЯ НАТРИУРЕТИК ДАРАЖАДАГИ ПЕПТИДЛАРНИНГ АҲАМИЯТИ

Пўлатова Ш.Х.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Артериал гипертензия сурункали юрак етишмовчилигининг энг кенг тарқалган сабабидир. Юрак етишмовчилигининг дастлабки босқичларини ўрганиш клинисенлар учун алоҳида қизиқиш уйғотади. Ҳар қандай этиологияли ЧФни эрта ташихлаш ва Б-турдаги натриуретик пептид (БНП) ёрдамида юрак етишмовчилигининг салбий натижаларини башорат қилиш имкониятига оид далиллар пайдо бўлди.

Калим сўзлар: артериал гипертензия, сурункали юрак етишмовчилиги, натриуретик пептид, эхокардиография, Допплер ултратовуш текшируви.

ЗНАЧЕНИЕ УРОВНЯ НАТРИУРЕТИЧЕСКИХ ПЕПТИДОВ В ГОЛОВНОМ МОЗГЕ ДЛЯ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ У ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

Пулатова Ш.Х.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. артериальная гипертензия служит самой частой причиной развития хронической сердечной недостаточности. Изучение проблемы сердечной недостаточности на ранних этапах ее развития вызывает особый интерес клиницистов. Появились данные о возможности ранней диагностики ХСН любой этиологии и прогнозирования возникновения неблагоприятных исходов сердечной недостаточности с помощью В – type Natriuretik Peptide (BNP).

Ключевые слова: артериальная гипертензия, хроническая сердечная недостаточность, натрийуретический пептид, эхокардиография, доплерография.

Relevance. Chronic heart failure (CHF) is the most frequent and serious complication of cardiovascular diseases. Arterial hypertension is the most common cause of CHF. The study of the problem of heart failure in the early stages of its development is of particular interest clinicians [5]. At the same time, the diagnosis of CHF in the early stages is important to prevent its further progression [1]. To date, there are data on the possibility of early diagnosis of CHF of any etiology and prediction the occurrence of adverse outcomes of heart failure with the help of a brain natriuretic peptide – B – type Natriuretik Peptide (BNP) In recent years, as a marker of the early (preclinical) stage of CHF in patients with AH is used natriuretic peptide group B (BNP). BNP in blood serum it is becoming the standard in the early diagnosis of CHF. The main stimulus to increased BNP secretion is a volume overload of the left ventricle[2].

The aim of the study was to study the dependence of the development of CHF in patients with arterial hypertension on the level of brain natriuretic peptide (BNP) [5]. Materials and methods of research [6]. We examined 80 patients, including 38 women and 42 men with arterial hypertension with and without clinical signs CHF aged 35 to 65 years, while 32 (40%) patients had chronic heart failure on the background of arterial Hypertension (AH) and 48 (60%) patients with AH without clinical and instrumental signs of CHF[7]. A comprehensive examination of patients included the collection and analysis of complaints and anamnestic

data, clinical examination, general clinical, laboratory and instrumental studies such as: standard ECG, Doppler EchoCG, 24-hour Holter ECG monitoring, chest X-ray [10]. All our patients underwent a quantitative assessment of the concentration of brain natriuretic peptide (ng/ml) in blood plasma by the method of enzyme immunoassay [8].

Discussion of the results obtained. In arterial hypertension, chronic pressure loading leads to thickening of the walls of the left ventricle with a normal size of its cavity and preserved systolic function [2]. This is how diastolic heart failure is formed. The corresponding type of remodeling is called concentric. The tension developed by the left ventricle is determined by the load on the myocardium. The main trigger of increased BNP release is increased end-diastolic pressure (CDP). The patients with hypertension examined by us, depending on the level of BNP, did not significantly differ in gender, duration of hypertension, body mass index, frequency of occurrence of CHF symptoms and regularity of taking antihypertensive drugs [11]. However, an increase in the level of BNP was associated with the age of patients. During our examination, there was some unreliable tendency to increase the NUP in women compared to men, and in more obese patients there was a tendency to decrease the level of NUP. The main indicators of blood pressure between the analyzed groups did not differ significantly. According to echocardiography, an increase in the thickness of the LV in the group of patients with hypertension with a level of MNP > 200 (two hundred) pg/ml with comparable indicators of the size of the left atrium, the index of relative wall thickness and LV myocardial mass, may indicate that the increase in MNP occurs not only due to the age of patients, but also the development of adaptive LV remodeling. It was assumed that the dynamics of the level of MNUP and NT-pro-MNUP in the direction of both increasing and decreasing will be able to individualize the assessment of the clinical condition of a patient with CHF, become a reliable indicator of the risk of adverse clinical events, and also be considered as an argument in favor of changing the treatment strategy [12]. The patients examined by us were divided into two groups. The first group consisted of 32 patients with hypertension with obvious signs of CHF. Such as – shortness of breath, fatigue, swelling and palpitations. And the second group included 48 patients with hypertension without obvious clinical and instrumental signs of CHF. The level of BNP was studied in all the examined patients. Analysis of the survey data indicates that in the first group (with obvious signs of CHF), thirty-one (96.8%) patients had a BNP level higher than normal values and amounted to 350 ± 20.8 pg/ml.

In the second group, there was an increase in the concentration of BNP in eleven patients (22.9%) who had no obvious clinical signs of CHF. Level BNP in this group was also higher than normal values - 220 ± 10.1 pg/ml. Conclusion. Analysis of the BNP results in our patients showed that in 11 out of 48 patients without obvious signs of CHF, the BNP level exceeded the norm, i.e. it was above 200 pg/ml. This means that in these patients, in the absence of complaints and clinical manifestations, there is still the development of chronic heart failure. Thus, an increased level of BNP indicates the presence of latent heart failure. The results obtained indicate that the use of the BNP laboratory criterion allows for an objective diagnosis with high sensitivity and specificity of the development of CHF. Currently The determination of BNP serves as a prognostic marker and indicator of the effectiveness of treatment and is a standard method for the diagnosis of HF.

References:

1. Пулатова Ш.Х. Особенности тромболитической терапии у больных острым инфарктом миокарда // Вестник экстренной медицины. – 2019. – Т. 12. – №. 6. – С. 88-91.
2. Кенжаев М.Л., Л.А. Ахмедов, Ш.Х. Пулатова Выбор тромболитиков при лечении инфаркта миокарда // Вестник экстренной медицины.- 2017.- Т. 3. – С. 93-96
3. Akhmedov L.A., Pulatova Sh.H. Optimization of hemodynamic diagnostics of acute left ventricular failure // Materials of the 7th Eurasian Congress of Cardiology. In J. Cardiology of Uzbekistan. 2019, C. 255.
4. Kenjaev ML, Ahmedov LA, Puvlatova SH, Boboeva MM The course of myocardial infarction in patients of young age // Bulletin of Physicians. Tashkent, 2017.- No.4 - P.44.
5. Kenjaev ML, Ahmedov LA, Pulatova SH, Boboeva MM. Cardiogenic shock bilan asoratlangan útkir myocardial infarcti davosida vasopressor therapy takomillashtirish // Bulletin of therapists. Tashkent, 2017.- No.1 - P.31
6. Pulatova, Sh. H. (2012). Founders: Institute of Immunology of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan. Theoretical and clinical medicine
7. Pulatova, Sh. H. (2012). Founders: Institute of Immunology, Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan. Theoretical and clinical medicine Founders: Institute of Immunology, Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan ISSN: 2091-5853
8. Khamroev, E. E., Nurboev, F. E., & Pulatova, S. K. (2022). Chronic heart failure: features

clinical manifestations in the elderly. British Medical Journal, 2(2).

9. Pulatova Sh.H. Method of improving vasopressor therapy for acute myocardial infarction complicated with cardiogenic shock // American Journal Of Medicine And Medical Sciences. 2020.– Vol. 10 (11). – P. 911-913

10. Pulatova Sh.H. Improvement of treatment of patients with acute heart failure, a comparative

evaluation of the effectiveness of dobutamine and levosimendan// World Journal Of Pharmaceutical Research. 2020. Vol 9 (6). –P. 2283-2288

11. Khamroev, E. E., F. E. Nurboev, and Sh Kh Pulatova. "chronic heart failure: features clinical manifestations in the elderly." British Medical Journal 2, no. 2 (2022).

12. Турдиев, У. М. "Unstable progressive angina." Узбекский медицинский журнал 3.3 (2022).

For citation: Pulatova Sh.H. The value of the brain natriuretic level peptides in the early diagnosis of chronic heart failure in patients with arterial hypertension // Bulletin of Fundamental and Clinic Medicine. – 2026. – № 4(24). – P. 616–618. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19627723>

SPECIFIC CLINICAL AND LABORATORY ASPECTS OF CHRONIC TONSILLITIS OF CYTOMEGALOVIRUS ETIOLOGY IN CHILDREN**Rustamova R.B., Kudratova Z.E., Rustamova G.R.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. The high incidence of cytomegalovirus (CMV) infection among children and its impact on chronic inflammatory processes are pressing issues in modern pediatrics and otorhinolaryngology. The study provides clinical and laboratory evidence for the role of CMV as an etiological factor in the chronic progression and recurrent course of the pathological process in the tonsils. It is known that this viral infection has the ability to trigger autoimmune reactions in the body and alter the functional state of the immune system. The study analyzed the specific features of chronic tonsillitis in school-aged children with active CMV, including a cytokine profile and a imbalance in humoral immunity indicators. The obtained results are of great importance for predicting the clinical course of the pathological process and for developing targeted treatment strategies.

Keywords: chronic tonsillitis, children, cytomegalovirus infection, immunological status, cytokines, humoral immunity, autoimmune processes.

БОЛАЛАРДА ЦИТОМЕГАЛОВИРУС ЭТИОЛОГИЯЛИ СУРУНКАЛИ ТОНЗИЛЛИТНИНГ КЛИНИК-ЛАБОРАТОР ХУСУСИЯТЛАРИ**Рустамова Р.Б., Қудратова З.Э., Рустамова Г.Р.**

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Болалар орасида цитомегаловирус (ЦМВ) инфекциясининг юқори даражада учраши ва унинг сурункали яллиғланиш жараёнлари ривожланишига таъсири замонавий педиатрия ҳамда оториноларингологиянинг долзарб муаммоларидан бири бўлиб қолмоқда. Тадқиқотда бодомсимон безлардаги патологик жараённинг сурункали шаклга ўтиши ва қайталанувчи кечишида ЦМВнинг этиологик омил сифатидаги ролига оид клиник-лаборатор далиллар келтирилган. Маълумки, ушбу вирус инфекцияси организмда аутоиммун реакцияларни қўзғатиш ва иммун тизимининг функционал ҳолатини ўзгартириш хусусиятига эга. Ишда мактаб ёшидаги болаларда ЦМВнинг фаол шакли билан кечувчи сурункали тонзиллитнинг ўзига хос хусусиятлари, жумладан, цитокинлар профили кўрсаткичлари ва гуморал иммунитет дисбаланси таҳлил қилинган. Олинган натижалар патологик жараённинг клиник кечишини прогноз қилиш ва мақсадли (таргет) даволаш стратегияларини ишлаб чиқишда муҳим аҳамиятга эга.

Калим сўзлар: Сурункали тонзиллит, болалар, цитомегаловирус инфекцияси, иммун статуси, цитокинлар, гуморал иммунитет, аутоиммун жараёнлар.

КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ХРОНИЧЕСКОГО ТОНЗИЛЛИТА ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНОЙ ЭТИОЛОГИИ У ДЕТЕЙ**Рустамова Р.Б., Қудратова З.Э., Рустамова Г.Р.**

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Высокая частота встречаемости цитомегаловирусной (ЦМВ) инфекции среди детей и её влияние на развитие хронических воспалительных процессов являются одними из актуальных проблем современной педиатрии и оториноларингологии. В исследовании представлены клиничко-лабораторные доказательства роли ЦМВ как этиологического фактора в хронизации и рецидивирующем течении патологического процесса в миндалинах. Известно, что данная вирусная инфекция обладает способностью запускать аутоиммунные реакции в организме и изменять функциональное состояние иммунной системы. В работе проанализированы специфические особенности хронического тонзиллита у детей школьного возраста с активной формой ЦМВ, включая показатели цитокинового профиля и дисбаланс гуморального иммунитета. Полученные результаты имеют важное значение для прогнозирования клинического течения патологического процесса и разработки стратегий таргетной терапии.

Ключевые слова: Хронический тонзиллит, дети, цитомегаловирусная инфекция, иммунный статус, цитокины, гуморальный иммунитет, аутоиммунные процессы.

The problem of chronic tonsillitis remains one of the priority areas of local otorhinolaryngology. Chronic tonsillitis is a chronic infectious and allergic disease in which the focus of infection is located in the tonsils.

In the foreign literature, the terms “chronic tonsillitis,” “acute tonsillopharyngitis,” and “recurrent tonsillitis” are used. Thus, chronic tonsillitis can be described as a polyetiological disease [5,6,7].

Currently, the study of nucleotide polymorphisms of a single pathogen is of great interest.

These studies are being conducted to determine the multifactorial genesis of chronic tonsillitis [1,2,3].

Research materials and methods. IgG class antibodies were evaluated by index according to IFA results, based on the optical density automatically calculated by the instrument.

An AV index value below 0.8 indicates a negative result, indicating the absence of class-specific IgG antibodies; a value above 1.1 indicates a positive result; AV index values between 0.9 and 1.0 were considered equivocal.

IgM class antibodies and the IgG avidity index for CMV were detected by enzyme immunoassay using the “Vector-CMV-IgM” and “Vector-CMV-IgG-avidity” (“Vector Best,” Russia) reagents. IgG avidity was determined only in children in whom CMV IgG-class antibodies were detected in the serum.

Children with IgM-class CMV antibodies were considered to have an acute infectious process, were excluded from the study, and were referred to an infectious disease specialist.

Molecular biological research methods were used to confirm the presence of CMV in the biological material—detection of CMV DNA in the biological material.

On an IQ5 cyclor analyzer (“BioRad”, USA) The quantity of CMV DNA in the whole blood of tested individuals was determined by a real-time PCR method with CMV detection via hybridisation-fluorescence, using the “Amplitens®CMV-ekran/monitor-fl” reagent kit.

Analytical performance of the test system used: sensitivity - 400 copies/mL; linear measurement range of the reagent kit - 400-10,000,000 copies/mL.

If the result is less than 400 copies/mL, it will be reported as less than 400 copies/mL. The specific sensitivity of the reagent kit is shown in the study of the AD169 matched strain.

The cellular composition of pharyngeal tonsil swabs was examined using a Micros 300 microscope (R) after Romanovsky-Giemsa staining ($p = 37$). Cells were counted in 10 fields of view.

Inclusion criteria for the main group: active CMV infection (primary or reactivated) confirmed by the laboratory based on the detection of CMV DNA in blood by PCR.

Results obtained. When analyzing the patients by gender, 56.6% were girls and 44.4% were boys. (Fig. 1)




Figure 1. Distribution of examined patients by gender

When analyzed by age, children aged 4 to 6 predominated, accounting for 37.3%, while the numbers of children aged 7–10 and 11–14 did not differ significantly. Girls aged 4–6 and boys aged 11–14 were more numerous.

According to the study and analysis of the medical history, the following statistically significant differences were identified in the obstetric history. When analyzing pregnancy complications, 85.7% of the mothers had anemia, A higher rate of cytomegalovirus infection, 69.7%, was found.

During the course of pregnancy, 72.5% of mothers experienced preeclampsia and 23% had.

During the analysis, we paid special attention to the presence of herpes viral infections during pregnancy.

In addition, 42.8% of the mothers suffered from acute respiratory infections, according to the survey results, In half of them, the illness was prolonged and accompanied by a persistent cough, which is why one in three mothers received a short course of antibiotics (amoxicillin, ampicillin, azithromycin).

Premature birth was observed in 12.6% of cases, and ENT pathology was detected in 12.6% of the children. Miscarriages and pyelonephritis were recorded in 7.7% and 8.2% of cases, respectively.

Thus, analysis of the obstetric history of the mothers of the examined children showed that among mothers whose children suffered from chronic tonsillitis, there were anemia, TORCH infection, gestational toxicosis, acute respiratory infections, and miscarriage.

Chronic tonsillitis was diagnosed for the first time in 28 of 55 patients, accounting for 50.9%.

By age group, ST was diagnosed in 23 children aged 2 to 3 years, accounting for 41.8%, and in 4 children aged 3 to 5 years (7.27%). Thus, ST was diagnosed for the first time in one out of every four children examined. The disease duration was most common between 2 and 3 years, accounting for 56.2%.

An analysis of clinical data related to ST is presented in Figure 2.




Figure 2. Analysis of complaints in patients with chronic tonsillitis associated with SMV

During our study, we examined the microflora on the surface of children's tonsils.

The data obtained from the patients are presented in Table 1.

Swabs were taken from 45 children with chronic tonsillitis; analysis was not performed on the remaining 10 because they had taken antibiotics immediately before the examination. In children with chronic tonsillitis, the dominant flora was *S. aureus* (24.4%), *S. pneumoniae* (20%), *H. influenzae* (13.3%), and *Candida* spp. in 11.2% of cases, with similar figures for *S. epidermidis* and *S. pyogenes* at 4.44%. A mixed microflora was found in 4 children, and no growth of the microbial flora was observed in 6 patients.




Figure 3. The composition of the microflora in children with chronic tonsillitis

To assess the cytokine profile, we examined the cytokine composition in children with CMV-associated chronic tonsillitis before and after treatment.

The results of the study of cytokine levels in children with CMV-associated chronic tonsillitis are shown in Figure 4.




Figure 4. Cytokine levels in patients with chronic tonsillitis

Note: Reliability of the differences before and after p-treatment

The results of the cytokine level study in CMV-associated chronic tonsillitis showed that IL-1β, IL-6, IL-8, IL-10, and IFN-γ were significantly elevated before treatment. As shown in Table 4, IL-1β levels rose to 21.91 ± 3.38 pg/mL before treatment, with a significant difference compared to reference values ($p < 0.05$). In our study, a nearly twofold increase in IL-6 levels to 19.43 ± 2.97 pg/mL was observed before treatment, when using the upper limits of the reference values, the difference was also significant ($p < 0.05$). The IL-10 level was within the reference value range before treatment, at 18.90 ± 3.65 pg/mL. Also, the levels of IL-8 and IFN-γ were 18.90 ± 3.65 pg/mL and 18.90 ± 3.65 pg/mL, respectively; it should be noted that all indicators were statistically significant.

Conclusions. In mothers of children with CMV, anemia, cytomegalovirus infection, and vomiting during pregnancy, If there is an increase in ORC, risk of miscarriage, IL-1β, IL-6, IL-8, and IFN-γ, additional testing should be conducted to detect active and chronic forms of CMV. For a definitive diagnosis, the presence of CMV IgM and IgG in the patient's venous blood should be tested.

References:

1. Aznabaeva L.M., Fedorova T.O., Ukubaeva D.G., Mikhailova E.A., Kirgizova S.B., Fomina M.V. et al. Salivary lysozyme and antilysozyme activity of microorganisms representing the tonsillar biota of patients with chronic tonsillitis. Russian Journal of Immunology. 2017;11(2):238-240.
2. Aksenova A.V., Shostak N.A., Guseva O.A. Post-streptococcal diseases in clinical practice. Bulletin of Otorhinolaryngology. 2016;2:39-43.
3. Andriyanova I.V. Dynamics of immunological parameters in patients with chronic tonsillitis. Moscow Surgical Journal. 2013, Vol. 33, No. 5, pp. 29-32.
4. Barkagan Z.S., Momot A.P. Diagnosis and Controlled Therapy of Hemostatic Disorders. 3rd ed. Moscow: Newdiamed; 2008.
5. Belov B.S. Diagnosis and rational antibiotic therapy of Group A streptococcal pharyngeal infections as the basis for primary prevention of acute rheumatic fever. Medical Council. 2016, No. 4, pp. 56–63
6. Belov V.A., Voropaeva Ya.V. Prevalence of chronic tonsillitis in children according to data from the All-Russian health screening program. Russian Journal of Perinatology and Pediatrics. 2012. Vol. 57, No. 1, pp. 85–89
7. Belyakova, A.A. Surgical treatment of chronic tonsillitis: a review of modern methods. Journal of Otorhinolaryngology. 2014;5:89–93.

For citation: Rustamova R.B., Kudratova Z.E., Rustamova G.R. Specific clinical and laboratory aspects of chronic tonsillitis of cytomegalovirus etiology in children // Bulletin of Fundamental and Clinic Medicine. – 2026. – № 4(24). – P. 619–622. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19627775>

БОЛАЛАРДА ЎТКИР ИЧАК ИНФЕКЦИЯЛАРИНИ ДАВОЛАШДА ЗАМОНАВИЙ ЁНДАШУВЛАР САМАРАДОРЛИГИ

Ҳайдаров М.М.

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Мақолада болаларда ўткир ичак инфекцияларини даволашда стандарт ва комбинацияли терапия усулларининг самарадорлиги таҳлил қилинган. Адабиётлар шарҳи асосида орал регидратация эритмалари ва цинк қўшимчалари стандарт даволаш сифатида қаралиб, пробиотиклар ва Racecadotril каби қўшимча воситаларнинг таъсири баҳоланди. Натижалар комбинацияли терапия клиник жиҳатдан юқори самарадорликка эга эканлигини кўрсатди.

Калит сўзлар: ўткир ичак инфекциялари, болалар, диарея, ORS, цинк, пробиотиклар, Racecadotril

EFFECTIVENESS OF MODERN APPROACHES IN THE TREATMENT OF ACUTE INTESTINAL INFECTIONS IN CHILDREN

Haydarov M.M.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. The article analyzes the effectiveness of standard and combination therapy approaches in the treatment of acute intestinal infections in children. Based on a review of the literature, oral rehydration solutions (ORS) and zinc supplementation are considered standard treatment, while the effects of additional agents such as probiotics and Racecadotril are evaluated. The results demonstrate that combination therapy has higher clinical effectiveness.

Keywords: acute intestinal infections, children, diarrhea, ORS, zinc, probiotics, Racecadotril

ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОВРЕМЕННЫХ ПОДХОДОВ К ЛЕЧЕНИЮ ОСТРЫХ КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ У ДЕТЕЙ

Хайдаров М.М.

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. В статье проанализирована эффективность стандартных и комбинированных методов терапии острых кишечных инфекций у детей. На основе обзора литературы растворы для оральной регидратации (ОРС) и препараты цинка рассматриваются как стандартное лечение, в то время как оценивается влияние дополнительных средств, таких как пробиотики и Racecadotril. Результаты показывают, что комбинированная терапия обладает более высокой клинической эффективностью.

Ключевые слова: острые кишечные инфекции, дети, диарея, ОРС, цинк, пробиотики, Racecadotril

e-mail: musohaydarov7@gmail.com

Кириш. Ўткир ичак инфекциялари болалар ўртасида энг кенг тарқалган касалликлардан бири бўлиб, айниқса 5 ёшгача бўлган болаларда юқори касалланиш кўрсаткичи билан тавсифланади [16]. Ушбу касалликлар сув-электролит мувозанатининг бузилишига олиб келиб, оғир ҳолатларда дегидратация ва асоратларга сабаб бўлиши мумкин [8]. Замонавий клиник тавсияларга кўра, болаларда ўткир диареяни даволашнинг асосий мақсади дегидратациянинг олдини олиш ва организмдаги сув-электролит балансини тиклашдан иборат [15]. Шу мақсадда орал регидратация эритмалари ва цинк қўшимчалари стандарт терапия сифатида қўлланилади [1,15]. Сўнгги йилларда қўшимча терапия усуллари, жумладан пробиотиклар ва антисекретор препаратлар қўлланилиши кенг ўрганилмоқда [4,10]. Ушбу усуллар диарея давомийлигини қисқартириш ва клиник симптомларни енгилаштиришга қаратилган.

Материаллар ва методлар. Ушбу тадқиқотда болаларда ўткир ичак инфекцияларини даволашнинг замонавий усулларини баҳолаш мақсадида сўнгги йилларда нашр этилган илмий адабиётлар таҳлил қилинди. Таҳлил учун систематик шарҳлар, мета-таҳлиллар, рандомизацияланган клиник тадқиқотлар ва халқаро клиник қўлланмалар танлаб олинди. Халқаро тавсияларга кўра,

болаларда ўткир диареяни даволашда асосий терапия сифатида орал регидратация еритмалари (ORS) ва цинк қўшимчалари қўлланилади [15]. ORS организмдаги сув ва электролит мувозанатини тиклаш орқали дегидратациянинг олдини олишда муҳим аҳамиятга эга [8]. Цинк қўшимчалари эса диарея давомийлигини қисқартириши ва касаллик оғирлигини камайтириши мета-таҳлилларда тасдиқланган [1]. Қўшимча терапия сифатида пробиотиклардан фойдаланиш масаласи кенг ўрганилган. Мета-таҳлил натижаларига кўра, пробиотиклар болаларда ўткир диарея давомийлигини қисқартириш ва симптомларни енгиллаштиришда маълум даражада самарадор ҳисобланади [4]. Шунингдек, *Lactobacillus reuteri* ва бошқа пробиотик штаммлар диарея касалликларида қўлланилганда клиник яхшиланишга олиб келиши қайд этилган [12]. Антисекретор препаратлар, жумладан *Racecadotril*, болаларда ўткир диареяни даволашда самарали восита сифатида кўриб чиқилган. Систематик шарҳлар *Racecadotril* ичакда сув ва электролит секрециясини камайтириб, диарея давомийлигини қисқартиришини кўрсатган [10]. Шунингдек, турли тадқиқотларда ушбу препаратни ORS билан биргаликда қўллаш клиник натижаларни яхшилаши аниқланган [9]. Қатор тадқиқотларда даволаш самарадорлигини баҳолаш мақсадида беморларни икки гуруҳга ажратиш усули қўлланилган: стандарт терапия (ORS + цинк) ва комбинацияли терапия (ORS + цинк + пробиотиклар ёки бошқа қўшимча воситалар) [2]. Бундай ёндашув турли терапия вариантларини солиштириш ва клиник самарадорликни ҳолис баҳолаш имконини беради. Адабиётларда асосий баҳолаш мезонлари сифатида қуйидаги кўрсаткичлар келтирилган: диарея давомийлиги, кунлик дефекация сони, дегидратация даражаси, лаборатор электролит кўрсаткичлари ва госпитализация муддати [1]. Шунингдек, клиник тадқиқотларда терапия самарадорлигини баҳолашда статистик усуллар — Student's t-test ва χ^2 тестларидан кенг фойдаланилган [5]. Шу тариқа, таҳлил қилинган адабиётлар асосида болаларда ўткир ичак инфекцияларини даволашда стандарт терапия билан бир қаторда комбинацияли терапияни қўллаш самарадорлиги ҳақида илмий жиҳатдан асосланган маълумотлар шакллантирилди. Ушбу ёндашув ретроспектив ва проспектив тадқиқотлар учун методологик асос бўлиб хизмат қилади [3].

Натижалар. Адабиётлар таҳлили стандарт терапия (ORS + цинк) диарея давомийлигини қисқартириш ва дегидратацияни камайтиришда самарали эканлигини кўрсатди [1,15]. Комбинацияли терапия (ORS + цинк + пробиотиклар) қўлланилганда диарея муддати янада қисқарган ва симптомлар тезроқ бартараф этилган [4,14]. *Racecadotril* қўлланилган ҳолларда сув йўқотилиши ва диарея оғирлиги камайгани кузатилган. Шунингдек, ушбу препаратни ORS билан биргаликда қўллаш госпитализация муддатини қисқартирган [9,10].

Муҳокама. Олинган натижалар стандарт терапиянинг асосий ўрин тутишини тасдиқлайди. Шу билан бирга, комбинацияли терапиянинг қўлланилиши клиник самарадорликни оширишга хизмат қилади [4,15]. Пробиотиклар ичак микрофлорасига ижобий таъсир кўрсатиб, диарея симптомларини камайтиришга ёрдам беради. *Racecadotril* эса антисекретор таъсири орқали диареяни тезроқ тўхтатади [10,12]. Айрим тадқиқотларда пробиотиклар самарадорлиги штаммга боғлиқ эканлиги қайд этилган, бу эса келгусида янада аниқ тадқиқотлар талаб этилишини кўрсатади [4].

Хулоса. Болаларда ўткир ичак инфекцияларини даволашда ORS ва цинк асосий терапия бўлиб қолмоқда. Шу билан бирга, пробиотиклар ва *Racecadotril* каби қўшимча воситаларни қўллаш клиник натижаларни яхшилаши мумкин. Комбинацияли терапия диарея давомийлигини қисқартириш ва бемор ҳолатини тезроқ тиклашда самарали ҳисобланади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Ali, A. A., Naqvi, S. K., Hasnain, Z., Zubairi, M. B. A., Sharif, A., Salam, R. A., & Soofi, S. (2024). Zinc supplementation for acute and persistent watery diarrhoea in children: A systematic review and meta-analysis. *Journal of Global Health*, 14, 04212. <https://doi.org/10.7189/jogh.14.04212>
2. Abdulah, D. M., Sulaiman, S. J., & Ahmed, Z. W. (2024). Effect of probiotics plus zinc supplementation on clinical outcomes of infants and children with acute infectious diarrhea: A randomized controlled trial. *Clinical and Experimental Pediatrics*, 67(4), 203–212.
3. Chen, C., Liu, P., Xiao, L., Cao, Q., Zhou, D., Liu, X., Shen, M., & Zhang, L. (2026). Probiotics for treating acute diarrhea in children: An evidence synthesis. *Frontiers in Pediatrics*, 13. <https://doi.org/10.3389/fped.2025.1722257>
4. Huang, R., Xing, H. Y., Liu, H. J., Chen, Z. F., & Tang, B. B. (2021). Efficacy of probiotics in the treatment of acute diarrhea in children: A systematic review and meta-analysis. *Translational Pediatrics*, 10(12), 3248–3260.
5. Florez, I. D., Veroniki, A. A., Al Khalifah, R., Yepes-Nuñez, J. J., Sierra, J. M., Vernooij, R. W. M., & Guyatt, G. H. (2018). The effectiveness and safety of treatments used for acute diarrhea and gastroenteritis in children: A systematic review and

network meta-analysis. *PLoS One*, 13(12), e0207701.

6. Ramadas, D., Chakraborty, A., & Chidambaram, S. (2024). A comparative study of probiotic combinations as adjuvants in pediatric diarrhea management. *International Archives of Biomedical and Clinical Research*, 2(3), 47–50.

7. Lamberti, L. M., Walker, C. L. F., Chan, K. Y., & Black, R. E. (2013). Oral zinc supplementation for the treatment of acute diarrhea in children. *Nutrients*, 5(11), 4715–4740.

8. Lifshitz, C., Kozhevnikov, O., Oesterling, C., Anbar, A., & Walker, S. (2023). Acute gastroenteritis and oral rehydration therapy: Updates and recommendations. *Frontiers in Pediatrics*, 11, 1294490.

9. Szajewska, H., Dziechciarz, P., & Mrukowicz, J. (2007). Racecadotril in the treatment of acute gastroenteritis in children: A systematic review. *Alimentary Pharmacology & Therapeutics*, 25(8), 871–876.

10. Gutiérrez-Castrellón, P., Polanco-Allué, I., & Salazar-Lindo, E. (2015). Racecadotril in the treatment of acute diarrhea in children: A meta-analysis. *Gaceta Médica de México*, 151, 329–336.

11. Patro-Gołab, B., Shamir, R., & Szajewska, H. (2015). Yogurt for treating acute gastroenteritis in children: A systematic review. *Clinical Nutrition*, 34(3), 451–456.

12. Urbańska, M., Gieruszczak-Białek, D., & Szajewska, H. (2016). *Lactobacillus reuteri* DSM 17938 for treating acute gastroenteritis in children. *Alimentary Pharmacology & Therapeutics*, 43(10), 1025–1034.

13. Das, R. R., Sankar, J., & Naik, S. S. (2015). Efficacy and safety of diosmectite in acute childhood diarrhea: A meta-analysis. *Archives of Disease in Childhood*, 100(7), 704–712.

14. Minaz, A., Alam, R., Jiwani, U., et al. (2024). Efficacy of probiotics for treatment of acute diarrhea in children: A systematic review. *Journal of Global Health*.

15. Guarino, A., Ashkenazi, S., Gendrel, D., et al. (2014). European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition guidelines for acute gastroenteritis in children. *Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition*, 59(1), 132–152.

16. World Health Organization. (2023). *Diarrhoea: Key facts and management guidelines in children*. Geneva: WHO.

Иқтибос учун: Ҳайдаров М.М. Болаларда ўткир ичак инфекцияларини даволашда замонавий ёндашувлар самарадорлиги // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси*. – 2026. – № 4(24). – Б. 623–625. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19627961>

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ИНСЕКТНОЙ АЛЛЕРГИИ У ДЕТЕЙ: ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИММУНОТЕРАПИИ С АКЦЕНТОМ НА ПЕРСПЕКТИВЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

**Мухамедова Ш.Т., Ачилова Д.Н., Ганиева Ш.Ш., Садуллоева И.К., Наимова Ш.А.,
Рустамов Б.Б., Жумаев Ф.Э., Касимова Н.А.**

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Инсектная аллергия является ведущей причиной анафилаксии в детском возрасте. Несмотря на высокую эффективность аллерген-специфической иммунотерапии ядами (АСИТ), ее внедрение в региональные системы здравоохранения, в том числе в Узбекистане, сталкивается с трудностями из-за нехватки узкоспециализированных детских аллергологических служб. Данный обзор синтезирует мировые данные об инновациях в диагностике и результатах АСИТ для формирования стратегии улучшения педиатрической помощи в Центральной Азии. Методы: Систематический обзор проведен в соответствии с протоколом PRISMA 2020. Поиск литературы осуществлялся в базах PubMed, Scopus и Cochrane Library среди публикаций за период 2016–2026 гг., посвященных детской инсектной аллергии, молекулярной диагностике (CRD) и АСИТ. Для финального качественного синтеза было отобрано 15 исследований. Результаты: Общая выборка составила 1482 пациента (возраст 3–18 лет). Молекулярная диагностика (CRD) с использованием маркеров *Ves v 5* и *Api m 1* повысила точность диагноза в 85% случаев двойной сенсibilизации. АСИТ продемонстрировала защитную эффективность 95–98% при аллергии на яд ос и 84–91% — на яд пчел. Региональные данные по Бухарской области (Узбекистан) показывают, что на долю инсектной аллергии приходится 11% острых аллергических реакций у детей, часто связанных с укусами *Vespa orientalis*. Профиль безопасности у детей оказался выше, чем у взрослых: системные реакции наблюдались менее чем в 1% случаев. Заключение: Ведение детей с инсектной аллергией требует перехода к молекулярной диагностике и расширения доступа к АСИТ. Проводя параллели с развитием детской гинекологии, мы подчеркиваем острую необходимость в создании специализированных программ подготовки детских аллергологов и региональных референс-центров в Узбекистане для преодоления разрыва между первичным звеном и высокотехнологичной иммунотерапией.

Ключевые слова: инсектная аллергия, Анафилаксия, Детская аллергология, Аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ), Молекулярная диагностика, Узбекистан, Центральная Азия, *Vespa orientalis*.

SYSTEMATIC REVIEW OF INSECT ALLERGY IN CHILDREN: DIAGNOSTIC INNOVATIONS AND IMMUNOTHERAPY OUTCOMES WITH A FOCUS ON CENTRAL ASIAN PERSPECTIVES

**Mukhamedova Sh.T., Achilova D.N., Ganieva Sh.Sh., Sadulloeva I.K., Naimova Sh.A.,
Rustamov B.B., Zhumaev F.E., Kasimova N.A.**

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. Insect venom allergy (Hymenoptera venom allergy, HVA) is a leading cause of anaphylaxis in the pediatric population. In the arid and hot climate of Uzbekistan, the high activity of stinging insects makes this a significant public health concern. This review synthesizes global evidence on diagnostic innovations and the efficacy of venom immunotherapy (VIT) to inform strategies for improving pediatric care in Central Asia. Methods: A systematic review was conducted in accordance with the PRISMA 2020 guidelines. A comprehensive literature search was performed across PubMed, Scopus, and the Cochrane Library for studies published between 2016 and 2026 focusing on pediatric HVA, component-resolved diagnostics (CRD), and VIT. Fifteen studies were selected for final qualitative and quantitative synthesis. Results: The total sample size across the selected studies was 1,482 patients (aged 3–18 years). Component-resolved diagnostics (CRD) using markers such as *Ves v 5* and *Api m 1* increased diagnostic accuracy in 85% of cases involving double sensitization. VIT demonstrated a protective efficacy of 95–98% for vespid venom and 84–91% for honeybee venom. Regional data from the Bukhara region (Uzbekistan) indicate that insect allergy accounts for 11% of acute allergic reactions in children, frequently associated with *Vespa orientalis* stings. The safety profile in children was superior to that in adults, with systemic reactions occurring in less than 1% of cases. Conclusions: Managing pediatric insect allergy requires a transition toward molecular diagnostics and expanded access to VIT. Drawing parallels with the development of specialized fields like pediatric gynecology, we emphasize the urgent need for specialized training programs for pediatric allergists.

and the establishment of regional reference centers in Uzbekistan to bridge the gap between primary care and high-tech immunotherapy.

Keywords: insect allergy, Anaphylaxis, Pediatric allergology, Allergen-specific immunotherapy (ASIT), Component-resolved diagnostics (CRD), Uzbekistan, Central Asia, *Vespa orientalis*.

БОЛАЛАРДА ИНСЕКТ АЛЛЕРГИЯНИНГ СИСТЕМАТИК ШАРҲИ: ДИАГНОСТИК ИННОВАЦИЯЛАР ВА ИММУНОТЕРАПИЯ НАТИЖАЛАРИ — МАРКАЗИЙ ОСИЁ ИСТИҚБОЛЛАРИГА УРҒУ БЕРГАН ҲОЛДА

Мухамедова Ш.Т., Ачилова Д.Н., Ганиева Ш.Ш., Садуллоева И.К., Наимова Ш.А.,
Рустамов Б.Б., Жумаев Ф.Э., Касимова Н.А.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Инсект аллергия болалар ўртасида анафилаксиянинг асосий сабабларидан биридир. Ўзбекистоннинг иссиқ иқлим шароитида жашловчи ҳашаротлар фаоллигининг юқорилиги ушбу муаммони янада долзарб қилади. Мазкур мақолада педиатрия амалиётида инсект аллергияни таххислаш ва даволашдаги замонавий ёндашувлар таххил қилинади. Методлар: Систематик шарҳ PRISMA 2020 протоколи асосида олиб борилди. PubMed, Scopus ва Cochrane Library маълумотлар базаларидан 2016–2026 йиллар оралигидаги 15 та илмий манба таххил учун саралаб олинди. Натижалар: Молекуляр компонент таххислаш (CRD) усулидан фойдаланиш (*Ves v 5* ва *Api m 1* маркерлари) икки ёқлама сенсibiliзация ҳолатларида таххис аниқлигини 85% га ошириш аниқланди. Аллерген-специфик иммунотерапия (АСИТ) ари захрига нисбатан 95–98%, асалари захрига нисбатан 84–91% ҳимоя самарадорлигини кўрсатди. Бухоро вилояти маълумотларига кўра, болалардаги ўткир алергик реакцияларнинг 11% қисми ҳашаротлар чақиши, айниқса *Vespa orientalis* билан боғлиқлиги аниқланган. Хулоса: Болаларда инсект аллергиясини бошқаришда молекуляр диагностикага ўтиш ва АСИТ имкониятларини кенгайтириш зарур. Ўзбекистонда ихтисослашган болалар алергология хизматини ривожлантириш ва ҳудудий референс-марказларни таххил этиш анафилаксия хавфини сезиларли даражада камайтириш имконини беради.

Калим сўзлар: инсект аллергия, анафилаксия, болалар алергологияси, АСИТ, молекуляр диагностика, Ўзбекистон, Марказий Осиё, *Vespa orientalis*.

Введение. Защита здоровья детей от жизнеугрожающих состояний является приоритетной задачей современной педиатрии. Инсектная аллергия (Hymenoptera venom allergy, HVA) представляет собой серьезную глобальную проблему здравоохранения, являясь одной из ведущих причин тяжелой анафилаксии в детском возрасте [1]. Несмотря на то, что системные реакции на яд перепончатокрылых насекомых у детей встречаются реже, чем у взрослых, их непредсказуемость и высокий риск летального исхода требуют особого внимания со стороны клиницистов [2].

Специфика детской алергологии часто оказывается в «серой зоне» между общей педиатрией и взрослой специализированной помощью. Как отмечают исследователи в смежных областях медицины, например, в детской гинекологии, существует критический разрыв в оказании узкоспециализированной помощи детям и подросткам, что может приводить к недодиагностике и задержке в назначении адекватной терапии [3]. В случае с инсектной аллергией этот разрыв особенно опасен, так как своевременное начало аллерген-специфической иммунотерапии (АСИТ) способно предотвратить фатальные реакции в будущем.

В регионах с жарким климатом, таких как Центральная Азия и, в частности, Бухарская область Узбекистана, проблема стоит особенно остро. Высокая инсоляция и аграрная специфика региона способствуют круглогодичной активности жалящих насекомых, таких как восточный шершень (*Vespa orientalis*) и медоносная пчела (*Apis mellifera*). Согласно данным региональных исследований, инсектные аллергены являются причиной до 11% всех случаев острых алергических состояний у детей в данном регионе [4]. При этом в клинической практике Узбекистана до сих пор преобладают традиционные методы диагностики, которые часто дают ложноположительные результаты из-за перекрестной реактивности белков яда.

Современная парадигма требует перехода к персонализированной медицине. Внедрение молекулярной компонент-разделенной диагностики (Component-Resolved Diagnostics, CRD) открывает новые возможности для точной идентификации мажорных алергенов (например, *Api m 1* или *Ves v 5*), что критично для подбора эффективного состава АСИТ [5]. Однако уровень осведомленности педиатров о данных инновациях остается недостаточно высоким.

Целью данного систематического обзора является обобщение текущих мировых данных об эффективности инновационных методов диагностики и иммунотерапии инсектной аллергии у детей, а также анализ перспектив их внедрения в клиническую практику здравоохранения Узбекистана для снижения бремени анафилактических реакций.

Материалы и методы. Данное исследование представляет собой систематический обзор, выполненный в соответствии с протоколом PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses). Мы использовали структурированный подход для минимизации систематической ошибки отбора и обеспечения прозрачности анализа данных (Рис. 1).




Рисунок 1. Блок-схема отбора исследований (PRISMA 2020)

Поиск научной литературы проводился в три этапа в период с января по март 2026 года. Основными базами данных послужили Scopus, PubMed (MEDLINE) и Cochrane Library. Дополнительно

использовался ресурс для поиска «серой» литературы и препринтов. Поисковый запрос: ("insect venom allergy" OR "hymenoptera hypersensitivity") AND ("children" OR "adolescent") AND ("immunotherapy" OR "molecular diagnosis") AND ("Uzbekistan" OR "Central Asia")

Статьи включались в обзор на основе следующих критериев **PICO**: - **Population**: Дети и подростки в возрасте от 0 до 18 лет; - **Intervention**: Использование молекулярной диагностики (CRD) или проведение аллерген-специфической иммунотерапии (АСИТ); - **Comparison**: Сравнение с группами плацебо, стандартными кожными тестами или отсутствие терапии; - **Outcome**: Эффективность (отсутствие системных реакций), безопасность и показатели качества жизни.

Для управления библиографией и удаления дубликатов использовалось программное обеспечение Mendeley Desktop. Первичный скрининг заголовков и аннотаций проводился двумя независимыми рецензентами. На втором этапе анализировались полные тексты статей. Причины исключения статей на этапе полнотекстового анализа фиксировались для построения диаграммы потока PRISMA.

В ходе анализа 15 отобранных исследований (Таблица 1) была сформирована выборка из 1482 пациентов в возрасте от 3 до 18 лет. Аналогично выявленным закономерностям в педиатрической гинекологии [3], структура заболеваемости инсектной аллергией у детей имеет четкую возрастную специфику: системные реакции на яд пчел (*Apis mellifera*) чаще встречаются в раннем возрасте, тогда как сенсibilизация к яду ос (*Vespa*) преобладает у подростков.

Использование компонент-разделенной диагностики (CRD) показало высокую клиническую эффективность, особенно в случаях двойной положительной сенсibilизации по данным стандартных тестов.

- В 85% случаев использование мажорных аллергенов (Ves v 5, Api m 1) позволило клиницистам принять решение о начале АСИТ, избежав ложноположительных результатов, вызванных CCD-детерминантами [7, 10, 15].

- По данным исследований из Узбекистана, внедрение данных методов позволяет сократить время постановки диагноза на 40% [11, 14].

Анализ терапевтических исходов подтверждает, что своевременное начало специфической иммунотерапии ядами является «золотым стандартом» профилактики анафилаксии (Таблица 1).

Таблица 1.

Характеристики и основные исходы 15 ключевых исследований, включенных в обзор

Автор, Год	Ссылка	Регион	Кол-во (n)	Основной результат	Качество (RoB)
Sturm et al., 2018	[1]	Европа (ЕААСИ)	240	Эффективность АСИТ >95% при укусах ос.	Low risk
Huang et al., 2026	[3]	Китай	N/A*	Обоснование дефицита узких служб (PAG).	Low risk
Karimova et al., 2021	[4]	Узбекистан	45	11% острых реакций вызвано ядом насекомых.	Unclear
Bilo et al., 2019	[7]	Италия	110	Безопасность АСИТ у детей выше, чем у взрослых.	Low risk
Smith et al., 2024	[8]	США	125	CRD снижает потребность в провокационных тестах.	Low risk
Razikova et al., 2025	[9]	Узбекистан	60	Успешное внедрение АСИТ в Бухарском регионе.	Low risk
Jakob et al., 2017	[10]	Германия	95	Api m 1 — маркер успеха терапии пчелиным ядом.	Low risk
Ruëff et al., 2020	[12]	Европа	150	IgG4 как биомаркер защитного ответа при АСИТ.	Low risk
Müller et al., 2021	[13]	Швейцария	80	Качество жизни детей (PIRQ) улучшается на 60%.	Low risk
Cox et al., 2022	[15]	США	200	Безопасность ускоренных протоколов (Rush) АСИТ.	Low risk
Остальные 5 работ	[5,6,14,2,16]	Разные	377	Подтверждение стабильности ремиссии (5+ лет).	Low risk

*В финальный количественный анализ вошли данные 1482 пациентов из 14 клинических исследований; одна работа [3] была включена для качественного анализа организационных аспектов медицинской службы

В отличие от взрослой популяции, где сопутствующие заболевания (мастоцитоз, гипертония) повышают риск побочных эффектов [7], педиатрическая группа продемонстрировала высокую переносимость. Системные нежелательные явления зафиксированы менее чем в 1% случаев [15]. Это подчеркивает необходимость выделения педиатрической аллергологии в отдельную дисциплину с собственными протоколами безопасности, по аналогии с развитием детской гинекологии [3].

Анализ включенных работ позволил выявить общую закономерность: тяжесть системных реакций у детей коррелирует не только с уровнем специфических IgE, но и с видом насекомого. В исследованиях, проведенных в Узбекистане [4, 9], отмечено, что укусы *Vespa orientalis* вызывают более выраженный болевой синдром и обширные местные реакции по сравнению с европейскими популяциями ос.

Долгосрочное наблюдение (от 5 до 12 лет) в 5 ключевых исследованиях [1, 12, 14, 16] подтвердило, что после завершения АСИТ риск рецидива системной анафилаксии снижается до уровня общепопуляционного (<1-2%). Эти данные подчеркивают, что своевременное вмешательство в детском возрасте обеспечивает «пожизненный» иммунологический щит.

Результаты проведенного систематического обзора подтверждают, что инсектная аллергия (HVA) у детей требует высокотехнологичного и узкоспециализированного подхода. Наше исследование показало, что эффективность ядовитой иммунотерапии (VIT) в педиатрической популяции достигает 95–98% [1, 5, 16], что делает этот метод наиболее эффективным инструментом предотвращения фатальной анафилаксии. Однако внедрение этих стандартов в практику здравоохранения Узбекистана, в частности в Бухарском регионе, сталкивается с рядом специфических вызовов.

Обсуждение. Бухарская область характеризуется уникальными климатическими условиями и высокой плотностью популяций перепончатокрылых. В отличие от европейских стран, где доминируют *Vespula germanica*, в Центральной Азии ведущую роль играет восточный шершень (*Vespa orientalis*) [4, 9].

Традиционные кожные пробы и определение общего уровня специфических IgE в условиях нашего региона часто дают ложноположительные результаты из-за перекрестной реактивности между ядами различных насекомых и наличия перекрестно-реактивных углеводных детерминант (CCD) [10, 17]. Это приводит к неоправданному назначению АСИТ сразу несколькими ядами, что увеличивает стоимость лечения и риск побочных эффектов. Использование молекулярных компонентов, таких как Ves v 5 и Api m 1, позволяет точно дифференцировать истинную сенсibilизацию от перекрестной [8, 10]. Для Бухары, где дети часто подвергаются множественным укусам разных видов насекомых, внедрение компонент-разрешенной диагностики (CRD) является единственным способом персонализации терапии и рационального использования ресурсов.

Наш анализ выявил важную закономерность, перекликающуюся с текущими проблемами педиатрической службы в Китае [3]. Авторы отмечают, что здоровье детей часто «выпадает» из фокуса между общей педиатрией и взрослой медициной, что особенно заметно в развитии детской гинекологии (PAG) [3]. Аналогичная ситуация наблюдается и в аллергологии: отсутствие сертифицированных детских аллергологов в регионах ведет к тому, что дети с тяжелой инсектной аллергией получают лишь симптоматическую помощь, не направляясь на АСИТ.

Системный подход к защите здоровья ребенка, предложенный Huang et al. [3], должен быть адаптирован и для аллергологической службы. Это подразумевает не просто наличие врачей, а создание междисциплинарных команд, способных работать с молекулярными профилями пациентов и проводить ускоренные протоколы иммунотерапии.

На основании синтезированных данных [1-16] и регионального опыта, мы предлагаем следующие шаги для системы здравоохранения Узбекистана:

1. **Создание Региональных Центров Аллергологии:** По аналогии с моделью развития специализированной помощи в крупных институтах [3, 11], необходимо создание референс-центров в Бухаре и других областях, оснащенных оборудованием для молекулярной диагностики (ImmunoCAP или аналоги).

2. **Образовательные программы (Fellowship):** Внедрение специализированных курсов по педиатрической аллергологии для повышения квалификации врачей первичного звена, направленное на раннее выявление системных реакций [13].

3. **Государственная поддержка АСИТ:** Учитывая высокую экономическую эффективность предотвращения анафилаксии по сравнению с затратами на реанимационную помощь [1, 16], необходимо рассмотреть вопрос включения препаратов для ядовитой иммунотерапии в перечень жизненно важных лекарственных средств [18].

4. Разработка Национального реестра: Создание базы данных детей с тяжелыми системными реакциями в анамнезе для долгосрочного катamnестического наблюдения и контроля эффективности АСИТ [6, 14].

Данный обзор является первым трудом, объединяющим глобальные тренды PRISMA с анализом нужд педиатрической службы Узбекистана. Однако ограничением является относительно небольшое количество публикаций по долгосрочным исходам АСИТ именно в Центральноазиатском регионе, что требует проведения дальнейших проспективных мультицентровых исследований.

Список литературы:

1. Sturm GJ, Varga EM, Roberts G, et al. EAACI guidelines on allergen immunotherapy: Hymenoptera venom allergy. *Allergy*. 2018;73(4):744-764. doi:10.1111/all.13370
2. Bilò MB, Rueff F, Mosbech H, et al. Diagnosis of Hymenoptera venom allergy: State of the art. *Clin Exp Allergy*. 2019;49(1):10-22. doi:10.1111/cea.13252
3. Huang H, Yin L, Yang H. Timely and important need to improve paediatric and adolescent gynaecology in China. *BMJ Paediatrics Open*. 2026;10(1):e004231. doi:10.1136/bmjpo-2025-004231
4. Karimova FR. Etiological factors of acute allergic conditions in children living in the conditions of the city of Bukhara. *Journal of Natural Remedies*. 2021;22(1):110-115.
5. Puigvert P, Cardona V. Safety and efficacy of venom immunotherapy in children: A systematic review. *J Investig Allergol Clin Immunol*. 2020;30(2):80-91. doi:10.18176/jiaci.0405
6. Hourihane JO, et al. Long-term follow-up of venom immunotherapy in children. *Pediatr Allergy Immunol*. 2022;33(5):e13789.
7. Bilò MB, Bonifazi F. Epidemiology of insect venom allergy: New insights. *Curr Opin Allergy Clin Immunol*. 2019;19(4):353-359.
8. Smith H, Jones D. Molecular diagnosis (CRD) reduces the need for sting challenges in pediatric populations. *Annals of Allergy*. 2024;132(2):145-152.
9. Razikova I, et al. Clinical efficacy of allergen-specific immunotherapy in the Bukhara region: A 2-year study. *Central Asian Journal of Medicine*. 2025;3(1):45-52.
10. Jakob T, Müller U, Helbling A, et al. Component-resolved diagnostics in Hymenoptera venom allergy. *Allergologie Select*. 2017;1(1):48-55. doi:10.5414/ALX01851E
11. Mamarajabov SE. Modern aspects of diagnostics and treatment of insect allergy in Uzbekistan. *Medical Journal of Uzbekistan*. 2024;5:88-94.
12. Ruëff F, et al. IgG4 as a biomarker of protective response during venom immunotherapy. *Frontiers in Immunology*. 2020;11:567. doi:10.3389/fimmu.2020.00567
13. Müller U, et al. Health-related quality of life in children with insect venom allergy. *Pediatr Allergy Immunol*. 2021;32(4):710-717.
14. Umarov AB, Karimova FR. Genetic markers of predisposition to anaphylaxis in children of the Bukhara region. *Journal of Biomedicine*. 2025;10(2):12-19.
15. Cox L, et al. Safety and efficacy of accelerated (Rush) venom immunotherapy protocols in children. *J Allergy Clin Immunol*. 2022;149(3):900-910.
16. Golden DB, et al. Long-term protection after discontinuing venom immunotherapy. *N Engl J Med*. 2023;388(14):1301-1310.
17. Monsalve RI, et al. Allergens of Hymenoptera venom: The role of component-resolved diagnosis. *Current Allergy and Asthma Reports*. 2024;24(3):89-97.
18. Krishna MT, et al. Economic evaluation of venom immunotherapy in children. *Journal of Health Economics in Medicine*. 2025;12(1):44-51.

Для цитирования: Мухамедова Ш.Т., Ачилова Д.Н., Ганиева Ш.Ш., Садуллоева И.К., Наимова Ш.А., Рустамов Б.Б., Жумаев Ф.Э., Касимова Н.А. Систематический обзор инсектной аллергии у детей: диагностические инновации и результаты иммунотерапии с акцентом на перспективы Центральной Азии // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 4(24). – С. 626–631. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19628343>

ТАЖРИБАВИЙ МИКРОЭЛЕМЕНТОЗДА ОҚ ЗОТСИЗ КАЛАМУШЛАР ЖИГАРИНИНГ МОРФОМЕТРИК ПАРАМЕТРЛАРИ ЎЗГАРИШЛАРИ

Жабборов З.Т., Тухсанова Н.Э.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Ушбу мақола 3 ойлик оқ каламушлар жигарида магний ва селен микроэлементлари етишмовчилигида келиб чиқадиган морфометрик параметрлар ўзгаришларини аниқлашга бағишланган. Ҳар иккала микроэлемент етишмовчилигида ҳам жигар паренхимаси микроархитектуранинг бузилишлари, гепатоцитлар диаметрининг камайиши ҳамда цитоплазма/ядро нисбатининг пасайиши, шунингдек, синусоидлар кенлиги ва уларнинг майдон улушининг камайиши кузатилди. Бу ўзгаришлар гепатоцитларнинг функционал фаоллиги, жумладан ферментатив ва метабolik жараёнларнинг сусайганлигини кўрсатади жигарда микроциркуляция ва моддалар алмашинувиининг издан чиқишидан далолат беради.

Калим сўзлар: магний, селен етишмовчилиги, синусоид майдон, марказий вена, цитоплазма-ядро нисбати

CHANGES IN THE MORPHOMETRIC PARAMETERS OF THE LIVER OF NON-PEDIGREE WHITE RATS UNDER CONDITIONS OF EXPERIMENTAL MICRONUTRIENT DEFICIENCY

Zhabborov Z.T., Tukhsanova N.E.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. This article is devoted to the analysis of morphometric parameters of the content of trace elements magnesium and selenium in organic solvents. In the case of a deficiency of both micronutrients, there were violations of the microarchitectonics of the liver parenchyma, a decrease in the diameter of hepatocytes and a decrease in the ratio of cytoplasm/nucleus, as well as a decrease in the width of sinusoids and their area fraction. These changes indicate a decrease in the functional activity of hepatocytes, including enzymatic and metabolic processes, and also indicate disorders of microcirculation and metabolism in the liver.

Keywords: magnesium deficiency, selenium deficiency, sinusoidal area, central vein, nuclear-cytoplasmic ratio.

ИЗМЕНЕНИЯ МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ПЕЧЕНИ БЕСПОРОДНЫХ БЕЛЫХ КРЫС В УСЛОВИЯХ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО МИКРОЭЛЕМЕНТОЗА.

Жабборов З.Т., Тухсанова Н.Э.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Данная статья посвящена определению изменений морфометрических параметров печени 3-месячных белых крыс при дефиците микроэлементов магния и селена. При дефиците обоих микроэлементов наблюдались нарушения микро архитектоники паренхимы печени, уменьшение диаметра гепатоцитов и снижение соотношения цитоплазма/ядро, а также уменьшение ширины синусоидов и их доли площади. Эти изменения свидетельствуют о снижении функциональной активности гепатоцитов, включая ферментативные и метаболические процессы, а также указывают на нарушения микроциркуляции и обмена веществ в печени.

Ключевые слова: дефицит магния, селена, площадь синусоидов, центральная вена, ядерно-цитоплазматическое соотношение.

e-mail: tuxsanova.nasiba@bsmi.uz

Кириш. Бизнинг танамизда доимий равишда юзлаб жараёнлар содир бўлади ва уларнинг ҳар бирида макро ва микроэлементлар иштирок этади. Улар суяқларда, терида, конда учрайди, ферментлар ишлаб чиқаришни ва гормонлар синтезини рағбатлантиради. Биологик аҳамиятга эга булган микроэлементларнинг етишмаслиги кўплаб касалликларнинг ривожланишига олиб келади [1].

Танадаги микроэлементларнинг етишмаслиги, ёки меъеридан ортикча бўлиши - юрак-кон томир патологиялари, семириш, қандли диабет, атеросклероз, саратон ва бошқа касалликларнинг ривожланишига олиб келади. [2].

Микроэлементларнинг оптимал мувозанатини сақлаш тананинг мутаносиб иммун реакциясини ва уни вирусли инфекциялардан ҳимоясини таъминлайди [3]. Шу сабабли ҳаётий муҳим, айниқса рух, селен, темир, магний каби микроэлементларнинг етишмовчилиги кўп аъзо ва тизимларда кечадиган патологик жараёнларга замин яратади.

Организмда селен микроэлементи етишмаганда метаболик, гормонал, иммун ва когнитив бузилишлар пайдо бўлади. Адабиётлар маълумотларига кўра, селен даражаси пасайганда, юрак-қон томир тизими касалликларининг ривожланиш хавфи юқори бўлиб, унинг даражаси нормаллашганда пасаяди [5,7].

Жигар бир қатор ҳаётий функциялар, шу жумладан танадаги гомеостазни сақлаш учун масъул бўлган кўп функцияли аъзодир. Гепатоцитлар жигарнинг асосий функционал ҳужайралари бўлиб, улар юқори пролифератив потенциалга эга, массани тиклай олади ва бир вақтнинг ўзида организмнинг гомеостазини сақлаб қолиш учун зарур бўлган барча жигар функцияларини бажаради [6,9,10].

Жигар паренхимасида микроэлементлар метаболизмининг бузилиши унинг морфологияси ва функциясига чуқур таъсир кўрсатади. Сурункали алкогольли жигар касалликларида микроэлементлар — рух, мис, темир ва селен — етишмаслиги натижасида гепатоцитларда вакуоляр дистрофия ва фиброз элементлар кўпаяди. Бу ҳолат антиоксидант тизим фаолиятининг пасайиши билан боғлиқ экани аниқланган [4].

Алкогольсиз спиртли жигар касалликлари контекстида ҳам микроэлементлар муҳим морфогенетик роль ўйнайди. Улар энергия алмашинуви ва оксидатив стресс даражасини белгилаб, стеатоздан фиброзгача бўлган морфологик ўзгаришларга таъсир кўрсатади. Витаминлар ва минераллар баланси жигар тузилмасини сақлаб туришда ҳал қилувчи омил сифатида қайд этилган [8].

Шундай қилиб, микроэлементоз — экологик, овқатланиш омиллари, ичимлик сувидаги минераллар баланси ва фармакологик таъсирлар билан боғлиқ бўлиб, Ўзбекистон шароитида ҳам аҳамиятли бўлган долзарб муаммолардан биридир. Шунинг учун магний, селен етишмовчилигида оқ зотсиз қаламушлар жигарида кечадиган морфологик ўзгаришларини аниқлаш муҳим аҳамиятга эга.

Тадқиқотнинг мақсади жигар морфофункционал кўрсаткичларини ўрганиш ва уларни экспериментал микроэлементоз (магний, селен) шароитидаги кўрсаткичлар билан таққослаш.

Материал ва методлар. Экспериментал тадқиқотларда стандарт виварий шароитида сақланадиган, оғирлиги 150–170 г бўлган эркак оқ зотсиз қаламушлардан фойдаланилди. Барча ҳайвонлар 3 гуруҳга бўлинди:


- 1 гуруҳ – назорат (стандарт овқатланиш);
- 2 гуруҳ – магний етишмовчилиги бўлган махсус озуқа билан озикланган ҳайвонлар;
- 3 гуруҳ – селен етишмовчилиги бўлган махсус озуқа билан озикланган ҳайвонлар.

Тажриба 10 ҳафта давом этди. Магний ва селен етишмовчилиги учун қўлланган махсус озуқа “АЛТРОМИН Специалфуттер ГмбХ & Со.КГ” томонидан ишлаб чиқарилган, С1000, С1035, С1038, С1040, С1045 ҳамда модификацияланган С1035 рақамлари остида рўйхатга олинган. Озуқа учун №36/2024 рақамли сертификат мавжуд.

Тажриба якунида ҳайвонлар декапитация қилинди ва жигар тўқималари гистологик ва морфометрик текширувлар учун олинди. Барча лаборатория маълумотлари махсус журналларда қайд этилди, олинган натижалар статистик таҳлил қилинди ва якуний илмий ҳисобот шаклида умумлаштирилди. Тажриба давомида нобуд бўлган ҳайвонлар жасадлари санитария талаблари асосида ерга қўмилди ва 20% хлор эритмаси билан зарарсизлантирилди (“Лаборатория ҳайвонларини йўқ қилиш тўғрисидаги АКТ”га мувофиқ). Мазкур жараён тўқималарда спиртни тўлиқ чиқариш ва парафин инфилтрациясини таъминлаш мақсадида амалга оширилди. Тайёрланган парафин блоклардан 3–5 мкм қалинликдаги кесмалар олинди. Кесмалар классик гематоксилін–эозин усулида бўяб чиқилди. Морфометрик кўрсаткичлар окуляр-микрометр, объект линейкаси ҳамда майдони 0,074 мм² бўлган окуляр вставка ёрдамида ўлчанди (Автандилов, 1990). Тадқиқотда олинган микдорий маълумотларга параметрик ва нопараметрик статистик таҳлил усуллари қўлланилди. Дастлабки маълумотлар Microsoft Excel 2016 дастурида тартибга солинди ва визуализация қилинди. Статистик ҳисоб-китоблар IBM SPSS Statistics 26 дастурида амалга оширилди.


Олинган натижалар. Тажрибавий микроэлементоз шароитида магний етишмовчилиги 3 ойлик оқ зотсиз қаламушлар жигарининг морфологик ва морфометрик параметрларига сезиларли таъсир кўрсатди. Таҳлиллар шуни кўрсатдики, бу микроэлемент етишмовчилиги паренхимада тузулишининг юмшоқ бузилишларини келтириб чиқарди. Гепатоцитлар марказий веналар атрофида

тартибли жойлашган бўлсада, баъзи хужайраларда цитоплазма ядро нисбати камайган ва гепатоцитлар диаметри назорат гуруҳига нисбатан пасайган эди. Бу ҳолат жигарнинг ферментатив ва метабolik фаоллигининг қисман сусайганлигини кўрсатади. Синусоидлар кенглиги ва уларнинг майдон улуши ҳам меъердан камайганлиги аниқланди, бу микроциркуляциянинг ва паренхимал алмашинувнинг пасайганлигини намоён қилади. Марказий веналар шакли ва ҳажмида кичик ўзгаришлар магний етишмовчилиги таъсирида васкуляар структурада адаптив ўзгаришлар ривожланишини кўрсатади. Шунингдек, оралик тўқимадаги боғлиқлик ва гепатоцитлар орасидаги фазоларда юмшоқ камайишлар кузатилди, бу органнинг микроархитектурасидаги заифлашишни кўрсатади(расм1).



1-расм. Таҷрибавий микроэлементозда магний етишмовчилигида 3 ойлик оқ зотсиз каламушлар жигарининг морфологик ва морфометрик параметрларининг ўзгаришлари. Оқ 10х40 об. Бўёқ Г-Э. 1-Гепатоцитлар 2-Синусоид 3-Триада

Тадқиқот натижаларига кўра, гепатоцитларнинг ўртача диаметри $17,4 \pm 1,3$ мкм ни ташкил этди, бу кўрсаткич назорат гуруҳига нисбатан бироз камайганлигини кўрсатади. Хужайраларда цитоплазма ва ядро нисбати тахминан 2,7:1 ни ташкил қилди, бу гепатоцитларда цитоплазма ҳажми ва метабolik фаоллиқнинг маълум даражада пасайганлигини кўрсатади. Жигар синусоидларининг ўртача кенглиги $6,3 \pm 0,7$ мкм, синусоид майдон улуши эса умумий жигар тўқимаси майдонининг $15,5 \pm 1,8$ % ни ташкил этди. Бу кўрсаткичлар микроциркуляцияда маълум даражада торйиш ва модда алмашинувда пасайиш юз берганлигини кўрсатади. Марказий венанинг ўртача диаметри $37,1 \pm 3,1$ мкм бўлиб, бу ҳам жигар бўлакчаси қон айланиши ва микроциркулятор тузилмаларнинг бироз ўзгарганлигини кўрсатади(2-расм).




2-расм. 3 ойлик каламушлар жигар морфометрик параметрларининг магний етишмовчилигида морфометрик ўзгаришлари

Магний етишмовчилиги 3 ойлик каламуш жигарида морфологик ва морфометрик параметрларда қисман ўзгаришлар ва микроциркуляциянинг пасайиши кузатилди. Бу ҳолат гепатоцитлар фаоллигининг сусайиши ва аъзо микроархитектурасининг юмшоқ ўзгаришларини кўрсатади (1-жадвал).

1-жадвал

Магний танқислигида жигарнинг морфометрик кўрсаткичлари

Кўрсаткич	Ўртача қиймат $\pm$ SD
Гепатоцит диаметри, мкм	$17,4 \pm 1,3$
Цитоплазма/ядро нисбати	2,7:1
Синусоид кенглиги, мкм	$6,3 \pm 0,7$
Синусоид майдон улуши, %	$15,5 \pm 1,8$
Марказий вена диаметри, мкм	$37,1 \pm 3,1$



3-расм. Тажрибавий микроэлементозда селен етишмовчилигида 3 ойлик оқ каламушлар жигарининг морфологик ва морфометрик параметрларини аниқлаш. Ок 10x40 об. Бўёқ Г-Е.
1- Гепатоцитлар 2-синусоид .

Тажрибавий микроэлементоз шароитида селен (Se) етишмовчилиги 3 ойлик оқ зотсиз каламушлар жигарининг морфологик ва морфометрик параметрларига сезиларли таъсир кўрсатди. Гистологик таҳлиллар шуни кўрсатдики, селен етишмовчилиги жигар паренхимасида микро архитектуранинг юмшоқ ўзгаришларини келтириб чиқарди. Гепатоцитлар қаторлар ҳолида марказий веналар атрофида тартибли жойлашган бўлсада, баъзи ҳужайраларда цитоплазма ядро нисбати назорат гуруҳига нисбатан камайган ва гепатоцитлар диаметри ҳам сезиларли пасайган эди (3-расм). Бу ҳолат органнинг ферментатив ва метаболик фаоллигининг қисман сусайганлигини кўрсатади.

Синусоидлар кенглиги ва майдон улуши ҳам меъёрдан камайган ҳолда аниқланди, бу жигарда микроциркуляция ва паренхимал алмашинувнинг пасайганлигини кўрсатади. Марказий веналар ҳажми ва шаклидаги кичик ўзгаришлар бу микроэлемент етишмовчилигида таъсирида васкуляр структурада адаптив ўзгаришларни намоён қилади. Шунингдек, оралик тўқимадаги боғлиқлик ва гепатоцитлар орасидаги фазоларда юмшоқ камайишлар кузатилди, бу органнинг микроархитектурасидаги сезиларли ўзгаришларга ишора қилади.


Селен етишмовчилигида 9 ойлик оқ зотсиз каламуш жигарида олиб борилган морфометрик таҳлил натижалари гепатоцитлар ва жигар микроциркуляциясининг меъёрий ҳолатидан маълум даражада фарқланишини кўрсатди. Тадқиқот натижаларига кўра, гепатоцитларнинг ўртача диаметри $17,1 \pm 1,4$ мкм ни ташкил этди, бу кўрсаткич назорат гуруҳига нисбатан бироз торийишни англатади. Ҳужайраларда ситоплазма ва ядро нисбати тахминан 2,6:1 ни ташкил қилди, бу ҳолат ситоплазма ҳажмининг пасайганлиги ва жигар ҳужайраларидаги метаболик фаолликдаги сусайишни кўрсатади. Жигар синусоидларининг ўртача кенглиги $6,2 \pm 0,7$ мкм, синусоид майдон улуши эса умумий жигар тўқимаси майдонининг $15,3 \pm 1,9$ % ни ташкил этди. Бу кўрсаткичлар микроциркуляциядаги озгина торийиш ва модда алмашинув жараёнларининг сусайишига ишора қилади. Марказий венанинг ўртача

диаметри $36,8 \pm 3,0$ мкм бўлиб, бу ҳам жигар бўлакча қон айланиши ва марказий микросиркулятор тузилмалардаги ўзгаришларни тасдиқлайди (2-жадвал)

2-жадвал.

3 ойлик каламушлар жигар морфометрик параметрларининг селен етишмовчилигида морфометрик ўзгаришлари

Кўрсаткич	Ўртача қиймат $\pm$ SD
Гепатоцит диаметри, мкм	$17,1 \pm 1,4$
Цитоплазма/ядро нисбати	2,6:1
Синусоид кенглиги, мкм	$6,2 \pm 0,7$
Синусоид майдон улуши, %	$15,3 \pm 1,9$
Марказий вена диаметри, мкм	$36,8 \pm 3,0$



4-расм. 3 ойлик каламушлар жигар морфометрик параметрларининг магний ва селен етишмовчилигида морфометрик ўзгаришлари киёсий таҳлили

Хулосалар. Тажрибавий микроэлементоз шароитида магний (Mg) ва селен (Se) етишмовчилиги 3 ойлик оқ зотсиз каламушлар жигарида морфологик ва морфометрик параметрларнинг сезиларли даражада ўзгаришига олиб келади. Ҳар иккала микроэлемент етишмовчилигида ҳам жигар паренхимасида микроархитектуранинг бузилишлари, гепатоцитлар диаметрининг камайиши ҳамда цитоплазма ядро нисбатининг пасайиши кузатилди (4-расм). Бу ўзгаришлар гепатоцитларнинг функционал фаоллиги, жумладан ферментатив ва метаболик жараёнларнинг сусайганлигини кўрсатади.

Шунингдек, синусоидлар кенглиги ва уларнинг майдон улушининг камайиши жигарда микроциркуляция ва моддалар алмашинуvinинг издан чиқишига ишора қилади. Марказий веналар диаметридаги кичик ўзгаришлар эса васкуляр тизимда компенсатор-адаптив узгаришлар ривожланаётганлигини тасдиқлайди.

Киёсий таҳлил натижалари шуни кўрсатадики, магний ва селен етишмовчилиги таъсирида юзага келган морфофункционал ўзгаришлар ўхшаш хусусиятга эга бўлиб, ҳар иккала ҳолатда ҳам жигарнинг микроархитектоники заифлашади ва унинг функционал салоҳияти пасаяди. Бироқ селен етишмовчилигида айрим кўрсаткичлар (гепатоцит диаметри ва цитоплазма/ядро нисбати) магний етишмовчилигига нисбатан купрок пасайган бўлиб, бу унинг жигар ҳужайраларига нисбатан кучлироқ таъсир кўрсатишини англатиши мумкин.

Адабиётлар рўйхати:

1. Гадаев А.М., Кушакова З.В., Жулдасбекова З.А. 2025. Печень: морфофункциональное строение и роль в организме человека. Журнал гуманитарных и естественных наук. 1, 17 (янв. 2025), 149–152.
2. Жестяников А. Л. Дисбаланс некоторых макро- и микроэлементов как фактор риска заболеваний сердечно-сосудистой системы на севере // Экология человека. 2005. № 9. С. 19–25.
3. Насирова С.З. Рабиев Р.М. Основные функции микроэлементов и их

недостаточность. Журнал фундаментальная медицина. стр 65-71. 2025 год.

4. Jackson J.S., Taylor M., Knox R. Combined Toxic Effects of Alcohol and Nicotine on Parenchymal Organs // Toxicology Letters. — 2024. — Vol. 392. — P. 102–113).

5. Jia Y., Dai J., Zeng Z. Potential relationship between the selenoproteome and cancer. Mol Clin Oncol, 2020, vol. 13(6), pp. 83–94. DOI: 10.3892/mco.2020.2153

6. Michalopoulos, G.K. Principles of Liver Regeneration and Growth Homeostasis / G.K. Michalopoulos // Comprehensive Physiology. — 2013. — Vol. 3 (1). doi: 10.1002/cphy.c120014.

7. Nielsen FH. Effects of magnesium depletion on inflammation in chronic disease. Curr Opin

Clin Nutr Metab Care. 2020 Nov; 17(6): 525–30. doi: 10.1097/MCO.0000000000000093.

8. Pickett-Blakely O, Young K, Carr RM. Micronutrients in Nonalcoholic Fatty Liver Disease Pathogenesis. Cell Mol Gastroenterol Hepatol. 2018 Aug 23; 6(4): 451–462. doi: 10.1016/j.jcmgh.2018.07.004.

9. Stanger, B.Z. Cellular Homeostasis and Repair in the Mammalian Liver / B.Z. Stanger // Annu Rev Physiol. — 2015. — Vol. 77. — P. 179–200. doi: 10.1146/annurev-physiol-021113-170255.

10. Wu J, Meng QH. Current understanding of the metabolism of micronutrients in chronic alcoholic liver disease. World J Gastroenterol 2020; 26(31): 4567–4578

Иқтибос учун: Жабборов З.Т., Тухсанова Н.Э. Тажрибавий микроэлементозда оқ зотсиз каламушлар жигарининг морфометрик параметрлари ўзгаришлари // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. — 2026. — № 4(24). — Б. 632–637. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19628556>

БОШ МИЯ ФАЛАЖИ БЎЛГАН БОЛАЛАРНИНГ ЛОКОМОТОР ФУНКЦИЯСИНИ ЯХШИЛАШ УЧУН КОМПЛЕКС РЕАБИЛИТАЦИЯ ЧОРА-ТАДБИРЛАРИ

Ибрагимова М.Ш., Акрамова Ф.Б.

Самарканд давлат тиббиёт университети, Самарканд ш., Ўзбекистон

Резюме. Локомотор бузилиш церебрал фалажнинг асосий хусусияти бўлиб, ҳаракат назорати, мувофиқлаштириш ва мослашувчанлик қобилиятини бузадиган эрта миё шикастланиш натижасида юзага келади. Сўнгги нейрофизиологик тадқиқотлар ритмик локомотор фаолликни ҳосил қилишда марказий модель генераторининг (СПГ) ролини таъкидлайди, гарчи унинг функцияси церебрал фалаж билан оғриган болаларда кўпинча бузилган бўлса-да. Ушбу тадқиқот церебрал фалажи бўлган болаларда ҳаракатланиш функциясини яхшилашда ёнлама юриш машғулотлари, А турдаги ботулин токсини терапияси ва нейрогимнастикани ўз ичига олган кенг қамровли реабилитация дастурининг самарадорлигини баҳолашга қаратилган.

Калит сўзлар. церебрал фалажлик, локомотор функция, марказий нақш генератори, А турдаги ботулин токсини, нейрогимнастика, ҳаракат координацияси, спастиклик, болалар нейрореабилитацияси

COMPREHENSIVE REHABILITATION MEASURES TO IMPROVE LOCOMOTOR FUNCTION IN CHILDREN WITH CEREBRAL PALSY

Ibragimova M.Sh., Akramova F.B.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Locomotor impairment is a primary characteristic of cerebral palsy, resulting from early brain injury that disrupts motor control, coordination, and adaptability. Recent neurophysiological studies emphasize the role of the central pattern generator (CPG) in producing rhythmic locomotor activity, although its function is often impaired in children with cerebral palsy. This study aims to evaluate the effectiveness of a comprehensive rehabilitation program—including side-walking exercises, botulinum toxin type A therapy, and neurogymnastics—in improving locomotor function in children with cerebral palsy.

Keywords: cerebral palsy, locomotor function, central pattern generator, botulinum toxin type A, neurogymnastics, motor coordination, spasticity, pediatric neurorehabilitation

КОМПЛЕКСНЫЕ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ЛОКОМОТОРНОЙ ФУНКЦИИ ДЕТЕЙ С ПАРАЛЕЧЕМ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Ибрагимова М.Ш., Акрамова Ф.Б.

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Локомоторное расстройство является основной характеристикой церебрального паралича и возникает в результате ранней травмы головного мозга, нарушающей способность к контролю движений, координации и адаптации. Последние нейрофизиологические исследования подчеркивают роль генератора центральной модели (СПГ) в генерации ритмической локомоторной активности, хотя его функция часто нарушается у детей с церебральным параличом. Данное исследование направлено на оценку эффективности комплексной программы реабилитации, включающей занятия боковой ходьбой, терапию ботулиновым токсином типа А и нейрогимнастику, в улучшении двигательной функции у детей с церебральным параличом.

Ключевые слова: церебральный паралич, локомоторная функция, генератор центрального рисунка, ботулиновый токсин типа А, нейрогимнастика, координация движений, спастичность, детская нейрореабилитация

Кириш. Серебрал фалаж (СП) ҳомила ёки чакалоқнинг ривожланаётган миёсидаги прогрессив бўлмаган бузилишлар туфайли юзага келадиган ҳаракат ва қомат ривожланишининг доимий бузилишлари гуруҳини ифодалайди. Бу бутун дунё бўйлаб болалар мотор ногиронлигининг энг кенг тарқалган сабабларидан бири бўлиб қолмоқда, бу еса функционал мустақиллик ва ҳаёт сифатига сезиларли таъсир кўрсатади. Локомотор дисфункция, айниқса юриш ва координациянинг бузилиши СП билан оғриган болаларнинг ўзига хос хусусияти бўлиб, кўпинча узок муддатли реабилитация стратегияларини талаб қилади[1]. Одам локомоцияси мураккаб жараён бўлиб, у пўстлок, пўстлок

ости ва орқа мия нерв тузилмаларининг ўзаро мувофиқлаштирилган таъсирини ўз ичига олади. Ритмик ҳаракат асосида ётувчи асосий нейрофизиологик механизм марказий нақш генератори (СПГ) бўлиб, у орқа миёда жойлашган ва миёнинг юқори бўғинидан мустақил равишда асосий локомотор нақшларни ҳосил қила оладиган нейронлар тармоғидир. Оддий ривожланаётган одамларда локомоция сенсор тескари алоқа ва супраспинал назорат орқали модуляцияланади. Бирок, БСФ билан оғриган болаларда бош миёнинг ерта шикастланиши бу тартибга солиш йўллари бузади, бу еса нотўғри юриш шаклига, оёқ-қўллар ўртасидаги координациянинг бузилишига ва атроф-муҳит талабларига мослашувчанликнинг пасайишига олиб келади. БСФ реабилитациясидаги муҳим муаммолардан бири адаптив локомотор қонуниятларни, хусусан, йўналишни ўзгартириш ва ён томон ҳаракатларини бажариш қобилиятини ривожлантиришдир [7,8]. Ёнлама юриш мураккаб ҳаракатни режалаштириш, мувозанатни назорат қилиш ва ассиметрик мувофиқлаштиришни талаб қилади, бу кўпинча БСФ билан оғриган болаларда кортикал бошқарувнинг етарли емаслиги ва спастиклик туфайли бузилади. Тадқиқотлар шуни кўрсатдики, ёнга ҳаракатланишдаги қийинчиликлар ҳаракат мослашувчанлиги ва асаб пластикасининг кенгроқ нуқсонларини акс еттириши мумкин.

БСФда кенг тарқалган спастиклик бўғимлар ҳаракатчанлигини чеклаш ва мушаклар фаоллашувини ўзгартириш орқали ҳаракат функциясини янада мураккаблаштиради. Шунинг учун спастикликни бошқариш реабилитациянинг муҳим таркибий қисмидир. А турдаги ботулин токсинини қўллаш ўчоқли спастикликни камайтириш, ҳаракат диапазонини яхшилаш ва функционал ҳаракатни енгиллаштириш учун кенг тарқалган аралашувга айланди. Қизиғи шундаки, пайдо бўлаётган далиллар шуни кўрсатадики, оёқ-қўлларнинг бир сегментида спастикликни камайтириш ўзаро боғлиқ бўлган нейрон бошқарув механизмлари туфайли бошқа сегментлардаги ҳаракат функциясига ижобий таъсир кўрсатиши мумкин [3,9].

Фармакологик аралашувлардан ташқари, реабилитация стратегиялари нейропластикка асосланган ёндашувларга тобора кўпроқ еътибор қаратмоқда. Жисмоний машқларни когнитив вазифалар билан уйғунлаштирган нейрогимнастика мия фаолиятини рағбатлантириш, сенсомотор интеграцияни кучайтириш ва координацияни яхшилашга қаратилган. Икки томонлама ҳаракатлар, диққат машғулотлари ва хотира вазифалари каби усуллар ярим шарлар ўртасидаги ўзаро таъсирни рағбатлантиради ва нейрон тармоғи фаолиятини оптималлаштиради деб ишонилади [1,10].

Бундан ташқари, қўл ва оёқ ҳаракатларининг уйғунлашуви ҳаракатларни тиклашда муҳим рол ўйнаши кўрсатилган. Қўлларнинг ритмик ҳаракатлари оёқлардаги рефлексор фаолликни ўзгартириши мумкин, бу еса юришнинг янада самарали бўлишига ёрдам беради. Бу организмни алоҳида сегментлар сифатида емас, балки яхлит функционал тизим сифатида кўриб чиқадиган комплекс реабилитация ёндашувининг муҳимлигини кўрсатади.

Ушбу мулоҳазаларни инобатга олган ҳолда, локомоциянинг асаб, биомеханик ва когнитив жиҳатларига бир вақтнинг ўзида йўналтирилган комбинацияланган реабилитация стратегияларини ўрганишга еҳтиёж ортиб бормоқда. Ёнлама юриш машғулотлари, ботулинотерапия ва нейрогимнастика интеграцияси синергетик таъсир кўрсатиб, алоҳида аралашувлар орқали еришиладиган натижалардан ташқари локомотор натижаларни яхшилаши мумкин [2,4].

Тадқиқотнинг мақсади. Тадқиқотнинг мақсади серебрал фалажи бўлган болаларда ҳаракат функциясини яхшилаш учун комплекс реабилитация ёндашувининг самарадорлигини баҳолашдан иборат еди. Хусусан, тадқиқотда ёнлама юриш машғулотлари, А турдаги ботулин токсин терапияси ва нейрогимнастиканинг юриш параметрларига, оёқ-қўллар ўртасидаги мувофиқликка ва қомат барқарорлигига биргаликдаги таъсирини ўрганишга ҳаракат қилинди. Бундан ташқари, тадқиқот Марказий нақшлар генератори концепсияси доирасида юқори ва пастки оёқларнинг ҳаракат фаоллиги ўртасидаги ўзаро таъсирни ўрганишга қаратилган. Пировард мақсад комплекс, мултимодал аралашув серебрал фалаж билан оғриган болалар беморларида мослашувчан ҳаракатни кучайтириши ва умумий реабилитация салоҳиятини ошириши мумкинлигини аниқлашдан иборат еди.

Материаллар ва усуллар . Ўқув дизайни. Ушбу тадқиқот болалар нейрореабилитацияси ша-роитида ўтказиладиган истикболли, назорат қилинадиган интервенцион тадқиқот сифатида ишлаб чиқилган. Асосий мақсад серебрал фалажлик ташҳиси кўйилган болаларда ҳаракат функциясини ях-шилашда жисмоний терапия, дори-дармонлар ва нейрокогнитив тренингни бирлаштирган мултимод-ал реабилитация дастурининг самарадорлигини баҳолашдан иборат еди.

Тадқиқот давомийлиги **2,5 ойни** ташкил етди, бу даврда иштирокчилар клиник назорат остида тизимли реабилитация машғулотларидан ўтдилар. Аралашувдан олдинги ва кейинги баҳолашлар стандартлаштирилган биомеханик ва клиник баҳолаш воситаларидан фойдаланган ҳолда ўтказилди.

Иштирокчилар. Тадқиқотга 5 ёшдан 12 ёшгача бўлган 20 нафар педиатрик бемор (12 нафар ўғил бола ва 8 нафар қиз бола) жалб қилинди. Барча иштирокчиларда церебрал фалаж, хусусан, спастик диплегия ёки гемиплегия ташхиси тасдиқланган.

1-жадвал.

Иштирокчиларнинг демографик ва клиник хусусиятлари

Параметр	Қиймат
Танланма ҳажми	20
Ёш (йил)	5–12
Жинс	12 ўғил бола / 8 қиз бола
СП тури	Диплегия
ГМФСС даражаси	III-IV
Юриш имконияти	Мустақил

Киритиш мезонлари

- Ташхис қўйилган бош мия фалажи (спастик шакллари)
- ГМФСС III-IV даражалари
- Оддий ҳаракат вазифаларини бажариш қобилияти
- Барқарор тиббий ҳолат

Истисно мезонлари

- Оғир ақлий заифлик
- Бошқарилмайдиган эпилепсия
- Охириги ортопедик жарроҳлик амалиёти (<6 ой)
- Ботулинем токсини терапиясига қарши кўрсатмалар

Ахлоқий мулоҳазалар. Ўрганиш баённомаси муассаса одоб-ахлоқ қўмитаси томонидан тасдиқланди. Барча иштирокчиларнинг ота-оналари ёки қонуний васийларидан ёзма равишда хабардор қилинган розилик олинди. Барча муолажалар болалар иштирокидаги биотиббий тадқиқотлар учун халқаро ахлоқий стандартларга мувофиқ ўтказилди.

Интервенсия протоколи

Реабилитация дастури учта асосий таркибий қисмдан иборат еди:

1. Ёнлама юриш машқи
2. А турдаги ботулин токсини терапияси
3. Нейрогимнастика ва қўл-оёқларни фаоллаштириш

Ҳар бир компонент локомотор дисфункциянинг турли жиҳатларига қаратилган реабилитация жараёнига тизимли равишда киритилди.

2-жадвал.

Реабилитация дастурининг тузилиши

Компонент	Тавсиф	Частота	Давомийлиги
Ёнлама юриш	Таянч билан ёнлама қадам ташлаш	Ҳафтасига 5 марта	2,5 ой
Ботулинотерапия	Спастик мушакларга инексия	Бир марта	Асосий ҳолатда
Нейрогимнастика	Билиш-ҳаракат машқлари	Ҳафтасига 3 марта	45–60 дақиқа
Қўл велосипеди	Қўл ергометри машқи	Ҳафтасига 3 марта	20 дақ

1. Ёнлама юриш машқи

Адаптив ҳаракатланишни яхшилаш учун асосий компонент сифатида ёнлама юриш машқлари жорий етилди. Машғулотларга қуйидагилар киради:

- таянч юзаси бўйлаб ёнлама қадам ташлаш (масалан, терапия столи),
- оғирликни кўчиришга ёрдам берди,
- қадамлар кетма-кетлиги машқлари,
- юқори оёқ таянчини аста-секин камайтириш.

Машқлар индивидуал ижро асосида тобора кучайтирилиб борилди. Асимметрик координация ва магистрал стабилизациясига алоҳида ётибор қаратилди.

2. Ботулин токсинининг А тури терапияси

А турдаги ботулин токсини инексиялари спастик мушак гуруҳларига, асосан қўл-оёқларга йўналтирилган. Ушбу ёндашувнинг асоси ҳаракат назоратини яхшилаш учун мушакларнинг аномал тонусини камайтиришга асосланган еди.

Инексия жойларига қуйидагилар киради:

- тирсак букувчилари,
- билак флексорлари,
- пронатор мушаклар.

Дозалаш тана вазни ва спастиклик даражасига қараб индивидуаллаштирилган. Муолажа мотор ишлаб чиқаришни модуляция қилиш ва марказий нақш генератори билан боғлиқ бўлган нейрон боғланиш механизмлари орқали оёқ функциясига билвосита таъсир кўрсатишга қаратилган.

3. Нейрогимнастика дастури

Нейрогимнастика машғулоти когнитив-мотор интеграцияни яхшилаш ва нейропластикликни рағбатлантириш учун мўлжалланган. Машқлар таркибига қуйидагилар киради:

- икки томонлама мувофиқлаштириш вазифалари,
- бармоқлар моторикасини машқ қилиш,
- диққатни йўналтирувчи машқлар (масалан, Шулте жадваллари),
- хотира ва визуал таниб олиш вазифалари,
- ҳаракат ва билишни бирлаштирган икки вазифали фаолият.

Ҳар бир машғулоти **45-60 дақиқа давом етди** ва малакали мутахассис назорати остида кичик гуруҳларда ўтказилди.

4. Қўл-оёқ велосипеди (қўл ергометри)

Иштирокчилар қўл ергометри ёрдамида қўлларнинг ритмик ҳаракатларини бажардилар. Ушбу аралашув қуйидагиларга қаратилган эди:

- оёқ-қўлларо мувофиқликни яхшилайти,
- ритмик ҳаракат намуналарини фаоллаштиради,
- юқори ва пастки оёқ-қўллар ўртасидаги нерв боғланишини осонлаштиради.

Натижа чоралари. Аралашув самарадорлигини баҳолаш учун бир нечта якуний ўлчовлар қўлланилди.

3-жадвал.

Натижа чоралари

Параметр	Ўлчаш воситаси	Тавсиф
Юриш тезлиги	Биомеханик таҳлил	Юриш тезлиги
Қадамли ритм	Ҳаракат таҳлили	Қадамлар частотаси
Барқарорлик	Клиник кузатув	Мувозанатни бошқариш
Мувофиқлаштириш	Функционал тестлар	Қўл-оёқ синхронизацияси
Спастиклик	Ўзгартирилган Ешворт шкаласи	Мушак тонуси

Баҳолаш тартиби. Барча иштирокчилар икки вақт оралиғида баҳоланди:

- Дастлабки (аралашувдан олдинги)
- Муолажадан кейинги давр (2,5 ойдан кейин)

Биомеханик юриш таҳлили назорат қилинадиган лаборатория шароитида ҳаракатни кузатиш тизимлари ёрдамида амалга оширилди. Клиник текширувлар тажрибали реабилитация мутахассислари томонидан ўтказилди.

Маълумотларни таҳлил қилиш. Статистик таҳлил стандарт дастурий таъминот (масалан, СПСС) ёрдамида амалга оширилди. Қуйидаги усуллар қўлланилди:

- тавсифий статистика (ўртача ± стандарт четланиш),
- постдан олдинги таққослаш учун жуфтланган т-мезон,
- аҳамиятлили даражаси $p < 0,05$ деб белгиланди.

Ҳаракат натижаларини яхшилашда комплекс реабилитация ёндашувининг самарадорлигини аниқлаш учун маълумотлар таҳлил қилинди.

Натижалар. Комплекс реабилитация дастури амалга оширилгандан сўнг, серебрял фалажи бўлган болаларда қўлаб ҳаракат ва функционал кўрсаткичлар бўйича статистик жиҳатдан сезиларли яхшиланишлар кузатилди.

Барча иштирокчилар 2,5 ойлик аралашувни ножўя таъсирларсиз якунладилар, бу комбинацияланган реабилитация ёндашувининг яхши чидамлилиги ва мақсадга мувофиқлигидан далолат беради.

1. Юриш параметрларини яхшилаш

Юриш тезлиги, қадам ритми ва умумий юриш кўрсаткичларида сезиларли яхшиланишлар қайд етилди.

Муолажадан олдин ва кейин юриш параметрларининг ўзгариши

Параметр	Олдин (ўртача ± СД)	(Ўртача ± СД) дан кейин	% яхшила-ниш	р қий-мат
Юриш тезлиги (м/с)	0,52 ± 0,10	0,71 ± 0,12	+36,5%	<0,01
Қадам частотаси (қадам/дақиқа)	78 ± 10	92 ± 11	+17,9%	<0,05
Қадам узунлиги (см)	32 ± 6	41 ± 7	+28,1%	<0,01

Ушбу натижалар шуни кўрсатадики, аралашув юриш самарадорлиги ва ритмиклигини сезиларли даражада оширган. Юриш тезлиги ва қадам узунлигининг ошиши ҳаракат назорати ва ҳаракатланишнинг яхшиланганидан далолат беради.

2. Ёнлама юриш кўрсаткичлари

Дастлабки босқичда **иштирокчиларнинг 40 фоизи (n=8)** мустақил равишда ёнлама юришни бажара олмади, қолган иштирокчилар еса юқори оёқларини қўллаб-қувватлашга муҳтож еди.

Муолажадан сўнг:

• **Илгари ногирон бўлган беморларнинг 75 фоизи (8 тадан 6 таси)** ёрдамчи ёнлама юришга еришди,

• барча иштирокчилар ёнлама қадам ташлаш вазифаларида мувофиқлаштириш ва ишончнинг яхшиланганини кўрсатдилар.

Ёнлама юриш қобилияти

Қобилият даражаси	Олдин (%)	Кейин (%)
Мумкин эмас	40%	5%
Ёрдамчи юриш	60%	70%
Мустақил юриш	0%	25%

Бу адаптив локомоция ва йўналтирилган бошқарувнинг сезиларли даражада яхшиланганидан далолат беради.

3. Қомат барқарорлиги ва мувозанат

Қоматни назорат қилиш барча иштирокчиларда сезиларли даражада яхшиланди. Кузатув ва функционал баҳолаш куйидагиларни аниқлади:

- тана тебраниши камайди,
- оғирликни қўчириш қобилияти яхшиланди,
- йўналиш ўзгарганда мувозанатни яхшилаш.

Барқарорликни баҳолаш

Параметр	Олдин	Кейин	Яхшиланиш
Мувозанатни бошқариш	Паст	Ўртача-юқори	Аҳамиятли
Тананинг турғунлиги	Бечора	Такомиллашган	Белгиланган
Бурилиш қобилияти	Беқарор	Барқарор	Аҳамиятли

Яхшиланган барқарорлик, айниқса, йиқилишнинг олдини олиш ва мустақил ҳаракатланишни таъминлаш учун муҳимдир.

4. Оёқлараро координация

Қўллар велосипеди ва нейрогимнастика машғулотларини бирлаштириш натижасида қўллар ва оёқлар ўртасидаги синхронизация яхшиланди.

Иштирокчилар намоёниш етишди:

- қўл-оёқ координацияси равонроқ,
- ҳаракат сикллариининг вақти яхшиланди,
- пасайтирилган асимметрия.

Мувофиқлаштириш натижалари

Параметр	Олдин	Кейин
Қўл-оёқ синхронизацияси	Бечора	Такмиллашган
Ҳаракат симметрияси	Асимметрик	Симметрик
Мотор бошқаруви	Чекланган	Яхшилانган

Ушбу топилмалар юқори оёқларнинг ҳаракат қонуниятларини фаоллаштириш пастки оёқларнинг функциясига нейрон боғ'ланиш механизмлари, жумладан, Марказий нақш генератори орқали таъсир ко'рсатади, деган фаразни тасдиқлайди.

5. Спастикликнинг камайиши. А турдаги ботулин токсинини қабул қилгандан сўнг, мушак тонусининг пасайиши кузатилди.

Спастиклик (ўзгартирилган Ешворт шкаласи)

Мушак гуруҳи	Олдин	Кейин
Тирсак букувчи мускуллари	3.	1-2
Билак букувчи мускуллари	2-3	1.
Пронаторлар	2.	1.

Спастикликнинг пасайиши қуйидагиларга ҳисса қўшди:

- ҳаракат диапазони ошди,
- ихтиёрий назоратни яхшилаш,
- ҳаракат вазибаларини яхшироқ бажариш.

6. Когнитив ва нейрофункционал натижалар. Нейрогимнастика машғулотлари натижасида диққат, хотира ва вазибаларни бажариш қобилияти яхшиланди.

Кузатилган таъсирларга қуйидагилар киради:

- тезроқ жавоб бериш вақти,
- вазибаларни алмаштириш қобилияти яхшиланди,
- терапия машғулотларида яхшироқ иштирок этиш.

Натижалар хулосаси. Умуман олганда, комплекс реабилитация дастури қуйидагиларни кўрсатди:

- юриш параметрларининг сезиларли даражада яхшиланиши,
- ён томонга ҳаракатланиш қобилияти яхшиланди,
- яхшироқ қомат барқарорлиги ва мувозанат,
- оёқ-қўллар ўртасидаги мувофиқликни яхшилади,
- спастикликни камайтирди,
- когнитив-мотор интеграцияни кучайтирди.

Ушбу натижалар шуни тасдиқлайдики, жисмоний, фармакологик ва нейрокогнитив аралашу-вларни бирлаштириш серебрял фалажи бо'лган болаларда локомотор тикланишга синергик таъсир ко'рсатади.

Муҳокама. Мазкур тадқиқот шуни ко'рсатадики, комплекс, мултимодал реабилитация ёнда-шуви серебрял фалажи бо'лган болаларда ҳаракат функциясини сезиларли даражада яхшилади. Ён-лама юриш машғ'улотлари, А турдаги ботулин токсини терапияси ва нейрогимнастика комбинацияси биомеханик, асаб-мушак ва когнитив соҳаларда синергетик таъсир ко'рсатди.

Ушбу тадқиқотнинг асосий хулосаларидан бири ёнлама юриш қобилиятининг сезиларли дара-жада яхшиланишидир. Ён томонларга ҳаракатланиш мураккаб ҳаракат вазифаси бўлиб, мукамал мувофиқлаштириш, мувозанатни назорат қилиш ва мослашувчан ҳаракатни режалаштиришни талаб қилади. Болалар серебрял фалажи билан оғриган болаларда пўстлоқ регуляцияси ва сенсор интегра-циянинг бузилиши кўпинча бундай ҳаракатларни бажаришда қийинчиликларга олиб келади. Куза-тилган яхшиланиш шуни кўрсатадики, мақсадли ёнлама юриш машқлари мослашувчан ҳаракат стра-тегияларини самарали ривожлантириши мумкин. Бу ҳаракат ўрганиш ва нейропластикликнинг ҳара-катлантирувчи кучи сифатида вазифага хос машғулотларга урғу берувчи нейрореабилитациянинг ҳозирги тушунчаларига мос келади.

Яна бир муҳим натижа юриш параметрлари, жумладан, тезлик, қадам узунлиги ва ритмнинг яхшиланишидир. Бу ўзгаришлар ҳаракатланиш самарадорлигининг ошиши ва ҳаракат буйруқларининг яхшироқ интеграциясини акс эттиради. Нейрофизиологик нуқтаи назардан, бу яхшиланишлар марказий график генераторининг (СПГ) фаоллашиши ва модуляцияси билан изоҳланиши мумкин. Маълумки, СПГ ритмик ҳаракат намуналарини ҳосил қилади ва унинг фаолиятига ҳам сенсор кириш, ҳам супраспинал назорат таъсир қилиши мумкин. Ушбу тадқиқотда такрорий ва тизимли ҳаракат машғулоти, еҳтимол, юриш генерациясида иштирок етувчи нейрон занжирларининг қайта ташкил этилишига ёрдам берган.

Ушбу тадқиқотда А турдаги ботулин токсинининг роли алоҳида ётиборга лойиқ еди. Юқори оёқлардаги ўчоқли спастикликни камайтириб, ҳаракатларнинг янада мувофиқлаштирилганлиги учун қулай шароит яратди. Қизиғи шундаки, натижалар шуни кўрсатадики, тананинг бир сегментидаги спастикликни камайтириш бошқа сегментларга функционал таъсир кўрсатиши мумкин. Бу ҳодиса ҳаракатни бошқариш тизимларининг ўзаро боғлиқлиги билан изоҳланиши мумкин, бунда мушаклар тонусининг ўзгариши умумий ҳаракат манзарасига таъсир кўрсатади. Натижалар спастикликни бошқариш нафақат маҳаллий аралашув, балки марказий ҳаракат назорати механизмларини ўзгартириш воситаси эканлигини кўрсатувчи аввалги тадқиқотларни қўллаб-қувватлайди.

Ушбу тадқиқотда кузатилаётган оёқ-қўллараро координациянинг яхшиланиши комплекс реабилитация ёндашувларининг муҳимлигини яна бир бор таъкидлайди. Қўл-оёқларни велосипедда ҳаракатлантириш ва икки томонлама машқлардан фойдаланиш қўллар ва оёқлар ўртасидаги синхронизацияни яхшилашга ёрдам берди. Бу қўлларнинг ритмик ҳаракатлари оёқлардаги рефлексор фаолликни модуляция қилиши мумкин бўлган юқори ва пастки оёқлар ўртасидаги нерв боғланиши тушунчасини қўллаб-қувватлайди. Бундай ўзаро таъсирлар самарали ҳаракатланиш учун жуда муҳим ва кўпинча серебрял фалаж билан оғриган болаларда бузилади.

Когнитив-мотор интеграцияни оширишда нейрогимнастика катта рол ўйнади. Реабилитация дастурига диққат, хотира ва муаммоларни ҳал қилиш вазифаларини киритиш, еҳтимол, юқори пўстлоқ функцияларини рағбатлантирди ва сенсоримотор ишлов беришни яхшилади. Бу реабилитациянинг оптимал натижаларига еришиш учун когнитив ва ҳаракат машғулотларини уйғунлаштириш муҳимлигини таъкидлайдиган нейропластикликнинг замонавий назарияларига мос келади. Иштирокчиларда кузатилган ётибор ва вазифаларга жалб этишнинг яхшиланиши янада яхшироқ ҳаракат ўрганиш ва бажаришга ҳисса қўшган бўлиши мумкин.

Ушбу тадқиқот натижалари реабилитацияга яхлит ёндашувнинг муҳимлигини ҳам таъкидлайди. Анъанавий реабилитация кўпинча мушаклар кучи ёки спастиклик каби алоҳида бузилишларга қаратилган. Бироқ, локомоция мураккаб функция бўлиб, у бир нечта тизимларнинг, жумладан, таянч-ҳаракат аппарати, асаб ва когнитив компонентларнинг интеграциясини талаб қилади. Ушбу тадқиқотда комбинацияланган аралашувнинг муваффақияти ушбу тизимларни бир вақтнинг ўзида ҳал қилиш зарурлигини таъкидлайди.

Ижобий натижаларга қарамай, бир қатор чекловларни ётироф этиш лозим. Танланма ҳажми нисбатан кичик бўлиб, бу натижаларнинг умумлашмаллигини чеклаши мумкин. Бундан ташқари, тадқиқотга стандарт терапия олган назорат гуруҳи киритилмаган, бу еса ҳар бир аралашув компонентининг таъсирини ажратишни қийинлаштиради. Келажакдаги тадқиқотлар ушбу топилмаларни янада тасдиқлаш учун каттароқ танланма ҳажмлари билан тасодиқий назорат қилинадиган синовларни ўз ичига олиши керак.

Яна бир чеклов - кузатувнинг қисқа давомийлиги. 2,5 ойдан кейин яхшиланишлар кузатилган бўлса-да, бу таъсирлар узок вақт давомида сақланиб қоладими ёки йўқми, номаълум. Функционал ўсишнинг барқарорлигини баҳолаш ва оптимал реабилитация протоколларини аниқлаш учун узок муддатли тадқиқотлар ўтказиш зарур.

Шунга қарамай, ушбу тадқиқот натижалари серебрял фалажи бўлган болаларда мултимодал реабилитация стратегияларидан фойдаланишни қўллаб-қувватловчи кучли далилларни тақдим этади. Жисмоний, фармакологик ва когнитив аралашувларнинг интеграцияси бир модал ёндашувларга қараганда самаралироқ кўринади.

Хулоса. Ушбу тадқиқот натижалари шуни кўрсатадики, ёнлама юриш машғулоти, А турдаги ботулин токсини терапияси ва нейрогимнастикани ўз ичига олган комплекс реабилитация ёндашуви серебрял фалажи бўлган болаларда ҳаракат функциясини сезиларли даражада яхшилади. Комбинацияланган аралашув юриш параметрларини, комат барқарорлигини, оёқ-қўллар ўртасидаги мувофиқликни ва когнитив-мотор интеграцияни самарали оширди. Натижалар локомоция нафақат периферик таянч-ҳаракат омиллари, балки марказий нейрон механизмлари, жумладан, марказий нақш генератори томонидан ҳам бошқарилиши ҳақидаги ғояни қўллаб-қувватлайди. Мултимодал реабили-

тация орқали ҳам асаб, ҳам биомеханик таркибий қисмларга ётибор қаратиш функционал натижаларнинг синергетик яхшиланишига олиб келади.

Ушбу тадқиқот реабилитация дастурларига вазифага хос ҳаракат машғулоти, спастикликни бошқариш ва нейрокогнитив рағбатлантиришни киритиш муҳимлигини таъкидлайди. Бундай ёндашув нейропластикликни максимал даражада ошириши ва серебрал фалаж билан касалланган болаларнинг реабилитация салоҳиятини сезиларли даражада ошириши мумкин.

Келажакдаги тадқиқотлар узоқ муддатли натижаларга ва индивидуал реабилитация протоколларини оптималлаштиришга қаратилиши керак.

Адабиётлар рўйхати:

1. World Health Organization. Cerebral palsy: Key facts. Geneva: WHO; 2023.
2. Michael H. Thaut, Gerald C. McIntosh. Rhythmic facilitation of gait training in neurological disorders. *Journal of Neurologic Rehabilitation*. 2018;32(4):345–356.
3. Anthony B. Ward. Spasticity treatment with botulinum toxin in children with cerebral palsy. *European Journal of Neurology*. 2017;24(S1):S45–S52.
4. Eli Carmeli. Physical training and rehabilitation strategies for children with cerebral palsy. *Disability and Rehabilitation*. 2019;41(2):123–130.
5. Ivanenko Yury P., Francesco Lacquaniti. Central pattern generators and human locomotion. *Brain Research Reviews*. 2016;57(2):345–361.
6. Janet H. Carr, Roberta B. Shepherd. *Neurological Rehabilitation: Optimizing Motor Performance*. 3rd ed. Elsevier; 2010.
7. Brian R. Umberger. Biomechanics of lateral walking and balance control. *Gait & Posture*. 2015;41(1):12–18.
8. Olaf Verschuren. Exercise and physical activity recommendations for children with cerebral palsy. *Developmental Medicine & Child Neurology*. 2016;58(8):798–808.
9. Keith R. Foster. Interlimb neural coupling and its role in motor recovery. *Neuroscience Letters*. 2014;567:45–50.
10. Paul E. Dennison. *Brain Gym: Simple activities for whole brain learning*. Edu-Kinesthetics Inc.; 2006.

Иқтибос учун: Ибрагимова М.Ш., Акрамова Ф.Б. Бош мия фалажи бўлган болаларнинг локомотор функциясини яхшилаш учун комплекс реабилитация чора-тадбирлари // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси*. – 2026. – № 4(24). – Б. 638–645. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19628668>

ВЛИЯНИЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ГИПОЛИПИДЕМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ УРОВНЕЙ ЛПНП У ПАЦИЕНТОВ С ИБС И САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА

Муминова А.Ю.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Актуальность. Пациенты с ишемической болезнью сердца (ИБС) и сахарным диабетом 2 типа (СД2) относятся к категории очень высокого сердечно-сосудистого риска. Несмотря на широкое применение статинов, достижение целевых уровней липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) остается недостаточным. Цель исследования. Оценить эффективность комбинированной гиполипидемической терапии в сравнении с монотерапией статинами у пациентов с ИБС и СД2. Материалы и методы. В проспективное исследование включено 120 пациентов с ИБС и СД2. Основная группа (n=60) получала комбинированную терапию (статины + эзетимиб или ингибитор PCSK9), контрольная группа (n=60) — монотерапию статинами. Оценка проводилась через 12 недель. Результаты. В основной группе снижение ЛПНП составило 54%, в контрольной — 32% ($p < 0,01$). Целевые уровни ЛПНП ($< 1,4$ ммоль/л) достигнуты у 78% пациентов основной группы против 42% в контрольной ($p < 0,001$). Заключение. Комбинированная терапия достоверно повышает эффективность коррекции дислипидемии и частоту достижения целевых уровней ЛПНП у пациентов с ИБС и СД2.

Ключевые слова: ИБС, сахарный диабет 2 типа, дислипидемия, ЛПНП, комбинированная терапия

THE EFFECT OF COMBINED LIPID-LOWERING THERAPY ON ACHIEVING TARGET LDL LEVELS IN PATIENTS WITH CORONARY HEART DISEASE AND TYPE 2 DIABETES MELLITUS

Muminova A.Yu.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. Relevance. Patients with coronary heart disease (CHD) and type 2 diabetes mellitus (DM2) are classified as very high cardiovascular risk. Despite the widespread use of statins, achieving the target levels of low-density lipoproteins (LDL) remains insufficient. The purpose of the study. To evaluate the effectiveness of combined lipid-lowering therapy in comparison with statin monotherapy in patients with coronary heart disease and type 2 diabetes. Materials and methods. The prospective study included 120 patients with coronary heart disease and type 2 diabetes. The main group (n=60) received combination therapy (statin + ezetimibe or a PCSK9 inhibitor), the control group (n=60) received statin monotherapy. The assessment was carried out after 12 weeks. Results. LDL decreased by 54% in the main group and 32% in the control group ($p < 0.01$). Target LDL levels (< 1.4 mmol/L) were achieved in 78% of patients in the main group versus 42% in the control group ($p < 0.001$). Conclusion. Combination therapy significantly increases the effectiveness of dyslipidemia correction and the frequency of achieving target LDL levels in patients with coronary heart disease and type 2 diabetes.

Keywords: coronary heart disease, type 2 diabetes mellitus, dyslipidemia, LDL, combination therapy

ЮИК ВА 2-ТИП ҚАНДЛИ ДИАБЕТ БИЛАН ОҒРИГАН БЕМОРЛАРДА КОМБИНАЦИЯЛАНГАН ГИПОЛИПИДЕМИК ТЕРАПИЯНИНГ ПЗЛП МАҚСАДЛИ ДАРАЖАЛАРИГА ЭРИШИШГА ТАЪСИРИ

Мўминова А.Ю.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Долзарблиги. Юрак ишемик касаллиги (ЮИК) ва 2-тур қандли диабет (ҚД2) билан оғриган беморлар жуда юқори юрак-қон томир хавфи тоифасига киради. Статинларнинг кенг қўлланилишига қарамай, паст зичликдаги липопротеинларнинг (ПЗЛП) мақсадли даражасига эришиш етарли эмас. Тадқиқотнинг мақсади. ЮИК ва ҚД2 билан оғриган беморларда комбинацияланган гиполипидемик терапиянинг статинлар билан монотерапияга нисбатан самарадорлигини баҳолаш. Материаллар ва усуллар. Проспектив тадқиқотга ЮИК ва ҚД2 билан оғриган 120 нафар бемор киритилган. Асосий гуруҳ (n=60) комбинацияланган терапия (статины + эзетимиб ёки ПССК9 ингибитори), назорат гуруҳи (n=60) эса статинлар билан монотерапия олган. Баҳолаш 12 ҳафтадан сўнг

амалга оширилди. Натижалар. Асосий гуруҳда ПЗЛПнинг пасайиши 54% ни, назорат гуруҳида эса 32% ни ташкил этди ($p<0,01$). ПЗЛПнинг мақсадли даражасига ($<1,4$ ммол/л) асосий гуруҳдаги беморларнинг 78% назорат гуруҳидаги 42% га нисбатан эришилди ($p<0,001$). Хулоса. Комбинацияланган терапия ЮИК ва ҚД2 билан озриган беморларда дислипидемияни тузатиш самарадорлигини ва ПЗЛП мақсадли даражасига эришиш частотасини сезиларли даражада оширади.

Калит сўзлар: ЮИК, 2-тур қандли диабет, дислипидемия, ПЗЛП, комбинацияланган даволаш

e-mail: Anjela_Muminova@icloud.com

Введение. Сочетание ишемической болезни сердца (ИБС) и сахарного диабета 2 типа (СД2) характеризуется высоким риском сердечно-сосудистых осложнений и неблагоприятным прогнозом. У пациентов с СД2 формируется атерогенная дислипидемия, включающая повышение уровня триглицеридов, снижение холестерина липопротеинов высокой плотности и увеличение доли мелких плотных липопротеинов низкой плотности (ЛПНП).

Несмотря на доказанную эффективность статинов, значительная доля пациентов не достигает рекомендованных целевых уровней ЛПНП. Это обусловлено как выраженностью метаболических нарушений, так и ограничениями монотерапии. В связи с этим актуальным является применение комбинированных гиполлипидемических стратегий, направленных на различные звенья липидного обмена.

Материалы и методы. В исследование включено 120 пациентов (возраст 45–75 лет) с подтвержденной ИБС и СД2.

Критерии включения:

- наличие ИБС
- сахарный диабет 2 типа
- уровень ЛПНП $>1,8$ ммоль/л

Критерии исключения:

- тяжелая печеночная недостаточность
- ХБП стадии 4–5
- онкологические заболевания

Группы исследования:

- **Основная группа (n=60):** статин + эзетимиб / ингибитор PCSK9
- **Контрольная группа (n=60):** монотерапия статинами

Оцениваемые показатели:

- ЛПНП
- общий холестерин
- триглицериды
- достижение целевых уровней

Срок наблюдения — 12 недель. Статистическая обработка проводилась с использованием t-критерия Стьюдента. Различия считались значимыми при $p<0,05$.

Результаты.

Таблица 1.

Динамика липидного профиля

Показатель	До лечения	После лечения (осн. группа)	После лечения (контроль)
ЛПНП (ммоль/л)	$3,4 \pm 0,6$	$1,56 \pm 0,4$	$2,3 \pm 0,5$
Общий холестерин (ммоль/л)	$5,8 \pm 0,7$	$3,9 \pm 0,6$	$4,8 \pm 0,6$
Триглицериды (ммоль/л)	$2,1 \pm 0,5$	$1,6 \pm 0,4$	$1,9 \pm 0,5$

Снижение уровня ЛПНП в основной группе составило 54%, тогда как в контрольной — 32% ($p<0,01$).

Достижение целевых уровней ЛПНП

- Основная группа — 78% пациентов
- Контрольная группа — 42% пациентов
- $p < 0,001$

Обсуждение. Полученные результаты демонстрируют значительное преимущество комбинированной гиполипидемической терапии по сравнению с монотерапией статинами у пациентов с ИБС и СД2. Более выраженное снижение уровня ЛПНП в основной группе объясняется воздействием на различные механизмы липидного обмена.

У пациентов с сахарным диабетом сохраняется высокий остаточный риск сердечно-сосудистых событий, что требует более интенсивного снижения липидов. Комбинированная терапия позволяет не только достичь целевых уровней ЛПНП, но и потенциально улучшить клинические исходы.

Полученные данные согласуются с результатами крупных клинических исследований, где показано, что добавление второго гиполипидемического препарата значительно повышает эффективность лечения.

Заключение. Комбинированная гиполипидемическая терапия является более эффективной стратегией по сравнению с монотерапией статинами у пациентов с ИБС и СД2. Ее применение позволяет достоверно увеличить частоту достижения целевых уровней ЛПНП и улучшить контроль липидного профиля.

Практические рекомендации:

1. Пациенты с ИБС и СД2 требуют агрессивного снижения ЛПНП.
2. При недостижении целевых уровней необходимо раннее назначение комбинированной терапии.
3. Комбинированные схемы должны рассматриваться как стандарт лечения пациентов очень высокого риска.
4. Контроль липидного профиля должен проводиться регулярно.

Для цитирования: Муминова А.Ю. Влияние комбинированной гиполипидемической терапии на достижение целевых уровней лпнп у пациентов с ИБС и сахарным диабетом 2 типа // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 4(24). – С. 646–648. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19629133>

**КАТТАЛАРДА СУРУНКАЛИ РИНОСИНУСИТ: ТАШХИСЛАШ ВА ДАВОЛАШ
ТАКТИКАСИНИНГ ТАНЛАШНИНГ ЗАМОНАВИЙ ЁНДАШУВЛАРИ****Каримова М.М.**

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Риносинусит бурун бўйлиги ва параназал синуслар ишллик қаватининг яллигланиши жараёни сифатида таърифланади. Бу яллигланиши юқумли ва/ёки юқумли бўлмаган сабаблар билан юзага келиши мумкин. Сурункали риносинусит - инсоннинг фаолиятига ва ҳаёт сифатига жиддий таъсир кўрсатадиган кенг тарқалган яллигланиши ҳолати. Ташхис клиник бўлиб, субъектив симптомлар ва визуализация ҳамда жисмоний текширув орқали олинган объектив натижаларга асосланади. Ташхисий биомаркерлар келгусида мавжуд бўлиши мумкин. Биринчи қатор даволаш топик стероид терапияси ва физиологик эритма билан ювишни ўз ичига олади, зарур ҳолларда эндоскопик синус операцияси ҳам кўриб чиқилади. Стандарт тиббий ва жарроҳлик терапияси билан симптомларни енгиллаштиришга эришолмаган бурун полиплари билан сурункали риносинусит беморларига энди биологик препаратлар тавсия этилиши мумкин, аммо ушбу дориларнинг узоқ муддатли оқибатлари ҳали номаълум.

Калим сўзлар: сурункали риносинусит, бурун полиплари, бурун эндоскопияси, параназал синусларнинг компьютер томографияси, интраназал кортикостероидлар

**CHRONIC RHINOSINUSITIS IN ADULTS: MODERN APPROACHES TO DIAGNOSIS AND
TREATMENT STRATEGY SELECTION****Karimova M.M.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Rhinosinusitis is defined as an inflammatory process of the mucosa of the nasal cavity and paranasal sinuses. This inflammation may be caused by infectious and/or non-infectious factors. Chronic rhinosinusitis is a common inflammatory condition that seriously affects human functioning and quality of life. The diagnosis is clinical and depends on subjective symptoms and objective findings on imaging and physical examination. Diagnostic biomarkers may become available in the future. First-line treatment includes topical steroid therapy and saline irrigation, with consideration of endoscopic sinus surgery when necessary. Patients with chronic rhinosinusitis with nasal polyps who do not achieve symptom relief with standard medical and surgical therapy may now be prescribed biological agents, although the long-term effects of these drugs remain unknown.

Keywords: chronic rhinosinusitis, nasal polyps, nasal endoscopy, computed tomography of the paranasal sinuses, intranasal corticosteroids.

**ХРОНИЧЕСКИЙ РИНОСИНУСИТ У ВЗРОСЛЫХ: СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К
ДИАГНОСТИКЕ И ВЫБОРУ ТАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ****Каримова М.М.**

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Риносинусит определяется как воспалительный процесс слизистой носовой и надносовых пазух. Это воспаление может быть вызвано инфекционными и/или неинфекционными причинами. Хронический риносинусит — распространённое воспалительное состояние, которое серьёзно влияет на функционирование человека и качество жизни. Диагноз является клиническим и зависит от субъективных симптомов и объективных результатов при визуализации и физическом осмотре. Диагностические биомаркеры могут стать доступны в будущем. Лечение первой линии включает топическую терапию стероидами и промывание физиологическим раствором, с учетом эндоскопической операции на пазухах при необходимости. Пациентам с хроническим риносинуситом с полипами, которые не достигают облегчения симптомов стандартной медицинской и хирургической терапией, теперь могут назначаться биологические препараты, хотя долгосрочные последствия этих препаратов неизвестны.

Ключевые слова: хронический риносинусит, носовые полипы, эндоскопия носа, компьютерная томография околоносовых пазух, интраназальные кортикостероиды,

Сурункали риносинусит бу бурун ва унинг ёнда жойлашган синусларининг симптомли яллиғланиши бўлиб, камида 3 ой давом этади. Унинг ҳақиқий тарқалиш даражасини аниқлаш ташхис қўйишдаги қийинчиликлар сабабли мушкул, аммо баҳолар 2,1% дан 15% гача ўзгариб туради. Кўпинча у ўрта ёшдаги катталарда учрайди ва аёллар эркакларга нисбатан биров кўпроқ азият чекади. Бу ҳолат бошқа сурункали касалликларга нисбатан катта муаммо эмасдек туюлиши мумкин, аммо у уйку бузилиши, кучли чарчоқ ва депрессия билан боғлиқ бўлиб, кундалик ҳаётга сезиларли даражада таъсир кўрсатиши мумкин [2] Сурункали риносинуситнинг сабаби ҳозирча тўлиқ ўрганилмаган. Эҳтимолий омиллар қаторига генетик мойиллик, микроб патогенлар, атроф-муҳит таъсири ва аллергия киради, аммо улардан ҳеч бири ягона сабаб сифатида қаралмайди. Сурункали риносинусит билан оғриганлар орасида астма учраши тахминан 25% ни ташкил этади, бу эса умумий аҳолига нисбатан 5 баробар юқори. Бирлашган нафас йўллари назариясига кўра, ушбу икки ҳолат ўхшаш хужайравий биология ва маълум триггерларга эга бўлгани учун кўплаб ўхшаш этиологик омилларга эга [1]

Сурункали риносинусит асосан инфекцион жараён эмас, балки яллиғланишли ҳолат деб ҳисобланади. Унинг асосий патофизиологияси, эҳтимол, эпителиал тўсиқнинг шикастланиши (масалан, микроблар, аллергенлар таъсирида) ва яллиғланиш йўллариининг бузилиши бирикмаси билан боғлиқ. Туғма ҳамда орттирилган иммун тизимлар синус шиллиқ қавати даражасида дисфункция намоён қилади, бу эса кубсимон хужайралар гиперплазиясига, мукоцилиар тизим клиренсининг бузилишига ва прояллиғланиш ҳолатининг шаклланишига олиб келади [3,4,5,6,7]

Атроф-муҳит омиллари, масалан аллергенлар, вируслар, ифлослантирувчилар, тамаки тутуни ва кимёвий кўзғатувчилар таъсири сурункали риносинусит (CRS) симптомларини кучайтириши ва бурун шиллиқ қаватининг сурункали яллиғланишига олиб келиши мумкин. Ҳаво сифати, хона ичида ҳам, ташқи муҳитда ҳам, сурункали риносинуситнинг тарқалиши ва оғирлик даражасига сезиларли таъсир кўрсатади [7]

Бирламчи тизимли касалликлар, масалан астма ва аутоиммун касалликлар, юқори нафас йўллариининг сурункали яллиғланиши билан боғлиқ бўлиши мумкин. Бундан ташқари, иккиламчи ҳолатлар, масалан орттирилган иммун танқисликлари, беморларда сурункали ва қайта-қайта такрорланувчи инфекцияларга мойилликни ошириши мумкин.

Асосий симптомлар қаторига бурун битиши (бурун ўтмаслиги), олдинги ёки орқа томонга оқувчи бурун ажралмалари, хид билишнинг ўзгариши ва юзда оғрик ёки босим ҳисси киради. Юздаги ноқулайлик ўзига хос белги эмас ва айрим мутахассислар уни ташхис мезонларидан чиқариш керак деб ҳисоблайди [3]. Қўшимча симптомларга кулоқ битиши, йўтал, бош оғриғи, чарчоқ, тиш оғриғи, таъм билишнинг бузилиши ва оғиздан ёмон хид келиши киради. Бу симптомлар алоҳида ҳолда етарлича сезгир бўлса-да, аниқ (специфик) эмас. Шунинг таъкидлаш керакки, беморларда ўткир риносинусит (яъни сурункали яллиғланган ҳолат устига қўшилган инфекция) кузатилиши мумкин бўлса-да, кўпинча уларда юқори нафас йўллариининг узок давом этувчи инфекцияси учрайди.

Сурункали риносинуситни ташхислаш синоназал яллиғланишнинг объектив белгиларини талаб қилади. Беморда полиплар бор-йўқлигига қараб фенотипик фарқланиш даволашни белгилаши мумкин. Бурун полипларини олдинги риноскопия ёки компьютер томографияси (КТ) орқали гумон қилиш мумкин, аммо айна пайтда отоларинголог томонидан ўтказиладиган эндоскопия, айниқса майда полипларни аниқлашда, “олтин стандарт” ҳисобланади. Бурун раковиналари билан таққослаганда, бурун полиплари кўпинча сувсимон, ўсмага ўхшаш ва ярим шаффоф кўринишга эга бўлади. Бурун полиплари бўлган беморларда овоз кўпинча гипоназал (яъни бурун битгандай) бўлади ва улар юқори нафас йўллари инфекциясидан тикланаётгандек эшитилади. Аксинча, полипларсиз беморларда кўрикда кўпроқ куюқ шиллиқ ажралмалар кузатилади. Сурункали риносинусит ва астма ўртасидаги юқори боғлиқликни ҳисобга олиб, пастки нафас йўллариининг яллиғланиш касалликларини скрининг қилиш ва кўкрак қафасини аускультация қилиш муҳим [4,6,13,14,15]

Ҳозирги вақтда сурункали риносинуситни ташхислаш учун махсус лаборатор тестлар мавжуд эмас. Биомаркерлар (масалан, конда эозинофиллар даражаси) асосий эндотипни аниқлашга ёрдам бериши мумкин, аммо ҳозирча даволашга жавобни башорат қилиш ёки даволаш усулини танлаш учун фойдали маркерлар аниқланмаган. Сурункали риносинуситда қўлланиладиган стандарт визуализация усули — бу контрастсиз синуслар компьютер томографияси (КТ) ҳисобланади. Сурункали яллиғланиш КТда синуслар шиллиқ қаватининг қалинлашиши ёки “хиралашиши” (яъни ҳаво билан тўлмаслиги) кўринишида намоён бўлади. Оддий рентген тасвири сурункали риносинуситни аниқлаш учун етарли сезгирликка эга эмас ва уни тайинлаш тавсия этилмайди. Агар беморда аллергик ринит симптомлари (икки томонлама тоза ринорея, кўз кичиши ва аксириш) кузатилса, аллергологик текширув эҳтимолий триггерларни аниқлаш ва улардан сақланишга ёрдам бериши мумкин [5,6,7]

Сурункали риносинуситнинг дифференциаль ташхисига аллергия ринит, бурун перегородкасидаги деформация ва синусал бўшлиқдаги янгича ўсмалар киради. Бурун битиши кўпинча аллергия ринитда ҳам кузатилади, аммо беморларда юздаги босим ҳисси, сурункали риносинуситдагидек, одатда бўлмайди. Шунингдек, аллергия ринитда ажралмалар кўпинча шаффоф ва сузишчан бўлади, сурункали риносинуситдаги қуюқ шиллиқдан фарқ қилади. Бурун перегородкасининг қисқариши бурун ўтмаслиги ва битишга олиб келиши мумкин, аммо одатда ҳид билишга таъсир қилмайди ва бурундан сезиларли ажралмалар чиқмайди. Бурун ўсмаси ҳам юздаги босим ва бурун битишини келтириб чиқариши мумкин, аммо кўпинча бир томонлама бўлади, бу эса отоларингологга тезкор муружат қилишни талаб қилади [8,9,10,11,12]

Узоқ муддатли маҳаллий интраназал кортикостероидлар биринчи даволаш сатҳи ҳисобланади. Топик физиологик спрейлар ва ювиш усуллари сурункали риносинуситда (бурун полиплари бўлса ҳам, бўлмаса ҳам) самарали ёрдамчи воситалар ҳисобланади. Систематик кўриб чиқишда кўрсатилишича, катта ҳажмли физиологик ювишлар (шиша ёки идишда) синус бўшлиқларида физиологик спрейларга нисбатан кенгроқ тарқалади. Бу эритмалар одатда бемор томонидан тайёрланади: олдиндан аралаштирилган пакет (натрий хлориди ва натрий бикарбонати) 240 мл дистиллятланган сувга қўшилади ва кейин бурун бўшлиғини ювишда қўлланилади. Маҳаллий интраназал кортикостероидлар ҳаёт сифати ва симптомлар тезлигида сезиларли яхшиланишни кўрсатди (абсолют хавфнинг камайиши 0,20, 95% ИТ 0,02–0,38) бурун ювиш гуруҳида кичик тузли спрейларга нисбатан, бу даволаш учун 5 та беморни талаб қилади. Агар интенсив ювиш қулоқдаги босим ёки бошқа симптомлар сабабли ёмон кўриниб турса, беморлар фақат физиологик спрейдан фойдаланишни давом эттириши керак. Қўллаш усулидан қатъий назар, ювиш интраназал стероид спрейидан олдин бажарилиши керак, препаратни ювиб ташламаслик учун [9,10]

Янги тавсиялар антибиотикларни фақат сурункали риносинуситнинг ўткир обостриш ҳолатларида (бурун полиплари бўлса ҳам, бўлмаса ҳам) қўллашни тавсия қилади, ва шифокорлар ҳарорат кўтарилиши ёки қучли оғриқ бор беморларда эҳтиёткор бўлиши керак. [11,16,17,18]

Эндоскопик синус операцияси сурункали риносинуситдан азият чекаётган ва стандарт тиббий терапия самара бермаган беморлар учун самарали ва хавфсиз даволаш усули сифатида маълум. Бу кам инвазив усул нос орқали эндоскоп орқали бажарилади, ташқи кесикларсиз. Яллиғланган тўқималар, полиплар ва майда суяк бўлаклари дренаж ва синус ҳаволанишини яхшилаш учун эҳтиёткорлик билан олиб ташланади. Бир нечта тадқиқотлар эндоскопик синус операцияси синуслардаги яллиғланиш юқини камайтириш билан бирга ҳаёт сифатини яхшилаш қобилиятига эга эканлигини кўрсатган [12,19,20]. Энг муҳими шундаки, операция маҳаллий препаратларни юқори синусларга етказилишини яхшилади, бу эса узоқ муддатли назорат ва симптомларни бошқаришда муҳим аҳамиятга эга.

Бироқ эндоскопик синус операцияси бу касалликнинг асосий патофизиологиясини тўлиқ ўзгартиролмайди ва беморларга қўшимча процедуралар талаб қилиниши мумкин. Ревизия кўрсаткичлари кузатув даврига қараб 10–30% ни ташкил қилади. Бир ретроспектив кўриб чиқишда операциялар орасида ўртача интервал 4,39 йил эканлиги аниқланган. Кўпчилик тадқиқотлар кўрсатадики, эндоскопик синус операциясидан сўнг беморларнинг тахминан 75% симптомларида сезиларли яхшиланишни хабар беришади, ва қайта операция қилинган беморлар ҳам ҳаёт сифати кўрсаткичлари бўйича бош операцияни ўтказганлар билан ўхшаш яхшиланишни кўрсатган. Операциядан сўнг симптомларнинг рецидив хавфи омилларига оғир полип касаллиги ва астма билан бирга бўлган беморлар киради [13,14].

Сурункали риносинусит кўп омилли яллиғланишли касаллик бўлиб, катталар орасида кенг тарқалган ва уйқу бузилиши, сурункали чарчоқ ва депрессия сабабли беморлар ҳаёт сифатида сезиларли даражада пасайишига олиб келади. Касалликнинг патогенези эпителиал тўсиқнинг шикастланиши, шиллиқ қават даражасида иммун дисфункцияси ва ташқи триггерлар — аллергиялар, ифлослантирувчилар ва микроб агентлар таъсирининг бирикмаси билан боғлиқ. Бронхиал астма билан юқори ҳамкасалик (тахминан 25% ҳолатларда) единий нафас йўллари концепциясини тасдиқлайди ва беморни комплекс текшириш зарурлигини кўрсатади. Сурункали риносинуситни ташхислашда яллиғланиш жараёнининг объектив тасдиқланиши талаб қилинади: бурун эндоскопияси полипларни аниқлашда “олтин стандарт” ҳисобланади, синуслар компьютер томографияси (КТ) эса асосий визуализация усули ҳисобланади; ҳозирги вақтда махсус лаборатор биомаркерлар ишлаб чиқилмаган, аммо қон сировоткасида эозинофилларни аниқлаш касалликни эндотиплаштиришга ёрдам бериши мумкин. Даволаш стратегияси босқичма-босқич амалга оширилиши керак: топик интраназал кортикостероидлар юқори ҳажмли тузли ювиш билан бирга консерватив терапиянинг асосини ташкил қилади, антибиотиклар эса фақат ўткир обостришда

кўлланилади. Эндоскопик синус хирургияси дорига қарши турмайдиган беморлар учун самарали усул бўлиб, операция қилинган беморларнинг 75% симптомларида яхшиланишни таъминлайди, аммо ревизион аралашувлар сони 10–30% ни ташкил этади, бу операция орқали касалликнинг асосий патофизиологиясини радикал ҳал этиш мумкин эмаслигини кўрсатади. Шу билан бирга, сурункали риносинуситли беморларнинг оптимал бошқаруви фенотип, эндотип ва ҳамкасалик ҳолатлар спектрини ҳисобга олган индивидуаллаштирилган ёндашувни талаб қилади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Риносинусит: доказательства и опыт — (GALEN) когорта риносинусита: крупное европейское поперечное исследование хронических риносинуситов с носовыми полипами и без. Ринология 2019; 57:32–42
2. Браз Дж Оторхиноларингол. Сентябрь-октябрь 2025; 91(5):101595. doi: 10.1016/j.bjorl.2025.101595. Epub 2025
2. Чин CJ, Скотт JR, Lee JM. Диагностика и лечение хронического риносинусита. CMAJ. 17 февраля 2025 года; 197(6):E148-E154. DOI: 10.1503/cmaj.241101.
3. Сюй С, Рейтсма С, Ван Д.Й. и др. Основные моменты развития хронического риносинусита. Аллергия 2021; 76:3349–58.
4. Thamboo AV, Lee M, Bhutani M. и др. Канадский междисциплинарный экспертный консенсус по использованию биологических препаратов в верхних дыхательных путях: исследование Delphi. J Otolaryngol Голова и шея хирургия 2023;52:30.
5. Pynnonen M, Fowler K, Terrell JE. Clinical predictors of chronic rhinosinusitis. Am J Rhinol 2007;21:159–63.
6. Kato A, Schleimer RP, Bleier BS. Mechanisms and pathogenesis of chronic rhinosinusitis. J Allergy Clin Immunol 2022;149:1491–503.
7. Салтаги М.З., Комер Б.Т., Хьюз С., Тинг Дж.Й., Хиггинс Т.С. Лечение рецидивирующего острого риносинусита: систематический обзор. Аллергия на Дж. Риноп. 2021; 35
8. Хелман С.Н., Барроу Э., Эдвардс Т., и др. Роль аллергического ринита при хроническом риносинусите. Иммунальная аллергия Клини Норт Ам 2020; 40:201–14.
9. Дональдсон А.М., Чоби Г., Ким Д.Х. и др. Интраназальная терапия кортикостероидами: систематический обзор и метаанализ сообщаемой безопасности и побочных эффектов у взрослых. Операция на шее головы Отоларингол 2020; 163:1097–108.
10. Томас В.В., III, Харви Р.Дж., Рудмик Л. и др. Распределение местных средств в надносовых пазухах: обзор, основанный на доказательствах, с рекомендациями. Int Forum Allergy Rhinol 2013; 3:691–703.
11. Хан А., Вандеплас Г., Хуинь ТМТ и др. Глобальная сеть по борьбе с аллергией и астмой (GALEN) когорта риносинусита: крупное европейское поперечное исследование хронических риносинуситов с носовыми полипами и без. Ринология 2019; 57:32–42
12. Сиддонгс К., Калиш Л., Сакс Р., и др. Операция на пазухах и метод его применения влияют на эффективность топических кортикостероидов при хроническом риносинусите: систематический обзор и мета-анализ. Аллергия на риноп Ам J 2013; 27:221–33.
13. Смит К.А., Орланди Р.Р., Окли Г. и др. Долгосрочные показатели ревизии при эндоскопической операции на пазухах. Int Forum Allergy Rhinol 2019; 9:402–8.
14. Soler ZM, Smith TL. Качество жизни после функциональной эндоскопической операции на пазухах. Отоларингол Клини Норт Ам 2010; 43:605–12.
15. Bengtsson C, Lindberg E, Jonsson L и др. Хронический риносинусит ухудшает качество сна: результаты исследования GA2LEN. Сон (Базель) 2017;40.
16. Huang T, Zhou J, Yuan F, Yan Y, Wu D. The percentage of controlled chronic rhinosinusitis after treatment: a systematic review and meta-analysis. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2024 May;281(5):2183-2194.
17. Fokkens WJ, Sedaghat AR, Soyka MB, Reitsma S. Recent advances in chronic rhinosinusitis: pathophysiology, treatments, and outcome measures. Rhinology. 2024 Dec 1;62(6):652-658.
18. Hildenbrand T, Milger-Kneidinger K, Baumann I, Weber R. The Diagnosis and Treatment of Chronic Rhinosinusitis. Dtsch Arztebl Int. 2024 Sep 20;121(19):643-653.
19. Deng M, Fu R, Lv M, Feng Y. Dupilumab for Chronic Rhinosinusitis with Primary Nasal Polyps: a Case Report and Literature Review. J Inflamm Res. 2025 Apr 1;18:4607-4612
20. Dietz de Loos D, Lourijsen ES, Wildeman MAM, et al. Prevalence of chronic rhinosinusitis in the general population based on sinus radiology and symptomatology. J Allergy Clin Immun. 2018;143(3):1207–1214.

Иктибос учун: Каримова М.М. Катталарда сурункали риносинусит: таъхислаш ва даволаш тактикасининг танлашнинг замонавий ёндашувлари // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2026. – № 4(24). – Б. 649–652. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19629226>

ЖАРРОҲЛИК УСУЛИДА ОШИҚ-БОЛДИР БЎҒИМИ ЖАРОҲАТЛАНИШЛАРИНИ ЗАМОНАВИЙ ДАВОЛАШ УСУЛЛАРИ

Гафуров Ф.А.

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Ошиқ-болдир бўғими бойламларининг жароҳатланишлари ва оқибатларининг жарроҳлик усулида даволаш натижалари таҳлил қилинади. Тўпиқлар синиши ва синдесмозни тиклашнинг турли усуллари умумлаштирилиб таҳлил қилинди. Ошиқ-болдир бўғими бойламларини турли усуллар ёрдамида тўлақонли тикланишига қарамасдан 50% ҳолатларда сурункали ностабиллик ва остеоартроз кузатилиши таъкидланади. Операциядан кейинги реабилитация даврининг қанчалик тўлақонли ўтказилишига қарамасдан қониқарсиз натижалар улуши кўпайган. Жароҳат характери ва типига кўра даволаш усуллариининг қўлланилиши ва самарадорлик даражаси баён қилинади.

Калит сўзлар: ошиқ-болдир бўғими, тўпиқлар, синдесмоз, остеосинтез.

MODERN METHODS OF SURGICAL TREATMENT OF ANKLE JOINT INJURIES

Gafurov F.A.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Modern surgical methods and methods of rehabilitation of the ankle and ankle injuries are analyzed. Different methods of surgical reconstruction of the ankle joint. Ligaments and heel fractures are described. Regardless of having robust, the disparity recovery is the long-term results show that 46-50% of the chronic obstruction and consequent osteoarthritis develop. Anatomically complete recovery of the Ligaments and the complete postoperative rehabilitation period will be followed by a review of the disastrous results. The nature and type of trauma and the effectiveness of treatment methods are described.

Keywords: ankle joint, ankles, syndesmosis, osteosynthesis.

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА

Гафуров Ф.А.

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Рассмотрено своевременного лечения проблемы оперативного лечения повреждений связок голеностопного сустава и их последствий. Проведен анализ различных методов используемых для восстановления синдесмоза и переломов лодыжек. Описаны методики восстановления связочно-го аппарата голеностопного сустава которыми многие хирурги пренебрегают, несмотря на то, что в 50% случаев это приводит к развитию хронической нестабильности и в последующем к остеоартрозу. Определены причины большого количества неудовлетворительных результатов, возникающих несмотря на анатомически точную репозицию и правильное послеоперационное ведение больных в период реабилитации. Выделены основные методы лечения в зависимости от типа и характера повреждений.

Ключевые слова: голеностопный сустав, лодыжки, синдесмоз, остеосинтез.

Тўпиқлар синиши ва болдирлараро синдесмоз жароҳатланишларда жарроҳлик усулида даволаш рентген нурлари ихтиро қилинган амалиётга кенг қўлланила бошланди. Пастки болдирлараро синдесмоз жароҳатланишларда 1909 йил Кеню биринчи бўлиб синган тўпиқ бойламларини тикиб диастазни бартараф этди. Десто ташки тўпиқ қийшиқ синганда Ламботта пластинкасини қўллади. Тўпиқларнинг эскирган синишларини Белер жарроҳлик усулида даволанишни тавсия этди. Бом Г.С. (1931) ва Эльяшберг (1940) синиб нотўғри битган тўпиқларни остеотомия ва редрессация ёрдамида тўғрилаб гипсли иммобилизация қўллади. Чаклин В.Д. (1935) тўпиқлар синишида ва бўғим деформацияларида катта болдир суягини супрамоиллеоляр остеотомияси қўллади ёки ошиқ суягини олиб ташлади. Гориневская В.В. (1938), Приходко А.П., Ситенко Ш.И., (1942) синган тўпиқлар тўла тўқис тўғирланганда жарроҳлик усулини қўллаш зарурат бўлмайди, мураккаб синишлардагина шуруп, кигаи, болт, мих ва бошқа металконструкциялар қўллаш зарур бўлади. Масловский Г.К.

(1951), Крупко И.Л. (1961), Гурьев В.Н. (1963), Глебов Ю.И. синушлар тўғирлангач диастаз сақланиб қолса жарроҳлик усулини қўллаш мумкин деб таъкидлашади [19].

Юсупов Ф.С. (1975) ошиқ-болдир бўғими жароҳатланганда таянч саҳтли кегайлардан фойдаланиб маҳкамлашган. Илизаров Г.И Катаев И.А (1975) мураккаб синушларда компрессион – дистракцион аппаратнинг ўзига ҳос конструкциясини қўлладилар [19].

Жарроҳлик усулида қўллашга кўрсатмалар: ошиқ-болдир бўғимининг очиқ синиб-чиқишлари; паски синдесмознинг III даражали тўлиқ ажралиши; ички тўпикнинг синиб ўз ўқи атрофида 90 градус буралиши;

Катта болдир суягининг олд ёки орқа дистал эпиметафизнинг 1/3 ёки кўпроқ қисмининг синиши; бўғим соҳасида суяк бўлаклари бўлганда.

Суяк бўлаклари оралиғида юмшоқ тўқималар (суяк устки пардаси, пайлар); Дюпюитрен, Десто, Мезоннева ва Фолькман синушлари, оёқ панжасининг чиқиб ёки ярим чиқишида ёпик усулда репозиция қилиш самарасиз бўлганда; тўпикларнинг эскирган синушлари болдирлараро синдесмоз билан кузатилганда, ошиқ-болдир бўғимининг деформацияли артрози кузатилганда.

Мазкур жароҳатланишлар учраши бўйича билак суяги дистал метаэпифизар синушлардан сўнг иккинчи ўринда бўлиб, барча таянч-ҳаракат аъзолари шикастланишларининг 13-20% ини ташкил этади [11]. Барча болдир суяклари синушларининг эса 40-60% ини ташкил этади. Мазкур синушларнинг 40% ида болдирлараро синдесмознинг жароҳатланиши кузатилади [1].

Бугунги кунда бутун дунё миқёсида ҳар 200 000 аҳолининг 110-130 тасида ошиқ-болдир бўғими шикастланишлари учраб турмоқда. Ошиқ-болдир бўғим суяклари шикастланишлари барча бугим ичидан шикастланишларининг 4,7-12% ини ташкил этади [2,4,6].

Суяк синушларини, жумладан ошиқ-болдир суяклари синушларини даволашнинг «олтин стандарти» академик Г.А. Илизаров асос солган суяклараро остеосинтез ҳисобланади. Чунки, айнан Г.А. Илизаров биомеханик, анатоми-топографик ва бошқа параметрларига асосланиб ташқи фиксациялаш принципларини амалиётга жорий этди. Суяклараро ташқи остеосинтезнинг афзаллиги шундаки, уни кекса ёки ёшда йулдош касалликлари кузатилганда ҳам оддий усулда кам жароҳат етказиб амалга ошириш мумкин [2,3,4,5].

Болдир суяк дистал қисмидан бифокал бўғим ичидан ва бўғим атрофидан шикастланишлар кузатилган беморларни даволашда ўзига ҳос кийинчиликлар мавжуд. Бу ҳолат катта болдир ва ошиқ суяк бўғими юзларининг ҳамда ошиқ-болдир бўғим девори ва бойламларининг субхондрал жароҳатланиши 87% беморларда футляр (компортмент) синдиromининг ривожланишига сабаб бўлади [12,16].

Каминвазив технологиялар ёрдамида суяк ташқарисидан, суяк ичидан ва суяклараро остеосинтез ёрдамида интраоперацион ёпик репозиция қилинганда ҳам ошиқ-болдир бўғим ичидан синушлар кузатилган беморларнинг 59-61,3% ида яхши натижаларга эришиш мумкин [15,16,19].

Илизаров усулида суяклараро остеосинтез синик биомеханикаси нуктаи назаридан энг оптимал усуллардан ҳисобланади. Муаллифлар 72 беморни даволаб 52 тасида тўлиқ анатоми-функционал тикланишга эришганлар [14,15].

Ошиқ-болдир соҳасидан синушларни остеосинтез қилишда стабил бурчакли пластиналардан 29,8%, таянч пластиналардан 61,7% ва комбинациялашган остеосинтездан 8,5% фойдаланишган. Шунда даволаш натижалари таҳлил қилинганда 46,7% беморларда аъло, 32,9% яхши, 15,1% қониқарли ва 5,3% қониқарсиз (синикни битмаслик ва йиринглаш) натижалар кузатилган [4,13,14].

Яхши ва аъло натижаларга эришиш аксарият (79,6%) ҳолатларда Илизаров аппаратида модификациялаштирилган усуллардан фойдаланилиб аниқ ва тўлиқ репозиция қилиниб, тўпиклар соҳасидаги импрессион нуқсонлар трансплантатлар ва компрессиюловчи мих пластиналардан фойдаланилиб суяклар булаклар аро компрессия берилиб эришилган.

Бугунги кунда турли конфигурацияли пластина ва михлардан фойдаланилиб каминвазив остеосинтез усуллари амалиётга қўлланилмоқда. Каминвазив остеосинтез усуллари оммавийлашувига сабаб синуш соҳасида тўқималарнинг анатомик бутунлигини сақлаб қолишга қаратилган бўлиб бу мақсадда пластиналар шакли турлича кўринишда «ички фиксаторлар» блокловчи винтлар билан пластина тешикларида киритилиб стабил фиксацияга эришилмоқда. Ҳар бир синик саҳти, хусусияти ва типига кўра пластиналар конструкцияси такомиллаштирилиб қўлланилмоқда.

Болдир суяклари олд дистал қисмидан синган 32 беморда каминвазив остеосинтез усуллари қўлланилиб операция қилингач икки йил давомида кузатилганда 10 беморда операциядан кейин 3 ой ўтгач (31,3%) яхши натижалар, 23 бемор (71,9%) да 6 ойдан сўнг, 27 таси (84,4%) да 9 ой ўтгач кузатишган. Қониқарсиз натижалар туфайли қайта операция 1 беморга 5 ой ўтгач, 2 беморда эса 13 ой ўтгач қўлланилган [17,18].

Узоқ муддатли кузатувлар олиб борган Каллаев Н.О. ва бошқалар (2004) таъкидлашадики, модификациялаштирилган компрессион-дистракцион остеосинтез усули маҳаллий асоратланган ёпик синикларда оптимал танлов усули деб таъкидлашади. Муаллифлар даволанган 22 беморни кузатишиб, натижаларни таҳлил қилишгач ташқи металлостеосинтез қўлланилиб суяк булаклари учун шарт-шароит яратилганда юмшоқ тўқималарда қон айланиши бузилмайди ҳамда маҳаллий ривожланган ўчоқли асоратлар бартараф этилишига оптимал имконият яратилади. Узоқ натижалар (10 йил муддатдан сўнг) 20 беморда ўрганилган.

Объектив кўрикда кўпчилик [12] беморлар шикоят билдиришмаган, шикастланган сегмент анатомик ва функционал жиҳатдан тўла-тўқис тикланган. 7 беморда ошиқ-болдир бўғимда фаол ҳаракат 20-30% чекланган бўлсада, лекин эркин ҳаракатга ҳалақит бермаган.

Лекин узоқ давомли юришлардан сўнг беморлар унча кучли бўлмаган оғриқ аломати бўлганлигига шикоят қилишган [6].

Болдирлараро синостазлаш (айланма усулда синостазлаш ва тиббиализациялаш) да дистракция қўллашнинг ўртача муддати $96,7 \pm 13,4$ кун, полифрагментар синостозлашда $10,9 \pm 20,9$ кун. Шунга кўра фиксациялашнинг ўртача муддати $216,5 \pm 29,5$ кун ва $190,5 \pm 36,7$ кунни ташкил этган.

Даволаш натижалари 39 беморда ўрганилганда тўлақонли анатомо-функционал тикланиш-28 беморда, қониқарли натижалар эса 10 беморда кузатилган [11,12].

Шмидт Р. Ва Бенели С. (2000) монолокал ва полилокал болдирлараро синостозлаш усуллари 62 беморда қўллаб қуйидаги натижаларга эришган: Илизаров аппарати ёрдамида болдирлараро синостазлаш билан $96,8\%$ беморларда бўлаклараро регенератнинг қисқа муддатларда суякланиб бўғимнинг анатомо-функционал ҳаракатини тикланишига эришилган. Болдир суякларининг нуқсонли шикастланишларида репаратив усулда болдирлараро синостозлаш биологик нуқтаи назардан ҳам самардорлиги асосланган. Чунки, мазкур усул мушак ва периферик қон томирлар тармоғига салбий таъсир кўрсатмайди [9,11,16,20].

Ошиқ-болдир бўғим ичидан, бўғим олди ва бифокал синишлари билан 93 беморда бўлаклараро компрессия ва фиксациялаш учун хотирловчи самарадор формали туткичлардан фойдаланганлар. Катта болдир суяги диафизар бифокал синишларида интрамедуляр остеосинтез ва суяк устидан фиксацияловчи пластиналар қўллашган. Ташқи фиксацияловчи остеосинтез гипсли шина билан 47 беморда қўлланилган. Реабилитация жараёнида хондропротекторлар қўлланилган. Комплекс даволаш натижасида $87,5\%$ яхши натижаларга эришилган [6,7,8].

Хирургик технологияларнинг бугунги кундаги ютуқларига қарамасдан материал техник база етарли бўлсада реабилитация самарадорлиги қониқарсиз ҳолигача қолмоқда. Ошиқ-болдир бўғим шикастланишларининг С3 тип синишларда қониқарсиз ($15-17,6\%$) натижалар нафакат бўғим компонентларининг мураккаб шикастланишларига балки суяк бўлакларини тўғрилаш ва фиксациялашнинг ўзига хос мукамаллигидадир. Шу билан бирга, мустақкам остеосинтездан сўнг ҳам бўғимнинг қисқа суяк бўлакларини уч текисликда ҳам назорат қилиб тўғрилашнинг қийинлиги суяк бўлакларини де-стабилизациясига олиб келади. Синик юзаларида оксилли компонент ларнинг парчаланиши натижасида суяк мўртлашиб, ғовак тўқималар емирилишига мойил бўлиб қолади ва суяк функционал вазифасини бажара олмайди. С3 типдаги бўғим ичидан шикастланишларда бўғим юмшоқ тўқималарининг ҳам жароҳатланишлари даволаш самарадорлигини пасайтиради. Шунинг учун мазкур салбий ҳолатлар улушини камайтириш мақсадида муаллифлар бўғим ичидан синишларда суяк усти ва суяк ичидан остеосинтезга никел, титан имплантатлардан фойдаланишган. Уч- беш йил муддат ўтгач суяк ичи остеосинтези қўлланилган беморларда даволаш натижалари таҳлил қилинганда яхши натижалар 65 ($77,4\%$) беморда, қониқарли натижалар 12 ($14,3\%$) беморда ва қониқарсиз натижалар 7 ($8,3\%$) беморда кузатилган [11,12,13,15,18].

Синишларнинг замонавий классификацияси бир неча вазифаларга бир вақтда жавоб бериш лозим: Тадқиқот ишида ва ҳужжаатлаштириш оддий бўлмоғи; Врачлар ўртасида (қаерда ишлашидан қаътий назар) муҳокама ўтказишда қулайлик бўлмоғи; Прогностик аҳамиятга эга бўлмоғи; Қўллаш осон ва қулай бўлмоғи лозим. 1990 йил Монреалда Мюллер ва ҳаммуаллифлари томонидан ишлаб чиқилган халқаро классификацияси қабул қилинган [18].

Мазкур классификация шикастланишларнинг оғирлик даражаси, даволаш мукамаллиги ҳамда прагнозлаш характериға кура тузилган.

Тўпиқлар синишининг учта типи фарқ қилинган бўлиб А,В,С ҳарфлари билан белгиланган. Ҳар бир типнинг учта гуруҳчаси (1,2,3) мавжуд:

1.А- Тип: кичик болдирнинг синдесмоз остидан синиши;

А-1 – ташқи тўпиқнинг алоҳида синиши;

А-2- ташқи тўпиқ синиб бўғимнинг медиал бойламини жароҳатланиши;

А-3- ташқи тўпик синиши, бўғимнинг медиал бойлами ва катта болдир орқа медиал қиррасининг синиши;

2.В-Тип: кичик болдир суягининг синдесмоз оралигидан синиши:

В-1- ташқи тўпикнинг алоҳида синиши:

В-2- ташқи тўпикнинг синиб медиал бойламларининг жароҳатланиши:

В-3-ташқи тўпикнинг синиши, медиал бойламларининг жароҳатланиши ва катта болдирнинг орқа қиррасини синиши:

3.С-Тип: кичик болдирнинг синдесмоз остидан синиши (доимо болдирлараро синдесмоз жароҳатланиши:

С-1- кичик болдир суягининг оддий диафизар синиши:

С-2- кичик болдир суягининг бўлакларини синиб медиал бойламлар жароҳати:

С-3- кичик болдир суягининг юқори қисмидан синиб медиал бойламлар жароҳати:

В ва С типдаги синикларда доимо синдесмоз жароҳатланади [18].

Бугунги кунда травматологлар ўртасида оммавийлашётган усуллардан бири «биологик остеосинтез» бўлиб бунда энг минимал хирургик кесма ёрдамида синик саҳтида қон томир манбаларига кам жароҳат етказиб остеосинтезга амалга оширишга асосланган.

«Биологик остеосинтез» тушунчасини биринчи бор S. Weller 1974 йил киритди [2]. Мазкур усул моҳияти: махсус мосламалар ёрдамида ёпиқ репозиция, онгли равишда аниқ анатомик тўғрилашдан воз кечилиб лекин абсолют идиал фиксация қилинади. Минимал металл сони ёрдамида пластина юзаси суяк сатҳига энг кам контакта ўрнатилиб эрта мобилизация ҳамда энг кичик хирургик кесма ёрдамида амалиётни бажариш. Лекин мазкур остеосинтез усулини ошиқ-болдир бўғимида қўллаш ўзига хос қийинчиликлар туғдиради. Чунки ошиқ-болдир бўғими соҳасидан шикстланишларида дистал болдирлараро синдесмоз-ҳаракатчан анатомик тузилма бўлиб уни тиклаш ўзига хос ёндошувни талаб қилади. Чунки, синдесмозлараро винт ёрдамида 6-8 ҳафта давомида остеосинтез қўлланилиши биологик остеосинтез қонуниятларига зид келади. Шунинг учун (В.Н.Гришин 2005) баъзи муаллифлар пружинасимон (W-симон эгилган) Киршнер кегайдан фойдаланишади [2,14,15,20].

Адабиётлар рўйхати:

1. Архипов С.В., Лычагин А.В. Современные аспекты лечения посттравматического деформирующего артроза голеностопного сустава. Вестник Травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова 2000:№4: 64-67 стр.
2. Бейдик О.В. Наружный чрезкожный остеосинтез при повреждениях дистальных эпиметафизов костей голени. Материалы VII съезда Травматологов-ортопедов России. Новосибирск 2002. – Т.1. Стр. 391-392.
3. Губанов А.В. Результаты оперативного лечения переломов лодыжек. Молодой ученый 2016 №3(2):165-167 стр.
4. Гюльназарова С.В., Давтян Г.Г. Восстановление функции голеностопного сустава при застарелых разрывах связок дистального межберцового синдесмоза. Гений ортопедии, №2, 2010. Стр. 81-84.
5. Доценко П.В., Демочкидов Р.А., Бровкин С.В. Лечение переломов лодыжек. Травматология и ортопедия XXI века: материалы VIII съезда Травматологов и ортопедов России. Самара 2006. Стр. 173-174.
6. Каллаев Н.О., Лыжина Е.Л., Каллаев Т.Н. Сравнительный анализ оперативных методов лечения около- и внутрисуставных переломов и переломовывихов голеностопного сустава. Вестник Травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова, 2004, №1. Стр. 32-35.
7. Кезля О.П., Харькович И.И., Ярмолович В.А., Бенько А.Н. Переломы заднего края дистального эпифиза большеберцовой кости. Вкн: Современные проблемы травматологии и ортопедии. Воронеж: 2004: 124-125 стр.
8. Литвинов И.И., Ключевский В.В. Накостный малоинвазивный остеосинтез при закрытых нижней трети большеберцовой кости. Вестник Травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова, 2006, №1. Стр. 13-17.
9. Сысенко Ю.М., Смелышев К.Н. Возможности чрескостного остеосинтеза при лечении больных с внутрисуставными переломами дистального эпиметафиза большеберцовой кости. Гений Ортопедия №2. 2013. 96-99 стр.
10. Оганесян О.В., Коршунов А.В. Вестник Травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова. – 2002. №3. 83-87 стр.
11. Омельченко Т.Н. Переломы лодыжек и быстро прогрессирующий повреждения нижних конечностей как причины стойкой утраты трудоспособности. Ортопедия, травматология и протезирование 2013: 4 (593): 35-41 стр.
12. Павлов Д.В., Воробьева О.В. Клинико-биомеханическая оценка статико- динамических показателей после эндопротезирования голеностопного сустава.

стопного сустава. Вопросы с . 2012: №4(5): 7-11 стр.

13. Панков И.О., Салихов Р.З., Нагматуллин В.Р. Современные методы хирургического лечения неустраненных разрывов связок дистального межберцового сочленения. Практическая медицина. Казань. 2014. 4 (80) июнь, Том 2. 100-103 стр.

14. Панков О.И. Чрескостный остеосинтез при пронационно-эверсионных переломах дистального суставного отдела костей голени. Практическая медицина №4 (96) август. 2016. Т. 136-138 стр.

15. Панков И.О., Ю Салихов В.Р., Нагматуллин В.Р. Современные методы хирургического лечения неустраненных разрывов связок дистального межберцового сочленения. Практическая медицина №4 (80) июль. 2014. Т. 100-104 стр.

16. Солод Э.И., Лазарев А.Ф., Гудушаури Я.Т., Какабадзе М.Т., Раскидайло А.С. Переломы

лодыжек: особенности и новые возможности лечения. Вестник травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова, 2011, №4. Стр. 19-22.

17. Телицын П.Н., Жила И.Г. Тактика лечения переломов и переломовывихов костей голеностопного сустава. Практическая медицина №6 (80) октябрь. 2015. Т. 31-36 стр.

18. Шаматов Н.М., Унгбоев Т.Э., Примов К.М. Диагностика и лечение повреждений голеностопного сустава. Ташкент, Медицина: 1985, 79с.

19. Шмидт Р., Бенели С. Влияние анатомических реконструкций связок на комплекс голеностопного сустава. Исследование Травматология и ортопедии им. Н.Н. Приорова, 2000: №4; 64-67 стр.

20. Яременко Д.А., Шевченко Е.Г., Тармис В.Б. Внутрисуставной остеосинтез нижних конечностей как причины стойкой утраты трудоспособности. Ортопедия, травматология и протезирование. 2014: №2. 46-47 стр.

Иқтибос учун: Ғафуров Ф.А. Жарроҳлик усулида ошиқ-болдир бўғими жароҳатланишларини замонавий даволаш усуллари // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2026. – № 4(24). – Б. 653–657. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19629293>

ОСОБЕННОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ БРОНХООБСТРУКТИВНОГО СИНДРОМА У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА ПИТАНИЯ

Тураев Т.Т., Шокиров Т.Б.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. В последнее десятилетие в структуре поражения органов дыхания отмечается увеличение удельного веса обструктивных бронхитов (ОБ), что связано с увеличением числа часто болеющих детей и воздействием неблагоприятных факторов окружающей среды и видом питания. Тип питания влияет на риск: искусственное вскармливание повышает частоту БОС из-за возможной пищевой аллергии, тогда как грудное вскармливание обеспечивает защиту. Дифференциальная диагностика необходима для исключения пороков развития, муковисцидоза и аспирации пищи.

Ключевые слова: бронхообструктивный синдром, дети раннего возраста, грудное вскармливание, искусственное вскармливание, дифференциальная диагностика, аллергия, иммунитет

FEATURES OF OCCURRENCE AND DIFFERENTIAL DIAGNOSIS OF BRONCHO- OBSTRUCTIVE SYNDROME IN EARLY CHILDHOOD ACCORDING TO THE TYPE OF NUTRITION

Turaev T.T., Shokirov T.B.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. In the last decade, there is an increase in the specific weight of obstructive bronchitis (OB) in the structure of the respiratory system, which is related to the increase in the number of frequently sick children and the impact of adverse environmental factors in the form of nutrition. The type of nutrition affects the risk: artificial breastfeeding increases the frequency of BOS due to a possible food allergy, while breastfeeding provides protection. Differential diagnosis is necessary for the exclusion of developmental defects, mucoviscidosis and aspiration of food.

Keywords: broncho-obstructive syndrome, children of early age, breastfeeding, artificial feeding, differential diagnosis, allergy, immunity.

ОВҚАТЛАНИШ ТУРИГА КЎРА ЭРТА ЁШДАГИ БОЛАЛАРДА БРОНХО-ОБСТРУКТИВ СИНДРОМНИНГ УЧРАШ ХУСУСИЯТЛАРИ ВА ДИФФЕРЕНЦИАЛ ДИАГНОСТИКАСИ

Тураев Т.Т., Шокиров Т.Б.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Сўнгги ўн йилликда нафас олиш тизими системасида обструктив бронхит (ОБ) ҳолатларининг ортиши кузатилмоқда, бу тез-тез касал бўладиган болалар сонининг кўпайиши ва овқатланиш шаклидаги ноқулай экологик омилларнинг таъсири билан боғлиқ. Овқатланиш тури касаллик хавфига таъсир қилади: сунъий овқатлантириш озиқ-овқат аллергияси туфайли БОС частотасини оширади, эмизish эса ҳимоя қилади. Ривожланиш нуқсонлари, муковисцидоз ва овқат аспирациясини истисно қилиш учун дифференциал диагностика ўтказиш зарур.

Калит сўзлар: бронхо-обструктив синдром, эрта ёш болалар, эмизish, сунъий озиқлантириш, дифференциал тахис, аллергия, иммунитет

e-mail: telmonturayev2022@gmail.com

Актуальность. Бронхообструктивный синдром (БОС) у детей раннего возраста представляет собой одну из наиболее актуальных проблем современной педиатрии, обусловленную высокой распространенностью, разнообразием этиологических факторов и сложностью дифференциальной диагностики. Особую значимость приобретает изучение влияния типа питания на формирование и течение бронхообструктивных состояний, поскольку питание в раннем возрасте является ключевым фактором, влияющим на иммунную систему, метаболические процессы и формирование аллергической предрасположенности [4].

Бронхообструктивный синдром (БОС) является одним из наиболее распространенных клинических синдромов у детей раннего возраста и характеризуется нарушением проходимости бронхиаль-

ного дерева вследствие воспалительных, аллергических или инфекционных процессов [1]. Частота его возникновения у детей первых лет жизни достигает 25–30% среди всех заболеваний органов дыхания [2].

Особенностью детского возраста является анатомо-физиологическая незрелость дыхательной системы: узкий просвет бронхов, повышенная реактивность слизистой оболочки, склонность к гиперсекреции слизи и недостаточная эффективность мукоцилиарного клиренса [3]. Эти факторы способствуют быстрому развитию обструкции даже при незначительном воспалительном процессе.

Одним из ключевых факторов, влияющих на формирование бронхообструктивного синдрома, является тип питания ребенка. Грудное вскармливание рассматривается как важнейший защитный фактор благодаря наличию иммуноглобулинов, цитокинов и других биологически активных веществ [5]. В то же время искусственное вскармливание связано с более высоким риском развития аллергических заболеваний и респираторных патологий [6].

Несмотря на большое количество исследований, посвященных бронхообструктивному синдрому, вопрос влияния типа питания на особенности его возникновения и течения остается недостаточно изученным, особенно в условиях региональных медицинских центров.

Согласно данным современной литературы, бронхообструктивный синдром у детей раннего возраста имеет полиэтиологическую природу. Основными причинами являются вирусные инфекции, аллергические реакции, врожденные аномалии и иммунологические нарушения [7].

Исследования показывают, что вирусные инфекции, такие как респираторно-синцитиальный вирус, играют ведущую роль в развитии БОС у детей до 2 лет [8]. Однако у значительной части пациентов выявляется аллергический компонент, который усиливает выраженность обструкции [9].

В ряде исследований подчеркивается роль питания как одного из факторов риска. Так, дети, находящиеся на грудном вскармливании, имеют более низкую частоту бронхиальной обструкции по сравнению с детьми на искусственном вскармливании [10]. Это объясняется наличием в грудном молоке секреторного IgA, лактоферрина и других защитных факторов [11].

Искусственное вскармливание, напротив, связано с повышенной сенсibilизацией организма, что способствует развитию аллергических заболеваний, включая бронхиальную астму и бронхообструктивный синдром [12].

Некоторые авторы также отмечают, что раннее введение прикорма может увеличивать риск развития аллергических реакций и бронхообструкции [13].

Бронхообструктивный синдром у детей раннего возраста представляет собой сложное клиническое состояние, в основе которого лежит взаимодействие множества факторов, включая инфекционные, аллергические и иммунологические механизмы [4]. Важным аспектом является влияние типа питания на формирование иммунного ответа.

Грудное молоко содержит уникальные компоненты, которые способствуют формированию адекватного иммунитета. Секреторный иммуноглобулин А обеспечивает защиту слизистых оболочек, предотвращая адгезию патогенных микроорганизмов [14]. Кроме того, грудное молоко содержит противовоспалительные цитокины, которые снижают выраженность воспалительного процесса.

В отличие от этого, искусственные смеси не могут полностью воспроизвести состав грудного молока, что приводит к снижению иммунной защиты и повышению риска инфекционных и аллергических заболеваний [15].

Одним из ключевых механизмов развития бронхообструкции является воспаление слизистой оболочки бронхов, сопровождающееся отеком, гиперсекрецией слизи и спазмом гладкой мускулатуры [16]. У детей на искусственном вскармливании эти процессы выражены более интенсивно.

Кроме того, у таких детей чаще наблюдается гиперреактивность бронхов, что связано с нарушением регуляции иммунного ответа и повышенной чувствительностью к аллергенам [17].

Особое значение в формировании бронхообструктивного синдрома имеет микробиота кишечника, которая во многом зависит от типа питания ребенка. У детей, находящихся на грудном вскармливании, преобладают бифидо- и лактобактерии, способствующие формированию толерантного иммунного ответа [18]. В то время как у детей на искусственном вскармливании наблюдается дисбиоз, который может усиливать воспалительные реакции и способствовать развитию аллергических заболеваний [4, 19].

Дополнительным фактором является уровень витаминов и микроэлементов. Доказано, что дефицит витамина D связан с повышенным риском развития респираторных заболеваний и бронхообструкции [20]. Тип питания напрямую влияет на обеспеченность ребенка данными нутриентами.

При проведении дифференциальной диагностики бронхообструктивного синдрома у детей раннего возраста необходимо учитывать широкий спектр заболеваний. Наиболее часто БОС следует

дифференцировать с острым бронхолитом, бронхиальной астмой, врожденными аномалиями дыхательных путей, а также аспирацией инородного тела [7].

Важным диагностическим критерием является характер течения заболевания. При инфекционной природе БОС чаще наблюдается острое начало с повышением температуры тела и выраженными симптомами интоксикации. В случае аллергической природы заболевание имеет рецидивирующее течение и часто сочетается с другими проявлениями атопии [4., 9].

Таким образом, тип питания следует рассматривать как один из значимых факторов, который необходимо учитывать при проведении дифференциальной диагностики бронхообструктивного синдрома.

Таким образом, анализ литературы показывает, что тип питания оказывает значительное влияние на развитие бронхообструктивного синдрома, однако требует дальнейшего изучения в клинических условиях.

Целью данного исследования явилось изучение особенностей возникновения бронхообструктивного синдрома у детей раннего возраста в зависимости от типа питания, а также совершенствование подходов к дифференциальной диагностике данного состояния.

Материалы и методы: исследование проведено на базе Бухарского областного многопрофильного детского медицинского центра. В исследование включены дети в возрасте от 1 месяца до 3 лет, находившиеся на стационарном лечении с признаками бронхообструктивного синдрома. Проведен анализ клинических, анамнестических, лабораторных и инструментальных данных, включая оценку типа питания (грудное, искусственное, смешанное).

Результаты. В ходе проведенного исследования были проанализированы данные 86 детей в возрасте от 1 месяца до 3 лет с диагнозом бронхообструктивного синдрома.

Все пациенты были распределены на три группы в зависимости от типа питания:

- I группа — дети на грудном вскармливании (n=28)
- II группа — дети на смешанном вскармливании (n=30)
- III группа — дети на искусственном вскармливании (n=28)

Анализ показал, что частота развития бронхообструктивного синдрома была значительно выше в группе детей на искусственном вскармливании ($p < 0,05$) [2].

У детей III группы отмечалось:

- более тяжелое течение заболевания (64%)
- высокая частота рецидивов (57%)
- выраженная бронхиальная обструкция по данным клинического обследования

В то время как у детей I группы:

- легкое течение наблюдалось в 68% случаев
- рецидивы встречались значительно реже (21%)
- быстрее наступало клиническое улучшение

Лабораторные данные показали, что у детей на искусственном вскармливании чаще выявлялись повышенные уровни маркеров воспаления (СРБ, лейкоцитоз), а также признаки аллергической сенсибилизации (эозинофилия) [10].

Инструментальные методы исследования (рентгенография органов грудной клетки, пульсоксиметрия) подтвердили более выраженные изменения у детей на искусственном вскармливании.

Результаты показали, что у детей, находящихся на искусственном вскармливании, бронхообструктивный синдром развивается чаще и протекает более тяжело, что связано с повышенной частотой аллергических реакций и незрелостью иммунной системы. [4]. У детей на грудном вскармливании отмечено более легкое течение заболевания и меньшая частота рецидивов.

Полученные результаты свидетельствуют о значительном влиянии типа питания на клиническое течение бронхообструктивного синдрома.

Заключение. Бронхообструктивный синдром у детей раннего возраста является мультифакторным состоянием, развитие которого зависит от сочетания инфекционных, аллергических и иммунологических факторов.

Результаты исследования показали, что тип питания играет ключевую роль в формировании данного синдрома. Грудное вскармливание оказывает защитное действие, снижая риск развития бронхообструкции и облегчая течение заболевания.

Искусственное вскармливание, напротив, связано с более тяжелым течением бронхообструктивного синдрома, высокой частотой рецидивов и выраженными воспалительными изменениями.

Тип питания является важным фактором, влияющим на развитие и клиническое течение бронхообструктивного синдрома у детей раннего возраста. Учет данного фактора позволяет улучшить диагностику и индивидуализировать терапевтические подходы.

Учет типа питания при диагностике и лечении бронхообструктивного синдрома позволяет повысить эффективность медицинской помощи и снизить риск осложнений.

Таким образом, рекомендуется:

- поддержка и поощрение грудного вскармливания
- индивидуализация подходов к лечению детей с учетом типа питания
- ранняя диагностика и профилактика аллергических состояний

Список литературы:

1. Иванов А.А. Бронхообструктивный синдром у детей. – М., 2019.
2. Петрова И.В. Респираторные заболевания у детей раннего возраста. – СПб., 2020.
3. Смирнов Д.В. Анатомо-физиологические особенности дыхательной системы у детей. – М., 2018.
4. Тураев Т.Т. Дифференциальная диагностика респираторных аллергозов и атипичных пневмоний при коинфекции: клинико-лабораторные, иммунологические индикаторы. Диссертация на соискание ученой степени доктора (DSC) медицинских наук. Бухара. 2025 г
5. Hanson L.A. Immunobiology of human milk. – Stockholm, 2017.
6. Oddy W.H. Breastfeeding and respiratory health. – Pediatrics, 2016.
7. Global Initiative for Asthma (GINA). Global Strategy, 2022.
8. Hall C.B. Respiratory syncytial virus infections. – N Engl J Med, 2015.
9. Martinez F.D. Asthma and wheezing in early childhood. – NEJM, 2017.
10. Kramer M.S. Breastfeeding and child health. – Lancet, 2018.
11. Victora C.G. Breastfeeding in the 21st century. – Lancet, 2016.
12. Prescott S.L. Early life nutrition and allergy. – J Allergy Clin Immunol, 2017.
13. Fewtrell M. Complementary feeding. – BMJ, 2017.
14. Field C.J. The immunological components of human milk. – Nutrients, 2019.
15. Koletzko B. Infant nutrition. – Ann Nutr Metab, 2018.
16. Barnes P.J. Pathophysiology of airway inflammation. – Chest, 2016.
17. Holgate S.T. Mechanisms of asthma. – Nat Rev Immunol, 2015.
18. Arrieta M.C. Gut microbiota and immunity. – Front Immunol, 2018.
19. Wopereis H. The first thousand days microbiome. – Pediatr Allergy Immunol, 2019.
20. Martineau A.R. Vitamin D and respiratory infections. – BMJ, 2017.

Для цитирования: Тураев Т.Т., Шокиров Т.Б. Особенности возникновения и дифференциальной диагностики бронхообструктивного синдрома у детей раннего возраста в зависимости от типа питания // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 4(24). – С. 658–661. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19629394>

MODERN METHODS FOR DIAGNOSTICING KNEE JOINT INJURIES IN PROFESSIONAL FOOTBALL PLAYERS**Anvarov A.A., Burkhanova G.L.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Knee joint injuries are one of the most pressing issues in sports medicine, especially among football players, where high intensity of loads leads to frequent damage to the ligament apparatus and meniscus. The aim of the study is to analyze modern methods for diagnosing knee joint injuries and to evaluate their clinical significance in early detection of injuries and the optimization of further treatment and rehabilitation tactics. The work utilized data from scientific literature and clinical observations of athletes aged 16–25. The results show that a comprehensive diagnostic approach, including MRI, ultrasound, functional tests, and biomechanical analysis of movements, ensures high diagnostic accuracy and contributes to reducing the risk of complications.

Keywords: football players, knee joint, ACL, MRI, sports medicine, diagnostics, biomechanics.

**ПРОФЕССИОНАЛ ФУТБОЛЧИЛАРДА ТИЗЗА БЎЎИМИ ЖАРОҲАТЛАРИ
ДИАГНОСТИКАСИНИНГ ЗАМОНАВИЙ УСУЛЛАРИ****Анваров А.А., Бурханова Г.Л.**

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш, Ўзбекистон

Резюме. Тизза бўғими жароҳатлари спорт тиббиётининг энг долзарб муаммоларидан бири ҳисобланади, айниқса футболчилар орасида, бу ерда юқори даражадаги юкламалар пай аппарати ва менискларнинг тез-тез шикастланишига олиб келади. Тадқиқотнинг мақсади тизза бўғими жароҳатларини таххислашининг замонавий усулларини таххил қилиш ва уларнинг жароҳатларни эрта аниқлаш ҳамда кейинги даволаш ва реабилитация тактикасини оптималлаштиришидаги клиник аҳамиятини баҳолашдан иборат. Ишда илмий адабиётлар ва 16-25 ёшдаги спортчиларнинг клиник кузатувлари маълумотларидан фойдаланилган. Натижалар шуни кўрсатадики, МРТ, ультратовуви текшируви, функционал тестлар ва ҳаракатларнинг биомеханик таххилини ўз ичига олган комплекс диагностика ёндашуви таххиснинг юқори аниқлигини таъминлайди ва асоратлар хавфини камайтиришга ёрдам беради.

Калит сўзлар: футболчилар, тизза бўғими, ACL, МРТ, спорт тиббиёти, диагностика, биомеханика.

**СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ ТРАВМ КОЛЕННОГО СУСТАВА У
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ФУТБОЛИСТОВ****Анваров А.А., Бурханова Г.Л.**

Самаркандский государственный медицинский университет, г.Самарканд, Узбекистан

Резюме. Травмы коленного сустава являются одной из наиболее актуальных проблем спортивной медицины, особенно среди футболистов, где высокая интенсивность нагрузок приводит к частым повреждениям связочного аппарата и менисков. Целью исследования является анализ современных методов диагностики повреждений коленного сустава и оценка их клинической значимости в раннем выявлении травм и оптимизации дальнейшей тактики лечения и реабилитации. В работе использованы данные научной литературы и клинических наблюдений спортсменов в возрасте 16–25 лет. Результаты показывают, что комплексный диагностический подход, включающий МРТ, УЗИ, функциональные тесты и биомеханический анализ движений, обеспечивает высокую точность диагностики и способствует снижению риска осложнений.

Ключевые слова: футболисты, коленный сустав, ACL, МРТ, спортивная медицина, диагностика, биомеханика

e-mail: abdumannonanvarov@gmail.com

1. Admission. Knee joint injuries are one of the most pressing issues in modern sports medicine, especially in high-intensity sports such as football. According to international research data, the knee joint ranks first in the frequency of injuries among large joints in athletes, and its injuries account for up to 30-

40% of all sports injuries [1]. This is related to the anatomical and functional characteristics of the joint, as well as the nature of football activity, which includes sharp changes in movement direction, acceleration, braking, jerks, and contact collisions.

Injuries to the anterior cruciate ligament (ACL), medial collateral ligament (MCL), and meniscus are of particular importance in the structure of knee joint injuries. An ACL tear is considered one of the most severe sports injuries, as it leads to pronounced joint instability, prolonged loss of athletic performance, and the need for surgical intervention followed by prolonged rehabilitation [2]. Even with successful treatment, the risk of secondary injury remains quite high and can reach significant levels in young athletes.

Modern sports medicine considers knee joint injuries not only as an anatomical injury but also as a complex violation of movement biomechanics. After an injury, athletes often develop compensatory motor strategies, muscle imbalance, and a decrease in proprioceptive sensitivity, which significantly increases the risk of repeated injuries [3]. In this regard, the role of not only treatment but also early and accurate diagnosis is increasing, allowing for the timely determination of the degree of injury and the development of optimal patient management tactics.

Traditional clinical examination methods, despite their accessibility and simplicity, do not always ensure sufficient diagnostic accuracy, especially in cases of partial damage to the ligament apparatus or combined injuries. In this regard, modern instrumental research methods, such as magnetic resonance imaging (MRI), ultrasound examination (USI), as well as functional and biomechanical assessment methods, are of particular importance [4].

To date, MRI is considered the "gold standard" in the diagnosis of intra-articular injuries, but even it requires interpretation in conjunction with clinical and functional data. Ultrasound, in turn, allows for the dynamic assessment of soft tissue structures and is an important auxiliary method. Additional functional tests and biomechanical analysis of movements allow for the assessment of not only structural but also functional changes, which is especially important when deciding on an athlete's return to training and competitions.[8,9]

Thus, the relevance of this study is due to the high prevalence of knee joint injuries in football players, the significant impact of these injuries on sports careers, as well as the need to improve diagnostic approaches. The comprehensive use of modern diagnostic methods increases the accuracy of injury detection, optimizes treatment, and reduces the risk of recurrent injuries, which is of great importance for sports medicine and rehabilitation. [10]

Table 1.

Frequency of Knee Injuries in Professional Football Players

Injury Type	Percentage (%)	Main Cause
ACL tear	25–40%	Sudden pivoting, contact
Meniscus injury	15–30%	Twisting movements
MCL injury	10–20%	Lateral impact
Cartilage damage	10–15%	Overuse
Patellar injury	5–10%	Jumping stress

2. Review literature. Modern research demonstrates that the diagnosis of knee joint injuries should be viewed as a multi-level process that includes anatomical, functional, and biomechanical assessment.

2.1. Epidemiology of knee injuries. Ekstrand J. et al. (2019) in a large study of professional football players showed that ACL injuries account for up to 20-25% of all serious lower limb injuries [2]. The authors note that the risk of recurrent injury is especially high in the first 12 months after returning to sports.

2.2. Clinical Diagnostics. Classical orthopedic tests (Lachman, Pivot shift, McMurray) remain the basic methods of primary diagnosis. However, according to data from Scholten et al. (2020), their sensitivity ranges from 60% to 85%, which limits their independent use [3].

2.3. Role MRI. Stoller D.W. emphasizes that magnetic resonance imaging is the "gold standard" for diagnosing soft tissue injuries of the knee joint, with an accuracy of up to 95% in meniscus and ACL tears [4].

However, some authors note that MRI does not always reflect functional stability of the joint, which requires additional assessment methods.

2.4. Ultrasound Diagnosis. According to the research of Razeq et al. (2018), ultrasound is an effective method of dynamic assessment of the connective apparatus and synovial structures, especially in the acute period of trauma [5]. The advantage of the method is its accessibility and the possibility of repeating the research multiple times.

2.5. Biomechanical analysis. Modern research in sports biomechanics indicates that up to 70% of recurrent ACL injuries are associated with the disruption of motor stereotypes [6]. Motion capture systems allow you to detect:

- load asymmetry
- violation of angular traffic parameters
- compensatory mechanisms

2.6. Functional tests. FIFA Medical Network recommends using Single-leg hop and Triple hop tests to assess an athlete's readiness for a return to the game [7]. These tests allow for the assessment of not only strength but also neuromuscular control.

Table 2 .

Summary Table (Literature Data)

Method	Accuracy	Role
MRI	90-95%	Anatomical Diagnostics
UZI	70–80%	Dynamic assessment
Clinical tests	60-85%	Primary screening
Biomechanics	85–90%	Functional analysis
Jump tests	80-88%	Sports fitness

3. Material and methods. The study included data from scientific publications and clinical observations of football players aged 16-25 with suspected knee joint injuries.

The following diagnostic methods were applied:

- High-resolution MRI (1.5–3 Tesla)
- Dynamic joint ultrasound
- Clinical stability tests
- Isokinetic muscle testing
- Biomechanical analysis of gait and posture
- Functional tests (hop tests)

Table 3.

Diagnostic Methods for Knee Injuries in Football Players

Method	Type	Sensitivity (%)	Specificity (%)	Clinical Use
MRI (Magnetic Resonance Imaging)	Imaging	90–98	85–95	ACL, meniscus, cartilage injuries
Ultrasound	Imaging	70–85	65–80	Soft tissue evaluation
X-ray	Imaging	40–60	70–90	Bone fractures, alignment
Arthroscopy	Invasive	95–100	95–100	Gold standard confirmation
Clinical Tests (Lachman, McMurray)	Physical exam	60–85	55–80	Initial screening

4. Results. Analysis has shown that using only clinical tests is insufficient for the accurate diagnosis of complex injuries.

The combined approach allowed for:

- increase diagnosis accuracy by 15-25%
- reduce the number of missed partial breaks
- improve recovery forecast

In athletes who underwent comprehensive diagnostics, the following was observed:

- earlier diagnosis
- accurate determination of damage level
- individualization of treatment

Descriptive. Effectiveness of diagnostic methods:

- MRI → 95%

- Biomechanics → 90%
- Ultrasound → 75% ultrasound
- Clinical tests → 70%

Table 4.

Diagnostic Accuracy Comparison

Method	Early Detection	Cost	Time Efficiency	Accuracy
MRI	Excellent	High	Moderate	Very High
Ultrasound	Good	Low	High	Moderate
Clinical exam	Moderate	Very Low	Very High	Low–Moderate
Arthroscopy	Excellent	Very High	Low	Highest

5. Discussion. The results obtained confirm the modern concept of sports medicine, according to which diagnosis should be not only anatomical but also functional.

MRI provides high accuracy, but does not reflect the dynamic stability of the joint. Biomechanical analysis and functional tests compensate for this deficiency, allowing for an assessment of real sports readiness.

Early diagnosis of ACL injuries is of particular importance, as late detection increases the risk of degenerative changes and recurrent injuries.

Thus, the most effective strategy is integration: MRI + clinical tests + biomechanics + functional tests

6. Conclusions. An analysis of modern methods for diagnosing knee joint injuries in football players showed that this problem remains one of the most pressing in sports medicine. The high frequency of injuries, especially injuries to the anterior cruciate ligament (ACL) and meniscus, requires the application of accurate, informative, and comprehensive diagnostic approaches.

It has been established that magnetic resonance imaging (MRI) is the most informative method for visualizing intra-articular structures, ensuring high sensitivity and specificity in detecting even partial lesions of the connective apparatus. However, using only instrumental methods does not allow for a full assessment of the athlete's functional state.

An important addition to visualization methods is functional tests and biomechanical analysis of movements, which allow for the identification of hidden motor control disorders, load asymmetry, and compensatory mechanisms. This is especially important in football, where returning to sports without a full functional assessment significantly increases the risk of repeated injuries.

Thus, the most effective approach is multidisciplinary and comprehensive diagnostics, including clinical examination, instrumental methods, and functional assessment. This approach allows not only to accurately determine the nature of the injury but also to optimize subsequent treatment and rehabilitation tactics for athletes.

Output:

1. Knee joint injuries are one of the most common problems in football and occupy a significant place in the structure of sports injuries.

2. The most common injuries are ruptures of the anterior cruciate ligament (ACL), meniscus injuries, and medial collateral ligament (MCL), which require accurate and early diagnosis.

3. Magnetic resonance imaging (MRI) is the "gold standard" for diagnosing intra-articular injuries due to its high informativeness and accuracy.

4. Ultrasound examination, clinical tests, and functional diagnostic methods are of auxiliary importance and increase the overall accuracy of the examination.

5. Biomechanical analysis of movements allows for the identification of functional disorders that are not determined by standard diagnostic methods.

6. A comprehensive diagnostic approach significantly improves the quality of diagnosis, contributes to the correct choice of treatment tactics, and reduces the risk of recurrent injuries.

7. Early and accurate diagnosis is a key factor in the successful return of athletes to professional activities.

References:

1. Ekstrand J., Häggglund M., Waldén M. Injury incidence and injury patterns in professional football: the UEFA injury study. *British Journal of Sports Medicine*. 2019;53(9):1–8.
2. Ardern C. L., Webster K. E., Taylor N. F., Feller J. A. Return to sport following anterior cruciate ligament reconstruction surgery: a systematic

review and meta-analysis. American Journal of Sports Medicine. 2014;42(7):1567–1577.

3. FIFA Medical Centre of Excellence. Football Medicine Manual: Sports Injuries and Prevention. Zurich: FIFA; 2020.

4. Stoller D. W. Magnetic Resonance Imaging in Orthopaedics and Sports Medicine. Philadelphia: Wolters Kluwer; 2017.

5. Griffin L. Y., Agel J., Albohm M. J. Non-contact anterior cruciate ligament injuries: risk factors and prevention strategies. Journal of the American Academy of Orthopaedic Surgeons. 2000;8(3):141–150.

6. Hewett T. E., Myer G. D., Ford K. R. Biomechanical measures of neuromuscular control and valgus loading of the knee predict ACL injury

risk. American Journal of Sports Medicine. 2005;33(4):492–501.

7. Butler R. J., Queen R. M. Functional performance deficits following ACL injury: biomechanical considerations. Sports Health. 2016;8(5):1–9.

8. Kapandji I. A. The Physiology of the Joints. Volume 2: Lower Limb. Edinburgh: Churchill Livingstone; 2011.

9. McCarty E.C., Marx R.G., DeHaven K.E. Meniscus repair: clinical outcomes // Sports Medicine and Arthroscopy Review. - 2012. - T. 20, No 2. - C. 86-94.

10. Kibler W.B., Press J., Sciascia A. The role of core stability in athletic function // Sports Medicine. - 2006. - T. 36, No 3. - C. 189-198.

For citation: Anvarov A.A., Burkhanova G.L. Modern methods for diagnosing knee joint injuries in professional football players // Bulletin of Fundamental and Clinic Medicine. – 2026. – № 4(24). – P. 662–666. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19658656>

КУЙИШ ШОКИДА ИНТЕНСИВ ТЕРАПИЯ УСУЛЛАРИНИНГ КЛИНИК-ПАТОФИЗИОЛОГИК САМАРАДОРЛИГИ

Ҳайдаров М.М.

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Ушбу тадқиқот куйиш шокида интенсив терапия усуллариининг клиник-патофизиологик самарадорлигини баҳолашга бағишланган. 23 нафар беморда гемодинамик кўрсаткичлар, сув-электролит мувозанати ва коагуляция тизими таҳлил қилинди. Даволаш Parkland формуласи асосида бошланиб, кейинчалик бемор ҳолатига қараб индивидуал тузатилди. Натижалар куйиш шокида гиповолемия ва микроциркуляция бузилишлари асосий аҳамиятга эга эканлигини кўрсатди. Оғир ҳолатларда инфузион терапия билан бирга инотроп препаратлар қўллаш зарурлиги аниқланди.

Калит сўзлар: куйиш шоки, интенсив терапия, гиповолемия, инфузион терапия, Parkland формуласи, гемодинамика, микроциркуляция, кристаллоид ва коллоид эритмалар.

CLINICAL AND PATHOPHYSIOLOGICAL EFFECTIVENESS OF INTENSIVE THERAPY METHODS IN BURN SHOCK

Haydarov M.M.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. This study is devoted to evaluating the clinical and pathophysiological effectiveness of intensive therapy methods in burn shock. Hemodynamic parameters, water-electrolyte balance, and coagulation system were analyzed in 23 patients. Treatment was initiated based on the Parkland formula and subsequently adjusted individually according to the patient's condition. The results showed that hypovolemia and microcirculatory disorders play a key role in burn shock. In severe cases, the use of inotropic agents along with infusion therapy was found to be necessary.

Keywords: burn shock, intensive therapy, hypovolemia, infusion therapy, Parkland formula, hemodynamics, microcirculation, crystalloids and colloids

КЛИНИКО-ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕТОДОВ ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ОЖГОВОМ ШОКЕ

Хайдаров М.М.

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Данное исследование посвящено оценке клинико-патофизиологической эффективности методов интенсивной терапии при ожоговом шоке. У 23 пациентов были проанализированы гемодинамические показатели, водно-электролитный баланс и система коагуляции. Лечение начиналось на основе формулы Паркланда с последующей индивидуальной коррекцией в зависимости от состояния пациента. Результаты показали, что гиповолемия и нарушения микроциркуляции играют ключевую роль в патогенезе ожогового шока. При тяжёлых состояниях наряду с инфузионной терапией необходимым является применение инотропных препаратов.

Ключевые слова: ожоговый шок, интенсивная терапия, гиповолемия, инфузионная терапия, формула Паркланда, гемодинамика, микроциркуляция, кристаллоидные и коллоидные растворы.

e-mail: musohaydarov7@gmail.com

Кириш. Куйиш шоки гиповолемия билан кечиб, тери ҳамда ундан чуқур жойлашган тўқималарнинг кенг ҳажмли термик жароҳатланишлари натижасида ривожланадиган оғир патологик ҳолат ҳисобланади. У травматик шокнинг бир шакли бўлсада, патогенетик жиҳатидан ўзига хос хусусиятларга эга. Ушбу хусусиятлар организмда суюқликнинг катта миқдорда қайта тақсимланиши ҳамда термик жароҳатланиш соҳасида узок муддат сақланиб қолувчи шишнинг ривожланиши билан изоҳланади. Термик жароҳатда капиллярлар ўтказувчанлиги ошиши натижасида суюқликнинг кон томирлар ўзанидан интерстициал бўшлиққа чиқиши жараёни 12–18 соат ва ундан ортиқ вақт давомида кечеди. Шу сабабли куйиш шокида артериал босимнинг пасайиши жароҳатдан кейин дарҳол эмас, балки маълум муддат ўтгач намоён бўлади. Куйиш билан боғлиқ гиповолемия тизимли

гемодинамик бузилишларни ва микроциркуляция издан чиқишини янада чуқурлаштиради. Куйишда гиповооemia қон айланиши ва микроциркуляцияни бузилишини янада чуқурлаштириб юборади. Куйиш майдони кенг бўлганда капиллярлар ўтказувчанлигининг ортиши нафақат маҳаллий характерга эга бўлади, балки бутун организм миқёсида намоён бўлиши мумкин. Хужайрадан ташқари суюқликнинг маълум қисми қон томирлар ўзанидан қайтмас равишда чиқиб кетади, қолган қисми эса вақтинчалик интерстициал бўшлиқда тўпланади. Қайтмас йўқотишлар асосан куйган тана юзасидан экссудация ҳисобига юзага келади, аста-секин резорбцияланувчи шиш эса вақтинчалик суюқлик йўқотилишини ташкил этади. Фаол хужайрадан ташқари бўшлиқ ҳажмининг камайиши ва шу билан боғлиқ равишда айланиб юрувчи қон ҳажмининг пасайиши куйиш майдони катталигига тўғридан-тўғри пропорционалдир. Шу муносабат билан куйиш шокида шокка қарши терапияни олиб боришда ушбу ҳолатнинг патогенетик механизмларини ҳисобга олиш муҳим аҳамият касб этади.

Тадқиқотнинг мақсад ва вазифаси — куйиш шокидаги беморларда қўлланилаётган интенсив терапия усулларининг клиник ва патофизиологик самарадорлигини таҳлил қилиш, шокка қарши замонавий терапевтик стратегияларни баҳолаш, шунингдек, шокни даволаш жараёнидаги асосий камчиликлар ва мураккабликларни илмий асосда аниқлаш ва уларнинг оқибатини таҳлил қилишдан иборат. Олинган натижалар асосида куйиш шокида интенсив терапияни такомиллаштириш бўйича амалий тавсиялар ишлаб чиқиш.

Материал ва методлар. Тадқиқот ишини бажариш мақсадида РШТЁИМ Самарқанд филиали комбустиология бўлимида даволанган, куйиш шоки ривожланган кенг майдонли куйишларга эга бўлган 14 ёшдан 63 ёшгача бўлган 23 нафар беморнинг касаллик тарихлари таҳлил қилинди. Куйиш шокининг I даражаси тана юзасининг 15–20% куйиши билан кечган 9 нафар беморда, II даражаси (оғир шок) тана юзасининг 21–60% куйиши билан кечган 11 нафар беморда, III даражаси (жуда оғир куйиш шоки) эса тана юзасининг 60% дан ортик қисми куйган 3 нафар беморда қайд этилди. Беморларнинг аҳоли оғирлигини баҳолаш мақсадида юрак қисқаришлари частотаси (ЮҚЧ), артериал босим (АБ), марказий веноз босим (МВБ), нафас олиш частотаси (НЧ), қоннинг кислотали-ишқорий ҳолати (КИХ) ва қон газлари кўрсаткичлари, сув-электролит алмашинуви (СЭА) — қондаги калий (K^+) ва натрий (Na^+) даражалари ўрганилди. Шунингдек, умумклиник ва биокимёвий текширув усуллари қўлланилди: қон ивиш ва қон кетиш вақти, тромбоцитлар сони, фибриноген миқдори, паракоагуляция тестлар. Беморлар аҳолини баҳолаш мақсадида Франк индекси қўлланилди. У юзаки куйиш майдонининг фоизда ифодаланган кўрсаткичи билан чуқур куйиш майдонининг уч баробар қийматини кўйиш орқали ҳисобланди. Индекс 30 дан кам бўлса — прогноз яхши, 30–60 — нисбатан яхши, 61–90 — шубҳали, 91 ва ундан юқори бўлса — оқибати ёмон деб баҳоланди. Шунингдек, куйиш касаллигининг кечишини баҳолашда умумқабул қилинган классификацияга амал қилинди. I давр — куйиш шоки: а) бирламчи шок — шикастланишдан кейинги дастлабки 2 соат; б) иккиламчи шок — шикастланишдан кейинги 2–72 соат. II давр — ўткир токсемия (8–12 сутка), шикастланишдан 6 соат ўтгач бошланади. III давр — септикотоксемия (2 ҳафтадан 3 ойгача). IV давр — реконвалесценция даври. Куйиш шокининг I даражаси тана юзасининг 15–20% куйиши билан кечган ёш ва ўрта ёшли беморларда аниқланди ($n=9$). Ифодаланган оғирқ синдроми фақат 4 нафар беморда кузатилди. Ушбу гуруҳда юрак қисқаришлари частотаси ўртача $87,3 \pm 5,2$ марта/дак, систолик артериал босим $122,3 \pm 4,5$ мм сим. уст., нафас олиш частотаси $17,3 \pm 3,4$ марта/дак, марказий веноз босим $6,4 \pm 1,3$ см сув устунини ташкил этди. Қондаги K^+ ва Na^+ миқдори меъёр доирасида бўлди. Ушбу гуруҳ беморларида паракоагуляция тестлар (этанол ва протамин-сульфат тестлари) мусбат бўлиб, Ли–Уайт усули бўйича қон ивиш вақти $3,3 \pm 0,8$ дақиқани ташкил этди. Тромбоцитлар сони $172,3 \pm 10,3 \times 10^9$ /л, фибриноген миқдори $3,4 \pm 0,3$ г/л бўлди. Бу кўрсаткичлар гуруҳда гиперкоагуляцияга мойиллик мавжудлигини кўрсатди. Ушбу гуруҳда шокка қарши инфузион терапия бемор стационарга қабул қилинган заҳоти Parkland формуласи асосида бошланди. Бир суткалик суюқлик ҳажми куйидагича ҳисобланди: Суюқлик миқдори (мл) = $4 \times \text{Вазн (кг)} \times \%TBSA$ (куйганган тери майдони) электролитлар (Рингер эритмаси) — 1,5 л + 2000 мл 5% глюкоза эритмаси. Бунда куйидаги қоидага риоя қилинди: биринчи суткада шокка қарши курашиш мақсадида юбориладиган суюқлик ҳажми бемор тана вазнининг 1/10 қисмидан ошмаслиги лозим. Шунингдек, умумий ҳажмнинг ярми биринчи 8 соат ичида, қолган ярми эса кейинги 16 соат давомида юборилди. Клиник мисол. К. исмли бемор, 18 ёшда, тана вазни — 60 кг. Қайноқ сувдан тана юзасининг 20% қисмида II–IIIа даражали куйиш қайд этилган. Parkland формуласига мувофиқ коллоид эритмалар ҳажми куйидагича ҳисобланди: мл = $4 \times 60 \times 20 = 4800$ мл. Parkland формуласини йўналтирувчи кўрсатма сифатида қабул қилиш лозим. Кейинчалик суюқликларининг ҳажми ва юбориш тезлиги диурез, гематокрит, гемоглобин, пульс ҳамда артериал қон босими кўрсаткичларининг динамикадаги ўзгаришлари асосида ўзгартирилади. Коллоид, критоллоид ва 5% глюкоза эитмалари беморга биринчи сутка давомида жами 4800 мл суюқлик юборилиши режалаштирилди,

шу жумладан: рефортан — 800 мл; Рингер эритмаси — 2000 мл; 5% ли глюкоза эритмаси — 2000 мл. Умумий инфузия ҳажмининг ярми, яъни 2400 мл, биринчи 8 соат ичида, қолган ярми эса кейинги 16 соат давомида юборилди. Биринчи 8 соат мобайнида бемор куйидаги суюқликларни қабул қилди: коллоидлар (рефортан) — 400 мл; электролитлар Рингер эритмаси — 1000 мл; 5% ли глюкоза эритмаси — 1000 мл. Қолган 16 соат давомида эса: рефортан — 400 мл; Рингер эритмаси — 1000 мл; 5% ли глюкоза эритмаси — 1000 мл юборилди. Оғир даражали куйиш шоки билан тана юзасининг 21% дан 60% гача қисми куйган 11 нафар беморда кузатилди. Бўлимга ётқизилган беморларнинг барчасида келган пайтда эс-хуши сақланган ҳолда қарахтлик ва адинамия кузатилди. Беморларнинг ҳаммасида тахикардия қайд этилди — юрак қисқаришлари частотаси ўртача $104 \pm 8,3$ марта/дақ бўлди. Систолик артериал босим $106,4 \pm 6,2$ мм симоб устунини ташкил қилди. Нафас олиш частотаси ошган бўлиб, тахипноэ $24,3 \pm 4,1$ марта/даққа тенг эди. Марказий веноз босим кескин пасайган ҳолда $0,7 \pm 0,4$ см сув устунига тенг бўлди. Қон плазмасида натрий (Na^+) миқдорининг пасайиши қайд этилди — $129,3 \pm 2,6$ ммоль/л, калий (K^+) даражаси эса ошган — $5,3 \pm 0,3$ ммоль/л. Коагулограмма томир ичи қон ивиш айрим кўрсаткичлар гипокоагуляцияга, бошқалари эса гиперкоагуляцияга хос бўлди. Хусусан, Ли–Уайт усули бўйича қон ивиш вақти $6,9 \pm 2,1$ дақиқани ташкил этди, тромбоцитлар сони пасайган ҳолда $150,1 \pm 7,9 \times 10^9/\text{л}$ бўлди, фибриноген миқдори эса ошган — $4,2 \pm 0,02$ г/л. Кейинчалик ушбу гуруҳ беморларида артериал босим инфузион терапия фонидагина барқарор ҳолда сақланиб турди. Беморларда кучли чанқоқлик ҳиссини кузатилди. Уч нафар беморда диспептик ҳолатлар кузатилди, бир нафар беморда эса ичаклар парези қайд этилди. Беморларнинг аксариятида ($n=6$) диурез допамин юбориш орқали қўллаб-қувватланди. Стационарга қабул қилинган пайтда барча беморларда ифодаланган гемоконцентрация аниқланди, гематокрит кўрсаткичи $70,3 \pm 2,8\%$ ни ташкил этди. Барча беморларда диурезнинг $0,6\text{--}1$ мл/кг/соатгача камайиши кузатилди. Қабул пайтида нафас олиш компенсация билан кечувчи ўртача даражадаги метаболик ацидоз қайд этилди ($\text{pH } 7,38 \pm 0,02$, pCO_2 — $33,4 \pm 1,2$ мм сим. уст.). Тана ҳароратининг пасайиши 4 нафар беморда аниқланди. Клиник мисол: Бемор Д., 62 ёшда, тана вазни — 71 кг. Танада 42% II–IIIаб даражали термик куйиш. Бемор жароҳатдан 40 дақиқа ўтиб стационарга қабул қилинди, ҳолати оғир. Беморнинг эс-хуши сақланган бўлсада, тормозланиш ҳолатида, саволларга секин жавоб берди. Клиник кўрсаткичлар: ЮҚС — 104 уд./дақ, АД — 110/70 мм сим. уст., Нафас олиш — чуқур, шовқинли, 24 марта/дақ, МВБ — 0 см сув устун. Шокка қарши инфузион терапия Parkland формуласи бўйича ҳисобланди, лекин, кейин инфузия диурез, гемодинамика ва лаборатор кўрсаткичларга қараб ўзгартирилди. Беморга биринчи суткада 8800 мл суюқлик куйилди, (рефортан, гелофузин, янги музлатилган плазма) 2400 мл, кристаллоидлар ҳажми (Рингер эритмаси, дисоль) 4400 мл, 5% глюкоза эритмаси — 2400 мл. Оксилли эритмаларни (янги музлатилган плазма) инфузион терапия бошланганидан 8–12 соат ўтгач юборилади. Альбумин эритмалари, Инфезол-40 қон томир деворининг ўтказувчанлиги камайдан ва куйиш соҳасида шишнинг ортиши тўхтагандан кейин қўлланилди. Одатда, оксил препаратларининг инфузия тезлиги 1–2 мл/кг/соатни ташкил этди. Иккинчи суткада беморга 4400 мл эритмалар юборилди. Ўта оғир даражали куйиш шоки билан 3 нафар бемор оғир ҳолатда бўлиб, уларда тана юзасининг 66%, 74% ва 83% қисми куйган эди. Беморларда келганда эс-хушида тормозланиш ва сопор ҳолати кузатилди. Пульс периферияда таранглиги кучсиз, юрак қисқаришлари частотаси $118 \pm 5,2$ уд./дақ, систолик артериал босим ўртача $84,5 \pm 4,6$ мм симоб устун ташкил қилди, бу ҳолат гормонлар, рефортан ва симпатомиметиклар юборилишига қарамай сақланди. Нафас олиш юзаки, тезлашган 40 марта/дақ гача ошди. Сийдик қопи катетеризация қилинди, макрогематурия белгилари қайд этилди. Гематокрит кўрсаткичи 70% дан юқори эди. Нафас етишмовчилиги сабабли беморлар CMV режимида сунъий нафас олиш аппарати (СНО) га ўтказилди. Шокка қарши терапия биринчи суткада оғир даражали куйиш шокига ўхшаш тарзда, лекин ўта оғир шок ҳолатларида, даволаш кеч бошланган бўлса, кристаллоид ва коллоид эритмаларни ҳисобланган ҳажмларда юбориш орқали артериал қон босимини 90 мм сим. уст.дан юқори даражада ушлаб туриш баъзан имконсиз бўлади. Бундай ҳолатларда юборилаётган суюқлик ҳажмини ошириш мақсадга мувофиқ эмас, чунки бу интерстициал ва хужайра ичи суюқлигининг ортишига олиб келиши мумкин. Шунинг ўрнига инотроп таъсирга эга препаратларни қўллаш тавсия этилади (допамин 5–10 мкг/кг/мин дозада). Гемоглобини 80 г/л дан паст бўлганлиги сабабли, эритроцитар масса куйилди. Артериал босимни ушлаб туриш учун дофамин ёки адреналин қўлланилди. ДВС-синдромга қарши гепарин 5 000 ЕД 4 марта сутка давомида ва СЗП юборилди. Иккинчи суткада беморларга юборилган суюқлик ҳажмининг ярми ва физиологик эҳтиёжлар берилди. Учинчи суткада эса коллоидлар олдинги кунга нисбатан икки баробар камайтирилган дозада юборилди.

Хулоса. Куйиш шоки – термик жароҳатлардан келиб чиққан гиповолемик ва системли гемодинамик бузилиш билан характерланувчи оғир ҳолат бўлиб, организмда суюқликнинг қайта

таксимланиши ва узоқ муддатли шиш билан изоҳланади. Шокка қарши терапия биринчи суткада Parkland формуласи асосида кристаллоид ва коллоид эритмалар билан бошланади, лекин оғир ва кеч бошланган шокларда суюқлик ҳажмини ошириш эмас, инотроп препаратлар (допамин, адреналин) қўллаш тавсия этилади. Гемоглобини паст бўлган беморларга эритроцитар масса юборилади, ДВС-синдромда гепарин ва СЗП қўлланилади. Иккинчи ва учинчи суткада суюқлик ҳажми ва коллоидлар дозаси беморнинг ҳолатига қараб камайтирилади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Азимов Ш.Т., Шакиров Б.М., Карабаев Ж.Ш. и др. Ранняя некрэктомия в комплексном лечении детей с глубокими ожогами // Сб. науч. тр. II Съезда комбустиологов России. М., 2008. С. 159-160.
2. Алексеев А.А., Лавров В.А. Актуальные вопросы организации и состояние медицинской помощи пострадавшим от ожогов в Российской Федерации // Материалы II съезда комбустиологов России. М., 2008. С. 3-4.
3. Алексеев А.А., Крутиков М.Г., Яковлев В.П. Ожоговая инфекция: этиология, патогенез, диагностика, профилактика и лечение. Москва: «Вузовская книга», 2010. 413 с.
4. Алексеев А.А. Классификация глубины поражения тканей при ожогах // III съезд комбустиологов России, Москва, 15-18 ноября 2010 г. Институт хирургии имени А.В. Вишневского Министерство здравоохранения РФ; редкол.: – Москва, 2010. С. 3-4.
5. Алексеев А.А., Крылов К.М. Классификация глубины поражения тканей при ожогах // III съезд комбустиологов России, Москва, 15-18 ноября 2010 г. Институт хирургии имени А.В. Вишневского Министерство здравоохранения РФ; редкол.: А.А. Алексеев – Москва, 2010. С. 3-4.
6. Алексеев А.А., Ушакова Т.А. Ожоговый шок: проблемы остаются. Сборник научных трудов: IV съезд комбустиологов России, Москва, 13-16 октября 2013 г. / ФГБУ Институт хирургии имени А.В. Вишневского Министерство здравоохранения РФ; редкол.: А.А. Алексеев, С.В. Попов. – Москва, 2013. 40 с.
7. Крылов К.М., Шлык В.И., Пивоварова Л.П., Орлова О.В. Ожоговый шок // Патогенез и лечение шока различной этиологии (Руководство для врачей). Под ред. д.м.н. проф. Ю.А. Щербука. Санкт-Петербург, 2010. С. 320-360.
8. Крылов К.М., Шлык В.И., Фролов С.Н. Оценка влияния субстратных антигипоксантов на течение ожогового шока. Сборник научных трудов: IV съезд комбустиологов России, Москва, 13-16 октября 2013 г. / ФГБУ Институт хирургии имени А.В. Вишневского Министерство здравоохранения РФ; редкол. – Москва, 2013. С. 66-68.

Иктибос учун: Ҳайдаров М.М. Куйиш шокида интенсив терапия усулларининг клиник-патофизиологик самарадорлиги // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2026. – № 4(24). – Б. 667–670. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19629569>

КОМПЛЕКСНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ АППАРАТА КОРВИТА И РЕФЛЕКСОТЕРАПИИ В ПРОЦЕССЕ РЕАБИЛИТАЦИИ У БОЛЬНЫХ ИНСУЛЬТОМ С МОТОРНОЙ ДИСФУНКЦИЕЙ

Сайдалиева С.Ш., Бурханова Г.Л., Анваров А.А., Шермамедова К.Т.

Самаркандский государственный медицинский университет, г.Самарканд, Узбекистан

Резюме. Инсульт является одной из ведущих причин инвалидизации во всем мире. У 50–70% пациентов после инсульта развивается моторная дисфункция, существенно снижающая качество жизни. В последние годы активно внедряются современные методы нейрореабилитации, включая аппаратные технологии и рефлексотерапию. Цель исследования — оценить эффективность комплексного применения аппарата «Корвит» и рефлексотерапии у пациентов с моторной дисфункцией после инсульта. В исследовании приняли участие 40 пациентов, разделенных на две группы: основную (комплексное лечение) и контрольную (стандартная реабилитация). Оценка проводилась с использованием шкалы Fugl-Meyer, индекса Бартел и шкалы Ashworth. Результаты показали, что в основной группе отмечено достоверное улучшение моторных функций (на 42%), снижение спастичности (на 35%) и повышение уровня повседневной активности (на 38%) ($p < 0,05$). Вывод: комплексное применение аппарата «Корвит» и рефлексотерапии значительно повышает эффективность реабилитации пациентов после инсульта.

Ключевые слова: инсульт, моторная дисфункция, реабилитация, Корвит, рефлексотерапия, нейропластичность, двигательные нарушения

THE COMBINED USE OF THE CORVIT DEVICE AND REFLEXOTHERAPY IN THE REHABILITATION OF STROKE PATIENTS WITH MOTOR DYSFUNCTION

Saydaliyeva S.Sh., Burkhanova G.L., Anvarov A.A., Shermamedova K.T.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Stroke is one of the leading causes of disability worldwide. After a stroke, motor dysfunction develops in 50-70% of patients, significantly reducing their quality of life. In recent years, modern methods of neurorehabilitation, including hardware technologies and reflexotherapy, have been actively implemented. The aim of the study is to evaluate the effectiveness of the complex use of the "Corvit" apparatus and reflex therapy in patients with post-stroke motor dysfunction. The study involved 40 patients, who were divided into two groups: primary (comprehensive treatment) and control (standard rehabilitation). The assessment was conducted using the Fugle-Meer scale, the Barthel index, and the Ashworth scale. The results showed that in the study group, a significant improvement in motor functions (by 42%), a decrease in spasticity (by 35%), and an increase in daily activity levels (by 38%) were noted ($p < 0.05$). Conclusion: the complex use of the "Corvit" apparatus and reflex therapy significantly increases the effectiveness of rehabilitation for patients after stroke.

Keywords: stroke, motor dysfunction, rehabilitation, Corvit, reflex therapy, neuroplasticity, motor disorders

МОТОР ДИСФУНКЦИЯ БИЛАН КЕЧУВЧИ ИНСУЛЬТ БЕМОРЛАРИДА РЕАБИЛИТАЦИЯ ЖАРАЁНИДА КОРВИТ АППАРАТИ ВА РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯНИНГ КОМПЛЕКС ҚЎЛЛАНИЛИШИ

Сайдалиева С.Ш., Бурханова Г.Л., Анваров А.А., Шермамедова К.Т.

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш, Ўзбекистон

Резюме. Инсульт бутун дунё бўйлаб ногиронликнинг етакчи сабабларидан биридир. Инсультдан кейин беморларнинг 50-70 фоизиди ҳаёт сифатини сезиларли даражада пасайтирадиган мотор дисфункцияси ривожланади. Сўнги йилларда нейрореабилитациянинг замонавий усуллари, жумладан, аппарат технологиялари ва рефлексотерапия фаол жорий этилмоқда. Тадқиқотнинг мақсади инсультдан кейинги мотор дисфункцияси бўлган беморларда "Корвит" аппаратини комплекс қўлаш ва рефлексотерапия самарадорлигини баҳолашдан иборат. Тадқиқотда 40 нафар бемор иштирок этди, улар икки гуруҳга бўлинган: асосий (комплекс даволаш) ва назорат (стандарт реабилитация). Баҳолаш Фугл-Меер шкаласи, Бартел индекси ва Ashworth шкаласи ёрдамида амалга оширилди. Натижалар шуни кўрсатдики, асосий гуруҳда ҳаракат функцияларининг сезиларли даражада яхши-

ланиши (42% га), спастикликнинг пасайиши (35% га) ва кундалик фаоллик даражасининг ошиши (38% га) қайд этилди ($p < 0,05$). Хулоса: "Корвит" аппарати ва рефлексотерапияни комплекс қўллаш инсультдан кейин беморларни реабилитация қилиш самарадорлигини сезиларли даражада оширади.

Калит сўзлар: инсульт, мотор дисфункция, реабилитация, Корвит, рефлексотерапия, нейропластиклик, ҳаракат бузилишлари

e-mail : saydaliyevasevara@gmail.com

Введение. Инсульт является одной из ведущих причин смертности и инвалидизации во всем мире. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно регистрируется более 12 миллионов новых случаев инсульта, при этом около 6,5 миллионов пациентов умирают, а значительная часть выживших остается с выраженными неврологическими дефицитами [1].

В структуре глобального бремени заболеваний инсульт занимает второе место по смертности и третье — по уровню утраты трудоспособности [2]. В последние годы наблюдается тенденция к «омоложению» инсульта: до 25–30% случаев приходится на лиц трудоспособного возраста [3].

Одним из наиболее распространенных последствий инсульта является моторная дисфункция, которая развивается у 50–80% пациентов [4]. Двигательные нарушения включают гемипарезы, нарушение координации, снижение мышечной силы и развитие спастичности, что существенно ограничивает функциональную независимость пациентов [5].

По данным клинических исследований, только около 20% пациентов достигают полного восстановления двигательных функций, тогда как у большинства сохраняются различные степени инвалидности [6].

Ключевым механизмом восстановления после инсульта является нейропластичность — способность головного мозга к функциональной и структурной перестройке [7]. Доказано, что ранняя и интенсивная реабилитация способствует активации нейропластических процессов и улучшению функциональных исходов [8].

Современные методы реабилитации включают применение сенсомоторной стимуляции, направленной на восстановление двигательных паттернов. Одним из перспективных методов является использование аппарата «Корвит», который обеспечивает стимуляцию проприоцептивных рецепторов стопы и способствует восстановлению координации движений [9].

Важную роль в реабилитации также играет рефлексотерапия, которая воздействует на центральную нервную систему через активацию афферентных путей, улучшает микроциркуляцию и снижает мышечный тонус [10].

Несмотря на доказанную эффективность указанных методов, вопрос их комплексного применения остается недостаточно изученным, что определяет актуальность настоящего исследования [11].

Обзор литературы

1. Нейропластичность и восстановление после инсульта. Современные исследования подтверждают, что нейропластичность является ключевым механизмом восстановления функций после инсульта [7].

Функциональная реорганизация мозга включает:

- активацию неповрежденных зон коры
- формирование новых синаптических связей
- перераспределение функций между полушариями

По данным нейровизуализационных исследований, интенсивная реабилитация приводит к достоверному увеличению активности моторной коры [12].

2. Распространенность моторной дисфункции. Моторные нарушения наблюдаются у 50–80% пациентов после инсульта [4].

При этом:

- гемипарез развивается у 70–80% больных [13]
- нарушения ходьбы сохраняются у 60% пациентов [14]
- спастичность формируется у 30–40% пациентов [15]

Спастичность значительно ухудшает функциональные исходы и снижает эффективность реабилитации [16].

3. Эффективность аппаратных методов (Корвит). Современные аппаратные методы направлены на стимуляцию сенсомоторной системы и восстановление двигательных функций.

Аппарат «Корвит» обеспечивает:

- стимуляцию проприоцептивных рецепторов стопы

- имитацию физиологической ходьбы
- активацию центральных двигательных паттернов

По данным клинических исследований:

- улучшение двигательных функций составляет 30–45% [17]
- восстановление навыков ходьбы ускоряется на 20–30% [18]
- повышается устойчивость и баланс пациентов [19]

4. Рефлексотерапия в реабилитации инсульта. Рефлексотерапия широко применяется в лечении неврологических заболеваний.

Метаанализы показывают:

- снижение спастичности на 25–40% [20]
- улучшение моторных функций на 30–35% [21]
- повышение уровня повседневной активности [22]

Механизмы действия включают:

- активацию сенсорных афферентных путей
- влияние на корково-подкорковые структуры
- регуляцию нейромедиаторных процессов

5. Комплексные методы реабилитации. Современные исследования подтверждают, что комбинированная терапия более эффективна, чем применение отдельных методов [23].

При комплексном подходе наблюдается:

- усиление нейропластичности
- ускорение восстановления двигательных функций
- снижение риска инвалидизации.

Тем не менее, исследования, посвященные сочетанному применению аппарата «Корвит» и рефлексотерапии, ограничены [24].

Заключение по обзору литературы. Таким образом, анализ литературы показывает, что:

- инсульт остается ведущей причиной инвалидности [1]
- моторная дисфункция развивается у большинства пациентов [4]
- нейропластичность является основой восстановления [7]
- аппаратные методы и рефлексотерапия доказали свою эффективность [17,20]
- комплексные подходы являются наиболее перспективными [23]

Однако недостаточная изученность комбинации данных методов обуславливает необходимость проведения настоящего исследования [24].

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 40 пациентов (возраст 45–70 лет) с постинсультной моторной дисфункцией.

Таблица №1

Группы исследования

Группа	Количество	Лечение
Основная	20	Корвит + рефлексотерапия
Контрольная	20	Стандартная реабилитация

Методы лечения

- Аппарат «Корвит» (нейромышечная стимуляция, имитация ходьбы)
- Рефлексотерапия (иглорефлексотерапия, точечный массаж)
- ЛФК и кинезотерапия

Методы оценки

- Шкала Fugl-Meyer (двигательная функция)
- Индекс Бартел (самообслуживание)
- Шкала Ashworth (спастичность)

Статистика

- Средние значения ($M \pm m$)
- t-критерий Стьюдента
- $p < 0,05$

Контингент пациентов

- 40 пациентов
- Возраст: 45–70 лет
- Диагноз: ишемический инсульт

Критерии включения

- наличие моторной дисфункции
- стабильное состояние
- отсутствие противопоказаний

Методы лечения

Основная группа:

- аппарат «Корвит» (20 минут/день)
- рефлексотерапия (10–12 процедур)
- ЛФК

Контрольная группа:

- стандартная реабилитация (ЛФК, медикаменты)

Результаты. Основная группа продемонстрировала выраженную положительную динамику по всем показателям.

- Fugl-Meyer: значительное улучшение моторики
- Barthel: рост самостоятельности пациентов
- Ashworth: снижение спастичности

1. Динамика моторной функции (Fugl-Meyer)**Таблица №2**

Группа	До лечения	После лечения	Прирост
Основная	38±2.1	54±2.5	+42%
Контрольная	37±2.3	37±2.3	45±2.7

2. Индекс Бартел**Таблица №3**

Группа	До	После	Улучшение
Основная	55	76	+38%
Контрольная	54	65	+20%

3. Спастичность (Ashworth)**Таблица №4**

Группа	До	После	Снижение
Основная	3.2	2.1	-35%
Контрольная	3.1	2.6	-16%

Графическое представление результатов (описание)

- Столбчатая диаграмма показывает более выраженное улучшение в основной группе
- Линейный график демонстрирует быстрый темп восстановления при комплексной терапии
- Разница между группами статистически значима ($p < 0,05$)



Рис. 1. Динамика двигательной функции по шкале Fugl-Meyer до и после лечения.





Таблица №5
Сравнительная характеристика эффективности лечения в основной и контрольной группах (M±SD)

Показатель	Группа	До лечения (M±SD)	После лечения (M±SD)	Изменение (Δ)	p-значение
Fugl-Meyer (баллы)	Основная (n=20)	38,2 ± 2,1	54,1 ± 2,5	+15,9	<0,001
	Контрольная (n=20)	37,5 ± 2,3	45,0 ± 2,7	+7,5	<0,05
Barthel Index (баллы)	Основная (n=20)	55 ± 6,3	76 ± 5,4	+21	<0,001
	Контрольная (n=20)	54 ± 6,1	65 ± 5,8	+11	<0,05
Ashworth Scale (баллы)	Основная (n=20)	3,2 ± 0,4	2,1 ± 0,3	-1,1	<0,001
	Контрольная (n=20)	3,1 ± 0,5	2,6 ± 0,4	-0,5	<0,05

Комплексное применение аппарата «Корвит» и рефлексотерапии показало достоверно более высокую эффективность в восстановлении двигательных функций, снижении спастичности и повышении функциональной независимости пациентов.

Обсуждение. Полученные результаты подтверждают высокую эффективность комплексного подхода. Аппарат «Корвит» обеспечивает сенсомоторную стимуляцию и имитацию физиологической ходьбы, что способствует активации центральных двигательных паттернов. Рефлексотерапия, в свою очередь, усиливает нейропластические процессы и улучшает проводимость нервных импульсов. Исследования показывают, что иглорефлексотерапия способствует перестройке нейронных сетей мозга.

Комбинация этих методов обеспечивает синергетический эффект: - усиление восстановления двигательной функции; - снижение спастичности; - улучшение повседневной активности.

Результаты исследования подтверждают данные современной литературы о высокой эффективности комбинированных методов реабилитации [23]. Применение аппарата «Корвит» способствует активации проприоцептивной афферентации, что играет ключевую роль в восстановлении двигательных функций [9]. Рефлексотерапия оказывает влияние на центральные механизмы регуляции движения, снижая спастичность и улучшая нейромышечную координацию [20].

Синергетический эффект комплексного применения проявляется в: - более выраженном восстановлении моторики; - снижении мышечного тонуса; - улучшении функциональной независимости.

Полученные результаты сопоставимы с данными других исследований, где улучшение двигательной функции при комбинированной терапии достигало 40–60% [21]. Таким образом, комбинированный подход является более эффективным по сравнению с монотерапией.

Заключение. Комплексное применение аппарата «Корвит» и рефлексотерапии является эффективным методом реабилитации пациентов с постинсультной моторной дисфункцией.

Данный подход обеспечивает:

- значительное улучшение двигательных функций
- снижение спастичности
- повышение уровня самостоятельности пациентов

Метод может быть рекомендован для широкого внедрения в клиническую практику.

Список литературы:

1. World Health Organization. Global Stroke Report. Geneva, 2022.
2. Feigin V.L. et al. Global burden of stroke. Lancet Neurology. 2021.
3. Johnson W. et al. Stroke epidemiology. Lancet. 2019.
4. Langhorne P. et al. Early supported discharge. Stroke. 2017.
5. Mahoney F.I., Barthel D.W. Functional evaluation. Maryland State Med J. 1965.
6. Dobkin B.H. Rehabilitation after stroke. NEJM. 2005.
7. Nudo R.J. Neural plasticity. J Rehabil Med. 2006.
8. Kleim J.A., Jones T.A. Neuroplasticity principles. J Speech Lang Hear Res. 2008.
9. Gerasimenko Y. et al. Sensorimotor stimulation. Neurorehabil Neural Repair. 2015.
10. Zhao J. et al. Acupuncture in stroke rehab. Stroke. 2012.
11. Winstein C.J. et al. Stroke rehabilitation guidelines. Stroke. 2016.
12. Fugl-Meyer A.R. et al. Assessment of motor recovery. Scand J Rehab Med. 1975.
13. Nakayama H. et al. Motor recovery. Arch Phys Med Rehabil. 1994.
14. Jørgensen H.S. et al. Walking function. Stroke. 1995.
15. Bohannon R.W., Smith M.B. Ashworth scale. Phys Ther. 1987.
16. Sommerfeld D.K. et al. Spasticity after stroke. Stroke. 2004.
17. Ivanenko Y.P. et al. Locomotor recovery. Brain Research. 2009.
18. Dietz V. et al. Locomotor training. Lancet Neurology. 2008.
19. Harkema S. et al. Neural control of locomotion. J Neurophysiol. 2011.
20. Zhang S. et al. Acupuncture meta-analysis. Neurorehabilitation. 2014.
21. Lee S.H. et al. Combined therapy stroke. Clin Rehab. 2018.
22. Chen L. et al. Functional recovery. J Stroke Cerebrovasc Dis. 2016.
23. Pollock A. et al. Interventions for stroke rehab. Cochrane Database. 2014.
24. Bernhardt J. et al. Stroke rehabilitation. Lancet. 2017.

Для цитирования: Сайдалиева С.Ш., Бурханова Г.Л., Анваров А.А., Шермамедова К.Т. Комплексное применение аппарата корвита и рефлексотерапии в процессе реабилитации у больных инсультом с моторной дисфункцией // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 4(24). – С. 671–676. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19639071>

ОЦЕНКА МЕТАБОЛИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ У ЖЕНЩИН С МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ «ЛИТОС»**Исомадинова Л.К., Хамидова Ф.М.**

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Мочекаменная болезнь (уролитиаз) остаётся одной из наиболее распространённых патологий мочевыделительной системы, характеризующейся высоким уровнем рецидивирования и выраженными метаболическими нарушениями. В последние годы особое внимание уделяется ранней диагностике литогенных изменений мочи с использованием современных лабораторных технологий, включая систему «Литос». Система «Литос» представляет собой современный лабораторный метод оценки литогенных свойств мочи, основанный на анализе процессов кристаллизации и коллоидной стабильности. Метод позволяет выявлять ранние предклинические изменения, предрасполагающие к камнеобразованию. Его преимуществами являются высокая чувствительность, неинвазивность и возможность комплексной оценки физико-химических характеристик мочи. Применение системы «Литос» повышает точность диагностики и позволяет прогнозировать риск развития и рецидива мочекаменной болезни.

Ключевые слова: Мочекаменная болезнь, Литос-система, кристаллы, минеральный обмен.

ASSESSMENT OF METABOLIC DISORDERS IN WOMEN WITH UROLITHIASIS USING THE “LITHOS” SYSTEM**Isomadinova L.K., Khamidova F.M.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Urolithiasis remains one of the most common pathologies of the urinary system, characterized by a high recurrence rate and pronounced metabolic disorders. In recent years, special attention has been paid to the early diagnosis of lithogenic changes in urine using modern laboratory technologies, including the “Lithos” system. The “Lithos” system is a modern laboratory method for assessing the lithogenic properties of urine, based on the analysis of crystallization processes and colloidal stability. This method allows the detection of early preclinical changes that predispose to stone formation. Its advantages include high sensitivity, non-invasiveness, and the possibility of a comprehensive assessment of the physicochemical characteristics of urine. The use of the “Lithos” system improves diagnostic accuracy and allows prediction of the risk of development and recurrence of urolithiasis.

Keywords: Urolithiasis, Lithos system, crystals, mineral metabolism.

АЁЛЛАРДА СИЙДИК-ТОШ КАСАЛЛИГИДА МЕТАБОЛИК БУЗИЛИШЛАРНИ «ЛИТОС» ТИЗИМИ ЁРДАМИДА БАҲОЛАШ**Исомадинова Л.К., Хамидова Ф.М.**

Самарканд давлат тиббиёт университети, Самарканд ш., Ўзбекистон

Резюме. Сийдик-тош касаллиги (уролитиаз) сийдик чиқариш тизимининг энг кенг тарқалган касалликларидан бири бўлиб, юқори рецидивланиш даражаси ва яққол метаболик бузилишлар билан характерланади. Сўнгги йилларда замонавий лаборатория технологиялари, жумладан «Литос» тизими ёрдамида сийдикдаги литоген ўзгаришларни эрта аниқлашга алоҳида эътибор қаратилмоқда. «Литос» тизими — бу сийдикнинг литоген хусусиятларини баҳолашга қаратилган замонавий лаборатория усули бўлиб, кристалланиш жараёнлари ва коллоид барқарорлигини таҳлил қилишга асосланган. Ушбу усул тош ҳосил бўлишига олиб келувчи эрта, клиник белгиларсиз ўзгаришларни аниқлаш имконини беради. Унинг афзалликлари юқори сезгирлик, инвазив эмаслиги ҳамда сийдикнинг физик-кимёвий хусусиятларини комплекс баҳолаш имкониятидан иборат. «Литос» тизимини қўлаш таххис аниқлигини оширади ва сийдик-тош касаллигининг ривожланиши ҳамда рецидив хавфини башорат қилиш имконини беради.

Калит сўзлар: Сийдик-тош касаллиги, Литос тизими, кристаллар, минерал алмашинув.

e-mail: lolaisomadinova@gmail.com, khamidovaf.m.05@mail.ru

Целью данного исследования явилось изучение изменений показателей мочи у женщин с мочекаменной болезнью с применением системы «Литос». В исследование включено 30 женщин с клинически и инструментально подтвержденной мочекаменной болезнью, проходивших лечение в многопрофильной клинике Самаркандского государственного медицинского университета (СамГМУ). Средний возраст пациенток составил $34,6 \pm 6,2$ года. Контрольную группу составили условно здоровые женщины ($n=15$).

Анализ мочи проводился с использованием системы «Литос», позволяющей оценить уровень кристаллизации, литогенность и структурные изменения. У пациенток с мочекаменной болезнью выявлено достоверное повышение литогенности мочи ($p<0,05$), увеличение количества кристаллов оксалатов кальция (у 73,3% пациенток) и фосфатов (у 46,7%). Нарушения коллоидной стабильности мочи наблюдались в 66,7% случаев.

Проведенный биохимический анализ сыворотки крови выявил статистически значимые изменения минерального обмена у пациенток с мочекаменной болезнью.

Установлено, что средний уровень общего кальция в основной группе составил $2,62 \pm 0,14$ ммоль/л, что достоверно превышает аналогичный показатель в контрольной группе ($2,34 \pm 0,11$ ммоль/л, $p<0,05$). Полученные данные свидетельствуют о наличии тенденции к гиперкальциемии у пациенток с уролитиазом, что является одним из ключевых патогенетических факторов формирования кальциевых содержащих конкрементов.

Повышение уровня кальция может быть обусловлено усиленной резорбцией костной ткани, нарушением почечной экскреции или изменениями гормональной регуляции (в частности, паратиреоидного гормона), что требует дальнейшего углубленного изучения.

Анализ уровня фосфора также показал его увеличение в основной группе ($1,52 \pm 0,18$ ммоль/л) по сравнению с контрольной ($1,21 \pm 0,15$ ммоль/л). Несмотря на то, что различия по фосфору носили характер тенденции, выявленные изменения могут свидетельствовать о нарушении фосфорно-кальциевого обмена и способствовать образованию фосфатных камней.

Полученные данные свидетельствуют о выраженных метаболических нарушениях у пациенток с мочекаменной болезнью и подтверждают высокую диагностическую значимость системы «Литос» в оценке литогенных свойств мочи.

Цель исследования: Изучить изменения физико-химических свойств мочи у женщин с мочекаменной болезнью с использованием системы «Литос» и оценить уровень микроэлементов крови (кальций, фосфор).

Задачи исследования: Оценить литогенные свойства мочи у пациенток с мочекаменной болезнью. Изучить характер кристаллизации мочи с помощью системы «Литос».

Материалы и методы: Настоящее исследование было выполнено на базе многопрофильной клиники Самаркандского государственного медицинского университета (СамГМУ) и носило проспективный сравнительный характер. В исследование были включены 45 женщин, которые были распределены на две группы. Основную группу составили 30 пациенток с клинически и инструментально подтвержденной мочекаменной болезнью. Диагноз устанавливался на основании клинических данных, результатов ультразвукового исследования почек, а также лабораторных показателей. Контрольную группу составили 15 практически здоровых женщин, не имеющих признаков патологии мочевыделительной системы. Всем участницам исследования проводился комплекс лабораторно-инструментальных обследований. Общий анализ мочи выполнялся стандартными методами с оценкой физических, химических и микроскопических показателей. Дополнительно проводилось исследование мочи с использованием системы «Литос», позволяющее определить степень литогенности, характер кристаллизации и состояние коллоидного равновесия мочи. Для оценки состояния минерального обмена у всех обследованных определяли уровень общего кальция и фосфора в сыворотке крови с использованием биохимических методов анализа. Ультразвуковое исследование почек проводилось с целью подтверждения диагноза, а также визуализации конкрементов и оценки состояния мочевыделительной системы.

Анализ мочи с применением системы «Литос» продемонстрировал выраженные нарушения литогенных свойств у пациенток основной группы по сравнению с контрольной.

Результаты исследования: Анализ мочи с применением системы «Литос» продемонстрировал выраженные нарушения литогенных свойств у пациенток основной группы по сравнению с контрольной.

Повышенная литогенность мочи была выявлена у 24 из 30 обследованных женщин (80%), что свидетельствует о высокой предрасположенности к процессам камнеобразования. При микроскопическом анализе наиболее часто определялись кристаллы оксалата кальция - у 22 пациен-

ток (73,3%), что указывает на доминирование оксалатного типа нарушений. Фосфатные кристаллы выявлены у 14 пациенток (46,7%), что может быть связано с изменениями pH мочи и нарушениями фосфорно-кальциевого обмена(1-таблица).

Кроме того, у 20 пациенток (66,7%) отмечалось снижение коллоидной стабильности мочи, что отражает нарушение защитных механизмов, препятствующих агрегации кристаллов и формированию конкрементов.

Сравнительный анализ количественных показателей показал, что средний уровень литогенности в основной группе составил $2,8 \pm 0,4$, что более чем в 2 раза превышает аналогичный показатель в контрольной группе ($1,2 \pm 0,3$, $p < 0,05$).

Биохимическое исследование крови выявило достоверное повышение уровня кальция у пациенток с мочекаменной болезнью ($2,62 \pm 0,14$ ммоль/л) по сравнению с контрольной группой ($2,34 \pm 0,11$ ммоль/л, $p < 0,05$). Уровень фосфора также был выше в основной группе ($1,52 \pm 0,18$ ммоль/л против $1,21 \pm 0,15$ ммоль/л), однако различия носили характер тенденции(2-таблица).

Таблица 1.

Показатели литогенных свойств мочи у обследованных пациенток

Показатель	Абс. число (n=30)	%
Повышенная литогенность мочи	24	80,0%
Кристаллы оксалата кальция	22	73,3%
Фосфатные кристаллы	14	46,7%
Снижение коллоидной стабильности	20	66,7%

Таблица 2.

Сравнительная характеристика лабораторных показателей ($M \pm m$)

Показатель	Основная группа (n=30)	Контрольная группа (n=15)	p
Литогенность мочи	$2,8 \pm 0,4$	$1,2 \pm 0,3$	$< 0,05$
Кальций крови (ммоль/л)	$2,62 \pm 0,14$	$2,34 \pm 0,11$	$< 0,05$
Фосфор крови (ммоль/л)	$1,52 \pm 0,18$	$1,21 \pm 0,15$	$> 0,05^*$

*различия статистически недостоверны, отмечается тенденция к повышению

Проведённый корреляционный анализ выявил умеренную положительную связь между уровнем кальция в сыворотке крови и степенью кристаллизации мочи ($r = 0,62$), что подтверждает участие нарушений кальциевого обмена в усилении литогенеза.

Обсуждение:Полученные результаты свидетельствуют о том, что у женщин с мочекаменной болезнью формируется комплекс метаболических и физико-химических нарушений, способствующих камнеобразованию. Существенное повышение литогенности мочи, выявленное у большинства пациенток, отражает изменение её структуры и перенасыщение солями, прежде всего кальция.

Преобладание кристаллов оксалата кальция указывает на ведущую роль оксалатно-кальциевого механизма в формировании конкрементов, что согласуется с современными представлениями о патогенезе уролитиаза. Одновременно выявление фосфатных кристаллов свидетельствует о многофакторности процесса и участии различных метаболических путей.

Снижение коллоидной стабильности мочи является важным патогенетическим звеном, поскольку именно коллоидные системы обеспечивают ингибирование роста и агрегации кристаллов. Нарушение этого механизма приводит к ускоренному формированию микролитов.

Выявленное повышение уровня кальция в крови подтверждает наличие системных нарушений минерального обмена, которые, в свою очередь, усиливают экскрецию кальция с мочой и способствуют кристаллизации. Тенденция к повышению уровня фосфора также может играть дополнительную роль в изменении физико-химических свойств мочи.

Применение системы «Литос» позволило не только зафиксировать наличие кристаллов, но и комплексно оценить литогенный потенциал мочи, включая её структурные и коллоидные характеристики. Это делает данный метод особенно ценным для ранней диагностики и профилактики рецидивов мочекаменной болезни.

Выводы: Проведённое исследование показало, что у женщин с мочекаменной болезнью наблюдаются выраженные нарушения литогенных свойств мочи, проявляющиеся её перенасыщением солями кальция, активной кристаллизацией и снижением коллоидной стабильности.

Использование системы «Литос» позволяет выявлять ранние изменения в структуре мочи, что существенно расширяет возможности доклинической диагностики и оценки риска камнеобразования.

Установлено, что повышение уровня кальция в сыворотке крови достоверно связано с усилением процессов кристаллизации, что подтверждает ключевую роль нарушений минерального обмена в патогенезе уролитиаза.

Комплексный подход, включающий исследование мочи с использованием системы «Литос» и оценку биохимических показателей крови, повышает диагностическую точность и может быть рекомендован для прогнозирования течения заболевания и разработки индивидуализированных профилактических мероприятий.

Список литературы:

1. Аляев Ю.Г., Руденко В.И. Мочекаменная болезнь. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. – 320 с.
2. Пытель Ю.А., Борисов В.В. Урология. – М.: Медицина, 2019. – 512 с.
3. Tiselius H.G. Epidemiology and medical management of stone disease // BJU International. – 2020. – Vol. 125(1). – P. 10–15.
4. Türk C., Neisius A., Petrik A. et al. EAU Guidelines on Urolithiasis. – European Association of Urology, 2023.
5. Pearle M.S., Goldfarb D.S., Assimos D.G. et al. Medical management of kidney stones // Journal of Urology. – 2019. – Vol. 202(6). – P. 1153–1160.
6. Worcester E.M., Coe F.L. Clinical practice. Calcium kidney stones // New England Journal of Medicine. – 2018. – Vol. 379. – P. 954–963.
7. Curhan G.C. Epidemiology of stone disease // Urologic Clinics of North America. – 2018. – Vol. 45(2). – P. 157–165.
8. Pak C.Y. Kidney stones // Lancet. – 2017. – Vol. 351. – P. 1797–1801.
9. Коган М.И., Лопаткин Н.А. Клиническая урология. М.: Практическая медицина, 2021. – 768 с.
10. Smith R.C., Rosenfield A.T. Imaging of urinary tract stone disease // Radiology. – 2019. – Vol. 291(3). – P. 660–673.
11. Evan A.P. Physiopathology and etiology of stone formation // Urologic Clinics of North America. – 2019. – Vol. 46(2). – P. 155–167.
12. Daudon M., Jungers P. Clinical value of crystalluria and quantitative morphoconstitutional analysis of urinary calculi // Nephrology Dialysis Transplantation. – 2018. – Vol. 33. – P. 1154–1162.
13. Арутюнян А.В., Григорьев А.В. Метаболические нарушения при мочекаменной болезни // Нефрология. – 2021. – № 5. – С. 45–52.
14. Khan S.R. Reactive oxygen species and kidney stone disease // Journal of Urology. – 2019. – Vol. 202(3). – P. 436–445.
15. Coe F.L., Evan A., Worcester E. Kidney stone disease // Journal of Clinical Investigation. – 2018. – Vol. 115(10). – P. 2598–2608.

Для цитирования: Исомадинова Л.К., Хамидова Ф.М. Оценка метаболических нарушений у женщин с мочекаменной болезнью с использованием системы «ЛИТОС» // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 4(24). – С. 677–680. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19639106>

КОГНИТИВНЫЕ НАРУШЕНИЯ ПРИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГИПЕРПРОЛАКТИНЕМИИ (ФГПРЛ) У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ И ДЛИТЕЛЬНОСТИ ФГПРЛ: РЕЗУЛЬТАТЫ КРОСС-СЕКЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Холикова А.О.¹, Халимова Н.Ю.², Жураева Ю.О.¹

¹Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр эндокринологии, г. Ташкент, Узбекистан

²Ташкентский государственный медицинский университет, г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. Гиперпролактинемия (ГПРЛ) остается одной из наиболее частых эндокринопатий репродуктивной системы у женщин детородного возраста. В клинической практике доминирует функциональная форма заболевания, диагностика которой требует дифференцированного подхода с исключением органических причин гиперсекреции пролактина. Несмотря на хорошо изученные эффекты гиперпролактинемии на репродуктивную систему, вопрос о влиянии повышенного уровня пролактина (ПРЛ) на центральную нервную систему и, в частности, на когнитивные функции, остается недостаточно освещенным в отечественной и мировой литературе. Существующие данные свидетельствуют о возможных нейровегетативных симптомах, депрессии, тревоге и расстройствах сна у пациенток с ГПРЛ. Однако специфические когнитивные дефициты, их патофизиологические механизмы и корреляция с уровнем и длительностью гиперпролактинемии изучены фрагментарно. В данной статье мы предлагаем собственные исследования проведенные в НИИ Эндокринологии в зависимости от уровня и длительности фГПРЛ.

Ключевые слова: Функциональная гиперпролактинемия, пролактин, когнитивные нарушения, нейрокогнитивные функции, MMSE, MoCA, память, внимание, исполнительные функции, женщины репродуктивного возраста, нейроэндокринология.

COGNITIVE IMPAIRMENTS IN FUNCTIONAL HYPERPROLACTINEMIA (fHPRL) IN WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE DEPENDING ON THE LEVEL AND DURATION OF fHPRL: RESULTS OF A CROSS-SECTIONAL STUDY

Kholikova A.O.¹, Khalimova N.Y.², Zhuraeva Y.O.¹

¹Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Endocrinology, Tashkent, Uzbekistan

²Tashkent State Medical University, Tashkent, Uzbekistan

Resume. Hyperprolactinemia (HPRL) remains one of the most common endocrine disorders of the reproductive system in women of childbearing age. In clinical practice, the functional form of the disease predominates, and its diagnosis requires a differentiated approach with the exclusion of organic causes of prolactin hypersecretion. Despite the well-studied effects of hyperprolactinemia on the reproductive system, the impact of elevated prolactin (PRL) levels on the central nervous system, particularly on cognitive functions, remains insufficiently explored in both domestic and international literature. Existing data suggest possible neurovegetative symptoms, depression, anxiety, and sleep disturbances in patients with HPRL [5, 6]. However, specific cognitive deficits, their pathophysiological mechanisms, and their correlation with the level and duration of hyperprolactinemia have been studied only fragmentarily. In this article, we present the results of our own research conducted at the Research Institute of Endocrinology, analyzing cognitive impairments depending on the level and duration of functional hyperprolactinemia.

Keywords: Functional hyperprolactinemia, prolactin, cognitive impairment, neurocognitive functions, MMSE, MoCA, memory, attention, executive functions, women of reproductive age, neuroendocrinology.

РЕПРОДУКТИВ ЁШДАГИ АЁЛЛАРДА ФУНКЦИОНАЛ ГИПЕРПРОЛАКТИНЕМИЯ (ФГПРЛ)ДА КОГНИТИВ БУЗИЛИШЛАР: ФГПРЛ ДАРАЖАСИ ВА ДАВОМИЙЛИГИГА БОҒЛИҚ ҲОЛДА КРОСС-СЕКЦИОН ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ

Холикова А.О.¹, Халимова Н.Ю.², Жураева Ю.О.¹

¹Республика ихтисослаштирилган илмий-амалий эндокринология тиббиёт маркази, Тошкент ш., Ўзбекистон

²Тошкент давлат тиббиёт университети, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. Гиперпролактинемия (ГПРЛ) репродуктив ёшдаги аёлларда учрайдиган энг кенг

тарқалган эндокрин касалликлардан бири. Клиник амалиётда ушбу касалликнинг функционал шакли устун-лик қилади ва уни аниқлаш пролактиннинг ортиқча ажралишининг органик сабабларини истисно этган ҳолда дифференциал ёндашувни талаб этади. Гиперпролактинемиянинг репродуктив тизимга таъсири етарлича ўрганилган бўлса-да, пролактин (ПРЛ) даражасининг ошиши марказий асаб тизимига, хусусан, когнитив функцияларга таъсири маҳаллий ва халқаро адабиётларда етарли даражада ёритилмаган. Мавжуд маълумотлар ГПРЛ билан оғриган беморларда нейровегетатив симптомлар, депрессия, хавотир ҳамда уйқу бузилишлари кузатилишини кўрсатади. Бироқ аниқ когнитив бузилишлар, уларнинг патофизиологик механизмлари ҳамда гиперпролактинемия даражаси ва давомийлиги билан ўзаро боғлиқлиги етарли даражада ўрганилмаган. Мазкур мақолада Эндокринология илмий-тадқиқот институтида олиб борилган ўз тадқиқотларимиз натижалари келтирилади ва унда когнитив бузилишлар функционал гиперпролактинемия даражаси ҳамда давомийлигига боғлиқ ҳолда таҳлил қилинади.

Калит сўзлар: функционал гиперпролактинемия, пролактин, когнитив бузилишлар, нейрокөгнитив функциялар, MMSE, МоСА, хотира, диққат, ижро функциялари, репродуктив ёшдаги аёллар, нейроэндокринология.

Введение. Гиперпролактинемия (ГПРЛ) представляет собой одно из наиболее распространённых эндокринных нарушений у женщин репродуктивного возраста и характеризуется стойким повышением уровня пролактина (ПРЛ) в сыворотке крови. В клинической практике особое место занимает функциональная гиперпролактинемия (фГПРЛ), не связанная с органическими поражениями гипофиза, однако сопровождающаяся широким спектром репродуктивных, метаболических и психоэмоциональных нарушений [1–4]. Несмотря на значительный прогресс в изучении репродуктивных аспектов данного состояния, его влияние на центральную нервную систему, в частности на когнитивные функции, остаётся недостаточно изученным.

Современные представления нейроэндокринологии рассматривают пролактин не только как гормон, регулирующий лактацию, но и как важный нейромодулятор, участвующий в регуляции поведенческих реакций, эмоционального состояния и когнитивных процессов. Наличие рецепторов пролактина в структурах головного мозга, включая гиппокамп, префронтальную кору и лимбическую систему, свидетельствует о его потенциальной роли в формировании памяти, внимания и исполнительных функций [7–10].

Ряд исследований указывает на то, что гиперпролактинемия может сопровождаться развитием тревожно-депрессивных состояний, нарушений сна и снижением качества жизни [5, 6]. Однако данные о специфических когнитивных нарушениях при фГПРЛ носят фрагментарный характер, а их связь с уровнем пролактина и длительностью заболевания остаётся предметом дискуссий. Недостаточно изучены также механизмы, лежащие в основе когнитивного дефицита, включая возможную роль дофаминергической дисрегуляции, окислительного стресса и метаболических нарушений. Особую актуальность проблема приобретает в связи с тем, что когнитивные нарушения у женщин репродуктивного возраста могут существенно снижать профессиональную продуктивность, социальную адаптацию и качество жизни. При этом ранняя диагностика субклинических когнитивных расстройств остаётся затруднительной без применения чувствительных нейропсихологических инструментов, таких как Монреальская шкала оценки когнитивных функций (МоСА).

В этой связи представляется актуальным комплексное изучение когнитивных функций у пациенток с функциональной гиперпролактинемией с учётом уровня пролактина и длительности заболевания, что позволит углубить понимание патогенетических механизмов и обосновать необходимость раннего скрининга и коррекции когнитивных нарушений.

Актуальность темы определяется несколькими факторами. Во-первых, современная нейроэндокринология рассматривает пролактин не только как гормон лактации, но и как нейромедиатор, участвующий в регуляции памяти, эмоций и поведения [7, 8]. Экспериментальные исследования продемонстрировали экспрессию пролактиновых рецепторов в гиппокампе, префронтальной коре и миндалине, что подтверждает их роль в когнитивных процессах [9, 10]. Во-вторых, когнитивные нарушения могут существенно снижать качество жизни пациенток, ограничивать их социально-профессиональную активность и усиливать тревожно-депрессивные симптомы, что требует системной оценки и коррекции [11, 12].

Целью настоящего исследования явилось изучение характера и структуры когнитивных расстройств у женщин репродуктивного возраста с функциональной гиперпролактинемией, а также определение корреляционных связей между выраженностью когнитивных нарушений, уровнем пролактина в сыворотке крови и длительностью заболевания.

Материалы и методы, дизайн исследования. Проведено кросс-секционное клинико-неврологическое исследование с применением верифицированных нейропсихологических шкал. Исследование выполнено в период с 2019 по 2023 год в Ташкентском Государственном Медицинском Университете при базе Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра эндокринологии с участием 200 пациенток с установленным диагнозом «функциональная гиперпролактинемия» (фГПРЛ) в возрасте от 18 до 40 лет (средний возраст $31,2 \pm 4,8$ года). Контрольную группу составили 20 здоровых женщин соответствующего возраста с нормальным уровнем пролактина (4,8–23,0 нг/мл) и без клинических проявлений гиперпролактинемии.

Критерии включения являлись: - Установленный диагноз функциональной ГПРЛ (неопухолового генеза) с повышением уровня ПРЛ в сыворотке крови более 25 нг/мл;

- Возраст 18–40 лет;

- Отсутствие органических причин гиперпролактинемии (по данным МРТ гипофиза, а так же с нормальной остротой зрения без полевого дефекта);

- Информированное согласие на участие в исследовании.

Критерии исключения: - Органические заболевания головного мозга (все виды опухоли головного мозга);

- Наличие в анамнезе черепно-мозговой травмы, проведенные операции на головном мозге, болезни находящиеся на лучевой терапии, эпилепсии;

- Патология щитовидной железы;

- Депрессивные и тревожные расстройства средней и тяжелой степени по шкалам HADS, MADRS;

- Прием лекарственных препаратов, влияющих на когнитивные функции;

- Злоупотребление алкоголем и наркотическими веществами;

- Беременность и лактация.

Для анализа влияния уровня пролактина исследуемые пациентки нами были условно разделены на три группы:

Группа 1 (n=61): средний уровень ПРЛ 27,0–34,9 нг/мл;

Группа 2 (n=86): средний уровень ПРЛ 35,0–44,9 нг/мл;

Группа 3 (n=53): средний уровень ПРЛ $\geq 45,0$ нг/мл.

Для оценки влияния длительности заболевания сформированы параллельные подгруппы:

Группа 1 (n=79): длительность ГПРЛ 0–2 года;

Группа 2 (n=72): длительность ГПРЛ 2–4 года;

Группа 3 (n=49): длительность ГПРЛ более 4 лет.

Для оценки состояния пациенток нами были проведены следующие методы диагностики: Оценка уровня пролактина выполнялась методом иммуноферментного анализа (ИФА) с использованием тест-системы «Prolactin-ELISA» (Biomerica, США) на анализаторе Stat Fax 2100. Кровь отбиралась натощак в фолликулярную фазу менструального цикла (3–5 день). Контрольный уровень ПРЛ определялся трижды с интервалом 2 недели при отказе от провоцирующих факторов.

Нейрокогнитивное тестирование мы провели двумя верифицированными международными тестами:

1. Мини-ментальный тест (MMSE – Mini-Mental State Examination) – скрининговый тест для оценки глобальных и глубоких когнитивных функций, включающий ориентацию, регистрацию, внимание и счет, воспроизведение, речевые функции и конструктивные праксисы. Максимальная оценка – 30 баллов. Когнитивные нарушения определялись при значениях ≤ 24 баллов [13, 14].

2. Монреальская шкала оценки когнитивных функций (MoCA – Montreal Cognitive Assessment) – более чувствительный тест для выявления легких когнитивных нарушений, оценивающий внимание, исполнительные функции, память, язык, визуализационно-конструктивные способности, концептуальное мышление, ориентацию. Максимальная оценка – 30 баллов. Когнитивные нарушения при значениях < 26 баллов [15, 16].

Тестирование проводилось квалифицированным нейропсихологом в стандартизированных условиях в утренние часы (9:00–12:00) с исключением влияния циркадных колебаний когнитивных функций.

Статистическая обработка выполнена с использованием пакета SPSS Statistics 26.0 (IBM, США). Проверка распределения данных на нормальность осуществлена с помощью критерия Шапиро-Уилка. Для количественных переменных с нормальным распределением представлены среднее арифметическое (M) и стандартное отклонение (SD). Межгрупповые сравнения выполнены с помощью однофакторного дисперсионного анализа (ANOVA) с последующим пост-хок тестом Тьюки.

Для оценки корреляционных связей применен коэффициент корреляции Пирсона (r) и Спирмена (ρ). Уровень статистической значимости принят при $p < 0,05$.

И были получены следующие результаты:

Структура когнитивных нарушений по данным MMSE: Анализ частоты когнитивных дефицитов у 200 пациенток с фГПРЛ выявил следующую структуру нарушений (рис. 1). Нарушение памяти (восприятие и отсроченное воспроизведение запоминаемых слов) диагностировано у 128 пациенток (64,2%). Дефицит концентрации внимания (серийное вычитание семерок) выявлен у 103 женщин (51,5%). Нарушения восприятия (копирование фигуры) отмечены у 93 пациенток (46,4%). Трудности в ориентировке в месте и времени выявлены соответственно у 69 (34,5%) и 65 (32,2%) пациенток. Ошибки при повторении фразы допустили 77 женщин (38,7%). Нарушения речи (называние объектов) выявлены у 28 пациенток (14,2%). Непонимание команд зафиксировано у 17 пациенток (8,6%).

Таким образом, доминирующими когнитивными дефицитами при фГПРЛ являлись нарушения памяти, внимания и визуопро пространственных функций, что свидетельствует о вовлечении в патологический процесс лобно-височных и теменных отделов коры головного мозга.



Рис. 1. Частота когнитивных расстройств у обследованных пациенток с функциональной гиперпролактинемией по данным MMSE

Как показали результаты, пациентки с фГПРЛ имели различные нарушения когнитивной функции в виде снижения памяти (64,2%), нарушения концентрации внимания (51,5%) и восприятия (46,4%). Допускались ошибки при повторениях фразы (38,7%), ориентировке в месте (34,5%) и времени (32,2%). Также, пациентки испытывали трудности в восприятии и отсроченном воспроизведении запоминаемых слов (46,4% и 38,7% соответственно).

Влияние уровня пролактина на когнитивную функцию. Сравнительный анализ средних баллов MMSE в зависимости от степени гиперпролактинемии продемонстрировал достоверное снижение показателей по мере увеличения уровня ПРЛ (табл. 1).

Таблица 1.

Средние значения баллов MMSE у больных с ГПРЛ в зависимости от уровня пролактина ($M \pm SD$)

группы	Всего	Тест MMSE, баллы	Контроль n= 20
1гр. ПРЛ: 27-34,9нг/мл	n= 61	26,5 ± 2,8	29,3 ± 1,2
2гр. ПРЛ: 35-44,9нг/мл	n= 86	25,4 ± 3,1	
3гр. ПРЛ: 45 и более нг/мл	n= 53	22,6 ± 3,1*	

*Примечание: * – достоверность различий между Группой 3 и Группой 1 ($p < 0,05$).

Анализ данных свидетельствует о том, что в Группе 3 с уровнем ПРЛ ≥ 45 нг/мл отмечены выраженные когнитивные расстройства ($22,6 \pm 3,1$ балла), соответствующие предменструальному синдрому. При этом в Группе 1 и 2 выявлено умеренное снижение когнитивных функций без статистически достоверных межгрупповых различий. Однако тенденция к прогрессирующему ухудшению когнитивных показателей по мере увеличения уровня ПРЛ имеет четкую дозозависимую направленность (trend analysis, $p < 0,001$).

2). Аналогичные результаты получены при оценке с помощью Монреальной шкалы (MoCA) (табл. 2).

Таблица 2.

Средние значения баллов МоСА у больных с ГПРЛ в зависимости от уровня пролактина ($M \pm SD$)

группы	Всего	Тест Монреальская шкала, средние баллы	Контроль n=20
1гр.ПРЛ:27-34,9нг/мл	n= 61	22,1 $\pm$ 2,7*	29,3 $\pm$ 4,3
2гр.ПРЛ:35-44,9нг/мл	n= 86	20,8 $\pm$ 3,8**	
3гр.ПРЛ:45 и более нг/мл	n= 53	19,5 $\pm$ 2,6**	

Примечание: * - достоверность различий, где * - $p < 0,05$; ** - $p < 0,01$

Данные МоСА демонстрируют более высокую чувствительность к выявлению легких когнитивных нарушений по сравнению с MMSE. Снижение среднего балла на 9,8 единицы в Группе 3 по сравнению с контролем свидетельствует о значительном вовлечении исполнительных функций, визуопространственных способностей и концептуального мышления.

Далее мы установили связь между длительностью ГПРЛ и когнитивными нарушениями.

Анализ взаимосвязи между длительностью заболевания и когнитивными показателями выявил прогностически значимые закономерности (табл. 3).

Таблица 3

Средние значения баллов MMSE пациенток в зависимости от длительности ГПРЛ

группы	Всего	Тест MMSE, баллы	Контроль n= 20
1гр. 0-2 года	n= 79	27,5 $\pm$ 2,8	29,3 $\pm$ 1,2
2гр.2-4года	n= 72	23,4 $\pm$ 2,1*	
3гр.более 4 лет	n= 49	19,6 $\pm$ 2,1***	

*Примечание: * – $p < 0,05$, ** – $p < 0,01$, *** – $p < 0,001$ по сравнению с контролем.*

Как показали результаты, в 1 группе с длительностью заболевания до 2 лет нарушений когнитивной функции не было, в то время как во 2 и 3 группах отмечались нарушения когнитивной функции от умеренных во 2 группе (23,4 $\pm$ 2,1, баллов, $p < 0,05$), до выраженных изменений у пациенток в 3 группе с длительностью ГПРЛ 4 и более лет (19,6 $\pm$ 2,1, баллов $p < 0,01$).

Таблица 4.

Средние значения баллов МоСА у пациенток в зависимости от длительности ГПРЛ ($M \pm SD$)

группы	Всего	Тес Монреальская шкала, средние баллы	Контроль n= 20
1гр. 0-2 года	n= 79	23,7 $\pm$ 1,9**	29,3 $\pm$ 1,2
2гр.2-4года	n= 72	19,6 $\pm$ 2,8**	
3гр.более 4 лет	n= 49	16,5 $\pm$ 2,1***	

Примечание: * - достоверность различий, где * - $p < 0,05$; * - $p < 0,01$

Ключевым фактом является отсутствие достоверных когнитивных нарушений в Группе 1 с длительностью заболевания до 2 лет при оценке по MMSE (27,5 $\pm$ 2,8 балла), в то время как МоСА уже выявила значимые изменения (23,7 $\pm$ 1,9 балла, $p < 0,01$). Это подтверждает повышенную чувствительность МоСА к субклиническим когнитивным дефицитам на ранних этапах заболевания.

В Группе 3 с длительностью ГПРЛ более 4 лет зафиксировано выраженное снижение когнитивных функций, соответствующее синдрому легкой когнитивной дисфункции (МКБ G31.84) по MMSE (19,6 $\pm$ 2,1 балла) и умеренной когнитивной дисфункции по МоСА (16,5 $\pm$ 2,1 балла). Прогрессирующее ухудшение показателей с увеличением длительности заболевания имеет четкую временную динамику ($p < 0,001$ при тренд-анализе).

Проведенный *корреляционный анализ* выявил высокую положительную связь между длительностью ГПРЛ и когнитивными показателями: МоСА ($r = -0,76$, $p < 0,001$) и MMSE ($r = -0,72$, $p < 0,001$). Статистически значимая корреляция между уровнем ПРЛ и когнитивными баллами была умеренной ($r = -0,48$ для МоСА, $p < 0,01$; $r = -0,42$ для MMSE, $p < 0,05$), что свидетельствует о более сильном влиянии хронизации заболевания по сравнению с уровнем гормона.

Результаты и их обсуждение. Полученные данные позволяют утверждать, что функциональная гиперпролактинемия является значимым фактором риска развития когнитивных нарушений у

женщин репродуктивного возраста. Выявленная структура дефицитов (преимущественное поражение памяти, внимания и визуопро пространственных функций) коррелирует с данными о патогенезе ГПРЛ на нейронном уровне.

С чем же это связано?

В первых: Патофизиологические механизмы. Современные представления о механизмах нейротоксического действия пролактина включают несколько теоретических концепций. Во-первых, гиперпролактинемия сопровождается снижением секреции дофамина в мезолимбической и мезокортикальной системах вследствие стимуляции дофаминергических нейронов гипоталамуса (тонический тормозящий контроль) [17, 18]. Дофаминовая недостаточность в префронтальной коре и гиппокампе приводит к дисрегуляции рабочей памяти и внимательных процессов [19, 20].

Во-вторых, экспериментально доказано, что хроническая гиперпролактинемия индуцирует окислительный стресс в гиппокампальных нейронах с повышением продукции свободных радикалов и снижением активности антиоксидантных ферментов [21, 22]. Это обуславливает нейродегенеративные изменения и нарушение синаптической пластичности, что клинически реализуется как дефицит памяти и обучения.

В-третьих, гиперпролактинемия ассоциируется с метаболическим синдромом, инсулинорезистентностью и дислипидемией [23, 24], которые являются самостоятельными факторами сосудистого поражения мозга и развития когнитивных дисфункций [25, 26]. Обнаруженная нами корреляция между длительностью заболевания и когнитивными нарушениями может отражать кумулятивный эффект метаболических нарушений на церебральную гемодинамику и нейронную целостность.

Сравнительная чувствительность диагностических шкал: Важным результатом исследования является демонстрация преимуществ МоСА над MMSE в выявлении субклинических когнитивных нарушений на ранних стадиях ГПРЛ. В группе с длительностью заболевания до 2 лет MMSE не выявил достоверных изменений ($27,5 \pm 2,8$ балла), тогда как МоСА уже показал значимый дефицит ($23,7 \pm 1,9$ балла, $p < 0,01$). Это согласуется с данными литературы о большей чувствительности МоСА к легким когнитивным нарушениям благодаря включению заданий на исполнительные функции и флуентность [27, 28].

Выявленная положительной корреляция между длительностью ГПРЛ и когнитивными показателями ($r = -0,76$ для МоСА) превышает по величине корреляцию с уровнем ПРЛ ($r = -0,48$), что указывает на важность хронизации заболевания. Это может объясняться нейропластическими изменениями, развивающимися при длительной гиперпролактинемии, включая редукцию плотности дофаминовых рецепторов D1 и D2 в префронтальной коре и стриатуме, что доказано в экспериментальных моделях [29, 30].

В группе с длительностью более 4 лет у 41 пациентки (83,7%) выявлены значения MMSE < 24 балла, что соответствует критериям когнитивных расстройств, требующих дифференциальной диагностики с ранними стадиями нейродегенеративных заболеваний. Это обуславливает необходимость включения нейропсихологического тестирования в стандартный алгоритм обследования пациенток с хронической ГПРЛ.

Полученные результаты по литературным данным согласуются с данными Yamada et al. (2019), которые продемонстрировали корреляцию между уровнем ПРЛ и объемом гиппокампа у пациенток с функциональной ГПРЛ [31]. Результаты Ferrero et al. (2020) также подтверждают наличие дефицита рабочей памяти и внимания у пациенток с тяжелой гиперпролактинемией [32]. Однако наше исследование впервые системно оценило влияние длительности заболевания на структуру когнитивных нарушений в среднеазиатской популяции, где на сегодняшний день большая часть женщин детородного возраста занимают должностные и важные руководящие места на предприятиях что повышает его клиническую значимость.

В заключении хотелось бы отметить, что: 1. Функциональная гиперпролактинемия у женщин репродуктивного возраста ассоциируется с развитием полиморфных когнитивных нарушений, доминирующими компонентами которых являются дефицит памяти (64,2%), внимания (51,5%) и визуопро пространственных функций (46,4%).

2. Выраженность когнитивных расстройств коррелирует с уровнем пролактина: при значениях ПРЛ ≥ 45 нг/мл отмечаются выраженные когнитивные нарушения (MMSE $22,6 \pm 3,1$ балла), соответствующие предементному синдрому.

3. Длительность гиперпролактинемии является более значимым предиктором когнитивных нарушений, чем уровень ПРЛ ($r = -0,76$ против $r = -0,48$). При длительности заболевания более 4 лет выявлены выраженные когнитивные дисфункции (МоСА $16,5 \pm 2,1$ балла), требующие дифференциальной диагностики с нейродегенеративной патологией.

4. Монреальская шкала оценки когнитивных функций (МоСА) демонстрирует превосходную чувствительность к субклиническим когнитивным нарушениям на ранних стадиях ГПРЛ по сравнению с MMSE.

5. Результаты исследования обосновывают необходимость включения нейропсихологического тестирования в стандартный алгоритм обследования пациенток с хронической гиперпролактинемией для раннего выявления когнитивных дефицитов и своевременной коррекции.

Практические рекомендации:

На основании полученных данных рекомендуется:

- Включение скрининга когнитивных функций (МоСА) в протокол обследования всех пациенток с ГПРЛ длительностью более 2 лет;
- Раннее начало медикаментозной коррекции ГПРЛ при наличии когнитивных нарушений независимо от репродуктивных симптомов;
- Дифференциальная диагностика с депрессией и тревожными расстройствами, маскирующимися под когнитивные дефициты;
- Когнитивные нарушения у пациенток с длительной гиперпролактинемией и выраженными когнитивными нарушениями, при антипролактиновой терапии в течение 6 месяцев, намного раз эффективнее улучшаются.

Список литературы:

1. Glezer A., Bronstein M.D. Prolactinomas // Endocrinol Metab Clin North Am. – 2015. – Vol. 44. – P. 71–78.
2. Naliato E.C.O., Farias M.L.F., Braucks G.R. et al. Prevalence of hyperprolactinemia in women with reproductive disorders // Arq Bras Endocrinol Metab. – 2019. – Vol. 63. – P. 412–418.
3. Klibanski A., Towers K., Scangas G. et al. Functional hyperprolactinemia: diagnostic challenges and therapeutic approaches // Nat Rev Endocrinol. – 2021. – Vol. 17. – P. 521–534.
4. Романенко Ю.В., Мельниченко Г.А. Гиперпролактинемия: современные подходы к диагностике и лечению // Consilium Medicum. – 2022. – № 7. – С. 54–61.
5. Sonigo C., Bouilly J., Carre N. et al. Hyperprolactinemia and psychiatric disorders: a Systematic review // Psychoneuroendocrinology. – 2020. – Vol. 115. – P. 104631.
6. Wang A.T., Mullan R.J., Lane M.A. et al. Treatment of hyperprolactinemia: a systematic review and meta-analysis // Syst Rev. – 2012. – Vol. 1. – P. 33.
7. Torner L., Neumann I.D. The brain prolactin system: involvement in stress response adaptations in lactation // Stress. – 2002. – Vol. 5. – P. 249–257.
8. Grattan D.R., Jasoni C.L., Liu X. et al. Prolactin regulation of gonadotropin-releasing hormone neurons to suppress luteinizing hormone secretion in mice // Endocrinology. – 2007. – Vol. 148. – P. 4344–4351.
9. Brown R.S., Piet R., Herbison A.E. et al. Differential actions of prolactin on electrical activity and intracellular signaling in hypothalamic GnRH neurons // J Neuroendocrinol. – 2017. – Vol. 29. – P. e12455.
10. Torner L., Toschi N., Nava G. et al. Increased hypothalamic vulnerability to oxidative stress in lactating rats // Neuroscience. – 2002. – Vol. 115. – P. 1133–1140.
11. Samson S.L., Hamrahian A.H., Ezzat S. et al. American Association of Clinical Endocrinologists, American College of Endocrinology disease state clinical review: clinical relevance of macroprolactin in the absence or presence of true hyperprolactinemia // Endocr Pract. – 2015. – Vol. 21. – P. 1420–1428.
12. De Sousa S.M., McLachlan R.I. An update on the diagnosis and management of functional hypothalamic amenorrhea // Curr Opin Endocrinol Diabetes Obes. – 2018. – Vol. 25. – P. 377–382.
13. Folstein M.F., Folstein S.E., McHugh P.R. Mini-mental state: a practical method for grading the cognitive state of patients for the clinician // J Psychiatr Res. – 1975. – Vol. 12. – P. 189–198.
14. Tombaugh T.N., McIntyre N.J. The mini-mental state examination: a comprehensive review // J Am Geriatr Soc. – 1992. – Vol. 40. – P. 922–935.
15. Nasreddine Z.S., Phillips N.A., Bédirian V. et al. The Montreal Cognitive Assessment, MoCA: a brief screening tool for mild cognitive impairment // J Am Geriatr Soc. – 2005. – Vol. 53. – P. 695–699.
16. Julayanont P., Phillips N., Chertkow H. et al. The Montreal Cognitive Assessment (MoCA): concept and clinical review // Cognitive Screening Instruments. – Springer, 2017. – P. 139–179.
17. Whittaker P.G., Bersak D., Molitch M. et al. The dopamine-mediated control of prolactin secretion // Endocr Rev. – 2019. – Vol. 40. – P. 1098–1120.
18. Ben-Jonathan N., LaPensee C.R., LaPensee E.W. What can we learn from rodents about pro-

lactin in humans? // *Endocr Rev.* – 2008. – Vol. 29. – P. 1–41.

19. Grattan D.R. The neuroendocrinology of prolactin: a 45-year perspective // *J Neuroendocrinol.* – 2020. – Vol. 32. – e12822.

20. Freeman M.E., Kanyicska B., Lerant A. et al. Prolactin: structure, function, and regulation of secretion // *Physiol Rev.* – 2000. – Vol. 80. – P. 1523–1631.

21. Pires A., Pires A., Ribeiro R. et al. Cognitive performance in patients with hyperprolactinemia: a systematic review // *Endocr Connect.* – 2021. – Vol. 10. – R109–R117.

22. Alos N., Moliner-Pregel M., Cañete R. et al. Effect of prolactin on glucose and lipid metabolism // *Obesity (Silver Spring).* – 2009. – Vol. 17. – P. 1334–1337.

23. Serri O., Beauregard C., Rasio E. et al. Metabolic effects of prolactin: a focus on glucose homeostasis and lipid metabolism // *Diabetologia.* – 2021. – Vol. 64. – P. 2031–2040.

24. Dos Santos Silva C.M., Barbosa F.R., Lima G.A. et al. Body composition and insulin resistance in patients with hyperprolactinemia // *Pituitary.* – 2011. – Vol. 14. – P. 186–192.

25. Anagnostis P., Adamidou F., Slavakis A. et al. Hyperprolactinemia and cardiovascular risk in patients with prolactinomas // *Hormones (Athens).* – 2013. – Vol. 12. – P. 415–423.

26. Dejager S., Gerber D., Ducluzeau P.H. et al. Prolactin and cardiovascular risk in patients with

prolactinoma // *Ann Endocrinol (Paris).* – 2010. – Vol. 71. – P. 502–509.

27. Costa A., Riedemann A., Román R. et al. Cognitive dysfunction in patients with hyperprolactinemia // *Endocrine.* – 2018. – Vol. 59. – P. 111–119.

28. Yamamoto Y., Kato Y., Shimatsu A. et al. Structural brain abnormalities in patients with hyperprolactinemia // *J Clin Endocrinol Metab.* – 2019. – Vol. 104. – P. 5234–5242.

29. Ferrero A., Barrai I., Davalli M. et al. Cognitive impairment in patients with prolactinomas: a multicenter prospective study // *Pituitary.* – 2020. – Vol. 23. – P. 245–253.

30. De Sousa S.M., Zhornitzki T., Kahn J.P. et al. Prolactin and dopamine: their relationship in health and disease // *Neuroendocrinology.* – 2021. – Vol. 111. – P. 1029–1045.

31. Kharlip J., Salvatori R., Yenokyan G. et al. Recurrence of hyperprolactinemia after withdrawal of long-term cabergoline therapy // *J Clin Endocrinol Metab.* – 2012. – Vol. 97. – P. 720–727.

32. Glezer A., Bronstein M.D. Approach to the patient with persistent hyperprolactinemia and negative sellar imaging // *J Clin Endocrinol Metab.* – 2012. – Vol. 97. – P. 2211–2216.

33. Molitch M.E. Prolactinoma // *N Engl J Med.* – 2014. – Vol. 371. – P. 2169–2176.

34. Stojanovic M., Lalic N.M. Cognitive dysfunction in hyperprolactinemia: a review of the literature // *Horm Metab Res.* – 2022. – Vol. 54. – P. 701–708.

Для цитирования: Холикова А.О., Халимова Н.Ю., Жураева Ю.О. Когнитивные нарушения при функциональной гиперпролактинемии (фГПРЛ) у женщин репродуктивного возраста в зависимости от уровня и длительности фГПРЛ: результаты кросс-секционного исследования // *Вестник фундаментальной и клинической медицины.* – 2026. – № 4(24). – С. 681–688. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19639174>

ҚАНДЛИ ДИАБЕТ ФОНИДАГИ ЭНЦЕФАЛОПАТИЯДА ЭМОЦИОНАЛ ФУНКЦИЯЛАР ЎЗГАРИШИНИНГ НЕЙРОФИЗИОЛОГИК МАРКЕРЛАРИ

Ходжиева Д.Т., Яхёев М.С.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Мақолада қандли диабет фонида шаклланадиган энцефалопатияда эмоционал функциялар ўзгаришининг нейрофизиологик маркерлари таҳлил қилинди. Асосий эътибор депрессия, хавотир, аффектив лабиллик ва эмоционал назорат бузилишининг нейробиологик механизмларига қаратилди. Таҳлил натижаларига кўра, сурункали гипергликемия, нейрояллигланиш, HPA ўқи дисрегуляцияси ва фронто-лимбик тармоқлардаги функционал ўзгаришлар эмоционал дисфункциянинг шаклланишида муҳим ўрин тутди. EEG ва ERP кўрсаткичларидаги оғишлар, шунингдек MRI/fMRIда аниқланадиган структура-функционал ўзгаришлар диабетик энцефалопатияда эмоционал бузилишларни баҳолашда қимматли маркерлар ҳисобланади. Руҳий ҳолатнинг тизимли скрининги ва нейрофизиологик мониторинг беморларни комплекс бошқаришда муҳим аҳамиятга эга.

Калим сўзлар: диабетик энцефалопатия, депрессия, хавотир, эмоционал дисфункция, нейрофизиологик маркер, EEG, фронто-лимбик тизим, нейрояллигланиш.

NEUROPHYSIOLOGY MARKERS OF CHANGES OF EMOTIONAL FUNCTIONS IN ENCEPHALOPATHY ON THE BACKGROUND OF DIABETES MELLITUS

Khodzhiyeva D.T., Yakhyoev M.S.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. The article examines neurophysiological markers of emotional dysfunction in encephalopathy developing against the background of diabetes mellitus. Particular attention is paid to the neurobiological mechanisms of depression, anxiety, affective lability, and impaired emotional regulation. The analysis suggests that chronic hyperglycemia, neuroinflammation, HPA-axis dysregulation, and functional alterations within fronto-limbic networks play a major role in the development of emotional dysfunction. Deviations in EEG and ERP indices, together with structural and functional changes detected by MRI/fMRI, are valuable markers for assessing emotional disturbances in diabetic encephalopathy. Systematic screening of psychoemotional status and neurophysiological monitoring are important components of comprehensive patient management.

Keywords: diabetic encephalopathy, depression, anxiety, emotional dysfunction, neurophysiological marker, EEG, fronto-limbic system, neuroinflammation.

НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ИЗМЕНЕНИЙ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ ПРИ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ НА ФОНЕ САХАРНОГО ДИАБЕТА

Ходжиева Д.Т., Яхёев М.С.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. В статье рассмотрены нейрофизиологические маркеры изменений эмоциональных функций при энцефалопатии, формирующейся на фоне сахарного диабета. Основное внимание уделено нейробиологическим механизмам депрессии, тревоги, аффективной лабильности и нарушений эмоциональной регуляции. Анализ показывает, что хроническая гипергликемия, нейровоспаление, дисрегуляция оси HPA и функциональные изменения во фронто-лимбических сетях играют значимую роль в формировании эмоциональной дисфункции. Отклонения по данным ЭЭГ и ERP, а также структурно-функциональные изменения, выявляемые с помощью MRI/fMRI, являются ценными маркерами для оценки эмоциональных нарушений при диабетической энцефалопатии. Систематический скрининг психоэмоционального состояния и нейрофизиологический мониторинг имеют важное значение для комплексного ведения пациентов.

Ключевые слова: диабетическая энцефалопатия, депрессия, тревога, эмоциональная дисфункция, нейрофизиологический маркер, ЭЭГ, фронто-лимбическая система, нейровоспаление.

e-mail: yahyoyev.mehridin@bsmi.uz

Кириш. Диабетик энцефалопатия ҳақидаги илмий тасаввурлар аввал когнитив пасайишга кўпроқ йўналтирилган бўлса, бугунги кунда эмоционал функциялардаги ўзгаришлар ҳам унинг муҳим таркибий қисми экани тан олинмоқда. Қандли диабетли беморларда депрессия, хавотир, аффектив беқарорлик, мотивация пасайиши ва руҳий чарчоқ кўп учрайди. Бу симптомлар баъзан “психологик реакция” сифатида баҳоланади, аммо кўплаб тадқиқотлар улар марказий асаб тизимида кечаётган нейробиологик ўзгаришлар билан ҳамбарчас боғлиқ эканини кўрсатмоқда.

Эмоционал бузилишларни ўз вақтида аниқламаслик катта клиник оқибатларга олиб келади. Депрессия ва хавотир гликемик назоратни ёмонлаштиради, ўз-ўзини бошқаришни сусайтиради, соматик асоратлар хавфини оширади ва ҳаёт сифатига салбий таъсир қилади. Шу сабабли диабетик энцефалопатияни когнитив-эмоционал синдром сифатида кўриш, унинг нейрофизиологик асосларини ўрганиш ва интеграл баҳолаш усулларини ишлаб чиқиш муҳим аҳамиятга эга.

Материаллар ва методлар. Мақола таҳлилий-обзор характерга эга. Унда диабет ва депрессиянинг ўзаро боғлиқлиги, диабетда хавотир-депрессия хавф омиллари, EEG/ERP кўрсаткичлари, фронто-лимбик нейротармоқлар ҳамда нейрояллитгиланиш механизмларига бағишланган адабиётлар умумлаштирилди. Асосий эътибор эмоционал функция билан боғлиқ биомаркерлар ва уларнинг клиник қўлланилишига қаратилди.

Натижалар ва муҳокама. Адабиётлар диабет ва депрессия ўртасида икки томонлама муносабат мавжудлигини кўрсатади. Бир томондан, диабетли беморларда депрессив симптомлар ва хавотир тарқалиши юқори. Иккинчи томондан, депрессия метаболик назоратни ёмонлаштириб, инсулинрезистентлик ва яллиғланиш фонида диабет кечишини оғирлаштириши мумкин. Демак, эмоционал бузилиш диабетнинг фақат психосоциал оқибати эмас, балки унинг патогенетик занжирига кирувчи омилдир.

Нейробиологик нуқтаи назардан ушбу боғлиқлик бир нечта механизмлар билан тушунтирилади. Сурункали яллиғланиш цитокинлар фаоллигини оширади, бу эса нейротрансмиттерлар алмашинуви ва нейропластикликка таъсир қилади. Инсулин сигнализациясининг мияда бузилиши серотонинергик ва дофаминергик тизимларнинг функциясига таъсир этиб, мукофот тизими, мотивация ва аффектив барқарорликни издан чиқаради. Шу билан бирга, гипоталамус-гипофиз-бўйрак усти ўқи дисрегуляцияси кортизол даражасининг хроник ошиши орқали гиппокамп ва олдинги сингулат каби тузилмаларга зарар етказиши мумкин.

EEG тадқиқотлари диабет ва катта депрессияда айрим умумий хусусиятлар борлигини кўрсатади. Хусусан, секин тўлқинлар фаоллигининг ортиши, кортикал уйғунлиқнинг пасайиши ва айрим ERP компонентларининг ўзгариши ҳам диабетда, ҳам депрессив ҳолатларда қайд этилган. Бу умумий нейрофизиологик профиль эмоционал функциялар бузилиши билан боғлиқ марказий тармоқлар иштироки мавжудлигини англатади. Диабетик беморларда P300 латентлигининг узайиши нафақат когнитив ишлов беришнинг секинлашуви, балки аҳамиятли стимулни эмоционал баҳолаш жараёни сусайганини ҳам билдиради.

Фронто-лимбик тизим эмоционал назоратнинг марказий нейрон тармоғи ҳисобланади. Олдинги сингулат қирраси диққатни эмотсионал ахборотга йўналтириш, конфликтни қайта ишлаш ва аффектив мониторингда қатнашади. Гиппокамп стрессга жавоб ва контекстуал хотирани бошқаради; амигдала эса хавотир ва салбий эмоцияларни ишлов беради. Диабетда ушбу тузилмаларнинг функцияси ҳамда ўзаро боғланиши ўзгариши ҳақидаги маълумотлар ортиб бормоқда. 2024 йилги нейровизуализация мета-таҳлилида олдинги сингулатда фаоллик ошиши компенсатор жараён ёки нейрон тармоқдаги қайта ташкилланиш сифатида баҳоланган. Бошқа ишлар гиппокампа атрофия ва темпорал соҳалардаги кулранг модда камайишини кўрсатади.

Эмоционал бузилишлар хавфини клиник омиллар ҳам кучайтиради. Юқори HbA1c, узоқ давом этган касаллик, оғриқли невропатия, томирли асоратлар, семириш, уйқу бузилиши ва ижтимоий қўллаб-қувватлашнинг етишмаслиги депрессия ва хавотир билан боғланган. Айнан шу омиллар когнитив пасайиш учун ҳам умумий хавф омиллари ҳисобланади. Демак, диабетик энцефалопатияда когнитив ва эмоционал дисфункция бир-биридан алоҳида эмас, балки умумий патогенетик майдонда шаклланади.

Амалиёт нуқтаи назаридан, эмоционал ҳолатни баҳолашни диабет менежментининг мажбурий қисми сифатида кўриш керак. PHQ-9, GAD-7 ва қисқартирилган аффектив скрининг воситалари клиник қабулда қўлланиши мумкин. Агар ушбу баҳолашлар когнитив тестлар ва нейрофизиологик кўрсаткичлар билан қўшилса, марказий асаб тизимининг зарарланиш даражаси ҳақида тўлароқ тасаввур ҳосил бўлади. Бундай ёндашув, айниқса, даволашга мойиллиги пасайган, чарчоқ ва мотивацияси сусайган диабетли беморларда самаралидир.

Хулоса:

1. Диабетик энцефалопатияда эмоционал функциялар ўзгариши клиник ва нейробиологик жиҳатдан аҳамиятли муаммо ҳисобланади.
2. Диабет ва депрессия ўртасида нейрояллийланиш, инсулинрезистентлик ва НРА ўқи дисрегуляцияси орқали икки томонлама боғлиқлик мавжуд.
3. EEG ва ERPда кузатиладиган ўзгаришлар эмоционал дисрегуляциянинг марказий нейрофизиологик маркерлари сифатида қаралиши мумкин.
4. Фронт-лимбик тармоқлар, айниқса олдинги сингулат, гиппокамп ва чакка соҳалари диабетдаги аффектив бузилишларда муҳим роль ўйнайди.
5. Эмоционал ва когнитив дисфункция умумий хавф омиллари ва умумий патогенетик механизмларга эга.
6. Диабетли беморларда руҳий ҳолатнинг тизимли скрининги, гликемик назорат ва когнитив баҳолаш билан бирга олиб борилиши лозим.

Адабиётлар рўйхати:

1. Liu Y., et al. Bidirectional relationship between diabetes mellitus and depression: a narrative review. *World Journal of Diabetes*. 2024;15(10):1847-1863.
2. Albai O., et al. Predictive Factors of Anxiety and Depression in Patients with Type 2 Diabetes. *Medicina*. 2024;60(5):747.
3. Alwhaibi M., et al. Depression, Anxiety, and Health-Related Quality of Life in Patients with Type 2 Diabetes. *Journal of Clinical Medicine*. 2024;13(20):6028.
4. Busili A., et al. The risk factors for mental health disorders in patients with type 2 diabetes: umbrella review. *Heliyon*. 2024;10:e28443.
5. Randvali M., et al. The Main Risk Factors in Type 2 Diabetes for Cognitive Impairment, Depression, and Psychosocial Problems. *Diabetology*. 2024;5(1):4.
6. Baskaran A., Milev R., McIntyre R.S. A review of electroencephalographic changes in diabetes mellitus in relation to major depressive disorder. *Neuropsychiatric Disease and Treatment*. 2013;9:143-153.
7. Dai P., et al. Abnormal changes of brain function and structure in patients with T2DM-related cognitive impairment: a neuroimaging meta-analysis and an independent validation. *Nutrition & Diabetes*. 2024;14:91.
8. American Diabetes Association. 13. Older Adults: Standards of Care in Diabetes-2026. *Diabetes Care*. 2026;49(Suppl. 1):S277-S290.
9. Grasset L., et al. Understanding the relationship between type 2 diabetes, MRI markers, and dementia. *Alzheimer's & Dementia*. 2024.
10. Yu X., et al. Diabetes-related cognitive impairment: Mechanisms, diagnosis, and treatment. *Frontiers in Endocrinology*. 2025;16:1502697.

Иқтибос учун: Ходжиева Д.Т., Яхёев М.С. Қандли диабет фонидаги энцефалопатияда эмоционал функциялар ўзгаришининг нейрофизиологик маркерлари // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси*. – 2026. – № 4(24). – Б. 689–691. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19659136>

PM2.5 VA TAMAКИ TUTUНИНИНГ КОМБИНАЦИЯЛАНГАН ТАЪСИРИДА ИЧКИ АЪЗОЛАРДАГИ МОРФОЛОГИК ЎЗГАРИШЛАР

Файзиева Н.Г., Темирова Н.Р.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Ушбу мақолада PM2.5 майда дисперс заррачалари ва тамаки тутунининг комбинацияланган таъсири шароитида лимфоид органлар (тимус, лимфа тугунлари) ва ўпка тўқимасида юзага келадиган морфологик ўзгаришлар таҳлил қилинган. Тадқиқот натижаларига кўра, ушбу икки омилнинг биргаликдаги таъсири изолирланган таъсирларга нисбатан кўпроқ даражада деструктив ва иммуноморфологик қайта қурилиш жараёнларини кучайтириши аниқланди. Тимусда инволютив-дегенератив ўзгаришлар устунлик қилиб, лимфа тугунларида реактив гиперплазия белгилари кузатилди. Ўпка тўқимасида эса сурункали яллиғланишга хос морфологик ўзгаришлар қайд этилди. Олинган натижалар PM2.5 ва тамаки тутунининг организм иммун тизими ва нафас олиш тизимида синергик патоген таъсир кўрсатишини кўрсатади.

Калим сўзлар: PM2.5, тамаки тутуни, морфология, тимус, лимфа тугуни, ўпка, яллиғланиш, иммун тизим.

MORPHOLOGICAL CHANGES IN INTERNAL ORGANS UNDER THE COMBINED INFLUENCE OF PM2.5 AND TOBACCO SMOKE

Faizieva N.G., Temirova N.R.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. This article analyzes morphological changes in lymphoid organs (thymus, lymph nodes) and lung tissue under the combined exposure to PM2.5 fine particulate matter and tobacco smoke. The results demonstrate that the combined exposure of these two factors induces more pronounced destructive processes and immunomorphological remodeling compared to isolated exposure. In the thymus, involutive and degenerative changes were predominant, while reactive hyperplasia was observed in the lymph nodes. The lung tissue showed morphological alterations characteristic of chronic inflammatory processes. The findings indicate a synergistic pathogenic effect of PM2.5 and tobacco smoke on the immune and respiratory systems.

Keywords: PM2.5, tobacco smoke, morphology, thymus, lymph node, lungs, inflammation, immune system.

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ ПОД СОВМЕСТНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ PM2.5 И ТАБАЧНОГО ДЫМА.

Файзиева Н.Г., Темирова Н.Р.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. В данной статье проанализированы морфологические изменения в лимфоидных органах (тимус, лимфатические узлы) и легочной ткани в условиях комбинированного воздействия мелкодисперсных частиц PM2.5 и табачного дыма. Согласно полученным результатам, сочетанное влияние этих двух факторов вызывает более выраженные деструктивные процессы и иммуноморфологическую перестройку по сравнению с изолированным воздействием. В тимусе преобладали инволютивно-дегенеративные изменения, в лимфатических узлах выявлены признаки реактивной гиперплазии. В легочной ткани отмечены морфологические изменения, характерные для хронического воспалительного процесса. Полученные данные свидетельствуют о синергическом патогенном воздействии PM2.5 и табачного дыма на иммунную и дыхательную системы организма.

Ключевые слова: PM2.5, табачный дым, морфология, тимус, лимфатический узел, легкие, воспаление, иммунная система.

Мавзунинг долзарблиги. Сўнгги ўн йилликда атмосфера хавосининг PM2.5 майда дисперсли заррачалари билан ифлосланиши глобал тиббий-экологик муаммо сифатида кенг ўрганилмоқда. Халқаро эпидемиологик тадқиқотлар PM2.5 таъсири ҳар йили миллионлаб эрта ўлим ҳолатларига сабаб бўлишини кўрсатади (1,4). Шу билан бирга, йирик кўламли когорт тадқиқотлар PM2.5 концентрациясининг ҳатто кичик ошиши ҳам умумий ўлим ва касалланиш кўрсаткичларига сезиларли таъсир кўрсатишини тасдиқлайди (3). Шу нуқтаи назардан, Lelieveld ва ҳаммуаллифлар

(2015) PM2.5 ни нафақат локал, балки системали патологик таъсирга эга бўлган экологик омил сифатида баҳолаган.

Россия Федерацияси ва Марказий Осиё ҳудудларида атмосфера ҳавосининг майда дисперсли заррачалар билан ифлосланиши аҳоли саломатлигига жиддий таъсир кўрсатувчи омил сифатида кенг ўрганилмоқда. Рус олимлари таъкидлашича, PM 2.5 концентрациясининг ошиши аҳолида нафас ва юрак-қон томир касалликлари кўрсаткичларининг ортиши билан бевосита боғлиқ (12).

PM2.5 — диаметри 2,5 микрометрдан кичик бўлган майда дисперс заррачалар бўлиб, атмосфера ҳавосининг энг хавфли ифлослантирувчиларидан бири ҳисобланади (World Health Organization, 2021). Ушбу заррачалар юқори пенетратсия қобилиятига эга бўлиб, нафас йўллари орқали альвеолаларгача етиб бориши ва систем қон айланишига кириши мумкин (18). Россия ва СНГ мамлакатлари тадқиқотларида ҳам PM2.5 шаҳар муҳитидаги асосий экологик хавф омилларидан бири эканлиги таъкидланган (8). Ўзбекистон олимлари маълумотларига кўра, йирик шаҳарларда ҳаво ифлосланиши даражаси ортиши аҳоли саломатлигига салбий таъсир кўрсатмоқда (1).

PM2.5 заррачалари юқори гетероген кимёвий таркибга эга бўлиб, улар оғир металллар, нитратлар, сульфатлар ва полициклик ароматик углеводородларни ўз ичига олади (16). Ушбу компонентлар PM2.5 нинг биологик фаоллигини белгилайди ва унинг токсик таъсирини кучайтиради. Schraufnagel (2020) таъкидлашича, PM2.5 заррачалари катта юза майдонига эга бўлиб, токсик моддаларни ташувчи “вектор” сифатида организмга киритади ва ҳужайра мембраналари билан фаол реакцияга киришади (8). Kelly ва Fussell (2019) эса бу заррачаларнинг иммун тизимга таъсири асосан оксидатив стресс ва яллиғланиш реакциялари орқали кечишини қайд этади.

PM2.5 майда дисперсли заррачалари иммун тизимига таъсир механизми бир неча йўналишда намоён бўлади. Биринчидан, PM2.5 таъсирида организмда реактив кислород шакллари (ROS) миқдори ортиб, антиоксидант тизим заифлашади, бу эса ҳужайра мембранаси ва ДНК шикастланишига олиб келади (15). Иккинчидан, PM2.5 макрофаглар ва эпителиал ҳужайраларни фаоллаштириб, IL-1 β , IL-6 ва TNF- α каби проинфламатор цитокинлар секрециясини кучайтиради (20,21). Учинчидан, иммун ҳужайралар, айниқса Т- ва В-лимфоцитлар пролиферацияси пасайиб, иммун жавоб сусаяди (13).

Рус олимларининг тадқиқотлари ҳам ушбу натижаларни тасдиқлайди (7). Чучалин (2018) атмосфера ифлосланиши юқори бўлган ҳудудларда сурункали бронх-ўпка касалликлари ва иммун реактивлик пасайишини қайд этган. Ревич (2019) эса PM2.5 системали токсик таъсир кўрсатиб, организмда иммунодепрессив ҳолатни шакллантиришини таъкидлайди (8). Зайцева (2017) экспериментал тадқиқотларда PM2.5 заррачаларининг альвеоляр барьер орқали қон ва лимфа тизимига ўтиши мумкинлигини исботлаган (3).

Тамаки тутуни 7000 дан ортиқ кимёвий бирикмалардан ташкил топган бўлиб, уларнинг кўпчилиги токсик ва канцероген ҳисобланади (Valavanidis, 2013). Ундаги никотин, карбон оксиди ва эркин радикаллар ҳужайра мембраналарига зарар етказиши (19). Россия тадқиқотчилари тамаки тутуни нафас олиш тизимида яллиғланиш ва эпителий шикастланишига олиб келишини кўрсатган (12). Марказий Осиё тадқиқотларида тамаки таъсири иммун тизим фаолиятини пасайтириши қайд этилган (5).

PM2.5 ва тамаки тутуни биргаликда таъсир этганда синергик эффект кузатилади (17). Бу ҳолатда оксидловчи стресс ва яллиғланиш реакциялари кучаяди (16). Россия олимлари комбинацияланган аэрополлютантлар таъсирида иммун тизим дисбаланси ривожланишини таъкидлайди (3). СНГ тадқиқотларида PM2.5 ва тамаки таъсирида нафас йўллари касалликлари хавфи бир неча барабар ошиши кўрсатилган (2).

PM2.5 таъсирида ўпкада альвеоляр септалар қалинлашиши ва интерстициал яллиғланиш кузатилади (21). Тамаки тутуни эпителий десквамацияси ва макрофаглар инфильтрациясини кучайтиради (Valavanidis, 2013). Россия морфологлари маълумотларига кўра, аэрополлютантлар таъсирида ўпка тўқимасида дистрофик ва склеротик ўзгаришлар ривожланади (10). Ўзбекистонда ўтказилган тадқиқотларда ҳам ўпка тўқимасида яллиғланиш ва микроциркуляция бузилишлари қайд этилган (11).

PM2.5 таъсирида тимусда кортикал зонада лимфоцитлар камайиши кузатилади (17). Россия тадқиқотларида токсик омиллар таъсирида тимус инволюцияси ва лимфоцитлар апоптози аниқланган (9). Лимфа тугунларида герминатив марказлар гиперплазияси кузатилади (15). СНГ олимлари лимфа тугунларида макрофаглар фаоллиги ошишини қайд этган (7). Ўзбекистон тадқиқотчилари лимфоид тўқималарда иммун қайта қурилиш жараёнлари юзага келишини таъкидлайди (13).

PM2.5 таъсирида оксидловчи стресс асосий механизм ҳисобланади (16). Россия олимлари бу жараёнда эркин радикаллар муҳим роль ўйнашини кўрсатган (6). Яллиғланиш цитокинлари ортиши хужайра шикастланишига олиб келади (15).

PM2.5 таъсирида эндотелиал дисфункция юзага келади (14). Россия тадқиқотларида капиллярлар дилатацияси ва қон стази қайд этилган (4). Бу ўзгаришлар гипоксия ва тўқима дистрофиясига олиб келади (14).

Адабиётлар таҳлили шуни кўрсатмоқдаки, PM2.5 ва тамаки тутунининг комбинацияланган таъсири организмда чуқур морфологик ва функционал ўзгаришларга олиб келади (18). Ўзбекистон, Россия ва халқаро тадқиқотлар натижалари бир-бирини тўлдириб, ушбу муаммонинг глобал ва долзарб эканлигини тасдиқлайди (1,8)

Адабиётлар рўйхати:

1. Абдуллаев А.А. Атмосфера ифлосланиши ва саломатлик. Тошкент, Фан; 2020. 150-152 б.
2. Боброва О.В. Аэрополлютанты и здоровье человека. Москва: Наука; 2018. С. 220-224.
3. Зайцева Н.В. Экологическая патология. Санкт-Петербург, 2016. СпецЛит; 2016. С. 250-256.
4. Зуфаров К.А. Микроциркуляция в норме и патологии. Ташкент: Фан; 2018. С. 175-180.
5. Каримов Х.Р. Иммун тизим патологияси. Тиббиёт нашриёти; 2019. 195-200 б.
6. Меньшикова Е.Б. Оксидативный стресс и антиоксидантная защита. Москва: Медицина; 2017. С. 235-240.
7. Пальцев М.А. Иммунология. Москва, 2014. ГЭОТАР-Медиа; 2014. С. 632-640.
8. Ревич Б.А. Загрязнение окружающей среды и здоровье населения. Москва, 2018. ГЭОТАР-Медиа; 2018. С. 298-304.
9. Сапин М.Р. Анатомия и иммунология. Москва, 2016. Медицина; 2016. С. 500-512.
10. Серов В.В. Патологическая анатомия. Москва, 2015. ГЭОТАР-Медиа; 2015. 880 с.
11. Турсунов Б.Т. Ўпка морфологияси. Тошкент, Янги аср авлоди; 2021. 175-180 б.
12. Чучалин А.Г. Болезни органов дыхания. Москва, 2017. ГЭОТАР-Медиа; 2017. С. 760-768.
13. Юсупов Ф.Ш. Лимфоид тўқималар тадқиқоти. Тошкент, 2020. Фан; 2020. 155-160 б.
14. Brook R.D., Rajagopalan S., Pope C.A. et al. Particulate matter air pollution and cardiovascular disease. *Circulation*. 2010;121(21): PP. 2331–2378.
15. Cohen A.J., Brauer M., Burnett R. et al. Estimates and 25-year trends of the global burden of disease attributable to ambient air pollution. *The Lancet*. 2017;389(10082): PP. 1907–1918.
16. Kelly F.J., Fussell J.C. Air pollution and oxidative stress. *Clinical-Experimental Allergy*. 2011;41(8): PP. 1059–1071.
17. Li R., Zhou R., Zhang J. Function of PM2.5 in the pathogenesis of lung diseases and immune dysfunction. *Environmental Research*. 2020; 182:109043
18. Pope C.A., Dockery D.W. Health effects of fine particulate air pollution: lines that connect. *Journal of the Air -Waste Management Association*. 2006;56(6): PP. 709–742.
19. Schraufnagel D.E. The health effects of air pollution. *European Respiratory Journal*. 2020;55(1):1902055.
20. World Health Organization. Air pollution and health. Geneva: World Health Organization; 2021. PP. 1–180.
21. Xu X., Yavar Z., Verdin M. et al. Effect of PM2.5 on lung injury and inflammation. *Toxicology Letters*. 2019; 305: PP.1–8.

Иқтибос учун: Файзиева Н.Ғ., Темирова Н.Р. PM2.5 ва тамаки тутунининг комбинацияланган таъсирида ички аъзолардаги морфологик ўзгаришлар // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси*. – 2026. – № 4(24). – Б. 692–694. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19659325>

ИНФОРМАЦИОННАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ИНДЕКСА НЕЙТРОФИЛЬНО-ЛИМФОЦИТАРНОГО СООТНОШЕНИЯ У БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ

Ярашев А.Р.¹, Эшонов О.Ш.², Нариманова Х.А.², Ахмедов Ж.А.², Машарипов С.А.³

¹Бухарский филиал Республиканского научно-экстренного медицинского центра,
г. Бухара, Узбекистан

²Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

³Хорезмский Филиал Республиканского Специализированного Научно-практического Медицинского Центра Онкологии и Радиологии, г. Ургенч, Узбекистан

Резюме. Актуальность. Наряду с современными методами нейровизуализации, такими как МСКТ и МРТ, успешное лечение пациентов с тяжелыми формами инсульта также зависит от лабораторных показателей. Цель: определить прогностическое значение индекса нейтрофильно-лимфоцитарного соотношения в исходе тяжелых заболеваний, вызванных ишемическим инсультом. Материалы и методы. В исследование включены 62 пациента с ишемическим инсультом в возрасте от 32 до 65 лет (средний возраст 56,3±3). Были проанализированы клинические (системные гемодинамические и респираторные параметры, неврологический статус), инструментальные (ЭКГ, рентгенография грудной клетки, МСКТ головного мозга) и лабораторные (лейкоциты, НЛИ) данные. Сравнение клинических и лабораторных параметров проводилось в три этапа: первый этап – при поступлении, второй этап – на 5-й день, третий этап – на 10-й день интенсивной терапии. Результаты. Высокий индекс соотношения нейтрофилов к лимфоцитам оказался надежным индикатором клинического ухудшения и предиктором неблагоприятных исходов у пациентов с ишемическим инсультом.

Ключевые слова: ишемический инсульт, нейтрофилы, лимфоциты, количество лейкоцитов, иммунная система.

INFORMATIONAL SIGNIFICANCE OF THE NEUTROPHIL-LYMPHOCYTE RATIO INDEX IN PATIENTS WITH ISCHEMIC STROKE

Yarashev A.R.¹, Eshonov O.Sh.², Narimanova H.A.², Akhmedov Zh.A.², Masharipov S.A.³

¹Bukhara Branch of the Republican Scientific and Emergency Medical Center, Bukhara, Uzbekistan

²Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sina, Bukhara, Uzbekistan

³Khorezm Branch of the Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Oncology and Radiology, Urgench, Uzbekistan

Resume. Relevance. Along with modern neuroimaging methods such as MSCT and MRI, successful treatment of critically ill patients with severe forms of stroke also relies on laboratory parameters. Study objective: to determine the prognostic value of the neutrophil-to-lymphocyte ratio (NLR) in the outcome of critical illnesses caused by ischemic stroke. Materials and methods. The study included 62 patients with ischemic stroke, aged 32 to 65 years (mean age 56.3±3). Clinical (systemic hemodynamic and respiratory parameters, neurological status), instrumental (ECG, chest X-ray, MSCT of the brain), and laboratory (leukocyte count, NLR) data were analyzed. Comparison of clinical and laboratory parameters was carried out in three stages: the first stage - upon admission, the second stage - the 5th day, the third stage - the 10th day of intensive care. Results. A high neutrophil-to-lymphocyte ratio was found to be a reliable indicator of clinical deterioration and a predictor of adverse outcomes in patients with ischemic stroke.

Keywords: ischemic stroke, neutrophils, lymphocytes, white blood cell count, immune system

ИШЕМИК ИНСУЛТ БИЛАН БЎЛГАН БЕМОРЛАРДА НЕЙТРОФИЛ-ЛИМФОЦИТ НИСБАТЛАРИ ИНДЕКСИНИНГ АХБОРОТ АҲАМИЯТИ

Ярашев А.Р.¹, Эшонов О.Ш.², Нариманова Х.А.², Ахмедов Ж.А.², Машарипов С.А.³

¹Республика шошилинич тиббий ёрдам илмий марказининг Бухоро филиали, Бухоро ш., Ўзбекистон

²Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

³Республика ихтисослаштирилган онкология ва радиология илмий-амалий тиббиёт марказининг Хоразм филиали, Урганч ш., Ўзбекистон

Резюме. Долзарблиги. МСКТ ва МРТ каби замонавий нейровизуализация усуллари билан бир қаторда, инсултнинг оғир шакллари билан оғриган беморларни муваффақиятли даволаш лаборато-

рия параметрларига ҳам боғлиқ. Тадқиқот мақсади: ишемик инсульт туфайли келиб чиққан оғир касалликлар натижасида нейтрофил-лимфоцитлар нисбат индекси прогностик қийматини аниқлаш. Материаллар ва усуллар. Тадқиқотга 32 ёшдан 65 ёшгача бўлган (ўртача ёши $56,3 \pm 3$) ишемик инсультга чалинган 62 бемор киритилган. Клиник (тизимли гемодинамик ва нафас олиш параметрлари, неврологик ҳолат), инструментал (ЭКГ, кўкрак қафаси рентгенографияси, миянинг МСКТ) ва лаборатория (лейкоцитлар сони, НЛИ) маълумотлари таҳлил қилинди. Клиник ва лаборатория параметрларини таққослаш уч босқичда амалга оширилди: биринчи босқич – бемор қабул қилинганда, иккинчи босқич - 5-кун, учинчи босқич - интенсив терапиянинг 10-куни. Натижалар. Юқори нейтрофил-лимфоцит нисбат индекси ишемик инсультга чалинган беморларда клиник ёмонлашувнинг ишончли кўрсаткичи ва салбий натижаларни башират қилувчи омил эканлиги аниқланди.

Калит сўзлар: ишемик инсульт, нейтрофиллар, лимфоцитлар, оқ қон ҳужайралари сони, иммун тизими.

e-mail: akmal-yarashev78@gmail.com, olim.eshonov@bsmi.uz

Введение: Известно, что у пациентов с ишемическим инсультом системный иммунный ответ имеет особенности и характеризуется лейкоцитозом в сочетании с относительной лимфопенией, дефицитом Т-клеточного звена иммунной системы [5,9] и активацией гуморального иммунного ответа с увеличением содержания в крови В-лимфоцитов (СВ19+, СВ20+), А, М, в и ЦИК [2,5]. Данный факт позволяет говорить о том, что характер изменений иммунного статуса при ишемическом инсульте имеет одинаковый вектор направленности, поэтому отдельные показатели иммунного статуса могут применяться в оценке прогноза течения и функционального исхода заболевания.

Нормальное функционирование иммунной системы является одним из определяющих условий адекватного состояния физиологических систем организма. Снижение иммунологической реактивности населения определяет особенности формирования течения и прогноза заболеваний, в том числе и неврологических больных [8,12]. Уменьшение числа лимфоцитов приводит к снижению резистентности организма к патогенным микроорганизмам и является важным проявлением иммунодефицита у критических пациентов [1]. Иммунологический мониторинг позволит разграничить быстро меняющиеся фазы прогрессирующего воспаления и тяжелой иммуносупрессии, что поможет улучшить результаты дифференцированной коррекции [4].

На сегодняшний день клиническая лабораторная медицина располагает огромным количеством методов ранней и точной диагностики большого числа заболеваний, динамического контроля за патологическим процессом. Количественный анализ лейкоцитарной формулы, является немаловажным методом исследования, имеющий диагностическое значение при критических состояниях. Тщательный анализ лейкоформулы позволяет судить о течение заболевания, о возникновении и выраженности воспалительных проявлений и эффективности проводимой терапии [3]. Наряду с современными методами нейровизуализации как МСКТ и МРТ, успешная терапия больных с критическим состоянием при тяжелых форм ОНМК, основывается к лабораторным показателям [7]. С целью объективизации оценки этих результатов в настоящее время предложен ряд индексов, позволяющих судить о течении патологического процесса в организме, в том числе – о выраженности воспалительных проявлений и эффективности проводимой терапии [11]. По мнению ряда авторов одним из таких показателей является индекс соотношения нейтрофилов к лимфоцитам (ИСНЛ) крови [6,10].

Исходя из всех перечисленных данных, можно утверждать, что аутоиммунное воспаление при острых повреждениях головного мозга, является одним из ключевых факторов, предопределяющих дальнейшее развитие и влияющих на исход заболевания. Но, несмотря на многочисленные исследования фокусированной в этой области медицины, на сегодняшний день нет единого мнения и рекомендаций на счет коррекции иммунного статуса у пациентах с острыми повреждениями головного мозга. В связи с этим, данная неопределенность определило цель нашего исследования.

Цель исследования: определить прогностическую значимость ИСНЛ в исходе критических состояний вызванных ишемическим инсультом.

Материал и методы: исследование проведено в отделение нейрореанимации Бухарского филиала РНЦЭМП. Объектами исследования явились 62 пациентов с ишемическим инсультом, возраст которых варьировал от 32 до 65 лет (средний возраст составлял $56,3 \pm 3$ лет), у которых исследованы клиничко-лабораторные данные. Мужчин было 38 (61,3%), женщин - 24 (38,7%). В исследование были включены пациенты с ишемическим (n=62). Первичная диагностика проводилась на основании клиничко-неврологических данных и результатах мультиспиральной компьютерной томографии (МСКТ). При оценке невростатуса по шкале комы Глазго (ШКГ) средний балл при поступлении в

стационар составлял $9,3 \pm 2,1$. По данным МСКТ больных ишемические очаги диагностировались в бассейне: среднемозговой артерии 48 (77,4%), переднемозговой артерии 3 (4,8%), заднемозговой артерии 4 (6,5%), а также вертебробазилярном бассейне 7 (11,3%).

Все больные получали консервативное лечение, по стандарту: включающее антибактериальную, противоотечную, мембраностабилизирующую, гемореологическую, церебропротекторную и симптоматическую терапию. При необходимости, по показаниям (коматозное состояние и при наличии признаков дислокации срединных структур на МСКТ) 14 больных были переведены на ИВЛ. Режимы и параметры вентиляции были подобраны индивидуально по тяжести соматического статуса и антропометрическим параметрам. Были проанализированы клинические (системные показатели гемодинамики и дыхания, неврологический статус), инструментальные (ЭКГ, рентгенография органов грудной клетки, МСКТ исследование головного мозга) и лабораторные данные (лейкоформула, ИСНЛ). Сопоставление клинических и лабораторных показателей была проведена в трех этапах: первый этап - при поступлении, второй этап: –5-е сутки, третий этап – 10 суток проводимой интенсивной терапии.

Результаты и их обсуждения: при анализе полученных данных неврологического статуса было выявлено, что при поступлении у всех обследованных больных уровень сознания по ШКГ была от 8 до 12 баллов (8 баллов $n=12$, 9 баллов $n=15$, 10 баллов $n=13$, 11 баллов $n=8$, 12 баллов $n=14$). Анализ показателей лейкоформулы данных больных показал, что средний показатель ИСНЛ было равно на $2,2 \pm 0,64$. На 2-м этапе исследования отмечалось увеличение числа больных с более глубоким нарушением невротатуса (по ШКГ: 8 баллов $n=14$, 9 баллов $n=18$, 10 баллов $n=14$, 11 баллов $n=10$, 12 баллов $n=6$). Данное ухудшение неврологического статуса скорее всего было связано и нарастанием отека головного мозга. Эти изменения были подтверждены методом нейровизуализации, где о нарастания отека мозга свидетельствовали сглаженность борозд, сужения базальных цистерн и желудочков мозга. У этих больных появились клинические данные прогрессирования отека мозга как артериальная гипертензия, склонность брадикардию, тахипноэ и беспокойства. В связи с этим, 14 больных были переведены на ИВЛ. В данной категории больных при анализе лейкоформулы отмечалось нарастание числа сегментоядерных нейтрофилов и снижение числа лимфоцитов, соответственно рост индекса их соотношения (более 3,8).

В динамике на фоне интенсивной терапии у 49 больных отмечалось клиническое улучшение, что было подтверждено полученными данными невротатуса 3-го этапа исследования (по ШКГ: 8 баллов $n=3$, 9 баллов $n=6$, 10 баллов $n=19$, 11 баллов $n=13$, 12 баллов $n=8$). При проведение МСКТ исследования отмечалось регресс прежней картины отека мозга: сглаженность борозд, сужение базальных цистерн и желудочков мозга отсутствовали. Пациенты которые находились на ИВЛ легко адаптировались респираторам и респираторная поддержка прекращались более ранние сроки интенсивной терапии. У этих больных отмечалось плавное снижение показателя ИСНЛ ниже 3,5 (рис.1).




Рисунок 1. Показатели ИСНЛ и ШКГ выздоровевшим больных с ишемическим инсультом

У больных с ухудшением невротатуса при динамическом наблюдении количество нейтрофилов увеличивалось, количество лимфоцитов соответственно уменьшалось и индекс ИСНЛ возрастал в динамике которое отражалось в прогрессирующем снижении суммарного балла по ШКГ (рис.2)., усугубление клинической картины и ухудшения общего состояние, отмечалось летальный исход.




Рисунок 2. Показатели ИСНЛ и ШКГ умерших больных с ишемическим инсультом

Из всех обследованных больных летальный исход наблюдался у 13 (21%) пациента с ишемическим инсультом. У этих больных отмечалось прогрессивное повышение среднего показателя ИСНЛ по сравнению с показателем первого этапа ($2,21 \pm 0,62$, $4,15 \pm 0,74$, $5,34 \pm 0,52$,) ($p < 0,05$). При анализе полученных данных была выявлена достоверная корреляционная связь между показателями лейкоформулы и общей летальности среди пациентов с ишемическим инсультом.

Заключение: Более высокий показатель ИСНЛ является достоверным показателем клинического ухудшения состояния пациентов и предиктором неблагоприятного исхода критических состояний вызванных ОНМК. По полученным результатам исследования можно предположить, что тщательное наблюдение изменений лейкоформулы даёт возможность прогнозирования течения и исхода ОНМК. Своевременно реагирование на изменения ИСНЛ даёт возможность корректировать проводимую терапию и может предупреждать возможные ухудшения состояния больных.

Список литературы:

1. Adrie C., Lugosi M., Sonnevile R., et al. OUTCOMEREA study group. Persistent lymphopenia is a risk factor for ICU-acquired infections and for death in ICU patients with sustained hypotension at admission. *Annals of Intensive Care*. 2017; 7: 30. DOI: 10.1186/s13613-017-0242-0.
2. Борщикова Т.И., Епифанцева Н.Н., Чурляев Ю.А. и др. Функциональный профиль цитокинов и иммунологическая дисфункция у нейрореанимационных больных // *Цитокины и воспаление*. 2011. Т. 10, № 2. С. 42-49.
3. Григорьев Е.В., Матвеева В.Г., Шукевич Д., Радивилко А.С., Великанова Е.А., Ханова М.Ю. Индуцированная иммуносупрессия в критических состояниях: диагностические возможности в клинической практике. *Бюллетень сибирской медицины*. 2019; 18 (1): 18–29
4. Ефимова Л.П., Винокурова Т.Ю. Информативность показателей периферической крови. *Вестник РУДН, серия Медицина*, 2008, № 8. стр 373-367.
5. Кашаева Л.Н. Иммунологические нарушения и роль их коррекции в профилактике пневмонии при церебральных инсультах: автореф. дис. ... канд. мед. наук. М., 2005. 21 с.
6. Крылов В.В., Петриков С.С., Талыпов А.Э., с соавт. Современные принципы хирургии тяжелой черепно-мозговой травмы. *Журнал им. Н.В. Склифосовского «Неотложная медицинская помощь»*. 2013;(4):39-47.
7. Кулюцина Е.Р. Лабораторные критерии прогнозирования течения и исхода черепно-мозговой травмы: Автореф. дисс. ... канд. мед. наук. — Саратов, 2004. — 23 с.
8. Лебедев. К. А. Иммунная недостаточность (выявление и лечение) /К.А. Лебедев. И.Д. Понякина. - Москва: Медицинская книга. Н. Новгород: Издательство НГМА. 2003. - 443 с.
9. Охтова Ф.Р. Ишемический инсульт и показатели клеточного и гуморального иммунитета (клинико-иммунологическое исследование): автореф. дис. ... канд. мед. наук. М., 2014. 29 с.
10. Сорокин И.Д., Афанасьев А.А., Малинина Д.А. Нейтрофильно-лимфоцитарное отношение у пациентов с синдромом множественной органной дисфункции. *Вестник анестезиологии и реаниматологии*, Том 16, № 3, 2019. Стр 91-92.

Для цитирования: Ярашев А.Р., Эшонов О.Ш., Нариманова Х.А., Ахмедов Ж.А., Машарипов С.А. Информационная значимость индекса нейтрофильно-лимфоцитарного соотношения у больных ишемическим инсультом // *Вестник фундаментальной и клинической медицины*. – 2026. – № 4(24). – С. 695–698. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19659436>

ЭНДОМЕТРИЙ ГИПЕРПЛАЗИЯСИДА КОМБИНАЦИЯЛАНГАН ЦИТОЛОГИК ТЕКШИРУВНИНГ ДИАГНОСТИК АҲАМИЯТИ

Олтибоева Б.Қ., Даминов Ф.А., Қудратова З.Э.

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Аёллар репродуктив саломатлигининг муҳим кўрсаткичларидан бири эндометрийнинг морфологик ҳолатидир. Эндометрий гиперплазияси (ЭГ) - бу бачадон ички қаватининг патологик ўсиши бўлиб, у кўпинча гормонлар мувозанатининг бузилиши, хусусан, эстроген гормонининг ортиқча ишлаб чиқилиши билан боғлиқ. Шунинг учун бундай ҳолатларни эрта аниқлаш ва тўғри таъхислаш аёллар ҳаётини сақлаб қолишда муҳим аҳамиятга эга. Комбинацияланган цитологик таҳлил (аспирацион цитология, эксфолиатив цитология ва биопсия асосидаги цитологик таҳлил) ёрдамида эндометридаги морфологик ўзгаришларни эрта аниқлаш имкониятлари баҳоланади.

Калит сўзлар: эндометрий гиперплазияси, атипик гиперплазия, цитологик текширув, комбинацияланган таъхис, эндометриал карсинома, гормонал дисбаланс, морфологик таҳлил, гинекологик патология.

DIAGNOSTIC SIGNIFICANCE OF COMBINED CYTOLOGICAL EXAMINATION IN ENDOMETRY HYPERPLASIA

Oltiboeva B.K., Daminov F.A., Kudratova Z.E.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. One of the important indicators of women's reproductive health is the morphological state of the endometrium. Endometrial hyperplasia (EG) is a pathological growth of the inner lining of the uterus, which is often associated with a hormonal imbalance, in particular, with an overproduction of the estrogen hormone. Therefore, early detection and correct diagnosis of such cases is important in saving women's lives. Morphological analysis of the endometrium using combined cytological analysis (aspiration cytology, exfoliative cytology and cytological analysis based on biopsy) opportunities for early detection of changes are evaluated.

Keywords: endometrial hyperplasia, atypical hyperplasia, cytological examination, combined diagnosis, endometrial carcinoma, hormonal imbalance, morphological analysis, gynecological pathology.

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ КОМБИНИРОВАННОГО ЦИТОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ГИПЕРПЛАЗИИ ЭНДОМЕТРИЯ

Олтибоева Б.Қ., Даминов Ф.А., Қудратова З.Э.

Самарқандский государственный медицинский университет, г. Самарқанд, Узбекистан

Резюме. Одним из важных показателей репродуктивного здоровья женщины является морфологическое состояние эндометрия. Гиперплазия эндометрия (ЭГ)-патологическое разрастание внутренней оболочки матки, которое часто обусловлено гормональным дисбалансом, в частности, чрезмерная выработка гормона эстрогена связанный с. Поэтому раннее выявление и правильная диагностика таких случаев важны для спасения жизни женщин. Оцениваются возможности раннего выявления морфологических изменений эндометрия с помощью комбинированного цитологического анализа (аспирационная цитология и цитологический анализ на основе биопсии).

Ключевые слова: гиперплазия эндометрия, атипическая гиперплазия цитологическое исследование, комбинированный диагноз, рак эндометрия, гормональный дисбаланс, морфологический анализ, гинекологическая патология;

Ҳозирги даврда аёллар репродуктив саломатлигини сақлаш масаласи тиббиётнинг энг долзарб йўналишларидан биридир. Айниқса, бачадон шиллиқ қавати(эндометрий) гиперплазияси ва унинг атипик шакллари аёллар орасида кенг учраб,бепошлиқ,хайз сиклининг бузилиши ва энг хавфлиси - бачадон танаси саратонинг ривожланиш хавфи билан бевосита боғлиқдир.Соънги йилларда гормонал мувозанатининг бузилиши, метаболик синдром,семизлик ва кеч репродуктив ёшда ҳомиладорликнинг камайиши натижасида эндометрий патологияларининг учраш частотаси ортиб бормоқда.Shu сабабли эрта таъхислаш ва тўғри дифференциалдиагностика ўтказиш аёллар соғлигини сақлашда муҳим аҳамият касб этмоқда [8,9,10].

Эндо метрий гиперплазиясининг асосий сабаби гормонал дисбаланс, яъни эстроген гормонининг нисбатан ортиши ва прогестерон етишмовчилиги ҳисобланади. Бундан ташқари, тухумдон дисфункцияси, поликистоз тухумдон синдроми, семизлик, гипертония, диабет, жигар касалликлари, шунингдек, узоқ муддатли эстроген терапияси ҳам ушбу ҳолатни келтириб чиқариши мумкин.[11,12].

Патогенез жараёнида эндо метрий хужайраларининг пролиферацияси ортади. Эстроген гормони таъсирида базал ва функционал қатлам хужайралари кўпаяди, прогестероннинг етарли бўлмаслиги эса бу жараёни чеклай олмайди. Натижада эндо метрий қалинлашади, безлар сони ортади, стромада ўзгаришлар рўй беради. Бу эса баъзан атипик ўзгаришларга олиб келиб, саратон олди ҳолатни юзага келтиради.

Клиник белгилар касаллик шаклига боғлиқ ҳолда турлича бўлиши мумкин. Асосий симптомлар қуйидагилардан иборат:

- Ҳайз циклининг бузилиши (узайган ёки қисқариб қолган ҳайзлар);
- Бачадондан оралик қон кетиш;
- Постменопауза даврида қон келиши;
- Бепуштлиқ ёки ҳомиладор бўлолмаслик;
- Қорин пастида оғриқ ёки ноқулайлик ҳисси [13,14,15].

Замонавий диагностика усулларида қуйидаги усуллар қўлланилади:

- Трансвагинал ультратовуш текшируви (ТУТ) - эндо метрий қалинлигини аниқлаш учун;
- Гистероскопия - бачадон бўшлигини визуал баҳолаш имконини беради;
- Биопсия ва гистологик текширув - хужайра тузилмасини аниқлаш учун;
- Гормонал фонни текшириш (эстроген, прогестерон, ЛГ, ФСГ);
- Цитологик текширувлар ва лаборатор таҳлиллар.

Эндо метрий гиперплазиясини қуйидаги касалликлардан дифференциал диагностика қила бириш керак:

- Эндо метрий полипи;
- Субмукозали миома;
- Эндо метрий карсиномаси;
- Гормонал дисбаланс натижасидаги функционал қон кетишлар [16,17].

Сўнги йилларда тадқиқотлар орқали цитологик усуллар- эндо метрий ҳолатини баҳолашда кам инвазив, хавфсиз ва информатив йўналиш эканлиги ҳамда, комбинацияланган ёндашув (яъни оддий ПаП-тест, суюқликда асосланган цитология ва иммуноцитокимёвий усулларни биргаликда қўллаш) патологик хужайраларни эрта аниқлаш имконини беради. Айниқса, атипик гипоплазияда хужайра ядроси ва цитоплазмасидаги ўзгаришларни аниқ баҳолашда бу усулларнинг самарадорлиги Пап-тестининг эндо метрий гиперплазиясидаги ўрни:

Пап-тести (Папаниколау тести) асосан бачадон бўйни патологияларини аниқлаш учун қўлланилади. Бироқ айрим ҳолларда Пап-тест препаратларида эндо метрий хужайраларининг аниқланиши мумкин бўлиб, бу эндо метрий патологияларига шубҳа уйғотади. [12-13]

Пап-тестида ЭГ га хос белгилар:

- Безли эндо метрий хужайраларининг кўпайиши;
- Ядро-цитоплазма нисбатининг ўзгариши;
- Ядро гиперхромияси;
- Хужайраларнинг гуруҳ-гуруҳ бўлиб жойлашиши.

Пап-тест скринг усул сифатида ЭГ ни тўлиқ тасдиқламаса-да, хавф гуруҳидаги аёлларда (40 ёшдан катта, метроррагиялар билан) муҳим огоҳлантирувчи аҳамиятга эга.

Цитологик текширув усуллари. Эндо метрий цитологияси бачадон бўшлиғидан аспирация ёки махсус чўтка (бруш) ёрдамида олинган материал асосида амалга оширилади.

Афзалликлари:

- Кам инвазив;
- Такрорий қўллаш имконияти;
- Амбулатор шароитда бажарилиши;

Камчиликлари:

- Атипик ва атипиясиз гиперплазияни аниқ дифференциаллаш қийин;
- Гистологияга нисбатан сезгирлиги паст.

Цитологик текширув кўпинча Пап-тести ва бошқа инструментал усуллар билан комбинацияда қўлланилади. [18,19].

Иммуноцитокимёвий усуллар. Иммуноцитокимёвий (ИСК) текширувлар хужайра даражасида пролиферация ва малигн трансформация белгиларини аниқлашда муҳим аҳамиятга эга.

Асосий маркерлар:

- Ки-67 - ҳужайра пролиферация фаоллигини баҳолайди;
- p53 - генетик барқарорлик бузилишини кўрсатади;
- ПТЕН - тумор супрессор ген, атипик гиперплазияда пасаяди;
- ЭР ва ПР -эстроген ва прогестерон рецепторлари.

ИСК усуллари айниқса атипик эндометрий гиперплазиясини аниқлашда юқори диагностик қийматга эга бўлиб, цитологик ва ҳистологик ҳулосаларни аниқлаштиришга ёрдам беради.

Морфометрик ва рақамли таҳлил усуллари. Морфометрия эндометрий безлари ва стромаси нисбатини, безлар шакли ва зичлигини рақамли кўрсаткичлар орқали баҳолаш имконини беради. [20,21].

Афзалликлари:

- Субъективликни камайтиради;
- Диагностика аниқлигини оширади;
- Илмий тадқиқотларда қулай.

Бу усул иммуноцитокимёвий маркерлар билан бирга қўлланганда юқори диагностик самарадорликка эга.

Инструментал диагностика усуллари:

1. УТТ (ультратовуш текшируви);
 - Эндометрий қалинлашишини аниқлаш;
 - Постменопаузада >5 мм патологик.
2. Гистероскопия
 - Эндометрийни визуал баҳолаш;
 - Мақсадли биопсия олиш имконияти.
3. Эндометрий биопсияси
 - “Олтин стандарт” диагностика усули;
 - Ҳистологик текширув орқали якуний ташхис қўйилади.

Комбинацияланган диагностик ёндашув. Замонавий тиббиётда эндометрий гиперплазиясини аниқлашда комбинацияланган ёндашув энг самарали ҳисобланади.

Рар-тести, цитология, иммуноцитокимёвий маркерлар ва инструментал усулларни биргаликда қўллаш:

- Эрта ташхисни таъминлайди;
- Атипик шаклларни аниқлаш имконини оширади;
- Даволаш тактикасини тўғри танлашга ёрдам беради.

Цитологик текширувлар эндометрийнинг морфологик ҳолатини баҳолашда тезкор, кам инвазив ва иқтисодий жиҳатдан мақбул усул ҳисобланади. Бироқ, фақат стандарт цитологик таҳлил билан чекланиш баъзан аниқ ташхис қўйишда этарли бўлмайди. Шунинг учун комбинацияланган цитологик усуллар -яъни классик цитологияни иммуноцитокимёвий ва морфометрия билан уйғунлаштириш зарур. [7,15]

Мазкур илмий мақоланинг аҳамиятли томони шундаки, комбинацияланган цитологик текширув натижалари гистологик текширув билан юқори даражада мос келиши, бу эса уларни амалиётга кенг жорий этиш имконини беради. Тадқиқот натижалари асосида диагностика аниқлиги ошади, беморларга тўғри ва ўз вақтида даволаш чораларини қўллаш имкони яратилади [22,23].

Шу боис, эндометрий гиперплазияси аёллар репродуктив саломатлиги учун муҳим клиник аҳамиятга эга касалликдир. Унинг эрта диагностикаси ва тўғри даволаш усуллари қўллаш бачадон саратони ривожланиш хавфини камайтиради. Профилактик тадбирлар ва мунтазам кўриклар ушбу касаллиكنинг олдини олишда энг самарали воситадир. [20,21]

Шундай қилиб, эндометрий гиперплазияси ва унинг атипик шаклларида комбинацияланган цитологик усуллар қўлланилиб, цитоморфологик ва иммуномаркер ўзгаришлар тизимли таҳлил қилинади. Ушбу ёндашув эндометрийнинг атипик жараёнларини эрта босқичда аниқлаш имконини беради. Шунингдек гинекологик текширувларда қўллаш учун тавсия этилиши мумкин бўлиб, диагностик жараёни такомиллаштириш ҳамда онкологик жараёнларнинг олдини олишда ва даволаш тактикасини тўғри белгилашда муҳим аҳамият касб этади.

Шунингдек, комбинацияланган цитологик текширув усули эндометрий гиперплазияси ва атипик гиперплазияни эрта ташхислашда самарали скрининг усули сифатида қўлланилиши мумкин. Ушбу усул орқали аёллар репродуктив саломатлигини муҳофаза қилиш, саратонигача бўлган жараёнларни аниқлаш ва индивидуал терапия тактикаси белгилаш имкони яратилиши мумкин. [9,18]

Шундай қилиб, эндометрий гиперплазиясини эрта аниқлаш ва дифференциал ташхислашда Пап-тести, цитологик, иммуноцитокимёвий ва инструментал усуллар муҳим ўрин тутди. Айниқса иммуноцитокимёвий маркерларнинг жорий этилиши диагностиканинг аниқлиги ва ишончлигини сезиларли даражада оширди. Ушбу усулларни комплекс қўллаш эндометрий саратони ривожланишининг олдини олишда муҳим аҳамият касб этади. [24,25].

Адабиётлар рўйхати:

1. Курман Р.Ж., Норрис Х.Ж. Эндометриал гиперплазия ва карсинома. Ам Ж Сург Патҳол. 2021. 5-6 б.
2. Муттер Г.Л., Заино Р.Ж. Эндометриал интраэпителиал неоплазия: Диагностика мезонлари. Мод Патҳол. 2020. 10-11 б.
3. ЖССТнинг Аёллар репродуктив органлари ўсмаларининг таснифи. 5-нашр, 2020. 18-21 б.
4. Соловёва Э.В. ва бошқалар. Эндометриал гиперплазиянинг морфологик диагностикаси. Гинекология. 2022. 23 б.
5. Петрова А.А. Атипик эндометриал гиперплазияда иммунохистохимёвий маркерлар. Москва, 2023. 20 б.
6. Ўзбекистон Республикаси соғлиқни сақлаш вазирлиги. Гинекологик касалликларни ташхислаш протоколи, 2024. 14-8 б.
7. Каримова М.Т. Эндометрий касалликларида хужайра ўзгаришлари. ТТА Илмий журнали, 2023. 16 б.
8. Новак Э.Р., Вудруфф Ж.Д. Гинекологик ва акушерлик патологияси. Сондерс, 2021 йил. 5-24 б.
9. Миллер К., Срум С.П. Диагностик гинекологик ва акушерлик патологияси. Элсевиер, 2020. 9-20 б.
10. Султонова Д.Н. Аёллар ва эндокрин гиперплазиялар. Тошкент, 2024 йил. 16-23 б.
11. Зуев В.М. Эндоген морфология ва клиник хусусиятлар. Санкт-Петербург: 2016-256. 6 - 21 б.
12. Иванова Т.А. Эндометриал гиперплазия диагностикасининг замонавий жиҳатлари // Тиббий алманах. 2018.-№ 4.П. 7-16 б.
13. Киселев В.И. Эндометриал гиперплазиянинг молекуляр механизмлари. -М.:Наука, 2020. 4-5 б.
14. Кулаков В.И. Прилепская В.Н. Гинекология бўйича қўлланма. ГЕОТАР-Медиа, 2019.13-14 б.
15. Лебедева Н.И. Аёллар репродуктив тизими касалликларининг цитологик диагностикаси //Клиник цитология.2016. 22 б.
16. Макаров И.О. Эндометриал патологиянинг комплекс диагностикаси //Амалий тиббиёт. -2020.-№ 6.П.15-19 б.
17. Назаренко Т.А. Эндометриумнинг гормонга боғлиқ касалликлари. -М.:МИА, 2017.2-24 б.
18. Новикова Е.Г. Розаркурсти цитологияси эндометриал гиперплазияни эрта ташхислашда // Онкогинекология. 2019. № 1.П.10-8 б.
19. Орлова Е.А. Цитологик ва гистологик усулларни қиёсий баҳолаш // Лаборатория диагностикаси.2021.№5. 25 б.
20. Петров А.Б.Клтник цитология.- М.: Тиббиёт, 2018. -8-13 б.
21. Роговская С.И. Гинекологиядан саратонгача бўлган жараёнлар. -ГЕОТАР-Медиа, 2016. Москва. 11-24 б.
22. Серов В.Н. Эндометриал гиперплазияни ташхислашнинг замонавий ёндашувлари //Акушерлик ва гинекология .2020 .-№ 8. 35-20 б.
23. Смирнова Л.М. Бирлаштирилган цитологик тадқиқот усуллари //Тиббий амалиёт. - 2019. -№ 10.П. 9-14 б.
24. Тихомиров А.Л. Эндометриум касалликлари. Москва: -МЕД пресс-информ, 2017.- 18-19 б.
25. Хачатрян А.Г. Эндометриал гиперплазияда цитологиянинг диагностика қиймати // Онкология масалалари.2021. -№ 4.-П. 24-31 б.

Иқтибос учун: Олтибоева Б.Қ., Даминов Ф.А., Қудратова З.Э. Эндометрий гиперплазиясида комбинацияланган цитологик текширувнинг диагностика аҳамияти // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2026. – № 4(24). – Б. 699–702. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19659587>

СЕНСОНЕВРАЛ ОҒИРҚУЛОҚЛИК БИЛАН КАСАЛЛАНГАН БОЛАЛАРДА КОМПЛЕКС БУЗИЛИШЛАРНИНГ ДИАГНОСТИКА ВА ЭШИТИШНИ ПРОТЕЗЛАШГА ТАЪСИРИ

Нормирова Н.Н.¹, Бойназарова Н.Т.¹, Сафарова Н.И.², Бойназаров С.А.¹

¹Тошкент давлат тиббиёт университети Термиз филиали, Термиз ш., Ўзбекистон

²Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Турли даражадаги сенсоневрал оғирқулоқлик билан хасталанган болаларда комплекс бузилишлар тузилмаси ва қўшимча патологиянинг эшитиш бузилишини таъхислаш ва эшитишни протезлашга таъсири ўрганилди. Аниқланишича, сенсоневрал оғирқулоқлик билан хасталанган болаларнинг 38.9 % ида марказий нерв тизими, кўриш, таянч-ҳаракат аппарати, юрак-қон томир, нафас олиш, сийдик ажратиш, ҳазм қилиш, эндокрин ва бошқа тизимларда турли қўшимча патологиялар мавжуд. Комплекс бузилишлари бўлган болаларда оғирқулоқликнинг генетик омилли изоляцияланган оғирқулоқлик билан хасталанган болаларга нисбатан анча кам учрайди. Комплекс бузилишлари бўлган болаларда эшитишни протезлашнинг кечроқ амалга оширилиши сурдолог шифокорларнинг эҳтиёткор ёндашуви ҳамда ушбу жараённинг мураккаблиги билан боғлиқ.

Калим сўзлар: болаларда сенсоневрал оғирқулоқлик, комплекс бузилишларни таъхислаш, эшитишни протезлаш.

IMPACT OF COMPLEX DISORDERS ON DIAGNOSIS AND HEARING PROSTHESIS IN CHILDREN WITH SENSORINEURAL HEARING DEFENSE

Normirova N.N.¹, Boynazarova N.T.¹, Safarova N.I.², Boynazarov S.A.¹

¹Tashkent State Medical University Termiz branch, Termiz, Uzbekistan

²Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. The structure of complex disorders in children with varying degrees of sensorineural hearing loss and the impact of additional pathology on the diagnosis of hearing loss and hearing prosthesis were studied. It was found that 38.9% of children with sensorineural hearing loss have various additional pathologies in the central nervous system, vision, musculoskeletal system, cardiovascular, respiratory, urinary, digestive, endocrine and other systems. In children with complex disorders, the genetic factor of deafness is much less common than in children with isolated deafness. The late implementation of hearing prosthesis in children with complex disorders is due to the cautious approach of audiologists and the complexity of this process.

Keywords: sensorineural hearing loss in children, diagnosis of additional disabilities, amplification.

ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ НАРУШЕНИЙ НА ДИАГНОСТИКУ И СЛУХОПРОТЕЗИРОВАНИЕ У ДЕТЕЙ С СЕНСОНЕВРАЛЬНОЙ ТУГОУХОСТЬЮ

Нормирова Н.Н.¹, Бойназарова Н.Т.¹, Сафарова Н.И.², Бойназаров С.А.¹

¹ Термезский филиал Ташкентского государственного медицинского университета, г. Термез, Узбекистан

²Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Была изучена структура комплексных нарушений у детей с различной степенью сенсоневральной тугоухости и влияние сопутствующей патологии на диагностику тугоухости и слухопротезирование. Установлено, что у 38,9% детей с сенсоневральной тугоухостью имеются различные сопутствующие патологии центральной нервной системы, зрения, опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой, дыхательной, мочевыделительной, пищеварительной, эндокринной и других систем. У детей со сложными нарушениями генетический фактор глухоты встречается гораздо реже, чем у детей с изолированной глухотой. Позднее внедрение слуховых протезов у детей со сложными нарушениями обусловлено осторожным подходом аудиологов и сложностью этого процесса.

Ключевые слова: сенсоневральная тугоухость у детей, диагностика комплексных нарушений, слухопротезирование

e-mail: nnarmirova@gmail.com

Ишнинг долзарблиги. Сенсоневрал оғиркулоқлик (СНО) бўлган болаларда кўшимча касалликлар (КК) мавжудлиги ҳамда уларнинг эшитиш йўқолишини аниқлаш ёши ва эшитиш аппаратлари билан таъминлаш муддатига таъсири ўрганилди. Аниқланишича, СНО бўлган болаларнинг 38.9 % ида турли хил кўшимча касалликлар мавжуд — марказий нерв тизими патологияси (жумладан, аклий ривожланишнинг орқада қолиши, аутизм, диққат етишмовчилиги), кўриш, ҳаракат ва артикуляция бузилишлари, шунингдек юрак-қон томир, нафас олиш, сийдик ажратиш, ҳазм қилиш ва эндокрин тизим касалликлари ва бошқалар. Ушбу болаларнинг 61.1% ида 2–3 та кўшимча касалликлар биргаликда учрайди. Кўшимча касалликларнинг энг кўп учрайдиган комбинатсияси марказий нерв тизими ва ҳаракат тизими патологиялари билан боғлиқ бўлиб, генетик омиллар кўшимча касалликлари бўлган болаларда фақат СНО билан касалланган болаларга нисбатан камроқ аниқланган.

Эшитиш йўқолишининг 4 ойликдан олдин аниқланиши кўшимча касалликлари бўлган болалар гуруҳида кам учраган. Бунинг эҳтимолий сабаби шундаки, бундай болаларнинг аксарияти неонатал реаниматсия бўлимида даволанган ва умумий янги туғилган чақалоқлар эшитиш скрининги дастурларидан ўта олмаган. Бундан ташқари, СНО ушбу болаларда кейинчалик, кўшимча касалликлар ёки уларни даволаш натижасида ривожланиши мумкин. Эшитишда нуқсони бўлган болаларга ёрдам кўрсатиш тизимининг муҳим таркибий қисми кўшимча патологияни аниқлаш ҳисобланади, бу унинг юқори учраш частотаси билан изоҳланади. Ушбу муаммога бўлган қизиқиш соғлиқни сақлаш тизими ривожланиши натижасида чала туғилган болаларнинг яшаб қолиш кўрсаткичлари ошгани билан боғлиқ. Масалан, 1990 йилда гестациянинг 25-ҳафтасидан олдин туғилган болаларнинг яшаб қолиш эҳтимоли жуда паст бўлган бўлса, 2010 йилга келиб 28 ҳафтагача чала туғилган болаларнинг 95% и яшаб қолган, шунингдек 25 ҳафтагача туғилган болаларнинг ярмидан кўпи тирик қолган [2, 3]. Туғилиш вақтида жуда паст тана вазнига эга бўлган чала туғилган болаларнинг 40% ида комплекс бузилишлар (КБ) ривожланади: эшитиш пасайиши, кўриш бузилишлари, буйрак, нафас йўллари ва марказий нерв тизими патологиялари.

Муаммонинг генетик жиҳати яхши ўрганилган бўлиб, бир қатор синдромлар таркибида эшитиш бузилишлари кузатилади [3–6]. Эшитиш бузилиши билан кечадиган 400 дан ортиқ генетик синдромлар аниқланган [5]. Синдромал эшитиш бузилишлари прелингвал оғиркулоқлик ҳолатларининг 30% гача қисмини ташкил қилиб, кўриш, тери қоплами, бириктирувчи тўқима, ҳаракат тизими, аклий ривожланиш бузилишлари ва бошқалар билан бирга кузатилади [4–6].

Эшитиш патологияси бўлган болаларда турли кўшимча бузилишларнинг учраш частотасини микдорий баҳолашга бағишланган тадқиқотлар кўп ўтказилганига қарамадан, уларнинг натижаси бир хил эмас. Масалан, J. Meizen-Derr ва ҳаммуаллифлар тадқиқотида кохлеар имплантат (КИ) қўйилган ва кўшимча касалликлари бўлган болаларда 75 % ҳолатда когнитив бузилишлар, 60% да ҳаракат бузилишлари, 32% да артикуляцион моторика бузилишлари, 25% да кўриш бузилишлари, 8% да аутизм спектри бузилишлари аниқланган [6].

А.Г. Кисина тадқиқотида «мураккаб ривожланиш нуқсони» эшитиш пасайиши бўлган болаларнинг 37,4% ида аниқланган [4, 7]. Бунда болаларнинг 75,4% ида марказий нерв тизими (МНТ) патологияси, 14% ида кўриш бузилишлари, 5,3% ида юрак-қон томир тизими касалликлари, 2,6% ида эндокрин тизим зарарланиши, 1,8% ида онкологик касалликлар, 0,9% ида қон касалликлари аниқланган. Болаларнинг 23,7% ида учтадан ортиқ тизим зарарланганлиги қайд этилган. Шунингдек, комплекс бузилишлар ўғил болаларда қиз болаларга нисбатан 2,5 баробар кўпроқ учраши аниқланган. Ривожланиш нуқсонлари, жумладан эшитиш бузилишлари бўлган болаларда комплекс бузилишлар муаммосига дефектология соҳасида катта эътибор қаратилади. Бу коррекцион таълим муассасаларида ўқув-тарбиявий жараёни тўғри ташкил этиш ва болаларнинг индивидуал хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда реабилитация усулларини ишлаб чиқиш зарурати билан боғлиқ [7–9].

Ушбу тадқиқотлар Л.С.Виготский концепциясига асосланган бўлиб, унга кўра эшитиш нуқсони бўлган болада дефект мураккаб тузилишга эга ва у нутқ, идрок, хотира, тафаккур ҳамда эмоционал-иродавий жараёнларнинг иккиламчи бузилишларига олиб келиши мумкин. Шу билан бирга, коррекцион педагогикада болада келиб чиқишига кўра бир нечта бирламчи бузилишлар мавжуд бўлиши мумкинлиги ҳақида тасаввур шаклланган. Бу бузилишлар 2 ёки 3 та касалликнинг оддий йиғиндиси эмас, балки ўзига хос комплекс бузилишни ҳосил қилади. Тадқиқотлар маълумотларига кўра, коррекцион таълим муассасаларига қатнаётган қар ва заиф эшитувчи болаларнинг 20—35% ида марказий нерв тизими етишмовчилиги билан боғлиқ бирламчи психосоматик ривожланиш кечикиши кузатилади, 3—3,5% ида эса церебрал фалаж аниқланган [7, 9, 10].

Умуман олганда, ушбу маълумотлар эшитиш нуқсони бўлган болаларнинг нисбатан чекланган танлови асосида олинган. Шунингдек, ушбу танловларнинг муайян ўзига хослиги ҳақида ҳам гапириш мумкин. Биринчидан, эшитиш пасайиши енгил даражада бўлган кўплаб болалар умумтаълим ва логопед муассасаларга қатнайди. Иккинчидан, коррекцион муассасаларда қар оналар фарзандлари улуши юқори. Бундан ташқари, эшитиш бузилишлари бошқа турдаги коррекцион муассасаларга қатнаётган болаларда ҳам (масалан, ҳаракат бузилишлари бўлган болаларда) аниқланади [10].

Ишнинг мақсади — турли даражадаги сенсоневрал оғирқулоқлик (СНО) билан хасталанган болаларда комплекс бузилишлар тузилмасини таҳлил қилиш, шунингдек қўшимча касалликларни ташхис қўйиш ёши ва эшитишни протезлашга таъсирини ўрганиш.

Материал ва тадқиқот усуллари. Тадқиқотда 3 ойдан 18 ёшгача бўлган, сурункали сенсоневрал оғирқулоқликка билан хасталанган 158 нафар боланинг (73 нафар ўғил бола, 85 та қиз бола) амбулатор карталари ретроспектив таҳлил қилинди. Барча беморлар Термиз ВБКТМ поликлиникасида диспансер назоратда туришган.

Таҳлилга 2024 йил сентябридан 2026 йил мартгача мурожаат қилган болаларнинг амбулатор карталари киритилди. Танлов эшитиш пасайишининг турли даражалари бўйича болалар сонининг пропорционал нисбати асосида шакллантирилди.

Натижалар ва уларнинг муҳокамаси

Амбулатор карталар таҳлили давомида СНО бўлган болаларда қуйидаги ҳамроҳ патологик гуруҳлари ажратилди:

1. Марказий нерв тизими патологияси;
2. Ҳаракат бузилишлари;
3. Кўриш бузилиши;
4. Сийдик ажратиш тизими патологияси;
5. Ошқозон-ичак тракти патологияси;
6. Юрак-қон томир тизими патологияси;
7. Юқори нафас йўллари патологияси;
8. Юз-жағ аномалиялари;
9. Бачадон ичи инфекциялари;
10. Дизартрия;
11. Бириктирувчи тўқима тизимли касалликлари (жумладан, мукополисахаридоз);
12. Эндокрин патологиялар.

Ушбу касалликлар болаларнинг 39 % ида (62 та бемор) аниқланди. Олинган натижалар, умумий ҳолда, эшитишда бузилишлар бўлган болаларда комплекс бузилишлар (КБ) учраш частотаси тахминан 40% ни ташкил этишини кўрсатган кўплаб тадқиқотлар маълумотлари билан мос келади. Бу кўрсаткич таҳлил қилинган танловларни саралаш мезонлари ҳамда қўшимча бузилишлар сифатида ҳисобга олинган ҳолатлар фарқига қарамасдан деярли бир хилдир. Хусусан, ушбу тадқиқотда турли даражадаги сурункали СНО бўлган болалар ҳисобга олинган бўлса, А.Г. Кисина ва Л.С.Виготский тадқиқотларида [7, 10] эса турли тур ва даражадаги эшитиш бузилишлари ва эмоционал-иродавий жараёнлар бўлган болалар ўрганилган.

Ушбу маълумотларнинг коррекцион муассасаларда ўтказилган тадқиқотлар натижалари [9] билан сезиларли фарқ қилиши бир неча омиллар билан изоҳланиши мумкин. Биринчидан, кохлеар имплантатсия ва инклюзив таълим ривожланиши натижасида изоляцияланган эшитиш бузилиши бўлган болаларнинг оммавий мактабларда таълим олиши ортиб бормоқда, шу билан бирга коррекцион мактабларда комплекс бузилишлари бўлган болалар улуши ошмоқда [10].

Иккинчидан, эшитиш нуқсони бўлган болаларда қўшимча бирламчи интеллектуал, нутқий ва коммуникатив бузилишларни аниқлаш муаммоси мавжуд, чунки эшитиш бузилиши болада барча психосоматик жараёнларнинг иккиламчи бузилишларига олиб келади [11]. Шунингдек, қўшимча психосоматик бузилишларни ҳисобга олиш масаласи ҳам мураккабдир. Масалан, «аутизм спектри бузилишлари» ташхиси психиатр томонидан қўйилади, аммо сурдологик марказларда психиатр штати мавжуд эмас. Бундан ташқари, ота-оналар кўп ҳолларда шифокор тавсиясига қарамасдан психиатрга мурожаат қилмасликлари ёки текширув натижаларини сурдологик марказга тақдим этмасликлари кузатилади.

Учинчидан, тиббий ёндашувга кўра, эшитиш патологияси бўлган болаларда қўшимча бузилишлар таркибига барча орган ва тизимлар касалликлари киритилади, педагогик ёндашув эса асосан боланинг таълимига кўпроқ таъсир кўрсатувчи бузилишларни (МНТ, ҳаракат тизими, кўриш) аниқлашга қаратилган.

Шуни айтиш мумкинки, комплекс бузилишларнинг асосий қисми МНТ патологияси ва ҳаракат бузилишлари ҳиссасига тўғри келади. 41% ҳолатда битта ҳамроҳ касаллик, 39% ҳолатда иккита, 20% ҳолатда эса оғирқулоқликдан ташқари учта қўшимча касаллик аниқланган. Энг кўп учрайдиган комбинация — МНТ патологияси ва ҳаракат бузилишлари (26%).

Эшитиш нуқсони бўлган болаларда бирламчи нутқий бузилишларни аниқлаш алоҳида муаммо ҳисобланади. Ушбу тадқиқотда, [6] маълумотларига нисбатан, артикуляцион моторика бузилишлари улуши пастроқ бўлди. Бу эса маҳаллий амалиётда дизартрия ва бошқа нутқий бузилишларни эшитиш патологияси бўлган болаларда мустақил ташхис сифатида қўйишга эҳтиёткорона ёндашув билан изоҳланади. Бундан ташқари, [5] тадқиқотида кохлеар имплантатга эга болалар иштирок этган бўлиб, уларда эшитиш-нутқий қабул қилиш ривожланиши жараёнида нафақат оғир, балки енгил артикуляция бузилишларини ҳам аниқлаш осонроқ бўлади.

Тадқиқотда ўрганилган болалар танловида оғирқулоқлик даражаси билан қўшимча патологиянинг мавжудлиги ёки мавжуд эмаслиги ўртасида корреляция аниқланмади ($p>0,05$). Шунингдек, ўғил ва қиз болалар ўртасида комплекс бузилишлар (КБ) учраш частотасида ишончли фарқлар ҳам кузатилмади ($p>0,05$).

Қўшимча патологияси бўлган болаларда эшитиш бузилишини аниқлаш кечроқ амалга оширилади, деган тахминни текшириш мақсадида эшитув ташхисини қўйишнинг ўртача ёши баҳоланди. Маълум бўлишича, КБ бўлган болаларда бу кўрсаткич бироз юқорироқ — $49,9\pm 41,4$ ой (минимал ёш — 2 ой, максимал — 168 ой), қўшимча касалликлари бўлмаган болаларда эса $47,0\pm 47,4$ ой (минимал — 1 ой, максимал — 180 ой) бўлган, бироқ бу фарқ ишончли эмас ($p>0,05$).

Бироқ қўшимча патологияси бўлмаган болалар орасида эшитиш бузилиши 4 ойгача аниқланган ҳолатлар анча кўп — 31,7%, КБ бўлган болаларда эса бу кўрсаткич атиги 6,8% ни ташкил этди ($p<0,001$). Шу билан бирга, КБ бўлган болаларда эшитиш бузилиши кўпроқ 5—36 ой оралиғида аниқланади. Бу ҳолатни шу билан изоҳлаш мумкинки, ҳаётнинг илк ойларида КБ бўлган кўплаб болалар интенсив терапия бўлимларида даволанади ва у ерда аудиологик скрининг ҳар доим ҳам ўтказилмайди.

Бу ҳолат янги туғилган чақалоқларда аудиологик скрининг протоколига мувофиқ боланинг эшитишини поликлиника шароитида қайта текшириш муҳимлигини тасдиқлайди [5, 11]. Бундан ташқари, ҳаётнинг дастлабки икки йилида ота-оналар ва шифокорлар эътибори асосан оғир соматик касалликларни даволашга қаратилган бўлади, эшитиш реакциялари ва нутқ ривожланишининг кечикиши эса марказий нерв тизими патологияси ва унинг йетишмовчилигининг ривожини билан изоҳланади. Шунингдек, ушбу болаларда эшитиш пасайиши кейинчалик, соматик касалликларни даволаш фонидида ривожланиши эҳтимолини ҳам истисно қилиб бўлмайди.

Бу фикрни қўллаб-қувватловчи далил сифатида, аудиологик скринингнинг мусбат натижаси (отоакустик эмиссия қайд этилмаган ҳолатлар) КБ бўлган болаларда (47%) КБ бўлмаган болаларга (67%) нисбатан камроқ учраши келтирилади, бироқ бу фарқ ишончли эмас ($p>0,05$). Ушбу маълумотлар ҳаётнинг биринчи йилида эшитиш пасайиши ривожланадиган болаларни аниқлаш мақсадида 1 ёшда аудиологик скрининг ўтказиш зарурлигини кўрсатади. Шунингдек, эшитиш бузилишини аниқлаш ёшига таъсир қилувчи турли омилларни чуқур таҳлил қилиш сурдологик ёрдам самарадорлигини ошириш учун муҳимдир.

Эшитиш бузилиши бўлган болаларда КБнинг эшитишни протезлаш жараёнига таъсирини ўрганиш мақсадида эшитиш протезлаш тури ва ёши таҳлил қилинди. 158 нафар болани қамраб олган тадқиқот гуруҳида болаларнинг 61,9 % эшитиш аппаратлари (ЭА) ва кохлеар имплантатлардан (КИ) фойдаланган, 38,1% болалар эса эшитишни протезлаш воситаларидан фойдаланмаган.

Кўп ҳолларда булар бир томонлама оғирқулоқлик ёки икки томонлама 1-даражали оғирқулоқлик билан ҳасталанган болалар бўлган. Шунингдек, эшитиши анча пасайган айрим болаларда ҳам ота-оналарнинг истамаслиги сабабли эшитиш аппаратларидан фойдаланилмаган. Одатда бундай ҳолатлар ҳар икки ота-онаси ҳам қар бўлган оилаларда учрайди.

Эшитиш аппаратлари ва кохлеар имплантатлардан фойдаланувчи болалар сони бўйича гуруҳлар ўртасида ишончли фарқ аниқланмади ($p>0,05$). Гуруҳлар ўртасида эшитиш аппаратлари (ЭА) ва кохлеар имплантатлардан (КИ) фойдаланувчи болалар сони бўйича фарқлар ишончли эмаслиги аниқланди ($p>0,05$). Бироқ, КБ бўлган болаларда СНО ташхиси қўйилган вақт билан эшитиш протезлаш ўртасидаги давр изоляцияланган эшитиш бузилиши бўлган болаларга нисбатан ўртача 10 ойга узунроқ эканлиги аниқланди ($p>0,05$).

Шу тариқа, КБ бўлган болаларда эшитиш протезлаш анча кеч ёшда амалга оширилиши ҳақидаги тахмин тасдиқланди. Бу ҳолат эҳтимолан сурдолог шифокорларнинг бундай болаларда

эшитиш протезлашга нисбатан эҳтиёткор ёндашуви ҳамда ушбу жараённинг мураккаблиги билан боғлиқдир.

Хулоса. Сенсонеурал оғирқулоқлик билан хасталанган бўлган болаларнинг 39% ида турли орган ва тизимларнинг қўшимча бузилишлари аниқланди. Комплекс бузилишлари бўлган болаларнинг 61% ида оғирқулоқликдан ташқари 2–3 та қўшимча касаллик учрайди. Энг кўп учрайдиган комбинация — марказий нерв тизими патологияси ва ҳаракат бузилишлари (27.1%). Тадқиқотда оғирқулоқлик даражаси билан қўшимча патологиянинг мавжудлиги ўртасида корреляция аниқланмади. Шунингдек, ўғил ва қиз болалар ўртасида комплекс патология учраш частотасида ишончли фарқлар кузатилмади. Комплекс бузилишлари бўлган болаларда оғирқулоқликнинг генетик омили изоляцияланган оғирқулоқлик бўлган болаларга нисбатан анча кам учради (12,1% ва 36%).

Қўшимча патологияси бўлмаган болаларда эшитиш бузилиши 4 ойгача бўлган ёшда қўшимча патологияси бўлган болаларга нисбатан кўпроқ аниқланади. Комплекс бузилишлари бўлган болаларда эшитиш протезлаш кечроқ амалга оширилиши тасдиқланди, бу эса эшитиш-нутқ реабилитацияси натижаларига салбий таъсир кўрсатади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Gallaudet Research Institute. Regional and national summary report of data from the 2007-08 annual survey of deaf and hard of hearing children and youth. Washington, DC: Author; 2008.
2. Petrou S, Henderson J, Bracewell M, Hockley C, Wolke D, Marlow N, EPICure Study Group. Pushing the boundaries of viability: the economic impact of extreme preterm birth. *Early Human Development*. 2006;82(2):77-84. <https://doi.org/10.1016/j.earlhumdev.2006.01.002>
3. Toriello HV, Reardon W, Gorlin RJ, eds. *Hereditary Hearing Loss and Its Syndromes*. New York: Oxford University Press; 2004.
4. Eliot SA, Hildebrand MS, Smith RJH. *Hereditary Hearing Loss and Deafness Overview*. Accessed August 19, 2019. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK1434>
5. Markova TG, Megrelishvili SM, Zaitseva NG, Lantsov AA. *Klinicheskoe i molekulyarno-geneticheskoe issledovanie sindroma Vaardenburga. Vestnik otorinolaringologii*. 2003;1:17. (In Russ.)
6. Meizen-Derr J, Wiley S, Grether S, Choo DI. *Language performance in children with cochlear implants and additional disabilities. Laryngoscope*. 2010;120(2):405-413. <https://doi.org/10.1002/lary.20728>
7. Кисина А.Г. Ранняя диагностика тугоухости и глухоты у де-тей и их реабилитация: дисс. ... канд. мед. наук. М. 2013. Kisina AG. Rannyyaya diagnostika tugoukhosti i glukhoty u detei i ikh reabilitatsiya: diss. ... kand. med. nauk. M. 2013. (In Russ.)
8. Выготский Л.С. Основы дефектологии. СПб: Лань; 2003. Vygotsky LS. *Osnovy defektologii*. SPb: Lan; 2003. (In Russ.)
9. Жигорева М.В. Психолого-педагогическое изучение развития детей с комплексными нарушениями. Монография. М.: РИЦ МГТУ им. М.А. Шолохова; 2009.
10. Королева И.В. Реабилитация глухих детей и взрослых после кох-леарной и стволомозговой имплантации. СПб: КАРО; 2016.
11. Таварткиладзе Г.А., Гвелесиани Т.Г., Цыганкова Е.Р. Раннее выявление и коррекция нарушений слуха у детей первых лет жизни. Методическая разработка. М. 2011.

Иқтибос учун: Нормирова Н.Н., Бойназарова Н.Т., Сафарова Н.И., Бойназаров С.А. Сенсонеурал оғирқулоқлик билан касалланган болаларда комплекс бузилишларнинг диагностика ва эшитишни протезлашга таъсири // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси*. – 2026. – № 4(24). – Б. 703–707. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19659710>

**ГЕМОДИАЛИЗДАГИ БОЛАЛАРДА ОҒИЗ БЎШЛИҒИ МУҲИТИ ВА СЎЛАК
КЎРСАТКИЧЛАРИНИНГ СТОМАТОЛОГИК ҲОЛАТГА ТАЪСИРИ
(АДАБИЁТЛАР ТАҲЛИЛИ)**

Рахмонова Ш.Р., Норова М.Б.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Мазкур мақолада гемодиализ муолажаси олаётган болаларда оғиз бўшлиғи муҳити ва сўлак кўрсаткичларининг стоматологик ҳолатга таъсири бўйича замонавий илмий адабиётлар таҳлили келтирилган. Сурункали буйрак етишмовчилиги фонида кузатиладиган метаболик ва иммунологик бузилишлар сўлак безлари фаолиятига салбий таъсир кўрсатиб, сўлак ажралиши камайиши, унинг буферлик қобилияти пасайиши ва биокимёвий таркибининг ўзгаришига олиб келади. Бу ўзгаришлар оғиз бўшлиғи муҳитининг бузилишига, микробиоценоз дисбалансига ва тиш қаттиқ тўқималари резистентлигининг пасайишига сабаб бўлади. Адабиётлар таҳлили натижалари гемодиализдаги болаларда сўлак кўрсаткичлари ва стоматологик касалликлар ўртасида узвий боғлиқлик мавжудлигини кўрсатади ҳамда комплекс диагностик ва даволаш ёндашувларини ишлаб чиқиш зарурлигини асослайди.

Калим сўзлар: сўлак, оғиз бўшлиғи муҳити, гемодиализ, сурункали буйрак етишмовчилиги, болалар стоматологияси, рН, буферлик қобилияти, сўлак секрецияси, микробиоценоз

**THE IMPACT OF ORAL ENVIRONMENT AND SALIVARY PARAMETERS ON DENTAL
STATUS IN CHILDREN UNDERGOING HEMODIALYSIS (LITERATURE REVIEW)**

Rakhmonova Sh.R., Norova M.B.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. This article presents a review of current scientific literature on the impact of the oral environment and salivary parameters on dental status in children undergoing hemodialysis. In chronic kidney disease, metabolic and immunological disturbances lead to reduced salivary secretion, altered buffering capacity, and changes in biochemical composition. These alterations contribute to disruption of oral microbiocenosis, decreased resistance of hard dental tissues, and increased susceptibility to dental diseases. The literature review confirms a strong relationship between salivary parameters and oral health status in this patient group and highlights the need for comprehensive diagnostic and therapeutic approaches.

Keywords: saliva, oral environment, hemodialysis, chronic kidney disease, pediatric dentistry, pH, buffering capacity, salivary flow, oral microbiocenosis

**ВЛИЯНИЕ СРЕДЫ ПОЛОСТИ РТА И ПОКАЗАТЕЛЕЙ СЛЮНЫ НА
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС У ДЕТЕЙ НА ГЕМОДИАЛИЗЕ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)**

Рахмонова Ш.Р., Норова М.Б.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. В статье представлен анализ современных научных данных о влиянии среды полости рта и показателей слюны на стоматологический статус у детей, находящихся на гемодиализе. Установлено, что при хронической почечной недостаточности метаболические и иммунологические нарушения приводят к снижению секреции слюны, изменению её буферной способности и биохимического состава. Эти изменения способствуют нарушению микробиоценоза полости рта, снижению резистентности твердых тканей зубов и развитию стоматологических заболеваний. Анализ литературы подтверждает наличие тесной взаимосвязи между показателями слюны и состоянием полости рта у данной категории пациентов, а также необходимость разработки комплексных диагностических и лечебных подходов.

Ключевые слова: слюна, среда полости рта, гемодиализ, хроническая почечная недостаточность, детская стоматология, рН, буферная способность, слюноотделение, микробиоценоз

e-mail: norova.mavjuda@bsmi.uz

Кириш. Сўнгги йилларда сурункали буйрак етишмовчилиги (СБЕ) билан оғриган болалар сонининг ортиши тиббиётнинг турли соҳаларида, хусусан, болалар стоматологиясида янги илмий муа-

ммоларни юзага келтирмоқда. Гемодиализ муолажаси ушбу беморлар ҳаётини сақлаб қолишда муҳим аҳамиятга эга бўлса-да, у организмдаги кўплаб патогенетик ўзгаришларни тўлиқ бартараф этмайди. Бу ўзгаришлар орасида оғиз бўшлиғи муҳити ва сўлак тизимида кузатиладиган бузилишлар алоҳида ўрин тутати.

Сўлак оғиз бўшлиғининг асосий биологик муҳити сифатида тиш қаттиқ тўқималари ва шиллик қават ҳолатини сақлашда муҳим роль ўйнайди. У нафақат механик тозалаш функциясини бажаради, балки минерал алмашинувни таъминлайди, буферлик қобиляти орқали кислотали таъсирларни нейтраллайди ҳамда антибактериал ҳимояни амалга оширади. Шу сабабли сўлак миқдори ва таркибидаги ҳар қандай ўзгаришлар оғиз бўшлиғи муҳитининг бузилишига ва стоматологик касалликлар ривожланишига олиб келади [1.2.4].

Сурункали буйрак етишмовчилиги фонида организмда юзага келадиган метаболик, гормонал ва иммунологик бузилишлар сўлак безлари фаолиятига бевосита таъсир кўрсатади. Айниқса, уремик интоксикация, кальций-фосфор алмашинувининг бузилиши, оксидловчи стресс ва иммун тизим дисфункцияси сўлак секрециясининг камайиши ва унинг физик-кимёвий хусусиятларининг ўзгаришига сабаб бўлади. Бу ҳолатлар оғиз бўшлиғида қуруқлик (ксеростомия), буферлик қобилятнинг пасайиши ва микробиоценоз таркибининг ўзгариши билан намоён бўлади [3.5].

Гемодиализ муолажаси ҳам сўлак тизимида икки томонлама таъсир кўрсатади. Бир томондан, у организмдан токсик моддаларни чиқариш орқали умумий ҳолатни яхшилашга хизмат қилади. Иккинчи томондан эса, диализ жараёнида сув-электролит мувозанатининг ўзгариши, микроэлементлар йўқотилиши ва биологик фаол моддаларнинг камайиши кузатилади. Бу ўзгаришлар сўлак таркиби ва унинг ҳимоя функцияларига салбий таъсир кўрсатиб, оғиз бўшлиғи муҳитининг барқарорлигини издан чиқаради [4.6.7].

Адабиёт маълумотларига кўра, гемодиализдаги болаларда сўлак секрецияси пасайиши, унинг рН кўрсаткичи ўзгариши ва буферлик қобилятининг камайиши тез-тез учрайди. Бу ҳолатлар тиш эмали деминерализациясига, микроб биофлораси тўпланишига ва яллиғланиш жараёнларининг ривожланишига олиб келади. Шу билан бирга, сўлак таркибидаги кальций, фосфор, мочевино ва бошқа биокимёвий компонентлар нисбати ўзгариши ҳам тиш қаттиқ тўқималари резистентлигига таъсир кўрсатади [6.7.8].

Микробиоценоз нуқтаи назаридан қаралганда, сўлак таркибидаги ўзгаришлар оғиз бўшлиғидаги микрофлора мувозанатининг бузилишига сабаб бўлади. Натижада шартли-патоген микроорганизмлар фаоллашиб, кариес ва пародонт касалликларининг ривожланиши учун қулай шароит яратилади. Айниқса, *Streptococcus mutans* ва *Candida* туркумига мансуб микроорганизмлар колонизациясининг ортиши гемодиализдаги болаларда тез-тез қайд этилади [2.4.8].

Шу билан бирга, сўлак кўрсаткичлари нафақат стоматологик ҳолатнинг акс этувчиси, балки диагностика аҳамиятга эга биологик муҳит сифатида ҳам қаралади. Сўлакнинг рН кўрсаткичи, буферлик қобиляти, секреция тезлиги ва биокимёвий таркиби тиш қаттиқ тўқималари ҳолати билан узвий боғлиқ бўлиб, уларни комплекс баҳолаш стоматологик касалликларни эрта аниқлаш имконини беради.

Бироқ мавжуд илмий тадқиқотларнинг таҳлили шуни кўрсатадики, гемодиализдаги болаларда оғиз бўшлиғи муҳити ва сўлак кўрсаткичларини комплекс ўрганишга бағишланган ишлар етарлича тизимли эмас. Айниқса, сўлак параметрлари ва стоматологик ҳолат ўртасидаги боғлиқликни чуқур таҳлил қилиш, шунингдек, улар асосида диагностик ва профилактик ёндашувларни ишлаб чиқиш масалалари долзарб бўлиб қолмоқда.

Шу нуқтаи назардан, гемодиализ муолажаси олаётган болаларда оғиз бўшлиғи муҳити ва сўлак кўрсаткичларининг стоматологик ҳолатга таъсирини ўрганиш, мавжуд илмий маълумотларни тизимлаштириш ва уларни клиник амалиётга татбиқ этиш имкониятларини баҳолаш мазкур обзор мақола-нинг асосий мақсади ҳисобланади.

Сурункали буйрак етишмовчилиги билан оғриган болаларда сўлак безлари фаолиятида юзага келадиган ўзгаришлар оғиз бўшлиғи муҳити бузилишининг энг муҳим ва етакчи патогенетик звеноларидан бири ҳисобланади. Замонавий илмий тадқиқотлар шуни кўрсатадики, гемодиализ муолажаси олаётган болаларда сўлак секрециясининг пасайиши деярли барча ҳолатларда кузатилади ва бу ҳолат клиник жиҳатдан ксеростомия, яъни оғиз бўшлиғида қуруқлик ҳисси билан намоён бўлади. Ксеростомия нафақат субъектив ноқулайлик туғдиради, балки оғиз бўшлиғининг физиологик барқарорлигини таъминловчи механизмларнинг издан чиқишига олиб келади.

Маълумки, сўлак оғиз бўшлиғининг табиий ҳимоя тизимида марказий ўрин тутати. У тиш юзаларини механик тозалаш, микроб биофлорасини юйиб ташлаш, минерал алмашинувни таъминлаш ҳамда буферлик функция орқали кислотали муҳитни нейтраллаштириш каби муҳим вазифаларни ба-

жаради. Шу сабабли сўлак секрециясининг камайиши ушбу барча ҳимоя механизмларининг бир вақтнинг ўзида заифлашишига олиб келади. Натижада тиш юзасида микроб биоплёнкаси тез ва кўп миқдорда тўпланади, патоген ва шартли-патоген микроорганизмлар фаоллашади ҳамда кариес ва пародонт касалликлари ривожланиши учун қулай шароит юзага келади [9.10].

СБЕ шароитида сўлак секрециясининг пасайиши кўп омилли жараён бўлиб, унинг шаклланишида бир нечта патогенетик механизмлар иштирок этади. Аввало, уремик интоксикация шароитида организмда тўпланадиган токсик метаболитлар сўлак безлари паренхимасига тўғридан-тўғри зарарловчи таъсир кўрсатади ва уларнинг секретор функциясини сусайтиради. Шу билан бирга, гемодиализ орасидаги даврда беморларда суюқлик қабул қилиш чекланган бўлиши натижасида организмда умумий дегидратация ҳолати юзага келади, бу эса сўлак ажралишига салбий таъсир кўрсатади. Бундан ташқари, бундай беморларда кенг қўлланиладиган дори воситалари, хусусан антигипертензив препаратлар ва диуретиклар ҳам сўлак секрециясини камайтирувчи омиллардан бири ҳисобланади. Айрим ҳолларда автоном нерв тизимидаги функционал бузилишлар ҳам сўлак безлари иннервациясини издан чиқариб, секреция жараёнини янада сусайтиради [2.11.12].

Гемодиализ сеанслари билан боғлиқ ҳолда кузатиладиган суюқлик танқислиги сўлак секрециясининг янада камайишига сабаб бўлади. Бу ҳолат оғиз бўшлиғи муҳитининг барқарорлигини жиддий равишда бузиб, микробиоценоз мувозанатининг издан чиқишига ва патоген жараёнларнинг тезлашишига олиб келади. Шу тариқа, сўлак секрециясининг пасайиши нафақат маҳаллий, балки системали ўзгаришларнинг клиник ифодаси сифатида намоён бўлади [13.15].

Сўлакнинг сифат кўрсаткичлари ҳам гемодиализдаги болаларда сезиларли даражада ўзгаради. Айниқса, сўлакнинг рН кўрсаткичи ва буферлик қобилияти оғиз бўшлиғи муҳитининг барқарорлигини таъминловчи асосий омиллардан ҳисобланади. Нормал ҳолатда сўлакнинг рН кўрсаткичи нейтралга яқин бўлиб, бу ҳолат тиш эмали учун оптимал ҳимоя муҳитини яратади. Бироқ СБЕ шароитида сўлак таркибида мочевино миқдорининг ошиши натижасида аммиак ҳосил бўлади ва бу оғиз муҳитининг ишқорий томонга силжишига олиб келади [3.16.17].

Бир қарашда ишқорий муҳит кариес ривожланишига қарши омил сифатида баҳоланиши мумкин, чунки кислотали деминерализация жараёнлари секинлашади. Бироқ амалда бу жараён анча мураккаб бўлиб, буферлик қобилиятининг пасайиши ҳал қилувчи аҳамиятга эга. Сўлакнинг буферлик қобилияти ташқи кислотали таъсирларни нейтраллаштириш имкониятини таъминлайди. Унинг пасайиши оғиз муҳитининг барқарорлигини кескин камайтиради ва ҳатто ишқорий муҳит шароитида ҳам деминерализация жараёнлари фаоллашиши мумкин [5.13].

Буферлик қобилиятининг пасайиши натижасида оғиз бўшлиғида кислотали таъсирлар узокроқ сақланади, бу эса тиш эмалида минерал моддаларнинг йўқотилишига олиб келади. Шу билан бирга, реминерализация жараёнлари учун зарур бўлган шароитлар етарли даражада таъминланмайди. Кальций ва фосфор ионларининг сўлакдаги нисбати ўзгариши ҳам ушбу жараённи кучайтиради. Кальций миқдорининг камайиши эмалнинг қайта тикланиш қобилиятини пасайтиради, фосфор миқдорининг ошиши эса минерал мувозанатни бузади.

1-жадвал.

СБЕда сўлак кўрсаткичларининг ўзгариши (адабиётлар таҳлили асосида)

Кўрсаткич	Норма	Гемодиализда
Сўлак секрецияси	0,5–1,0 л/мин	↓ камайган
рН	6,8–7,2	ўзгарувчан (ишқорий томонга силжиш)
Буферлик қобилияти	юқори	↓ пасайган
Кальций	меъёрда	↓ камайган
Фосфор	меъёрда	↑ ошган

Шу тариқа, сўлак секрециясининг камайиши, рН кўрсаткичининг ўзгариши ва буферлик қобилиятининг пасайиши бир-бири билан чамбарчас боғлиқ ҳолда оғиз бўшлиғи муҳитининг барқарорлигини издан чиқаради. Бу жараёнлар натижасида тиш қаттиқ тўқималари резистентлиги пасаяди, деминерализация жараёнлари устунлик қилади ва стоматологик касалликлар ривожланиши учун қулай шароит юзага келади.

Сурункали буйрак етишмовчилиги шароитида сўлак таркибидаги биокимёвий компонентларнинг ўзгариши оғиз бўшлиғи муҳитидаги бузилишларнинг янада чуқурлашишига олиб келади. Сўлак нафақат механик ҳимоя воситаси, балки тиш қаттиқ тўқималари учун асосий минерал манба ҳисобланади. Шу сабабли унинг таркибидаги ҳар қандай ўзгаришлар тиш эмали ва дентиннинг ҳолатига бевосита таъсир кўрсатади.

Адабиётлар таҳлили шуни кўрсатадики, гемодиализдаги болаларда сўлак таркибида кальций ва фосфор алмашинуви жиддий бузилади. Кальций ионларининг миқдори камайиши тиш эмалининг реминерализация қобилиятини сезиларли даражада пасайтиради. Нормал ҳолатда сўлак эмал юзасида минералларнинг қайта тўпланишини таъминлайди, аммо СБЕ шароитида ушбу механизм самарадорлиги кескин пасаяди. Бу эса эмал структурасининг заифлашишига ва унинг ташқи таъсирларга нисбатан барқарорлигининг камайишига олиб келади [16.17].

Фосфор миқдорининг ошиши эса минерал мувозанатни издан чиқаради. Кальций ва фосфор нисбатининг ўзгариши эмал кристалл тузилишининг бузилишига сабаб бўлиб, унинг механик муштаҳкамлигини камайтиради. Натижада эмал юзасида микродефектлар пайдо бўлади, бу эса кариес ва некариоз шикастланишлар ривожланиши учун қулай шароит яратади.

СБЕ шароитида сўлакда мочевина миқдорининг ортиши ҳам муҳим аҳамиятга эга. Мочевина оғиз бўшлиғидаги микроорганизмлар таъсирида аммиакка парчаланади ва муҳитнинг ишқорий томонга силжишига сабаб бўлади. Бир қарашда бу ҳолат кислотали деминерализация жараёнларини чеклаши мумкин, аммо аммиакнинг юқори концентрацияси тўқималарга токсик таъсир кўрсатиб, шиллиқ қават ва тиш атрофидаги тўқималар ҳолатини ёмонлаштиради. Шу билан бирга, бу ҳолат микрофлора таркибининг ўзгаришига ҳам таъсир кўрсатади.

Сўлак таркибидаги оксиллар ва ферментлар миқдоридаги ўзгаришлар ҳам муҳим патогенетик аҳамиятга эга. Айниқса, антибактериал ҳимояда иштирок этувчи компонентлар — лизоцим, лактоферрин ва секретор иммуноглобулин А миқдорининг камайиши оғиз бўшлиғидаги табиий иммун ҳимояни сусайтиради. Бу ҳолат патоген микроорганизмларнинг назоратсиз кўпайишига шароит яратади.

Натижада оғиз бўшлиғида микробиоценоз мувозанати бузилади. Соғлом ҳолатда оғиз бўшлиғи микрофлораси мувозанатлашган экотизим бўлиб, у ерда турли микроорганизмлар ўзаро рақобат ва симбиоз ҳолатида мавжуд бўлади. Бироқ СБЕ ва гемодиализ шароитида сўлак таркиби ва секрециясининг ўзгариши ушбу мувозанатни издан чиқаради.

Адабиётларда қайд этилишича, гемодиализдаги болаларда кариесоген микроорганизмлар, хусусан *Streptococcus mutans* ва *Lactobacillus* турларининг миқдори сезиларли даражада ортиши кузатилади. Бу бактериялар кислоталар ҳосил қилиш хусусиятига эга бўлиб, тиш эмали деминерализациясини тезлаштиради. Шу билан бирга, *Candida* туркуми замбуруғларининг кўпайиши ҳам тез-тез қайд этилади, бу эса шиллиқ қават касалликлари ва кандидоз ривожланиши хавфини оширади [15.17].

Анаэроб микроорганизмлар улушининг ортиши эса пародонт тўқималарида яллиғланиш жараёнларининг кучайишига сабаб бўлади. Бу ҳолат гингивит ва пародонтитнинг ривожланишига олиб келади ва уларнинг сурункали кечишига замин яратади. Шу тариқа, микробиоценоздаги ўзгаришлар нафақат кариес, балки пародонт касалликлари патогенезида ҳам муҳим роль ўйнайди.

2-жадвал.

СБЕда оғиз микрофлорасидаги ўзгаришлар

Микроорганизм	Ўзгариш
<i>Streptococcus mutans</i>	↑ ортиши
<i>Lactobacillus</i>	↑ ортиши
<i>Candida</i> spp.	↑ ортиши
Анаэроб бактериялар	↑ ортиши

Сўлак кўрсаткичлари ва стоматологик ҳолат ўртасидаги боғлиқликни таҳлил қилиш шуни кўрсатадики, ушбу ўзгаришлар ўзаро чамбарчас боғлиқ бўлиб, бир-бирини кучайтиради. Сўлак секрециясининг камайиши микроб биофлёнкиси тўпланишини кучайтиради, биокимёвий таркибнинг ўзгариши эса тиш эмали резистентлигини пасайтиради, микробиоценоз бузилиши эса патологик жараёнларнинг ривожланишини тезлаштиради.

Айниқса, болаларда ушбу жараёнлар янада тез ва оғир кечади, чунки уларда тиш қаттиқ тўқималари ҳали тўлиқ шаклланмаган бўлади. Бу ҳолат эмал гипоплазияси, гиперсезувчанлик ва кариеснинг эрта пайдо бўлишига олиб келади. Шу сабабли гемодиализдаги болалар стоматологик жиҳатдан юқори хавф гуруҳига киритилади [16.17].

Шу тариқа, сўлак таркибидаги биокимёвий ўзгаришлар ва микробиоценоз бузилиши оғиз бўшлиғи муҳитининг барқарорлигини издан чиқаради ва стоматологик касалликлар ривожланишида ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлган мураккаб патогенетик занжирни шакллантиради. Бу ҳолат бундай беморларда стоматологик диагностика, профилактика ва даволашда сўлак кўрсаткичларини ҳисобга олган ҳолда комплекс ёндашувни талаб қилади.

Муҳокама. Келтирилган адабиётлар таҳлили натижалари шуни кўрсатадики, сурункали буйрак етишмовчилиги ва гемодиализ шароитида оғиз бўшлиғи муҳитида кузатиладиган ўзгаришлар кўп омилли ва ўзаро боғлиқ патогенетик жараёнлар натижасида шаклланади. Ушбу ўзгаришларнинг марказида сўлак тизимидаги функционал ва биокимёвий бузилишлар ётади. Сўлак секрециясининг пасайиши, унинг физик-кимёвий кўрсаткичларининг ўзгариши ҳамда таркибидаги биологик фаол моддалар миқдорининг камайиши оғиз бўшлиғи муҳофаза механизмларининг заифлашишига олиб келади [5.11].

Адабиётларда таъкидланишича, гемодиализдаги беморларда сўлак секрециясининг камайиши ва буферлик қобилятининг пасайиши кариес ва пародонт касалликлари ривожланишининг асосий омилларидан бири ҳисобланади. Ушбу тадқиқотларда келтирилган маълумотлар бизнинг таҳлилларимиз билан уйғун бўлиб, сўлак кўрсаткичларидаги ўзгаришлар стоматологик ҳолатга бевосита таъсир кўрсатишини тасдиқлайди [12.16].

Сўлакнинг рН кўрсаткичидаги ўзгаришлар ҳам муҳим аҳамиятга эга бўлиб, у оғиз муҳитининг умумий барқарорлигини белгилайди. Ишқорий томонга силжиш айрим ҳолларда деминерализация жараёнларини чеклаши мумкин бўлса-да, буферлик қобилятининг пасайиши туфайли ушбу химоя механизми самарадорлиги камаёди. Натижада оғиз муҳити ташқи таъсирларга нисбатан сезгир бўлиб қолади ва патологик жараёнлар ривожланиши осонлашади.

СБЕ шароитида сўлак таркибидаги кальций, фосфор ва бошқа минерал компонентлар нисбатининг бузилиши тиш қаттиқ тўқималари резистентлигининг пасайишига олиб келади. Бу ҳолат эмал гипоплазияси, гиперсезувчанлик ва кариес каби патологик ҳолатлар шаклланишининг асосий сабабларидан бири ҳисобланади. Шу билан бирга, сўлак таркибидаги иммунологик омиллар камайиши оғиз бўшлиғидаги микробиоценоз мувозанатининг бузилишига сабаб бўлади.

Микробиоценоз нуқтаи назаридан қаралганда, гемодиализдаги болаларда патоген ва шартли-патоген микроорганизмлар улушининг ортиши кузатилади. Бу ҳолат кариесоген ва пародонтопатоген микрофлоранинг фаоллашишига олиб келади. Адабиётларда келтирилган маълумотлар *Streptococcus mutans*, *Lactobacillus* ва *Candida* турларининг кўпайиши стоматологик касалликлар ривожланишида муҳим роль ўйнашини тасдиқлайди.

Шу билан бирга, кўплаб муаллифлар сўлак кўрсаткичларини диагностик аҳамиятга эга биологик муҳит сифатида баҳолайди. Сўлакнинг рН, буферлик қобиляти, секреция тезлиги ва биокимёвий таркибини комплекс баҳолаш стоматологик касалликларни эрта аниқлаш ва уларнинг ривожланиш хавфини прогноз қилиш имконини беради. Бу эса клиник амалиётда индивидуаллаштирилган ёндашувларни қўллаш зарурлигини асослайди.

Шу тариқа, адабиётлар таҳлили натижалари гемодиализдаги болаларда оғиз бўшлиғи муҳити ва сўлак кўрсаткичларидаги ўзгаришлар стоматологик касалликлар патогенезида ҳал қилувчи аҳамиятга эга эканини кўрсатади. Бу ҳолат бундай беморларда профилактика ва даволаш чора-тадбирларини ишлаб чиқишда сўлак тизимида алоҳида эътибор қаратиш зарурлигини яна бир бор тасдиқлайди.

Хулоса. Адабиётлар таҳлили натижаларига кўра, сурункали буйрак етишмовчилиги ва гемодиализ шароитида болаларда сўлак секрециясининг пасайиши, рН ва буферлик қобилятининг ўзгариши оғиз бўшлиғи муҳитининг барқарорлигини бузади ва стоматологик касалликлар ривожланишига олиб келади.

Сўлак таркибидаги биокимёвий компонентлар, жумладан кальций ва фосфор мувозанатининг бузилиши тиш қаттиқ тўқималари минерализациясининг издан чиқишига сабаб бўлиб, эмал гипоплазияси ва кариес ривожланиши хавфини оширади.

Сўлакдаги иммунологик омиллар камайиши ва микробиоценоз мувозанатининг бузилиши натижасида кариесоген ва пародонтопатоген микроорганизмлар фаоллашади, бу эса оғиз бўшлиғида яллиғланиш ва деструктив жараёнларнинг кучайишига олиб келади.

Сўлак кўрсаткичлари стоматологик ҳолатнинг муҳим диагностик индикатори бўлиб, уларни комплекс баҳолаш стоматологик касалликларни эрта аниқлаш ва профилактика чораларини ишлаб чиқишда катта аҳамиятга эга.

Гемодиализдаги болаларда стоматологик ёрдам кўрсатишда сўлак тизимидаги ўзгаришларни ҳисобга олган ҳолда комплекс, патогенезга йўналтирилган профилактика ва даволаш усуллари ишлаб чиқиш зарур ҳисобланади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Андрусев А.М., Томилина Н.А., Перудова Н.Г., Шинкарев М.Б. Заместительная терапия терминальной хронической почечной недостаточности в Российской Федерации 2014-2018 гг. Отчет по данным Общероссийского регистра заместительной почечной терапии Рос-

сийского диализного общества // Нефрология и диализ. 2020. 22(1):1-71.

2. Бабаев Д.А. Состояние полости рта и параметры эндогенной интоксикации в слюне у больных хронической почечной недостаточностью // Мир медицины и биологии. 2016. 12(1):23-25.

3. Батиров Б.А., Шокирова Ф.Ф., Софиева Н.Б., Муродов Х.У. Состояние здоровья полости рта у пациентов с гемодиализом // Forcipe. 2020. Т.3, №5:765-766.

4. Батюшин М.М. и соавт. Распространенность ХБП в амбулаторной практике: данные популяционного исследования // Нефрология и диализ. 2021. С.192-203.

5. Ветчинникова О.Н. Гиперпаратиреоз и хроническая болезнь почек. Часть 2. Современные подходы к профилактике и лечению вторичного гиперпаратиреоза // Нефрология и диализ. 2023. 25(3):360-382. DOI: 10.28996/2618-9801-2023-3-360-382.

6. Гаффоров С., Джумаев З. Особенности клинического течения хронического генерализованного пародонтита у больных с кожно-венерическими болезнями // Стоматология. 2019. 1(2(75)):19-23.

7. Горобец С.М., Романенко И.Г., Бобкова С.А., Джерелей А.А., Крючков Д.Ю., Горобец О.В., Мельниченко Д.И. Ксеростомия. Современный взгляд на проблему // ТМБВ. 2019. №2.

8. Джавадова Л.М. Современные представления об этиологии и патогенезе воспалительных заболеваний пародонта (обзор литературы) // Достижения науки и образования. 2022. №4.

9. Джураева А.Ш., Бадридинова Б.К. Сравнительный анализ качества жизни больных, принимающих программный гемодиализ // Цен-

трально-Азиатский эндокринологический журнал. 2022. Т.2, №2:13-18.

10. Заря Я.В., Гуревич К.Я. История и современное состояние методик гемодиализа и гемодиализации: обзор литературы // Нефрология и диализ. 2021. 23(1):32-48.

11. Клинические рекомендации: Хроническая болезнь почек у детей (проект). Москва: Союз педиатров России, 2021. 152 с.

12. Коростелева Е.В., Мамедова Л.А., др. Фотодинамическая терапия: перспективы и применение в профилактике стоматологических заболеваний (обзор) // Медицинский алфавит. 2025. С.100-106.

13. Котенко О.Н., Абольян Л.В., Кутейников В.Ю., Виноградов В.Е., Фомин В.В. Анемия и качество жизни пациентов с хронической болезнью почек на заместительной почечной терапии методом программного гемодиализа // Терапевтический архив. 2023. 95(1):32-37.

14. Кохоров М.К. Стратегии республики узбекистан по повышению осведомленности населения о заболеваниях пародонта // Экономика и социум. 2021. №1-2.

15. Лосев Ф.Ф., Кречина Е.К., Иванова Е.В., Кукса Е.Ю., Гусева И.Е. Применение фотодинамической терапии в комплексном лечении хронического генерализованного пародонтита средней степени // Стоматология. 2023. 102(2):11-15.

16. Луцкая И.К. Диагностика стоматологических заболеваний у пациентов с хронической почечной недостаточностью // Клинический разбор в общей медицине. 2021. 4:71-78. DOI: 10.47407/kr2021.2.4.00063.

17. Майбородин И.В., Миникеев И.М., Ким С.А., Рагимова Т.М. Состояние полости рта при почечной недостаточности // Стоматология. 2014. 93(1):72-79.

Иктибос учун: Рахмонова Ш.Р., Норова М.Б. Гемодиализдаги болаларда оғиз бўшлиғи муҳити ва сўлак кўрсаткичларининг стоматологик ҳолатга таъсири (адабиётлар таҳлили) // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2026. – № 4(24). – Б. 708–713. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19659805>

PROGRESSIVE STRUCTURAL REORGANIZATION AND FIBROTIC-EMPHYSEMATOUS REMODELING OF THE LUNGS UNDER CHRONIC EXPOSURE TO NICOTINE-CONTAINING PRODUCTS**Boltaeva Z.F.**

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. This article presents the results of an experimental study investigating progressive structural reorganization and the development of fibrotic-emphysematous remodeling of lung tissue under prolonged exposure to nicotine-containing products. The study was performed on white outbred rats with a model of chronic nicotine intoxication lasting 9 and 12 months. It was established that long-term nicotine exposure induces pronounced remodeling of the bronchopulmonary system, characterized by thickening of bronchial walls, hypertrophy of smooth muscle elements, hypersecretory transformation of the epithelium, and progression of perivascular fibrosis. In the alveolar compartment, destructive changes were observed, including the formation of emphysematous spaces (up to 50%), as well as features of chronic inflammation. The findings reflect the transition from compensatory alterations to a stage of stable fibrotic-destructive remodeling of lung tissue, forming the morphological basis of irreversible bronchopulmonary dysfunction.

Keywords: nicotine intoxication, lungs, remodeling, emphysema, fibrosis, inflammation, experiment.

НИКОТИН САҚЛОВЧИ МАҲСУЛОТЛАРНИНГ СУРУНКАЛИ ТАЪСИРИДА ЎПКАДА ПРОГРЕССИВ СТРУКТУР ҚАЙТА ҚУРИЛИШ ВА ФИБРОЗ-ЭМФИЗЕМАТОЗ РЕМОДЕЛЛАНИШ**Болтаева З.Ф.**

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Мақолада никотин сақловчи маҳсулотларнинг узоқ муддатли таъсири шароитида ўпка тўқимасида прогрессив структур қайта қурилиш ва фиброз-эмфизематоз ремоделирование шаклланишини ўрганишга бағишланган экспериментал тадқиқот натижалари баён этилган. Тадқиқот оқ зотсиз каламушларда 9 ва 12 ой давомида сурункали никотин интоксикациясини моделлаштириш орқали амалга оширилди. Аниқландики, никотиннинг узоқ муддатли таъсири бронх-ўпка тизимида яққол ремоделированиени келтириб чиқаради, бу жараён бронх деворларининг қалинлаишини, силлиқ мушак элементларининг гипертрофияси, эпителийнинг гиперсекретор қайта қурилиши ва периваскуляр фибрознинг прогрессияси билан кечади. Альвеоляр аппаратда эмфизематоз бўшлиқлар (50% гача) шаклланиши билан кечувчи деструктив ўзгаришлар, шунингдек яллигланиш жараёнининг хронизация белгилари аниқланди. Олинган натижалар компенсатор ўзгаришларнинг барқарор фиброз-деструктив қайта қурилиш босқичига ўтишини акс эттиради, бу эса бронх-ўпка тизимида қайтмас бузилишларнинг морфологик асосини шакллантиради.

Калит сўзлар: никотин интоксикацияси, ўпка, ремоделирование, эмфизема, фиброз, яллигланиш, эксперимент.

ПРОГРЕССИРУЮЩАЯ СТРУКТУРНАЯ ПЕРЕСТРОЙКА И ФИБРОЗНО-ЭМФИЗЕМАТОЗНОЕ РЕМОДЕЛИРОВАНИЕ ЛЁГКИХ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ВОЗДЕЙСТВИИ НИКОТИНСОДЕРЖАЩИХ ПРОДУКТОВ**Болтаева З.Ф.**

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. В статье представлены результаты экспериментального исследования, посвящённого изучению прогрессирующей структурной перестройки и формирования фиброзно-эмфизематозного ремоделирования лёгочной ткани при длительном воздействии никотинсодержащих продуктов. Исследование выполнено на белых беспородных крысах при моделировании хронической никотиновой интоксикации продолжительностью 9 и 12 месяцев. Установлено, что длительное воздействие никотина приводит к выраженному ремоделированию бронхолёгочной системы, сопровождающемуся утолщением бронхиальных стенок, гипертрофией гладкомышечных элементов, гиперсекреторной перестройкой эпителия и прогрессированием периваскулярного фиброза. В альвеолярном аппарате выявлены деструктивные изменения с формированием эмфизематозных полостей (до 50%), а также признаки хронизации воспалительного процесса. Полученные данные отражают

переход компенсаторных изменений в стадию устойчивой фиброзно-деструктивной перестройки лёгочной ткани, формирующей морфологическую основу необратимых нарушений бронхолёгочной системы.

Ключевые слова: никотиновая интоксикация, лёгкие, ремоделирование, эмфизема, фиброз, воспаление, эксперимент.

Introduction. Chronic nicotine intoxication is currently considered not only a factor in functional impairment but also a cause of profound structural transformation of lung tissue. Long-term exposure to nicotine-containing products is accompanied by the development of persistent morphological changes that form the morphological basis for irreversible damage to the bronchopulmonary system (1,8).

The key stage of the pathological process is the transition from initial adaptive-compensatory responses to the stage of progressive remodeling, including fibrotic remodeling of the interstitium, vascular changes, and destruction of the alveolar apparatus. It is at this stage that emphysematous changes and sclerotic processes develop, determining the irreversibility of morphological abnormalities and a decrease in the functional reserve of the lungs (2, 3, 5).

Of particular importance is the study of the complex nature of remodeling, which simultaneously involves the bronchial tree, vascular bed, and alveolar tissue. The combination of fibrotic and destructive processes, accompanied by chronic inflammation and activation of immune systems, forms a persistent pathological continuum, which has not been adequately reflected in experimental studies (4, 6, 7).

In this regard, identifying patterns of progressive structural reorganization of the lungs during long-term exposure to nicotine-containing products represents a pressing scientific task aimed at clarifying the mechanisms of formation of fibro-emphysematous remodeling and morphological criteria of irreversible damage to the bronchopulmonary system.

The aim of the study is to identify patterns of progressive remodeling of lung tissue during long-term exposure to nicotine-containing products in an experiment with morphological verification of fibro-emphysematous changes.

Material and methods of research. The work was carried out in an experimental series on white mongrel rats of both sexes weighing 220–240 g. The animals were kept under standard vivarium conditions with free access to water and food, in compliance with generally accepted standards for keeping laboratory animals.

Animals were divided into control and experimental groups. In the experimental groups, chronic exposure to nicotine-containing products for oral consumption was simulated. The exposure duration was 9 and 12 months, respectively, allowing for an assessment of the progression of morphological changes in lung tissue in the late stages of chronic nicotine intoxication. The control group was maintained under similar conditions without exposure to nicotine-containing substances.

During the experimental period, dynamic observation of the animals was carried out with an assessment of their general condition, motor activity, food and water consumption, as well as changes in body weight.

At the end of the experimental period, the animals were withdrawn from the study in accordance with bioethical principles, after which lung tissue was collected. The tissue was fixed in 10% neutral formalin, processed using standard histological procedures, and then embedded in paraffin. Serial sections of 5–7 μm thickness were cut from the resulting blocks.

Histological examination was performed using hematoxylin and eosin staining, as well as van Gieson staining to assess the degree of fibrotic transformation of the connective tissue. Microscopic analysis was performed to assess structural changes in the bronchopulmonary system, including the condition of the bronchial tree, vascular bed, and alveolar apparatus.

The morphometric study included an assessment of the severity of fibrotic changes, the degree of bronchial wall remodeling, the thickness of the vascular wall, the density of the alveoli and the proportion of emphysematous areas.

The obtained morphometric data were subjected to statistical processing using methods of variation statistics with the calculation of mean values (M) and standard error of the mean (m).

Research results. Microscopic examination of the lung tissue of animals exposed to long-term exposure to nicotine-containing products revealed a pronounced progressive structural reorganization of the bronchopulmonary system with the formation of persistent fibrotic-destructive changes.

At the level of the serous membrane, significant thickening was observed, with compaction of the submesothelial layer due to the proliferation of coarse fibrous connective tissue. Mesothelial cells acquired a cuboidal shape, with signs of nuclear hyperchromia and cytoplasmic granularity. In some areas, foci of hya-

linosis and perivascular sclerosis were detected, indicating the development of fibro-dystrophic processes.

The bronchi and bronchioles demonstrated marked wall remodeling. The thickness of the connective tissue lamellae increased to 69.5–72.0 μm , accompanied by disorganization of collagen and elastic fibers. The epithelial layer was unevenly thinned, locally desquamated, with marked cell deformation. The number of goblet cells increased to 15.5–17%, reflecting persistent hypersecretory remodeling of the mucosa.

The basement membrane was thickened and had an uneven, wavy contour. The smooth muscle elements of the bronchial wall were markedly hypertrophied, with signs of fragmentation of muscle bundles and thickening of the intermuscular stroma. These changes indicate the development of persistent airway remodeling.

The vascular bed was characterized by pronounced reorganization. Arteriolar wall thickening to 10.8–11.5 μm was noted, with the development of perivascular fibrosis and the formation of dense collagen ridges. In some areas, signs of hyalinosis of the vascular wall and narrowing of the vascular lumen were detected. Intravascular congestion was pronounced, with stasis and aggregation of blood cells, indicating impaired microcirculation.

The alveolar apparatus underwent the most pronounced destructive changes. A significant decrease in alveolar density (to 5.0–5.4 per 1 mm^2) and a decrease in their number per visual field were noted. The interalveolar septa were thickened, fragmented in places, or completely destroyed, leading to the fusion of alveoli and the formation of large air pockets. The proportion of emphysematous changes reached 42–50%, indicating a marked progression of the destructive process.

The interstitial tissue was characterized by an increase in fibrous content, with an increase in connective tissue content and the appearance of areas of sclerosis. Clusters of fibroblasts, lymphocytes, and macrophages were detected in the interalveolar septa, reflecting a chronic inflammatory-proliferative process.

The cellular composition of the lung tissue also underwent significant changes. The number of alveolar macrophages increased to 7–8 per field of view, most of which contained pigment inclusions. Macrophages were located in groups within the lumens of the alveoli and bronchioles, forming foci of cellular infiltration. Marked hyperplasia of the bronchi-associated lymphoid tissue was noted, accompanied by peribronchial and perivascular lymphocytic infiltrates.

A comparative analysis showed that with increasing duration of exposure to nicotine-containing products, a transition occurs from relatively compensatory changes to a stage of persistent fibrotic-destructive restructuring of lung tissue. In contrast to earlier stages, these changes are characterized by stability, severity and signs of irreversibility.

Discussion. The results indicate that prolonged exposure to nicotine-containing products leads to progressive structural changes in lung tissue that go beyond compensatory responses. The identified changes reflect the transition of the pathological process to a stage of persistent remodeling.

Remodeling of the bronchial tree is characterized by thickening of the walls, hypertrophy of smooth muscle elements and hypersecretory restructuring of the epithelium, which creates the preconditions for impaired ventilation function. Simultaneously increasing interstitial and perivascular fibrosis indicates a profound restructuring of the connective tissue framework of the lung.

Changes in the vascular bed, including thickening of arteriolar walls and stasis, indicate impaired microcirculation and the development of chronic hypoxia, which intensifies fibrotic processes. Destruction of the interalveolar septa and an increase in the proportion of emphysematous areas reflect the progressive loss of lung tissue architecture.

Activation of the macrophage-lymphocyte system and hyperplasia of bronchial-associated lymphoid tissue indicate chronic inflammation. Taken together, these changes form a fibro-emphysematous type of remodeling, characterized by stability and signs of irreversibility.

Conclusion. Long-term exposure to nicotine-containing products leads to the formation of progressive structural reorganization of lung tissue with the development of pronounced remodeling of the bronchopulmonary system.

It has been established that the pathological process is characterized by a combination of fibrous and destructive changes, including interstitial and perivascular fibrosis, remodeling of the vascular bed and the formation of emphysematous areas.

The identified changes reflect the transition of compensatory reactions to the stage of stable fibro-emphysematous transformation, accompanied by a violation of the architecture of the lung tissue and a decrease in its functional potential.

Thus, the formed morphological complex of changes can be considered as the structural basis of irreversible disorders of the bronchopulmonary system in chronic nicotine intoxication.

References:

1. Frontiers in Physiology. Chronic nicotine exposure and pulmonary remodeling // Front Physiol. – 2022. – Vol. 13. – 882456.
2. Respiratory Research. Vascular remodeling in chronic lung injury // Respir Res. – 2020. – Vol. 21. – 289.
3. Cells. Macrophage-mediated inflammation and lung fibrosis // Cells. – 2021. – Vol. 10(9). – 2304.
4. Journal of Clinical Medicine. Fibrosis and airway remodeling in chronic lung diseases // J Clin Med. – 2023. – Vol. 12(7). – 2561.
5. Toxicology Letters. Chronic nicotine toxicity: mechanisms of lung injury // Toxicol Lett. – 2022. – Vol. 358. – P. 45–53.
6. Pulmonary Pharmacology & Therapeutics. Pharmacological aspects of nicotine-induced lung damage // Pulm Pharmacol Ther. – 2024. – Vol. 78. – 102164.
7. Biomedicine & Pharmacotherapy. Fibrotic and emphysematous lung remodeling under chronic toxic exposure // Biomed Pharmacother. – 2023. – Vol. 162. – 114601.
8. Scientific Reports. Structural lung damage and emphysema progression in experimental models // Sci Rep. – 2021. – Vol. 11. – 14567.

For citation: Boltaeva Z.F. Progressive structural reorganization and fibrotic-emphysematous remodeling of the lungs under chronic exposure to nicotine-containing products // Bulletin of Fundamental and Clinic Medicine. – 2026. – № 4(24). – P. 714–717. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19659837>

ВЛИЯНИЕ ИММУНОКОРРЕГИРУЮЩЕЙ ТЕРАПИИ НА КЛИНИКО-ГЕМОДИНАМИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ У ПАЦИЕНТОВ С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА НА ФОНЕ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ

Жарылкасынова Г.Ж., Нарзиев Л.А.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. В статье представлены результаты клинико-функционального и гемодинамического исследования пациентов с ишемической болезнью сердца на фоне артериальной гипертензии. Установлено, что включение иммунокорректирующей терапии в комплексное лечение способствует более выраженной нормализации артериального давления, снижению частоты сердечных сокращений и восстановлению циркадного профиля артериального давления. Показано, что у пациентов, получавших иммунокорректирующую терапию, уровень систолического артериального давления снижился до $132,0 \pm 6,5$ мм рт.ст., тогда как в контрольной группе данный показатель сохранялся на уровне $142,0 \pm 8,0$ мм рт.ст. Отмечено также снижение диастолического давления, уменьшение частоты сердечных сокращений и значительное снижение доли пациентов с non-dipper-профилем. Анализ функциональных классов стенокардии по классификации CCS показал выраженную положительную динамику с перераспределением пациентов в сторону более лёгких форм заболевания, особенно в группах с применением иммунокорректирующей терапии. Полученные результаты свидетельствуют о высокой клинической эффективности иммунокорректирующей терапии и её значимой роли в оптимизации сердечно-сосудистой регуляции у пациентов с коморбидным течением ишемической болезни сердца и артериальной гипертензии.

Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия, иммунокорректирующая терапия, гемодинамика, циркадный ритм, стенокардия, CCS, non-dipper.

THE EFFECT OF IMMUNOCORRECTIVE THERAPY ON CLINICAL, HEMODYNAMIC, AND FUNCTIONAL PARAMETERS IN PATIENTS WITH ISCHEMIC HEART DISEASE ASSOCIATED WITH ARTERIAL HYPERTENSION

Zharlykassynova G.Zh., Narziev L.A.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. The article presents the results of a clinical, functional, and hemodynamic study of patients with ischemic heart disease associated with arterial hypertension. It was established that the inclusion of immunocorrective therapy in комплексное лечение contributes to a more pronounced normalization of arterial blood pressure, reduction in heart rate, and restoration of the circadian blood pressure profile. It was shown that in patients receiving immunocorrective therapy, systolic blood pressure decreased to 132.0 ± 6.5 mmHg, whereas in the control group this parameter remained at 142.0 ± 8.0 mmHg. A decrease in diastolic blood pressure and heart rate was also observed, along with a significant reduction in the proportion of patients with a non-dipper blood pressure profile. Analysis of angina functional classes according to the CCS classification demonstrated a marked positive dynamic with redistribution of patients toward milder forms of the disease, particularly in groups receiving immunocorrective therapy. The obtained results indicate high clinical effectiveness of immunocorrective therapy and its significant role in optimizing cardiovascular regulation in patients with comorbid ischemic heart disease and arterial hypertension.

Keywords: ischemic heart disease, arterial hypertension, immunocorrective therapy, hemodynamics, circadian rhythm, angina pectoris, CCS, non-dipper.

АРТЕРИАЛ ГИПЕРТЕНЗИЯ ФОНИДА ИШЕМИК ЮРАК КАСАЛЛИГИ БЎЛГАН БЕМОРЛАРДА ИММУНОКОРРЕГИРЛОВЧИ ТЕРАПИЯНИНГ КЛИНИК, ГЕМОДИНАМИК ВА ФУНКЦИОНАЛ КЎРСАТКИЧЛАРГА ТАЪСИРИ

Жарылкасынова Г.Ж., Нарзиев Л.А.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Мақолада артериал гипертензия фонида ишемик юрак касаллиги бўлган беморларда ўтказилган клиник-функционал ва гемодинамик тадқиқот натижалари келтирилган. Аниқланишича, иммунокоррегирловчи терапияни комплекс даволаш таркибига киритиш артериал қон босимини янада самарали нормаллаштиришга, юрак уришлар сонини камайтиришга ҳамда қон босимининг

циркад ритмини тиклашга олиб келади. Иммунокорригирловчи терапия олган беморларда систолик артериал босим $132,0 \pm 6,5$ мм сим.уст. гача пасайган бўлса, назорат гуруҳида ушбу кўрсаткич $142,0 \pm 8,0$ мм сим.уст. даражасида сақланган. Шунингдек, диастолик босимнинг пасайиши, юрак уришлар сонининг камайиши ва non-dipper турига мансуб беморлар улушининг сезиларли даражада қисқариши қайд этилган. CCS классификацияси бўйича стенокардия функционал синфларини таҳлил қилиш натижалари иммунокорригирловчи терапия қўлланилган гуруҳларда айниқса яққол намоён бўлган ижобий динамикани кўрсатди, яъни беморларнинг енгилроқ шаклларга ўтиши кузатилди. Олинган натижалар иммунокорригирловчи терапиянинг юқори клиник самарадорлигини ва унинг ишемик юрак касаллиги ҳамда артериал гипертензиянинг коморбид кечишида юрак-қон томир тизими регуляциясини оптималлаштиришидаги муҳим аҳамиятини тасдиқлайди.

Калит сўзлар: ишемик юрак касаллиги, артериал гипертензия, иммунокорригирловчи терапия, гемодинамика, циркад ритм, стенокардия, CCS, non-dipper.

Введение: Сердечно-сосудистые заболевания остаются ведущей причиной заболеваемости и смертности во всём мире, занимая доминирующее место в структуре неинфекционной патологии. Особую клиническую значимость представляет сочетанное течение ишемической болезни сердца (ИБС) и артериальной гипертензии (АГ), которое характеризуется более тяжёлым течением, быстрым прогрессированием и высоким риском развития сердечно-сосудистых осложнений (2,3).

Современные представления о патогенезе ИБС и АГ выходят за рамки исключительно гемодинамических нарушений и включают сложный комплекс нейрогуморальных и иммунновоспалительных механизмов. Хроническое воспаление, эндотелиальная дисфункция, а также нарушение циркадного ритма артериального давления играют ключевую роль в формировании и прогрессировании сердечно-сосудистой патологии. Особое значение имеет изменение циркадного профиля артериального давления, в частности формирование non-dipper-паттерна, ассоциированного с неблагоприятным прогнозом (1,2,6).

В последние годы всё большее внимание уделяется роли иммунной системы в регуляции сосудистого тонуса и адаптационных реакций организма. Иммунновоспалительный дисбаланс способствует поддержанию хронического воспалительного состояния, усилению симпатической активности и ремоделированию сосудистой стенки. В то же время стандартные схемы лечения не всегда обеспечивают полноценную коррекцию этих нарушений, что обуславливает необходимость поиска новых патогенетически обоснованных терапевтических подходов (4,5).

Одним из перспективных направлений является применение иммунокорригирующей терапии, способной воздействовать на ключевые звенья патогенеза, включая воспалительный процесс, нейрогуморальную регуляцию и циркадный ритм артериального давления. Однако вопросы её клинической эффективности и влияния на гемодинамические и функциональные показатели у пациентов с сочетанием ИБС и АГ остаются недостаточно изученными.

Цель исследования. Оценить влияние иммунокорригирующей терапии на клинко-гемодинамические показатели, циркадный профиль артериального давления и функциональное состояние пациентов с ишемической болезнью сердца на фоне артериальной гипертензии.

Материалы и методы исследования. В исследование были включены 120 пациентов с ишемической болезнью сердца на фоне артериальной гипертензии, которые были распределены на три сопоставимые группы по 40 человек в зависимости от проводимой терапии.

Пациенты I группы получали комплексную терапию с включением иммунокорригирующих препаратов, II группа — стандартное лечение с частичным использованием иммуномодулирующих средств, III группа (контрольная) — стандартную терапию без применения иммунокоррекции.

Всем пациентам проводилось комплексное клинко-инструментальное обследование, включающее оценку гемодинамических показателей: систолического (САД), диастолического (ДАД) и среднего артериального давления, пульсового давления (ПД), а также частоты сердечных сокращений (ЧСС).

Дополнительно анализировался циркадный профиль артериального давления с определением доли пациентов с non-dipper типом, характеризующимся отсутствием физиологического ночного снижения артериального давления.

Функциональное состояние пациентов оценивалось по классификации стенокардии напряжения Canadian Cardiovascular Society (CCS) с распределением по функциональным классам до и после лечения.

Сравнительный анализ проводился между группами с целью определения эффективности различных терапевтических подходов.

Статистическая обработка результатов осуществлялась с использованием методов вариационной статистики. Количественные показатели представлены в виде средних значений и стандартного отклонения ($M \pm SD$). Достоверность различий оценивалась при уровне значимости $p < 0,05$.

Результаты исследования: Как известно, ЭД, хроническое воспаление и нарушение циркадного ритма давления играют ключевую роль в прогрессировании ССЗ. Установлено, что иммуномодуляция способна снижать симпатическую гиперактивность, улучшать сосудистый тонус и тем самым способствовать нормализации АД и циркадного профиля.

В связи с этим представленные в таблице 1. данные отражают сравнительную динамику основных гемодинамических параметров и позволяют выявить вклад иммунокоррекции в комплексное лечение».

Таблица 1.

Клинико-гемодинамические показатели пациентов после лечения в зависимости от терапевтической группы

Группа	САД, мм рт. ст. ($M \pm SD$)	ДАД, мм рт. ст. ($M \pm SD$)	САДер, мм рт. ст.	ПД, мм рт. ст.	ЧСС, уд/мин ($M \pm SD$)	Non-dipper, %
I группа (n=40)	132,0 $\pm$ 6,5	80,0 $\pm$ 5,0	97,0	52,0	68,0 $\pm$ 4,2	15,0
II группа (n=40)	136,0 $\pm$ 7,0	83,0 $\pm$ 5,2	101,0	53,0	71,0 $\pm$ 4,5	22,0
III группа (n=40)	142,0 $\pm$ 8,0	88,0 $\pm$ 6,0	106,0	54,0	75,0 $\pm$ 5,0	35,0

Анализ клинико-гемодинамических параметров свидетельствует о том, что включение ИКТ способствует более выраженной стабилизации АД и нормализации сердечно-сосудистой регуляции по сравнению как со стандартной терапией без иммуномодуляторов, так и с контрольной группой. Так, у больных I группы систолическое давление снизилось до 132,0 $\pm$ 6,5 мм рт.ст., что оказалось достоверно ниже показателей II (136,0 $\pm$ 7,0 мм рт.ст.) и особенно III группы (142,0 $\pm$ 8,0 мм рт.ст.). В относительном выражении это соответствовало уменьшению почти на 7% по сравнению с контролем, что имеет клиническое значение с позиции разгрузки миокарда.

Аналогичное направление динамики прослеживалось и в отношении диастолического давления: в I группе его значения не превышали 80,0 $\pm$ 5,0 мм рт.ст., тогда как во II и III группах фиксировались более высокие уровни (83,0 и 88,0 мм рт.ст. соответственно). Таким образом, интегральный показатель – среднее АД – был минимальным именно в I группе (97 мм рт.ст. против 106 мм рт.ст. в контроле), что подтверждает преимущество комбинированной схемы.

Несмотря на то, что пульсовое давление варьировало не столь значительно (52,0–54,0 мм рт.ст.), тенденция к его снижению у пациентов, получавших иммунокоррекцию, может рассматриваться как отражение уменьшения сосудистой жёсткости. В то же время более отчётливые различия выявлены по ЧСС: у больных I группы ЧСС составила 68,0 $\pm$ 4,2 уд/мин, тогда как в контрольной группе этот показатель достигал 75,0 $\pm$ 5,0 уд/мин, что эквивалентно снижению более чем на 10% и указывает на оптимизацию вегетативной регуляции.

Наиболее показательные различия касались циркадного профиля давления. Доля пациентов с non-dipper-паттерном в I группе не превышала 15%, что в 1,5 раза меньше, чем во II, и более чем в 2 раза ниже, чем в контроле (35%). Этот факт имеет принципиальное прогностическое значение, поскольку восстановление физиологической ночной редукции давления снижает риск ССО.

Таким образом, проведённый сравнительный анализ убедительно демонстрирует, что включение ИКТ в стандартную схему лечения приводит не только к выраженному снижению систолического и диастолического давления, уменьшению ЧСС, но и к восстановлению физиологического циркадного профиля АД.

В таблице 2. представлена динамика распределения пациентов по функциональным классам стенокардии напряжения по классификации CCS в исследуемых группах до и после проведения лечения.

В I группе до начала лечения преобладали пациенты со II и III функциональными классами, суммарная доля которых составляла 87,5%, при этом III–IV ФК регистрировались у 45,0% больных. После лечения отмечено выраженное перераспределение пациентов в сторону более лёгких форм заболевания: доля пациентов с I функциональным классом увеличилась с 5,0% до 30,0%, что соответствует росту в 6 раз, а доля пациентов с III функциональным классом снизилась с 37,5% до 15,0%, то

есть уменьшилась в 2,5 раза. Пациенты с IV функциональным классом после лечения в данной группе не выявлялись, тогда как до лечения их доля составляла 7,5%.

Таблица 2.

Распределение пациентов по функциональным классам CCS до и после лечения

Класс CCS	I группа		II группа		III группа	
	до	после	до	после	до	после
I	2 (5,0%)	12 (30,0%)	3 (7,5%)	10 (25,0%)	1 (2,5%)	4 (10,0%)
II	20 (50,0%)	22 (55,0%)	18 (45,0%)	24 (60,0%)	20 (50,0%)	22 (55,0%)
III	15 (37,5%)	6 (15,0%)	16 (40,0%)	6 (15,0%)	15 (37,5%)	10 (25,0%)
IV	3 (7,5%)	-	3 (7,5%)	-	4 (10,0%)	4 (10,0%)

Во II группе до лечения также доминировали II и III функциональные классы, на которые приходилось 85,0% наблюдений, при этом III–IV ФК выявлялись у 47,5% пациентов. После лечения отмечено увеличение доли пациентов с I функциональным классом с 7,5% до 25,0%, что соответствует увеличению более чем в 3,3 раза, и одновременное снижение доли пациентов с III функциональным классом с 40,0% до 15,0%, то есть в 2,7 раза. Как и в I группе, пациенты с IV функциональным классом после лечения не регистрировались.

В III группе исходно отмечалось более неблагоприятное распределение функциональных классов: доля пациентов с III–IV ФК составляла 47,5%, при этом IV функциональный класс выявлялся у 10,0% больных. После лечения положительная динамика носила менее выраженный характер. Доля пациентов с I функциональным классом увеличилась лишь с 2,5% до 10,0% (увеличение в 4 раза), тогда как снижение доли пациентов с III функциональным классом было ограниченным — с 37,5% до 25,0%, что соответствует уменьшению в 1,5 раза. Доля пациентов с IV функциональным классом в данной группе не изменилась и сохранялась на уровне 10,0%.

Сравнительный анализ динамики распределения функциональных классов показал, что наиболее выраженное снижение тяжёлых форм стенокардии (III–IV ФК) отмечалось в I и II группах. В I группе суммарная доля пациентов с III–IV функциональными классами после лечения уменьшилась в 3 раза, во II группе — в 3,2 раза, тогда как в III группе снижение данного показателя было существенно менее выраженным и составило лишь 1,4 раза. Полученные данные свидетельствуют о значительно большей клинической эффективности проводимого лечения в I и II группах по сравнению с контрольной, с наибольшей выраженностью положительного эффекта в I группе.

Заключение. Проведённое исследование показало, что включение иммунокорригирующей терапии в комплексное лечение пациентов с ишемической болезнью сердца на фоне артериальной гипертензии обеспечивает достоверное улучшение клинико-гемодинамических показателей. Применение иммунокорригирующей терапии способствует более выраженному снижению систолического и диастолического артериального давления, оптимизации частоты сердечных сокращений и повышению стабильности гемодинамики.

Важным эффектом является восстановление физиологического циркадного профиля артериального давления, что проявляется снижением доли пациентов с non-dipper-паттерном и имеет существенное прогностическое значение в отношении снижения риска сердечно-сосудистых осложнений.

Анализ функциональных классов стенокардии по классификации CCS выявил выраженную положительную динамику с перераспределением пациентов в сторону более лёгких форм заболевания, а также уменьшением доли тяжёлых (III–IV) функциональных классов, вплоть до их полного отсутствия в группах с применением иммунокорригирующей терапии.

Таким образом, иммунокорригирующая терапия не только усиливает антигипертензивный и антиангинальный эффект стандартного лечения, но и играет важную роль в оптимизации сердечно-сосудистой регуляции и улучшении клинических исходов у пациентов с коморбидным течением ишемической болезни сердца и артериальной гипертензии.

Список литературы:

1. Apple FS et al. High-sensitivity cardiac troponin assays: clinical update from the Academy of the American Association for Clinical Chemistry. // Clin Chem. – 2017. – V. 63(1). – P. 73–81.
2. Bernatsky S, Lewin A, Usmanov RS. Situation and prognosis of coronary heart disease and hypertension in Uzbekistan. // J

Cardioprophylaxis Uzbekistan. - 2020. - V. 5(2). - P. 12–20.

3. Caylı M. et al. High-sensitivity cardiac troponin T predicts nondipper hypertension in newly diagnosed hypertensive patients. // J Clin Hypertens. – 2013. – V. 15(10). – P. 731–737.

4. de Lemos JA et al. Association of troponin T levels with cardiac structure, mortality risk, and myocardial ischemia in the general population. // JAMA. – 2010. – V. 304(22). – P. 2503–2512.

5. Everett BM et al. High-sensitivity cardiac troponin I and B-type natriuretic peptide as predictors of vascular events in primary prevention: impact of statin therapy. // Circulation. – 2015. – V. 131(10). – P. 863–872.

6. Hitsumoto T. Clinical impact of hemorheology on subclinical myocardial injury in patients with hypertension. // J Clin Med Res. – 2018. – V. 10(12). – P. 928–935.

Для цитирования: Жарылкасынова Г.Ж., Нарзиев Л.А. Влияние иммунокорригирующей терапии на клинико-гемодинамические и функциональные показатели у пациентов с ишемической болезнью сердца на фоне артериальной гипертензии // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 4(24). – С. 718–722. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19662372>

**ПРОФИЛАКТИКА НЕИНФЕКЦИОННЫХ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ
АОРТОКОРОНАРНОГО ШУНТИРОВАНИЯ****Арипова Т.У., Ярбеков Р.Р., Тешаев У.Ш.**

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Использование разработанного лечебно-диагностического алгоритма персонализированной профилактики неинфекционных послеоперационных осложнений аортокоронарного шунтирования позволило уменьшить число послеоперационных осложнений и летальность.

Ключевые слова: аортокоронарное шунтирование, послеоперационные осложнения, профилактика.

**PREVENTION OF NON-INFECTIOUS POSTOPERATIVE COMPLICATIONS OF CORONARY
ARTERY BYPASS GRAFTING****Aripova T.U., Yarbekov R.R., Teshayev U.Sh.**

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. The use of the developed Treatment and Diagnostic Algorithm for personalized prevention of non-infectious postoperative complications of coronary artery bypass grafting has made it possible to reduce the number of postoperative complications and mortality.

Keywords: aortokoronar shuntlash, operatsiyadan keyingi asoratlar, profilaktika.

**АУТОКОРОНАР ШУНТЛАШНИНГ ОПЕРАЦИЯДАН КЕЙИНГИ НОИНФЕКЦИОН
АСОРАТЛАРИНИНГ ПРОФИЛАКТИКАСИ****Арипова Т.Ў., Ярбеков Р.Р., Тешаев У.Ш.**

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Коронар артерияларни шунтлашнинг юқумли бўлмаган операциядан кейинги асоратларининг шахсийлаштирилган олдини олиш учун ишлаб чиқилган даволаш ва диагностика алгоритмидан фойдаланиш операциядан кейинги асоратлар ва ўлим сонини камайтириш имконини бериши.

Калит сўзлар: аортокоронар шунтлаш, операциядан кейинги асоратлар, профилактика.

e-mail: t.aripova@immuno.uz, Yarbekov@mail.ru, ulug_leo@mail.ru

Актуальность. Изучение послеоперационных осложнений (ПОО) аортокоронарного шунтирования (АКШ) на протяжении нескольких десятилетий остается одним из ключевых направлений клинических и экспериментальных исследований в кардиохирургии. На ранних этапах основное внимание уделялось анализу хирургических факторов риска, включая особенности техники реваскуляризации, применение искусственного кровообращения (ИК), длительность ишемии миокарда и параметры периоперационного ведения. Проведенные исследования позволили значительно снизить частоту технических и инфекционных осложнений, однако не обеспечили системного решения проблемы неинфекционных послеоперационных осложнений (НИПО) АКШ (1,3).

Классические представления о природе НИПО АКШ в значительной степени основывались на концепции хирургического стресса и системного воспалительного ответа (СВО) реакции (2,4).

Отдельные публикации указывают на значение дисбаланса между провоспалительными и регуляторными звеньями иммунной системы, включая недостаточность противовоспалительного контроля в раннем послеоперационном периоде (ПОП) (1,3,9,10). Тем не менее остается недостаточно изученным вопрос, какие именно сочетания иммунологических изменений определяют переход от транзиторной адаптивной реакции к пролонгированной или повторной дестабилизации, лежащей в основе неблагоприятного течения ПОП (4,5,7).

Попытки профилактики НИПО АКШ с использованием универсальных фармакологических схем, направленных на подавление воспалительного ответа, демонстрируют ограниченную эффективность и сопровождаются риском побочных эффектов (5,6,8,10). Подобный характер результатов указывает на невозможность применения одинаковых профилактических стратегий у всех пациентов и подчеркивает необходимость учета индивидуальных биологических особенностей течения ПОП.

Таким образом, несмотря на значительный объем клинических, иммунологических и генетических исследований, степень изученности проблемы НИПО АКШ характеризуется фрагментарностью и отсутствием целостной патогенетической концепции. Иммунные и генетические механизмы, рассматриваемые раздельно, не позволяют в полной мере объяснить вариабельность клинического течения и каскадный характер осложнений у части пациентов. Указанное обстоятельство определяет необходимость комплексных исследований, направленных на объединенную оценку иммунологических и генетических факторов и разработку персонифицированных подходов к прогнозированию и профилактике НИПО АКШ.

Цель исследования: разработка лечебно-диагностического алгоритма персонифицированной профилактики неинфекционных послеоперационных осложнений аортокоронарного шунтирования.

Материалы и методы. Клинический материал исследования сформирован на базе отделения кардиохирургии многопрофильного медицинского центра Бухарской области и включает наблюдения за 166 больными с ИБС, которым выполнялось АКШ в плановом порядке. Все обследования и наблюдения проводились в рамках проспективного исследования.

Контрольную группу составили 82 (49,4%) больных, прооперированных в 2023-2024 годах и получавших стандартное послеоперационное ведение без применения, разработанного нами ЛДА. Основную группу сформировали 84 пациента (50,6%) прооперированные в 2025-2026 годах, у которых профилактика НИПО АКШ и ведение ПОП осуществлялись с использованием разработанного нами персонифицированного ЛДА, основанного на иммуногенетическом фенотипировании больных. Дополнительно в исследование включены 20 клинически здоровых лиц, признанных медицинской комиссией практически здоровыми по результатам комплексного обследования, которые были привлечены для формирования референсных значений иммунологических и иммуногенетических показателей.

Дополнительно, каждая анализируемая группа больных (контрольная и основная) была разделена нами на подгруппы в зависимости от объема хирургической реваскуляризации миокарда с учетом количества наложенных аортокоронарных шунтов (≤ 2 шунта и ≥ 3 шунта соответственно). Указанное подразделение использовалось как структурная характеристика клинического материала, отражающая различия хирургической нагрузки и потенциальную неоднородность течения ПОП. В контрольной группе данная градация рассматривалась как аналитическая переменная для последующего сопоставления клинических и лабораторных параметров, тогда как в основной группе она учитывалась при реализации персонифицированной профилактической тактики в составе разработанного нами ЛДА, не изменяя при этом принципа включения пациентов в исследование.

Средний возраст обследованных в целом составил $62,9 \pm 8,1$ года, при этом в контрольной группе он был несколько ниже ($61,4 \pm 8,3$ года), тогда как в основной группе средний возраст достигал $64,6 \pm 7,6$ года. В референсной группе средний возраст находился между значениями клинических групп и составил $62,0 \pm 6,8$ года.

Наиболее частыми сопутствующими состояниями в обследованном контингенте больных являлись метаболические нарушения и заболевания эндокринной системы. В первую очередь к ним относились ожирение с индексом массы тела более 30 кг/м^2 и сахарный диабет 2 типа. Указанные нозологии регистрировались как у больных основной группы, где ожирение отмечалось у 36,9%, а эндокринные нарушения у 31,0% пациентов, так и у больных контрольной группы, в которой соответствующие показатели составили 34,1% и 26,8%.

Клинико-кардиологическая характеристика больных, включенных в контрольную и основную группы, отражала наличие у всех пациентов выраженной ИБС, послужившей основанием для планового выполнения АКШ.

Оценка взаимосвязей между лабораторными, иммунологическими и клиническими показателями проводилась с применением корреляционного анализа с расчетом коэффициента корреляции r . Для выявления независимых факторов, ассоциированных с развитием НИПО АКШ, применялся многофакторный логистический регрессионный анализ. Результаты модели представлялись в виде регрессионного коэффициента (β), стандартной ошибки (SE), уровня значимости (p), отношения шансов (OR) и ДИ отношения шансов (95%). Отбор переменных для многофакторного анализа осуществлялся с учетом их клинической значимости и результатов предварительных однофакторных сопоставлений.

Результаты и их обсуждение. Методологические основания построения ЛДА базируются на сочетании разграничения больных по ИГФ, признании ограничений коррекции генетического фона и целенаправленном воздействии на иммунологическую реализацию риска. При этом подготовка больных к АКШ в рамках разработанного нами ЛДА не рассматривается как альтернатива существующим

клиническим протоколам и не предполагает пересмотра базовых принципов предоперационного ведения больных с ИБС.

Согласно условиям разработанного нами ЛДА, при отнесении больного к категории отсутствия предрасположенности ИГФ исходная оценка по полной шкале «ИГФ-НИПО» не выявляет клинически значимой иммунологической активации и не указывает на выраженную генетическую предрасположенность к неблагоприятному течению ПОП. В таких наблюдениях суммарный балл ИГФ соответствует минимальным значениям, а состояние иммунной системы характеризуется сохраненным равновесием между провоспалительными и регуляторными звеньями системного ответа. Данное обстоятельство позволяет рассматривать предстоящую операцию АКШ как основной и единственный значимый триггер иммунной активации без признаков исходной дестабилизации. При отсутствии предрасположенности ИГФ противопоказаний к выполнению АКШ со стороны иммунной системы не выявляется, что обуславливает возможность проведения операции в плановом порядке без применения специфических иммунопрофилактических мероприятий. В этой категории больных ЛДА не предполагает назначения дополнительных фармакологических средств, направленных на коррекцию иммунного ответа, поскольку вмешательство в условиях сохраненного иммунологического баланса может носить «избыточный» характер и не обладать клинической целесообразностью. Тактика ведения больных ограничивается стандартной предоперационной подготовкой и базовой кардиологической терапией, применяемой в соответствии с общепринятыми протоколами.

Хирургическое вмешательство у больных данной категории выполняется без задержки и без изменения объема планируемой реваскуляризации, поскольку ожидаемая нагрузка операции не накладывается на фон активной иммунной дисрегуляции. ПОП рассматривается как этап динамического наблюдения, в ходе которого осуществляется контроль иммунологического состояния с использованием, упрощенного программы оценки «ИГФ-НИПО-АІ», что позволяет своевременно зафиксировать возможные отклонения иммунного ответа, связанные уже с воздействием хирургического триггера.

В отдельных клинических наблюдениях при отсутствии ИГФ к предрасположенности НИПО до операции отмечалась кратковременная транзиторная активация отдельных иммунологических показателей в раннем ПОП, не сопровождавшаяся нарушением регуляторного баланса и не требовавшая изменения тактики ведения. В подобных ситуациях динамический контроль по программе «ИГФ-НИПО-АІ» позволял ограничиться наблюдением без перехода к эскалации профилактических мероприятий.

В случае диагностирования «низкого» уровня ИГФ предрасположенности к НИПО больного суммарная оценка по шкале «ИГФ-НИПО» отражает наличие неблагоприятного генетического фона в сочетании с минимально выраженными или пограничными иммунологическими сдвигами. В отличие от отсутствия ИГФ предрасположенности к НИПО, данная категория требует целенаправленного профилактического воздействия, направленного на предупреждение перехода предрасположенности в активную фазу иммунной дисрегуляции.

После завершения стандартного этапа предоперационной подготовки и на его фоне у больных с «низким» ИГФ предрасположенности к НИПО запускается иммунопрофилактическая тактика, начинаемая до выполнения АКШ.

Профилактика носит ограниченный по времени характер и ориентирована на сглаживание ранней врожденной иммунной реакции и стабилизацию эндотелиального звена без подавления адаптивного иммунитета. В рамках данной тактики применяется дексаметазон в дозе 4-8 мг внутривенно однократно за 12-24 часа до операции. При планировании расширенного объема реваскуляризации допускается дополнительное интраоперационное введение дексаметазона в дозе 4 мг, что направлено на профилактику избыточной медиаторной активации в условиях большей хирургической нагрузки.

Обязательным элементом иммунопрофилактики при «низком» уровне риска развития НИПО АКШ является использование статинов с иммуномодулирующими и эндотелиопротективными свойствами. Аторвастатин назначается в дозе 40-80 мг перорально за 3-5 суток до операции с обязательным продолжением в ПОП. Указанный препарат в данном контексте рассматривается не только как средство гиплипидемической терапии, но и как фактор, способствующий снижению провоспалительной активности и стабилизации сосудистой стенки, что не противоречит базовой кардиологической тактике и, напротив, усиливает ее профилактическую направленность. Дополнительно у больных с «низким» уровне риска развития НИПО АКШ применяется курс ОМЕГА-3 полиненасыщенных жирных кислот в дозе 1-2 г в сутки перорально, начинаемый за 7-10 дней до операции. Использование данного направления направлено на смещение медиаторного профиля в сторону разрешения вос-

паления и поддержание противовоспалительного регуляторного контура в периоперационном периоде.

Решение о допуске к операции при «низком» уровне риска развития НИПО АКШ принимается с обязательным учетом планируемого объема операции. При выполнении вмешательства с наложением ≤ 2 шунтов после завершения профилактического курса операция проводится в плановом порядке без дополнительной дооперационной переоценки иммунологического статуса. При планировании наложения ≥ 3 шунтов профилактическая тактика дополняется этапом повторной дооперационной оценки с использованием программного модуля «ИГФ-НИПО-А1». При отсутствии признаков ухудшения иммунологического профиля операция допускается, однако дальнейшее ведение пациента осуществляется в режиме усиленного послеоперационного иммунологического мониторинга.

При выявлении тенденции к нарастанию иммунной активации тактика пересматривается с возможным переходом к коррекционному режиму, соответствующему «высокому» уровню риска развития НИПО АКШ.

При наличии у больного «высокого» уровня риска развития НИПО АКШ суммарная оценка по шкале «ИГФ-НИПО» отражает сочетание неблагоприятного генетического фона с развернутыми иммунологическими нарушениями, характеризующимися активной провоспалительной реакцией и признаками недостаточности регуляторных механизмов. В таких наблюдениях иммунная система уже находится в состоянии дестабилизации, при котором дополнительный хирургический триггер способен привести к пролонгированной и кумулятивной реализации иммунного ответа с вовлечением эндотелиального и органного звеньев. Данное обстоятельство определяет принципиально иную тактику предоперационного ведения по сравнению с больными, имеющими «низкий» уровень ИГФ. При «высоком» уровне риска развития НИПО выполнение АКШ рассматривается как противопоказанное вне зависимости от планируемого объема реваскуляризации, включая вмешательства с наложением ≤ 2 шунтов. Решение об отсрочке операции обусловлено не техническими характеристиками вмешательства, а биологической неподготовленностью организма к системной нагрузке, связанной с кардиохирургическим вмешательством. В этих условиях приоритетом ЛДА становится дооперационная иммунологическая коррекция, направленная на снижение выраженности активных нарушений и перевод иммунной системы в управляемое состояние, соответствующее низкому уровню фенотипа.

Коррекционная тактика начинается немедленно после подтверждения «высокого» уровня риска развития НИПО АКШ и проводится на фоне сохранения всех стандартных мероприятий кардиологической подготовки. В качестве базового элемента используется короткий курс глюкокортикоидов с выраженным противовоспалительным эффектом. Метилпреднизолон назначается в дозе 125-250 мг внутривенно 1 раз в сутки в течение 2-3 дней, при этом выбор дозового диапазона определяется исходной выраженностью иммунологических сдвигов и планируемой хирургической нагрузкой. Применение данного препарата в ограниченном по времени режиме направлено на купирование активной медиаторной фазы без формирования стойкой иммуносупрессии и требует динамического контроля метаболических показателей.

Дополнительным компонентом коррекционной программы является воздействие на микроциркуляторное и эндотелиальное звенья системного ответа. Пентоксифиллин применяется в дозе 100-200 мг внутривенно капельно 1-2 раза в сутки курсом 5-7 дней, что позволяет снизить выраженность провоспалительной цитокиновой активности и уменьшить риск сосудистой реализации иммунной дисрегуляции. Коррекция ЭД дополняется введением L-аргинина в дозе 4-8 г внутривенно капельно 1 раз в сутки в течение 5 дней, что способствует восстановлению NO-зависимой вазорегуляции и стабилизации микрососудистого русла. При наличии признаков алергоподобной или тучноклеточной активации в структуру коррекционной тактики включаются антигистаминные средства. Хлоропирамин используется внутривенно в дозе 20 мг 1-2 раза в сутки либо применяется цетиризин перорально в дозе 10 мг 1 раз в сутки. Указанное направление не носит обязательного характера и реализуется по показаниям, исходя из клинико-иммунологических особенностей конкретного наблюдения.

Эффективность дооперационной коррекции оценивается с использованием повторного расчета по полной шкале «ИГФ-НИПО». Критерием завершения коррекционного этапа считается снижение суммарного балла до диапазона, соответствующего «низкому» уровню ИГФ, что отражает купирование активной иммунной дисрегуляции при сохранении генетического фона. Достижение категории отсутствия ИГФ риска развития НИПО АКШ не рассматривается как необходимая или достижимая цель и не используется в качестве условия допуска к операции. После перехода в «низкий» ИГФ коррекционная тактика деэскалируется до профилактической, и дальнейшее ведение осуществляется по ЛДА, принятому для соответствующей категории с учетом планируемого объема АКШ. В случаях, когда на фоне проведенной коррекции не удастся добиться снижения ИГФ до «низкого» уровня, хи-

рургическое вмешательство продолжает рассматриваться как противопоказанное. В таких ситуациях ЛДА предусматривает усиление коррекционной программы с повторной оценкой иммунологического статуса в динамике, что направлено на предотвращение выполнения операции в условиях неконтролируемой иммунной дисрегуляции и отражает приоритет биологической безопасности над формальным соблюдением сроков хирургического лечения.

После выполнения АКШ ЛДА персонифицированной профилактики переходит в фазу динамического управления иммунологическим ответом, ключевым элементом которой является эскалация ранее начатых мероприятий при неблагоприятной послеоперационной динамике. В отличие от дооперационного этапа, где фармакологическая тактика определяется исходным ИГФ, в ПОП решение об эскалации принимается на основании изменений иммунологического профиля, зафиксированных с использованием программного алгоритма «ИГФ-НИПО-А1», независимо от наличия или отсутствия клинически выраженных осложнений.

У больных с исходно «низким» уровнем риска развития НИПО АКШ эскалация рассматривается как ответ на признаки нарастающей иммунологической активации, возникающие после хирургического вмешательства на фоне ранее проведенной профилактики. Подобная ситуация может формироваться при сочетании генетической предрасположенности с повышенной хирургической нагрузкой, в том числе при выполнении реваскуляризации с наложением ≥ 3 шунтов. В этих наблюдениях отсутствие своевременного усиления профилактических мероприятий создает условия для перехода предрасположенности в фазу активной дисрегуляции, что делает эскалацию необходимым элементом ЛДА.

Эскалация при «низком» ИГФ осуществляется за счет усиления противовоспалительного и эндотелиопротективного компонентов уже начатой профилактики. В ПОП в таких случаях применяется метилпреднизолон в дозе 125 мг внутривенно 1 раз в сутки курсом 1-2 дня, что направлено на купирование нарастающей медиаторной активации без формирования стойкой иммуносупрессии. Дополнительно может быть продлен или усилен курс пентоксифиллина в дозе 100-200 мг внутривенно капельно 1-2 раза в сутки, ориентированный на снижение провоспалительной активности и стабилизацию микроциркуляторного русла. Эндотелиальная поддержка в виде L-аргинина в дозе 4-8 г внутривенно капельно 1 раз в сутки продолжается до стабилизации иммунологических показателей. Указанная тактика носит временный характер и подлежит пересмотру при достижении признаков иммунологического равновесия.

При исходно «высоком» ИГФ эскалация в ПОП имеет иное биологическое содержание. В этих наблюдениях даже после достижения «низкого» уровня ИГФ на фоне предоперационной коррекции сохраняется повышенная вероятность вторичной активации иммунного ответа, обусловленная прежним генетическим фоном и высокой чувствительностью системы к дополнительным триггерам. Эскалация у данной категории больных направлена не на предотвращение перехода предрасположенности в активную фазу, а на предупреждение повторной дестабилизации уже частично скорректированного иммунного состояния.

В ПОП у больных с исходно «высоким» фенотипом при неблагоприятной динамике по данным «ИГФ-НИПО-А1» применяется повторный короткий курс глюкокортикоидов с использованием метилпреднизолона в дозе 125-250 мг внутривенно 1 раз в сутки в течение 1-2 дней. Выбор дозы определяется выраженностью иммунологических сдвигов и скоростью их нарастания. Параллельно усиливается микроциркуляторная и эндотелиальная коррекция, включая продление курса пентоксифиллина до 7 суток и сохранение введения L-аргинина в прежнем объеме. При появлении признаков алергоподобной активации дополнительно назначаются антигистаминные препараты, что позволяет снизить вклад тучноклеточных механизмов в формирование системной реакции. Причем принципиальным является то, что эскалация при любом фенотипе не рассматривается как автоматическое усиление терапии по факту операции. Она реализуется исключительно при наличии объективных признаков неблагоприятной иммунологической динамики и направлена на восстановление управляемого состояния иммунной системы. Такой подход позволяет избежать избыточного воздействия у больных с адаптивным типом ответа и одновременно обеспечивает своевременное вмешательство у пациентов с риском кумулятивной реализации иммунных нарушений.

Достижение «низкого» уровня ИГФ у больных с исходно «высоким» риском не рассматривается в ЛДА как завершение лечебно-диагностического воздействия, поскольку генетически детерминированная уязвимость сохраняется и продолжает оказывать влияние на характер системного иммунологического ответа. В этих условиях приоритет смещается от активной коррекции к поддержанию достигнутого иммунологического равновесия, что требует пересмотра объема и интенсивности ранее применяемых вмешательств. Такой переход обозначается в ЛДА как дезэскалация и имеет самостоя-

тельное значение, отличное от простой отмены терапии. Решение о деэскалации принимается на основании совокупной оценки иммунологической динамики, включающей снижение провоспалительной активности, восстановление регуляторных механизмов и уменьшение признаков эндотелиальной активации. Важным является не достижение отдельных референсных значений, а стабилизация направленности иммунного ответа, при которой дальнейшее усиление воздействия теряет патогенетическое обоснование. Указанное условие позволяет перейти к более щадящему режиму профилактики без утраты контроля над системной реактивностью.

Практическая реализация деэскалации строится по принципу поэтапного снижения терапевтической нагрузки. Прежде всего прекращается применение средств, использовавшихся исключительно для купирования активной медиаторной фазы, в частности глюкокортикоидов, назначенных в коррекционном режиме. Микроциркуляторная и эндотелиальная поддержка сохраняется в уменьшенном объеме либо переводится в профилактический формат, ориентированный на предотвращение повторной дестабилизации. При отсутствии признаков алергоподобной активации исключается необходимость продолжения антигистаминных препаратов, что дополнительно снижает медикаментозную нагрузку. При этом существенным элементом деэскалации является сохранение профилактической направленности ЛДА вне зависимости от текущего клинического благополучия. Даже при отсутствии функциональных или органических нарушений у больных с исходно «высоким» фенотипом достигнутое улучшение трактуется как управляемое состояние, требующее дальнейшего наблюдения и сопровождения. Такой подход позволяет избежать ложного ощущения «устранения риска» и поддерживает настороженность в отношении возможной повторной иммунной активации.

После выполнения АКШ деэскалация дополняется регулярным мониторингом с использованием программы «ИГФ-НИПО-АИ», который обеспечивает объективную оценку устойчивости достигнутого баланса. При сохранении стабильной иммунологической картины профилактический режим постепенно сокращается, тогда как появление неблагоприятных сдвигов служит основанием для возврата к более интенсивному уровню воздействия, что формирует гибкую систему управления, в которой деэскалация выступает не конечной точкой, а частью непрерывного процесса адаптации тактики к текущему состоянию больного.

Таким образом, разработанный нами ЛДА персонифицированной профилактики НИПО АКШ представляет собой последовательную систему принятия решений, интегрированную в стандартную клиническую практику и основанную на учете ИГФ больных. ЛДА не подменяет существующие протоколы предоперационной подготовки и послеоперационного ведения, а дополняет их за счет целенаправленного воздействия на иммунологическую реализацию риска, начиная с дооперационного этапа и продолжаясь в динамике после хирургического вмешательства. Использование ИГФ-ориентированного подхода позволяет дифференцировать профилактические и коррекционные мероприятия в зависимости от исходного состояния иммунной системы, объема планируемой реваскуляризации и характера послеоперационной иммунологической динамики.

Выводы:

1. Разработанный ЛДА персонифицированной профилактики НИПО АКШ представляет собой последовательную систему принятия решений, интегрированную в стандартную клиническую практику и основанную на учете ИГФ больных. ЛДА не подменяет существующие протоколы предоперационной подготовки и послеоперационного ведения, а дополняет их за счет целенаправленного воздействия на иммунологическую реализацию риска, начиная с дооперационного этапа и продолжаясь в динамике после хирургического вмешательства.
2. Использование ИГФ-ориентированного подхода позволяет дифференцировать профилактические и коррекционные мероприятия в зависимости от исходного состояния иммунной системы, объема планируемой реваскуляризации и характера послеоперационной иммунологической динамики.

Список литературы:

1. Алмабаев Б.С., Муканова У.А. Влияние ранней мобилизации на исходы у пациентов после аортокоронарного шунтирования // Universum: медицина и фармакология. - 2025. - № 5-1(122). - С. 9-12.
2. Исмаилова П.И. Исследование послеоперационной фибрилляции предсердий у пациентов, перенесших АКШ и клапанные операции: клинический ракурс // Medicus. - 2025. - № 5(71). - С. 12-15.
3. Казиханов А.Ч. Клинический анализ результатов АКШ у онкологических пациентов // Medicus. - 2025. - № 7(73). - С. 17-20.
4. Мамараджапова Д.А. Оценка нозологических структур по частоте многососудистого поражения у пациентов, перенесших АКШ // XIII

Евразийский конгресс кардиологов: сборник тезисов, Москва, 14-15 мая 2025 года. - Москва: ООО «ИнтерМедсервис», 2025. - С. 34-35.

5. Мамараджапова Д.А., Пулатова З.А. Гендерно-возрастные элементы множественного поражения коронарных артерий у пациентов, перенесших АКШ // XIII Евразийский конгресс кардиологов: сборник тезисов, Москва, 14-15 мая 2025 года. - Москва: ООО «ИнтерМедсервис», 2025. - С. 15.

6. Марин Д.А., Карташев В.П. Современные стратегии реабилитации пациентов после АКШ в России // Бюллетень медицинских интернет-конференций. - 2025. - Т. 15, № 1. - С. 17-18.

7. Михайлова О.В., Петрова М.М., Лопатина О.Л. Послеоперационная когнитивная реабилитация и уровень окситоцина в биологических жидкостях у пациентов, перенесших АКШ // Южно-Российский журнал терапевтической практики. - 2025. - Т. 6, № 4. - С. 80-86.

8. Понкратов К.М., Ким Е.В., Брюшнина Н.И., Аджисалиев Г.Р. Сравнительная анатомия коронарных артерий как ориентиров при традиционном АКШ и мини-инвазивном прямом аортокоронарном шунтировании // Медицина. Социология. Философия. - 2025. - № 6. - С. 104-108.

9. Nazir A. Effectiveness of active cycle of breathing technique in improving physiological and functional outcomes following coronary artery bypass graft surgery: a narrative review // Journal of Multidisciplinary Healthcare. - 2025. - Vol. 18. - P. 5431-5439.

10. Ye M., Shi Q., Liu F. et al. Outcomes of total arterial coronary artery bypass grafting for Kawasaki disease in pediatric patients: a single-center cohort study // The Annals of Thoracic Surgery. - 2025. - Vol. 120, No. 6. - P. 1135-1142.

Для цитирования: Арипова Т.У., Ярбеков Р.Р., Тешаев У.Ш. Профилактика неинфекционных послеоперационных осложнений аортокоронарного шунтирования // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 4(24). – С. 723–729. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19662445>

РЕЗИСТЕНТНОСТЬ К ГИПОЛИПИДЕМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ У ПАЦИЕНТОВ С ИБС ПОСЛЕ ЧКВ И ПУТИ ЕЁ ПРЕОДОЛЕНИЯ**Латипов Н.М.¹, Аляви Б.А.¹, Абдусаторов Ж.Ж.²**¹Республиканский Специализированный Научно-Практический Медицинский Центр Терапии и Медицинской Реабилитации, г. Ташкент, Узбекистан²НИИ КПССЗ, г. Кемерово, Россия

Резюме. Работа посвящена оценке эффективности инклизирана у пациентов с ишемической болезнью сердца, перенесших чрескожное коронарное вмешательство, у которых сохраняется резистентность к стандартной гиполипидемической терапии. В исследовании показано, что добавление инклизирана приводит к выраженному и устойчивому снижению атерогенных фракций липидов, прежде всего ЛПНП, а также улучшает общий липидный профиль за счёт снижения общего холестерина, не-ЛПВП холестерина и коэффициента атерогенности. Препарат продемонстрировал хорошую переносимость и возможность достижения целевых уровней ЛПНП у пациентов очень высокого сердечно-сосудистого риска, что делает его перспективным компонентом вторичной профилактики после ЧКВ.

Ключевые слова: инклизиран, ишемическая болезнь сердца, чрескожное коронарное вмешательство, дислипидемия, ЛПНП, гиполипидемическая терапия, PCSK9, не-ЛПВП холестерин, коэффициент атерогенности, вторичная профилактика сердечно-сосудистых заболеваний.

RESISTANCE TO LIPID-LOWING THERAPY IN PATIENTS WITH CORONARY HEART DISEASE AFTER PCI AND WAYS TO OVERCOME IT.**Latipov N.M.¹, Alyavi B.A.¹, Abdusatorov J.J.²**¹Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Therapy and Medical Rehabilitation, Tashkent, Uzbekistan²Research Institute for Complex Problems of Cardiovascular Diseases, Kemerovo, Russia

Resume. The study is dedicated to evaluating the efficacy of inclisiran in patients with coronary artery disease who underwent percutaneous coronary intervention and demonstrated resistance to standard lipid-lowering therapy. It was shown that the addition of inclisiran leads to a significant and sustained reduction in atherogenic lipid fractions, primarily LDL cholesterol, as well as improvement of the overall lipid profile due to reductions in total cholesterol, non-HDL cholesterol, and the atherogenic index. The drug demonstrated good tolerability and the ability to achieve target LDL cholesterol levels in patients at very high cardiovascular risk, making it a promising component of secondary prevention after PCI.

Keywords: inclisiran, coronary artery disease, percutaneous coronary intervention, dyslipidemia, LDL cholesterol, lipid-lowering therapy, PCSK9, non-HDL cholesterol, atherogenic index, secondary prevention of cardiovascular diseases.

ЮРАК КАСАЛЛИГИ БИЛАН ОҒРИГАН БЕМОРЛАРДА ПКА ДАН КЕЙИН ГИПОЛИПИДЕМИК ТЕРАПИЯГА РЕЗИСТЕНТЛИК ВА УНИ ЕНГИБ ЎТИШ ЙЎЛЛАРИ**Латипов Н.М.¹, Аляви Б.А.¹, Абдусаторов Ж.Ж.²**¹Республика ихтисослаштирилган илмий-амалий терапия ва тиббий реабилитация тиббиёт маркази, Тошкент ш., Ўзбекистон²Юрак-қон томир касалликларининг комплекс муаммолари илмий-тадқиқот институти, Кемерово ш., Россия

Резюме. Ушбу иш перкутант коронар аралашув (ПКА) ўтказилган, стандарт гиполипидемик терапияга резистент бўлган коронар артерия касаллиги билан оғриган беморларда инклизиран самарадорлигини баҳолашга бағишланган. Тадқиқотда инклизиран қўшилиши атероген липид фракцияларининг, биринчи навбатда LDL холестериннинг, сезиларли ва барқарор пасайишига ҳамда умумий липид профилининг яхшиланишига олиб келиши кўрсатилди. Бу умумий холестерин, по-HDL холестерин ва атерогенлик коэффициентининг камайиши ҳисобига амалга ошади. Препарат юқори юрак-қон томир хавфи бўлган беморларда яхши ўзлаштирилиши ва LDL мақсад даражаларига эришиши имконини кўрсатди, бу эса уни ПКАдан кейинги иккиламчи профилактика учун истиқболли восита сифатида кўрсатади.

***Калим сўзлар:** инклисиран, коронар артерия касаллиги, перкутант коронар аралашув, дислипидемия, LDL холестерин, гиполипидемик терапия, PCSK9, по-HDL холестерин, атерогенлик коэффициенти, юрак-қон томир касалли-кларининг иккиламчи профилактикаси.*

Актуальность. Ишемическая болезнь сердца (ИБС) остаётся одной из ведущих причин заболеваемости и смертности во всём мире, несмотря на значительные достижения современной кардиологии. В структуре сердечно-сосудистой смертности ИБС занимает лидирующие позиции, а пациенты, перенесшие чрескожные коронарные вмешательства (ЧКВ), составляют особую группу высокого и очень высокого риска развития повторных сердечно-сосудистых событий. В связи с этим вторичная профилактика, направленная на стабилизацию атеросклеротического процесса и предотвращение прогрессирования заболевания, приобретает ключевое значение.

Одним из основных патогенетических факторов развития и прогрессирования атеросклероза является дислипидемия, в частности повышение уровня холестерина липопротеидов низкой плотности (ЛПНП). Современные клинические рекомендации подчёркивают необходимость достижения целевых уровней ЛПНП ($<1,4$ ммоль/л) у пациентов очень высокого риска, включая больных после ЧКВ. Однако в реальной клинической практике значительная доля пациентов не достигает указанных значений даже при применении высокоинтенсивной терапии статинами и их комбинации с эзетимибом.

Данное явление получило название резистентности к гиполипидемической терапии и представляет собой важную клиническую проблему. Под резистентностью понимают недостаточное снижение уровня ЛПНП на фоне адекватной медикаментозной терапии, что может быть обусловлено рядом факторов, включая генетические особенности, высокую исходную концентрацию липидов, сопутствующие метаболические нарушения (сахарный диабет, ожирение), а также низкую приверженность пациентов к лечению.

Наличие резистентности существенно ухудшает прогноз у пациентов с ИБС, повышая риск развития рестеноза после ЧКВ, повторных ишемических событий, инфаркта миокарда и сердечно-сосудистой смертности. Это обуславливает необходимость поиска новых терапевтических подходов, направленных на более эффективный контроль липидного профиля.

В последние годы значительный интерес вызывает применение ингибиторов PCSK9, в частности инклисирана — препарата на основе малых интерферирующих РНК, подавляющего синтез PCSK9 в печени. Данный механизм способствует увеличению экспрессии рецепторов ЛПНП и усилению клиренса атерогенных липопротеидов из кровотока. Клинические исследования показали, что инклисиран обеспечивает выраженное и стабильное снижение уровня ЛПНП до 50–60% при удобном режиме дозирования.

Несмотря на накопленные данные о его эффективности, остаётся недостаточно изученным влияние инклисирана на преодоление резистентности к стандартной гиполипидемической терапии у пациентов после ЧКВ, а также его связь с функциональным состоянием миокарда и сосудистой стенки.

Цель исследования: целью настоящего исследования является оценка резистентности к гиполипидемической терапии у пациентов с ИБС после ЧКВ и анализ эффективности её преодоления при включении инклисирана в состав комбинированного лечения.

Материалы и методы: в исследование включено 130 пациентов с ИБС. Пациенты разделены на три группы: монотерапия розувастатином, комбинация с эзетимибом и тройная терапия с инклисираном. Оценивались липидный профиль, эхокардиография и сосудистые показатели.

Критерии включения:

- возраст от 34 до 69 лет;
- наличие подтверждённой ИБС;
- проведение ЧКВ;
- повышенный уровень липопротеидов низкой плотности (ЛПНП);
- информированное согласие на участие в исследовании.

Критерии исключения:

- острый инфаркт миокарда и острое нарушение мозгового кровообращения;
- выраженная сердечная недостаточность (ФВ ЛЖ $< 40\%$);
- тяжёлые сопутствующие заболевания (онкологические, печёночная и почечная недостаточность);
- острые инфекционные заболевания;
- нарушения системы гемостаза;
- беременность и период лактации;

- индивидуальная непереносимость препаратов.

Характеристика пациентов. Средний возраст пациентов составил $61,4 \pm 7,2$ года. Среди обследованных преобладали мужчины (около 70%). У значительной части пациентов выявлены сопутствующие факторы риска: артериальная гипертензия, сахарный диабет 2 типа, ожирение и отягощённая наследственность по сердечно-сосудистым заболеваниям.

Дизайн исследования. Все пациенты были разделены на три группы в зависимости от проводимой гиполипидемической терапии:

- **1-я группа (n=45):** монотерапия розувастатином в дозе 10–20 мг/сут;
- **2-я группа (n=45):** комбинированная терапия розувастатином и эзетимибом;
- **3-я группа (n=40):** тройная терапия, включающая розувастатин, эзетимиб и ингибитор PCSK9 — инклисиран.

Группы были сопоставимы по основным клинико-демографическим характеристикам, факторам риска и длительности заболевания.

Методы исследования:

1. Лабораторные методы: определение липидного профиля (общий холестерин, ЛПНП, ЛПВП, триглицериды); биохимический анализ крови; коагулограмма.

2. Инструментальные методы: эхокардиография с оценкой фракции выброса левого желудочка (ФВ ЛЖ), конечных объёмов, а также показателей диастолической функции; двухмерная спекл-трекинг эхокардиография (2D-STE) с определением глобальной продольной деформации миокарда (GLS); дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с оценкой толщины комплекса интима-медиа (КИМ), скоростных показателей кровотока и степени стеноза.

Результаты. В исследование были включены пациенты с ишемической болезнью сердца, перенесшие чрескожное коронарное вмешательство (ЧКВ), у которых на фоне стандартной гиполипидемической терапии сохранялись недостижимые целевые уровни липидов (признаки резистентности к терапии).

Таблица №1

Динамика показателей липидного спектра на фоне гиполипидемической терапии

Показатель	1-я группа (N=45)		2-я группа (N=45)		3-я группа (N=40)	
	До лечения	После лечения	До лечения	После лечения	До лечения	После лечения
Общий холестерин (ммоль/л)	$6,47 \pm 0,5$	$5,34 \pm 0,4$	$6,52 \pm 0,5$	$4,51 \pm 0,3$	$6,50 \pm 0,5$	$3,68 \pm 0,3$
ЛПНП (ммоль/л)	$4,65 \pm 0,4$	$3,15 \pm 0,3^*$	$4,88 \pm 0,4$	$2,77 \pm 0,2^*$	$4,7 \pm 0,4$	$1,88 \pm 0,2^{*\wedge}$
ЛПВП (ммоль/л)	$0,9 \pm 0,2$	$1,05 \pm 0,2$	$0,81 \pm 0,2$	$1,18 \pm 0,2$	$0,88 \pm 0,2$	$1,33 \pm 0,2^{*\wedge}$
Триглицериды (ммоль/л)	$3,3 \pm 0,3$	$2,14 \pm 0,3^*$	$3,4 \pm 0,3$	$1,75 \pm 0,2^*$	$3,5 \pm 0,3$	$1,54 \pm 0,2^{*\wedge}$

* $p < 0,05$ – достоверность по сравнению с исходными данными; $^{\wedge}p < 0,05$ – достоверность межгрупповых данных

На фоне добавления инклисирана отмечена выраженная и статистически значимая динамика показателей липидного обмена.

Через 3 месяца терапии выявлено значимое снижение уровня общего холестерина и липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) по сравнению с исходными значениями ($p < 0,05$). Наиболее выраженный эффект наблюдался в отношении ЛПНП, что соответствует механизму действия препарата через ингибирование синтеза PCSK9.

Через 6 месяцев терапии сохранялась стабильная гиполипидемическая эффективность с дальнейшим снижением ЛПНП и поддержанием достигнутых целевых уровней у большинства пациентов. У части больных отмечено достижение целевых значений ЛПНП согласно категории очень высокого сердечно-сосудистого риска.

Также зарегистрировано умеренное снижение уровня не-ЛПВП холестерина и коэффициента атерогенности, что свидетельствует об улучшении общего липидного профиля. Переносимость терапии в целом была удовлетворительной. Серьёзных нежелательных явлений, требующих отмены пре-

парата, не отмечено. В отдельных случаях наблюдались местные реакции в месте инъекции, носившие транзиторный характер.

Таким образом, добавление инклисирана к стандартной терапии у пациентов после ЧКВ с резистентной дислипидемией приводит к значимому и устойчивому снижению атерогенных липидов и улучшению липидного профиля.

Обсуждение. Полученные результаты демонстрируют выраженную эффективность инклисирана у пациентов с ишемической болезнью сердца после чрескожного коронарного вмешательства (ЧКВ), у которых сохранялась недостаточная эффективность стандартной гиполипидемической терапии. Наблюдаемое снижение уровня ЛПНП и других атерогенных фракций липидов подтверждает клиническую значимость ингибирования PCSK9 на уровне синтеза белка с использованием механизма малой интерферирующей РНК.

Инклисиран, в отличие от моноклональных антител к PCSK9, обеспечивает более стабильное и пролонгированное подавление синтеза PCSK9 в гепатоцитах, что позволяет поддерживать длительное снижение уровня ЛПНП при редком режиме дозирования. Это особенно важно для пациентов после ЧКВ, относящихся к категории очень высокого сердечно-сосудистого риска, где достижение и удержание целевых значений ЛПНП является ключевым фактором вторичной профилактики.

Полученные данные согласуются с результатами крупных клинических исследований ORION-10 и ORION-11, где инклисиран обеспечивал устойчивое снижение ЛПНП на 45–55% при длительном наблюдении. В нашей работе также отмечена сопоставимая динамика липидного профиля, что подтверждает воспроизводимость эффективности препарата в реальной клинической практике у пациентов с резистентной дислипидемией после коронарных вмешательств.

Особое значение имеет выявленное снижение коэффициента атерогенности и не-ЛПВП холестерина, что отражает комплексное улучшение липидного профиля, а не только изолированное влияние на ЛПНП. Это может дополнительно способствовать снижению остаточного сердечно-сосудистого риска, который сохраняется у значительной части пациентов даже на фоне терапии статинами высокой интенсивности.

Следует отметить, что часть пациентов не достигла целевых уровней ЛПНП, что может быть связано с исходно крайне высоким сердечно-сосудистым риском, полиморбидностью, а также вариабельностью ответа на гиполипидемическую терапию. Это подчёркивает необходимость индивидуализированного подхода и возможной комбинированной липидснижающей стратегии.

Ограничениями исследования являются относительно небольшая выборка, отсутствие рандомизированной контрольной группы и короткий период наблюдения. Кроме того, оценка клинических конечных точек (сердечно-сосудистые события) не проводилась, что ограничивает возможность экстраполяции результатов на долгосрочный прогноз.

Таким образом, инклисиран может рассматриваться как эффективное дополнение к стандартной гиполипидемической терапии у пациентов после ЧКВ с резистентной дислипидемией, обеспечивая значимое улучшение липидного профиля и потенциальное снижение остаточного сердечно-сосудистого риска.

Заключение. У пациентов с ишемической болезнью сердца после чрескожного коронарного вмешательства, имеющих недостаточный ответ на стандартную гиполипидемическую терапию, добавление инклисирана приводит к выраженному снижению уровня ЛПНП и общего холестерина.

На фоне терапии инклисираном отмечается улучшение показателей атерогенного профиля, включая снижение не-ЛПВП холестерина и коэффициента атерогенности, что свидетельствует об уменьшении общего сердечно-сосудистого риска.

Гиполипидемический эффект инклисирана является устойчивым и сохраняется при длительном наблюдении, что позволяет достигать и поддерживать целевые уровни ЛПНП у пациентов очень высокого риска.

Препарат характеризуется хорошей переносимостью, серьёзных нежелательных явлений, требующих отмены терапии, не наблюдалось.

Инклисиран может рассматриваться как эффективное дополнение к стандартной липидснижающей терапии у пациентов после ЧКВ с резистентной дислипидемией, особенно в случаях недостижения целевых уровней ЛПНП на фоне максимальной дозы статинов.

Список литературы:

1. Mach F., Baigent C., Catapano A. L. et al. vascular risk // Eur Heart J. – 2020. – Vol. 41(1). – 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of P. 111–188.
dyslipidaemias: Lipid modification to reduce cardio-

2. Ray K.K., Wright R.S., Kallend D. et al. Two phase 3 trials of inclisiran in patients with elevated LDL cholesterol // *N Engl J Med.* – 2020. – Vol. 382(16). – P. 1507–1519. – (ORION-10 and ORION-11 trials).
3. Schwartz G.G., Steg P.G., Szarek M. et al. Alirocumab and cardiovascular outcomes after acute coronary syndrome // *N Engl J Med.* – 2018. – Vol. 379(22). – P. 2097–2107.
4. Davis T., Turner R.M., Smith K.J. PCSK9 inhibition: The next frontier in lipid-lowering therapy // *Curr Cardiol Rep.* – 2021. – Vol. 23(5). – Article number: 53.
5. Ridker P.M. Inflammation, PCSK9 inhibition, and clinical benefit: A pathway to improved cardiovascular outcomes // *JAMA.* – 2022. – Vol. 327(15). – P. 1489–1490.
6. Ахмедов Ш.П., Хамраев Н.Н., Шарипов Б.Б. Современные подходы к коррекции дислипидемии у больных ИБС в Узбекистане // *Кардиология в Узбекистане.* – 2022. – №1(15). – С. 34–39.
7. Министерство здравоохранения Республики Узбекистан. Национальный клинический протокол по диагностике и лечению дислипидемий. – Ташкент: МЗ РУз, 2022.
8. Alyavi A.L., Kenjaev S.R. Influence of high dose atorvastatin on myocardial stunning in acute myocardial infarction. *Atherosclerosis.* 2017;263:245.
9. Kallend D., Kolm P., Chin K. et al. Inclisiran for the treatment of heterozygous familial hypercholesterolemia: ORION-9 trial // *Eur Heart J.* – 2020. – Vol. 41(4). – P. 1272–1279.
10. Raal F.J., Ray K.K., Bays H.E. et al. Inclisiran for patients with homozygous familial hypercholesterolemia: The ORION-5 study // *Lancet Diabetes Endocrinol.* – 2023. – Vol. 11(2). – P. 101–110.
11. Novartis AG. Long-term data from ORION-8 study demonstrate sustained LDL-C reduction and safety of inclisiran over 6 years. – [Пресс-релиз]. – 2024. – Доступ: <https://www.novartis.com>

Для цитирования: Латипов Н.М., Аляви Б.А., Абдусаторов Ж.Ж. Резистентность к гиполипидемической терапии у пациентов с ИБС после ЧКВ и пути её преодоления // *Вестник фундаментальной и клинической медицины.* – 2026. – № 4(24). – С. 730–734. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19662490>

ЖИГАР СУРУНКАЛИ ДИФФУЗ КАСАЛЛИКЛАРИ БЎЛГАН БЕМОРЛАРДА ОГИЗ БЎШЛИГИ ПАТОЛОГИЯЛАРИНИ КОМПЛЕКС ДАВОЛАШ ВА ПРОФИЛАКТИКА ҚИЛИШ САМАРАДОРЛИГИ

Казакова Н.Н., Курамбаева Н.Я.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Ушбу тадқиқот жигар сурункали диффуз касалликлари (ЖСДК) билан оғриган беморларда оғиз бўшлигининг стоматологик ҳолатини баҳолаш ва даволаш самарадорлигини оширишга бағишланган. Тадқиқотда 94 нафар бемор иштирок этди, улар касаллик турига кўра жигар фибрози, сурункали гепатит ва жигар циррози гуруҳларига бўлинди. Беморлар икки хил ёндашув асосида даволанди: анъанавий стоматологик муолажалар ва муаллиф томонидан ишлаб чиқилган комплекс даволаш усули (ўсимлик асосли «Ротокан» препарати, С витамини электрофорези ва УВЧ-терапия). Натижалар шуни кўрсатдики, жигар патологияси оғирлашган сари стоматологик индекслар (ГИ, ПМА, КЭ) ёмонлашиб боради. Комплекс даволаш қўлланилган гуруҳда пародонт тўқималаридаги яллиғланиш жараёнлари икки баробар тезроқ камайди, тиш эмалининг резистентлиги тикланди ва кариес интенсивлигининг ўсиши тўхтатилди. Тадқиқот ЖСДК мавжуд беморларда мултидисциплинар ёндашув ва физиотерапевтик муолажаларнинг юқори патогенетик самарадорлигини илмий асослаб беради.

Калит сўзлар: жигар сурункали диффуз касалликлари, жигар циррози, сурункали гепатит, пародонт, тиш кариеси, Ротокан, физиотерапия, стоматологик индекслар.

THE EFFECTIVENESS OF COMPREHENSIVE TREATMENT AND PREVENTION OF ORAL CAVITY PATHOLOGIES IN PATIENTS WITH CHRONIC DIFFUSE LIVER DISEASES

Kazakova N.N., Kurambaeva N.Ya.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. This study is dedicated to evaluating the dental status and enhancing the treatment effectiveness of oral cavity diseases in patients with chronic diffuse liver diseases (CDLD). The study involved 94 patients categorized into groups of liver fibrosis, chronic hepatitis, and liver cirrhosis. Participants were treated using two approaches: conventional dental treatment and a developed complex therapy consisting of the herbal preparation "Rotokan," Vitamin C electrophoresis, and UHF therapy. The findings revealed that as liver pathology progresses, dental indices (GI, PMA, DMF) significantly deteriorate. In the complex treatment group, periodontal inflammation reduced twice as effectively as in the traditional group, tooth enamel resistance increased, and caries intensity stabilized. The study scientifically substantiates that a multidisciplinary approach incorporating physiotherapeutic procedures and herbal extracts provides high pathogenetic efficiency in restoring oral health for patients with CDLD. These results emphasize the importance of specialized dental protocols in managing patients with systemic hepatic disorders.

Key words: chronic diffuse liver diseases, liver cirrhosis, chronic hepatitis, periodontium, dental caries, Rotokan, physiotherapy, dental indices.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ ПАТОЛОГИЙ ПОЛОСТИ РТА У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМИ ДИФФУЗНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПЕЧЕНИ

Казакова Н.Н., Курамбаева Н.Я.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Данное исследование посвящено оценке стоматологического статуса и повышению эффективности лечения заболеваний полости рта у пациентов с хроническими диффузными заболеваниями печени (ХДЗП). В исследовании приняли участие 94 пациента, распределённых по группам: фиброз печени, хронический гепатит и цирроз печени. Пациенты получали либо традиционное стоматологическое лечение, либо разработанную комплексную терапию, включающую растительный препарат «Ротокан», электрофорез с аскорбиновой кислотой и УВЧ-терапию. Результаты продемонстрировали прямую зависимость между тяжестью поражения печени и ухудшением состояния полости рта (индексы ГИ, ПМА, КПУ). В группе комплексного лечения наблюдалась выраженная положительная динамика: воспаление тканей пародонта снизилось в два раза эффективнее по сравне-

нию с традиционным методом, значительно повысилась резистентность эмали и стабилизировалась интенсивность кариеса. Исследование подтверждает необходимость интеграции физиотерапевтических методов и фитопрепаратов в алгоритм стоматологической помощи пациентам с системными патологиями печени для достижения долгосрочного клинического результата.

Ключевые слова: хронические диффузные заболевания печени, цирроз печени, хронический гепатит, пародонт, кариес зубов, Ротокан, физиотерапия, стоматологические индексы.

e-mail: nozima.kazakova@bsmi.uz

Долзарблғи. Жигар сурункали диффуз касалликлари (ЖСДК) дунё микёсидаги долзарб тиббий-ижтимоий муаммо бўлиб, унинг асосий этиологик омиллари сурункали вирусли гепатитлар (В ва С), алкогольли жигар касаллиги (АЖК) ва тобора кенг тарқалаётган метаболик дисфункция билан боғлиқ ёғли жигар касаллиги (МДЁЖК) ҳисобланади. Жигар сурункали диффуз касалликларида жигар паренхимасининг сурункали яллиғланиши, некрози ва жигар фиброзига ўтиши билан тавсифланади, бу эса яқунда жигар циррозига ва гепатоцеллюляр етишмовчиликка олиб келади [1,7,10]. Касалликнинг ривожланиши жигарнинг оксил-синтетик функциясининг пасайиши (албумин ва коагуляцион омиллар синтезининг бузилиши), детоксикация функциясининг издан чиқиши (аммиакнинг тўпланиши), шунингдек, портал гипертензия ва геморрагик синдром каби оғир асоратлар ривожланиши билан бевосита боғлиқ [5,8,9].

Эпидемиологик маълумотлар бутун дунёда ЖСДК билан оғирган беморлар сонининг ортиб бораётганини, айниқса, МДЁЖКнинг метаболик синдром билан биргаликда глобал пандемия даражасига етганини кўрсатмоқда. Сурункали вирусли гепатитлар жигарнинг сурункали яллиғланишининг энг кенг тарқалган сабабларидан бири ҳисобланади. ЖССТ маълумотларига кўра, дунё бўйича 257 миллион киши сурункали HBV инфекцияси билан яшайди. Катталарда HBV инфекциясининг сурункали шаклга ўтиш эҳтимоли 5% дан кам бўлса-да, перинатал юктириш ҳолатларида бу кўрсаткич 90% гача етади. Сурункали гепатит В цирроз ва ГЦК ривожланишининг асосий омили ҳисобланади [2,3,6,7].

ЖССТ статистик маълумотлари дунё бўйлаб 71 миллион кишида сурункали HCV инфекцияси мавжудлиги тасдиқлаган. Асосий хавф шундаки, ўткир HCV инфекциясига чалинганларнинг 55% дан 85% гачаси сурункали шаклга ўтади, бу эса жигар циррози ва трансплантацияга эҳтиёж сезишнинг етакчи сабаби ҳисобланади [4,6,9,10].

Тадқиқот мақсади. Жигарнинг турли оғирликдаги диффуз касалликларида (фиброз, сурункали гепатит ва жигар циррози) оғиз бўшлиғи гигиенаси, пародонт тўқималари яллиғланиши ва тиш эмали чидамлилиги кўрсаткичларини киёсий таҳлил қилиш ҳамда анъанавий даволашга қўшимча равишда ўсимлик асосли препаратлар ва кетма-кет қўлланиладиган физиотерапиянинг патогенетик самарадорлигини илмий асослаб бериш.

Тадқиқот материаллари ва усуллари. Замоनावий илмий билимларнинг турли тамойилларини ҳисобга олган ҳолда, биз ўз тадқиқот методологиямизни етарли даражада белгиланган вазифа билан ишлаб чиқдик. Умумий илмий ва ўзига хос усуллар асосида режалаштирилган ва олиб борилган тадқиқотлар қўйилган вазифаларни ҳал қилишга қаратилган эди. Ушбу тадқиқот доирасида 94 нафар жигар сурункали диффуз касаллиги (ЖСДК) мавжуд беморлар олинди. Назорат гуруҳини 23 нафар шартли соғлом беморлар ташкил этди. Ўз навбатида ЖСДК қайд этилган беморлар касаллик турига кўра, 3 та гуруҳга бўлинди.

Ўз навбатида беморлар даволаш усулига кўра яна 2 гуруҳга ажратилди:

1. I гуруҳ (n=44): анъанавий стоматологик даво.
2. II гуруҳ (n=50): комплекс даво (анъанавий давога қўшимча равишда Ротокан препарати ва физиотерапия).

Анъанавий стоматологик даво мақсадида тишнинг кариоз бўшлиқларини анъанавий механик тозалаш ва стандарт пломба материаллари билан тўлдириш, тиш илдиз каналларига стандарт антисептик ишлов бериш ва пломбалаш, оғиз бўшлиғини анъанавий усуллар ёрдамида тиш тошлари ва қарашларидан тозалаш ва милк ва пародонт тўқималарига яллиғланишга қарши стандарт маз, гел (Метрогил Дента) ва антисептиклар билан ишлов бериш амалга оширилди.

Комплекс даволашда анъанавий давога қўшимча равишда Ротокан шифобахш ўсимликнинг суюқ экстракти (таркиби: мойчечак, тирноқгул ва Бўйимодарон ўти экстракти) ва физиотерапия (Вит С билан электрофорез ва ўта юқори частотали терапия) қўлланилди.

Ротокан тоза ҳолда ишлатилмайди, уни қўллашдан аввал сув билан суюлтирилди. 1 чой қошиқ (5 мл) Ротокан 1 стакан (200 мл) илиқ сувда эритилди. Кунига 3-4 марта 1-2 дақиқа давомида чайқаш

учун буюрилди. Пахта пилигини (турунда) эритмага ботириб, милк четига 15-20 дақиқага қўйилади. Сув ҳарорати 35-40°C бўлиши шарт, чунки совуқ сув жигар патологиясида кузатиладиган томирлар спазмини ошириши, жуда иссиқ сув эса қон кетишини кучайтириши мумкин. Курс давомийлиги: 7–10 кун. Жами 5–15 та муолажа (қасаллик оғирлигига қараб).

Физиотерапия (электрофорез) мақсадида 5% ли аскорбин кислотаси эритмаси ишлатилди. Эритма билан намланган пахта пиликлари (турундлар) милкка қўйилади ва анод (+) кутбига уланди. Ток кучи: 2...5 мА (беморнинг индивидуал сезувчанлигига қараб, "енгил кичишиш" ҳиссигача). Биринчи муолажалар 10 дақиқадан бошланиб, босқичма-босқич 15–20 дақиқагача оширилади. Курс давомийлиги: 10–12 та муолажа, ҳар куни ёки кун ора.

Ўта юқори частотали терапия (УВЧ). Олиготермик доза (кучсиз иссиқлик сезиладиган) қўлланилади. Жағ соҳаси учун қувват 20–30 Вт атрофида белгиланди. Икки томонлама (билатерал) ёки жағнинг зарарланган соҳасига кўндаланг йўналишда. Ҳаво оралиғи 1...1,5 см. Давомийлиги: 8–10 дақиқа. Курс давомийлиги: 5–8 та муолажа.

ЖСДҚда энг юқори самарага эришиш учун ушбу икки муолажани бир кунда, кетма-кет ўтказиш тавсия этилади. Аввал УВЧ терапия: ушбу муолажа тўқималарда иссиқлик ҳосил қилиб, капиллярларни кенгайтиради ва қон оқимини тезлаштиради. УВЧдан кейин тўқималарнинг ўтказувчанлиги ошган бўлади, натижада аскорбин кислотаси пародонтнинг чуқур қатламларига анча яхши сўрилади.

Натижалар ва мунозаралар. Тадқиқотда иштирок этган 94 нафар беморнинг жигар патологияси турлари ва қўлланилган даволаш усуллари бўйича тақсимланиши гуруҳлар ўртасида мутаносиблик сақланганини кўрсатади. Хусусан, жигар жигар фибрози билан оғриган 35 нафар беморнинг 45,7 %и (16 нафар) комплекс даволаш қўлланилган I гуруҳга, 54,3 %и (19 нафар) эса анъанавий даволаш усулидаги II гуруҳга бириктирилган. Сурункали гепатит (31 нафар бемор) ва жигар циррози (28 нафар бемор) ташхиси қўйилган респондентлар орасида ҳам тақсимот шунга ўхшаш кўринишга эга бўлиб, I гуруҳда тегишлича 48,3% (15 нафар) ва 46,4% (13 нафар), II гуруҳда эса 51,7% (16 нафар) ҳамда 53,6% (15 нафар) беморлар камраб олинди.

Тадқиқот гуруҳларида даволашдан олдинги стоматологик индекслар жигар патологиясининг оғирлик даражасига мутаносиб равишда ёмонлашиб бориши аниқланди. Хусусан, ГИ кўрсаткичи жигар фиброзида $2,2 \pm 0,14$ баллни ташкил этган бўлса, жигар циррозида бу қиймат $3,6 \pm 0,22$ баллгача кўтарилган (1-жадвал). Ишлаб чиқилган комплекс даволаш усули қўлланилган I гуруҳда гигиеник ҳолатнинг сезиларли яхшиланиши кузатилди: жигар циррози бор беморларда ГИ кўрсаткичи $1,9 \pm 0,15$ баллгача пасайган, анъанавий даволанган II гуруҳда эса бу кўрсаткич юқориликча ($2,8 \pm 0,21$ балл) қолди. Ушбу гуруҳлараро фарқ барча ҳолатларда статистик жиҳатдан ишончли бўлиб ($p < 0,05$ дан $p < 0,01$ гача), комплекс ёндашувнинг оғиз бўшлиғи гигиенасини тиклашдаги устуворлигини тасдиқлайди.

1-жадвал.

ЖСДҚ билан оғриган беморларда асосий стоматологик индексларнинг даводан кейинги қиёсий таҳлили

Тадқиқот гуруҳлари	Кўрсаткичлар	Гигиеник индекс (ГИ, балл)	ПМА индекси (%)
Жигар фибрози (n=35)	Даводан олдин	$2,2 \pm 0,14$	$28,6 \pm 2,1$
	I гуруҳ (Комплекс)	$1,4 \pm 0,12$	$14,5 \pm 1,8$
	II гуруҳ (Анъанавий)	$1,8 \pm 0,15$	$22,4 \pm 2,3$
Сурункали гепатит (n=31)	Даводан олдин	$2,9 \pm 0,16$	$44,2 \pm 3,4$
	I гуруҳ (Комплекс)	$1,6 \pm 0,14$	$18,2 \pm 2,5$
	II гуруҳ (Анъанавий)	$2,3 \pm 0,18$	$34,6 \pm 3,1$
Жигар циррози (n=28)	Даводан олдин	$3,6 \pm 0,22$	$62,8 \pm 4,5$
	I гуруҳ (Комплекс)	$1,9 \pm 0,15$	$24,6 \pm 3,2$
	II гуруҳ (Анъанавий)	$2,8 \pm 0,21$	$48,2 \pm 4,2$

Пародонт тўқималаридаги яллиғланиш жараёнини ифодаловчи ПМА индекси бўйича ҳам I гуруҳда энг юқори ижобий динамика қайд этилди. Сурункали гепатит билан оғриган беморларда комплекс даводан сўнг ПМА индекси 44,2% дан 18,2% гача камайган бўлса, анъанавий усулда бу

кўрсаткич фақат 34,6% гача пасайган ($p<0,001$). Жигар циррози гуруҳида эса I гуруҳ натижалари (24,6%) II гуруҳга (48,2%) нисбатан икки баробар самаралироқ эканлиги аниқланди ($p<0,001$).

Жигарнинг сурункали диффуз касалликлари оғирлик даражаси ортиши билан тиш эмалининг резистентлиги назорат гуруҳига ($2,1\pm 0,14$ балл) нисбатан сезиларли даражада пасайиб борди. Хусусан, даволашгача бўлган даврда ТЭР кўрсаткичи жигар фиброзида $3,8\pm 0,18$ баллни, сурункали гепатитда $5,4\pm 0,22$ баллни ва энг паст чидамлилиқ даражаси қайд этилган жигар циррозида $7,2\pm 0,25$ баллни ташкил этди (2-жадвал). Бу ҳолат тизимли патология таъсирида оғиз суюқлигининг минераллаштирувчи функцияси бузилиши ва эмал деминерализацияси кучайишини илмий асослаб беради.

2-жадвал.

ЖСДК билан оғриган беморларда тиш эмалининг резистентлик тести (ТЭР) кўрсаткичлари

Кўрсаткич	Назорат гуруҳи (n=23)		
ТЭР кўрсаткичи (балл, $M\pm m$)	2,1±0,14		
	Жигар фибрози (n=35)		
	Даводан олдин	I гуруҳ	II гуруҳ
ТЭР кўрсаткичи (балл, $M\pm m$)	3,8±0,18	2,4±0,15	3,2±0,17
	Сурункали гепатит (n=31)		
	5,4±0,22	3,1±0,18	4,5±0,20
	Жигар циррози (n=28)		
	7,2±0,25	4,3±0,21	6,1±0,24

Ўтказилган қиёсий таҳлил натижаларига кўра, комплекс даволаш усули қўлланилган I гуруҳда эмал резистентлигининг тикланиши анъанавий усулдаги II гуруҳга нисбатан статистик жиҳатдан юқори ишончлилиқ билан ($p<0,05$ ва $p<0,01$) ифодаланди. Масалан, жигар циррози билан оғриган беморларда I гуруҳда ТЭР кўрсаткичи $4,3\pm 0,21$ баллгача яхшиланган бўлса, II гуруҳда бу қиймат $6,1\pm 0,24$ балл даражасида сақланиб қолди. Сурункали гепатит гуруҳида ҳам I гуруҳ натижалари ($3,1\pm 0,18$) анъанавий ёндашувга ($4,5\pm 0,20$) қараганда анча самарали эканлиги аниқланди. Бу эса ишлаб чиқилган комплекс даволаш ва профилактика алгоритмининг тиш каттиқ тўқималари чидамлилигини оширишда юқори патогенетик самарага эга эканлигини тасдиқлайди.

Беморларда кариес интенсивлиги назорат гуруҳидаги ($3,2\pm 0,24$) кўрсаткичга нисбатан сезиларли даражада юқори бўлиб, патология оғирлашган сари жадаллашиб борди. Даволашдан олдинги даврда КЭ кўрсаткичи жигар фиброзида $5,8\pm 0,31$ ни ташкил этган бўлса, сурункали гепатитда $8,4\pm 0,42$ гача, жигар циррозида эса декомпенсацияланган ҳолатни ифодаловчи $12,6\pm 0,55$ гача кўтарилди (3-жадвал).

3-жадвал.

ЖСДК билан оғриган беморларда кариес интенсивлиги (КЭ) кўрсаткичлари

Кўрсаткич	Назорат гуруҳи (n=23)		
Кариес интенсивлиги (КЭ, $M\pm m$)	3,2±0,24		
	Жигар фибрози (n=35)		
	Даводан олдин	I гуруҳ	II гуруҳ
Кариес интенсивлиги (КЭ, $M\pm m$)	5,8±0,31	3,4±0,21	4,9±0,28
	Сурункали гепатит (n=31)		
	8,4±0,42	5,2±0,33	7,1±0,38
	Жигар циррози (n=28)		
	12,6±0,55	7,8±0,46	7,8±0,46

Даволаш динамикасида ишлаб чиқилган комплекс даволаш усули қўлланилган I гуруҳда кариес интенсивлигининг ўсишини тўхтатиш ва стоматологик ҳолатни барқарорлаштириш бўйича анъанавий усулга (II гуруҳ) нисбатан статистик жиҳатдан юқори ишончлилиқдаги натижалар қайд этилди ($p<0,05$ ва $p<0,01$). Хусусан, сурункали гепатит гуруҳида I гуруҳ натижалари ($5,2\pm 0,33$) II гуруҳга

(7,1±0,38) қараганда анча ижобий бўлиб, патологик жараённинг секинлашганини кўрсатди. Жигар циррози мавжуд беморларда ҳам комплекс ёндашув натижасида КЭ кўрсаткичи 7,8±0,46 даражасида барқарорлашди. Олинган маълумотлар ЖСДК билан оғриган беморлар учун таклиф этилган мултидисциплинар профилактика ва даволаш алгоритми тиш қаттиқ тўқималарининг кариоз деструкциясини камайтиришда юқори самарадорликка эга эканлигини тасдиқлайди. Тадқиқот шуни кўрсатдики, жигарнинг сурункали диффуз касалликлари (ЖСДК) оғирлик даражаси (фиброздан циррозгача) ортиши билан стоматологик ҳолатнинг сезиларли даражада ёмонлашиши кузатилади. Бунда гигиеник индекс (ГИ) 2,2 дан 3,6 баллгача кўтарилиб, тиш эмалининг резистентлиги пасаяди ва кариес интенсивлиги (КЭ) 5,8 дан 12,6 гача (циррозда) ортади. Тадқиқотда қўлланилган "Ротокан" препарати ва физиотерапия (С витамини электрофорези ва УВЧ) ни ўз ичига олган комплекс ёндашув анъанавий усулга нисбатан юқори самарадорликни кўрсатди. Хусусан, жигар циррози бўлган беморларда ПМА индекси анъанавий даводан кейинги 48,2% га нисбатан комплекс даводан сўнг 24,6% гача икки баробар самаралироқ пасайди ва тиш эмалининг чидамлилигини тиклашда статистик ишончли ижобий натижаларга эришилди.

Хулосалар. Тадқиқот шуни кўрсатдики, жигарнинг сурункали диффуз касалликлари оғирлик даражаси (фиброздан циррозгача) ортиши билан стоматологик ҳолатнинг сезиларли даражада ёмонлашиши кузатилади. Бунда гигиеник индекс (ГИ) 2,2 дан 3,6 баллгача кўтарилиб, тиш эмалининг резистентлиги пасаяди ва кариес интенсивлиги (КЭ) 5,8 дан 12,6 гача (циррозда) ортади.

Тадқиқотда қўлланилган "Ротокан" препарати ва физиотерапия (С витамини электрофорези ва УВЧ) ни ўз ичига олган комплекс ёндашув анъанавий усулга нисбатан юқори самарадорликни кўрсатди. Хусусан, жигар циррози бўлган беморларда ПМА индекси анъанавий даводан кейинги 48,2% га нисбатан комплекс даводан сўнг 24,6% гача икки баробар самаралироқ пасайди ва тиш эмалининг чидамлилигини тиклашда статистик ишончли ижобий натижаларга эришилди.

Адабиётлар рўйхати:

1. Аронбаев Д. и соавт. Диагностическая ценность протеома слюны. Мини-обзор // Sciences of Europe. – 2024. – С. 8-10.
2. Булаева А.М. и соавт. Влияние болезней пародонта на функцию печени // FORCIPE. – 2020. – Т. 3. – С. 929.
3. Булатова И.А. Фиброз при хронических заболеваниях печени: механизмы развития, клинико-лабораторная оценка прогрессирования и мониторинг терапии: автореф. дис. ... д-ра мед. наук. – Пермь. – 2016. – С. 49.
4. Гонтарев С.Н. и соавт. Особенности лечения слизистой оболочки полости рта при вирусной инфекции с использованием фитопрепаратов (обзор литературы) // Вестник новых медицинских технологий. Электронное издание. – 2023. – Т. 17. – № 3. – С. 48-54. doi:10.24412/2075-4094-2023-3-1-8
5. Даминова Ш.Б. и соавт. Состояние стоматологического статуса у женщин с остеопорозом в периоде менопаузы // Проблемы биологии и медицины. – 2022. – № 3. – С. 32-34.
6. Даминова Ш.Б. и соавт. Оценка факторов риска генерализованного остеопороза у женщин и определение их влияния на органы полости рта // Новый день в медицине. – 2022. – № 7(45). – С. 146-149.
7. Еремин А.В. и соавт. Патология пародонта у пациентов с циррозами печени // Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология. – 2022. – № 3(199). – С. 15-25.
8. Ибрагимов М.А. и соавт. Эндокринные заболевания в практике семейного врача и стоматолога // Sciences of Europe. – 2023. – № 127. – С. 49-51.
9. Ивашкин В.Т. Пропедевтика внутренних болезней: учебник. – 2-е изд. // ГЭОТАР-Медиа. – 2023. – С. 936.
10. Ивашкин В.Т. и соавт. Клинические рекомендации Российского общества по изучению печени и Российской гастроэнтерологической ассоциации по лечению осложнений цирроза печени // Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии. – 2016. – Т. 26. № 4. – С. 71-102.

Иктибос учун: Казакова Н.Н., Курамбаева Н.Я. Жигар сурункали диффуз касалликлари бўлган беморларда оғиз бўшлиғи патологияларини комплекс даволаш ва профилактика қилиш самарадорлиги // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2026. – № 4(24). – Б. 735–739. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19662652>

ДИАБЕТИК ЭНЦЕФАЛОПАТИЯДА КОГНИТИВ ФУНКЦИЯЛАР БУЗИЛИШИНING НЕЙРОФИЗИОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ

Ходжиева Д.Т., Яхёев М.С.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Ушбу мақолада диабетик энцефалопатияда кузатиладиган когнитив бузилишларнинг нейробиологик асослари таҳлил қилинди. Мақсад — когнитив пасайишнинг асосий нейробиологик механизмлари, электроэнцефалографик ва чақирилган потенциал маркерлари, шунингдек нейровизуализацияда кузатиладиган ўзгаришларни тизимлаштириш. Таҳлил натижалари диққат, ишчи хотира, ижро функцияси ва ахборотни қайта ишлаш тезлигининг пасайиши диабетда эрта намоён бўлиши мумкинлигини кўрсатади. EEGда секин тўлқинлар фаоллигининг ошиши, P300 латентлигининг узайиши ва айрим кортикал-лимбик зоналарда функционал пасайиш муҳим диагностик белги ҳисобланади. Когнитив скринингни нейробиологик баҳолаш билан бирга қўллаш диабетик энцефалопатияни эрта аниқлаш ва беморларни кузатиш самарадорлигини оширади.

Калим сўзлар: диабетик энцефалопатия, когнитив бузилиш, нейробиология, EEG, ERP, P300, нейровизуализация, 2-тур қандли диабет.

NEUROPHYSIOLOGICAL FEATURES OF COGNITIVE DYSFUNCTION IN DIABETIC ENCEPHALOPATHY

Khodzhiyeva D.T., Yakhyoev M.S.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sina, Bukhara, Uzbekistan

Resume. This article analyzes the neurophysiological basis of cognitive impairment in diabetic encephalopathy. The aim is to systematize the main neurobiological mechanisms of cognitive decline, electroencephalographic and event-related potential markers, as well as neuroimaging changes associated with diabetes. The review indicates that impairments in attention, working memory, executive function, and processing speed may appear at relatively early stages of the disease. Increased slow-wave activity on EEG, prolonged P300 latency, and functional reduction in selected cortico-limbic regions are considered important diagnostic indicators. The combined use of cognitive screening and neurophysiological assessment may improve early detection of diabetic encephalopathy and enhance patient monitoring.

Keywords: diabetic encephalopathy, cognitive impairment, neurophysiology, EEG, ERP, P300, neuroimaging, type 2 diabetes mellitus.

НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ ПРИ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ

Ходжиева Д.Т., Яхёев М.С.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. В статье проанализированы нейробиологические основы когнитивных нарушений при диабетической энцефалопатии. Цель работы — систематизировать основные нейробиологические механизмы когнитивного снижения, электроэнцефалографические и вызванные потенциалы как маркеры, а также изменения, выявляемые методами нейровизуализации. Результаты анализа показывают, что снижение внимания, рабочей памяти, исполнительных функций и скорости переработки информации может проявляться уже на ранних этапах диабета. Повышение активности медленных волн на ЭЭГ, удлинение латентности P300 и функциональное снижение в отдельных кортикально-лимбических зонах рассматриваются как важные диагностические признаки. Совместное применение когнитивного скрининга и нейробиологической оценки повышает эффективность раннего выявления диабетической энцефалопатии и мониторинга пациентов.

Ключевые слова: диабетическая энцефалопатия, когнитивные нарушения, нейробиология, ЭЭГ, ERP, P300, нейровизуализация, сахарный диабет 2 типа.

e-mail: yahyoyev.mehriddin@bsmi.uz

Кириш. Қандли диабет бутун организмга таъсир этувчи сурункали метаболик касаллик бўлиб, унинг неврологик асоратлари орасида диабетик энцефалопатия алоҳида ўрин тутади. Ушбу ҳолат

марказий асаб тизимида юзага келадиган тузилмавий, метаболик ва функционал ўзгаришлар мажмуаси бўлиб, амалиётда хотиранинг сусайиши, диққат барқарорлигининг пасайиши, ижро функциясининг издан чиқиши, руҳий чарчоқ ва ахборотни қайта ишлаш тезлигининг секинлашуви билан намоён бўлади. Сўнгги адабиётларда диабетга боғлиқ когнитив дисфункция “унутилган асорат” сифатида ҳам баҳоланмоқда, чунки у беморнинг ўз-ўзини бошқариш қобилиятига, дори қабул қилиш интизомига ва ҳаёт сифатига бевосита таъсир қилади.

Когнитив нуқсонлар диабетнинг ҳам 1-турида, ҳам 2-турида учраши мумкин, бироқ 2-тур диабетда уларнинг клиник аҳамияти кенгроқ ўрганилган. Бунга сабаб ушбу турда ёш омиллари, семириш, артериал гипертензия, дислипидемия ва томирли хавф омилларининг қўшилиб келиши ҳисобланади. Натижада миёдаги глюкоза метаболизми, нейронлараро сигнал узатиш ва цереброваскуляр реактивлик издан чиқади. Шу боис диабетик энцефалопатияни фақат субъектив шикоятлар асосида эмас, балки нейропсихологик ва нейрофизиологик кўрсаткичлар мажмуаси орқали баҳолаш долзарб вазифадир.

Материаллар ва методлар. Мақола адабиётлар таҳлили шаклида тайёрланди. Таҳлилга 2015-2026 йилларда эълон қилинган обзор мақолалар, нейровизуализация мета-таҳлиллари, EEG/ERP тадқиқотлари ҳамда диабет бўйича клиник тавсиялар жалб этилди. Манбаларда қуйидаги йўналишларга алоҳида эътибор қаратилди: 1) диабетда когнитив бузилишнинг асосий доменлари; 2) ушбу бузилишларнинг патогенетик механизмлари; 3) миёнинг биоэлектрик фаоллиги ва чақирилган потенциалларидаги ўзгаришлар; 4) MRI/fMRI асосида кузатилган функционал ва тузилмавий қайта қурилиш. Таҳлил синтез усулида олиб борилиб, клиник жиҳатдан аҳамиятли хулосалар ажратилди.

Натижалар ва муҳокама. Адабиётлар таҳлили диабетда энг кўп зарар кўрадиган когнитив соҳаларга диққат, ишчи хотира, ижро функцияси, психомотор тезлик ва эпизодик хотира киришини кўрсатади. Айрим тадқиқотларда нутқий ва визуал хотира ҳам пасайиши таъкидланган. Бу ўзгаришлар, одатда, кескин деменция тарзида эмас, балки енгил ёки ўртача даражадаги, лекин функционал аҳамиятга эга пасайиш кўринишида кечади. Диабетли беморда терапия режими мураккаблашган сари, ана шу енгил кўринган когнитив нуқсонлар гликемик назоратни қийинлаштириши мумкин.

Патогенетик жиҳатдан когнитив дисфункция бир омил билан эмас, балки ўзаро боғлиқ бир нечта механизмлар билан белгиланади. Биринчидан, сурункали гипергликемия оқсилларнинг гликацияси ва охириги гликация маҳсулотлари тўпланишига олиб келади. Бу эндотелий дисфункцияси, қон-мия тўсиғининг зарарланиши ва микроциркуляциянинг ёмонлашувига сабаб бўлади. Иккинчидан, инсулинрезистентлик миё тўқимасида инсулин сигнализациясини издан чиқаради, бу эса синаптик пластиклик ва гиппокампага боғлиқ хотира жараёнларига салбий таъсир қилади. Учинчидан, оксидловчи стресс ва нейрояллиғланиш нейронлар ҳамда глиа хужайраларининг функциясини издан чиқариб, нейродегенератив жараёнларни тезлаштириши мумкин.

Нейрофизиологик текширувлар орасида EEG алоҳида аҳамият касб этади. Диабетли беморларда паст частотали секин тўлқинлар - айниқса тета ва дельта диапазонидаги қувватнинг ошиши, бета ва гамма фаоллигининг пасайиши ҳақида маълумотлар мавжуд. Бу ҳолат кортикал ишлов бериш самарадорлиги пасайганини ва нейрон тармоқларининг синхронлиги ўзгарганини кўрсатади. Кўпгина муаллифлар секин тўлқинлар фаоллигининг кучайишини диққат ва ижро назорати билан боғлиқ тармоқлар фаолиятининг сусайиши билан изоҳлайдилар.

Чақирилган потенциаллар, хусусан P300 компоненти диабетик энцефалопатияни баҳолашда сезгир кўрсаткичлардан бири ҳисобланади. Адабиётларда P300 латентлигининг узайиши когнитив ишлов бериш вақти чўзилганини, амплитуда пасайиши эса диққат ресурслари ва стимулни баҳолаш самарадорлиги камайганини акс эттиради. Шунингдек, айрим ишлар N100 ва бошқа эрта сенсор компонентларда ҳам ўзгаришлар борлигини кўрсатади. Демак, диабет нафақат юқори когнитив жараёнларга, балки ахборотни дастлабки қайта ишлаш босқичларига ҳам таъсир ўтказиши мумкин.

Нейровизуализация тадқиқотлари EEG/ERP натижаларини морфофункционал жиҳатдан тўлдиради. Сўнгги мета-таҳлиллар 2-тур диабетга боғлиқ когнитив бузилишда олдинги сингулат кирраси, лингуал гирус, юқори чакка бурмаси, энса соҳалари, гиппокамп ва парагиппокампа тузилмаларда ўзгаришлар кузатилишини кўрсатди. Айрим соҳаларда фаолликнинг ортиши компенсатор механизм сифатида талқин қилинади, бошқаларида эса фаоллик ва кулранг модда ҳажмининг пасайиши нейрон тармоқлари заифлашганидан далолат беради. Айниқса визуал ишлов бериш ва хотира билан боғлиқ соҳаларнинг зарарланиши диабетик когнитив бузилишнинг клиник профилига мос келади.

Клиник нуқтаи назардан, MoCA, MMSE ва Mini-Cog каби скрининг воситалари когнитив пасайишни аниқлашда фойдали бўлса-да, улар барча ҳолатларда етарли сезгир эмас. Шунинг учун когнитив тестлар EEG, ERP ёки нейровизуализация билан қўшиб қўлланганда эрта аниқлаш имконияти

ошади. Айниқса узоқ давом этган диабет, юқори HbA1c, такрорий гипогликемия, томирли хавф омиллари ва депрессия симптомлари мавжуд беморларда бундай комплекс ёндашув жуда муҳим.

Хулоса:

1. Диабетик энцефалопатияда когнитив бузилишлар асосан диққат, хотира, ижро функцияси ва ахборотни қайта ишлаш тезлигида намоён бўлади.
2. Ушбу ўзгаришлар сурункали гипергликемия, инсулинрезистентлик, микроангиопатия, нейрояллиғланиш ва оксидловчи стресснинг қўшма таъсири натижасидир.
3. EEGда тета/дельта фаоллигининг ошиши ва юқори частотали фаолликнинг пасайиши кортикал дисфункциянинг эрта белгиси бўлиши мумкин.
4. ERPда P300 латентлигининг узайиши ҳамда амплитуданинг пасайиши когнитив ишлов бериш самарадорлиги камайганини кўрсатади.
5. MRI/fMRI тадқиқотлари олдинги сингулат, лингуал, гиппокампал ва чакка-энса тармоқларида муҳим ўзгаришларни аниқламоқда.
6. Когнитив скринингни нейрофизиологик маркерлар билан биргаликда қўллаш диабетик энцефалопатияни эрта аниқлаш ва кузатиш самарадорлигини оширади.

Адабиётлар рўйхати:

1. American Diabetes Association. 13. Older Adults: Standards of Care in Diabetes-2026. Diabetes Care. 2026;49(Suppl. 1):S277-S290.
2. Yu X., et al. Diabetes-related cognitive impairment: Mechanisms, diagnosis, and treatment. Frontiers in Endocrinology. 2025;16:1502697.
3. Dai P., Yu Y., Sun Q., et al. Abnormal changes of brain function and structure in patients with T2DM-related cognitive impairment: a neuroimaging meta-analysis and an independent validation. Nutrition & Diabetes. 2024;14:91.
4. Sola T., et al. The Effects of Type 2 Diabetes on Cognitive Performance. International Journal of Behavioral Medicine. 2024.
5. Moheet A., Mangia S., Seaquist E.R. Impact of diabetes on cognitive function and brain structure. Annals of the New York Academy of Sciences. 2015;1353(1):60-71.
6. Baskaran A., Milev R., McIntyre R.S. A review of electroencephalographic changes in diabetes mellitus in relation to major depressive disorder. Neuropsychiatric Disease and Treatment. 2013;9:143-153.
7. Liao X., et al. A Narrative Review on Cognitive Impairment in Type 2 Diabetes. Biomedicines. 2025;13(2):473.
8. Kan W., et al. A review of type 2 diabetes mellitus and cognitive impairment. Frontiers in Endocrinology. 2025;16:1624472.
9. Randvali M., et al. The Main Risk Factors in Type 2 Diabetes for Cognitive Impairment, Depression, and Psychosocial Problems. Diabetology. 2024;5(1):4.
10. Sjolholm A., et al. Cognitive dysfunction in diabetes - the forgotten complication? Frontiers in Clinical Diabetes and Healthcare. 2025.

Иқтибос учун: Ходжиева Д.Т., Яхёев М.С. Диабетик энцефалопатияда когнитив функциялар бузилишининг нейрофизиологик хусусиятлари // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2026. – № 4(24). – Б. 740–742. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19662770>

**IMMUNE DYSREGULATION IN INFECTIOUS PROCESSES AND METHODS FOR ITS
CORRECTION****Hamidova A.I.**

Navoi State University, Navoi, Uzbekistan

Resume. Immune dysregulation during infectious processes constitutes a profound disruption in the coordinated protective response of the immune system against invading pathogens. This dysregulation manifests as either an exaggerated hyperinflammatory reaction, often termed cytokine storm, or a subsequent state of profound immunosuppression that impairs pathogen clearance and predisposes to secondary infections. Such imbalances contribute significantly to tissue damage, multiorgan dysfunction, and elevated mortality rates observed in conditions like bacterial sepsis and severe viral infections. The present article provides a comprehensive examination of the underlying mechanisms driving immune dysregulation in infectious diseases, encompassing the roles of innate immune activation through pattern recognition receptors, overproduction of proinflammatory cytokines such as interleukin six and tumor necrosis factor alpha, as well as the later exhaustion of adaptive immune cells including T lymphocytes. Particular attention is devoted to the biphasic nature of the response, where initial hyperinflammation transitions into immunoparalysis. Correction strategies are critically evaluated, including cytokine-specific blockers, immune checkpoint inhibitors, recombinant cytokines such as interleukin seven and granulocyte macrophage colony stimulating factor, and emerging personalized immunomodulatory approaches guided by biomarkers. The analysis draws upon recent scientific literature to highlight the effectiveness, timing considerations, and limitations of these interventions. Findings suggest that tailored, biomarker-driven immunomodulation can restore immune homeostasis, reduce complications, and improve clinical outcomes in patients with severe infectious processes. This work underscores the necessity of precision medicine in managing immune dysregulation and identifies promising avenues for future research and therapeutic development in the fields of immunology and infectious diseases. The global burden of life-threatening infections continues to emphasize the urgency of advancing strategies that address immune imbalance effectively.

Key words : infectious processes, immune dysregulation, cytokine storm, sepsis, viral infections, hyperinflammation, immunosuppression, immunomodulators, immune checkpoints, correction methods, personalized immunotherapy

**ИНФЕКЦИОН ЖАРАЁНЛАРДА ИММУН ДИСРЕГУЛЯЦИЯ ВА УНИ ТУЗАТИШ
УСУЛЛАРИ****Ҳамидова А.И.**

Навоий давлат университети, Навоий ш., Ўзбекистон

Резюме. Инфекцион жараёнлар давомида иммун дисрегуляция иммун тизимининг кириб келаётган патогенларга қарши мувофиқлаштирилган ҳимоя жавобининг чуқур бузилиши ҳисобланади. Ушбу ҳолат ҳаддан ташқари кучли гипертенсион реакция, яъни “цитокин бўрони” ёки кейинчалик юзага келадиган чуқур иммуносупрессия билан намоён бўлади. Бу эса патогенларни йўқ қилишни қийинлаштириб, иккиламчи инфекциялар хавфини оширади. Бундай номуносивликлар тўқималарнинг шикастланиши, кўп аъзоли этишмовчилик ва бактериал сепсис ҳамда оғир вирусли инфекцияларда кузатиладиган юқори ўлим кўрсаткичларига сезиларли ҳисса қўшади. Мазкур мақолада инфекция касалликларда иммун дисрегуляциянинг асосий механизмлари кенг ёритилган бўлиб, улар қаторига туғма иммунитетнинг паттерни таниб олувчи рецепторлар орқали фаоллашуви, интерлейкин-6 ва ўсма некроз омил аλфа каби пролягизланиш цитокинларининг ортқча ишлаб чиқарилиши, шунингдек, Т-лимфоцитлар каби адаптив иммун ҳужайраларнинг кейинги босқичда ҳолдан тойиши киради. Айниқса, жавобнинг икки босқичли хусусияти — дастлабки гипертенсиондан иммунопаралич ҳолатига ўтиш жараёни алоҳида таъкидланади. Тузатиш стратегиялари сифатида цитокинларга қарши блокаторлар, иммун назорат нуқталари ингибиторлари, интерлейкин-7 ва гранулоцит-макрофаг колониясини рағбатлантирувчи омил каби рекомбинант цитокинлар, шунингдек, биомаркерларга асосланган янги шахсийлаштирилган иммуномодуляция ёндашувлар таҳлил қилинади. Таҳлил замонавий илмий манбаларга асосланиб, ушбу усулларнинг самарадорлиги, қўллаш вақти ва чекловларини ёритади. Натижалар шуни кўрсатадики, биомаркерларга асосланган индивидуал ёндашув орқали иммуномодуляция иммун гомеостазини тиклаш, асоратларни камайтириш ва оғир инфекция жараёнларга чалинган беморларда клиник натижаларни яхшилаш имконини беради. Уш-

бу иш иммун дисрегуляцияни бошқаришда аниқлик тиббиётининг муҳимлигини таъкидлайди ҳамда иммунология ва инфекция касалликлар соҳасида келгусидаги тадқиқотлар ва даволаш усуллари ривожлантириш учун истиқболли йўналишларни белгилайди. Ҳаёт учун хавфли инфекцияларнинг глобал юкламаси иммун мувозанатни самарали тиклаш стратегияларини ишлаб чиқиш зарурлигини яна бир бор кўрсатмоқда.

Калит сўзлар: инфекциян жараёнлар, иммун дисрегуляция, цитокин бўрони, сепсис, вирусли инфекциялар, гипертвоспалация, иммуносупрессия, иммуномодуляторлар, иммун назорат нуқталари, тузатиш усуллари, шахсийлаштирилган иммунотерапия.

ИММУННАЯ ДИСРЕГУЛЯЦИЯ ПРИ ИНФЕКЦИОННЫХ ПРОЦЕССАХ И МЕТОДЫ ЕЁ КОРРЕКЦИИ

Хамидова А.И.

Наваийский государственный университет, г. Наваи, Узбекистан

Резюме. Иммунная дисрегуляция при инфекционных процессах представляет собой глубокое нарушение согласованного защитного ответа иммунной системы на внедрение патогенов. Это состояние проявляется либо чрезмерной гипертвоспалительной реакцией, часто называемой «цитокиновым штормом», либо последующим состоянием выраженной иммуносупрессии, которое ухудшает элиминацию патогенов и повышает риск вторичных инфекций. Подобные нарушения вносят значительный вклад в повреждение тканей, развитие полиорганной недостаточности и высокий уровень смертности, наблюдаемый при таких состояниях, как бактериальный сепсис и тяжёлые вирусные инфекции. В данной статье представлено всестороннее исследование механизмов, лежащих в основе иммунной дисрегуляции при инфекционных заболеваниях, включая роль активации врождённого иммунитета через рецепторы распознавания образов, избыточную продукцию провоспалительных цитокинов, таких как интерлейкин-6 и фактор некроза опухоли альфа, а также последующее истощение клеток адаптивного иммунитета, включая Т-лимфоциты. Особое внимание уделяется двухфазному характеру ответа, при котором начальная гипертвоспалительная реакция сменяется состоянием иммунопаралича. Рассматриваются стратегии коррекции, включая блокаторы цитокинов, ингибиторы иммунных контрольных точек, рекомбинантные цитокины, такие как интерлейкин-7 и гранулоцитарно-макрофагальный колониестимулирующий фактор, а также новые персонализированные иммуномодулирующие подходы, основанные на биомаркерах. Анализ основан на современных научных данных и подчёркивает эффективность, временные аспекты и ограничения данных методов лечения. Полученные результаты свидетельствуют о том, что индивидуализированная иммуномодуляция, основанная на биомаркерах, способна восстановить иммунный гомеостаз, снизить частоту осложнений и улучшить клинические исходы у пациентов с тяжёлыми инфекционными процессами. Данная работа подчёркивает необходимость применения принципов прецизионной медицины при лечении иммунной дисрегуляции и определяет перспективные направления дальнейших исследований и разработки терапевтических подходов в области иммунологии и инфекционных заболеваний. Глобальное бремя жизнеугрожающих инфекций подчёркивает актуальность разработки эффективных стратегий коррекции иммунного дисбаланса.

Ключевые слова: инфекционные процессы, иммунная дисрегуляция, цитокиновый шторм, сепсис, вирусные инфекции, гипертвоспаление, иммуносупрессия, иммуномодуляторы, иммунные контрольные точки, методы коррекции, персонализированная иммунотерапия.

Introduction. Infectious processes arise when pathogenic microorganisms such as bacteria, viruses, or fungi invade the human body, multiply, and trigger a complex cascade of host responses aimed at containment and elimination. The immune system plays a central role in this defense, integrating innate and adaptive components to recognize pathogen associated molecular patterns and damage associated molecular patterns through specialized receptors. Upon detection, immune cells release signaling molecules that orchestrate inflammation, recruit additional effectors, and ultimately clear the threat while promoting tissue repair. Nevertheless, in numerous severe infections, this finely tuned response becomes dysregulated, leading to either excessive activation that causes collateral damage or inadequate function that allows persistent infection and secondary complications. Immune dysregulation in infectious contexts is characterized by two main overlapping phases. The early hyperinflammatory phase involves massive release of proinflammatory mediators, resulting in systemic inflammation, endothelial dysfunction, coagulopathy, and potential progression to acute respiratory distress syndrome or multiorgan failure. This phenomenon, frequently referred to as cytokine storm, occurs when negative feedback mechanisms fail to limit the amplitude of the immune reaction.

In contrast, the later immunosuppressive phase features exhaustion and apoptosis of key immune cells, reduced antigen presentation, and increased expression of inhibitory receptors, which collectively impair host defense and heighten vulnerability to opportunistic pathogens. These phases often coexist dynamically rather than occurring in strict sequence, creating a state of immunodynamic disruption that complicates clinical management. Factors contributing to immune dysregulation include the virulence and burden of the pathogen, host genetic predispositions, age, comorbidities, and environmental influences. For example, certain viruses may delay or suppress type one interferon responses, allowing unchecked viral replication that subsequently triggers compensatory hyperinflammation. Bacterial components such as lipopolysaccharide potentially activate toll like receptors on macrophages and neutrophils, amplifying cytokine production through nuclear factor kappa B and mitogen activated protein kinase pathways. In viral infections like severe acute respiratory syndrome coronavirus two disease, impaired interferon signaling combined with persistent antigen stimulation drives both excessive inflammation and T cell exhaustion. The clinical consequences of untreated immune dysregulation are severe, including prolonged intensive care stays, higher mortality, and long term sequelae. Timely recognition and correction of these imbalances therefore represent critical therapeutic goals. Current standard care focuses on antimicrobial therapy and supportive measures, yet adjunctive immunomodulation is increasingly recognized as essential for improving outcomes in selected patients. This article systematically reviews the mechanisms of immune dysregulation across major infectious processes, evaluates available and investigational correction methods, and discusses the shift toward personalized, biomarker guided strategies. By synthesizing evidence from recent studies, the work aims to provide a robust framework for clinicians and researchers seeking to optimize immune management in infectious diseases. The introduction of novel biologic agents and precision tools holds substantial promise for mitigating the devastating effects of immune imbalance while preserving protective functions.

Literature review. Extensive scientific literature documents the phenomenon of immune dysregulation in severe infectious diseases, with particular emphasis on sepsis and viral pneumonias. In sepsis, the immune response is profoundly altered at multiple levels, affecting cell production, effector functions, and survival. Early stages feature hyperactivation of innate immune cells triggered by pathogen associated molecular patterns and damage associated molecular patterns, leading to cytokine storm and tissue injury. Subsequent phases involve reprogramming of monocytes, neutrophil dysfunction, and adaptive immune cell exhaustion, culminating in a state of immunoparalysis that promotes secondary infections.

Studies on viral infections, notably severe acute respiratory syndrome coronavirus two disease, reveal similar patterns of dysregulation. Delayed or inadequate type one interferon production allows viral persistence, while later excessive release of interleukin six, tumor necrosis factor alpha, and other mediators drives hyperinflammation and acute respiratory distress syndrome. Single cell analyses have identified expanded populations of highly inflammatory monocytes and exhausted CD eight positive T cells in critical cases, alongside reduced regulatory T cells and conventional dendritic cells type two, further disrupting immune homeostasis.

The cytokine storm itself arises from uncontrolled activation of signaling cascades, including nuclear factor kappa B and Janus kinase signal transducer and activator of transcription pathways. Positive feedback loops involving interleukin six and interferon gamma amplify the response, while failure of regulatory mechanisms such as interleukin ten signaling and decoy receptors permits escalation. In bacterial sepsis, lipopolysaccharide driven toll like receptor four activation on macrophages initiates this cascade, with natural killer cells and other effectors contributing additional cytokines. Comparative analyses indicate that while cytokine levels in viral diseases may be lower than in classic cytokine release syndromes, the resulting immune pathology remains clinically significant.

Regarding correction approaches, literature highlights both anti inflammatory and immunostimulatory strategies tailored to disease phase. Cytokine blockers such as interleukin six receptor antagonists have demonstrated survival benefits in hyperinflammatory states by dampening excessive signaling without completely abolishing protective responses. Interleukin one pathway inhibitors similarly mitigate inflammation in selected cohorts. In the immunosuppressive phase, recombinant interleukin seven has shown capacity to reverse lymphopenia, promote T cell proliferation and survival via B cell lymphoma two family proteins, and restore interferon gamma production without exacerbating inflammation. Granulocyte macrophage colony stimulating factor and interferon gamma supplementation aim to enhance monocyte and dendritic cell function.

Immune checkpoint inhibitors targeting programmed death one or cytotoxic T lymphocyte associated protein four pathways offer another avenue for reversing T cell exhaustion in later stages. Preclinical and early clinical data suggest these agents can restore effector functions, though careful timing is required to avoid worsening hyperinflammation. Combination regimens, such as interleukin seven with checkpoint

blockade or dual cytokine modulation, are under investigation to address the biphasic nature of dysregulation. Emerging modalities include mesenchymal stromal cells, intravenous immunoglobulin, and nanotechnology based targeted delivery systems that enable precise modulation of specific pathways.

Biomarker guided personalization is a recurring theme. Monitoring lymphocyte counts, monocyte human leukocyte antigen DR expression, cytokine profiles, and checkpoint molecule levels helps stratify patients and select appropriate interventions. Literature consistently emphasizes that one size fits all approaches have largely failed in past trials, underscoring the value of immune profiling. Overall, the reviewed studies provide strong mechanistic insights and preliminary clinical evidence supporting phased, individualized immunomodulation as a viable strategy to improve outcomes in infectious processes characterized by immune dysregulation.

Discussion. Immune dysregulation in infectious processes follows a dynamic, often overlapping biphasic pattern that demands nuanced therapeutic consideration. The hyperinflammatory phase is initiated when pathogens or their components engage pattern recognition receptors on innate cells, activating transcription factors that drive rapid and excessive production of proinflammatory cytokines. This response, while intended to contain infection, can overwhelm regulatory checkpoints, leading to endothelial activation, vascular leak, coagulopathy, and organ damage. In parallel or subsequently, persistent antigen stimulation and inflammatory milieu induce exhaustion programs in T cells, characterized by upregulation of inhibitory receptors such as programmed death one and reduced effector cytokine secretion. Monocytes may shift toward an anti inflammatory or tolerogenic phenotype, further impairing antigen presentation and adaptive immunity. The net result is a state of immunodynamic disruption where both excessive and insufficient immune activity coexist, complicating straightforward intervention.

In bacterial sepsis, lipopolysaccharide and other bacterial products potently stimulate toll like receptor four, triggering nuclear factor kappa B dependent cytokine release and positive feedback involving natural killer cells and neutrophils. Viral infections frequently exhibit defective early interferon responses, permitting higher pathogen loads that later fuel hyperinflammation through alternative pathways. Single cell transcriptomic data confirm that critical patients display monocyte driven interleukin related gene overexpression alongside T cell exhaustion signatures, highlighting cellular heterogeneity as a key driver of variable disease trajectories.

Correction methods must therefore be phase specific and individualized. During predominant hyperinflammation, agents such as interleukin six receptor antagonists effectively reduce systemic cytokine levels, alleviate organ stress, and improve survival in appropriately selected patients, as evidenced by large platform trials. Interleukin one blockade provides complementary benefit in cases with prominent inflammasome activation. These interventions aim to interrupt deleterious amplification loops without fully compromising antimicrobial defense. In the immunosuppressive phase, immunostimulatory cytokines like recombinant interleukin seven counteract lymphocyte apoptosis, expand T cell populations, and enhance functional recovery through mammalian target of rapamycin pathway modulation. Clinical observations indicate sustained increases in circulating CD four and CD eight positive T cells following interleukin seven administration, correlating with reduced secondary infection risk. Granulocyte macrophage colony stimulating factor may similarly support myeloid cell function in cases of monocyte deactivation. Immune checkpoint blockade represents a targeted means to reinvigorate exhausted T cells. By disrupting programmed death one programmed death ligand one interactions, these inhibitors can restore proliferative capacity and cytokine production, though their use requires caution in early hyperinflammatory stages to prevent exacerbation of tissue damage. Preclinical models support combination strategies that simultaneously address inflammation and exhaustion, such as pairing interleukin six inhibition with programmed death one blockade. Challenges persist, including optimal timing, dosing, patient selection, and potential adverse effects such as secondary infections or rebound inflammation. Biomarker panels incorporating lymphocyte counts, human leukocyte antigen DR expression on monocytes, ferritin, interleukin six levels, and checkpoint molecule expression offer practical tools for guiding therapy. Personalized approaches that integrate immune profiling with clinical parameters hold the greatest promise for balancing risks and benefits. Future directions include refinement of nanotechnology for targeted delivery, exploration of cell based therapies, and development of rapid diagnostic assays for immune status. The discussion underscores that successful management of immune dysregulation in infectious processes requires moving beyond broad immunosuppression or stimulation toward precision immunomodulation informed by real time host response assessment. Continued translational research integrating mechanistic insights with clinical trial data will be essential to realize the full potential of these strategies.

Results. Synthesis of scientific evidence indicates that immune dysregulation affects a substantial proportion of patients with severe infectious processes, including bacterial sepsis and critical viral infections.

In sepsis cohorts, early hyperactivation frequently elevates proinflammatory cytokine concentrations several-fold above baseline, correlating with progression to multiorgan dysfunction and mortality rates approaching 70% in those exhibiting full cytokine storm features. Lymphocyte counts decline markedly in both sepsis and critical viral infections, with reductions exceeding 50% in many critical cases, accompanied by increased expression of exhaustion markers (e.g., PD-1) on remaining T cells. Monocyte reprogramming and diminished HLA-DR expression further characterize the immunosuppressive shift, associating with higher rates of secondary infections and prolonged recovery.

Application of correction methods yields measurable benefits when aligned with the immune phase. Interleukin-6 (IL-6) pathway inhibition has been linked to reduced inflammatory markers by 30–40% and improved survival in hyperinflammatory subsets, particularly when initiated within defined windows of disease progression. Recombinant interleukin-7 (IL-7) therapy consistently restores circulating lymphocyte numbers, with increases of 2- to 4-fold observed in treated patients, alongside enhanced interferon-gamma production and shortened duration of lymphopenia. These immunologic improvements translate to trends toward lower secondary infection incidence and better overall recovery metrics in pilot studies. Immune checkpoint modulation demonstrates restoration of T-cell proliferative responses in ex vivo assays and early clinical settings, though larger outcome data remain emerging.

Biomarker-guided selection enhances efficacy. Patients stratified by high IL-6 or ferritin combined with low lymphocyte counts show greater response to combined anti-inflammatory and immunostimulatory regimens. Combination approaches appear superior to monotherapy in addressing biphasic dysregulation, with preliminary reports indicating additive effects on survival and organ function preservation. Adverse events, including transient cytokine fluctuations or increased infection risk, occur but are generally manageable with monitoring. Overall, individualized immunomodulatory interventions are associated with survival improvements ranging from 20 to 35% in responsive cohorts compared with standard care alone, although heterogeneity across studies necessitates cautious interpretation. These results support the feasibility and clinical value of targeted correction of immune dysregulation in infectious diseases while highlighting the ongoing need for refined protocols and larger confirmatory trials.

Table 1.

Key immune parameters in infectious processes and effects of immunomodulatory interventions (synthesized from clinical studies in sepsis and severe viral infections)

Parameter / Indicator	Hyperinflammation Phase (Cytokine Storm)	Immunosuppression Phase (Immunoparalysis)	Effect of IL-6 Pathway Blockade (e.g., Tocilizumab)	Effect of Recombinant IL-7 Therapy	Overall Outcome with Biomarker-Guided Approach
IL-6 Levels (pg/mL)	Markedly elevated (>400–10,000+)	Moderate or decreased	Reduction by 30–40%, decreases organ stress	Does not exacerbate inflammation	Reduces mortality risk by 20–35%
Lymphocyte Count ($\times 10^9/L$)	Decreased (often <1.0)	Severe lymphopenia (<0.5–0.8)	Limited direct effect	2–4-fold increase (CD4+ & CD8+ T cells)	Reduces secondary infections
Monocyte HLA-DR Expression (%)	Normal or elevated	Markedly decreased (<70–80%)	Indirect improvement possible	Supports myeloid cell function	Key biomarker for patient stratification
T-cell Exhaustion (PD-1 Expression)	Moderate	Strongly elevated	Requires caution in early phase	Restores T-cell proliferation	Effective in combination
Mortality / Organ Dysfunction Rate	High (up to 50–70% in cytokine storm)	High due to secondary infections	Reduces mortality in hyperinflammatory subsets	Shortens lymphopenia, accelerates recovery	20–35% survival benefit in selected patients

Table footnote: Data represent averaged ranges synthesized from platform trials (e.g., REMAP-CAP), IL-7 studies, and immune profiling research. Individual values vary; therapy should be guided by biomarkers such as IL-6, lymphocyte count, and mHLA-DR.




Figure 1. Schematic representation of the biphasic immune dysregulation in severe infectious processes and the phase-specific effects of immunomodulatory correction strategies.

This figure visually summarizes the dynamic biphasic nature of immune dysregulation and demonstrates how timely, biomarker-driven interventions (IL-6 blockade in the early phase and IL-7 in the later phase) can help restore immune homeostasis.

Conclusion. Immune dysregulation represents a central pathophysiological feature of severe infectious processes, driving both acute life threatening complications and delayed recovery through hyperinflammation and immunosuppression. Comprehensive analysis of mechanisms reveals a complex, dynamic interplay between innate overactivation and adaptive immune failure that varies by pathogen, host factors, and disease stage. Correction strategies encompassing cytokine blockade, recombinant immunostimulatory cytokines, immune checkpoint inhibitors, and biomarker driven personalization offer substantial potential to restore balance and improve patient outcomes. Evidence accumulated to date demonstrates that timely, tailored immunomodulation can mitigate organ damage, reduce secondary infections, and enhance survival when integrated with antimicrobial and supportive therapies. Future progress depends on advancing rapid immune profiling technologies, optimizing combination regimens, and conducting well designed trials that account for patient heterogeneity. Clinicians are encouraged to incorporate immune status assessment into routine management of severe infections to guide therapeutic decisions. Ultimately, the shift toward precision immunomodulation in infectious diseases promises to transform care by addressing the host response as actively as the pathogen itself. Continued interdisciplinary research will be vital to refine these approaches and extend their benefits to broader populations affected by life threatening infections.

References:

1. Angriman, F., Ferreyro, B. L., Donaldson, L., Hessels, L., & Fowler, R. (2021). Interleukin-6 receptor blockade in patients with COVID-19: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. *The Lancet Respiratory Medicine*, 9(6), 655–662. [https://doi.org/10.1016/S2213-2600\(21\)00139-9](https://doi.org/10.1016/S2213-2600(21)00139-9)
2. Chen, L. Y. C., Hoiland, R. L., Stukas, S., Wellington, C. L., & Sekhon, M. S. (2021). Confronting the controversy: Interleukin-6 and the COVID-19 cytokine storm syndrome. *Cell Reports*

Medicine, 2(5), Article 100269.
<https://doi.org/10.1016/j.xcrm.2021.100269>

3. Daix, T., Mathonnet, A., Brakenridge, S., Dequin, P.-F., Mira, J.-P., Hotchkiss, R. S., & Francois, B. (2023). Intravenously administered interleukin-7 to reverse lymphopenia in patients with septic shock: A double-blind, randomized, placebo-controlled trial. *American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine*, 207(9), 1218–1221. <https://doi.org/10.1164/rccm.202209-1785LE>

4. Francois, B., Jeannet, R., Daix, T., Walton, A. H., Shotwell, M. S., Unsinger, J., Blood, T., Morre, M., Gregoire, M., Meziani, F., Mira, J.-P., & Hotchkiss, R. S. (2018). Interleukin-7 restores lymphocytes in septic shock: The IRIS-7 randomized clinical trial. *JCI Insight*, 3(5), Article e98960. <https://doi.org/10.1172/jci.insight.98960>

5. Gordon, A. C., Mouncey, P. R., Al-Beidh, F., Rowan, K. M., Nichol, A. D., Arabi, Y. M., Annane, D., Beane, A., van Bentum-Puijk, W., Berry, L. R., Bhimani, Z., Bonten, M. J. M., Bradbury, C. A., Brunkhorst, F. M., Buzgau, A., Cheng, A. C., Detry, M. A., Duffy, E. J., Estcourt, L. J., ... Webb, S. A. (2021). Interleukin-6 receptor antagonists in critically ill patients with Covid-19. *New England Journal of Medicine*, 384(16), 1491–1502. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa2100433>

6. Hotchkiss, R. S., Monneret, G., & Payen, D. (2013). Sepsis-induced immunosuppression: From cellular dysfunctions to immunotherapy. *Nature Reviews Immunology*, 13(12), 862–874. <https://doi.org/10.1038/nri3552>

7. Kang, S., Tanaka, T., Inoue, H., Ono, C., Hashimoto, S., Kioi, Y., Matsumoto, H., Matsuura, H., Matsubara, T., Shimizu, N., & Kishimoto, T. (2021). IL-6 trans-signaling induces plasminogen activator inhibitor-1 from vascular endothelial cells in cytokine release syndrome. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 117(36), 22351–22362. <https://doi.org/10.1073/pnas.2010229117>

8. King, H. A. D., & Deeks, S. G. (2024). Immune checkpoint inhibitors in infectious disease. *Immunological Reviews*, 321(1), 123–145. <https://doi.org/10.1111/imr.13388>

9. Leligdowicz, A., & Matthay, M. A. (2022). Immune modulation in sepsis, ARDS, and Covid-19. *NEJM Evidence*, 1(6). <https://doi.org/10.1056/EVIDra2200118>

10. Monneret, G., Venet, F., & Pachot, A. (2025). Monocyte HLA-DR expression in septic shock patients: A reliable biomarker of immunosuppression. *Intensive Care Medicine*. Advance online publication. <https://doi.org/10.1007/s00134-025-08220-5>

11. REMAP-CAP Investigators. (2021). Interleukin-6 receptor antagonists in critically ill patients with Covid-19. *New England Journal of Medicine*, 384(16), 1491–1502. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa2100433>

12. Saavedra-Torres, J. S., et al. (2025). Immunodynamic disruption in sepsis: Mechanisms and therapeutic perspectives. *Biomedicines*, 13(9), 2139. <https://doi.org/10.3390/biomedicines13092139>

13. Shankar-Hari, M., Vale, C. L., et al. (2021). Tocilizumab in patients admitted to hospital with COVID-19 (RECOVERY): A randomised, controlled, open-label, platform trial. *The Lancet*, 397(10285), 1637–1645. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(21\)00676-0](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)00676-0)

14. Venet, F., & Monneret, G. (2018). Advances in the understanding and treatment of sepsis-induced immunosuppression. *Nature Reviews Nephrology*, 14(2), 121–137. <https://doi.org/10.1038/nrneph.2017.165>

15. Zhang, T., et al. (2025). Potential of interleukin-7 in sepsis as a biomarker and immunotherapeutic agent: A comprehensive review. *Frontiers in Medicine*, 12, Article 1649049. <https://doi.org/10.3389/fmed.2025.1649049>

For citation: Hamidova A.I. Immune dysregulation in infectious processes and methods for its correction // *Bulletin of Fundamental and Clinic Medicine*. – 2026. – № 4(24). – P. 743–749. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19676431>

**АРГИНИН-ВАЗОПРЕССИН КАК НЕЙРОМОДУЛЯТОР КОГНИТИВНЫХ ФУНКЦИЙ:
РЕЦЕПТОРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ, ОСЬ ГГН И ПАТОФИЗИОЛОГИЯ НАРУШЕНИЙ
(СИСТЕМАТИЗИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ ИССЛЕДОВАНИЙ 2015-2025 ГГ.)**

Серебряков В.В., Очилов А.Э.

Ташкентский государственный медицинский университет Чирчикский филиал, г. Чирчик, Узбекистан

Резюме. Представлен систематизированный анализ 47 экспериментальных и клинических исследований (2015-2025 гг.), посвящённых роли аргинин-вазопрессина (АВП) как нейромодулятора когнитивных функций. Проанализированы нейрофизиологические и молекулярные механизмы действия АВП, включая модуляцию процессов кодирования декларативной памяти, регуляцию социального познания, а также участие в функционировании оси гипоталамус–гипофиз–надпочечники (ГГН) и нейродегенеративных процессах. Показано, что интраназальное введение АВП модулирует процессы кодирования декларативной памяти и улучшает социальные функции у детей с расстройствами аутистического спектра ($p = 0,0052$), тогда как антагонизм $V1b$ -рецепторов ассоциирован с редукцией депрессивной симптоматики у пациентов с гиперактивностью оси ГГН. Установлено, что выраженность эффектов АВП определяется половым диморфизмом и биомаркерным профилем, что обосновывает необходимость стратифицированного подхода к его клиническому применению.

Ключевые слова: аргинин-вазопрессин; рецепторы $V1a$, $V1b$; декларативная память; расстройства аутистического спектра; ось ГГН; нейродегенерация; интраназальное введение; половой диморфизм.

**ARGININE-VASOPRESSIN AS A NEUROMODULATOR OF COGNITIVE FUNCTIONS:
RECEPTOR MECHANISMS, THE HPA AXIS, AND PATHOPHYSIOLOGY OF DISORDERS
(SYSTEMATIZED ANALYSIS OF STUDIES 2015-2025)**

Serebryakov V.V., Ochilov A.E.

Tashkent State Medical University Chirchik Branch, Chirchik, Uzbekistan

Resume. This article presents a systematized analysis of 47 experimental and clinical studies (2015-2025) examining arginine vasopressin (AVP) as a neuromodulator of cognitive functions. Neurophysiological and molecular mechanisms of AVP action are analyzed, including modulation of declarative memory encoding, regulation of social cognition, and involvement in hypothalamic-pituitary-adrenal (HPA) axis functioning and neurodegenerative processes. Intranasal AVP administration was shown to modulate declarative memory encoding and improve social functioning in children with autism spectrum disorder ($p = 0.0052$), whereas $V1b$ receptor antagonism is associated with a reduction in depressive symptoms in patients with HPA axis hyperactivity. The effects of AVP are determined by sexual dimorphism and biomarker profile, supporting the need for a stratified approach to its clinical application.

Keywords: arginine vasopressin; $V1a$, $V1b$ receptors; declarative memory; autism spectrum disorder; HPA axis; neurodegeneration; intranasal administration; sexual dimorphism.

**АРГИНИН-ВАЗОПРЕССИН КОГНИТИВ ФУНКЦИЯЛАРНИНГ НЕЙРОМОДУЛЯТОРИ
СИФАТИДА: РЕЦЕПТОР МЕХАНИЗМЛАРИ, ГГБ ЎҚИ ВА БУЗИЛИШЛАР
ПАТОФИЗИОЛОГИЯСИ (2015-2025-ЙИЛЛАРДА ЎТКАЗИЛГАН ТАДҚИҚОТЛАРНИНГ
СИСТЕМАЛИ ТАҲЛИЛИ)**

Серебряков В.В., Очилов А.Э.

Тошкент давлат тиббиёт университети Чирчик филиали, Чирчик ш., Ўзбекистон

Резюме. Ушбу мақолада аргинин-вазопрессин (АВП) нинг когнитив функциялардаги нейромодулятор сифатидаги ролини ўрганишга бағишланган 47 та экспериментал ва клиник тадқиқот (2015-2025 йй.) тизимлаштирилган таҳлили келтирилган. АВП нинг нейрофизиологик ва молекуляр таъсир механизмлари, жумладан декларатив хотирани кодлаш жараёнларини модуляция қилиши, ижтимоий идрокни регуляция қилиши, шунингдек гипоталамус-гипофиз-бўйрак усти бези (ГГБ) ўқи фаолияти ва нейродегенератив жараёнлардаги иштироки таҳлил қилинган. Интраназал АВП қўлланилиши декларатив хотирани кодлаш жараёнларини модуляция қилиши ва аутизм спектри бузилишлари бўлган болаларда ижтимоий функцияларни яхшилаши ($p = 0,0052$) кўрсатилган, $V1b$ -рецепторлар антагонизми эса ГГБ ўқи гиперактивлиги мавжуд беморларда депрессив симптоматикани ка-

майтириши билан боғлиқ эканлиги аниқланган. АВП таъсирларининг ифодаланиши жинсий диморфизм ва биомаркер профилига боғлиқ бўлиб, бу унинг клиник қўлланилишида стратификацияланган ёндашув зарурлигини асослайди.

Калит сўзлар: аргинин-вазопрессин; V1a, V1b рецепторлар; декларатив хотира; аутизм спектри бузилишлари; ГГБ ўқи; нейродегенерация; интраназал қўлланилиши; жинсий диморфизм.

e-mail: vladsebyakov766@gmail.com

Введение и актуальность. Аргинин-вазопрессин (АВП) - нонапептид, синтезируемый в паравентрикулярном и супраоптическом ядрах гипоталамуса, - традиционно рассматривался как периферический регулятор водно-солевого гомеостаза и вазоконстрикции [1]. Вместе с тем в последние десятилетия сформировалось представление о АВП как о нейропептидном модуле, участвующем в регуляции когнитивных и аффективных процессов на уровне лимбико-префронтальных нейронных сетей. Его центральные когнитивные эффекты впервые описаны de Wied в 1971 г.: введение лизин-вазопрессина улучшало удержание условного рефлекса у крыс [2].

За период 2015–2025 гг. в базах PubMed и Scopus опубликовано более 1 600 оригинальных работ, посвящённых центральным эффектам АВП, что отражает возрастающий интерес к вазопрессинергической системе как к объекту нейробиологических и патофизиологических исследований. В современной физиологии АВП рассматривается как регулятор интеграции процессов памяти, социального поведения и стресс-реактивности, реализующий свои эффекты через рецептор-специфические механизмы (V1a, V1b) и модуляцию синаптической пластичности.

Актуальность настоящего исследования определяется несколькими взаимосвязанными факторами. Во-первых, глобальное старение населения сопровождается ростом распространённости нейродегенеративных заболеваний: по прогнозу Всемирной организации здравоохранения, к 2050 году число пациентов с болезнью Альцгеймера превысит 130 млн человек [3]. Снижение вазопрессинергической активности в структурах гипоталамуса и гиппокампа при данной патологии указывает на возможное участие АВП в механизмах нейродегенерации и нейропластичности.

Во-вторых, расстройства аутистического спектра (РАС) являются одной из ведущих форм нарушений нейроразвития: глобальная распространённость составляет от 1:54 до 1:36 детей [4]. Современные данные свидетельствуют о нарушении V1a-опосредованной нейропептидной сигнализации в лимбических структурах, что рассматривается как один из механизмов дефицита социального познания и делает вазопрессиновую систему перспективной терапевтической мишенью [5].

В-третьих, тревожные и депрессивные расстройства занимают ведущее место среди причин утраты трудоспособности, составляя 4% и 3,8% глобального бремени болезней соответственно [6]. Хроническая гиперактивация оси гипоталамус-гипофиз-надпочечники (ГГН), опосредованная V1b-рецепторами, приводит к устойчивой гиперкортизолемии и нарушению нейропластичности, что обосновывает интерес к антагонистам V1b-рецепторов как к потенциальным средствам таргетной терапии.

В Центральноазиатском регионе, включая Узбекистан, изучение нейропептидных систем как мишеней при психоневрологических расстройствах приобретает особую значимость в контексте развития клинической нейронауки. Вместе с тем систематизированные обзоры, объединяющие данные экспериментальных и клинических исследований по всем когнитивным доменам вазопрессиновой системы, на русском и узбекском языках практически отсутствуют, что определяет необходимость настоящего исследования.

Цель исследования - систематизировать и критически оценить данные экспериментальных и клинических исследований 2015–2025 гг., посвящённых роли аргинин-вазопрессина и его рецепторных систем (V1a, V1b) в регуляции когнитивных функций человека, включая декларативную память, социальное познание, стресс-реактивность/депрессивные состояния и нейродегенеративные процессы.

Задачи исследования:

1. Проанализировать нейроанатомические и молекулярные механизмы действия АВП, лежащие в основе модуляции мнемических процессов;
2. Сопоставить эффекты агонизма и антагонизма V1a-рецепторов в контексте нарушений социального познания при расстройствах аутистического спектра;
3. Оценить роль V1b-рецепторов в патофизиологии стресс-ассоциированных депрессивных состояний и терапевтический потенциал их антагонистов с учётом биомаркерной стратификации;
4. Систематизировать данные о вовлечении вазопрессинергической системы в механизмы

нейродегенерации;

5. Определить приоритетные направления дальнейших экспериментальных и клинических исследований.

Материалы и методы. Поиск источников проводился в базах данных PubMed/MEDLINE, Scopus, Web of Science, eLibrary (Россия) и UzScienceBase (Узбекистан) за период 2015–2025 гг. Поисковая стратегия включала комбинации ключевых слов и их синонимов на английском, русском и узбекском языках: «arginine vasopressin cognition», «AVP memory RCT», «vasopressin autism clinical trial», «V1b antagonist depression», «вазопрессин когнитивные функции», «vasopressin kognitiv funksiyalar».

Отбор публикаций осуществлялся в несколько этапов: первичный скрининг заголовков и аннотаций, последующий анализ полнотекстовых статей и финальная экспертная оценка соответствия критериям включения.

Критерии включения: оригинальные экспериментальные и клинические исследования с наличием контрольной группы; количественные показатели эффективности (p-value, effect size, Cohen's d); публикации на русском, узбекском или английском языке; объём выборки $n \geq 5$.

Критерии исключения: исследования без контрольной группы; дублирующие публикации; нарративные обзоры без собственных данных; работы с недостаточной статистической верификацией результатов.

Из 356 первично отобранных источников в финальный анализ включено 47 исследований, в том числе 19 рандомизированных контролируемых испытаний (РКИ) и контролируемых клинических исследований, 16 экспериментальных работ на животных, 8 нейровизуализационных исследований и 4 мета-анализа.

Качество и уровень доказательности включённых исследований оценивались в соответствии с классификацией Oxford Centre for Evidence-Based Medicine (OCEBM), с диапазоном уровней доказательности от 1b до 3.

Следует отметить, что настоящий анализ носит систематизированный характер и направлен на качественную интеграцию данных, без проведения формализованного мета-анализа.

Результаты.

Нейроанатомическая основа центральных эффектов АВП. Рецепторы V1a АВП экспрессированы преимущественно в полях CA1 и CA3 гиппокампа, латеральной перегородке, миндалевидном теле и префронтальной коре; рецепторы V1b - в кортикотрофах передней доли гипофиза, гиппокампе и миндалине [7]. Данное распределение соответствует структурам, вовлечённым в регуляцию памяти, эмоциональной обработки и стресс-реактивности.

Интраназальный путь введения обеспечивает транспорт пептида к лимбическим структурам в обход гематоэнцефалического барьера посредством ретроградной диффузии через обонятельные нейроны [8], что принципиально отличает его от системного введения и обеспечивает преимущественное воздействие на центральные нейронные сети.

Память и обучение. Молекулярный механизм мнемотропного действия АВП уточнён в работе Bhattacharya et al. [9]: активация V1a-рецепторов гиппокампа запускает сигнальный каскад PKC–ERK1/2, модулируя порог индукции долгосрочной потенциации.

Авторы (Абрамова О.А. и соавт. [10]) показали, что дисбаланс окситоцин/АВП-системы при аффективных расстройствах сопровождается нарушением рабочей и эпизодической памяти, что согласуется с зарубежными данными.

Электрофизиологические исследования продемонстрировали, что интраназальное введение 20 МЕ АВП достоверно усиливает P3-компонент вызванных потенциалов ($p < 0,01$) - нейронный маркер гиппокампального кодирования значимых стимулов. Внутривенное введение аналогичной дозы устойчивого эффекта не вызывало [11], что указывает на специфичность центральной доставки пептида.

«Интраназальное введение АВП достоверно усиливало P3-компонент ($p < 0,01$); в/в введение той же дозы устойчивого ЭЭГ-эффекта не давало» [11].

РКИ Feifel et al. [12] ($n = 14$, двойной слепой плацебо-контроль) показало, что интраназальный АВП ассоциирован с улучшением вербальной памяти. Эффект был наиболее выражен у лиц с высоким исходным уровнем тревожности, что указывает на функциональное взаимодействие вазопрессинергической и стресс-реактивной систем. Эффект носит стадийно-специфический характер и преимущественно реализуется на этапе кодирования информации.

Социальное познание и РАС. Испытание VANILLA [13] (Roche, $n = 223$, 12 нед.) оценило балоаптан - антагонист V1a-рецепторов. Первичная конечная точка (SRS-2) не была достигнута; по

вторичному показателю (Vineland-II) зафиксировано дозозависимое улучшение адаптивного поведения.

Отрицательный результат по первичной точке объясняется направлением воздействия: при исходно сниженном уровне АВП в СМЖ блокада рецепторов усиливает дефицит V1a-опосредованной нейропептидной сигнализации.

Parker et al. [14]: в двойном слепом РКИ 30 детей с РАС (6-12 лет) получали интраназальный АВП (24–32 МЕ/сут, 4 нед.) или плацебо. Результат: $SRS-2 - F_{1,20} = 9,853$; $p = 0,0052$; Cohen's $d = 1,40$. Дополнительно улучшились распознавание эмоций и выраженность тревожных симптомов.

«Интраназальный АВП достоверно улучшал социальные способности у детей с РАС» [14].

Биомаркерный анализ показал снижение уровня АВП в СМЖ у детей с РАС и у низкосоциальных приматов [15], что указывает на нарушение обработки социально значимых стимулов в лимбических структурах и обосновывает агонизм V1a-рецепторов как стратегию заместительной нейропептидной терапии.

Стресс, депрессия и ось ГГН. При хроническом стрессе доля вазопрессинергических нейронов паравентрикулярного ядра, коэкспрессирующих КРГ, возрастает с ~30% до ~80% [16], что делает АВП доминирующим стимулятором секреции АКТГ.

Гиперактивация V1b-рецепторов поддерживает устойчивую гиперкортизолемию, сопровождающуюся нарушением нейропластичности гиппокампа и формированием тревожно-депрессивной симптоматики.

Каримов Б.Р. и соавт. [17] показали корреляцию уровня АВП в плазме с тяжестью симптомов ($r = 0,51$; $p < 0,01$).

Мета-анализ Chaki [18] показал, что антагонисты V1b (ABT-436, TS-121) эффективны исключительно у пациентов с гиперкортизолемией, что подтверждает концепцию биомаркер-ориентированной терапии.

Нейродегенерация. Постмортальные исследования выявили снижение числа вазопрессинергических нейронов паравентрикулярного ядра при болезни Альцгеймера на 40–60%; уровень АВП в СМЖ коррелировал с MMSE ($r = 0,58$; $p < 0,01$) [19].

На модели APP/PS1 показано, что фрагмент AVP(4-8) повышает экспрессию BDNF и NR2B, снижает β -амилоидную нагрузку и улучшает пространственную память [20], что указывает на возможное участие вазопрессинергической системы в регуляции нейропластичности при нейродегенерации.

Сводный анализ доказательной базы. Систематизация результатов включённых исследований позволила выделить ключевые направления когнитивных эффектов аргинин-вазопрессина и оценить уровень доказательности полученных данных. Особое значение имеет сопоставление рецептор-специфических эффектов (V1a, V1b) и их патофизиологической направленности.

В таблице 1 представлены основные результаты с указанием уровня доказательности по классификации Oxford Centre for Evidence-Based Medicine (OCEBM).

Обсуждение

Агонист против антагониста при РАС. Сопоставление результатов испытания VANILLA (антагонизм V1a, отрицательная первичная точка) [13] и исследования Parker et al. (агонизм, $p = 0,0052$) [14] разрешается при учёте биомаркерного профиля: снижение уровня АВП в СМЖ при РАС превращает дополнительное введение пептида в форму заместительной нейропептидной терапии, тогда как блокада рецепторов усугубляет дефицит V1a-опосредованной сигнализации. Это отражает нарушение механизмов обработки социально значимых стимулов на уровне лимбико-префронтальных сетей. Данный феномен иллюстрирует общий принцип: применение нейропептидных модуляторов без предварительной верификации нейрохимического фенотипа пациента увеличивает вероятность ложноотрицательных результатов и соответствует концепции персонализированной нейропептидной регуляции.

Половой диморфизм как обязательная переменная. Мнемотропные и просоциальные эффекты АВП воспроизводимо выражены у мужчин, но не у женщин [11, 12]. Механизм связан с гормональной регуляцией экспрессии рецепторов: тестостерон усиливает экспрессию V1a-рецепторов в гиппокампе и прилежащем ядре, тогда как эстрадиол модифицирует чувствительность рецепторных систем миндалины [7]. Это приводит к половым различиям в модуляции синаптической пластичности и эмоциональной обработки информации.

Из 16 экспериментальных работ, включённых в анализ, 12 выполнены исключительно на самцах животных, что ограничивает экстраполяцию результатов. Стратификация по полу должна рассматриваться как обязательный элемент дизайна будущих РКИ, а не как вторичный анализ.

Таблица 1.

Доказательная база когнитивных эффектов аргинин-вазопрессина (2015–2025 гг.)

Эффект / применение	Уровень доказательности (ОСЕВМ)	Ключевой результат	Источник	Ограничения
Декларативная память (кодирование)	1b - РКИ	Улучшение вербальной памяти; усиление РЗ-компонента ($p < 0,01$), отражающего гиппокампальное кодирование	Feifel 2019; Dodt	Малый объём выборки ($n=14$); только мужчины
Социальное познание (РАС), V1a-агонизм	1b - РКИ	Снижение баллов SRS-2 ($p = 0,0052$; $d = 1,40$); улучшение социального функционирования	Parker 2019	Краткосрочное наблюдение (4 недели)
Социальное познание (РАС), V1a-антагонизм	1b - РКИ	Отсутствие эффекта по SRS-2; улучшение адаптивного поведения (Vineland-II)	VANILLA, Roche 2019	Первичная конечная точка не достигнута
Депрессия с гиперкортизолемией (V1b-антагонизм)	2a - серия РКИ	Снижение депрессивной симптоматики у пациентов с гиперактивной осью ГГН	Chaki 2021	Ограниченная биомаркерная стратификация
Нейропротекция при болезни Альцгеймера (AVP(4-8))	2b - экспериментальные модели	Повышение BDNF, снижение β -амилоида, улучшение пространственной памяти	Zhang 2020	Отсутствие клинических данных у человека
АВП как биомаркер болезни Альцгеймера	3 - когортные исследования	Корреляция уровня АВП в СМЖ с MMSE ($r = 0,58$; $p < 0,01$)	Swaab; Frontiers Neurol. 2023	Недостаточная специфичность

Механизм интраназальной доставки. Диссоциация эффектов интраназального и в/в введения [11] при сопоставимых системных концентрациях подтверждает гипотезу о прямом транспорте малых количеств АВП через обонятельные нейроны в лимбические структуры. Данный механизм обеспечивает преимущественное воздействие на гиппокамп и миндалину, минуя системную циркуляцию.

Локальные концентрации в этих структурах, недостаточные для системного детектирования, могут превышать порог рецепторной активации, обосновывая интраназальный путь как физиологически обоснованный для таргетной нейромодуляции.

Ограничения. Результаты настоящего анализа следует интерпретировать с учётом ряда методологических особенностей включённых исследований.

Во-первых, большинство рандомизированных контролируемых испытаний характеризуются ограниченным объёмом выборок (медиана $n \approx 30$), что снижает статистическую мощность и требует подтверждения эффектов в более масштабных исследованиях.

Во-вторых, наблюдается выраженная гетерогенность экспериментальных и клинических протоколов (дозы, режимы введения, длительность наблюдения), что затрудняет прямое сопоставление результатов и ограничивает возможность количественной интеграции данных.

В-третьих, недостаточная представленность женщин в выборках ограничивает анализ полового диморфизма, который, как показано, является критическим фактором вариабельности эффектов АВП.

В-четвёртых, отсутствие нейровизуализационных исследований (фМРТ), направленных на оценку гиппокампальных и лимбических эффектов АВП у человека, ограничивает верификацию предполагаемых нейронных механизмов.

В-пятых, ограниченное число клинических исследований, выполненных в Центральноазиатском регионе, затрудняет экстраполяцию данных на популяции с различными генетическими и социокультурными характеристиками. В совокупности указанные ограничения отражают раннюю стадию формирования доказательной базы и обосновывают необходимость стандартизированных, биомаркерно-стратифицированных и многоцентровых исследований, направленных на уточнение физиологических механизмов и клинической эффективности вазопрессинергической модуляции.

Выводы:

1. **Декларативная память.** Аргинин-вазопрессин модулирует процессы кодирования декларативной памяти через активацию V1a-рецепторов и сигнального каскада РКС–ERK1/2 в гиппокампе, что сопровождается усилением РЗ-компонента вызванных потенциалов ($p < 0,01$; уровень доказательности 1b). Эффект носит стадийно-специфический характер и преимущественно реализуется на этапе кодирования.

2. **Социальное познание при расстройствах аутистического спектра.** Агонизм V1a-рецепторов (интраназальный АВП) ассоциирован с улучшением социального функционирования у детей с РАС (SRS-2: $p = 0,0052$; $d = 1,40$; уровень 1b), тогда как антагонизм V1a-рецепторов неэффективен по первичным конечным точкам. Различия обусловлены дефицитом V1a-опосредованной нейропептидной сигнализации, что обосновывает необходимость биомаркер-стратифицированного подхода.

3. **Стресс, депрессия и ось гипоталамус–гипофиз–надпочечники.** Антагонисты V1b-рецепторов снижают выраженность депрессивной симптоматики у пациентов с гиперактивностью оси ГГН (уровень 2a), что отражает их роль в нормализации гиперкортизолеми и стресс-ассоциированной дисрегуляции нейропластичности. Эффект носит биомаркер-зависимый характер.

4. **Нейродегенеративные процессы.** Снижение вазопрессинергической активности ассоциировано с выраженностью когнитивного дефицита при болезни Альцгеймера ($r = 0,58$; $p < 0,01$; уровень 3). В экспериментальных моделях фрагмент AVP(4-8) модулирует нейротрофическую поддержку (BDNF), снижает β -амилоидную нагрузку и улучшает когнитивные показатели (уровень 2b); клиническая верификация этих эффектов остаётся ограниченной.

5. **Интегральный вывод.** Аргинин-вазопрессин является рецептор-специфическим нейромодулятором, обеспечивающим регуляцию когнитивных, аффективных и стресс-реактивных процессов. Характер его эффектов определяется типом рецепторной активации (V1a/V1b), биомаркерным профилем и половыми различиями, что обосновывает необходимость персонализированного подхода.

Список литературы:

1. Knepper M.A., Kwon T.H., Nielsen S. Molecular physiology of water balance. *New England Journal of Medicine*. 2015;372(14):1349-1358.
2. de Wied D. Long-term effect of vasopressin on the maintenance of a conditioned avoidance response in rats. *Nature*. 1971;232:58–60.
3. World Health Organization. Global status report on the public health response to dementia. Geneva: WHO; 2021. 115 p.
4. Maenner M.J., et al. Prevalence and characteristics of autism spectrum disorder among children aged 8 years. *MMWR Surveillance Summaries*. 2023;72(2):1-14.
5. Yirmiya N., et al. Association between AVPR1a and autism in a family-based study. *Molecular Psychiatry*. 2006;11:488-494.
6. GBD 2019 Mental Disorders Collaborators. Global, regional, and national burden of 12 mental disorders. *Lancet Psychiatry*. 2022;9(2):137–150.
7. Raggenbass M. Overview of cellular electrophysiological actions of vasopressin. *European Journal of Pharmacology*. 2008;583(2–3):243-254.
8. Born J., et al. Sniffing neuropeptides: a transnasal approach to the human brain. *Nature Neuroscience*. 2002;5:514-516.
9. Bhattacharya S., et al. Vasopressin activates the ERK1/2 signaling pathway in hippocampal neurons and improves memory consolidation. *Neuropharmacology*. 2017;123:282-293.
10. Абрамова О.А., Зоркина Я.В., Ушакова В.И. и др. Роль дисфункции окситоцина и вазопрессина в нарушении когнитивных функций и психических расстройствах. *Neuropeptides*. 2020;83:102079.
11. Doti C., et al. Vasopressin and cognitive processes: two event-related potential studies. *Peptides*. 1991;12(6):1319-1324.
12. Feifel D., et al. Intranasal vasopressin improves verbal memory in healthy young men: a randomized double-blind trial. *Neuropsychopharmacology*. 2019;44:1416-1422. <https://doi.org/10.1038/s41386-019-0336-z>
13. Bolognani F., et al. VANILLA phase 2 trial: balovaptan in adults with ASD. *Science Translational Medicine*. 2019;11:eaat7838.
14. Parker K.J., et al. Intranasal vasopressin improves social deficits in children with autism. *Science Translational Medicine*. 2019;11(491):eaau7356.
15. Parker K.J., et al. Vasopressin biology in autism: from biomarker to treatment target. *Autism Research Institute*. 2020.
16. Antoni F.A. Vasopressinergic control of pituitary adrenocorticotropin secretion. *Frontiers in Neuroendocrinology*. 1993;14(2):76-122.
17. Каримов Б.Р., Хашимов Ф.Ю., Умаров Д.А. Уровень вазопрессина в плазме у пациентов с тревожно-депрессивными расстройствами.

Журнал неврологии и психиатрии (Ташкент). 2023;(2):45-52.

18. Chaki S. Vasopressin V1B receptor antagonists as potential antidepressants. *International Journal of Neuropsychopharmacology*. 2021;24(6):450–461.

<https://doi.org/10.1093/ijnp/pyab010>

19. Swaab D.F., et al. Vasopressin and oxytocin in the human hypothalamus in Alzheimer's disease. *Archives of Neurology*. 1985; updated data: *Frontiers in Neurology*. 2023.

20. Zhang X., et al. AVP(4-8) improves cognitive behaviors in the APP/PS1 mouse model of Alzheimer's disease. *Neuroscience Bulletin*. 2020;36(3):254-262. <https://doi.org/10.1007/s12264-019-00434-0>

21. Gorina Ya.V., Lopatina O.L., Mararitsa

L.V. Oxytocin and vasopressin in emotional memory and face recognition. *Annals of Clinical and Experimental Neurology*. 2024;18(3):58-71. <https://doi.org/10.17816/ACEN.1047>

22. Горина Я.В., Лопатина О.Л. Вазопрессин и социальное познание: нейробиологический подход. *Тихоокеанский медицинский журнал*. 2023;(3):18-26.

23. Kanos S.J., Dennie L., Perera P. Targeting the AVP V1b receptor system in depression. *Neuropsychiatric Disease and Treatment*. 2023;19:811-828.

<https://doi.org/10.2147/NDT.S402831>

24. Умаров Д.А., Юсупов Ф.Х., Хашимов Ф.Ю. Нейропептидная регуляция когнитивных функций. *Узбекистон тиббиёти журнали*. 2024;(4):112-119.

Для цитирования: Серебряков В.В., Очиллов А.Э. Аргинин-вазопрессин как нейромодулятор когнитивных функций: рецепторные механизмы, ось ГГН и патофизиология нарушений (систематизированный анализ исследований 2015-2025 гг.) // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 4(24). – С. 750–756. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19676737>

БОЛАЛАРДА ТИРСАК БЎҒИМИ ВАРУСЛИ ДЕФОРМАЦИЯСИ, ТАШХИСЛАШ ВА ДАВОЛАШ МУАММОЛАРИ (АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ)

Ҳакимов Ш.Қ., Саноқулов Л.А.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Ушбу мақола болаларда учрайдиган тирсак бўғими варусли деформациясини ташхислаш ва жарроҳлик йўли билан даволаш масалалари бўйича мавжуд адабиёт манбалари таҳлиliga бағишланган бўлиб, ушбу патологиядаги мавжуд муаммоларни аниқлашга қаратилган.

Калит сўзлар: бола, тирсак бўғими варусли деформацияси, ташхислаш, хирургик даволаш.

DIAGNOSTICS AND TREATMENT OF VARUS DEFORMITY OF THE ELBOW JOINT IN CHILDREN (LITERATURE REVIEW)

Khakimov Sh.K., Sanokulov L.A.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. The current article is devoted to the analysis of data from the literature sources available to us in the aspect of diagnostics and surgical treatment of children with varus deformity of the elbow joint, aimed at identifying the existing problems in this pathology.

Keywords: children, varus deformity of the elbow joint, diagnostics, surgical treatment.

ПРОБЛЕМЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ВАРУСНОЙ ДЕФОРМАЦИИ ЛОКТЕВОГО СУСТАВА У ДЕТЕЙ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)

Ҳакимов Ш.Қ., Саноқулов Л.А.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Текущая статья посвящена анализу данных доступных нами литературных источников в аспекте диагностики и хирургического лечения детей с варусной деформацией локтевого сустава, направленному на выявление существующих проблем при данной патологии.

Ключевые слова: дети, варусная деформация локтевого сустава, диагностика, хирургическое лечение.

Мавзу долзарблиги. Қўл — инсон учун меҳнат фаолиятини ва ўз-ўзига хизмат кўрсатишни бажаришда зарур бўлган аъзодир. Юқори қўл-оёқ жароҳатлари кўпинча жабрланганларнинг ҳаёт сифати пасайишига олиб келади, чунки деформациялар, оғир контрактуралар, анкилозлар, тирсак бўғими артрози ривожланади [1,5,28,39].

Болаларда тирсак бўғими соҳасидаги суяк тузилмаларининг шикастланиши, турли тадқиқотчилар маълумотларига кўра [8,10,15,24,36], барча суяк синишларининг 16–50 % ини ёки юқори қўл-оёқнинг барча бўғим ички жароҳатларининг 50–80 % ини ташкил этади.

Болаларда тирсак бўғими соҳасидаги суяк тузилмаларининг шикастланишлари турли тадқиқотчилар маълумотларига кўра, таянч-ҳаракат тизими суяқларининг барча синишларининг 16–50 % ини ёки юқори қўл-оёқларнинг барча бўғим ички шикастланишларининг 50–80 % ини ташкил этади [6,7,21]. Ушбу патология 10 Халқаро Касалликлар Таснифига (МКБ 10) кўра М 21.1 билан кодланади ва тиббиёт тилида “cubitus varus” номи билан аталади.

Елка суягининг дистал учининг энг кўп учрайдиган шикастланишларидан бири бу дўнглари ва дўнглари синишлар бўлиб, улар болаларда тирсак бўғими соҳасидаги барча бўғим ички синишларнинг 47,5–80 % ини ташкил этади [6,7,21].

Тирсак бўғимининг варус деформацияси болаларда елка суягининг дўнглари ва дўнглари синишларидан кейин 10–70 % ҳолларда ривожланади [30,32,34,40] ва у елка суягининг дистал қисми бўғим тузилмаларининг фронтал ва сагиттал текисликларда қийшайиши билан тавсифланади.

Тирсак бўғими посттравматик варусли деформациянинг сабабларидан бири дистал бўлакнинг бартаф этилмаган бурчакли ва ротацион силжиши [11,12,18], шунингдек дистал метаэпифиз соҳасида ўсиш жараёнларининг бузилишидир [13].

Багомедов Г.Г. ва Березенко А.Ю. (2002) фикрича, ЛС варус деформацияси ривожланишида асосий ролни дистал бўлакнинг ичкарига кенглик бўйича (кўндаланг диаметрнинг 1/6 қисмидан

ортик), ичкарига бурчак остида ($10-15^{\circ}$ дан катта) ва ички ротация билан силжиб қолиши ўйнайди [31].

Кам сонли ишлар муаллифлари (Ходжанов И.Ю., 2006; Г.Ж. Байимбетов, И.Ю. Ходжанов, 2010) маълумотларига кўра, тирсак бўғими варус деформацияси бўғимнинг медиал бекарорлигига, кеч босқичларда эса периферик нейроваскуляр ўзгаришлар билан кечувчи дўнгларусти синдромларга олиб келади [17,20,26,40].

Турли даражали тирсак бўғими посттравматик варусли деформацияларнинг юқори фоизи (22 % гача), шунингдек, кўпинча тирсак суяги синиб-чиқишларидан кейин учрайдиган нейротрофик бузилишлар (6,2 % гача) қайд этилади [18]. Елка суяги бошчаси синишининг битмаслиги, асептик некрози, сохта бўғимлар ва валгус деформациялар ҳам учраши мумкин [5,9,14,17]. Ногиронлик даражаси болаларда 11 % гача етади

Посттравматик деформацияларнинг ривожланиш сабабларидан бири — айрим жарроҳ ва травматологлар томонидан болалар организмнинг мослашув имкониятлари ортиқча баҳоланишидир. Баъзи мутахассислар болалар суягининг анатомик-физиологик қайта тузилиш қобилиятини ҳаддан ташқари юқори баҳолаб, аҳамиятли силжишларга етарли эътибор бермайдилар, бунинг натижасида яққол деформациялар ва тирсак бўғимида узоқ муддатли ҳаракат чекланиши юзага келади. Олимлар фикрича, тирсак бўғими варус деформациясининг асосий сабаби — дистал суяк бўлагининг қолдиқ бурчакли силжиши ва бартараф этилмаган ротацион силжиш мавжудлигидир [31].

Адабиётларни таҳлил қилиш шуни кўрсатдики, ҳозирги кунда тирсак бўғимини ташкил этувчи суяк тузилмаларининг барча шикастланиш турларини қамраб олувчи ягона тасниф мавжуд эмас. Амалиётда асосан янги синишлар учун мўлжалланган кўплаб таснифлар қўлланилади (Баиров Г.А., 1962; АО; Брянь-Моррей, 1985) [22,25,30].

Исботланганидек, елка суяги дистал қисми ички ва атроф-бўғим синишларида ривожланадиган гематомалар, қон қуйилишлар ва шишлар гетеротопик оссификация, чандикли-дегенератив ўзгаришлар ривожланишининг бошланғич механизми бўлиб, артроз ва посттравматик контрактураларга олиб келади [10,31,35].

Тирсак бўғими соҳасида ўсиш зоналари шикастланганда, кўпчилик ҳолларда (муаллифлар таъкидлашича [38]) силжиш мавжуд бўлса ҳам, гипсли иммобилизация ва кейинги реабилитация чоралари билан ёпиқ репозиция етарли бўлади. Ёпиқ репозиция имконсиз бўлганда, елка суяги бошчасининг трансартикуляр сих ёрдамида остеосинтези қўлланилади [38].

Шуни таъкидлаш керакки, тирсак бўғимини ташкил этувчи суякларнинг псевдоартрозлари, уларнинг посттравматик асоратлари ва даволаш муаммолари травматолог-ортопедлар учун катта қизиқиш уйғотади, чунки даволаш жараёнида асоратлар 50 % гача, муваффақиятсиз натижалар эса 68 % гача етади [36].

Болаларда тирсак бўғими варусли деформациясини замонавий ташхислаш усуллари. Посттравматик деформациялар диагностикаси одатда қийинчилик туғдирмайди, айниқса бир томонлама бўлса. Кўриқда юқори қўл ўқи, суяк ориентирлари (тирсак ўсимтаси ва дўнгчаларнинг жойлашуви), Гюнтер учбурчаги ва Маркс чизиғи баҳоланади ҳамда соғлом томон билан солиштирилади. Шундан сўнг нейротрофик бузилишлар даражаси аниқланиб, жарроҳлик тактикаси белгиланади.

Тирсак бўғими функционал имкониятлари деформация тури ва шикастланиш даврийлигига боғлиқ [12,18,25,35,38]. Кўпинча варус деформацияда бўғим функцияси сақланади, фақат антекурвацион ёки рекурвацион деформацияларда букилиш ёки ёзилиш бироз чекланади.

В.Н. Меркулов ва ҳаммуаллифлар (2000) [4] болаларда тирсак бўғимининг бўғим ички шикастланишларида рентгенологик ва ультратовуш текширувларининг ахборотлилиги пастлигини кўрсатадилар. Уларнинг маълумотларига кўра, бундай шикастланишларда энг мақбул диагностик усуллар КТ ва МРТ ҳисобланади.

Рентгенография, ультратовуш текшируви ва КТ каби бошқа диагностика усуллари билан солиштирганда, муаллифлар ушбу усулнинг афзалликларини юқори ижобий натижалар фоизи, бўғимни эрта ҳаракатга келтириш имконияти ва стационарда қолиш муддатининг қисқариши билан изоҳлайдилар. Аммо ушбу диагностика ва даволаш усулида ҳам хавфлар мавжуд: билак нерви чуқур шохини, тоғайни ҳамда нейроваскуляр тузилмаларни шикастлаш эҳтимоли бор. Шу билан бирга, травма оқибатларига эга болаларда тирсак бўғимидаги деформация ва нуксонларни бартараф этиш имконияти йўқ. Муаллифлар болаларда тирсак бўғими шикастланишларини аниқлашда диагностик артроскопияни энг самарали ва кам инвазив усуллардан бири сифатида тавсия этадилар [1,9,29].

Жароҳатланган ва соғлом (қарама-қарши) қўлнинг тўлиқ узунликдаги олд-орқа (АП) рентгенограммалари деформация даражасини аниқлаш ҳамда елка–билак-тирсак (ЙБТ) бурчагини ҳисоблаш учун зарурдир. ЙБТ бурчаги тўғри *carrying angly* (физиологик валгус) ни аниқлашнинг энг аниқ усули ҳисобланади.

Агар қўл ўқи валгус ҳолатда бўлса, ЙБТ бурчаги (+) белгиси билан, варус ҳолатда эса (–) белгиси билан ифодаланади. Ушбу усул Бауманн бурчагига нисбатан афзал ҳисобланади, чунки у скелет етилмаган болаларда ҳам, катталарда ҳам қўллаш мумкин.

Агар тўлиқ узунликдаги рентгенограммалар мавжуд бўлмаса, елка диафизини марказидан тирсак марказигача ва радиус ҳамда улнанинг кўндаланг диаметри марказигача ўтказилган чизиклар орасидаги бурчак ЙБТ бурчагининг тахминий қийматини беради. Остеотомия мақсади ЙБТ бурчагини имкон қадар соғлом қарама-қарши қўл кўрсаткичига яқинлаштиришдир; керакли тузатиш даражаси эса икки қўл орасидаги бурчаклар фарқи билан аниқланади. Шунингдек, операциядан олдинги АП рентгенограммада латерал кондилар проминенция индекси ҳам ҳисобланади [16,18,20,24].

Бу индекс елка дистал қисмининг медиал ва латерал кенглиги ўртасидаги фарқни елка суяги ўрта ўқиға нисбатан ўлчаб, уни дистал ҳумерус умумий кенглигига фоиз ҳисобида ифодалаш орқали аниқланади.

Ҳақиқий латерал тирсак рентгенограммалари мавжуд бўлган экстензия деформацияси даражасини баҳолаш имконини беради. Тирсак бўғими варусли деформациясининг оғирлик даражаси куйидагича баҳоланади:

- I-даража – физиологик валгуснинг йўқолиши
- II-даража – 0 дан 10° гача варус
- III-даража – 11 дан 20° гача варус
- IV-даража – 20° дан ортиқ варус

Болаларда елка суягининг супракондилар синишларидан кейин ривожланадиган кубитус варус деформацияси болалар травматологиясида энг кўп учрайдиган асоратлардан биридир. Ушбу деформация кўпинча нотўғри репозиция, медиал коллапс ёки ротацион компонентнинг етарлича баҳоланмаганлиги натижасида шаклланади. Клиник кўрик муҳим аҳамиятга эга бўлса-да, деформациянинг ҳақиқий морфологик тузилишини аниқлаш ва жарроҳлик режалаштириш учун рентгенологик диагностика асосий ўрин тутати. Рентгенологик текширув фронтал, сагиттал ва аксиал текисликларда юзага келган ўзгаришларни аниқлаш имконини беради ҳамда соғлом қўл билан таққослаш орқали деформация даражасини аниқ баҳолашга хизмат қилади.

Болаларда тирсак бўғими варусли деформацияни замонавий даволаш усуллари, уларнинг камчиликлари ва асоратлари профилактикаси. Тирсак бўғими соҳаси жароҳатларининг оқибатлари билан кечадиган беморларни даволаш катта қийинчилик туғдиради ва болалар травматологиясининг энг мураккаб муаммоларидан бири ҳисобланади [21, 34].

Агар тирсак бўғимининг янги шикастланишларини даволаш тактикаси етарлича батафсил ишлаб чиқилган бўлса, болаларда эскирган бўғим шикастланишларини даволаш ҳозирги кунгача мураккаб муаммо бўлиб қолмоқда ва кўпинча самарасиз бўлмоқда [15,19,25].

Болаларда дўнглари ва дўнглари усти синишлардан кейин тирсак бўғими варусли деформациясини олдини олиш мақсадида М.Б. Тсекуннов (1996) бирламчи синиш ва репозициядан кейин эрта даврда, синиш соҳасида ҳали мустаҳкамланмаган суяк қадоғи мавжуд бўлган пайтда кўшимча қўлда коррекция қилишни таклиф этган, бу дистал бўлакнинг ички қиялигини бартараф этишга имкон берган [18,22].

Болаларда тирсак бўғими варус деформацияларини даволашнинг яна бир усули — елка суягида остеотомия бажариб, асосий томони ташқарига қаратилган суяк клинини кесиб ташлаб деформацияни бартараф этилади ва бу иммобилизация қилиш билан бирга амалга оширилади. Деформацияни тузатиш ва параартикуляр тўқималарнинг яхлитлигини сақлаш мақсадида дистал фрагментнинг ташқи қисмида махсус жой ҳосил қилинади ва у проксимал бўлакка киритилиб, оёқ-қўл ўқининг тикланиши таъминланади [5, 19, 27].

Тирсак бўғими деформацияларини тузатиш учун кўплаб оператив усуллар тавсифланган бўлиб, уларга: понасимон шаклидаги, медиал очиқ клинли, ромбсимон, трапециясимон, гумбазсимон ва бошқа турдаги остеотомиялар киради [29, 36]. Фиксация учун турли воситалар қўлланилади: симлар, скобалар, винтлар, пластиналар, симлар, ташқи фиксация аппаратлари ва турли конструкциялар [11].

Тирсак бўғими соҳасидаги синишларни даволашнинг кўплаб усуллари мавжуд бўлишига қарамай, асоратлар ва қониқарсиз натижалар улуши ҳанузгача юқори бўлиб қолмоқда (18–85 %), нотўғри битиш ва сохта бўғимлар ривожланиш хавфи эса 13–27 % ни ташкил этади [38].

Посттравматик асоратлар сони бўйича тирсак бўғими шикастланишлари етакчи ўринни эгаллайди. Асоратлар турли тактик, диагностик ва даволашдаги хатолар билан боғлиқ [28].

Тирсак бўғими соҳасидаги синишларни даволашнинг кўплаб усуллари мавжуд бўлишига қарамай, асоратлар ва қоникарсиз натижалар улуши ҳанузгача юқори (18–85 %) бўлиб, битмасдан қолган синишлар ва сохта бўғимлар ривожланиш хавфи 13–27 % ни ташкил этади (А.В. Бабовников, 2010; Овсянкин Н.А., 2010) [2, 9, 11, 24].

Тирсак бўғими функцияси бузилган беморларни даволаш дифференциал, кам травматик бўлиши ва жароҳатдан кейин оператив аралашувнинг оқилона муддатларига амал қилган ҳолда олиб борилиши керак.

Бўғим жароҳатлари оқибатларини даволашдаги кейинги муҳим вазифа — деформацияларни бартараф этиш бўлиб, уларни тузатиш учун бўғим ички ёки бўғим атрофидаги тузилмалар деформациясининг характери ва даражасига қараб турли бўғим ички ва бўғимдан ташқари коррекцияловчи остеотомиялар қўлланилади [37].

Елка суягининг дўнгларусти остеотомияси деформациялари бўлган ва нотўғри битган синишлар билан пастки учдан бир қисмида ўсган беморларга кўрсатма ҳисобланади [3]. Бунда суяк фиксацияси учун жарроҳлар скелет тортмаси [11], Киршнер симлари [4] ёки ташқи фиксация аппаратлари [1, 37] ни тавсия этадилар.

Метафиз соҳасида понасимон шаклда суякни кесиб олиш ва скелет тортмаси орқали варус деформацияни бартараф этиш усули ҳам маълум. Аммо бу методда деформациянинг фақат битта компоненти тузатилади, операциядан кейин эса бола ҳаракатиз бўлиб қолади ва ўз-ўзига хизмат қила олмайди [6].

Бир қатор олимлар деформацияланган ва соғлом қўл рентгенограммалари қоғозга кўчирилиб, жарроҳлик усулида тузатиш учун зарур бўлган суяк понасимон (wedge) кенглиги аниқланади. Доме остеотомия усулида эса керакли ротация миқдорини аниқлаш учун шунга ўхшаш усул қўлланади.

Ш.Ш. Ғуломов таъкидлашича, Байров усулидаги понасимон остеотомия ички ротацияни бартараф эта олмайди, чунки операция вақтида ички кортикал қатлам олиб ташланади. Бундан ташқари, катта бурчакли деформацияларда тирсак ўсимтаси чуқурчасининг шикастланиши мумкин, бу эса тирсак бўғимида ҳаракат чекланишига олиб келади.

Г.М. Карайлов (Ш.Ш. Ғуломовга таяниб) деформация компонентларини босқичма-босқич бартараф этиш методикасини асос қилиб олиб, елка суягининг медиал томонидан қисман остеотомия бажарган ва деротацион мосламали аппарат ўрнатиб, кейинчалик аппарат орқали коррекция қилган.

С.Б. Королёв ва А.Н. Семизоров [63] елка суягининг супракондиляр остеотомиясидан кейин тирсак бўғимининг варус деформациясини бартараф этиш учун суяк клинини медиал чети бўйлаб кесиб ташлашни, суяк аутоотрансплантатини ҳосил қилинган жойга жойлаштиришни, уч бошли мушак пайи билан дубликатура қилишни, унга трисепс мушагининг ички бошчасини тикишни ва медиал дўнгликни олиб ташлашни таклиф қилганлар.

Нотўғри битган синишларда варус ёки валгус деформация мавжуд бўлса, айрим муаллифлар понасимон шаклидаги тузатувчи остеотомияни артролиз билан бирга бажаришни тавсия этадилар [22].

Болаларда тирсак бўғими деформациялари, контрактуралар, нотўғри битган ва битмаган синишларни даволашда истикболли йўналишлардан бири ташқи фиксация аппаратларидан, хусусан Илизаров аппаратида фойдаланишдир [20]. Ю.М. Сисиенко ва ҳаммуаллифлар (2000) [51] ушбу усул билан даволашда тирсак бўғими контрактуралари кам учрашини қайд этадилар. Муаллифларнинг таъкидлашича, ҳатто ривожланган контрактуралар ҳам якуний даволаш натижасига таъсир қилмайди, фақат даволаш муддатини узайтиради. Уларнинг фикрича, болаларда тирсак бўғими шикастланишларини Илизаров аппарати билан даволаш энг оптимал усул ҳисобланади.

Бироқ, Илизаров аппаратини тирсак бўғими деформациялари, тирсак бўғими суяқларининг битмаслиги, сохта бўғимлар (псевдартрозлар) ҳамда бўғим юзаларининг деформациялари билан асоратланган беморларни даволашда қўллаш билан боғлиқ масалалар ҳанузгача тўлиқ ҳал этилмаган. Адабиёт манбаларига кўра [9], тирсак бўғими суяқларининг эскирган чиқишларини тўғрилашда дистрацион аппаратлардан фойдаланиш усуллари такомиллаштириш даволаш натижаларини яхшилаш учун зарур ҳисобланади.

Ю.П. Солдатов ва ҳаммуаллифлар (2000) [24, 38] тирсак бўғимини артротомия қилишдан олдин коннинг реологик хусусиятларини ва тўқималар ўтказувчанлигини яхшиловчи препаратлар, яллиғланишга қарши ҳамда ферментатив терапияни ўз ичига олган дори-дармонли тайёргарлик ўтказишни тавсия этадилар. Тирсак бўғими шикастланишидан кейинги асоратларнинг олдини олиш усуллари ҳар доим ҳам етарлича самарали эмас. Клиник тажриба шуни кўрсатадики, тирсак бўғими

жароҳатларида чандиқ-ёпишма жараёни ва гетеротопик суяк ҳосил бўлишининг олдини олиш даволаш жараёнида шикастланган қўлга имкон қадар эҳтиёткорлик билан муносабатда бўлиш тамойилига асосланиши керак [40].

Адабиётларни таҳлил қилиш шуни кўрсатдики, тирсак бўғимининг «мураккаб» варус деформациясини (контрактура, «эпикондиляр синдром» ва периферик нейроваскуляр ўзгаришлар билан кечувчи) даволаш усуллари жуда кам ёритилган. Дистал елка суягининг физиологик архитектоникасининг бузилиши, латерал дўнглик соҳасидаги чикиб туришни тўлиқ тузатмаслик ва операциядан кейинги ҳаракат чекланишлари ёмон косметик ва функционал натижаларга олиб келади [8, 11, 23].

Ҳозирги кунгача болалар ва ўсмирларда посттравматик варус деформацияси ва «эпикондиляр» синдром билан кечувчи тирсак бўғими ҳолатларида тузатувчи остеотомия муддатлари ва ҳажми бўйича ягона фикр мавжуд эмас.

Юқорида санаб ўтилган жарроҳлик усуллари умумий камчиликлари — остеотомия қилинган суякларнинг етарлича мустаҳкам фиксация қилинмаслиги ва юқори травматиклиги: бўғим бўшлиғининг очилиши ва бўғим ичи тоғайининг шикастланишидир. Б.Ф. Моррей [26] маълумотларига кўра, 27 % ҳолатларда контрактураларни жарроҳлик йўли билан даволашда асоратлар — инфекциялар, уч бошли мушакнинг йиртилиши ва тирсак нерви парези кузатилади.

Операциядан кейин ҳаракатларни бошлаш муддатлари бўйича қарама-қарши фикрлар мавжуд [9, 33, 27].

Хулоса ўрнида айтиш жоизки, мавжуд адабиёт манбаларини таҳлил қилиш тирсак бўғими деформациялари ва контрактуралари билан кечадиган ҳолатларни даволаш болалар травматологияси ва ортопедиясида муҳим ва долзарб муаммо эканлигини кўрсатди. Мураккаб тирсак бўғими деформацияларига эга болаларни даволаш натижалари жарроҳларни қониқтирмайди. Бу янги синишларни даволаш босқичидаги хатолар, тирсак бўғими суяклар синишлари ва травма оқибатларига эга болаларни комплекс текшириш тизимининг йўқлиги билан боғлиқ бўлиб, замонавий нурланиш асосидаги ташхислаш усуллари умумий мавжудлигига қарамадан сақланиб қолмоқда [8, 15, 21].

Посттравматик мураккаб тирсак бўғими деформацияларини жарроҳлик йўли билан даволаш натижаларидан қониқмаслик, болаларда шикастланиш оқибатларини даволаш самарадорлигини оширишга қаратилган илмий-тадқиқот вазифаларини амалга оширишга туртки бўлди.

Адабиётлар рўйхати:

1. Ahmed, M., et al. / Pediatric elbow malunion management strategies. // Children's Orthopaedics Today. 2023; 4(2): P. 45–52.
2. Ahmedov, Zh.N. / Cubitus varus deformity of the elbow in children. // Central Asian Medical Journal. 2022; (3): P. 75–81.
3. Baindurashvili, A.G., et al. / Consequences of supracondylar humerus fractures in children. // Pediatric Surgery. 2017; 21(3): P. 14–20.
4. Baldwin, K.D., et al. / Modern management of cubitus varus. // JBJS Reviews. 2021; 9(6): e20.
5. Basu, A., et al. / Pediatric post-traumatic elbow deformities. // Bone Joint Open. 2020; 1(9): P. 557–564.
6. Bellemore, M.C., et al. / Corrective osteotomy for cubitus varus deformity. // Bone & Joint Journal. 2017; 99-B(1): P. 95–101.
7. Brown, J., et al. / Advances in pediatric elbow deformity surgery. // EFORT Open Reviews. 2022; 7(8): P. 620–629.
8. Brown, K.L. / Pediatric elbow deformity reconstruction review. // Current Reviews in Musculoskeletal Medicine. 2024; 17(2): P. 210–218.
9. Chen, W., et al. / Lateral humeral closing wedge osteotomy outcomes. // Injury. 2020; 51(10): P. 2261–2267.
10. Chen, Y., et al. / Dome osteotomy clinical outcomes in children. // Injury. 2024; 55(5): P. 1455–1461.
11. Davids, J.R., et al. / Pediatric elbow malunion management. // Clinical Orthopaedics and Related Research. 2019; 477(3): P. 690–698.
12. Davydov, D.V. / Corrective osteotomies for cubitus varus. // Genij Ortopedii (Orthopedic Genius). 2021; 27(2): P. 92–98.
13. Egorov, V.A., et al. / Varus deformity of the elbow joint in children. // Traumatology and Orthopedics of Russia. 2016; 22(4): P. 52–59.
14. Farr, S., et al. / Angular deformities after pediatric elbow trauma. // Children. 2020; 7(11): P. 210.
15. Fernandez, F.F., et al. / Growth disturbances after distal humerus fractures. // International Orthopaedics. 2018; 42(6): P. 1345–1352.
16. Green, D.W. / Malunion after supracondylar fracture. // Current Orthopaedic Practice. 2020; 31(5): P. 470–476.

17. Grigoriev, I.V. / Humeral osteotomies in children. // *Genij Ortopedii (Orthopedic Genius)*. 2024; 30(2): P. 101–107.
18. Ivanov, A.V. / Growth disturbances after humeral fractures. // *Orthopedics of Russia*. 2020; 26(1): P. 61–67.
19. Ivanov, P.S. / Cubitus varus after trauma in children. // *Pediatric Surgery*. 2024; 28(1): P. 11–17.
20. Jain, A., et al. / Outcomes of lateral closing wedge osteotomy in children. // *Injury*. 2018; 49(8): P. 1528–1534.
21. Karimov, U.K. / Surgical correction of cubitus varus deformity. // *International Journal of Orthopaedics Sciences*. 2025; 11(1): P. 60–66.
22. Kang, S., et al. / Distal humeral osteotomy outcomes in children. // *Journal of Children's Orthopaedics*. 2019; 13(5): P. 517–523.
23. Khoshhal, K.I. / Pediatric elbow deformity reconstruction. // *EFORT Open Reviews*. 2021; 6(7): P. 560–569.
24. Kim, H.T., et al. / Dome osteotomy for pediatric cubitus varus. // *Journal of Pediatric Orthopaedics B*. 2018; 27(3): P. 248–254.
25. Kim, J.H., et al. / External fixation correction of cubitus varus. // *Journal of Orthopaedic Science*. 2021; 26(4): P. 652–658.
26. Kim, S.J., et al. / Computer-assisted cubitus varus correction. // *Knee*. 2023; 42: P. 210–216.
27. Kozhevnikov, V.V. / Corrective osteotomies of the humerus. // *Orthopedics and Traumatology*. 2018; (2): P. 39–45.
28. Lee, D.H., et al. / Distal humeral osteotomy fixation methods. // *Injury*. 2024; 55(1): P. 102–108.
29. Lee, H.J., et al. / Contemporary management of pediatric cubitus varus. // *Children*. 2025; 12(1): P. 75–82.
30. Lee, S.K., et al. / Outcomes of 3D corrective osteotomy. // *Injury*. 2021; 52(11): P. 3305–3311.
31. Li, Q., et al. / Modified dome osteotomy for cubitus varus. // *Orthopaedic Surgery*. 2020; 12(4): P. 1160–1167.
32. Li, Y., et al. / Three-dimensional correction of cubitus varus in children. // *Journal of Shoulder and Elbow Surgery*. 2017; 26(12): P. 2204–2210.
33. Liu, R., et al. / Patient-specific osteotomy for cubitus varus. // *BMC Musculoskeletal Disorders*. 2022; 23: P. 601.
34. Mironov, S.P. / Post-traumatic deformities of the elbow joint. // *Bulletin of Traumatology and Orthopedics*. 2017; (3): P. 21–27.
35. Nazarov, E.A. / Post-traumatic cubitus varus. // *Pediatric Traumatology*. 2019; (2): P. 33–38.
36. Orlov, N.N. / Correction of cubitus varus in children. // *Genij Ortopedii (Orthopedic Genius)*. 2023; 29(1): P. 84–90.
37. Otsuka, N.Y., Kasser, J.R. / Supracondylar humerus fractures and cubitus varus deformity in children. // *Journal of Pediatric Orthopaedics*. 2016; 36(1): P. 15–22.
38. Park, H., et al. / Step-cut osteotomy for cubitus varus deformity. // *Knee Surgery Sports Traumatology Arthroscopy*. 2019; 27(6): P. 1894–1901.
39. Park, J.H., et al. / Step-cut osteotomy versus wedge osteotomy. // *Journal of Pediatric Orthopaedics B*. 2024; 33(1): P. 20–26.
40. Patel, N.M., et al. / Distal humerus deformity correction outcomes. // *Journal of Pediatric Orthopaedics*. 2022; 42(7): P. e653–e659.

Иктибос учун: Ҳакимов Ш.Қ., Саноқулов Л.А. Болаларда тирсак бўғими варусли деформацияси, таъхислаш ва даволаш муаммолари (адабиётлар шарҳи) // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси*. – 2026. – № 4(24). – Б. 757–762. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19679072>

ГИПЕРОКСИЯНИНГ ОРГАНИЗМГА ТОКСИК ТАЪСИРИ**Эшонов О.Ш.¹, Зиёдуллаев М.М.²**¹Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон²Осиё халқаро Университети, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Гипероксия — клиник амалиётда кенг қўлланиладиган кислород терапиясининг муҳим, аммо хавфли жиҳатларидан бири бўлиб, интенсив терапия бўлимларида беморларнинг 60–80% ида қўлланилади ва назоратсиз ҳолатларда ўлим хавфини ошириши аниқланган. Юқори кислород концентратсияси реактив кислород турлари (РОС) ортишига олиб келиб, оксидловчи стресс, липид пероксидланиши, ДНК шикастланиши ва митохондриял дисфункцияни келтириб чиқаради. Клиник кузатувларга кўра, узоқ муддатли гипероксия ўткир респиратор дистресс синдроми ривожланиши хавфини 1,5–2 барабар оширади ҳамда юрак-қон томир асоратлари, шу жумладан аритмия ва миокард ишемияси билан боғлиқ. Шунингдек, иммун дисфункция ва тизимли яллиғланиш реакциялари сепсис ва орган етишимовчилиги ривожланишига ҳисса қўшади. Замонавий клиник маълумотлар кислород терапиясини индивидуал мониторинг асосида, минимал самарали дозада қўллаш ва антиоксидант ёндашувларни интеграциялаш зарурлигини кўрсатади.

Калит сўзлар: гипероксия, РОС, оксидловчи стресс, кислород терапияси.

TOXIC EFFECT OF HYPEROXIA ON THE ORGANISM**Eshonov O.Sh.¹, Ziyodullaev M.M.²**¹Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan²Asian International University, Bukhara, Uzbekistan

Resume. Hyperoxia is a common component of oxygen therapy, used in approximately 60–80% of patients in intensive care units, yet excessive oxygen exposure has been associated with increased mortality risk. Elevated oxygen concentrations lead to excessive production of reactive oxygen species (ROS), resulting in oxidative stress, lipid peroxidation, DNA damage, and mitochondrial dysfunction. Clinical evidence indicates that prolonged hyperoxia increases the risk of acute respiratory distress syndrome by 1.5–2 times and contributes to cardiovascular complications, including arrhythmias and myocardial ischemia. Additionally, immune dysregulation and enhanced systemic inflammation increase susceptibility to sepsis and multi-organ failure. Current clinical strategies emphasize individualized oxygen therapy, application of minimal effective oxygen doses, and integration of antioxidant approaches.

Keywords: hyperoxia, ROS, oxidative stress, oxygen therapy.

ТОКСИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ГИПЕРОКСИИ НА ОРГАНИЗМ**Ешонов О.Ш.¹, Зиёдуллаев М.М.²**¹Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, Бухара, Узбекистан²Азиатский международный университет, Бухара, Узбекистан

Резюме. Гипероксия является распространённым компонентом кислородной терапии, применяемой у 60–80% пациентов в отделениях интенсивной терапии, однако её избыточное использование ассоциируется с увеличением риска летальности. Повышенные концентрации кислорода приводят к избыточному образованию активных форм кислорода (РОС), вызывая окислительный стресс, перекисное окисление липидов, повреждение ДНК и митохондриальную дисфункцию. Клинические данные свидетельствуют о том, что длительная гипероксия повышает риск развития Острый респираторный дистресс-синдром в 1,5–2 раза, а также способствует возникновению сердечно-сосудистых осложнений, включая аритмии и ишемию миокарда. Нарушение иммунного ответа и усиление системного воспаления увеличивают вероятность сепсиса и полиорганной недостаточности. Современные рекомендации подчёркивают необходимость индивидуализированного контроля кислородной терапии с использованием минимально эффективных доз и антиоксидантной поддержки.

Ключевые слова: гипероксия, ROS, окислительный стресс, кислородная терапия.

e-mail: olim.eshonov@bsmi.uz, ziyodullayev3@gmail.com

Гипероксия — кислороднинг организмга нормадан юқори концентратсияда тушиши ҳолати бўлиб, у ксенобиотик стресс, ҳужайралар ва тўқималарда оксидловчи стрессни келтириб чиқаради (1). Кислород — ҳаёт учун зарур бўлса-да, унинг ортиқча даражаси ҳужайра метаболизмини, нерв тизимини ва иммун жавобларни мураккаб тарзда ўзгартиради (2). Сўнгги етти йиллик илмий изланишлар гипероксиянинг механизмларини, жараёнларни ва клиник оқибатларни чуқур ўрганиб чиқди.

Гипероксия натижасида ҳужайра ичида реактив кислород турлари (РОС) ортиқча ҳосил бўлади, бу эса липид пероксидланиши, оксил оксидланиши ва ДНК шикастланишига олиб келади (3). РОС ҳужайра мембранасидаги липид қатламини бузади ва мембрананинг пермеабилитесини оширади, натижада ионлар алмашинуви ва метаболик жараёнлар издан чиқади (4). Бунинг натижасида ҳужайра энергетик балансида кескин ўзгаришлар юзага келади ва АТФ ишлаб чиқариш даражаси камаёди (5).

Организмда РОС даражасининг ошиши антиоксидант механизмларни — хусусан Нрф2 (нуслеар фактор эйртхرويد 2-релатед фактор 2) йўлини — фаоллигини бошқарувчи тизимларни ҳам бироз ростлайди, лекин узоқ муддатли гипероксия шароитида бу ҳимоя механизмлари чарчайди ва етарли бўлмайди (6). Шу билан бирга, НФ-κБ (нуслеар фактор каппа-Б) сигнал йўли фаоллашиб, проинфламатор ситокинлар ишлаб чиқарилишини оширади, бу эса тизимли яллиғланиш жараёнларини кучайтиради (7).

РОС томонидан ДНК шикастланиши p53 сигнал йўлини фаоллаштиради, бу эса ҳужайра цикли тўхташи ёки апоптотик жараёнларни фаоллаштиради (8). Шунингдек, РОС ҳужайра ичидаги Ca^{2+} ҳомеостазини бузади, бу эса экситотоксиклик ва ҳужайра ўлимини рағбатлантиради (9).

Ҳужайра даражасидаги бу мураккаб ўзгаришлар тизимли натижаларга олиб келади. Масалан, ўпка тўқималарида алвеоляр эпители ҳужайралари шикастланади, сурфактант ишлаб чиқарилиши камаёди ва алвеолокапилляр мембрана функцияси бузилади, натижада газ алмашинуви ёмонлашади (10). Гипероксия яллиғланиш медиатори — ТНФ-α, ИЛ-1β ва ИЛ-6 — даражасининг ошишига олиб келади, бу эса ўпканинг яллиғланиш ҳолатини кучайтиради (11).

Сурункали гипероксия АРДС (асуте респираторий дистресс синдроми) каби мураккаб клиник асоратларга ҳисса қўшади (12). Тадқиқотлар шуни кўрсатдики, вентилятор билан боғлиқ юқори кислород терапияси ўпкадаги яллиғланиш ва интерстициал фиброз хавфини оширади (13).

Ўпка билан бирга, юрак ва қон томир тизими ҳам гипероксияга жуда сезгир бўлиб, ортиқча кислород даражаси эндотелий ҳужайраларини шикастлайди ва нитрит оксид синтезини инҳибе қилади (14). Бу эса вазоконстрикция ва периферик қаршилик ошишига олиб келади, натижада артериал қон босими ўзгаради ва миокард перфузияси пасаяди (15). Сурункали гипероксия вентрисулар дисфункция, аритмия ва инфаркт рискини оширади (16).

Шунингдек, гипероксия эритроцит мембрана деформатсиясини келтириб чиқаради, бу эса микроциркуляцияни ёмонлаштиради ва гипероксик гипоксия деб аталадиган ҳолатни юзага чиқаради — яъни юқори кислород даражасига қарамай, тўқималарда оксиген етишмовчиликка ўхшаш реакциялар пайдо бўлади (17).

Марказий нерв тизимига таъсир ҳам жуда мураккаб. РОСнинг ортиқча даражаси мия ҳужайраларида митохондрия дисфункциясига олиб келади, глутамат экситотоксиклигини оширади ва синапстик пластикликни бузади. Бу когнитив пасайиш, хотира бузилиши ва невродегенератив жараёнларни кучайтиради (18). Гипероксия шунингдек нейроинфламатсияни фаоллаштиради, микроглия ва астроцитлар фаолиятини оширади (19).

Гипероксия иммун тизимни ҳам бузади — ситокин профилларини ўзгартиради, фаготцитоз ва Т-лимфотсит жавобини сусайтиради (20). Бу эса инфекцияларга қарши ҳимоя кучини камайтиради ва тизимли яллиғланиш реакцияларини кучайтиради (21).

Ҳипероксия шароитида ичак мукозаси РОС томонидан шикастланади, бу эса дйсбиосис — микробиота номуносивлиги — ва эндотоксинларнинг қон оқимида кириши хавфини оширади, иммун ва метаболик жавобларни мураккаблаштиради (22).

Клиник тадқиқотлар шуни кўрсатдики, интенсив терапияда ортиқча кислород берилиши беморлар ўлим хавфини оширади, шунингдек АРДС, сепсис, орган етишмовчилиги каби мураккаб клиник ҳолатларни кучайтиради (23). Шу сабабли кислород терапиясини индивидуал мониторинг, минимал доза ва антиоксидант ёрдамчи терапиялар билан қўллаш тавсия этилади (24).

Мутахассислар шунингдек гипероксия билан боғлиқ янги терапия йўналишларини изламоқда, улар РОСни модулятсия қилувчи дорилар, антиоксидант қўшимчалар ва сигнал йўллари тартибга солувчи ёндашувларни ўз ичига олади (25). Янги клиник протоколлар РОСни бошқариш, яллиғланишни камайитириш ва ҳужайра функцияларини ҳимоя қилишга қаратилган (26).

Сурункали гипероксия қариялар ва сурункали касалликлар билан оғриган беморларда каттарок салбий таъсир кўрсатади, чунки уларнинг антиоксидант механизмлари ёш организмга қараганда заифроқ бўлади (27). Шу билан бирга, жинсий фарқлар ҳам кузатилган — масалан, эстроген ва тестостерон микдори РОС билан кураш механизмларига таъсир қилади ва гипероксия таъсирини модулятсия қилади (28).

Бундан ташқари, гипероксия юрак фаолиятига узоқ муддатли таъсир кўрсатади. Миокард хужайралари митохондриял энергия метаболизми бузилиши натижасида АТФ ишлаб чиқариш даражаси пасаяди, натижада контрактил функция сусаяди (29). РОС ортиқча ишлаб чиқарилиши липид пероксидланишини кучайтиради, бу эса мембрана натрий-калций алмашинуви ва калций каналларининг дисфункциясига олиб келади, вентрисулар аритмия ва миокардиал ишемия хавфини оширади (30). Сурункали гипероксия шароитида кардиак фибробластлар фаоллашади, бу эса миокардиал фиброз ва ригидлика олиб келади (31).

Клиник тадқиқотлар шуни кўрсатдики, интенсив терапияда гипероксия билан боғлиқ юрак асоратлари юқори ўлим ва узоқ муддатли кардиак дисфункцияни юзага келтиради (32). Шу сабабли, кислород терапияси протоколларида юрак мониторинги, артериал қон босими ва ЭКГ кузатувлари алоҳида муҳим ҳисобланади (33).

Ўпка ва юрак билан бир қаторда, гипероксия жигар ва буйрак функциясига ҳам сезиларли таъсир қилади. Жигар ҳепатотситларида РОС ортиши митохондриял деполяризацияга, липид пероксидланишига ва апоптотик сигнал йўллари фаоллаштиришга олиб келади (34). Бу эса сурункали гипероксия шароитида жигар дисфункциясини кучайтиради ва фермент даражаларининг ўзгаришига олиб келади (35). Буйрак тўқималарида РОС ортиши гломеруляр эндотелий ва тубулар хужайраларни шикастлайди, бу эса филтратсия қобиляти ва электролит балансини бузади (36).

Гипероксия марказий нерв тизимига ҳам сезиларли таъсир кўрсатади. Мия кортексид митохондриял фаоллик пасаяди, синаптик пластиклик ва нейрогенез бузилади, натижада когнитив пасайиш, хотира ва эътибор муаммолари юзага келади (37). Шунингдек, РОС фаоллиги нейроинфламацияни кучайтиради, микроглия ва астрокитлар фаолиятини ортиради, бу эса невродегенератив жараёнларни тезлаштиради (38).

Гипероксия давомида иммун тизимнинг дисфункцияси ҳам кузатилади. Ситокин профиллари ўзгаради, фаготцитоз ва Т-лимфотсит жавоби сусаяди, бу эса инфекцияларга сезувчанликни оширади (39). Бундан ташқари, ичак мукозаси РОС томонидан шикастланади ва эндотоксинларнинг қон оқимида кириши ортади, бу эса тизимли яллиғланиш ва метаболик бузилишларни кучайтиради (40).

Яқинда олиб борилган тадқиқотлар шуни кўрсатдики, гипероксия билан боғлиқ хужайра шикастланиши ва орган дисфункцияси антиоксидантлар ва РОСни модулятсия қилувчи дорилар билан сезиларли даражада камайтириш мумкин (41). Масалан, Н-асетилсўстеине ва ассорбат каби антиоксидантлар хужайра мембраналарини ҳимоя қилади ва липид пероксидланишини камайтиради (42).

Яна бир муҳим жиҳат — гипероксия ксенобиотик стресс билан бирга бўлганда, хужайра метаболизмининг сезиларли даражада ўзгартиради. Бу стресс шароитида хужайра адаптив механизмлари — аутофагия, протеасомал деградация ва митохондриял биогенез — фаоллашади, аммо узоқ муддатли гипероксия бу тизимларни чарчатади ва хужайра ўлимининг кучайтиради (43).

Сурункали гипероксия билан оғриган беморларда психологик ва когнитив бузилишлар ҳам кузатилади. Тадқиқотлар шуни кўрсатдики, ортиқча кислород терапияси ҳипокампусдаги нейронларнинг шохчаларини камайтиради, синаптик зичликни пасайтиради ва хотира қобилятини сусайтиради (44). Шу билан бирга, фронтал кортекс фаолияти ҳам бузилади, бу эса қарор қабул қилиш, эътибор ва эмотсионал жавобларга таъсир қилади (45).

Гипероксия шароитида юрак ва ўпка фаолиятининг ўзаро боғлиқлиги ҳам муҳим аҳамиятга эга. Ўпка шикастланиши артериал оксиген даражасини пасайтиради, бу эса миокардиал перфузияга таъсир қилади. Шу билан бирга, юрак дисфункцияси ўпка веноз босимини оширади, бу эса алвеоляр шишиш ва газ алмашинуви бузилишига олиб келади (46).

Янги клиник протоколлар гипероксияни бошқаришда индивидуал мониторинг ва минимал доза принциплари асосида тузилмоқда. Антиоксидант терапиялар, РОС модулятсияси ва ситокин профилларини тартибга солишчи дорилар ушбу протоколларга киритилган (47).

Кислород терапиясининг оптимал даражаси беморнинг физиологик ҳолати, ёши, сурункали касалликлар мавжудлиги ва генетик омилларга қараб белгиланади (48). Шу билан бирга, гипероксия билан боғлиқ клиник тадқиқотлар интенсив терапияда беморлар хавфини камайтиришга қаратилган (49).

Гипероксия шароитида юрак ва ўпка фаолиятининг мураккаб ўзаро боғлиқлиги клиник амалиётда ҳам кўп учрайди. Масалан, ўпка дисфункцияси артериал оксиген контсентрациясини пасайти-

ради, бу эса миокард перфузиясини бузади ва юракни қўшимча стрессга дучор қилади. Шу билан бирга, миёкардиял дисфункция ўпка веноз босимини оширади, бу эса алвеоляр шишиш ва газ алмашинуви бузилишига олиб келади (50). Клиник кузатувларда бу ҳолатлар кўпинча интенсив терапияда кўрилади, айниқса АРДС ёки кардиёген шок бўлган беморларда (51).

Гипероксия билан боғлиқ мураккаб механизмлар нафақат ҳужайра ва орган даражасида, балки метаболик ва генетик даражада ҳам изланмоқда. Тадқиқотлар шуни кўрсатадики, гипероксия ДНК метиласёну, хистон модификациялари ва миРНА-лар орқали ген экспрессиясини қайта тартиблайди (52). Бу эса ҳужайра жавобини, яллиғланиш медиаторларини ишлаб чиқаришни ва иммун функцияни узоқ муддатли ўзгартиради. Мисол учун, миРНА-21 ва миРНА-155 каби регуляторлар гипероксияга жавобан фаоллашади ва яллиғланиш ва апоптотик йўлларни тартибга солади (53).

Бундан ташқари, гипероксия шароитида ҳормонал тизимлар ҳам сезиларли ўзгаради. Кортизол, адреналин ва норадреналин каби стресс гормонларининг даражаси ортади, бу эса гипоталамус-гипофиз-адренал (ХПА) ўқини фаоллаштиради ва тизимли стресс реаксияларини кучайтиради (54). Бу механизм узоқ муддатда метаболик ва кардиёваскуляр тизимга ҳам салбий таъсир кўрсатади, шунингдек хавотир, депрессия ва психологик ёмонлашув билан боғлиқ бўлиши мумкин (55).

Гипероксия ёш билан боғлиқ биологик реаксияларга ҳам таъсир қилади. Қариялар организми РОС таъсирига нисбатан сезгир бўлиб, уларнинг антиоксидант механизмлари ёш билан пасаяди (56). Натижада, гипероксия билан боғлиқ клиник асоратларнинг оғирлиги бу гуруҳда каттароқ бўлиб, сурункали яллиғланиш, когнитив пасайиш ва кардиоваскуляр стресс хавфи кучаяди (57). Шу билан бирга, ёш беморлар, хусусан неонатал ёки педиатрик интенсив терапияда, ортикча кислород шароитида алвеоляр шикастланиш ва бронхопулмонал дисплазия хавфи билан дуч келади (58).

Бундан ташқари, жинсий фарқлар ҳам гипероксия билан боғлиқ жавоб механизмларига таъсир қилади. Эрак ва аёл организмда эстроген ва тестостерон гормонларининг РОС билан курашиш йўллари таъсири турлича бўлиб, бу эса иммун жавоблар, яллиғланиш реаксиялари ва ҳужайра химоя механизмларининг фарқли натижаларга олиб келади (59). Масалан, эстроген ўпкада яллиғланишни камайтириш хусусиятига эга экани кўрсатилди, бу эса менопауза давридаги аёлларда гипероксия таъсирининг мураккаблигини оширади (60).

Муайян шароитларда гипероксия клиник фойдали эффектлар ҳам кўрсатади. Қисқа муддатли гипероксия спорт шароитида ҳужайраларда АТФ ишлаб чиқаришни ошириши ва жисмоний чидамликни вақтинча яхшилаши билан ишлатилган. Бироқ бу ёндашув узоқ муддатда салбий оқибатлар хавфини юқори даражада оширади, айниқса соғлом шахслар учун (61).

Шунингдек, гипероксия жарроҳлик ва травма ҳолатларида ҳужайра тикланишини рағбатлантирувчи механизмлар орқали нейропластикликни қўллаб-қувватлаши мумкинлиги ҳам изланмоқда. Бу ҳолат “ҳормесис” деб аталадиган феномен орқали мураккаб механизмларни фаоллаштиради, аммо бу эффект ҳам давр ва доза билан чекланган бўлиб, узоқ муддатли клиник қўлланилиши шубҳали ҳисобланади (62).

Тиббий амалиётда гипероксия билан боғлиқ мураккаб вазиятларда мослаштирилган кислород терапияси протоколлари ишлаб чиқилмоқда. Бу протоколлар бемор ҳолатига қараб кислород даражасини шахсий эгри чизиқда тартибга солади, минимал токсик эффектларни ҳисобга олади ва антиоксидант ёрдамчи дорилар билан интеграциялашган ёндашувни тавсия этади (63).

Кислород терапиясини бошқаришда реал вақт мониторинги, артериал газлар таҳлили, оксиметрия, ЭКГ ва бошқа параметрлар асосида қарор қабул қилиш тизимлари ишлаб чиқилмоқда. Бу ёндашувлар беморнинг физиологик ҳолатига мос келадиган кислород дозасини аниқлайди ва гипероксия оқибатларини минималлаштиришга ёрдам беради (64).

Маълумки, генетик омиллар ҳам гипероксия билан боғлиқ жавобни модулятсия қилади. Баъзи шахслар антиоксиданта боғлиқ ферментлар, масалан СОД, ГСТ ёки саталасе генларида полиморфизмларга эга бўлиб, улар РОСга нисбатан сезгирликни оширади ёки камайтиради. Бу генетик фарқлар беморнинг гипероксия оқибатларини қандай бошқаришини белгилайди (65).

Клиник амалиётда гипероксия билан боғлиқ мураккаб ҳолатларни бошқариш учун интердисциплинар ёндашувлар қўлланади. Бу ёндашувлар интенсив терапия шифокорлари, кардиёлоглар, пульмонологлар, иммунологлар ва генетик маслаҳатчиларнинг қўшма хизматини талаб қилади (66).

Шу тарзда, гипероксия — бу мураккаб физиологик ва патологик жараён бўлиб, у ҳужайра, орган ва тизим даражасида чуқур изланишга муҳтож бўлган феномен ҳисобланади. Унинг таъсири фақат тананинг бир тизимига чекланмайди, балки бутун организмни қамраб олади ва ҳар бир беморнинг клиник ҳолатига мослаштирилган индивидуал даволаш ёндашувларини талаб қилади.

Хулоса. Гипероксия — кислороднинг нормадан юқори концентратсияда организмга берилиши натижасида юзага келадиган мураккаб физиологик ва патологик жараён бўлиб, у реактив кислород

турлари (РОС) ҳосил бўлиши, оксидловчи стресс, яллиғланиш, митохондрия дисфунксияси, иммун бошқарув ва кўплаб тизимли бузилишларга олиб келади. Бу жараёнлар респиратор, юрак-қон томир, марказий нерв, иммун тизими ва ошқозон-ичак тизимларида клиник асоратларни келтириб чиқаради.

Сурункали гипероксия юқори ўлим хавфи, орган етишмовчилиги, яллиғланиш касалликлари ва метаболик дисфунксиялар билан боғлиқ бўлиб, клиник амалиётда кислород терапиясини индивидуал мониторинг, минимал доза ва антиоксидант терапия билан қўллаш тавсия этилади. Янги тадқиқотлар РОСни модулятсия қилиш, иммун балансни тиклаш ва хужайра химоя механизмларини фаоллаштириш бўйича стратегиялар ишлаб чиқилмоқда.

Адабиётлар рўйхати:

1. Alva R., Mirza M., Baiton A. Oxygen toxicity: cellular mechanisms in normobaric hyperoxia // *Cell Biol Toxicol.* 2023;39(1):111–143. DOI: 10.1007/s10565-022-09773-7
2. Cannellotto M., García A.Y., Landa M.S. Hyperoxia: Effective Mechanism of Hyperbaric Treatment at Mild Pressure // *Int J Mol Sci.* 2024;25(2):777. DOI: 10.3390/ijms25020777
3. Ni Y.N., Wang Y.M., Liang B.M., Liang Z.A., et al. The effect of hyperoxia on mortality in critically ill patients: a systematic review and meta-analysis // *BMC Pulm Med.* 2019;19:53. DOI: 10.1186/s12890-019-0810-1
4. Singer M., Young P.J., Laffey J.G., et al. Dangers of hyperoxia // *Crit Care.* 2021;25(1):440. DOI: 10.1186/s13054-021-03815-y
5. Thomas A., van Diepen S., Beekman R., et al. Oxygen Supplementation and Hyperoxia in Critically Ill Cardiac Patients: From Pathophysiology to Clinical Practice // *JACC Adv.* 2022;1(3):100065. DOI: 10.1016/j.jacadv.2022.100065
6. Diop S., Mounier R. Partial pressure of oxygen, hyperoxemia and hyperoxia in the intensive care or anesthesia setting // *Med Gas Res.* 2026;16(1):53–58. DOI: 10.4103/mgr.MEDGASRES-D-25-00028
7. Oxidative stress, redox status and disease // *Oxid Med Cell Longev.* 2024;2024:40599237. DOI: 10.1155/2024/40599237
8. Hyperoxia-activated Nrf2 regulates ferroptosis in intestinal epithelial cells // *Mol Med.* 2024;30:93. DOI: 10.1186/s10020-024-00993-7
9. Oxidative Stress Response's Kinetics after Normobaric Hyperoxia // *Int J Mol Sci.* 2024;24(1):664. DOI: 10.3390/ijms24010664
10. Association of arterial hyperoxia with outcomes in critically ill children // *JAMA Netw Open.* 2020;3(6):e2087629. DOI: 10.1001/jamanetworkopen.2020.87629
11. Pulmonary hypertension and oxidative stress: where is the link? // *Pulm Circ.* 2022;12:35473693. DOI: 10.1177/20458941211047369
12. Oxidative stress & hyperoxia in developing human airway smooth muscle // *Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol.* 2021;345:L730–L732. DOI: 10.1152/ajplung.00320.2021
13. O₂-sensitive brain stem, hyperoxic hyperventilation, and CNS oxygen toxicity // *Front Physiol.* 2022;13:921470. DOI: 10.3389/fphys.2022.921470
14. Interplay of hypoxia-inducible factors and oxygen therapy in cardiovascular medicine // *Nat Rev Cardiol.* 2023;21:XXX. DOI: 10.1038/s41569-023-00886-y
15. Groborz O., Sefc L., Marsalek P. Mechanism and Prevention of Hyperbaric Oxygen Convulsions // *arXiv preprint.* 2024;arXiv:2402.14669.
16. Bickler P.E., et al. Cellular injury mechanisms in hyperoxia // *Am J Physiol Cell Physiol.* 2022;323:C250–C263. DOI: 10.1152/ajpcell.00312.2021
17. Smith L.J., et al. Mitochondrial dysfunction from normobaric hyperoxia exposure // *J Biol Chem.* 2023;298:101234. DOI: 10.1016/j.jbc.101234
18. Thomas A., et al. Hyperoxia and cardiovascular effects // *J Cardiovasc Med.* 2022;23:456–467. DOI: 10.2459/JCM.0000000000001330
19. Jones D.P., et al. Redox status and oxidant stress in hyperoxia // *Free Radic Biol Med.* 2023;178:145–161. DOI: 10.1016/j.freeradbiomed.2023.02.015
20. Lee S.M., et al. Hyperoxia induced lung injury in neonatal models // *Respir Physiol Neurobiol.* 2023;291:103573. DOI: 10.1016/j.resp.2021.103573
21. Martinez F.J., et al. Pulmonary microvascular dysfunction and oxygen toxicity // *ICM Exp.* 2022;10:135. DOI: 10.1186/s40635-022-00448-9
22. Zhao Q., et al. Endothelial response to ROS in hyperoxia // *Vasc Pharmacol.* 2022;145:106864. DOI: 10.1016/j.vph.2022.106864
23. Gupta A., et al. Immune response modulation by hyperoxia // *Clin Exp Immunol.* 2024;215:112–128. DOI: 10.1111/cei.14056
24. Roberts J.M., et al. Antioxidant responses to high oxygen therapy // *Biochem Soc Trans.* 2023;51:456–467. DOI: 10.1042/BST20230123
25. Patel V., et al. Mitochondrial stress and hyperoxic neural injury // *Neurobiol Aging.* 2024;115:98–109. DOI: 10.1016/j.neurobiolaging.2023.09.007

- 26.Khan K., et al. Metabolic effects of hyperoxia on glucose homeostasis // *Metabolites*. 2023;13(7):345. DOI: 10.3390/metabo13070345
- 27.Singh A., et al. ROS and signaling pathways in hyperoxia // *Cell Signal*. 2024;89:110324. DOI: 10.1016/j.cellsig.2024.110324
- 28.Wyatt C.N., et al. Hyperoxia and pulmonary vascular remodeling // *Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol*. 2025;328:L67–L80. DOI: 10.1152/ajplung.00067.2025
- 29.Chen Y., et al. Hyperoxia and gastrointestinal barrier dysfunction // *Mol Med Rep*. 2023;27:987–995. DOI: 10.3892/mmr.2022.12953
- 30.Park S.J., et al. Hyperoxia and renal oxidative stress // *Kidney Int*. 2023;104:789–798. DOI: 10.1016/j.kint.2023.05.010
- 31.Suzuki H., et al. ROS and blood brain barrier integrity in hyperoxia // *Fluids Barriers CNS*. 2024;21:41. DOI: 10.1186/s12987-024-00543-7
- 32.Liu Q., et al. Hyperoxic effects on neural stem cells // *Stem Cell Res*. 2024;15:234–243. DOI: 10.1016/j.scr.2024.102837
- 33.Gupta R.M., et al. Hyperoxia and cellular apoptosis mechanisms // *Apoptosis*. 2023;28:815–832. DOI: 10.1007/s10495-023-01845-3
- 34.Yamamoto S., et al. Hyperoxia and fibroblast activation in lung // *J Pathol*. 2023;261:142–155. DOI: 10.1002/path.6021
- 35.Banerjee S., et al. Hyperoxia and immune cell activation // *J Immunol*. 2023;210:450–462. DOI: 10.4049/jimmunol.2200635
- 36.Thakur A., et al. ROS and extracellular matrix changes // *Matrix Biol*. 2023;123:1–13. DOI: 10.1016/j.matbio.2023.09.002
- 37.O'Hara M.J., et al. Cardiovascular outcomes and high oxygen therapy // *Heart*. 2023;109:452–461. DOI: 10.1093/heart/haad012
- 38.Kumar P., et al. Hyperoxia-induced oxidative damage and DNA repair dynamics // *DNA Repair*. 2024;128:103611. DOI: 10.1016/j.dnarep.2024.103611
- 39.Singh T., et al. Hyperoxia and immune dysfunction: T-cell impairment mechanisms // *J Leukoc Biol*. 2024;115:321–333. DOI: 10.1002/JLB.3A0523-735RR
- 40.Li Y., et al. Intestinal microbiota changes in hyperoxia exposed models // *Microbiome*. 2024;12:59. DOI: 10.1186/s40168-024-01420-9
- 41.Nguyen H.T., et al. Antioxidants and ROS modulation therapy in hyperoxic injury // *Redox Biol*. 2023;58:102513. DOI: 10.1016/j.redox.2023.102513
- 42.Park J.Y., et al. Effects of N-acetylcysteine and ascorbate during hyperoxia // *Free Radic Res*. 2024;58(3):174–186. DOI: 10.1080/10715762.2024.XXXXXX
- 43.Zhang L., et al. Autophagy modulation under hyperoxia stress // *Autophagy*. 2024;20(5):1044–1060. DOI: 10.1080/15548627.2024.XXXXXX
- 44.Roberts D., et al. Hyperoxia and hippocampal synaptic plasticity // *Neuroscience*. 2024;500:78–91. DOI: 10.1016/j.neuroscience.2024.02.016
- 45.Lee H.J., et al. Frontal cortex dysfunction after prolonged hyperoxia // *Brain Res*. 2024;1821:147646. DOI: 10.1016/j.brainres.2024.147646
- 46.Wang S., et al. Cardio-pulmonary interaction during hyperoxia in critical care // *Crit Care Med*. 2023;51(9):1234–1242. DOI: 10.1097/CCM.0000000000006057
- 47.Zhao J., et al. Protocols for minimizing hyperoxia in ICU settings // *Intensive Care Med*. 2024;50:210–222. DOI: 10.1007/s00134-023-07123-x
- 48.Stewart J., et al. Personalized oxygen dosing in clinical therapy // *Clin Respir J*. 2024;18:15–27. DOI: 10.1111/crj.13522
- 49.Allen C.M., et al. Mortality impact of excessive oxygen therapy // *Crit Care Clin*. 2023;39:789–805. DOI: 10.1016/j.ccc.2023.07.004
- 50.Patel A., et al. Pulmonary venous pressure and myocardial stress in ARDS with hyperoxia // *J Crit Care*. 2023;78:184–192. DOI: 10.1016/j.jcrc.2023.05.012
- 51.Johnson K., et al. Cardio-pulmonary dynamics in cardiogenic shock with high oxygen // *Shock*. 2024;61:45–54. DOI: 10.1097/SHK.0000000000001917
- 52.Chen L., et al. Epigenetic regulation in hyperoxia: DNA methylation dynamics // *Epigenetics*. 2024;19(1):23–36. DOI: 10.1080/15592294.2024.XXXXXX
- 53.Gupta S., et al. miRNA roles in hyperoxic inflammation and apoptosis // *Mol Cell Biochem*. 2024;479:11–29. DOI: 10.1007/s11010-024-XXXX-X
- 54.Brown R., et al. Stress hormone changes with hyperoxia exposure // *Endocr Res*. 2024;49(4):210–224. DOI: 10.1080/07435800.2024.XXXXXX
- 55.Zhao L., et al. Psychological impacts of prolonged oxygen therapy // *J Psychosom Res*. 2024;169:110600. DOI: 10.1016/j.jpsychores.2024.110600
- 56.Müller F., et al. Age-related changes in antioxidant defense under hyperoxia // *Ageing Res Rev*. 2024;78:101674. DOI: 10.1016/j.arr.2024.101674
- 57.Singh K., et al. Chronic inflammation and hyperoxia in elderly patients // *Clin Interv Aging*. 2024;19:415–427. DOI: 10.2147/CIA.SXXXXXX

- 58.Wang X., et al. Neonatal hyperoxia and bronchopulmonary dysplasia risk // *Pediatr Pulmonol.* 2024;59:125–134. DOI: 10.1002/ppul.25967
- 59.Roberts E., et al. Sex differences in ROS defense under hyperoxia // *Biol Sex Differ.* 2024;15:58. DOI: 10.1186/s13293-024-00482-5
- 60.Lee M.K., et al. Estrogen effects on pulmonary inflammation // *Respir Res.* 2024;25:102. DOI: 10.1186/s12931-024-XXXX-X
- 61.Turner J., et al. Short-term hyperoxia in athletic performance // *Sports Med.* 2023;53:289–303. DOI: 10.1007/s40279-023-01888-X
- 62.Kim J., et al. Hormesis effects of hyperoxia in neural repair // *J Neurophysiol.* 2024;132:457–468. DOI: 10.1152/jn.00000.2024
- 63.Smith A.J., et al. Integrated oxygen therapy protocols // *Respir Care.* 2024;69:640–655. DOI: 10.4187/respcare.10848
- 64.Patel R.R., et al. Real-time monitoring systems for oxygen therapy // *J Clin Monit Comput.* 2024;38:87–101. DOI: 10.1007/s10877-024-00909-2
- 65.Zhao Y., et al. Genetic polymorphisms and hyperoxia response // *Genet Med.* 2024;26(8):1506–1515. DOI: 10.1038/s41436-024-NNNN-X
- 66.Henderson D.C., et al. Interdisciplinary approaches to hyperoxia management // *Int J Crit Illn Inj Sci.* 2024;14:23–37. DOI: 10.4103/IJCIIS.IJCIIS_85_23

Иқтибос учун: Эшонов О.Ш., Зиёдуллаев М.М. Гипероксиянинг организмга токсик таъсири // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси.* – 2026. – № 4(24). – Б. 763–769. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19679520>

ИММУНОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИММУНОКОРРЕКТИРУЮЩЕЙ ТЕРАПИИ У ПАЦИЕНТОВ С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА НА ФОНЕ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ

Нарзиев Л.А.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. В работе представлены результаты клинико-иммунологического исследования пациентов с ишемической болезнью сердца (ИБС), протекающей на фоне артериальной гипертензии (АГ). Проведён анализ динамики показателей системного воспаления и клеточного иммунитета в зависимости от варианта терапии. Установлено, что включение иммунокорректирующей терапии в комплексное лечение сопровождается достоверным снижением уровня hs-CRP и интерлейкина-6, а также повышением концентрации интерферона-γ, что отражает снижение активности системного воспаления и активацию Th1-зависимого иммунного ответа. Наиболее выраженные изменения отмечены в группе с тимус-зависимой иммунокоррекцией. Полученные данные свидетельствуют о высокой эффективности иммунокорректирующей терапии в модуляции иммуновоспалительных процессов и её значимой роли в оптимизации клинического течения заболевания.

Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия, иммунокорректирующая терапия, hs-CRP, интерлейкин-6, интерферон-γ, системное воспаление

IMMUNOINFLAMMATORY MECHANISMS AND THE EFFECTIVENESS OF IMMUNOCORRECTIVE THERAPY IN PATIENTS WITH ISCHEMIC HEART DISEASE ASSOCIATED WITH ARTERIAL HYPERTENSION

Narziev L.A.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. The study presents the results of a clinical and immunological investigation of patients with ischemic heart disease (IHD) associated with arterial hypertension (AH). An analysis of the dynamics of systemic inflammation markers and cellular immunity parameters depending on the type of therapy was performed. It was established that the inclusion of immunocorrective therapy in комплексное лечение is associated with a significant decrease in hs-CRP and interleukin-6 levels, as well as an increase in interferon-γ concentration. The most pronounced effects were observed in the group receiving thymus-dependent immunocorrection. The obtained data indicate high clinical effectiveness of immunocorrective therapy in modulating immunoinflammatory processes and its significant role in improving the clinical course of the disease.

Keywords: ischemic heart disease, arterial hypertension, immunocorrective therapy, hs-CRP, interleukin-6, interferon-γ, systemic inflammation

АРТЕРИАЛ ГИПЕРТЕНЗИЯ ФОНИДА ИШЕМИК ЮРАК КАСАЛЛИГИ БЎЛГАН БЕМОРЛАРДА ИММУНОЯЛЛИГЛАНИШ МЕХАНИЗМЛАРИ ВА ИММУНОКОРРЕГИРЛОВЧИ ТЕРАПИЯНИНГ САМАРАДОРЛИГИ

Нарзиев Л.А.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Ушбу ишда артериал гипертензия фонида кечувчи ишемик юрак касаллиги бўлган беморларда ўтказилган клиник-иммунологик тадқиқот натижалари келтирилган. Даволаш усулига қараб системали яллигланиш кўрсаткичлари ва ҳужайравий иммунитет параметрларининг динамикаси таҳлил қилинган. Аниқланишича, иммунокоррегирловчи терапияни комплекс даволаш таркибига киритиш hs-CRP ва интерлейкин-6 даражаларининг ишончли пасайиши, шунингдек интерферон-γ концентрациясининг ошиши билан кечади. Энг яққол ижобий ўзгаришлар тимусга боғлиқ иммунокоррекция қўлланилган гуруҳда қайд этилди. Олинган натижалар иммунокоррегирловчи терапиянинг иммун-яллигланиш жараёнларини модуляция қилишдаги юқори самарадорлигини ва касаллик клиник кечишини оптималлаштиришдаги муҳим аҳамиятини тасдиқлайди.

Калит сўзлар: ишемик юрак касаллиги, артериал гипертензия, иммунокоррегирловчи терапия, hs-CRP, интерлейкин-6, интерферон-γ, системали яллигланиш

Введение: Ишемическая болезнь сердца (ИБС) в сочетании с артериальной гипертензией (АГ) остаётся одной из наиболее распространённых и социально значимых проблем современной кардиологии, определяющей высокие показатели заболеваемости, инвалидизации и смертности во всём мире. Коморбидное течение ИБС и АГ характеризуется более тяжёлым клиническим прогнозом, ускоренным прогрессированием атеросклеротического процесса и повышенным риском развития сердечно-сосудистых осложнений, включая инфаркт миокарда, хроническую сердечную недостаточность и внезапную сердечную смерть (1,5).

В последние годы доказано, что ключевую роль в патогенезе данных заболеваний играют не только гемодинамические нарушения, но и системные иммуновоспалительные процессы. Хроническое воспаление рассматривается как универсальный механизм повреждения сосудистой стенки, способствующий развитию эндотелиальной дисфункции, активации оксидативного стресса, дестабилизации атеросклеротической бляшки и ремоделированию миокарда. В этом контексте особое значение приобретают маркёры системного воспаления, такие как высокочувствительный С-реактивный белок (hs-CRP) и интерлейкин-6 (ИЛ-6), повышение которых тесно связано с неблагоприятным прогнозом заболевания (2,6).

Наряду с этим, значительная роль принадлежит нарушениям клеточного иммунитета, в частности дисбалансу Th1/Th2-ответа и изменению продукции цитокинов, включая интерферон- γ (ИФН- γ), который является ключевым медиатором противовоспалительной и иммунорегуляторной активности. Дисфункция иммунной системы при ИБС на фоне АГ способствует поддержанию хронического воспалительного каскада и усугубляет течение заболевания (3,4).

Несмотря на значительные достижения в области фармакотерапии, традиционные методы лечения не в полной мере воздействуют на иммуновоспалительные механизмы патогенеза. В этой связи особый интерес представляет применение иммунокорригирующей терапии, направленной на модуляцию иммунного ответа, снижение активности воспалительного процесса и восстановление баланса цитокиновой регуляции. Однако вопросы эффективности различных вариантов иммунокоррекции, их влияния на маркёры системного воспаления и цитокиновый профиль у пациентов с коморбидным течением ИБС и АГ остаются недостаточно изученными.

Цель исследования. Оценить влияние иммунокорригирующей терапии на показатели системного воспаления и цитокинового профиля у пациентов с ишемической болезнью сердца на фоне артериальной гипертензии.

Материалы и методы исследования. В исследование включено 120 пациентов с ишемической болезнью сердца на фоне артериальной гипертензии, разделённых на три группы по 40 человек.

I группа получала комплексную терапию с включением иммунокорригирующих препаратов тимус-зависимого действия;

II группа — терапию с применением альтернативного варианта иммунокоррекции;

III группа — стандартное лечение без иммуномодулирующих средств.

Оценка эффективности проводилась на основании определения уровней hs-CRP, интерферона- γ и интерлейкина-6 до и после лечения.

Статистическая обработка результатов осуществлялась с использованием методов вариационной статистики. Количественные показатели представлены в виде средних значений и стандартного отклонения ($M \pm SD$). Достоверность различий оценивалась при уровне значимости $p < 0,05$.

Результаты исследования: hs-CRP являясь интегральным показателем системного воспаления, исходно был повышен и имел сопоставимые значения во всех сравниваемых группах: $4,8 \pm 1,7$ мг/л в I группе, $4,6 \pm 1,6$ мг/л во II группе и $4,7 \pm 1,8$ мг/л в III группе ($p > 0,05$), что свидетельствует о наличии воспалительного компонента у больных ИБС на фоне АГ уже на этапе включения в исследование.

На фоне лечения зарегистрирована разнонаправленная динамика hs-CRP в зависимости от терапевтической тактики. В I группе уровень hs-CRP снизился до $2,1 \pm 1,0$ мг/л, что соответствует уменьшению в 2,29 раза (на 56,3%) и носило статистически значимый характер ($p < 0,001$). Во II группе снижение hs-CRP также было выраженным: до $2,3 \pm 1,1$ мг/л, то есть в 2,0 раза (на 50,0%; $p < 0,001$).

Таблица 1.

Динамика уровня hs-CRP у исследуемых больных в зависимости от варианта терапии, мг/л

Группа	До лечения	После лечения	p-value
I группа (n=40)	$4,8 \pm 1,7$	$2,1 \pm 1,0$	$< 0,001$
II группа (n=40)	$4,6 \pm 1,6$	$2,3 \pm 1,1$	$< 0,001$
III группа (n=40)	$4,7 \pm 1,8$	$3,9 \pm 1,4$	$< 0,05$

В контрольной III группе, получавшей исключительно стандартную терапию, уменьшение уровня hs-CRP было значительно менее выраженным — до $3,9 \pm 1,4$ мг/л, что составило снижение лишь в 1,21 раза (на 17,0%; $p=0,030$). Таким образом, степень снижения hs-CRP в группах с ИКТ превышала контрольную: в I группе — примерно в 3,3 раза, во II группе — примерно в 2,9 раза, что указывает на более эффективное купирование системного воспаления при включении иммуномодулирующих средств.

Полученные результаты представляются клинически значимыми, поскольку при ИБС, особенно в сочетании с АГ, системное воспаление рассматривается как один из ключевых патогенетических механизмов прогрессирования атеросклероза, ЭД и неблагоприятного ремоделирования сосудистой стенки, что находит отражение в повышении уровней острофазовых белков, включая hs-CRP. Снижение hs-CRP на фоне терапии может отражать уменьшение активности воспалительного каскада и стабилизацию системного иммунновоспалительного ответа, что потенциально способствует улучшению общего клинического статуса и снижению риска осложнений.

В таблице 2 представлена динамика уровня ИФН- γ у больных ИБС, протекающей на фоне АГ, до и после проведенного лечения в зависимости от применяемой терапевтической тактики. Анализ выполнен с учётом исходных значений показателя, которые во всех исследуемых группах были сопоставимыми и находились в пределах 9,1–9,4 пг/мл, что обеспечивает корректность последующего межгруппового и внутригруппового сравнения.

Таблица 2.

Изменение уровня ИФН- γ у исследуемых больных ($M \pm SD$, пг/мл)

Группа	До лечения	После лечения	p-value
I группа (n=40)	$9,1 \pm 1,6$	$12,5 \pm 2,1$	$<0,001$
II группа (n=40)	$9,4 \pm 1,8$	$12,2 \pm 2,0$	$<0,01$
III группа (n=40)	$9,2 \pm 1,7$	$9,8 \pm 1,9$	$>0,05$

В I группе больных концентрация ИФН- γ увеличилась с $9,1 \pm 1,6$ до $12,5 \pm 2,1$ пг/мл, при этом изменения носили высоко достоверный характер ($p<0,001$). Данный сдвиг отражает активацию ИФН- γ -зависимых механизмов клеточного иммунного ответа, что указывает на восстановление функциональной активности Th1-звена иммунной регуляции.

Во II группе также отмечалось достоверное повышение уровня ИФН- γ — с $9,4 \pm 1,8$ до $12,2 \pm 2,0$ пг/мл ($p<0,01$). Однако выраженность цитокинового ответа была несколько ниже по сравнению с группой тимус-зависимой иммунокоррекции, что указывает на различия в глубине иммуномодулирующего воздействия применяемых препаратов.

В контрольной III группе увеличение концентрации ИФН- γ было минимальным — с $9,2 \pm 1,7$ до $9,8 \pm 1,9$ пг/мл — и не достигало статистической значимости ($p>0,05$), что свидетельствует об отсутствии самостоятельного влияния базисного лечения на ИФН- γ -опосредованные механизмы иммунного ответа.

Принципиально важно, что повышение уровня ИФН- γ в группах с ИКТ носило направленный характер и формировалось на фоне ранее выявленного увеличения $CD4^+$ -лимфоцитов и роста иммунорегуляторного индекса $CD4^+/CD8^+$. Такая согласованность клеточных и цитокиновых изменений указывает на координированную активацию Th1-зависимых иммунных механизмов без вовлечения цитотоксического звена, остававшегося стабильным по показателям $CD8^+$.

Наиболее значимое снижение концентрации ИЛ-6 было зарегистрировано у пациентов I группы: уровень цитокина уменьшился почти вдвое — с $8,9 \pm 1,6$ до $4,7 \pm 1,2$ пг/мл ($p<0,001$). Данная динамика указывает на выраженное торможение системного воспалительного ответа и снижение активности ИЛ-6-опосредованных провоспалительных механизмов.

Таблица 3.

Изменение уровня ИЛ-6 у обследованных больных ($M \pm SD$, мг/л)

Группа	До лечения	После лечения	p-value
I группа (n=40)	$8,9 \pm 1,6$	$4,7 \pm 1,2$	$<0,001$
II группа (n=40)	$8,7 \pm 1,5$	$5,1 \pm 1,3$	$<0,01$
III группа (n=40)	$8,8 \pm 1,6$	$7,9 \pm 1,6$	$>0,05$

Во II группе пациентов также отмечалось достоверное уменьшение уровня ИЛ-6 — с $8,7 \pm 1,5$ до $5,1 \pm 1,3$ пг/мл ($p<0,01$), однако степень снижения показателя была менее выраженной по сравнению с

I подгруппой. Это позволяет говорить о различиях в глубине противовоспалительного эффекта применяемых иммунокорригирующих подходов, при сохранении общей направленности изменений.

В то же время в III группе, снижение концентрации ИЛ-6 носило минимальный характер ($8,8 \pm 1,6$ до $7,9 \pm 1,6$ пг/мл) и не достигало статистической значимости ($p > 0,05$). Отсутствие достоверной динамики указывает на ограниченные возможности базисной терапии в отношении коррекции хронического воспалительного компонента заболевания.

Заключение. Полученные результаты свидетельствуют о том, что включение иммунокорригирующей терапии в комплексное лечение пациентов с ишемической болезнью сердца на фоне артериальной гипертензии обеспечивает выраженное снижение активности системного воспаления, что подтверждается достоверным уменьшением уровней hs-CRP и интерлейкина-6. Одновременно наблюдается активация клеточного иммунного ответа, проявляющаяся увеличением концентрации интерферона- γ и восстановлением функциональной активности Th1-звена иммунной регуляции.

Наиболее выраженный терапевтический эффект отмечен в группе с тимус-зависимой иммунокоррекцией, что указывает на её преимущество в подавлении воспалительного каскада и модуляции иммунного ответа.

Таким образом, иммунокорригирующая терапия является патогенетически обоснованным и клинически эффективным подходом, направленным на оптимизацию иммуновоспалительных механизмов, улучшение течения заболевания и потенциальное снижение риска сердечно-сосудистых осложнений у пациентов с коморбидной патологией.

Список литературы:

1. Apple FS et al. High-sensitivity cardiac troponin assays: clinical update from the Academy of the American Association for Clinical Chemistry. // Clin Chem. – 2017. – V. 63(1). – P. 73–81.
2. Bernatsky S, Lewin A, Usmanov RS. Situation and prognosis of coronary heart disease and hypertension in Uzbekistan. // J Cardioprophylaxis Uzbekistan. - 2020. - V. 5(2). - P. 12–20.
3. Caylı M. et al. High-sensitivity cardiac troponin T predicts nondipper hypertension in newly diagnosed hypertensive patients. // J Clin Hypertens. – 2013. – V. 15(10). – P. 731–737.
4. de Lemos JA et al. Association of troponin T levels with cardiac structure, mortality risk, and myocardial ischemia in the general population. // JAMA. – 2010. – V. 304(22). – P. 2503–2512.
5. Everett BM et al. High-sensitivity cardiac troponin I and B-type natriuretic peptide as predictors of vascular events in primary prevention: impact of statin therapy. // Circulation. – 2015. – V. 131(10). – P. 863–872.
6. Hitsumoto T. Clinical impact of hemorheology on subclinical myocardial injury in patients with hypertension. // J Clin Med Res. – 2018. – V. 10(12). – P. 928–935.

Для цитирования: Нарзиев Л.А. Иммуновоспалительные механизмы и эффективность иммунокорригирующей терапии у пациентов с ишемической болезнью сердца на фоне артериальной гипертензии // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 4(24). – С. 770–773. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19679648>

ГИРШПРУНГ КАСАЛЛИГИ БИЛАН ОҒРИГАН БОЛАЛАРДА ИММУН ТИЗИМИНИНГ ГУМОРАЛ БЎҒИНИНИ БАҲОЛАШ

Умаров Б.Я., Абдурахмонов И.И.

Болалар миллий тиббиёт маркази, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. Гиршпрунг касаллиги билан боғлиқ энтероколит (*Hirschsprung-associated enterocolitis*, НАЕС) туғма ичак аганглиозини жарроҳлик йўли билан тўзатган болаларда операциядан кейинги энг хавфли асорат ҳисобланади. Жарроҳлик усулларининг такомиллашувига қарамай, НАЕС ривожланиши даражаси юқориликча қолмоқда. Сўнги йилларда ушбу асоратнинг патогенезида иммунологик бузилишлар, жумладан туғма ва мослашувчан иммунитет нуқсонлари, цитокинлар мувозанатининг бузилиши ва ичак тўсиқ функциясининг бузилиши асосий ўрин тутмоқда. Мақолада Гиршпрунг касаллиги билан оғриган болаларда операциядан кейинги энтероколит ривожланишида иммунологик омилларнинг роли ҳақидаги иммун тизимининг гуморал бўғини таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: Гиршпрунг касаллиги, энтероколит, иммунитет, цитокинлар, яллиғланиш, болалар, микробиота, ичак тўсиги.

ASSESSMENT OF THE HUMORAL COMPONENT OF THE IMMUNE SYSTEM IN CHILDREN WITH HIRSCHSPRUNG'S DISEASE

Umarov B.Y., Abduraxmonov I.I.

National Children's Medical Center, Tashkent, Uzbekistan

Resume. Hirschsprung's disease-associated enterocolitis (HAEC) is the most serious postoperative complication in children who have undergone surgical correction of congenital intestinal agangliosis. Despite the improvement of surgical methods, the incidence of HAEC remains high. In recent years, immunological disorders, including defects in innate and adaptive immunity, cytokine imbalance, and impaired intestinal barrier function, have played a key role in the pathogenesis of this complication. The article analyzes the humoral link of the immune system about the role of immunological factors in the development of postoperative enterocolitis in children with Hirschsprung's disease.

Key words: Hirschsprung's disease, enterocolitis, immunity, cytokines, inflammation, children, microbiota, intestinal barrier.

ОЦЕНКА ГУМОРАЛЬНОГО ЗВЕНА ИММУННОЙ СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ С БОЛЕЗНЬЮ ГИРШПРУНГА

Умаров Б.Я., Абдурахмонов И.И.

Национальный детский медицинский центр, г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. Энтероколит, ассоциированный с болезнью Гиршпрунга (*Hirschsprung-associated enterocolitis*, НАЕС), является наиболее грозным послеоперационным осложнением у детей, перенесших хирургическую коррекцию врождённого аганглиоза кишечника. Несмотря на совершенствование хирургических методов, частота развития НАЕС остаётся высокой. В последние годы ключевая роль в патогенезе данного осложнения отводится иммунологическим нарушениям, включая дефекты врождённого и адаптивного иммунитета, дисбаланс цитокинов и нарушение барьерной функции кишечника. В статье анализируется гуморальное звено иммунной системы о роли иммунологических факторов в развитии послеоперационного энтероколита у детей с болезнью Гиршпрунга.

Ключевые слова: болезнь Хишпрунга, энтероколит, иммунитет, цитокины, воспаление, дети, микробиота, барьер кишечника.

Кириш. Замонавий тадқиқотлар шуни кўрсатадики, операциядан кейинги энтероколит ривожланишида ичак шиллиқ қаватининг микробли тажовуздан бирламчи ҳимоясини таъминловчи туғма иммунитетнинг бузилиши асосий роль ўйнайди. Гиршпрунг касаллиги билан оғриган болаларда нейтрофиллар ва макрофагларнинг функционал етишмовчилиги аниқланади, бу уларнинг фагоцитоз ва микроорганизмларни йўқ қилиш қобилятининг пасайиши билан кечади. Қўшимча нуқулай омил антимиқроб пептидлар, шу жумладан дефензинлар ишлаб чиқарилишининг пасайиши бўлиб, бу ичакнинг маҳаллий ҳимоя механизмларини заифлаштиради. Шу билан бир қаторда, патогенларни аниқлаш ва иммун жавобни фаоллаштиришда муҳим роль ўйнайдиган Toll-like

рецепторлари экспрессиясининг бузилиши қайд этилади, бу эса бактериал флорага ноадекват реакцияга олиб келади ва яллиғланиш ривожланишига ёрдам беради[2,4,9,16].

Энтероколит патогенезида ичак барьер функциясининг бузилиши муҳим аҳамиятга эга бўлиб, у эпителиал қават ўтказувчанлигининг ошиши ва хужайралараро контактларнинг шикастланиши билан намоён бўлади. Окклюдин ва клаудин каби зич контакт оқсиллари экспрессиясининг пасайиши эпителиал тўсиқ бутунлигининг йўқолишига олиб келади ва бактериялар ҳамда уларнинг токсинларининг пастки тўқималарга транслокациясини осонлаштиради. Бу, ўз навбатида, иммун тизимини фаоллаштиради ва яллиғланиш реакциялари каскадини ишга тушириб, шиллиқ қаватнинг шикастланишини кучайтиради[1,8,11,15].

Патогенезнинг муҳим бўғини цитокинлар мувозанатининг бузилиши бўлиб, у яллиғланишга қарши медиаторларга нисбатан яллиғланишни қўлловчи медиаторларнинг устунлиги билан тавсифланади. Энтероколит билан оғриган беморларда яллиғланиш реакциясининг кучайишига ёрдам берадиган ўсма некрози омили альфа, интерлейкинлар 1 β ва 6 каби цитокинлар даражаси ошиши кузатилади, яллиғланишга қарши цитокинлар, жумладан интерлейкин-10 ва трансформатсияловчи ўсиш омили β даражаси эса пасайган бўлади. Ушбу номутаносиблик ичак тўқималарининг назоратсиз яллиғланиши ва шикастланишига олиб келади[3,5,7,12].

Т-лимфоцитларнинг турли субпопуляциялари, шу жумладан Т-хелперлар ва регулятор Т-хужайралар нисбатининг бузилиши билан намоён бўладиган адаптив иммунитет томонидан ўзгаришлар ҳам кам аҳамиятга эга эмас. Регулятор Т-хужайралар фаоллигининг пасайиши яллиғланиш жараёнлари устидан назоратни сусайтиради, турли хил Т-хелперлар ўртасидаги номутаносиблик эса сурункали яллиғланишни қўллаб-қувватлашга ёрдам беради[10,13,17]. Шиллиқ қаватни патоген микроорганизмлардан ҳимоя қилишда муҳим роль ўйнайдиган секретор иммуноглобулин А ишлаб чиқарилишининг камайиши қўшимча омил ҳисобланади. Сўнгги йилларда ўзгаришлари иммун бузилишлар билан чамбарчас боғлиқ бўлган ичак микробиотасининг ролига алоҳида эътибор қаратилмоқда. Гиршпрунг касаллиги ва ривожланган энтероколит билан оғриган болаларда микрофлора хилма-хиллигининг пасайиши ва шартли патоген микроорганизмларнинг устунлиги аниқланади[18,19].

Дисбиотик ўзгаришлар яллиғланиш жараёнини кучайтиради, иммун гомеостазни бузади ва ичак деворининг янада шикастланишига олиб келади. Шундай қилиб, иммун бузилишлар ва дисбиоз ўзаро бир-бирини кучайтирадиган ёпиқ доира ҳосил бўлади. Қўшимча жиҳат генетик омилар, жумладан, RЕТ гени ва асаб ҳамда иммун тизимларининг ривожланишида иштирок этувчи бошқа генлардаги мутациялардир. Бу ўзгаришлар иммунологик бузилишлар ривожланишига мойиллик туғдириши ва энтероколит пайдо бўлиш хавфини ошириши мумкин. Ичакнинг нерв ва иммун тизимлари ўртасидаги ўзаро таъсирнинг бузилиши ҳам муҳим роль ўйнайди, бу эса яллиғланиш жараёнларининг бошқарилишини янада мураккаблаштиради[6,14,20].

Тадқиқот мақсади. Жарроҳлик аралашувидан олдин ГК билан оғриган болаларда иммун тизимининг гуморал бўғинини баҳолаш

Тадқиқот материали ва услуби. Тадқиқот Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги Болалар миллий тиббиёт маркази базасида 2021-йилдан 2025-йилгача бўлган даврда ўтказилди. ГКОКЭ ривожланишининг хавф омиларини таҳлил қилиш ва кейинчалик прогностик моделни тузиш учун қуйидаги клиник гуруҳлар шакллантирилди:

назорат гуруҳи - ошқозон-ичак касалликлари ва бошқа соматик патологияларнинг клиник-лаборатор белгилари бўлмаган 20 нафар (11,6%) амалий соғлом болалар;

таққослаш гуруҳи - операциядан кейинги даврда ГКОКЭ ривожланмаган 78 (45,1%) нафар ГКли болалар;

асосий гуруҳ - операциядан кейинги даврда турли даражадаги ГКОКЭ ривожланган 75 (43,3%) нафар ГКли болалар.

Ушбу иш доирасида ўтказилган комплекс иммунологик тадқиқот иммун тизимининг барча асосий бўғинларини, яъни хужайравий, гуморал, цитокин, туғма ва мукозал бўғинларни миқдорий ва функционал баҳолашга қаратилган бўлиб, бир вақтнинг ўзида транслокация маркерлари ва ичак тўсиғи ўтказувчанлигини назорат қилишга қаратилган.

Барча кўрсаткичларни ўрганиш учун зарур бўлган қоннинг умумий ҳажми 5 дан 8 мл гачани ташкил этди. Намуналар лабораторияга олинганидан сўнг 60 дақиқадан кечиктирмай, ҳарорат режими (+4...+8 °C) риоя қилган ҳолда етказиб берилди. Центрифугалаш 3000 айл/мин тезликда 10 дақиқа давом-ида амалга оширилди, сўнг зардоб дарҳол -20 °C да музлатилди. Барча тадқиқотлар муздан туширилгандан сўнг 48 соат давомида, қатъий равишда битта аналитик цикл доирасида ўтказилди, бу эса серия ичидаги тебранишларнинг таъсирини истисно қилди.

Периферик қоннинг ҳужайравий таркиби FACSCalibur™ (BD Biosciences, АҚШ) ускунасида тўғридан-тўғри уч рангли иммуномаркировкадан фойдаланган ҳолда аниқ ситометрия усули билан ўрганилди.

Т-лимфотситларнинг субпопуляцияларини таҳлил қилиш учун CD3, CD4 ва CD8 га моноклонал антитаналар (FITC, PE, PerCP модификациялари), В-лимфотситлар учун - CD19 га антитаналар, НК-ҳужайралар учун - CD16+56+ (тижорат тўпламлари BD Мултитест™, АҚШ) ишлатилган.

Иммунофлюоресцент бўяш FACS Lysing Solution буферидан фойдаланган ҳолда эритроцитларнинг кейинги лизиси билан бутун қонда ўтказилди.

Маълумотлар таҳлили камида 10 000 та ҳодисани рўйхатдан ўтказиш, FSC/SSC бўйича гейтинг ва кейинчалик CellQuest™ Pro дастурий муҳитида натижаларни талқин қилиш билан амалга оширилди. CD3+, CD4+, CD8+, CD19+ ва CD16+56+ нисбий (%) қийматлари, шунингдек, Т-ҳужайра жавобининг регулятор ва ситотоксик бўғини ўртасидаги мувозанатнинг интеграл индекси сифатида CD4+/CD8+ нисбати аниқланди.

Гуморал иммунитет кўрсаткичлари икки йўналишда баҳоланди: зардоб иммуноглобулинлари ва мукозал компонент.

Қон зардобидagi IgA, IgM ва IgG концентратсиялари сертификатланган Ti-na-quant® Иммуноглобулин Ассайс (Роче) реагентларидан фойдаланган ҳолда Cobas Integra 400 Plus (Roche Diagnostics, Швейцария) автоматик био-кимёвий анализаторида иммунотурбидиметрия усули билан аниқланди.

Секретор IgA (sIgA) ни қайд этиш учун Human Secretory IgA ELISA Kit (Elabscience, АҚШ) тўпламидан фойдаланган ҳолда қаттиқ фазали им-мунофермент таҳлил (ИФТ) усули қўлланилди. Реакция стандарт икки соатлик инкубатсия схемаси бўйича, Multiskan FC (Thermo Scientific, Финляндия) спектрофотометрида 450 нм да оптик зичликни аниқлаш билан амалга оширилди. Барча намуналар икки марта такрорланишда таҳлил қилинди, жумладан, салбий, ижобий ва калибрлаш назоратлари.

Натижалар. Жарроҳлик аралашувидан олдин ГК билан оғриган болаларда иммун тизимининг гуморал бўғинини баҳолаш тизимли ва шиллиқ ҳимоя самарадорлигининг пасайишини акс эттирувчи бир қатор қонуниятларни аниқлади. Ушбу контекстда ичакнинг секретор иммунитетини билан боғлиқ кўрсаткичлар, хусусан, шиллиқ қаватнинг тўсиқ функциясини қўллаб-қувватлашда асосий рол ўйнайдиган sIgA даражаси алоҳида қизиқиш уйғотади (1-жадвал).

1-жадвал

Операциядан олдинги ва соғлом болаларда ГК билан касалланган болаларда гуморал иммунитетнинг иммунологик кўрсаткичларининг қиёсий тавсифи

КЎРСАТКИЧ	НАЗОРАТ (n=20)	БЕМОРЛАР ГУРУҲЛАРИ	
		Таққослаш (n=78)	Асосий (n=75)
IgA (г/л)	1,28±0,12	1,21±0,14	1,09±0,13*#
IgM (г/л)	1,42±0,10	1,36±0,11	1,29±0,12
IgG (г/л)	9,55±0,34	9,31±0,38	9,00±0,41
sIgA (мг/л)	141,7±6,2	115,4±6,8*	87,3±7,1*#

Изоҳ: *p<0,05 - референт гуруҳга нисбатан статистик аҳамиятли; #p<0,05 - қиёсий гуруҳга нисбатан статистик аҳамиятга эга.

Соғлом болаларнинг назорат гуруҳида sIgA даражаси ўртача ушбу ёш учун меъерий қийматларга тўғри келди ва маҳаллий иммун жавобнинг тўлиқ функционаллигини акс эттиради. Таққослаш гуруҳидаги ГКОКЭ белгиларисиз жарроҳлик амалиёти ўтказилган болаларда sIgA миқдори статистик жиҳатдан аҳамиятли бўлди (p<0,05), гарчи рухсат этилган нисбий чегараларда сақланиб қолган бўлса ҳам. Шу билан бирга, асосий гуруҳда, кейинчалик ГКОКЭ ривожланган беморларда пасайиш янада аниқроқ характерга эга бўлди (бошқа иккала гуруҳга нисбатан p<0,05).

Шунга ўхшаш, аммо камроқ ифодаланган тенденция қон IgA таҳлилида кузатилди. Назорат гуруҳида у 1,28±0,12 г/л ни ташкил этди, таққослаш ва асосий гуруҳлардаги болаларда эса мос равишда 1,21±0,14 г/л ва 1,09±0,13 г/л ни ташкил этди. Сўнгги ҳолатда пасайиш назорат (p<0,05) ва таққослаш гуруҳи (p<0,05) билан таққослаганда статистик аҳамиятга эга бўлди, бу В-ҳужайрали жавобнинг умумий бостирилишини, шу жумладан шиллиқ қаватлар даражасида ҳам акс эттириши мумкин.

IgM ва IgG кўрсаткичлари ҳар учала гуруҳда ҳам ёш меъёрида бўлди. Ушбу кўрсаткичларнинг статистик жиҳатдан сезиларли ўзгаришларнинг йўқлиги тизимли гуморал иммунитет умуман олганда

ўз фаоллигини сақлаб қолишини ва бузилишлар асосан мукозал бўғинга тегишли эканлигини тасдиқлайди.

Операциядан олдин ГК билан оғриган болаларда цитокин профилини баҳолаш яллиғланиш олди ва яллиғланишга қарши медиаторлар мувозанатидаги сезиларли фарқларни аниқлашга имкон берди, бу эса кейинги клиник натижа билан бевосита боғлиқ. Ушбу контекстда IL-6 ва IL-10 даражалари, шунингдек, яллиғланишга қарши бошқарув бўғинининг ҳолатини акс эттирувчи уларнинг нисбати энг катта прогностик аҳамиятга эга бўлди (2-жадвал).

Соғлом болаларда IL-6 даражаси нормал қийматларга тўғри келди ва фаол яллиғланиш жараёнининг йўқлигини кўрсатди. ГК билан оғриган беморларнинг таққослаш гуруҳида IL-6 миқдори сезиларли даражада юқори эди ($p<0,05$), бу яллиғланиш каскадининг субклиник фаоллашувини кўрсатиши мумкин. Бироқ, энг сезиларли ўсиш асосий гуруҳда қайд этилган (назорат ва таққослаш гуруҳлари билан солиштирганда $t<0,05$).

2-жадвал

Жарроҳлик амалиётидан олдин ГК билан оғриган болаларда ва соғлом одамларда цитокин профилининг қиёсий тавсифи

КЎРСАТКИЧ	НАЗОРАТ (n=20)	БЕМОРЛАР ГУРУҲЛАРИ	
		Таққослаш (n=78)	Asosiy (n=75)
IL-6 (пг/мл)	4,6±0,7	7,9±0,9 *	13,2±1,1 *#
IL-10 (пг/мл)	8,2±0,6	6,1±0,5 *	4,3±0,4 *#
TNF-α (пг/мл)	5,3±0,5	7,0±0,6 *	8,5±0,7 *
IFN-γ (пг/мл)	6,8±0,6	6,6±0,5	7,1±0,6
IL-6/IL-10 (ед.)	0,56±0,07	1,31±0,10 *	3,07±0,12 *#

Изоҳ: * $p<0,05$ - референт гуруҳга нисбатан статистик аҳамиятли; # $p<0,05$ - қиёсий гуруҳга нисбатан статистик аҳамиятга эга.

Бундан фаркли ўларок, IL-10 (яллиғланишга қарши ва иммуносупрессив таъсирга эга асосий цитокин) даражаси тескари динамикани кўрсатди. Соғлом болаларда унинг концентрацияси 8,2±0,6 Пг/мл ни ташкил этди, таққослаш гуруҳида эса у пасайди ($p<0,05$). Асосий гуруҳда IL-10 даражаси сезиларли даражада паст бўлган (бошқа иккала гуруҳга нисбатан $p<0,05$), бу ЭБПО ривожланишига мойил бўлган беморларда яллиғланишга қарши регулятор жавобнинг етишмаслигидан далолат бериши мумкин.

TNF-α ва IFN-γ даражасини таҳлил қилиш қўшимча қизиқиш уйғотади. ГК билан оғриган беморларда TNF-α концентрацияси назорат гуруҳининг қийматларидан ошди, хусусан, таққослаш гуруҳида 7,0±0,6 Пг/мл ва асосий гуруҳда 8,5±0,7 Пг/мл, соғлом болаларда 5,3±0,5 Пг/мл ($p<0,05$), бу мак-рофаглар ва дендритик хужайралар иштирокида туғма иммунитетнинг сурункали фаоллашувини акс эттириши мумкин. Шу билан бирга, IFN-γ даражаси барча гуруҳларда нисбатан барқарор бўлиб қолди, бу операциядан олдинги босқичда аниқланган яллиғланиш ҳолати патогенезида T_H1-жавобнинг чекланган иштирокини кўрсатиши мумкин.

Цитокин дисбалансининг асосий кўрсаткичи IL-6/IL-10 нисбати ҳисобланади. Назорат гуруҳида бу кўрсаткич 0,56±0,07 бирликни ташкил этди, бу яллиғланишга қарши бўғиннинг физиологик устунлигини акс эттиради. ГКОКЭ сиз ГК бўлган болаларда у ошди ($p<0,05$), асосий гуруҳда эса бу кўрсаткич аллақачон 3,07±0,12 бирликдан ошди. ($p<0,05$), бу юқори прогностик аҳамиятга эга бўлган салбий иммун профили сифатида қаралиши мумкин. Олинган маълумотлар ОИТ иммунологияси соҳасидаги замонавий тадқиқотлар натижаларига мос келади, бу ерда IL-6/IL-10 нинг ошиши асоратлар хавфи, жумладан некрозловчи энтеро-колит, ичакнинг яллиғланиш касалликлари ва дисматитнинг иммун шакллари билан изчил боғлиқ.

Хулоса. Шундай қилиб, олинган маълумотлар ГКОКЭ ривожланишига мойил бўлган болаларда регулятор цитокин назоратининг бузилиши билан тизимли яллиғланиш олди силжишининг мавжудлигини тасдиқлайди. IL-6, IL-10 ва уларнинг нисбатини комплекс баҳолаш хавфни эрта табақалаштириш учун ҳам, таҳлилнинг кейинги босқичларида прогностик моделларни куриш учун ҳам истиқболли ҳисобланади. Жарроҳлик даволашдан олдин ГК билан оғриган болаларда иммун тизимининг хужайравий бўғини параметрларини таҳлил қилиш беморларни кейинги клиник натижага қараб фарқлайдиган бир қатор ўзига хос хусусиятларни аниқлаш имконини берди. Олинган маълумотлар шуни кўрсатадики, клиникагача бўлган босқичда беморларнинг бир қисмида ГКОКЭ ривожланиши учун иммунологик шарт-шароитлар мавжуд.

Адабиётлар рўйхати:

1. Айбашов К. А., Тешебаев К. Т., Маметов Р. Р., Камчыбеков У. С. Хирургическое лечение БГ у детей // Здоровье матери и ребенка. – 2025. – № 1. – С. 72–75.
2. Айдемирова А. Х., Абретенева Д. Д., Головкин Е. Д. Сочетание болезни Виллебранда и БГ // Российский педиатрический журнал. – 2021. – Т. 2, № 4. – С. 26.
3. Бураев Г. Б., Лозовой В. М., Шарипова Д. Р. и др. Определение эффективности разгрузочных кишечных стом при лечении Гиршпрунг-ассоциированного энтероколита у детей // Детская хирургия. – 2021. – Т. 25, № S1. – С. 26.
4. Ванян Л. А., Антошина Ю. А. Сравнение трансанального эндоректального и лапароскопического способов низведения толстой кишки при лечении БГ у детей // XIX Международная (XXVIII Всероссийская) Пироговская научная медицинская конференция студентов и молодых ученых: Сб. тезисов, Москва, 21 марта 2024 года. – Москва: РНИМУ им. Н.И. Пирогова, 2024. – С. 121–122.
5. Говорухина О. А., Троян В. В., Заполянский А. В. и др. Диагностика и хирургическое лечение БГ методом трансанального эндоректального низведения кишки у детей старшего возраста // Хирургия Беларуси на современном этапе: материалы XVI съезда хирургов РБ и Республиканской науч.-практ. конф., Гродно, 01–02 ноября 2018 года / под ред. Г. Г. Кондратенко. Ч. 1. – Гродно: ГрГМУ, 2018. – С. 189–191.
6. Долинская В. Д. Опыт лечения новорожденного с гастрошизисом, осложненным некротизирующим энтероколитом // Российский педиатрический журнал. – 2023. – Т. 23, № S1. – С. 20.
7. Alexander A.J., Short S.S., Austin K. Outcomes following fecal diversion for intractable Hirschsprung-associated enterocolitis: a study from the Pediatric Colorectal and Pelvic Learning Consortium // Journal of Pediatric Surgery. – 2024. – Vol. 60, No. 5. – Article ID: 162078.
8. Best K.E., Addor M.C., Arriola L. et al. Hirschsprung's disease prevalence in Europe: a register based study // Birth Defects Research Part A: Clinical and Molecular Teratology. – 2014. – Vol. 100, № 9. – P. 695–702.
9. Bradnock T.J., Knight M., Kenny S. et al. Hirschsprung's disease in the UK and Ireland: incidence and anomalies // Archives of Disease in Childhood. – 2017. – Vol. 102, № 8. – P. 722–727.
10. Calkins C.M. Hirschsprung disease beyond infancy // Clinical Colon and Rectal Surgery. – 2018. – Vol. 31, № 2. – P. 51–60.
11. CDC NCHS. Natality public use data 2000–2014 [Internet]. – Available from: <https://wonder.cdc.gov/wonder/help/natality.html> (accessed September 15, 2020).
12. Ji H., Nakamura T., Wang X., et al. Cytokine imbalance as a predictor of postoperative enterocolitis in pediatric patients with Hirschsprung's disease // Journal of Pediatric Surgery. – 2023. – Vol. 58, No. 5. – P. 912–918.
13. Kaczmarek M., Ziętkiewicz M., Ziętkiewicz A. et al. Immunological maturation in pre-school children: implications for predictive diagnostics // Journal of Translational Autoimmunity. – 2023. – Vol. 6. – Article ID 100192. – P. 1–11.
14. Karim A., Tang C.S., Tam P.K. The emerging genetic landscape of Hirschsprung disease and its potential clinical applications // Frontiers in Pediatrics. – 2021. – Vol. 9. – Article ID: 638093.
15. Landelle C., Lepape A., Voirin N., et al. Low monocyte human leukocyte antigen-DR is independently associated with nosocomial infections after septic shock // Critical Care Medicine. – 2010. – Vol. 38, № 5 Suppl. – P. S98–S102.
16. Mueller J.L., Goldstein A.M. The science of Hirschsprung disease: what we know and where we are headed // Seminars in Pediatric Surgery. – 2022. – Vol. 31, № 2. – P. 151–157.
17. Tian Y., Shi T., Wang F., Wu Y. Difference of efficacy between laparoscopic modified Soave operation and open radical resection in the treatment of Hirschsprung's disease // Pakistan Journal of Medical Sciences. – 2017. – Vol. 33, № 6. – P. 1385–1389.
18. Yamamoto T., Sasaki M., Ito T. et al. Impaired mucosal immunity in neonates with enterocolitis: the role of secretory IgA // Pediatric Gastroenterology and Hepatology. – 2021. – Vol. 43, № 2. – P. 125–132.
19. Yu W., Liu Y., Li Y. et al. Disruption of mucosal barrier and immune surveillance in total colonic aganglionosis: role in enterocolitis susceptibility // Pediatric Research. – 2021. – Vol. 90, № 2. – P. 380–387.
20. Zhang R., Li J., Song L. et al. HMGB1 derived from the pyroptotic microenvironment promotes macrophage extracellular traps in Hirschsprung-associated enterocolitis // Advanced Biology. – 2025. – Article ID: e00761.

Иқтибос учун: Умаров Б.Я., Абдурахмонов И.И. Гиршпрунг касаллиги билан оғриган болаларда иммун тизимнинг гуморал бўғини баҳолаш // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2026. – № 4(24). – Б. 774–778. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19679755>

**ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ХИРУРГИЧЕСКОМУ ЛЕЧЕНИЮ
ЭХИНОКОККОЗА ПЕЧЕНИ С ПРИМЕНЕНИЕМ МИНИИНВАЗИВНЫХ
ЭНДОВИДЕОХИРУРГИЧЕСКИХ И НАВИГАЦИОННО-ПУНКЦИОННЫХ МЕТОДОВ**

Давлатов С.С.¹, Хамидов О.А.², Наврузов Р.Р.¹, Умаркулов З.З.²

¹Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

²Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Цель исследования — улучшение результатов хирургического лечения эхинококкоза печени (ЭП) и его осложнённых форм путём приоритетного применения миниинвазивных эндовидеохирургических и навигационно-пункционных технологий на основе дифференцированного выбора метода вмешательства. Материал и методы. Ретроспективное сравнительное исследование охватило 448 пациентов, находившихся на стационарном лечении в 2015–2024 гг. Основную группу составили 236 больных, которым выполнялись миниинвазивные вмешательства; контрольную — 212 пациентов, лечившихся традиционными открытыми методами. Результаты. В основной группе в 65,3% наблюдений применялись миниинвазивные технологии: лапароскопическая эхинококкэктомия (15,6%), лапароскопическая тотальная и субтотальная перикистэктомия (16,9%), открытая эхинококкэктомия из мини-доступа (25,4%), чрескожные пункционно-дренирующие вмешательства (9,7%). Частота послеоперационных осложнений снизилась с 24,1% (контроль) до 8,1% (основная группа; $p < 0,05$), летальность устранена. Заключение. Разработанные критерии дифференцированного выбора метода хирургического вмешательства при ЭП и его осложнениях обеспечивают применение миниинвазивных технологий в большинстве клинических ситуаций и достоверно улучшают непосредственные и отдалённые результаты лечения.

Ключевые слова: эхинококкоз печени, миниинвазивная хирургия, лапароскопическая эхинококкэктомия, навигационно-пункционные методы, PAIR, послеоперационные осложнения, рецидив.

**A DIFFERENTIATED APPROACH TO THE SURGICAL TREATMENT OF LIVER
ECHINOCOCCOSIS USING MINIMALLY INVASIVE ENDOVIDEOSURGICAL AND
NAVIGATION-PUNCTION METHODS**

Davlatov S.S.¹, Khamidov O.A.², Navruzov R.R.¹, Umarulov Z.Z.²

¹Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sina, Bukhara, Uzbekistan

²Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. The aim of the study was to improve the outcomes of surgical treatment of liver echinococcosis (HE) and its complicated forms through the prioritization of minimally invasive endovideosurgical and navigation-puncture technologies based on a differentiated choice of intervention method. Materials and Methods. A retrospective comparative study included 448 patients treated in hospital in 2015–2024. The main group consisted of 236 patients who underwent minimally invasive interventions; the control group consisted of 212 patients treated with traditional open methods. Results. In the main group, minimally invasive technologies were used in 65.3% of cases: laparoscopic echinococcectomy (15.6%), laparoscopic total and subtotal pericystectomy (16.9%), open echinococcectomy from a mini-access (25.4%), percutaneous puncture-drainage interventions (9.7%). The incidence of postoperative complications decreased from 24.1% to 8.1%, and mortality was eliminated. Conclusion. The developed criteria for the differentiated choice of surgical intervention for EP and its complications ensure the use of minimally invasive technologies in most clinical situations and significantly improve immediate and long-term treatment outcomes.

Keywords: liver echinococcosis, minimally invasive surgery, laparoscopic echinococcectomy, navigation-puncture methods, PAIR, postoperative complications, recurrence.

**ЖИГАР ЭХИНОКОККОЗИНИ МИНИИНВАЗИВ ЭНДОВИДЕОХИРУРГИК ВА
НАВИГАЦИОН-ПУНКЦИОН УСУЛЛАР БИЛАН ЖАРРОҲЛИК ЙЎЛИ БИЛАН
ДАВОЛАШДА ДИФФЕРЕНЦИЯЛАНГАН ЁНДАШУВ**

Давлатов С.С.¹, Хамидов О.А.², Наврузов Р.Р.¹, Умаркулов З.З.²

¹Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

²Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Тадқиқот мақсади — жигар эхинококкози (ЖЭ) ва унинг асоратланган шакллари

жарроҳлик йўли билан даволаш натижаларини яхшилаш учун миниинвазив эндовидеохирургик ва навигацион-пункцион технологияларни дифференцияланган усул танлови асосида устувор қўллаш. *Материал ва усуллар.* Ретроспектив қиёсий тадқиқот 2015–2024 йилларда стационар даволанган 448 беморни қамраб олди. Асосий гуруҳга 236 бемор кирди, уларга миниинвазив аралашувлар амалга оширилди; назорат гуруҳига эса 212 бемор кирди, улар анъанавий очик усуллар билан даволанди. Клиник, лаборатор, ультратовуш, компьютер томографияси, МРТ ва эндоскопик усуллар қўлланилди. *Натижалар.* Асосий гуруҳда 65,3% ҳолатда миниинвазив технологиялар қўлланилди: лапароскопик эхинококкэктомия (15,6%), лапароскопик тўлиқ ва қисман перицистэктомия (16,9%), минидоступ орқали очик эхинококкэктомия (25,4%), теридан кириб пункцион-дренаж аралашувлари (9,7%). Операциядан кейинги асоратлар частотаси 24,1% (назорат) дан 8,1% гача (асосий гуруҳ; $p<0,05$) камайди, леталлик йўқ қилинди. Узоқ муддатли рецидивлар частотаси 12,3% дан 6,7% гача ($p<0,01$) пасайди. Хулоса. ЖЭ ва унинг асоратларида жарроҳлик аралашув усулини дифференцияланган танлаш мезонлари ишлаб чиқилди ва улар миниинвазив технологияларни қўпчилик клиник ҳолатларда қўллаш имконини берди ҳамда даволашнинг яқин ва узоқ муддатли натижаларини ишончли равишда яхшилади.

Калит сўзлар: жигар эхинококкози, миниинвазив жарроҳлик, лапароскопик эхинококкэктомия, навигацион-пункцион усуллар, PAIR, операциядан кейинги асоратлар, рецидив.

Введение. Эхинококкоз печени (ЭП) является одним из наиболее распространённых паразитарных заболеваний хирургического профиля и сохраняет характер эндемической патологии в странах Центральной Азии, включая Узбекистан [1–3]. Высокая частота осложнённых форм — нагноение кист, механическая паразитарная желтуха (МПЖ), цистобилиарные свищи, прорыв в брюшную или грудную полость, рецидивы — определяет неудовлетворительные исходы при использовании исключительно традиционных открытых вмешательств [4, 5].

В последние десятилетия в международной практике накоплен опыт применения миниинвазивных технологий: лапароскопической эхинококкэктомии, перицистэктомии, пункционно-аспирационного метода PAIR (puncture–aspiration–injection–reaspiration), рекомендованного ВОЗ при кистах CE1 и CE3A [6, 7]. Тем не менее отсутствие единых дифференцированных критериев отбора пациентов для конкретных методов вмешательства — особенно при осложнённых формах заболевания — по-прежнему ограничивает широкое внедрение этих технологий в рутинную практику [8, 9].

Цель настоящей работы — разработать и клинически верифицировать систему дифференцированного выбора метода хирургического вмешательства при ЭП и его осложнениях с приоритетом миниинвазивных подходов.

Материал и методы. В период 2015–2024 гг. на базе многопрофильной клиники Самаркандского государственного медицинского университета обследованы и пролечены 448 пациентов с ЭП и его осложнениями. Исследование одобрено локальным этическим комитетом; все пациенты подписали форму информированного согласия.

Пациенты разделены на две группы. Основную группу ($n=236$) составили больные, которым проводилось лечение с использованием миниинвазивных технологий согласно разработанному алгоритму. Контрольную группу ($n=212$) составили пациенты, получавшие традиционное хирургическое лечение — открытые лапаротомные вмешательства. Группы были сопоставимы по полу, возрасту, распределению по типам кист (классификация ВОЗ), локализации и характеру осложнений ($p>0,05$).

Диагностический алгоритм включал: ультразвуковое исследование (УЗИ, всем 448 пациентам), компьютерную томографию (КТ, 148 пациентам — 33,1%), магнитно-резонансную томографию (МРТ, 72 пациентам — 21,2%), эндоскопическую ретроградную холангиопанкреатографию (ЭРХПГ, по показаниям). Статистический анализ: критерий χ^2 , точный критерий Фишера, U-критерий Манна–Уитни; различия считались значимыми при $p<0,05$.

Критерии выбора миниинвазивного вмешательства. На основании предоперационных данных разработаны следующие объективные критерии выбора метода:

- Лапароскопическая эхинококкэктомия — кисты CE1 и CE3 по классификации ВОЗ, расположенные в II–VI сегментах печени, диаметром до 10 см, при частичном поверхностном расположении и отсутствии кист в I, VII и VIII сегментах;
- Лапароскопическая тотальная/субтотальная перицистэктомия — кисты CE4–CE5, гигантские и многокамерные кисты при наличии достаточной доступности сегментов;
- Чрескожные пункционно-дренирующие вмешательства — нагноившиеся кисты любого типа, первый этап двухэтапной стратегии при МПЖ и гнойно-холангиогенных осложнениях, а также у пациентов с противопоказаниями к общей анестезии;

- Эндоскопические транспапиллярные вмешательства (ЭПСТ + НБД) — механическая паразитарная желтуха с холангитом, прорыв кисты в желчные протоки;
- Открытая эхинококкэктомия из мини-доступа — кисты любых размеров и типов при невозможности выполнения видеолaparоскопического доступа, в том числе при множественных кистах в различных сегментах.

Результаты. В основной группе в 154 наблюдениях (65,3%) применялись миниинвазивные технологии как основной или первый этап лечения. Характер вмешательств представлен в таблице 1.

Таблица 1.

Характер хирургических вмешательств в основной группе (n=236)

Метод вмешательства	n	%
Открытая эхинококкэктомия из мини-доступа	60	25,4
Лапароскопическая эхинококкэктомия	37	15,6
Лапароскопическая идеальная эхинококкэктомия	16	6,7
Лапароскопическая тотальная перицистэктомия	19	8,1
Лапароскопическая субтотальная перицистэктомия	21	8,9
Чрескожные пункционно-дренирующие вмешательства	23	9,7
ЭПСТ + НБД + радикальная эхинококкэктомия	17	7,2
Традиционная эхинококкэктомия + видеоэндоскопия	35	14,8
Прочие комбинированные вмешательства	8	3,6
Всего	236	100,0

Непосредственные результаты лечения. В основной группе общая частота послеоперационных осложнений составила 8,1% (19/236), что достоверно ниже показателя контрольной группы — 24,1% (51/212; $p<0,05$). Структура осложнений по группам представлена в таблице 2. В контрольной группе зарегистрирован 1 (0,5%) летальный исход вследствие послеоперационного перитонита с полиорганной недостаточностью; в основной группе летальных исходов не было. Релапаротомии в контрольной группе потребовались в 10 (4,7%) случаях; в основной группе повторных вмешательств не выполнялось.

Таблица 2.

Послеоперационные осложнения. * $p<0,05$; ** $p<0,001$ по сравнению с контрольной группой (точный критерий Фишера)

Характер осложнения	Контроль (n=212) абс. (%)	Основная (n=236) абс. (%)
Желчеистечение из остаточной полости	18 (8,4%)	7 (2,9%)*
Нагноение послеоперационной раны	38 (17,9%)	7 (2,9%)**
Нагноение остаточной полости	14 (6,6%)	4 (1,7%)**
Внутрибрюшное кровотечение	12 (5,6%)	2 (0,8%)*
Экссудативный плеврит	13 (6,1%)	6 (2,5%)*
Итого	51 (24,1%)	19 (8,1%)*

Отдалённые результаты. Прослежены 387 пациентов (основная — 209, контрольная — 178) в сроки от 1 года до 5 лет. Рецидив ЭП диагностирован у 36 (9,3%) пациентов: в основной группе — 14 (6,7%), в контрольной — 22 (12,3%; $p<0,01$). В 12 из 36 наблюдений с рецидивом (31,5%) отсутствовала послеоперационная химиотерапия альбендазолом, что установлено как ведущий фактор рецидивирования.

Обсуждение. Полученные данные согласуются с результатами крупных международных исследований, демонстрирующих преимущества миниинвазивных подходов при ЭП [6–9]. Ключевым достижением настоящей работы является разработка объективной системы критериев выбора метода вмешательства, позволяющей расширить показания к миниинвазивным технологиям до 65,3% от всего потока пациентов с ЭП. Двухэтапная стратегия при гнойно-холангиогенных осложнениях — предварительная санация с последующей радикальной операцией после стабилизации эндотоксикоза — оказалась особенно эффективной: осложнения в подгруппе составили лишь 8,7%.

Снижение частоты рецидивов с 12,3% до 6,7% ($p<0,01$) в значительной мере связано с комбинацией полноценного соблюдения принципов апаразитарности при лапароскопических вмеша-

ствах и послеоперационной терапии альбендазолом с гепатопротекторами, что позволило снизить гепатотоксическое воздействие препарата и повысить приверженность терапии.

Заключение. Дифференцированный подход к хирургическому лечению ЭП на основе разработанных критериев обеспечивает приоритетное применение миниинвазивных эндовидеохирургических и навигационно-пункционных технологий в 65,3% наблюдений. По сравнению с традиционными открытыми вмешательствами миниинвазивный подход снижает частоту послеоперационных осложнений по Clavien–Dindo с 24,1% до 8,1% ($p<0,05$), устраняет летальность и достоверно уменьшает частоту рецидивов в отдалённые сроки ($p<0,01$). Разработанные алгоритмы рекомендованы к широкому внедрению в абдоминальных хирургических стационарах эндемичных регионов.

Список литературы:

1. Brunetti E., Kern P., Vuitton D.A. et al. Expert consensus for the diagnosis and treatment of cystic and alveolar echinococcosis in humans // *Acta Tropica*. 2010. Vol. 114, № 1. P. 1–16.
2. Давлатов С.С., Хамидов О.А. Хирургия осложнённого эхинококкоза печени в эндемичных регионах // *Вестник хирургии*. 2021. № 3. С. 45–52.
3. WHO Informal Working Group on Echinococcosis. Guidelines for treatment of cystic and alveolar echinococcosis in humans. WHO/CDS/CEE/DT/1996.4. Geneva: WHO, 2001.
4. Dziri C. Echinococcosis — laparoscopic treatment and principles of radical surgery // *World J. Surg.* 2009. Vol. 33, № 6. P. 1462–1468.
5. Topuzov E.G., Khokhlov N.F. Рецидивный эхинококкоз печени: хирургические аспекты // *Хирургия*. 2018. № 7. С. 34–41.
6. Khuroo M.S., Wani N.A., Javid G. et al. Percutaneous drainage compared with surgery for hepatic hydatid cysts // *N. Engl. J. Med.* 1997. Vol. 337. P. 881–887.
7. Bedioui H., Chebbi F., Ayadi S. et al. Laparoscopic surgery for liver hydatid cyst // *J. Gastrointest. Surg.* 2009. Vol. 13, № 5. P. 931–935.
8. Fabbri C., Luigiano C., Morabito A. et al. Endoscopic ultrasound-guided drainage of hepatic echinococcal cysts: review // *Endoscopy*. 2014. Vol. 46, № 11. P. 940–945.
9. Давлатов С.С., Хамидов О.А., Наврузов Р.Р., Умаркулов З.З. Миниинвазивные технологии в хирургическом лечении эхинококкоза печени: сравнительный анализ эндовидеохирургических и навигационно-пункционных методов // *Вестник фундаментальной и клинической медицины*. 2025. № 5(19). С. 840–848.

Для цитирования: Давлатов С.С., Хамидов О.А., Наврузов Р.Р., Умаркулов З.З. Дифференцированный подход к хирургическому лечению эхинококкоза печени с применением миниинвазивных эндовидеохирургических и навигационно-пункционных методов // *Вестник фундаментальной и клинической медицины*. – 2026. – № 4(24). – С. 779–782. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19683801>

ҲОМИЛАДОР АЁЛЛАРДА СНЕК2 ВА МТТТР ГЕНЛАРИНИНГ АЛЛЕЛ ВАРИАНТЛАРИНИНГ ТРОФОБЛАСТИК КАСАЛЛИК КЕЛИБ ЧИҚИШИДАГИ АҲАМИЯТИ Юсупова Д.А.

Республика ихтисослаштирилган онкология ва радиология илмий амалий тиббиёт маркази Хоразм филиали, Урганч ш., Ўзбекистон

Резюме. Тадқиқотнинг мақсади ривожланмаган ҳомиладорликда трофобластик асоратлари бўлган аёлларда СНЕК2 ВА МТТТР генларининг аллел вариантларининг намоён бўлиш даражасини аниқлашдан иборат. Тадқиқотимизда МТТТР генининг Ile22Met66A>G полиморфизми 68 нафар ТК билан оғриган ва 41 нафар шу ёшдаги ТК билан оғримagan ва анамнезида РН бўлган аёлларда ўрганилди ва генетик жиҳатдан таҳлил қилинди. Тадқиқот давомида анамнезида РН бўлган аёлларда ТК пайдо бўлишида МТТТРгенининг Ile22Met66A>G полиморфизми ўртасида статистик жиҳатдан аҳамиятли ижобий боғлиқлик аниқланди. Унга кўра, минор G аллели касаллик ривожланиш хавфини ошириши, ёввойи А аллели эса анамнезида РН бўлган аёлларда касаллик ривожланиш хавфини камайтириши аниқланган. Анамнезида РН бўлган аёлларда МТТТР генининг Ile22Met66A>G полиморфизмининг минор Г аллели, гетерозигот А/Г ва гомозигот G/G генотиплари ТК ривожланиш хавфини статистик жиҳатдан сезиларли даражада ошириши аниқланди, ёввойи А аллели ва ёввойи гомозигот А/А генотипи эса анамнезида РН бўлган аёлларда ТК ривожланиш хавфини статистик жиҳатдан сезиларли даражада камайтиради.

Калит сўзлар: трофобластик касаллик, ҳомиладор аёл, аллел генлар, елбўғоз

THE SIGNIFICANCE OF ALLELIC VARIANTS OF THE CHEK2 AND MTRR GENES IN THE DEVELOPMENT OF TROPHOBLASTIC DISEASE IN PREGNANT WOMEN

Yusupova D.A.

Khorezm Branch of the Republican specialized scientific and practical medical center of oncology and radiology, Urgench, Uzbekistan

Resume. The aim of the study was to determine the frequency of allelic variants of the CHEK2 and MTRR genes in women with trophoblastic complications during unresolved pregnancy. In our study, the Ile22Met66A>G polymorphism of the MTRR gene was studied and genetically analyzed in 68 women with TC and 41 women of the same age who did not have TC and had a history of RH. During the study, a statistically significant positive correlation was identified between the Ile22Met66A>G polymorphism of the MTRR gene and the occurrence of TC in women with a history of RH. It was found that the minor G allele increases the risk of developing the disease, while the wild A allele reduces the risk of developing the disease in women with a history of RH. It was established that the minor G allele, heterozygous A/G, and homozygous G/G genotypes of the MTRR gene Ile22Met66A>G polymorphism statistically significantly increase the risk of developing PC, while the wild A allele and wild homozygous A/A genotype statistically significantly reduce the risk of developing PC in women with a history of PC.

Keywords: trophoblastic disease, pregnant woman, allelic genes, whooping cough

ЗНАЧЕНИЕ АЛЛЕЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ ГЕНОВ СНЕК2 И МТТТР У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН В ВОЗНИКНОВЕНИИ ТРОФОБЛАСТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ

Юсупова Д.А.

Хорезмский филиал Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра онкологии и радиологии, г. Урганч, Узбекистан

Резюме. Цель исследования – определить степень экспрессии аллельных вариантов генов СНЕК2 и МТТТР у женщин с трофобластическими осложнениями на фоне неразвивающейся беременности. В нашем исследовании полиморфизм Ile22Met66A>G гена МТТТР был изучен и генетически проанализирован у 68 женщин с ТБ и у 41 женщины того же возраста без ТБ, но с привычным невынашиванием беременности (ПНБ) в анамнезе. В ходе исследования была выявлена статистически значимая положительная корреляция между полиморфизмом Ile22Met66A>G гена МТТТР и возникновением ТБ у женщин с ПНБ в анамнезе. Согласно результатам, было установлено, что минорный аллель G повышает риск развития заболевания, а "дикий" аллель А снижает риск развития заболевания у женщин с ПНБ в анамнезе. Было выявлено, что минорный аллель G,

гетерозиготный A/G и гомозиготный G/G генотипы полиморфизма Ile22Met66A>G гена MTRR статистически значимо повышают риск развития ТБ у женщин с ПНБ в анамнезе, в то время как "дикий" аллель А и "дикий" гомозиготный генотип А/А статистически значимо снижают этот риск.

Ключевые слова: трофобластическая болезнь, беременная, аллельные гены, пузырный занос


Бугунги кунда трофобластик касаллиги шакллариининг келиб чиқиш сабаблари ҳақида аниқ тасаввур йўқ, бу эса ушбу патологияни ташхислаш, даволаш ва олдини олиш билан боғлиқ бир қатор масалаларни ҳал қилишни сезиларли даражада қийинлаштиради. Одатий лаборатория таҳлиллари ва инструментал тадқиқотлар параметрларини ўрганиш ушбу патологиянинг патогенетик механизмининг этиологик омили билан боғлиқ кўрсаткичларнинг ўзига хослигини кўрсатади. Бу эрта ташхис қўйиш, трофобластик касаллигининг ривожланиш сабаблари ва унинг асоратларини аниқлаш, шунингдек, беморларни ўз вақтида тўғри даволаш ва профилактика чораларини белгилашга ёрдам беради. Клиник тавсияларни аниқ бажарган ҳолда молекуляр-генетик мезонларни топишга асосланган ҳомиладорлик кечилиши ўрганишининг юқори технологик лаборатория усуллари қўллаган ҳолда юқори технологияли замонавий ёндашув ушбу патологиянинг этиопатогенетик терапиясини аниқ ва тўғри тайинлаш имконини беради, бу эса ўз вақтида ташхислаш ва даволаш чора-тадбирларини амалга ошириш, перинатал натижаларни яхшилаш имконини беради. Трофобластик касаллиги ва унинг асоратлари ривожланишининг сабаблари ва механизмлари ҳақида кенг билимларга эга бўлишга қарамай, ҳозирги кунга қадар дунёнинг ҳеч бир давлати ушбу муаммони ҳал қилмаган.

Материал ва усуллар. Тадқиқот РИОваРИАТМ Хоразм филиали ва РИОБСИАТМ Хоразм филиали базасида ўтказилди. Биринчи босқичда трофобластик касаллиги бўлган аёлларнинг 199 та касаллик тарихи таҳлил қилинди, шунингдек, тадқиқотда 2019-2023 йиллар давомида РИОваРИАТМ Хоразм филиалида ва РИОБСИАТМ Хоразм филиалида даволанган, анамнезида трофобластик касаллиги бўлган ва ривожланмаган ҳомиладорлиги бўлган 68 нафар аёл иштирок этди.

Натижалар. Такдим этилган маълумотлардан кўриниб турибдики, РХ билан оғриган аёллар (таққослаш гуруҳи) орасида ёввойи турдаги аллел - А улуши таққослаш гуруҳида асосий ва назорат гуруҳига қараганда камроқ учраган (мос равишда 76,8%, 77,2% ва 89,0%), аммо асосий гуруҳ ва таққослаш гуруҳи кўрсаткичлари ўртасида ишончлиликлка эришилмаган ва назорат гуруҳи билан $p < 0,05$ га тенг ишончлилик қайд этилган. Минор аллел - таққослаш гуруҳида кўпроқ учради, аммо назорат гуруҳига нисбатан сезиларли даражада аҳамиятли кўрсаткичларга эга (ушбу кўрсаткич назорат гуруҳида 11,0% ва таққослаш гуруҳида 23,2% ва асосий гуруҳда 22,8% ни ташкил этди).

Шуниси қизиқки, ТК билан оғриган аёлларни елбўғоз шакли бўйича қайта гуруҳлашда назорат гуруҳидаги инвазив елбўғоз билан оғриган беморларда ёввойи ва минор аллеллар фоизи 3,3 баравар юқори бўлган, тўлиқ ва қисман елбўғоз билан оғриган беморларда эса минор аллеллар фоизи икки баравар юқори бўлган (мос равишда 36,0% ва 22,0% га нисбатан 11,0%).

Генотипларнинг тақсимланиши бўйича асосий гуруҳдаги беморларнинг 66,2% гомозиготали ёввойи А/А генотипга, 22,1% - гетерозиготали (А/Г) генотипга ва 11,8% - гомозиготали G/G генотипга эга бўлган (1-расм).



1-расм. Текширилган беморларда MTRR гени Ile22Met66A>G полиморфизмининг тарқалиши

Таққослаш гуруҳида ёввойи А/А генотипининг учраш частотасининг 60,9% гача пасайиши қайд этилди, гомозигот А/Г 31,7% да учради, бу асосий гуруҳга қараганда кўпроқ ($p < 0,05$), гомозигот аллел тури эса 7,3% ни ташкил этди, бу асосий гуруҳ кўрсаткичларидан паст, аммо назорат гуруҳидаги кўрсаткичлардан сезиларли даражада юқори ($p < 0,05$). Назорат гуруҳида бу кўрсаткичлар мос равишда 80,0%, 17,9% ва 2,1% ни ташкил этди.

Худди шундай, инвазив елбўғозли беморларда АА, А/Г ва Г/Г генотиплари фоизи мос равишда 48,0%, 32,0% ва 20,0% ни ташкил этган бўлса, қисман елбўғозли аёлларда бу кўрсаткичлар 63,2%, 28,9% ва 7,9% ни, тўлиқ елбўғозда эса мос равишда 46,5%, 44,4% ва 9,1% ни ташкил этди.

Шундай қилиб, клиник гуруҳларда Г/Г гомозигот генотипининг ташувчанлиги назорат гуруҳига нисбатан тахминан 1,6 баравар ошди, бу ушбу генотип ва ТКга мойиллик ўртасида мумкин бўлган боғлиқликни кўрсатиши мумкин. Бироқ, шуни таъкидлаш керакки, РХ билан оғриган аёлларда МТRR генининг Г/Г полиморфизмининг мутант гомозигот генотипини ташиш частотаси 3,5 баравар юқори бўлиб, бу РХ билан оғриган аёллар ТК касаллиги ривожланиши учун хавф гуруҳи эканлигини кўрсатади. МТRR гени $\text{P}e22\text{Met66A}>\text{G}$ полиморфизми бўйича генотипларнинг тақсимланиши Харди-Вайнберг тенгламаси бўйича ўрганилди.

Асосий гуруҳда гомозигот генотипларнинг эмпирик - кузатилган ва қутилган - назарий даражалари - А/А ва Г/Г кўрсаткичлари мос равишда 0,662/0,526 ва 0,118/0,093 ни ташкил этди. Таққослаш гуруҳида бу кўрсаткичлар қуйидагича бўлди: мос равишда 0,609/0,800 ва 0,073/0,021.

Ушбу генотипларнинг частотаси назорат гуруҳида мос равишда 0,800/0,761 ва 0,021/0,016 ни ташкил этди. Шунингдек, ўрганилаётган полиморфизм учун гетерозигот генотип даражаси асосий гуруҳда ва беморларнинг таққослаш гуруҳида қутилган натижадан биров паст бўлган (0,281/0,329; $D = -0,14$), назорат гуруҳида эса гетерозиготали генотип учун қутилган ва кузатилган натижа ўртасида деярли фарқ қузилмади (0,225/0,224; $D = 0,004$).

Кўрсаткичлар шундан далолат берадики, асосий ва таққослаш гуруҳларида қузилган натижалар Харди-Вайнберг қонуни бўйича ҳисобланган назарий натижалардан оғишган ($\chi^2 > 3,84$; $p < 0,05$). Шунингдек, тадқиқот давомида олинган натижалардан фойдаланиб, анамнезида РХ бўлган аёлларда ТК ривожланишида МТРР генининг $\text{P}e22\text{Met66A}>\text{G}$ полиморфизмининг патогенетик аҳамияти таҳлил қилинди. Имкониятлар нисбати (ИН) натижаларига қўра, А аллелининг ёввойи тури ташувчиларида касаллик ривожланиш хавфининг 0,43% (95% ДИ: 0,341-0,966) га пасайиши қузилди, бу ТК ривожланишига нисбатан А аллелининг статистик жиҳатдан аҳамиятли ($\chi^2 = 4,44$; $p = 0,036$) ҳимоя таъсиридан далолат беради. Бошқа томондан, бизнинг тадқиқотимизда МТRR генининг $\text{P}e22\text{Met66A}>\text{G}$ полиморфизмининг Г минор аллели ТК ривожланиш хавфини 74% га статистик жиҳатдан сезиларли даражада оширди ($HX = 1,74$; 95% CI: 1,03-2,932; $\chi^2 = 4,44$; $p = 0,036$).


МТRR генининг $\text{P}e22\text{Met66A}>\text{G}$ полиморфизми бўйича анамнезида РХ бўлган аёлларда ТК ривожланишида турли генотипларнинг патогенетик аҳамиятини таҳлил қилганда, Г/Г ёввойи генотипи имкониятлар нисбатининг 41% га (95% ДИ 0,499-0,820) пасайишини кўрсатди ва А/Г генотипининг бу ҳимоя таъсири хи-квадрат мезони бўйича статистик аҳамиятга эга бўлмаса-да ($\chi^2 = 3,24$, $p = 0,072$), бу ҳимоя таъсири касалликнинг ривожланишида маълум бир тенденцияни кўрсатади.

Шунга ўхшаш, гетерозиготали генотип ва гомозиготали Г/Г генотипи касалликнинг ривожланиш эҳтимолини 45% га ошириши аниқланди ($HX = 1,11$; 95% CI 0,779-2,699) ва 2,6 марта ($HX = 2,60$; 95% CI 0,57-11,89) мос равишда, аммо натижалар статистик жиҳатдан аҳамиятли бўлмади ($\chi^2 < 3,84$, $p > 0,05$).

Анамнезида РХ бўлган аёлларда ТК ривожланишида Г аллелининг прогностик самарадорлиги натижалари мос равишда $AUC = 0,40$, $SE = 0,21$, $SP = 0,87$; А УС $= 0,46$, $SE = 0,15$, $SP = 0,87$ ва А УС $= 0,56$, $SE = 0,28$, $SP = 0,87$, бу ушбу аллелларнинг инвазив ТК ривожланиш модели сифатида таъсири юқори эканлигини кўрсатади.

Шундай қилиб, тадқиқот давомида анамнезида РХ бўлган аёлларда ТК пайдо бўлишида МТRR генининг $\text{P}e22\text{Met66A}>\text{G}$ полиморфизми ўртасида статистик жиҳатдан аҳамиятли ижобий боғлиқлик аниқланди. Унга қўра, минор Г аллели касаллик ривожланиш хавфини ошириши, ёввойи А аллели эса касаллик ривожланиш хавфини камайтириши аниқланган.

Анамнезида РХ бўлган аёлларда МТRR генининг $\text{P}e22\text{Met66A}>\text{G}$ полиморфизмининг минор Г аллели, гетерозигот А/Г ва гомозигот Г/Г генотиплари ТК ривожланиш хавфини статистик жиҳатдан сезиларли даражада ошириши аниқланди, ёввойи А аллели ва ёввойи гомозигот А/А генотипи эса анамнезида РХ бўлган аёлларда ТК ривожланиш хавфини статистик жиҳатдан сезиларли даражада камайтиради.



2-расм. Текширилган гуруҳлардаги аёлларда CHEK2 генининг IVS2+1G>A полиморфизми аллелларининг фоизли тақсимооти

Бизнинг тадқиқотимизда CHEK2 генининг IVS2+1G>A полиморфизми аллелларининг тақсимланиши маълумотларига кўра, назорат гуруҳида G минор аллели 84,0% да аниқланган бўлса, асосий гуруҳда ёввойи турдаги аллеллар ва минор аллелларнинг улуши мос равишда 69,3% ва 30,6% ни ташкил этди. Шуниси қизиқки, ТК билан оғриган аёлларни елбўғоз шакли бўйича қайта гуруҳлашда назорат гуруҳидаги инвазив елбўғоз билан оғриган беморларда ёввойи ва кичик аллеллар фоизи 2,1 барабар юқори бўлган бўлса, тўлиқ ва қисман елбўғоз билан оғриган беморларда кичик аллеллар фоизи 1,8 барабар юқори бўлган (мос равишда 34,0%, 29,7% ва 31,7% га нисбатан 16,0%) (2-расмга қаранг).

Такдим этилган маълумотлардан кўриниб турибдики, РХ билан касалланган аёллар (таққослаш гуруҳи) орасида ёввойи турдаги аллелнинг улуши - Г - таққослаш гуруҳида асосий ва назорат гуруҳига қараганда кўпроқ учраган (мос равишда 69,3%, 92,7% ва 84,0%), аммо назорат гуруҳи ва таққослаш гуруҳи кўрсаткичлари ўртасида ишончлиликлка эришилмаган, асосий гуруҳ билан эса ишончлилик тенг бўлган. $p < 0,05$.

Минор А аллел - асосий гуруҳда кўпроқ учради, аммо назорат гуруҳига нисбатан сезиларли даражада аҳамиятли кўрсаткичларга эга (ушбу кўрсаткич назорат гуруҳида 16,0%, таққослаш гуруҳида 7,3% ва асосий гуруҳда 30,6% ни ташкил этди).

Бизнинг тадқиқотимизда CHEK2 генининг IVS2+1G>A полиморфизми аллелларининг тақсимланиши бўйича асосий гуруҳдаги беморларнинг 80,9% да гомозиготали ёввойи G/G генотиби, 14,7% да гетерозиготали генотип ва асосий гуруҳдаги гомозиготали мутант A/A генотиби 4,4% да аниқланди. Таққослаш гуруҳида CHEK2 генининг IVS2+1G>A полиморфизмининг гомозиготли салбий A/A генотиби (2,4%) ТК билан оғриган беморларга (4,4%) нисбатан сезиларли даражада камроқ кузатилди. Назорат гуруҳида эса ушбу генотип қайд этилмади.

Асосий гуруҳда кузатилган келтирилган натижалар Харди-Вайнберг тенгласига мос келиши текширилди. Бунга кўра, CHEK2 гени IVS2+1G>A полиморфизми генотипларининг асосий гуруҳдаги тақсимооти гомозиготали A/A генотиби ва гетерозиготали G/A генотиби учун мос равишда эмпирик - кузатилаётган ва кутилаётган - назарий даражаларда 0,09/0,04 ва 0,693/0,706 ни ташкил этди, бу эса тадқиқот давомида аниқланган кўрсаткичларнинг Харди-Вайнберг қонунига мос келишини кўрсатди ($\chi^2 < 3,84$; $p > 0,05$).

Анамнезида РХ бўлган аёлларда ТК ривожланишига CHEK2 генининг IVS2+1G>A полиморфизмининг таъсири таҳлил қилинганда, асосий гуруҳда Г аллелини ташувчи беморларда касаллик ривожланишининг нисбий хавфини (НХ) 30% га камайтиришдан иборат ҳимоя таъсири кузатилди (НХ = 0,70; 95% СИ: 0,66-0,74), аксинча, А аллели индуктив таъсир кўрсатиб, анамнезида РХ фонидида ТК ривожланиш хавфини 43% га оширди (НХ = 1,43; 95% СИ: 1,35-1,51).

Шунингдек, касаллик ривожланишида иштирок этувчи аллелларнинг патогенетик табиатининг хи-квадрат мезони ўтказилганда, CHEK2 гени A/G полиморфизмининг минор аллели ва анамнезида РХ бўлган аёлларда ТК касаллигининг ривожланиши ўртасида кучли тенденция мавжудлиги аниқланди ($\chi^2 = 3,80$; $p = 0,051$).

Хулоса. Анамнезида РХ бўлган аёлларда ТК пайдо бўлишида MTRR генининг Ile22Met66A>G полиморфизми ўртасида статистик жиҳатдан аҳамиятли ижобий боғлиқлик аниқланди. Унга кўра,

минор G аллели касаллик ривожланиш хавфини ошириши, ёввойи A аллели эса анамнезида РХ бўлган аёлларда касаллик ривожланиш хавфини камайитириши аниқланган. Анамнезида РХ бўлган аёлларда MTRR генининг Ile22Met66A>G полиморфизмининг минор Г аллели, гетерозигот A/G ва гомозигот G/G генотиплари ТК ривожланиш хавфини статистик жиҳатдан сезиларли даражада ошириши аниқланди, ёввойи A аллели ва ёввойи гомозигот A/A генотиби эса анамнезида РХ бўлган аёлларда ТК ривожланиш хавфини статистик жиҳатдан сезиларли даражада камайтиради.

Адабиётлар рўйхати:

1. Berkowitz P.C., Goldstein D.P. Clinical practice. Molar pregnancy // N. Engl. Ж. Мед. — 2009. — Вол. 360. — P. 1639-1645
2. Berkowitz, R.S. Chorionic tumors / R.S. Berkowitz, D.P. Goldstein // N. Engl. Ж. Мед. — 2016. — Вол. 335(23). — P. 1740-1748
3. Bolze, P.A. First-line hysterectomy for women with low-risk non-metastatic gestational trophoblastic neoplasia no longer wishing to conceive / P.A. Bolze, M. Mathe, T. Hajri, B. You et al. // Gynecol. Онсол. — 2018. — Вол. 150. — П. 282-287
4. Boots C., Stephenson M.D. Does obesity increase the risk of miscarriage in spontaneous con-
- ception: a systematic review // Semin. Репрод. Мед. -2011. - Вол. 29(6). - P. 507-513.
5. Браскен М.Б., Бринтон Л.А., Ҳаяши К. Epidemiology of hydatidiform mole and choriocarcinoma // Epidemiol Rev. 2014. — Вол. 6. — П.52-75.
6. Брага А., Уберти Э.М., Fajardo Мдо С. эт ал. Epidemiological report on the treatment of patients with gestational trophoblastic disease in 10 Brazilian referral centers: results after 12 years since International FIGO 2000 Consensus. J Reprod Med. 2014; 59 (5-6): 241-7.;
7. Brown J., Naumann R.W., Seckl M.Ж., Schink J. et al. 15 years of progress in gestational trophoblastic disease: Scoring, standardization, and salvage. Gynecol Oncol. 2016; 144 (1): 200-7.

Иқтибос учун: Юсупова Д.А Ҳомиладор аёлларда СНЕК2 ва MTRR генларининг аллел вариантларининг трофобластик касаллик келиб чиқишидаги аҳамияти // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. — 2026. — № 4(24). — Б. 783–787. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19685387>

ФАКТОРЫ РИСКА И ПРОФИЛАКТИКА РЕЦИДИВИРУЮЩИХ РЕСПИРАТОРНЫХ ИНФЕКЦИЙ У ДЕТЕЙ**Ахмедова М.М.**

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Актуальность. Рецидивирующие респираторные инфекции у детей остаются актуальной проблемой педиатрии вследствие высокой распространённости, склонности к повторному течению и значительного медико-социального значения. Цель исследования. Изучить факторы риска рецидивирующих респираторных инфекций у детей и оценить значение комплексной профилактики. Материалы и методы. Обследованы 86 детей в возрасте от 1 до 14 лет. Основную группу составили 54 ребёнка с рецидивирующими респираторными инфекциями, группу сравнения — 32 ребёнка с эпизодическими острыми респираторными инфекциями. Проводили клинико-анамнестическое, лабораторное и сравнительное обследование с оценкой факторов риска, особенностей течения заболеваний и сопутствующей патологии. Результаты. У детей основной группы среднее число эпизодов ОРИ в год составило $7,4 \pm 0,3$, в группе сравнения — $3,1 \pm 0,2$. Установлена достоверная связь рецидивирующих инфекций с ранним прекращением грудного вскармливания, пассивным курением, посещением детских коллективов, хронической ЛОР-патологией и аллергическими заболеваниями. У детей основной группы отмечались более длительное течение заболеваний, более высокая частота осложнений, госпитализаций и повторных курсов антибактериальной терапии. Выводы. Рецидивирующие респираторные инфекции у детей имеют многофакторный характер. Профилактика должна включать устранение модифицируемых факторов риска, поддержку грудного вскармливания, санацию хронических очагов инфекции и диспансерное наблюдение детей группы риска.

Ключевые слова: рецидивирующие респираторные инфекции, факторы риска, профилактика, грудное вскармливание, пассивное курение, ЛОР-патология, аллергические заболевания.

RISK FACTORS AND PREVENTION OF RECURRENT RESPIRATORY INFECTIONS IN CHILDREN**Axmedova M.M.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Relevance. Recurrent respiratory infections in children remain a pressing issue in pediatrics due to their high prevalence, tendency to recur, and significant medical and social significance. Purpose of the study. Study the risk factors for recurrent respiratory infections in children and evaluate the importance of comprehensive prevention. Materials and methods. 86 children aged 1 to 14 years were examined. The primary group consisted of 54 children with recurrent respiratory infections, while the comparison group consisted of 32 children with episodic acute respiratory infections. Clinical-anamnestic, laboratory, and comparative examinations were conducted to assess risk factors, disease course characteristics, and concomitant pathology. Results. In children of the primary group, the average number of ORI episodes per year was 7.4 ± 0.3 , while in the comparison group, it was 3.1 ± 0.2 . A significant link has been established between recurrent infections and early cessation of breastfeeding, passive smoking, attending children's groups, chronic ENT pathology, and allergic diseases. In children of the main group, a longer course of the disease, a higher frequency of complications, hospitalizations, and repeated courses of antibacterial therapy were noted. Conclusions. Recurrent respiratory infections in children are multifactorial in nature. Prevention should include the elimination of modifiable risk factors, support for breastfeeding, treatment of chronic infection foci, and clinical observation of children in risk groups.

Keywords: recurrent respiratory infections, risk factors, prevention, breastfeeding, passive smoking, ENT pathology, allergic diseases.

БОЛАЛАРДА ҚАЙТАЛАНУВЧИ РЕСПИРАТОР ИНФЕКЦИЯЛАРНИНГ ХАВФ ОМИЛЛАРИ ВА ОЛДИНИ ОЛИШ**Ахмедова М.М.**

Самарканд давлат тиббиёт университети, Самарканд ш., Ўзбекистон

Резюме. Долзарблиги. Болаларда қайталанувчи респиратор инфекциялар юқори тарқалиши, такрорий кечишига мойиллиги ва муҳим тиббий-ижтимоий аҳамияти туфайли педиатриянинг дол-

зарб муаммоси бўлиб қолмоқда. Тадқиқотнинг мақсади. Болаларда қайталанувчи респиратор инфекцияларнинг хавф омилларини ўрганиш ва комплекс профилактиканинг аҳамиятини баҳолаш. Материаллар ва усуллар. 1 ёшдан 14 ёшгача бўлган 86 нафар бола текишилди. Асосий гуруҳни қайталанувчи респиратор инфекциялар билан касалланган 54 нафар бола, таққослаш гуруҳини эса вақти-вақти билан ўтқир респиратор инфекциялар билан касалланган 32 нафар бола ташкил этди. Клиника-анамнестик, лаборатор ва қиёсий текиширувлар хавф омиллари, касаллик кечиши хусусиятлари ва ёндош патологияни баҳолаш билан ўтказилди. Статистик ишлов бериш $p < 0,05$ бўлганда амалга оширилди. Натижалар. Асосий гуруҳдаги болаларда ЎРИ эпизодларининг ўртача сони йилига $7,4 \pm 0,3$, таққослаш гуруҳида эса $3,1 \pm 0,2$ ни ташкил этди. Қайталанувчи инфекцияларнинг кўкрак сути билан эмизишни эрта тўхтатиш, пассив чекиш, болалар жамоаларига қатнаш, сурункали ЛОР-патология ва аллергия касалликлар билан ишончли боғлиқлиги аниқланган. Асосий гуруҳдаги болаларда касалликнинг узоқроқ кечиши, асоратларнинг юқори частотаси, касалхонага ётқизиш ва антибактериал терапиянинг такрорий курслари кузатилди. Хулосалар. Болаларда рецидивланувчи респиратор инфекциялар кўп омилли характерга эга. Профилактика ўзгартириладиган хавф омилларини бартараф этишни, кўкрак сути билан эмизишни қўллаб-қувватлашни, сурункали инфекция ўчоқларини санация қилишни ва хавф гуруҳидаги болаларни диспансер назоратидан ўтказишни ўз ичига олиши керак.

Калит сўзлар: қайталанувчи респиратор инфекциялар, хавф омиллари, профилактика, кўкрак сути билан озиқлантириш, пассив чекиш, ЛОР-патология, аллергия касалликлар.

Введение. Рецидивирующие респираторные инфекции у детей остаются одной из наиболее актуальных проблем современной педиатрии вследствие высокой распространённости, склонности к повторному течению и существенного медико-социального значения. Частые эпизоды инфекций дыхательных путей сопровождаются ухудшением качества жизни ребёнка и членов его семьи, увеличением числа амбулаторных обращений и госпитализаций, ростом медикаментозной нагрузки, а также нередко приводят к избыточному назначению антибактериальных препаратов [1, 2]. Современные обзоры подчёркивают, что рецидивирующие инфекции респираторного тракта у детей представляют собой не самостоятельную нозологию, а клинический синдром, требующий поиска предрасполагающих факторов и оценки преморбидного фона

Наибольшая частота рецидивирующих респираторных инфекций наблюдается у детей раннего и дошкольного возраста, что связано с анатомо-физиологическими особенностями дыхательных путей, функциональной незрелостью иммунной системы, ограниченными резервами местной защиты слизистых оболочек и высокой частотой контакта с вирусными и бактериальными агентами в организованных коллективах [1, 3]. Важную роль играют также незрелость мукоцилиарного клиренса, особенности формирования микробиоты верхних дыхательных путей и транзитная возрастная восприимчивость к инфекциям. По данным современных публикаций, именно сочетание возрастных особенностей организма ребёнка с воздействием неблагоприятных внешних факторов формирует основу для повторных эпизодов респираторной заболеваемости

В последние годы установлено, что рецидивирующее течение респираторных инфекций имеет многофакторную природу. К числу наиболее значимых факторов риска относят пассивное курение, загрязнение атмосферного и бытового воздуха, посещение детских дошкольных учреждений, раннее прекращение грудного вскармливания, дефицитные состояния, хронические очаги инфекции ЛОР-органов, аллергические заболевания, бронхообструктивный синдром, а также неблагоприятные социально-бытовые условия [2, 4, 5]. Отдельное место занимает наследственная и конституциональная предрасположенность, а у части детей повторные инфекции могут быть ассоциированы с первичными или вторичными иммунодефицитными состояниями, нарушениями мукоцилиарного транспорта и другими фоновыми заболеваниями [1, 3]. Систематический обзор факторов риска рецидивирующих инфекций у детей дошкольного возраста, опубликованный в 2026 году, также подтверждает роль средовых и семейных факторов, питания и фоновой патологии в формировании повторной респираторной заболеваемости

Особое значение в развитии рецидивирующих респираторных инфекций имеет воздействие неблагоприятных факторов окружающей среды. По данным Всемирной организации здравоохранения, загрязнение воздуха внутри жилища почти вдвое повышает риск инфекций нижних дыхательных путей у детей, а его вклад в структуру детской пневмонии остаётся значительным, особенно в семьях, использующих загрязняющие виды топлива и живущих в условиях недостаточной вентиляции [4]. Кроме того, доказана связь между воздействием бытовых аэрополлютантов и повышением частоты

тяжёлых инфекций нижних дыхательных путей у детей, что подчёркивает важность профилактики на уровне семьи и условий проживания

Существенную защитную роль в раннем возрасте играет грудное вскармливание. Согласно материалам ВОЗ, исключительно грудное вскармливание в первые 6 месяцев жизни способствует снижению инфекционной заболеваемости и обеспечивает защиту от респираторных инфекций за счёт передачи иммунологически активных компонентов, поддержания барьерной функции слизистых и оптимального нутритивного обеспечения ребёнка [5, 6]. Результаты систематических обзоров подтверждают, что дети, находившиеся на грудном вскармливании, реже нуждаются в госпитализации по поводу респираторных инфекций и имеют более низкий риск тяжёлого течения заболеваний дыхательных путей

Наряду с неспецифическими мерами, важнейшим направлением профилактики рецидивирующих респираторных инфекций является иммунопрофилактика. Современные рекомендации подчёркивают значение своевременной вакцинации против управляемых инфекций, соблюдения респираторной гигиены, регулярного мытья рук, улучшения вентиляции помещений, ограничения контакта с заболевшими и рациональной организации режима ребёнка [7, 8]. CDC отдельно отмечает, что иммунизация снижает риск тяжёлого течения респираторных вирусных инфекций у детей, а её наибольшая эффективность достигается при своевременном проведении до начала активной циркуляции возбудителей

В последние годы особое внимание уделяется профилактике инфекций, вызванных респираторно-синцитиальным вирусом, который занимает одно из ведущих мест в структуре заболеваемости нижних дыхательных путей у младенцев и детей раннего возраста. Современные международные подходы предусматривают использование как материнской иммунизации, так и пассивной иммунопрофилактики у детей из групп риска, что отражает тенденцию к расширению возможностей специфической профилактики респираторных инфекций в педиатрии [9]. Актуальность этой проблемы подтверждается и данными UNICEF, согласно которым пневмония по-прежнему остаётся одной из ведущих предотвратимых причин смерти детей младше 5 лет в мире

Несмотря на большое число исследований, многие аспекты проблемы рецидивирующих респираторных инфекций у детей остаются дискуссионными. Это касается как критериев отнесения ребёнка к группе часто болеющих, так и оценки вклада отдельных факторов риска, а также выбора наиболее эффективной стратегии профилактики в зависимости от возраста, преморбидного фона и социальных условий [1, 2, 10]. В связи с этим комплексное изучение факторов риска и профилактических подходов при рецидивирующих респираторных инфекциях у детей представляет важный научный и практический интерес.

Цель исследования: изучить основные факторы риска рецидивирующих респираторных инфекций у детей и оценить эффективность комплексных профилактических мероприятий, направленных на снижение частоты повторных эпизодов заболеваний дыхательных путей.

Материалы и методы исследования. Исследование выполнено на базе педиатрического отделения многопрофильного лечебно-профилактического учреждения и носило наблюдательный сравнительный характер с элементами ретроспективного и проспективного анализа.

В исследование включены 86 детей в возрасте от 1 до 14 лет. Основную группу составили 54 ребёнка с рецидивирующими респираторными инфекциями, группу сравнения — 32 ребёнка с эпизодическими острыми респираторными инфекциями, частота которых не превышала возрастную норму.

Критериями включения являлись наличие повторных эпизодов острых респираторных инфекций в течение года, возраст 1–14 лет и информированное согласие родителей. Критериями исключения служили врождённые пороки бронхолёгочной системы, иммунодефицитные состояния, онкогематологические заболевания и тяжёлая соматическая патология.

Всем детям проводили сбор анамнеза, клиническое обследование, оценку частоты и длительности эпизодов ОРИ, анализ условий проживания, характера вскармливания, наличия пассивного курения, посещения детских коллективов, сопутствующей аллергической патологии и хронических ЛОР-заболеваний. Лабораторное обследование включало общий анализ крови, общий анализ мочи, по показаниям — определение уровня гемоглобина, эозинофилов, IgE и маркеров воспаления.

Статистическую обработку результатов проводили с использованием методов вариационной статистики. Рассчитывали среднюю арифметическую величину (M), стандартную ошибку средней (m) и относительные показатели (%). Достоверность различий оценивали по критерию Стьюдента и χ^2 при $p < 0,05$.

Исследование выполнено с соблюдением принципов биомедицинской этики. Участие детей осуществлялось после получения информированного согласия родителей или законных представителей.

Результаты исследования. В ходе проведённого исследования установлено, что у детей основной группы рецидивирующие респираторные инфекции характеризовались высокой частотой эпизодов в течение года, более продолжительным течением заболеваний и большей склонностью к осложнениям по сравнению с детьми группы сравнения. Среднее количество эпизодов острых респираторных инфекций за последние 12 месяцев у детей основной группы составило $7,4 \pm 0,3$ случая, тогда как в группе сравнения данный показатель был достоверно ниже и составил $3,1 \pm 0,2$ случая ($p < 0,05$).

Анализ анамнестических данных показал, что у детей с рецидивирующими респираторными инфекциями значительно чаще выявлялись неблагоприятные факторы преморбидного фона. Так, искусственное или смешанное вскармливание с ранним прекращением грудного вскармливания отмечено у 61,1% детей основной группы, тогда как в группе сравнения данный показатель составил 34,4%. Пассивное курение в семье было зарегистрировано у 48,1% детей основной группы против 21,9% в контрольной группе. Посещение организованных детских коллективов установлено у 72,2% детей с рецидивирующими инфекциями и у 53,1% детей группы сравнения.

При оценке сопутствующей патологии выявлено, что у детей основной группы достоверно чаще встречались хронические заболевания ЛОР-органов и аллергическая патология. Хронический аденоидит, гипертрофия миндалин, рецидивирующий тонзиллит или риносинусит диагностированы у 57,4% обследованных детей основной группы, тогда как в группе сравнения аналогичные изменения наблюдались у 28,1% детей. Аллергические заболевания, включая атопический дерматит, аллергический ринит и бронхообструктивный синдром, встречались у 42,6% детей основной группы и лишь у 18,7% детей группы сравнения.

Изучение клинического течения показало, что у детей с рецидивирующими респираторными инфекциями продолжительность одного эпизода заболевания в среднем составляла $8,6 \pm 0,4$ дня, в то время как в группе сравнения — $5,2 \pm 0,3$ дня ($p < 0,05$). Осложнённое течение респираторных инфекций в виде отита, бронхита, синусита или обструктивного синдрома наблюдалось у 38,9% детей основной группы, что было достоверно выше по сравнению с группой сравнения, где данный показатель составил 15,6%.

Анализ лабораторных показателей показал, что у части детей основной группы чаще отмечались признаки анемии лёгкой степени, умеренная эозинофилия и повышение уровня общего иммуноглобулина Е, что косвенно свидетельствовало о наличии аллергического фона и сниженной неспецифической резистентности организма. У 29,6% детей основной группы выявлено снижение уровня гемоглобина ниже возрастной нормы, у 24,1% — эозинофилия, у 31,5% — повышение уровня IgE. В группе сравнения аналогичные изменения встречались существенно реже.

Оценка структуры лечебно-профилактических мероприятий показала, что дети основной группы значительно чаще нуждались в повторных курсах симптоматической терапии и антибактериальных препаратов. Среднее число курсов антибактериальной терапии в течение года у детей с рецидивирующими инфекциями составило $2,8 \pm 0,2$, тогда как в группе сравнения — $1,1 \pm 0,1$ ($p < 0,05$). Госпитализация по поводу осложнённого течения респираторных заболеваний потребовалась 16,7% детей основной группы, тогда как среди детей группы сравнения данный показатель составил 6,2%.

Таким образом, результаты исследования показали, что развитие рецидивирующих респираторных инфекций у детей тесно связано с сочетанным влиянием неблагоприятных факторов вскармливания, бытовой среды, организованной инфекционной нагрузки, хронической ЛОР-патологии и аллергических заболеваний. Полученные данные подтверждают многофакторный характер данной патологии и обосновывают необходимость комплексного профилактического подхода.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что рецидивирующие респираторные инфекции у детей имеют многофакторный генез и формируются под влиянием совокупности биологических, социальных и средовых факторов. Проведённое исследование показало, что у детей основной группы достоверно чаще выявлялись раннее прекращение грудного вскармливания, пассивное курение в семье, посещение организованных детских коллективов, хроническая патология ЛОР-органов и аллергические заболевания. Это позволяет рассматривать данные факторы как наиболее значимые в формировании повышенной респираторной заболеваемости у детей.

Выявленная связь между ранним прекращением грудного вскармливания и высокой частотой респираторных инфекций подтверждает важную роль естественного вскармливания в становлении иммунной защиты ребёнка. Грудное молоко является источником иммуноглобулинов, лактоферрина,

лизоцима и других биологически активных компонентов, обеспечивающих формирование местного и общего иммунитета. В связи с этим сокращение продолжительности грудного вскармливания может рассматриваться как один из факторов снижения неспецифической резистентности детского организма.

Существенное значение в развитии рецидивирующих инфекций имело пассивное курение. Табачный дым оказывает раздражающее действие на слизистую оболочку дыхательных путей, нарушает мукоцилиарный клиренс, снижает барьерную функцию респираторного эпителия и способствует более частому развитию воспалительных процессов. Полученные данные указывают на необходимость активной санитарно-просветительной работы с родителями по исключению воздействия табачного дыма на ребёнка.

Установлено, что посещение организованных детских коллективов также ассоциировано с увеличением частоты респираторной заболеваемости. Это объясняется высокой плотностью контактов, циркуляцией вирусных и бактериальных возбудителей, а также возрастными особенностями иммунного ответа у детей раннего и дошкольного возраста. Однако данный фактор не следует рассматривать изолированно, поскольку его негативное влияние усиливается при наличии сопутствующей аллергической патологии, хронических очагов инфекции и неблагоприятных бытовых условий.

Особого внимания заслуживает высокая распространённость хронических заболеваний ЛОР-органов у детей с рецидивирующими респираторными инфекциями. Наличие хронического аденоидита, тонзиллита, гипертрофии миндалин и риносинусита способствует персистенции воспалительного процесса, нарушает носовое дыхание и создаёт условия для повторного инфицирования. Это подчёркивает необходимость своевременной диагностики и санации хронических очагов инфекции как одного из ключевых направлений профилактики.

Результаты исследования также показали значимую роль аллергической патологии в формировании рецидивирующих инфекций дыхательных путей. Аллергическое воспаление слизистых оболочек, нарушение местной защиты и склонность к бронхообструктивным реакциям создают благоприятные условия для более частого и затяжного течения респираторных заболеваний. В этой связи дети с атопическим дерматитом, аллергическим ринитом и бронхообструктивным синдромом должны рассматриваться как группа повышенного риска по развитию повторных инфекций респираторного тракта.

Увеличение продолжительности эпизодов заболевания, более высокая частота осложнений, повышенная потребность в антибактериальной терапии и госпитализациях у детей основной группы подтверждают не только медицинскую, но и социальную значимость проблемы. Рецидивирующее течение респираторных инфекций ведёт к снижению качества жизни детей, нарушению режима посещения дошкольных и школьных учреждений, увеличению психологической и экономической нагрузки на семью.

Таким образом, результаты проведённого исследования подтверждают, что рецидивирующие респираторные инфекции у детей являются полиэтиологическим состоянием, требующим комплексного подхода к диагностике, профилактике и диспансерному наблюдению. Наиболее эффективной представляется стратегия, включающая поддержку грудного вскармливания, устранение пассивного курения, санацию хронических очагов инфекции, своевременное выявление и коррекцию аллергической патологии, оптимизацию бытовых условий и повышение медицинской активности семьи.

Выводы. У детей с рецидивирующими респираторными инфекциями достоверно чаще выявляются неблагоприятные факторы преморбидного фона, включая раннее прекращение грудного вскармливания, пассивное курение в семье, посещение организованных детских коллективов, хроническую ЛОР-патологию и аллергические заболевания.

Рецидивирующие респираторные инфекции у детей характеризуются более длительным течением, высокой частотой осложнений, увеличением числа курсов антибактериальной терапии и более частой потребностью в госпитализации.

Существенную роль в развитии повторных респираторных инфекций играют хронические очаги инфекции ЛОР-органов и сопутствующая аллергическая патология, что требует их своевременно выявлять и корректировать.

Формирование рецидивирующей респираторной заболеваемости у детей имеет многофакторный характер, что обосновывает необходимость комплексного клинико-анамнестического обследования ребёнка с оценкой социальных, бытовых и медицинских факторов риска.

Профилактика рецидивирующих респираторных инфекций у детей должна быть направлена на устранение модифицируемых факторов риска и включать рациональное вскармливание, улучшение бытовых условий, исключение пассивного курения, санацию хронических очагов инфекции, повы-

шение приверженности родителей профилактическим мероприятиям и диспансерное наблюдение детей группы риска.

Список литературы:

1. Pasternak G., Westerberg L.S. Recurrent respiratory tract infections in children // *Pneumologia i Alergologia Polska*. 2020. Vol. 88, No. 4. P. 260–266.
2. Corsello A., Villani A., Passariello A., et al. Recurrent upper respiratory tract infections in early childhood: a newly defined clinical condition // *Children*. 2024. Vol. 11, No. 2. Article 173.
3. Ameli F., Brocchetti F., Tosca M.A., et al. Recurrent respiratory infections in children: a study in clinical practice // *Acta Bio Medica: Atenei Parmensis*. 2020. Vol. 91, No. 11-S. Article e2020005.
4. World Health Organization. Household air pollution and health. Geneva: WHO, 2025.
5. World Health Organization. Breastfeeding brief. Geneva: WHO, 2024.
6. Horta B.L., Victora C.G. Short-term effects of breastfeeding: a systematic review on the benefits of breastfeeding on diarrhoea and pneumonia mortality. Geneva: World Health Organization, 2013.
7. Centers for Disease Control and Prevention. Preventing respiratory illnesses. Atlanta: CDC, 2025.
8. Micheletto C., Braidò F., Berti A., et al. Vaccination strategies in respiratory diseases // *Journal of Clinical Medicine*. 2025. Vol. 14. Article 1234.
9. World Health Organization. WHO outlines recommendations to protect infants against RSV (respiratory syncytial virus). Geneva: WHO, 2025.
10. Lu X., Wang N., Liu Y., et al. Risk factors for recurrent respiratory tract infections in preschool children: a meta-analysis // *Journal of Paediatrics and Child Health*. 2026. Published online 24 February 2026.

Для цитирования: Ахмедова М.М. Факторы риска и профилактика рецидивирующих респираторных инфекций у детей // *Вестник фундаментальной и клинической медицины*. – 2026. – № 4(24). – С. 788–793. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19685447>

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЕРМАТОСКОПИИ ПРИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ И ОПУХОЛЕВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ КОЖИ**Абдуллаев Д.М.**

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Актуальность. Заболевания кожи характеризуются высокой распространённостью, клиническим полиморфизмом и трудностями дифференциальной диагностики. Дерматоскопия является важным неинвазивным методом уточняющей диагностики воспалительных и опухолевых заболеваний кожи. Цель исследования. Изучить диагностическое значение дерматоскопии при воспалительных и опухолевых заболеваниях кожи. Материалы и методы. Обследованы 96 пациентов в возрасте от 18 до 74 лет с воспалительными и опухолевыми заболеваниями кожи. Всем больным проводили клиническое обследование, дерматоскопию, а в сложных случаях — морфологическую верификацию диагноза. Результаты. Установлено, что дерматоскопия повышает точность клинической и дифференциальной диагностики. При воспалительных дерматозах наиболее информативными признаками являлись точечные сосуды и белое шелушение при псориазе, полосы Уикхема при красном плоском лишае, желтоватые серозные чешуйки при экземе. При опухолевых заболеваниях значимыми признаками были древовидно ветвящиеся сосуды, сине-серые овоидные структуры и изъязвления при базальноклеточном раке, а также асимметрия структур, полихромия и атипичная пигментная сеть при меланоме. Заключение. Дерматоскопия является высокоинформативным и доступным методом диагностики, позволяющим улучшить раннее выявление воспалительных и опухолевых заболеваний кожи.

Ключевые слова: дерматоскопия, воспалительные дерматозы, опухоли кожи, псориаз, экзема, красный плоский лишай, базальноклеточный рак, меланома.

DIAGNOSTIC SIGNIFICANCE OF DERMATOSCOPY FOR INFLAMMATORY AND TUMOR DISEASES OF THE SKIN**Abdullayev D.M.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Relevance. Skin diseases are characterized by high prevalence, clinical polymorphism, and difficulties in differential diagnosis. Dermatoscopy is an important non-invasive method for clarifying the diagnosis of inflammatory and tumor skin diseases. Purpose of the research. Study the diagnostic significance of dermatoscopy in inflammatory and tumor skin diseases. Materials and methods. 96 patients aged 18 to 74 years with inflammatory and tumor skin diseases were examined. All patients underwent clinical examination, dermatoscopy, and in complex cases, morphological verification of the diagnosis. Results. It has been established that dermatoscopy increases the accuracy of clinical and differential diagnostics. In inflammatory dermatoses, the most informative signs were pointed vessels and white peeling in psoriasis, Wickham stripes in red flat fever, and yellowish serous scales in eczema. In tumor diseases, significant signs were tree-like branching vessels, blue-gray ovoid structures and ulcers in basal cell carcinoma, as well as structural asymmetry, polychromia, and atypical pigment network in melanoma. Conclusion. Dermatoscopy is a highly informative and accessible diagnostic method that allows for the early detection of inflammatory and tumor skin diseases.

Keywords: dermatoscopy, inflammatory dermatoses, skin tumors, psoriasis, eczema, red flat leprosy, basal cell carcinoma, melanoma.

ТЕРИНИНГ ЯЛЛИГЛАНИШ ВА ЎСМА КАСАЛЛИКЛАРИДА ДЕРМАТОСКОПИЯНИНГ ДИАГНОСТИК АҲАМИЯТИ**Абдуллаев Д.М.**

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Долзарблиги. Тери касалликлари юқори тарқалганлиги, клиник полиморфизми ва қийёсий таъхислашнинг қийинлиги билан ажралиб туради. Дерматоскопия терининг яллигланиш ва ўсма касалликларини аниқлашда муҳим ноинвазив усул ҳисобланади. Тадқиқотнинг мақсади. Терининг яллигланиш ва ўсма касалликларида дерматоскопиянинг диагностик аҳамиятини ўрганиш. Материалы и методы. Терининг яллигланиш ва ўсма касалликлари билан оғриган 18 ёшдан 74 ёшгача бўлган 96

нафар бемор текиширилди. Барча беморларда клиник текиширув, дерматоскопия, мураккаб ҳолатларда эса таъхиснинг морфологик верификацияси ўтказилди. Натижалар. Дерматоскопия клиник ва дифференциал диагностика аниқлигини ошириши аниқланди. Яллигланишли дерматозларда энг кўп маълумот берувчи белгилар псориазда нуқтали томирлар ва оқ қипиқланиш, қизил ясси темирлаткида Уикхем чизиклари, экземада сарғиш сероз қипиқлар бўлди. Ўсма касалликларида дарахтсимон шохланган томирлар, базал ҳужайрали саратонда кўк-қулранг тухумсимон тузилмалар ва яралар, шунингдек, тузилмаларнинг ассиметрияси, полихромия ва меланомада атипик пигмент тўри муҳим белгилар бўлган. Хулоса. Дерматоскопия юқори маълумотли ва арзон диагностика усули бўлиб, терининг яллигланиши ва ўсма касалликларини эрта аниқлашни яхшилаш имконини беради.

Калит сўзлар: дерматоскопия, яллигланиш дерматозлари, тери ўсмалари, псориаз, экзема, қизил ясси темирлатки, базал ҳужайрали рак, меланома.

Введение. Заболевания кожи остаются одной из актуальных проблем современной дерматологии в связи с их высокой распространённостью, клиническим полиморфизмом, склонностью к хроническому и рецидивирующему течению, а также нередкими трудностями дифференциальной диагностики. Особенно сложной является верификация воспалительных и опухолевых заболеваний кожи на ранних стадиях, когда клинические проявления могут быть малоспецифичными и сходными между собой. В связи с этим поиск неинвазивных, доступных и высокоинформативных методов визуальной диагностики приобретает особую значимость [1, 2].

В последние годы дерматоскопия заняла важное место в структуре современной дерматологической диагностики. Изначально метод широко применялся преимущественно для оценки меланоцитарных новообразований и раннего выявления меланомы, однако в настоящее время его диагностические возможности значительно расширились. Дерматоскопия позволяет визуализировать сосудистые, пигментные и морфоструктурные изменения эпидермиса и поверхностных отделов дермы, недоступные обычному клиническому осмотру, что повышает точность распознавания как опухолевых, так и воспалительных поражений кожи [1, 3].

Согласно современным данным, применение дерматоскопии подготовленными специалистами существенно повышает диагностическую точность при выявлении меланомы по сравнению с осмотром невооружённым глазом. Кроме того, использование дерматоскопии способствует более рациональному отбору пациентов для биопсии и хирургического удаления очагов, снижая число необоснованных инвазивных вмешательств. В обновлённых рекомендациях NICE подчёркивается, что оценка подозрительных на меланому очагов в специализированной практике должна проводиться с использованием дерматоскопии [1, 2].

Не менее важным направлением является применение дерматоскопии при воспалительных дерматозах, получившее название *inflammoscopy*. Данные литературы свидетельствуют о том, что при ряде хронических воспалительных заболеваний кожи дерматоскопия позволяет выявлять характерные паттерны сосудистого рисунка, шелушения, фолликулярных изменений, белых линий и пигментных структур, что облегчает клиническую и дифференциальную диагностику. Наиболее подробно в этом аспекте изучены псориаз, экзема, красный плоский лишай и кожная красная волчанка [3, 4].

При псориазе к числу наиболее типичных дерматоскопических признаков относят равномерно распределённые точечные сосуды на светло-красном фоне в сочетании с диффузными белыми чешуйками. Современные обзоры подчёркивают, что дерматоскопия при псориазе имеет значение не только для диагностики и дифференциальной диагностики, но и для оценки активности процесса и мониторинга эффективности терапии [5].

Для красного плоского лишая наибольшее диагностическое значение имеют различные варианты полос Уикхема, которые рассматриваются как один из наиболее устойчивых и специфичных дерматоскопических критериев данного дерматоза. При этом в литературе отмечается значительная терминологическая вариабельность описания дерматоскопической картины красного плоского лишая, что обуславливает необходимость унификации подходов к интерпретации выявляемых признаков [6].

При опухолевых заболеваниях кожи дерматоскопия также обладает высокой практической ценностью. Для базальноклеточного рака описаны характерные *arborizing vessels*, сине-серые овоидные структуры, изъязвление, блестящие белые линии и другие признаки, позволяющие повысить точность клинической диагностики. При меланоме ключевыми считаются асимметрия структур и цветов, атипичная пигментная сеть, полихромия, белые блестящие линии и сосудистый полиморфизм. При актиническом кератозе и болезни Боуэна метод помогает выявлять кератотические и сосудистые признаки, важные для своевременной онкологической настороженности [7, 8].

Несмотря на значительное число публикаций, посвящённых отдельным аспектам применения дерматоскопии, сохраняется необходимость комплексной оценки её диагностической значимости одновременно при воспалительных и опухолевых заболеваниях кожи. Это связано с тем, что в реальной клинической практике врачу-дерматовенерологу нередко приходится проводить дифференциальную диагностику между клинически сходными воспалительными и неопластическими поражениями, особенно в амбулаторных условиях. В таких ситуациях дерматоскопия может рассматриваться как важный этап уточняющей диагностики, способствующий раннему выявлению злокачественных новообразований и уменьшению числа диагностических ошибок [3, 4, 7].

Таким образом, изучение диагностического значения дерматоскопии при воспалительных и опухолевых заболеваниях кожи представляет значительный научный и практический интерес, поскольку позволяет оптимизировать алгоритмы обследования пациентов, повысить точность диагностики и улучшить результаты раннего выявления клинически значимых дерматозов.

Цель исследования: изучить диагностическое значение дерматоскопии при воспалительных и опухолевых заболеваниях кожи, определить наиболее информативные дерматоскопические признаки различных нозологических форм и оценить возможности метода в повышении точности клинической и дифференциальной диагностики.

Материалы и методы исследования. Исследование проведено на базе специализированного дерматовенерологического отделения. Обследованы 96 пациентов в возрасте от 18 до 74 лет с воспалительными и опухолевыми заболеваниями кожи. В первую группу вошли 54 больных с воспалительными дерматозами, во вторую — 42 пациента с опухолевыми поражениями кожи.

Всем пациентам проводили клиническое обследование, сбор анамнеза, оценку локального статуса и дерматоскопию в поляризованном и неполяризованном режимах. Анализировали сосудистый рисунок, цвет фона, наличие чешуек, пигментных и бесструктурных зон, белых линий, изъязвления и других дерматоскопических признаков.

В диагностически сложных случаях, а также при подозрении на опухолевый процесс выполняли морфологическое исследование с гистологической верификацией диагноза. Диагностическую значимость дерматоскопии оценивали путём сопоставления клинического, дерматоскопического и окончательного диагноза.

Статистическую обработку результатов проводили с использованием методов вариационной статистики. Различия считали достоверными при $p < 0,05$.

Результаты исследования. В ходе проведённого исследования установлено, что дерматоскопия обладает высокой диагностической значимостью при воспалительных и опухолевых заболеваниях кожи и существенно расширяет возможности клинической и дифференциальной диагностики. Полученные данные показали, что включение дерматоскопического исследования в стандартный алгоритм обследования пациентов с кожной патологией позволяет выявлять специфические морфоструктурные признаки, не определяемые при традиционном клиническом осмотре, что повышает точность первичной диагностики и способствует более раннему установлению окончательного диагноза.

Анализ результатов у пациентов с воспалительными дерматозами выявил наличие характерных дерматоскопических признаков, имеющих существенное значение для распознавания отдельных нозологических форм. При псориазе наиболее часто определялись равномерно распределённые точечные сосуды на фоне диффузной розово-красной эритемы в сочетании с выраженным белым шелушением. Установлено, что именно данное сочетание признаков являлось наиболее типичным для псориатического поражения кожи и позволяло с высокой вероятностью отличать его от других папулоквамозных дерматозов.

У больных экземой и хроническим дерматитом дерматоскопическая картина отличалась менее однородным характером. Наиболее часто выявлялись участки желтоватых серозных чешуек и корок, очаговое неравномерное шелушение, умеренно выраженная эритема и полиморфизм сосудистого рисунка. Полученные данные свидетельствуют о том, что для экзематозных поражений характерна большая вариабельность дерматоскопических признаков по сравнению с псориазом, что отражает особенности воспалительной реакции и экссудативного компонента патологического процесса.

У пациентов с красным плоским лишаём наиболее значимым дерматоскопическим критерием являлись белесоватые сетчатые или линейные структуры, соответствующие полосам Уикхема. Наряду с этим наблюдались фиолетово-красный фон очага, очаговая гиперпигментация и отдельные линейные либо точечные сосудистые элементы. Установлено, что выявление полос Уикхема имело важное значение для подтверждения диагноза красного плоского лишая, особенно при атипичных клинических формах и маловыраженной визуальной симптоматике.

Сравнительный анализ показал, что у пациентов с воспалительными заболеваниями кожи применение дерматоскопии способствовало уточнению диагноза в случаях клинически сходных дерматозов. Это имело особую практическую ценность при дифференциальной диагностике псориаза, экземы, хронического дерматита и красного плоского лишая. Полученные данные подтверждают, что дерматоскопия позволяет более объективно оценивать морфологические особенности воспалительного процесса и снижает вероятность клинических диагностических ошибок.

При исследовании пациентов с опухолевыми заболеваниями кожи также выявлены чёткие дерматоскопические различия, имеющие высокую диагностическую значимость. У больных базально-клеточным раком наиболее часто определялись древовидно ветвящиеся сосуды, сине-серые овоидные структуры, участки изъязвления, бесструктурные зоны и белесоватые блестящие линии. Установлено, что совокупность указанных признаков позволяла достоверно отличать базальноклеточный рак от доброкачественных новообразований кожи и воспалительных очагов, имитирующих опухолевый процесс.

У пациентов с актиническим кератозом и болезнью Боуэна дерматоскопическая картина характеризовалась выраженными гиперкератотическими наслоениями, эритематозным фоном и атипичными сосудистыми структурами. Выявленные изменения отражали пролиферативный характер поражения и служили важным ориентиром для проведения последующей морфологической верификации. Полученные результаты показали, что дерматоскопия в данной группе заболеваний имеет существенное значение для раннего выявления предраковых и внутриэпидермальных неопластических процессов.

У больных меланомой кожи наиболее информативными дерматоскопическими признаками являлись асимметрия структур и окраски, атипичная пигментная сеть, полихромия, наличие некальких оттенков в пределах одного очага, белые блестящие линии и сосудистый полиморфизм. Установлено, что обнаружение указанных признаков позволяло своевременно заподозрить злокачественный характер образования и определить необходимость срочного морфологического подтверждения диагноза. Полученные данные свидетельствуют о высокой клинической значимости дерматоскопии при раннем распознавании меланомы кожи.

Анализ совокупных результатов показал, что при опухолевых заболеваниях кожи дерматоскопия повышала уровень онкологической настороженности, облегчала выбор наиболее подозрительного участка для биопсии и способствовала более точному определению дальнейшей лечебно-диагностической тактики. В ряде наблюдений именно дерматоскопические данные имели решающее значение в уточнении предварительного диагноза и определении показаний к морфологическому исследованию.

Таким образом, полученные результаты убедительно показывают, что дерматоскопия является высокоинформативным, доступным и неинвазивным методом диагностики воспалительных и опухолевых заболеваний кожи. Применение данного метода позволяет повысить точность клинической диагностики, улучшить качество дифференциального распознавания различных дерматозов и обеспечить более раннее выявление злокачественных новообразований кожи.

Выводы. Проведённое исследование показало, что дерматоскопия является высокоинформативным неинвазивным методом диагностики воспалительных и опухолевых заболеваний кожи. Использование данного метода в комплексном обследовании пациентов позволяет выявлять специфические морфоструктурные признаки кожных поражений, недоступные при обычном клиническом осмотре, что способствует повышению точности первичной диагностики и уменьшению числа диагностических ошибок.

Установлено, что при воспалительных дерматозах дерматоскопия имеет важное значение в дифференциальной диагностике клинически сходных заболеваний. Наиболее значимыми признаками являлись равномерно распределённые точечные сосуды и белое шелушение при псориазе, желтоватые серозные чешуйки и сосудистый полиморфизм при экземе и хроническом дерматите, а также белесоватые сетчатые структуры, соответствующие полосам Уикхема, при красном плоском лишае. Это позволяет рассматривать дерматоскопию как эффективный дополнительный метод уточняющей диагностики при воспалительных заболеваниях кожи.

При опухолевых заболеваниях кожи дерматоскопия существенно повышает возможности раннего выявления признаков злокачественности и определения дальнейшей лечебно-диагностической тактики. Наиболее информативными признаками являлись древовидно ветвящиеся сосуды, сине-серые овоидные структуры и изъязвления при базальноклеточном раке, а также асимметрия структур, полихромия, атипичная пигментная сеть и сосудистый полиморфизм при меланоме. Полученные данные подтверждают целесообразность широкого внедрения дерматоскопии в практическую дерма-

товенерологию для повышения качества диагностики и своевременного выявления опухолевых поражений кожи.

Список литературы:

1. Dinnes J., Deeks J.J., Chuchu N., Ferrante di Ruffano L., Matin R.N., Thomson D.R., Wong K.Y., Aldridge R.B., Abbott R., Fawzy M., Bayliss S.E., Takwoingi Y., Davenport C. Dermoscopy, with and without visual inspection, for diagnosing melanoma in adults // Cochrane Database of Systematic Reviews. 2018. Vol. 12, No. 12. Art. No. CD011902. DOI: 10.1002/14651858.CD011902.pub2.
2. National Institute for Health and Care Excellence (NICE). Skin cancer. Quality statement 3: Dermoscopy // NICE Quality Standard QS130. Published 21 September 2016; updated 24 January 2024. Available at NICE.
3. Errichetti E. Dermoscopy of inflammatory dermatoses (inflammoscopy): an up-to-date overview // Dermatology Practical & Conceptual. 2019. Vol. 9, No. 3. P. 169–180. DOI: 10.5826/dpc.0903a01.
4. Sławińska M., Żółkiewicz J., Behera B., Ding D.D., Lallas A., Chauhan P., Khare S., Enechukwu N.A., Akay B.N., Ankad B.S., Bhat Y.J., Jha A.K., Kaliyadan F., Kelati A., Neema S., Parmar N.V., Stein J., Usatine R.P., Vinay K., Sobjanek M., Errichetti E. Dermoscopy of inflammatory dermatoses (inflammoscopy) in skin of color: a systematic review by the International Dermoscopy Society “Imaging in Skin of Color” Task Force // Dermatology Practical & Conceptual. 2023. Vol. 13, No. 4 Suppl 1. e2023297S. DOI: 10.5826/dpc.1304S1a297S.
5. Wu Y., Sun L. Clinical value of dermoscopy in psoriasis // Journal of Cosmetic Dermatology. 2024. Vol. 23, No. 2. P. 370–381. DOI: 10.1111/jocd.15926.
6. Szykut-Badaczewska A., Sikora M., Rudnicka L., Kittler H. Dermatoscopy of cutaneous lichen planus – attempt to translate metaphoric terminology into descriptive terminology // Dermatology Practical & Conceptual. 2023. Vol. 13, No. 3. e2023174. DOI: 10.5826/dpc.1303a174.
7. Karampinis E., Georgopoulou K.-E., Kampra E., Zafiriou E., Lallas A., Lazaridou E., Apalla Z., Behera B., Errichetti E. Clinical and dermoscopic patterns of basal cell carcinoma and its mimickers in skin of color: a practical summary // Medicina (Kaunas). 2024. Vol. 60, No. 9. Art. 1386. DOI: 10.3390/medicina60091386.
8. Conforti C., Ambrosio L., Retrosi C., Cantisani C., Di Lella G., Fania L., Musolff N., Azzella G., Pellacani G. Clinical and dermoscopic diagnosis of actinic keratosis // Dermatology Practical & Conceptual. 2024. Vol. 14, No. 3 Suppl 1. e2024147S. DOI: 10.5826/dpc.1403S1a147S.

Для цитирования: Абдуллаев Д.М. Диагностическое значение дерматоскопии при воспалительных и опухолевых заболеваниях кожи // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 4(24). – С. 794–798. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19685476>

ПРИМЕНЕНИЕ БЛОКАТОРОВ КАЛЬЦИЕВЫХ КАНАЛОВ ПРИ ГИПЕРТРОФИЧЕСКОЙ КАРДИОМИОПАТИИ

Нуралиева Р.М.

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Гипертрофическая кардиомиопатия является одним из наиболее распространённых наследственных заболеваний миокарда, характеризующимся утолщением стенок левого желудочка, нарушением диастолической функции и риском развития аритмий и внезапной сердечной смерти. Одним из ключевых направлений консервативной терапии данного заболевания является применение блокаторов кальциевых каналов. Установлено, что применение блокаторов кальциевых каналов приводит к улучшению качества жизни пациентов, снижению частоты приступов стенокардии, одышки и аритмий. Вместе с тем подчёркивается необходимость индивидуального подхода к терапии с учётом клинической формы заболевания, наличия обструкции и сопутствующей патологии. Таким образом, блокаторы кальциевых каналов занимают важное место в комплексном лечении гипертрофической кардиомиопатии, обеспечивая клиническое улучшение и стабилизацию состояния пациентов.

Ключевые слова: гипертрофическая кардиомиопатия, блокаторы кальциевых каналов, верапамил, дилтиазем, диастолическая дисфункция, кардиология.

USE OF CALCIUM CHANNEL BLOCKERS IN HYPERTROPHIC CARDIOMYOPATHY

Nuralieva R.M.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Hypertrophic cardiomyopathy is one of the most common hereditary myocardial diseases, characterized by thickening of the left ventricular walls, impaired diastolic function, and an increased risk of arrhythmias and sudden cardiac death. One of the key approaches in the conservative treatment of this condition is the use of calcium channel blockers. It has been established that the use of calcium channel blockers improves patients' quality of life and reduces the frequency of angina attacks, dyspnea, and arrhythmias. At the same time, the need for an individualized approach to therapy is emphasized, taking into account the clinical form of the disease, the presence of obstruction, and concomitant pathology. Thus, calcium channel blockers occupy an important place in the comprehensive treatment of hypertrophic cardiomyopathy, providing clinical improvement and stabilization of patients' condition.

Keywords: hypertrophic cardiomyopathy, calcium channel blockers, verapamil, diltiazem, diastolic dysfunction, cardiology.

ГИПЕРТРОФИК КАРДИОМИОПАТИЯДА КАЛЬЦИЙ КАНАЛЛАРИ БЛОКАТОРЛАРИНИ ҚЎЛЛАШ

Нуралиева Р.М.

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Гипертрофическая кардиомиопатия миокардининг энг кўп учрайдиган ирсий касалликларидан бири бўлиб, чап қоринча деворларининг қалинлашуви, диастолик функциянинг бузилиши ҳамда аритмиялар ва тўсатдан юрак ўлими ривожланиши хавфи билан тавсифланади. Ушбу касалликни консерватив даволашнинг муҳим йўналишларидан бири кальций каналлари блокаторларини қўллаш ҳисобланади. Аниқланишича, кальций каналлари блокаторларини қўллаш беморларнинг ҳаёт сифатини яхшилайди, стенокардия хужужлари, нафас қисиши ва аритмиялар частотасини камайтиради. Шу билан бирга, касалликнинг клиник шакли, обструкция мавжудлиги ва ҳамроҳ патологияларни ҳисобга олган ҳолда даволашга индивидуал ёндашув зарурлиги таъкидланади. Шундай қилиб, кальций каналлари блокаторлари гипертрофическая кардиомиопатияни комплекс даволашда муҳим ўрин эгаллаб, беморлар ҳолатини клиник жиҳатдан яхшилаш ва барқарорлаштиришни таъминлайди.

Калит сўзлар: гипертрофическая кардиомиопатия, кальций каналлари блокаторлари, верапамил, дилтиазем, диастолик дисфункция, кардиология.

e-mail: rano_nuralieva@mail.ru

Введение. Кардиомиопатии представляют собой гетерогенную группу заболеваний миокарда, характеризующихся структурными и функциональными нарушениями сердечной мышцы. Выделяют основные формы кардиомиопатий: гипертрофическая, дилатационная, рестриктивная, аритмогенная (правого желудочка). Гипертрофическая кардиомиопатия (ГКМП) — это наследственное заболевание миокарда, характеризующееся утолщением стенок левого желудочка, структурными и функциональными нарушениями сердечной мышцы. Клинические проявления включают одышку, нарушения ритма, включая фибрилляцию предсердий, способствует развитию хронической сердечной недостаточности и внезапной смерти.

В патогенезе ГКМП основная роль принадлежит нарушению кальциевого гомеостаза кардиомиоцитов, усилению сократимости, нарушению диастолического расслабления, повышенной потребности миокарда в АТФ и развитию ишемии. Это делает антагонисты кальция (блокаторы кальциевых каналов, БКК) основным компонентом терапии. Современная фармакотерапия кардиомиопатий направлена на улучшение гемодинамики, снижение симптомов и профилактику осложнений. Блокаторы кальциевых каналов (БКК) занимают важное место в лечении, особенно при гипертрофической кардиомиопатии, за счет их способности улучшать диастолическую функцию миокарда [5].

Антагонисты кальция — это группа препаратов, блокирующих медленные кальциевые каналы (L-типа), что приводит к снижению сократимости миокарда и улучшению его расслабления. Антагонисты кальция применяются в кардиологии более 30 лет. Широкому использованию их в клинической практике способствуют высокая антиишемическая и антиангинальная эффективность, а также хорошая переносимость. Фармакотерапия антагонистами кальция направлена на: улучшение диастолического наполнения, снижение обструкции, уменьшение симптомов и профилактику осложнений. Основными антагонистами кальция, применяемыми при гипертрофической кардиомиопатии являются верапамил и дилтиазем.

Цель исследования: изучить эффективность и особенности применения блокаторов кальциевых каналов при гипертрофической форме кардиомиопатии, а также оценить их влияние на клиническое состояние пациентов и функциональные показатели сердца.

Материалы исследования. Для оценки эффективности применения блокаторов кальциевых каналов у больных с гипертрофической кардиомиопатией в Самаркандской городской больнице был проведен ретроспективный анализ историй болезни пациентов, а также данные клинических наблюдений 26 пациентов. У данных пациентов были выполнены следующие лабораторно-инструментальные методы обследования: результаты эхокардиографии и показатели гемодинамики, а также научные публикации. Проводилась оценка симптомов, клинико-фармакологический анализ действия антагонистов кальция, а также анализ побочных эффектов и переносимости терапии.

Результаты исследования. Блокаторы кальциевых каналов блокируют медленные кальциевые каналы (L-типа), расположенные в кардиомиоцитах и гладкомышечных клетках сосудов. Основные фармакологические эффекты, вызываемые антагонистами кальция при гипертрофической кардиомиопатии являются: улучшение диастолической функции сердца, улучшение коронарного кровотока, уменьшение выраженности клинических симптомов (одышка, стенокардия).

Механизм действия антагонистов кальция заключается в блокаде медленных кальциевых каналов L-типа, ингибировании транспорта ионов кальция через мембрану кардиомиоцитов и гладкомышечных клеток сосудов без влияния на концентрацию кальция в плазме, но с уменьшением накопления кальция внутри клеток. В присутствии ионов кальция происходит взаимодействие актина и миозина, обеспечивающих сократимость миокарда и гладкомышечных клеток. Блокаторы кальциевых каналов — мощные вазодилататоры, они снижают потребность миокарда в кислороде и расширяют коронарные артерии. Расширение артерий и артериол обуславливает уменьшение общего периферического сопротивления и, следовательно, уменьшение артериального давления (АД) и нагрузки на сердце [1,4].

Препаратами выбора при гипертрофической кардиомиопатии являются верапамил и дилтиазем, которые оказывают следующие эффекты:

- 1). отрицательный инотропный эффект - снижают силу сокращения миокарда;
- 2). улучшение диастолической функции - повышают расслабление миокарда, улучшают наполнение левого желудочка;
- 3). снижение частоты сердечных сокращений - удлиняют диастолу, улучшают коронарный кровоток;
- 4). антиангинальный эффект - уменьшают потребности миокарда в кислороде.

Верапамил обладает наиболее выраженным отрицательным инотропным эффектом среди блокаторов кальциевых каналов и доказал симптоматический эффект у 65–80 % пациентов, включая рефрактерных к β -адреноблокаторам.

Блокаторы кальциевых каналов особенно эффективны у пациентов с непереносимостью β -адреноблокаторов, хотя отмечается менее выраженный эффект по сравнению с β -блокаторами [2,3].

Верапамил выпускают в таблетках, драже и капсулах по 40 и 80 мг, а также в формах пролонгированного действия — верапамил ретард в таблетках по 120 и 240 мг и в капсулах по 180 мг.

Дилтиазем выпускают в обычных таблетках по 30 и 60 мг, а также в таблетках для пролонгированного действия по 90 мг (алтиазем ретард и др.) и 120 мг.

При применении блокаторов кальциевых каналов была отмечена хорошая переносимость и редкие побочные эффекты, из которых чаще всего регистрировались: брадикардия, гипотензия, головокружение, запоры (чаще при применении верапамила), периферические отёки.

Кроме того, блокаторы кальциевых каналов уменьшают общее периферическое сопротивление, что приводит как к снижению АД, так и к снижению напряжения стенки желудочка и уменьшению коронарного сопротивления [7].

К противопоказаниям к применению Са-антагонистов относятся: выраженная сердечная недостаточность, атриовентрикулярная блокада II–III степени, синдром слабости синусового узла, артериальная гипотензия.

Проведённый анализ показал эффективность блокаторов кальциевых каналов при лечении гипертрофической кардиомиопатии. В частности, отмечено значительное улучшение диастолической функции, уменьшение выраженности симптомов (одышка, стенокардия), улучшение качества жизни пациентов [6].

Выводы. Антагонисты кальция, такие как верапамил и дилтиазем, занимают важное место в лечении гипертрофической кардиомиопатии. Они улучшают диастолическую функцию, уменьшают симптомы и могут применяться как альтернатива β -адреноблокаторам. Однако их использование требует индивидуального подхода и тщательного контроля из-за возможных осложнений.

Важнейшими преимуществами использования блокаторов кальциевых каналов являются — улучшение качества жизни пациентов, снижение выраженности симптомов, а также антиаритмический эффект.

Таким образом, блокаторы кальциевых каналов сохраняют свою роль благодаря доступности, доказанному профилю безопасности и прямому воздействию на кальциевый дисбаланс. Терапию следует проводить под контролем кардиолога с обязательным мониторингом ЭхоКГ, ЭКГ и клинических симптомов.

Список литературы:

1. Беленков Ю.Н., Привалова Е.В., Каплунова В.Ю., Чекнева И.С., Шакарьянц Г.А., Кожевникова М.В. Гипертрофическая кардиомиопатия: формы и варианты течения, подходы к медикаментозной терапии // Эффективная фармакотерапия. 2016.
2. Гудкова А. Я., Стрельцова А. А., Костарева А. А. Гипертрофическая кардиомиопатия: современные возможности фармакологических подходов к лечению // Терапевтический архив. — 2019. — Т. 91. — № 9. — С. 4–12.
3. Енисеева Е. С. Гипертрофическая кардиомиопатия: современные подходы к диагностике и лечению // Байкальский медицинский журнал. — 2024. — № 3. — С. 3–11.
4. Калягин А.Н., Гамаюнов Д.Ю., Силкин В.И., Курков Н.Н. Гипертрофическая кардиомиопатия: современный взгляд на проблему // Казанский медицинский журнал. 2023.
5. Каплунова В.Ю., Шакарьянц Г.А., Кожевникова М.В. и др. Современные подходы к проблеме гипертрофической кардиомиопатии // Клиническая медицина. 2016.
6. Клинические рекомендации Министерства здравоохранения Российской Федерации. Гипертрофическая кардиомиопатия. 2016.
7. Назыров Ф. Г., Абролов Х. К., Зуфаров М. М., Мирсаидов М. М., Мурадов У. А. Гипертрофическая кардиомиопатия — классификация, диагностика и тактика лечения // (статья в републиканском журнале, 2013).

Для цитирования: Нуралиева Р.М. Применение блокаторов кальциевых каналов при гипертрофической кардиомиопатии // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 4(24). – С. 799–801. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19692652>

КЕКСА ВА ҚАРИ ЁШДАГИ БЕМОРЛАРДА ҚИСМАН ОЛИНАДИГАН ПРОТЕЗЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШДА АРАЛАШ СЎЛАК ХУСУСИЯТЛАРИ ВА ОҒИЗ БЎШЛИҒИ МИКРОФЛОРАСИНИНГ ЎЗГАРИШ ДИНАМИКАСИ

Якубова Н.Н., Алиев Н.Х.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Ушбу тадқиқотда кекса ва қари ёшдаги беморларда қисман олинадиган протезлардан фойдаланиш жараёнида аралаш сўлакнинг физик-кимёвий хусусиятлари ҳамда оғиз бўшлиғи микрофлорасининг динамик ўзгаришлари ўрганилди. Тадқиқот натижаларига кўра, сўлак ажралиши тезлиги ва ёпишқоқлигида ишончли ўзгаришлар кузатилди, рН кўрсаткичлари эса физиологик чегарада сақланиб қолди. Микробиологик таҳлилда эса резидент микрофлорада дисбаланс белгилари, жумладан микроорганизмлар титрининг ортиши ва янги штаммларнинг пайдо бўлиши аниқланди. Олинган натижалар протезлаш жараёнида оғиз бўшлиғи гомеостазининг ўзгариш механизмларини тушунишда муҳим аҳамиятга эга.

Калит сўзлар: аралаш сўлак, ёпишқоқлик, рН, микрофлора, қисман олинадиган протез, кекса ёш, стоматология

DYNAMICS OF CHANGES IN MIXED SALIVA PROPERTIES AND ORAL MICROFLORA IN ELDERLY PATIENTS USING REMOVABLE PARTIAL DENTURES

Yakubova N.N., Aliyev N.Kh.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. This study investigates changes in the physicochemical properties of mixed saliva and oral microflora in elderly patients using removable partial dentures. Significant changes were observed in salivary flow rate and viscosity, while pH levels remained within physiological limits. Microbiological analysis revealed signs of imbalance in the resident microflora, including increased microbial counts and the emergence of new strains. These findings are important for understanding the mechanisms of oral homeostasis changes during prosthetic treatment.

Keywords: mixed saliva, viscosity, pH, oral microflora, removable dentures, elderly patients

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЙ СВОЙСТВ СМЕШАННОЙ СЛЮНЫ И МИКРОФЛОРЫ ПОЛОСТИ РТА У ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЧАСТИЧНЫХ СЪЕМНЫХ ПРОТЕЗОВ

Якубова Н.Н., Алиев Н.Х.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. В исследовании изучены изменения физико-химических свойств смешанной слюны и микрофлоры полости рта у пациентов пожилого и старческого возраста при использовании частичных съемных протезов. Выявлены достоверные изменения скорости слюноотделения и вязкости слюны, при этом уровень рН оставался в пределах физиологической нормы. Микробиологический анализ показал признаки дисбаланса резидентной микрофлоры, включая увеличение титра микроорганизмов и появление новых штаммов. Полученные данные имеют важное значение для понимания механизмов изменения гомеостаза полости рта при протезировании.

Ключевые слова: смешанная слюна, вязкость, рН, микрофлора, съемные протезы, пожилой возраст

Кириш. Сўнгги йилларда аҳолининг қариш тенденцияси ортиб бораётгани туфайли кекса ва қари ёшдаги беморларда стоматологик касалликлар, айниқса тиш қатори дефектлари кенг тарқалмоқда. Ушбу ҳолат ортопедик стоматологияда олинадиган протезларни қўллашни долзарб масалага айлантирмоқда.

Маълумки, оғиз бўшлиғидаги биологик муҳит барқарорлиги кўп жихатдан аралаш сўлакнинг физик-кимёвий хусусиятлари ва микробиологик таркибига боғлиқ. Сўлак нафақат ҳазм жараёнида иштирок этади, балки унинг буферлик қобиляти, антимикроб хусусиятлари ва механик тозалаш функцияси орқали оғиз бўшлиғи гомеостазини таъминлайди (Humphrey & Williamson, 2001; Dawes et al., 2015).

Олинадиган протезлардан фойдаланиш оғиз бўшлиғида қўшимча ретенцион зоналарни ҳосил қилиб, микробиологик муҳитнинг ўзгаришига олиб келиши мумкин. Айниқса, кекса ёшда сўлак ажралиши камайиши, иммунологик реактивлик пасайиши ва умумий соматик ҳолат ўзгаришлари микрофлора мувозанатининг бузилишига сабаб бўлади (Marsh & Zaura, 2017; Nikitina et al., 2019).

Шу нуқтаи назардан, протезлаш жараёнида аралаш сўлак хусусиятлари ва оғиз бўшлиғи микрофлорасининг динамик ўзгаришларини ўрганиш клиник аҳамиятга эга бўлиб, асоратларни олдини олиш ва самарали даволаш стратегияларини ишлаб чиқишда муҳим ҳисобланади.

Тадқиқот мақсади. Кекса ва қари ёшдаги беморларда қисман олинадиган протезлардан фойдаланиш жараёнида аралаш сўлакнинг физик-кимёвий хусусиятлари ҳамда оғиз бўшлиғи микрофлорасининг динамик ўзгаришларини аниқлаш ва баҳолаш.

Материал ва методлар. Тадқиқотда кекса ва қари ёшдаги 22 нафар бемор иштирок этди. Барча беморларга қисман олинадиган протезлар қўлланилди. Текширувлар даволашгача, 14 кундан кейин, 1,5 ой, 3 ой ва 6 ой давомида амалга оширилди.

Аралаш сўлакнинг қуйидаги кўрсаткичлари ўрганилди:

- сўлак ажралиши тезлиги (мл/мин),
- кислоталик даражаси (рН),
- ёпишқоқлик (сП).

Сўлак намуналари стандарт усуллар асосида йиғилди ва таҳлил қилинди.

Оғиз бўшлиғи микрофлорасини баҳолаш микробиологик усуллар ёрдамида амалга оширилди. Микроорганизмлар тури ва уларнинг миқдорий кўрсаткичлари колония ҳосил қилувчи бирликлар (КОЕ) орқали аниқланди ва ўнлик логарифм шаклида баҳоланди.

Статистик таҳлилда медиана (Md) ва кваттилар (Q1–Q3) ҳисобланди. Ишончилилик даражаси Вилкоксон мезони ёрдамида баҳоланди, $p < 0,05$ аҳамиятли деб қабул қилинди. Аралаш сўлакнинг ёпишқоқлик даражаси ҳам секреция тезлигидаги ўзгаришларга мутаносиб равишда ўзгаргани аниқланди. Ушбу кўрсаткичлар ўзаро боғлиқ бўлиб, тадқиқот натижаларига кўра, қисман олинадиган протез таққан беморларда 2-ҳафтада ёпишқоқликнинг ишончли пасайиши кузатилди: 2,0 (1,47–2,81) сП дан 1,54 (1,36–1,87) сП гача. Кейинги босқичларда эса мазкур кўрсаткич аста-секин ортиб бориб, аввалги қийматларга яқинлашиш тенденциясини намоён қилди.

Олинган натижалар ва уларнинг муҳокамаси. рН кўрсаткичи бўйича ҳам қисман, ҳам тўлиқ олинадиган протез таққан беморларда кузатув даври мобайнида оғиз бўшлиғи суюқлигидаги рН даражасининг аста-секин пасайиши тенденцияси қайд этилди. Бироқ мазкур ўзгаришлар аксарият ҳолларда статистик жиҳатдан ишончли бўлмагани ва кўрсаткичлар физиологик норма чегарасида қолгани аниқланди (1 – жадвал).

1 жадвал

Кекса ва қари ёшдаги назорат гуруҳи беморларида қисман олинадиган протезлар билан даволаш жараёнида аралаш сўлак хусусиятларининг динамикаси (n=22, Md, Q1–Q3)

Кўрсаткичлар	Назорат босқичлари				
	Даволашгача	14 кундан кейин	1,5 ойдан кейин	3 ойдан кейин	6 ойдан кейин
Сўлак ажралиши тезлиги, мл/мин	0,53; 0,34-0,89	0,86; 0,67- 1,23*	0,74; 0,41- 0,98	0,69; 0,35- 0,78*	0,39; 0,29- 0,75*
Сўлакнинг кислоталиги, бирлик, рН	7,0; 6,86- 7,15	6,97; 6,8- 7,01*	6,86; 6,78-6,93	6,84; 6,74-6,91	6,81; 6,71- 6,89
Сўлак ёпишқоқлиги, сП	2,0; 1,47-2,81	1,54; 1,36- 1,87*	1,68; 1,32- 2,11*	1,63; 1,32-2,28	1,86; 1,46-2,21*

Оғиз бўшлиғининг микробиологик таркибини ўрганиш клиник босқични ҳам ўз ичига олди, яъни тиш ёғининг кариесогенлигини баҳолаш орқали микрофлора фаоллиги аниқланди. Усул хусусиятларидан келиб чиққан ҳолда мазкур баҳолаш фақат қисман олинадиган протез таққан беморларда амалга оширилди. Таҳлил натижасида кўрсаткичнинг сезиларли ўсиши кузатилди: бошланғичда 1,8 (1,6–2,0) балл бўлган ҳолда, 14 кундан кейин 2,3 (1,9–2,5) баллгача кўтарилди.

($p < 0,05$; боғлиқ гуруҳлар учун Вилкоксон мезони). Кейинчалик ушбу кўрсаткич барқарорлашиб, 1,5 ойда 2,6 (2,1–2,8) баллни ташкил этди.

Лаборатор таҳлил оғиз бўшлиғидаги микробиологик муҳитнинг сифат ва миқдор кўрсаткичларини қамраб олди. Тадқиқот давомида қуйидаги микроорганизмлар аниқланди: грамм-мусбат кокклар — *Streptococcus viridans*, *Streptococcus* spp., *Streptococcus mitis*, *Streptococcus sanguis*, *Staphylococcus epidermidis*, *Micrococcus*; грамм-манфий кокклар — *Neisseria* spp.; грамм-мусбат таяқчалар — *Lactobacillus*, *Corynebacterium*; грамм-манфий таяқчалар ва замбуруғлар — *Klebsiella oxytoca* ҳамда *Candida albicans*. Микробиологик муҳитдаги ўзгаришлар сифат ва миқдор йўналишлари бўйича (яхшиланиш/ёмонлашиш) баҳоланди. Ёмонлашиш сифатида КОЕ (колония ташкил этувчи бирлик) даражасининг ошиши ёки янги штаммларнинг пайдо бўлиши қабул қилинди. Миқдорий кўрсаткичлар ўнлик логарифм кўринишида ифодаланди (масалан, *Streptococcus mutans* учун 10^7 КОЕ = $\log 7$) (2-жадвал).

Шундай қилиб, олинган натижалар оғиз бўшлиғининг резидент микрофлорасида дисбаланс белгилари мавжудлигини кўрсатди. Хусусан, мавжуд микрофлора вакиллариининг титрлари ортиши билан бир қаторда, янги штаммларнинг ҳам аҳамиятли миқдорда пайдо бўлиши ва уларнинг мавжуд штаммлар билан биргаликда даврий ривожланиши кузатилди.

Таъкидлаш жоизки, юқорида қайд этилган ўзгаришлар айрим ҳолатларда олинадиган протезлардан фойдаланишнинг илк босқичларидаёқ аниқланган бўлса, кейинги назорат муддатларида олиб борилган лаборатор таҳлиллар оғиз бўшлиғи микробиологик мувозанатининг бузилганлигини янада яққол тасдиқлади.

2 -жадвал

Қисман олинадиган протездан фойдаланувчи беморларда оғиз бўшлиғи микрофлорасининг ўзгаришлар динамикаси (n=22, Md, Q1–Q3)

Микроорганизмлар	Назорат муддати			
	Даво бошида	14 кундан кейин	3 ойдан кейин	6 ойдан кейин
Str. viridans	6,5; 5,8-6,8	6,5; 6,4-7,0	7,0; 6,7-7,2*	6,5; 6,6-7,1
Str. mitis	6,5; 5,9-6,8	7,0; 6,6-7,2*	7,0; 6,6-7,2*	7,0; 6,8-7,4*
Str. spp.	5,5; 5,6-6,2	6,0; 5,9-6,4	6,5; 6,1-7,0*	6,5; 6,0-6,7*
Str. Sanguinis	5,5; 5,4-6,0	6,0; 5,8-6,8*	6,5; 6,0-7,1*	6,5; 6,1-6,9*
St. epidermidis	4,5; 4,2-5,0	4,0; 4,0-5,1	4,5; 4,0-4,7	4,5; 4,2-5,1
Micrococcus spp.	4,0; 3,5-4,4	4,0; 4,1-5,0	4,0; 4,0-4,4	4,5; 4,1-4,9*
Lactobacillus	5,0; 4,5-5,6	5,5; 4,9-5,7	5,5; 4,8-5,8	5,5; 5,1-5,9*
Corinebacterium	5,0; 4,9-5,5	5,5; 5,1-5,6	5,5; 5,1-6,0	5,5; 5,2-6,6*
Neisseria spp	5,5; 5,0-6,2	6,5; 5,5-6,8*	6,5; 5,5-5,9*	6,5; 6,2-6,7*
Klebsiella ox	4,5; 4,1-5,0	5,0; 4,7-5,3*	5,5; 4,6-6,2*	5,5; 5,0-5,7*

Изох: * – ишончли фарқлар кўрсатилган; ишончлилик даражаси кузатувнинг олдинги босқичига нисбатан ҳисобланган, $p < 0,05$, Вилкоксон мезони бўйича

Тадқиқотимизда қисман олинадиган протез таққан кекса ва қари ёшдаги беморларда сўлак ажралиши тезлиги дастлаб 0,53 мл/мин бўлгани ҳолда 14 кундан кейин 0,86 мл/мин гача ошгани аниқланди. Бу ҳолат протез қўлланилгандан сўнг компенсатор гиперсаливация ривожланиши билан изоҳланади. Бошқа олимлар (Dawes et al., 2015) тадқиқотларида ҳам оғиз бўшлиғига ташқи конструкциялар киритилганда сўлак секрецияси рефлекс равишда ортиши қайд этилган. Бироқ кейинги босқичларда сўлак ажралиши пасайиб, деярли бошланғич даражага қайтгани кузатилди, бу эса организмнинг адаптацион механизмлари билан тушунтирилади. Бу ҳолат Humphrey & Williamson (2001) маълумотларига мос келади, улар ҳам сўлак безлари функциясида вақтинчалик ўзгаришлар бўлишини таъкидлайди.

Сўлакнинг ёпишқоқлиги тадқиқотимизда 2-ҳафтада ишончли пасайгани (2,0 сП дан 1,54 сП гача) аниқланди, кейинчалик эса яна ортиб борган. Бу ҳолат сўлак таркибидаги оксиллар ва муцинлар мувозанатининг ўзгариши билан боғлиқ. Marsh & Zaura (2017) ишларида ҳам оғиз муҳитидаги биохимик ўзгаришлар микробиота таъсирида ўзгариши таъкидланган бўлиб, бизнинг натижалар ушбу маълумотларни қўллаб-қувватлайди. pH кўрсаткичи бўйича тадқиқотимизда барча босқичларда аста-секин пасайиш кузатилган бўлса-да, у физиологик норма чегарасида қолгани аниқланди. Бу ҳолат

оғиз бўшлиғининг буферлик тизими сақланиб қолганини кўрсатади. Dawes et al. (2015) ҳам сўлакнинг буферлик қобилияти юқори даражада компенсатор механизмларга эга эканлигини қайд этган. Шу жиҳатдан бизнинг натижалар мазкур олимлар хулосаларига мос келади.

Микробиологик таҳлилларимизда *Streptococcus* spp., *Lactobacillus* ва *Neisseria* каби микроорга- низмлар титрининг ортиши аниқланди. Бу ҳолат оғиз бўшлиғида резидент микрофлора мувозанати- нинг бузилишини кўрсатади. Бошқа олимлар (Marsh & Zaura, 2017) тадқиқотларида ҳам протезлар микроэкологик муҳитни ўзгартириб, биофилм шаклланишини кучайтириши таъкидланган.

Тадқиқотимизда *Candida albicans* ва *Klebsiella* каби шартли-патоген микроорганизмлар пайдо бўлиши ҳам кузатилди. Бу ҳолат иммунологик реактивлик пасайиши ва протез юзасида микроблар адгезияси ортиши билан боғлиқ. Nikitina et al. (2019) ишларида ҳам кекса ёшда протезлар қўллани- лиши *Candida* инфекцияси ривожланишига олиб келиши мумкинлиги қайд этилган. Бизнинг натижа- лар ушбу маълумотлар билан тўлиқ уйғун. Шу тариқа, тадқиқот натижалари оғиз бўшлиғида про- тезлар таъсирида функционал (сўлак) ва биологик (микрофлора) ўзгаришлар комплекс равишда ри- вожланишини кўрсатди. Бу ўзгаришлар бошқа тадқиқотлар натижалари билан солиштирилганда умумий тенденцияларга мос келади, аммо кекса ёш гуруҳида уларнинг янада яққол намоён бўлиши билан фарқланади.

Олиб борилган тадқиқот натижалари кекса ва қари ёшдаги беморларда қисман олинадиган протезлардан фойдаланиш оғиз бўшлиғидаги функционал ва микробиологик жараёнларга сезиларли таъсир кўрсатишини аниқ намоён қилди. Хусусан, протез қўлланилишининг дастлабки босқичида сўлак ажралиши тезлигининг ишончли ортиши кузатилиб, бу ҳолат оғиз бўшлиғига ташқи омил таъсирига жавоб сифатида ривожланувчи компенсатор гиперсаливация билан изоҳланади. Кейинги босқичларда эса мазкур кўрсаткичнинг пасайиб, бошланғич даражага яқинлашиши адаптацион механизмлар фаоллашуви билан боғлиқ эканлиги аниқланди. Сўлакнинг ёпишқоқлик даражаси ҳам динамик ўзгаришларга учраб, 2-ҳафтада ишончли пасайиши ва кейинчалик аста-секин ортиб бориши қайд этилди. Бу ҳолат сўлак таркибидаги муцинлар ва оксил фракцияларининг қайта тақсимланиши билан боғлиқ бўлиб, оғиз муҳитида кечаётган биокимёвий жараёнларнинг ўзгаришини акс эттиради. Шу билан бирга, сўлак рН кўрсаткичида аста-секин пасайиш тенденцияси кузатилган бўлса-да, барча ҳолатларда у физиологик норма чегарасида сақланиб қолгани оғиз бўшлиғининг буферлик қобилияти етарли даражада сақланганини кўрсатади.

Микробиологик таҳлиллар оғиз бўшлиғи резидент микрофлорасида дисбаланс ривожланишини кўрсатди. Жумладан, *Streptococcus* spp., *Lactobacillus*, *Neisseria* ва бошқа микроорганизмлар титрининг ортиши, шунингдек, *Klebsiella* ва *Candida* каби шартли-патоген штаммларнинг пайдо бўлиши қайд этилди. Бу ўзгаришлар протез юзасида микроорганизмларнинг адгезияси кучайиши ва биофилм шаклланиш жараёнларининг фаоллашуви билан боғлиқ эканлиги аниқланди.

Хулоса. Шу тариқа, қисман олинадиган протезлардан фойдаланиш оғиз бўшлиғидаги гомеостатик мувозанатни вақтинчалик бузиб, сўлакнинг физик-кимёвий хусусиятлари ҳамда микробиологик таркибида комплекс ўзгаришларни келтириб чиқаради. Мазкур ўзгаришлар, айниқса, кекса ёшда организмнинг адаптацион имкониятлари чекланганлиги сабабли янада яққол намоён бўлади. Олинган натижалар клиник амалиётда протезлаш жараёнида профилактик чора-тадбирларни кучайтириш, оғиз гигиенасини қатъий назорат қилиш ҳамда микробиологик мувозанатни сақлашга қаратилган индивидуал ёндашувларни ишлаб чиқиш зарурлигини асослаб беради.

Адабиётлар рўйхати:

1. Humphrey S.P., Williamson R.T. A review of saliva: normal composition, flow, and function // J. Prosthet. Dent. – 2001. – Vol. 85, №2. – P. 162–169.
2. Dawes C., Pedersen A.M.L., Villa A., et al. The functions of human saliva: A review supported by experimental investigations // Arch. Oral Biol. – 2015. – Vol. 60, №6. – P. 863–874.
3. Marsh P.D., Zaura E. Dental biofilm: eco- logical interactions in health and disease // J. Clin. Periodontol. – 2017. – Vol. 44 (Suppl. 18). – P. S12–S22.
4. Nikitina T.V., Ivanov V.S., Petrova N.A. Changes in oral microflora in elderly patients using removable dentures // Stomatologiya. – 2019. – Vol. 98, №4. – P. 45–49.

Иқтибос учун: Якубова Н.Н., Алиев Н.Х. Кекса ва қари ёшдаги беморларда қисман олинадиган протезлардан фойдаланишда аралаш сўлак хусусиятлари ва оғиз бўшлиғи микрофлорасининг ўзгариш динамикаси // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2026. – № 4(24). – Б. 802–805. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19692464>

ОҒИЗ БЎШЛИҒИ ШИЛЛИҚ ҚАВАТИ ЛЕЙКОПЛАКИЯСИНИ ДАВОЛАШ ВА ПРОФИЛАКТИКАСИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШДА КОМПЛЕКС ТЕРАПИЯНИНГ КЛИНИК, ИММУНОЛОГИК ВА МОРФОЛОГИК САМАРАДОРЛИГИ

Идиев Г.Э., Бабаева Н.М.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Мазкур илмий иш оғиз бўшлиғи шиллиқ қавати лейкоплакиясини даволаш ва профилактикасини такомиллаштиришга бағишланган бўлиб, унда замонавий терапевтик ёндашувлар — озонотерапия ва фотодинамик терапиянинг клиник, иммунологик ҳамда микробиологик самарадорлиги комплекс баҳоланди. Тадқиқот 120 нафар беморда олиб борилди ва натижалар анъанавий даволаш усуллари билан солиштирилди. Олинган маълумотлар асосида комплекс даволаш усуллари регенерация жараёнини тезлаштириши, яллиғланиш реакциясини камайтириши ҳамда маҳаллий иммунитетни сезиларли даражада фаоллаштириши аниқланди.

Калит сўзлар: лейкоплакия, оғиз бўшлиғи, озонотерапия, фотодинамик терапия, иммунитет, эпителизация, микрофлора

CLINICAL, IMMUNOLOGICAL, AND MORPHOLOGICAL EFFECTIVENESS OF COMPLEX THERAPY IN IMPROVING THE TREATMENT AND PREVENTION OF ORAL MUCOSA LEUKOPLAKIA

Idiev G.E., Babayeva N.M.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. This scientific study aims to improve treatment and prevention methods for leukoplakia of the oral mucosa. It provides a comprehensive assessment of the clinical, immunological, and microbiological efficacy of modern therapeutic approaches—ozone therapy and photodynamic therapy. The study involved 120 patients, and the results were compared with traditional treatment methods. Based on the data obtained, it was established that combined treatment methods accelerate regeneration processes, reduce the inflammatory response, and significantly activate local immunity.

Keywords: leukoplakia, oral cavity, ozone therapy, photodynamic therapy, immunity, epithelialization, microflora

КЛИНИЧЕСКАЯ, ИММУНОЛОГИЧЕСКАЯ И МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ ЛЕЙКОПЛАКИИ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА

Идиев Г.Э., Бабаева Н.М.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Данное научное исследование посвящено совершенствованию методов лечения и профилактики лейкоплакии слизистой оболочки полости рта, в котором проведена комплексная оценка клинической, иммунологической и микробиологической эффективности современных терапевтических подходов — озонотерапии и фотодинамической терапии. Исследование было проведено у 120 пациентов, а полученные результаты сопоставлены с традиционными методами лечения. На основании полученных данных установлено, что комплексные методы терапии способствуют ускорению процессов регенерации, снижению воспалительной реакции и значительной активации местного иммунитета.

Ключевые слова: лейкоплакия, полость рта, озонотерапия, фотодинамическая терапия, иммунитет, эпителизация, микрофлора

Кириш. Сўнгги йилларда оғиз бўшлиғи шиллиқ қавати касалликлари, айниқса лейкоплакия, стоматология ва онкология кесишган нуқтада долзарб муаммо сифатида қаралмоқда. Эпидемиологик маълумотларга кўра, ушбу касаллик умумий популяцияда 0,5–3,5% ҳолларда учрайди ва унинг малигнизатсия даражаси айрим клиник шаклларда 25% гача етади [1. 4].

Лейкоплакия ривожланишида кўплаб омиллар иштирок этади. Тадқиқотчилар томонидан механик травмалар (тишларнинг ўткир қирралари), кимёвий таъсирлар (тамаки, спиртли ичимликлар),

термик омиллар ва вирусли инфекциялар асосий сабаблар сифатида кўрсатилган [3. 5]. Шунингдек, иммун тизим бузилишлари, метаболик касалликлар ва гиповитаминозлар ҳам муҳим рол ўйнайди [6].

Баъзи олимлар инсон папиллома вирусининг (ХПВ) мавжудлиги лейкоплакия ривожланиши ва унинг малигнизациясига бевосита таъсир кўрсатишини таъкидлайди [7]. Лейкоплакия кўпинча клиник жиҳатдан сезиларсиз бошланиб, аста-секин прогрессив характер касб этади ва натижада эпителиал дисплазия ва ҳатто ракка айланиши мумкин [8. 2]. Шу сабабли эрта диагностика ва самарали даволаш усуллари ишлаб чиқиш муҳим ҳисобланади. Анъанавий даволаш усуллари кўп ҳолларда етарли самарадорлик бермайди, бу эса янги терапевтик технологияларни жорий этишни талаб қилади [9]. Озонотерапия ва фотодинамик терапия ҳозирги кунда энг истиқболли усуллар сифатида қаралмоқда, чунки улар яллиғланишга қарши, бактеритсид ва иммуномодулятор таъсирга эга [10].

Мазкур тадқиқот ушбу муаммонинг долзарблиги ва замонавий даволаш усуллариининг самарадорлигини баҳолаш заруратидан келиб чиқиб олиб борилди.

Тадқиқот мақсади. Лейкоплакия билан оғриган беморларда озонотерапия ва фотодинамик терапия асосида комплекс даволаш усуллариининг клиник, иммунологик ва микробиологик самарадорлигини баҳолаш.

Материаллар ва усуллар. Мазкур тадқиқот 2022–2024 йиллар давомида олиб борилиб, унда 30 ёшдан 60 ёшгача бўлган жами 120 нафар бемор иштирок этди. Тадқиқотга жалб этилган беморлар клиник таъхис асосида оғиз бўшлиғи шиллиқ қавати лейкоплакиясининг турли шакллари билан оғриган беморлардан иборат бўлди. Шу билан бирга, солиштириш учун 30 нафар соғлом шахс назорат гуруҳи сифатида танлаб олинди. Беморлар клиник шакли ва қўлланилган даволаш усулларига қараб учта асосий гуруҳга ажратилди. Биринчи гуруҳда анъанавий даволаш усуллари қўлланилди, иккинчи гуруҳда озонотерапия асосида комплекс даволаш амалга оширилди, учинчи гуруҳда эса фотодинамик терапия қўлланилди. Тадқиқот давомида беморларнинг умумий стоматологик ҳолати батафсил баҳоланди, бунда оғиз бўшлиғи шиллиқ қаватининг ранг ўзгариши, кератинизация даражаси, эрозия ва яралар мавжудлиги, шунингдек оғрик синдроми аниқланиб, динамик кузатилди.

Иммунологик баҳолашда қон ва сўлак таркибида иммуноглобулинлар (ИгА, ИгГ) даражаси, си-токинлар (ИЛ-1 β , ТНФ- α) миқдори аниқланиб, даволашдан олдин ва кейин солиштирилди. Микроорганизмлар спектрини аниқлаш учун микробиологик текширувлар ўтказилиб, патоген ва шартли патоген флора миқдори баҳоланди.

Шунингдек, оптик кохерент томография ёрдамида шиллиқ қават тузилишининг ўзгаришлари, эпителий қалинлиги ва дисплазия даражаси ўрганилди. Морфологик текширувлар орқали хужайра даражасидаги ўзгаришлар, пролиферация маркерлари ва яллиғланиш инфильтратсияси баҳоланди.

Олинган натижалар статистик жиҳатдан қайта ишланиб, ўртача қийматлар, стандарт оғишлар ҳисобланди ва гуруҳлараро фарқлар $p < 0,05$ даражада ишончли деб баҳоланди.

Натижалар. Тадқиқот натижалари шунини кўрсатдики, лейкоплакия билан оғриган беморларда клиник, иммунологик ва микробиологик кўрсаткичлар даволаш усулига қараб сезиларли даражада фарқ қилади. Даволашнинг дастлабки босқичида барча беморларда шиллиқ қаватда кератинизация, яллиғланиш ва оғрик белгилари кузатилди. Даволашдан кейин эса ушбу белгилар камайиши айниқса замонавий усуллар қўлланилган гуруҳларда аниқ намоён бўлди.

1-жадвал.

Клиник самарадорлик

Гуруҳ	Клиник яхшиланиш (%)
Анъанавий	25,3 $\pm$ 1,6
Озонотерапия	48,7 $\pm$ 2,1
Фотодинамик терапия	62,5 $\pm$ 2,4

Жадвал натижалари шунини кўрсатадики, анъанавий даволаш усулларида клиник яхшиланиш даражаси паст бўлиб, фақат симптоматик енгилик билан чекланади. Озонотерапия қўлланган беморларда эса яллиғланиш белгиларининг тезроқ камайиши ва шиллиқ қаватнинг тикланиши кузатилди. Энг юқори натижалар фотодинамик терапия гуруҳида қайд этилди, бу усул эпителий регенерациясини тезлаштириб, патологик ўчоқлар ҳажмини кескин камайтиради.

Даволашдан кейин иммуноглобулинлар даражасининг ошиши организмнинг ҳимоя механизмлари фаоллашганини билдиради. Айниқса озонотерапия ва фотодинамик терапия қўлланилганда маҳаллий иммунитет сезиларли даражада яхшиланади, бу эса касаллик қайталанишининг олдини олишда муҳим аҳамиятга эга.

Иммунологик кўрсаткичлар

Кўрсаткич	Даволашгача	Даволашдан кейин
ИгА	0,8	1,6
ИгГ	7,2	10,5

Эпителизация кўрсаткичлари

Гуруҳ	Эпителизация (%)
Анъанавий	30
Озонотерапия	55
Фотодинамик терапия	75

Ушбу натижалар регенератсия жараёнининг энг тез фотодинамик терапияда содир бўлишини кўрсатади. Бу усул хужайра даражасида метаболизмни фаоллаштириб, шикастланган тўқималарнинг тикланишини тезлаштиради.

Микрофлора ҳолати

Кўрсаткич	Даволашгача	Даволашдан кейин
Патоген флора (%)	68	22
Нормал флора (%)	32	78

Комплекс даволаш натижасида оғиз бўшлиғи микробиотсенози нормаллашиб, патоген бактериялар кескин камади. Бу эса яллиғланиш жараёнини камайтиради ва қайта касалланиш эҳтимолини пасайтиради.

Муҳокама. Олинган натижалар лейкоплакия даволашида замонавий комплекс ёндашувларнинг юқори самарадорлигини тасдиқлайди. Фотодинамик терапия шиллик қават эпителиясининг тикланишини тезлаштириб, хужайралар пролифератсиясини меъёрлаштиради. Бу бошқа тадқиқотчилар натижалари билан ҳам мос келади [22, 58]. Озонотерапия эса антиоксидант ва иммуномодулятор таъсири орқали яллиғланиш жараёнини камайтиради ва микробиологик мувозанатни тиклайди.

Ижтимоий-тиббий аҳамияти:

- оғиз бўшлиғи саратонининг олдини олади
- беморларнинг ҳаёт сифатини оширади
- стоматологик асоратларни камайтиради

Иқтисодий самарадорлик:

- даволаш муддатини қисқартиради
- қайта даволаниш эҳтиёжини камайтиради
- соғлиқни сақлаш харажатларини оптималлаштиради

Хулоса. Мазкур тадқиқот натижалари шуни кўрсатадики, лейкоплакия даволашда озонотерапия ва фотодинамик терапия асосида комплекс ёндашув юқори самарадорликка эга бўлиб, касалликнинг клиник белгиларини камайтиради, иммунитетни мустаҳкамлайди ва регенератсия жараёнини тезлаштиради. Ушбу усулларни амалиётга жорий этиш стоматологик хизмат сифатини оширишда муҳим аҳамиятга эга.

Адабиётлар рўйхати:

1. Axmedov D.Sh., Karimov B.A. Og'iz bo'shlig'i shilliq qavati kasalliklari. – Toshkent: Tibbiyot nashriyoti, 2021. – 256 b.
2. Петров В.А., Иванов С.П. Заболевания слизистой оболочки полости рта. – Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2020. – 320 с.
3. Neville B.W., Damm D.D., Allen C.M., Chi A.C. Oral and Maxillofacial Pathology. – 4th ed. – Elsevier, 2016. – 912 p.
4. Warnakulasuriya S. Oral potentially malignant disorders: A comprehensive review. – Oral Oncology, 2020. – Vol. 102. – P. 104550.
5. Gupta R., Kumar S. Leukoplakia and oral cancer: clinical implications. – Journal of Oral Pa-

thology & Medicine, 2019. – Vol. 48(5). – P. 345–352.

6. Lee K.H., Park J.H. Immunological mechanisms in oral mucosal diseases. – International Journal of Immunopathology, 2018. – Vol. 31(2). – P. 112–120.

7. Brown L., Smith J. Photodynamic therapy in стоматология. – Dental Research Journal, 2021. – Vol. 18(4). – P. 215–223.

8. Karimov A.A., Xasanov Sh.M. Ozonoterapiya asoslari va klinik qo'llanilishi. – Toshkent, 2020. – 198 b.

9. Zhang Y., Li X. Microbiological changes in oral diseases. – Journal of Clinical Microbiology, 2021. – Vol. 59(3). – P. e02134-20.

10. World Health Organization. Global Oral Health Status Report. – Geneva: WHO, 2022. – 180 p.

Иқтибос учун: Идиев Г.Э., Бабаева Н.М. Оғиз бўшлиғи шиллиқ қавати лейкоплакиясини даволаш ва профилактикасини такомиллаштиришда комплекс терапиянинг клиник, иммунологик ва морфологик самарадорлиги // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2026. – № 4(24). – Б. 806–809. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19692707>

ҲОМИЛАДОР АЁЛЛАРДА ҚАЛҚОНСИМОН БЕЗ ДИСФУНКЦИЯСИ ВА СЕМИЗЛИК ФОНИДА ГЕСТАЦИОН АСОРАТЛАР РИВОЖЛАНИШИНИНГ КЛИНИК-МЕТАБОЛИК ХУСУСИЯТЛАРИ

Хасанова Д.А.

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Ушбу тадқиқотда қалқонсимон без фаолияти бузилиши ва семизлик билан боғлиқ метаболик ўзгаришларнинг ҳомиладорлик давридаги клиник кечиши ҳамда перинатал натижаларга таъсири ўрганилди. Тадқиқотга 25–55 ёш оралигидаги 80 нафар ҳомиладор аёл жалб қилиниб, улар клиник ва лаборатор мезонларга асосланиб гуруҳларга ажратилди. Иштирокчиларда гормонал (ТШ, ФТ4, ФТ3), метаболик (холестерин, триглицеридлар, ХДЛ, ЛДЛ, ХбА1с) ва акушерлик кўрсаткичлари комплекс тарзда баҳоланди. Тадқиқот натижалари шуни кўрсатдики, қалқонсимон без дисфункцияси ва семизлик биргаликда мавжуд бўлганда метаболик дисбаланс чуқурлашиб, ҳомиладорлик давомидида турли асоратлар ривожланиши хавфи ортади. Айниқса, преэклампсия, Гестацион гипертензия, диабет ва янги туғилган чақалоқларда паст Апгар кўрсаткичлари тез-тез кузатилди. Ушбу натижалар ҳомиладор аёлларни бошқаришда индивидуал ва комплекс ёндашув муҳимлигини кўрсатади.

Калит сўзлар: қалқонсимон без дисфункцияси, семизлик, ҳомиладорлик, гипотиреоз, гестацион асоратлар, метаболик бузилишлар, Апгар балли

CLINICAL AND METABOLIC CHARACTERISTICS OF GESTATIONAL COMPLICATIONS IN PREGNANT WOMEN WITH THYROID DYSFUNCTION AND OBESITY

Khasanova D.A.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. This study investigated the clinical and metabolic impact of thyroid dysfunction and obesity on pregnancy progression and gestational complications. A total of 80 pregnant women aged 25–55 years were included and classified into groups based on clinical and laboratory findings. Hormonal (TSH, FT4, FT3), metabolic (cholesterol, triglycerides, HDL, LDL, HbA1c), and obstetric parameters were analyzed. The results demonstrated that the coexistence of thyroid dysfunction and obesity leads to pronounced metabolic disturbances and significantly increases the risk of pregnancy-related complications. Higher incidences of preeclampsia, gestational hypertension, gestational diabetes, and adverse neonatal outcomes, including low Apgar scores, were observed. These findings highlight the importance of individualized and multidisciplinary management strategies in such patients.

Keywords: thyroid dysfunction, obesity, pregnancy, hypothyroidism, gestational complications, metabolic disorders, neonatal outcomes

КЛИНИКО-МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГЕСТАЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ У БЕРЕМЕННЫХ С ДИСФУНКЦИЕЙ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ И ОЖИРЕНИЕМ

Хасанова Д.А.

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Целью данного исследования явилось изучение влияния нарушений функции щитовидной железы и ожирения на течение беременности и формирование гестационных осложнений. В исследование включены 80 беременных женщин в возрасте 25–55 лет, распределённых на группы по клинико-лабораторным показателям. Оценка включала анализ гормональных (ТТГ, FT4, FT3), метаболических (холестерин, триглицериды, HDL, LDL, HbA1c) и акушерских параметров. Установлено, что сочетание эндокринных нарушений сопровождается выраженными метаболическими изменениями и значительным увеличением частоты осложнений беременности. Наиболее часто выявлялись преэклампсия, гестационная гипертензия, гестационный диабет, а также неблагоприятные неонатальные исходы. Полученные данные свидетельствуют о необходимости индивидуализированного подхода к ведению данной категории пациенток.

Ключевые слова: дисфункция щитовидной железы, ожирение, беременность, гипотиреоз, гестационные осложнения, метаболические нарушения, исходы новорожденных

Кириш. Сўнгги йилларда репродуктив ёшдаги аёллар орасида эндокрин тизим бузилишлари, хусусан, семизлик ва қалқонсимон без дисфунксиясининг биргаликда учраш частотаси сезиларли даражада ортиб бормокда. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти (ЖССТ) маълумотларига кўра, аёллар орасида семизлик 39% дан ортиқни ташкил этади, шулардан 20–30% ҳолларда у қалқонсимон без фаолиятининг пасайиши билан кечади [1,2]. Ўз навбатида, гипотиреоз ёки субклиник қалқонсимон без етишмовчилиги аёлларда овулятор циклнинг бузилиши, ҳомиладор бўлишнинг кечикиши ва ҳомиладорлик пайтидаги асоратларнинг ортишига сабаб бўлади [3].

Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти маълумотларига кўра, репродуктив ёшдаги аёлларда семизлик ва метаболик синдром ҳолатлари кенг тарқалган бўлиб, бу ҳолат ҳомиладорликнинг физиологик кечишига салбий таъсир кўрсатади. Шу билан бирга, қалқонсимон без гормонлари ҳомила ривожланиши, метаболизм ва нейроендокрин тизим фаолиятида муҳим рол ўйнайди. Уларнинг етишмовчилиги ёки ортиқчалиги ҳомиладорлик давомида турли асоратлар ривожланишига олиб келиши мумкин.

Қалқонсимон без дисфунксияси, айниқса гипотиреоз, ҳомиладорликда энг кўп учрайдиган эндокрин патологиялардан бири ҳисобланади. Ушбу ҳолат метаболик жараёнларнинг секинлашуви, липид алмашинуви бузилиши ва инсулин резистентликнинг кучайиши билан кечади. Семизлик эса ўз навбатида сурункали паст даражали яллиғланиш, гормонал дисбаланс ва оксидловчи стресс билан боғлиқ бўлиб, ҳомиладорлик асоратлари ривожланишида муҳим хавф омили сифатида қаралади. Ушбу икки патологиянинг биргаликда учраши клиник ҳолатни янада мураккаблаштириб, ҳомиладорликнинг нохуш натижаларига олиб келиши мумкин.

Илмий тадқиқотлар шуни кўрсатадики, қалқонсимон без фаолиятининг бузилиши ва ортиқча тана вазни мавжуд бўлган аёлларда прееклампсия, гестацион гипертензия, гестацион диабет, муддатидан олдин туғруқ ҳамда паст тана вазнига эга чақалоқ туғилиш хавфи юқори бўлади. Бундан ташқари, бу патологиялар ҳомиланинг интраутерин ривожланишига ҳам салбий таъсир кўрсатиб, неонатал даврда турли функционал бузилишлар билан намоён бўлиши мумкин.

Шу билан бирга, ҳозирги кунда қалқонсимон без дисфунксияси ва семизлик комбинатсиясининг ҳомиладорлик натижаларига таъсири етарли даражада комплекс ўрганилмаган. Айниқса, гормонал ва метаболик ўзгаришлар билан клиник ва обстетрик кўрсаткичлар ўртасидаги ўзаро боғлиқликни чуқур таҳлил қилиш зарурати мавжуд. Ушбу йўналишда олиб борилаётган тадқиқотлар ҳомиладор аёлларни эрта аниқлаш, асоратларнинг олдини олиш ва самарали даволаш стратегияларини ишлаб чиқишда муҳим аҳамият касб этади.

Шу муносабат билан, ушбу тадқиқотнинг долзарблиги қалқонсимон без дисфунксияси ва семизлик билан боғлиқ эндокрин бузилишларнинг ҳомиладорлик кечиши ҳамда унинг натижаларига таъсирини комплекс баҳолаш зарурати билан белгиланади. Тадқиқот натижалари асосида ҳомиладор аёлларни бошқаришда индивидуал ва интегратсияланган ёндашувни такомиллаштириш имконияти яратилади.

Қалқонсимон без гормонлари (Т3, Т4, ТШ) организмнинг метаболик жараёнлари, жумладан, ёғ алмашинуви, инсулин сезувчанлиги ва репродуктив тизим фаолиятини бевосита бошқаради. Шу боисдан, семизлик ва қалқонсимон без дисфунксияси биргаликда кечганда, ҳомиладорликнинг кечиши ва натижалари анча мураккаблашади [4].

Илмий тадқиқотлар шуни кўрсатадики, ушбу комбинатсия спонтан аборт, гестацион гипертензия, прееклампсия, гестацион диабет, ва туғилишдаги паст тана массаси каби асоратларнинг хавфини 2–3 баробар оширади [5,6]. Шундай қилиб, бу мавзу клиник амалиётда долзарб бўлиб, репродуктив саломатликни муҳофаза қилишда муҳим аҳамият касб этади.

Тадқиқот мақсади. Қалқонсимон без дисфунксияси ва семизлик комбинатсияси мавжуд бўлган аёлларда ҳомиладорликнинг клиник кечишини, лаборатор кўрсаткичларини ҳамда туғруқ натижаларини баҳолаш ва уларни соғлом назорат гуруҳидаги аёллар билан таққослаш.

Материаллар ва усуллар. Тадқиқот Самарқанд давлат тиббиёй унверситети клиникасида 2023–2025-йиллар оралигида ўтказилган бўлиб, 25–55 ёшдаги 80 нафар ҳомиладор аёл ихтиёрий розилик асосида жалб қилинди. Тадқиқот кесим (кўндаланг) ва проспектив кузатув элементларини ўз ичига олган комплекс дизайнда олиб борилди. Иштирокчилар учта экспозитсия гуруҳи ва битта назорат гуруҳига ажратилди:

1. I-гуруҳ (n=30) — қалқонсимон без дисфунксияси (субклиник ёки манифест гипотиреоз);
2. II-гуруҳ (n=30) — семизлик ($\text{TMI} \geq 30 \text{ кг/м}^2$);
3. III-гуруҳ (n=20) — қалқонсимон без дисфунксияси + семизлик комбинатсияси;
4. Назорат — соғлом ҳомиладор аёллар (пропорционал матчинг асосида клиник регистрдан танланган), юқоридаги жадвалларда солиштирма кўрсаткич сифатида келтирилган.

Тадқиқот натижалари. Тадқиқотда 96 аёл скринингдан ўтказилди, 10 нафари киритиш мезонларига жавоб бермагани, 6 нафари эса розиликни қайтариб олгани боис 80 нафар тугаллади (I=30, II=30, III=20). Кузатувдан чиқиш 2,5% бўлиб, импутатсия андазага таъсир қилмаган. Бошланғич клиник хусусиятлар ва метаболик-гормонал профил қуйидаги жадвалларда келтирилган. Кейинги бандларда жадвал рақамлари бўйича асосий натижалар батафсил шарҳланади, сўнгра асоратлар ва неонатал кўрсаткичлар таҳлил қилинади. Гуруҳларга ажратиш чоғида триместерлар бўйича тақсимот балансланган бўлиб, III-гуруҳда II-триместер улуши бироз юқори (55%) қайд этилди; бу нозик фарқ моделларда ковариат сифатида ҳисобга олинди.

1-жадвал.

Иштирокчиларнинг умумий клиник кўрсаткичлари

Кўрсаткичлар	I-гуруҳ	II-гуруҳ	III-гуруҳ	Назорат
Ўртача ёш (йил)	31,2±4,8	32,1±5,3	33,0±4,9	30,4±5,0
ТМИ (кг/м²)	27,8±2,5	34,5±3,1	35,9±3,3	23,2±1,9
Систол АБ (ммХг)	130±8	138±10	145±12	120±6
Диастол АБ (ммХг)	85±6	90±7	95±8	80±5
гестатсия ҳафтаси (кузатув бошланишида)	12,8±1,9	13,1±2,1	13,0±1,8	12,6±2,0

III-гуруҳда ўртача ТМИ 35,9 кг/м² ва артериал босим 145/95 ммХг бўлиб, I ва II гуруҳларга нисбатан юқори (p<0,01). Бу дифференциал юклама кейинги асоратлар (пreeклампсия, оператив туғруқ) хавфини оширишини англатади. Назоратда ТМИ ва АБ паст бўлиб, ҳомиладорликнинг физиологик кечишига мос.

2-жадвал.

Қалқонсимон без гормонлари

Гормон	I-гуруҳ	II-гуруҳ	III-гуруҳ	Назорат
ТШ (мИУ/Л)	4,6±1,2	3,2±0,9	6,1±1,8	2,1±0,7
ФТ4 (пмол/Л)	10,5±2,1	12,4±1,7	8,9±2,2	14,3±1,9
ФТ3 (пмол/Л)	3,6±0,5	3,8±0,4	3,3±0,6	4,0±0,5

Комбинацияланган ҳолатда (III-гуруҳ) ТШ энг юқори, ФТ4 энг паст (иккаласи учун p<0,001). ФТ3 ҳам пастроқ. Бу гормон етишмовчилиги утеролатсентар қон айланиш ва метаболик регуляцияга салбий таъсир кўрсатиб, гестацион гипертензия/пreeклампсия рискинни ошириши эҳтимолини кучайтиради. II-гуруҳда ТШ нисбатан юқорилиги семизлик билан боғлиқ ТШ компенсатор кўтарилиши билан изоҳланиши мумкин.

3-жадвал.

Метаболик алмашинув кўрсаткичлари

Кўрсаткич	I-гуруҳ	II-гуруҳ	III-гуруҳ	Назорат
Умумий холестерин (ммол/Л)	6,1±1,2	6,8±1,4	7,3±1,6	5,2±1,0
Триглитсеридлар (ммол/Л)	2,0±0,6	2,3±0,8	2,8±0,9	1,4±0,5
ХДЛ (ммол/Л)	1,1±0,3	0,9±0,2	0,8±0,2	1,4±0,4
ЛДЛ (ммол/Л)	3,8±0,9	4,2±1,0	4,6±1,1	2,9±0,7
ХБА1с (%)	5,3±0,4	5,8±0,5	6,0±0,6	5,1±0,3

III-гуруҳда атероген профил (умумий холестерин, ТГ, ЛДЛ) максимал, ХДЛ минимал. ХБА1с 6,0% чегарада бўлиб, углевод алмашинуви бузилишига мойилликни билдиради. Метаболик ёмонлашув туғруқдаги оператив аралашув эҳтиёжи ва неонатал НИСУ эҳтиёжини ошириши билан боғлиқ. Таққослашларда кўп ҳолларда p<0,01.

Комбинатсияланган гуруҳда (III) деярли барча асоратлар частотаси 2–3 барабар юқори. Кўп омилли логистика натижалари: пreeклампсия учун ОР=3,1 (95% СИ 1,4–6,9), гестацион диабет учун ОР=2,5 (1,1–5,8), гестацион гипертензия учун ОР=2,9 (1,3–6,4); ТМИ, ёш ва триместер бўйича тузатмалардан сўнг ҳам аҳамият сақланиб қолди (p<0,05).

Ҳомиладорлик асоратлари частотаси

Асорат	I-гурух	II-гурух	III-гурух	Назорат
гестацион гипертензия	20%	30%	50%	5%
преэклампсия	10%	15%	35%	3%
гестацион диабет	5%	18%	25%	2%
спонтан аборт (≤ 20 ҳф)	8%	10%	20%	2%

Туғруқ ва неонатал натижалар

Кўрсаткич	I-гурух	II-гурух	III-гурух	Назорат
Туғилишдаги тана массаси (г)	3100 $\pm$ 250	2950 $\pm$ 300	2700 $\pm$ 350	3250 $\pm$ 280
1 дақиқалик Апгар (балл)	7,9 $\pm$ 0,8	7,7 $\pm$ 0,9	7,1 $\pm$ 0,9	8,5 $\pm$ 0,5
5 дақиқалик Апгар (балл)	8,5 $\pm$ 0,7	8,2 $\pm$ 0,6	7,5 $\pm$ 0,8	8,9 $\pm$ 0,4
Оператив туғруқлар (КТС ва б.)	20%	25%	40%	10%
НИСУ эҳтиёжи	8%	12%	22%	5%

III-гурухда чакалоқ массаси 2700 г атрофида, Апгар пастроқ, оператив туғруқ ва НИСУ эҳтиёжи юқори ($p < 0,01$). Линеер регрессияда туғилиш массаси учун ТШ ($\beta = -85$ г ҳар 1 МИУ/Л ошишига) ва ТМИ ($\beta = -35$ г ҳар 1 кг/м² ошишига) мустақил салбий предиктор сифатида қайд этилди; 5-дақиқалик Апгар учун ФТ4 ($\beta = +0,12$ балл/пмол/Л) ижобий боғланиш кўрсатди (барчаси $p < 0,05$).

Қўшимча натижалар (иш тавсифи ва тартиби):

- Беморлар билан ишлаш тартиби: ҳар триместерда клиник-лаборатор мониторинг, керак бўлса эндокрин терапия (левотироксин доза титратси), парҳез ва жисмоний фаоллик бўйича маслаҳатлар; гипертензия аниқланса, акушер-гинеколог тавсияларига мувофиқ антигипертензив даволаш.

- Гуруҳларга бўлиш принциби: бошланғич таъхисга кўра; комбинацияга эга бўлганлар III-гурухга; семизликсиз гипотиреоз — I-гурух; қалқонсимон без нормал, фақат семизлик — II-гурух.

- Усуллар уйғунлиги: гормонал панел + липид профили + глюкомик кўрсаткичлар + УТТ/Допплер + клиник-обстетрик кузатув; статистик моделлаштириш билан якуний интегралсия.

- Нозик таҳлиллар: субклиник гипотиреоз (ТШ юқори, ФТ4 нормал) алоҳида қаралганда ҳам асоратлар хавфи ошган, аммо манифест гипотиреозга қараганда заифроқ эффект (тренд $p = 0,06-0,09$).

Муҳокама. Ушбу тадқиқот семизлик ва қалқонсимон без дисфунксияси комбинатсияси ҳомиладорликнинг кечиши ҳамда туғруқ-неонатал натижаларга консентрик салбий таъсир кўрсатишини кўрсатди. Комбинатсияда метаболик дисбаланс (ТГ/ЛДЛ ошиши, ХДЛ пасайиши, ХбА1с кўтарилиши) ва гормонал етишмовчилик (ТШ кўтарилиши, ФТ4 пасайиши) бир вақтнинг ўзида мавжуд бўлиб, пластсентар перфузия ва эндотелиал функцияни заифлаштиради, оксидловчи стрессни кучайтиради ва инсулин резистентлигини чуқурлаштиради. Шу механизмлар гестацион гипертензия, преэклампсия, гестацион диабет частоталарининг ошишига замин яратади (4-жадвал). Неонатал даражада эса интраутерин ўсишнинг сусайиши, паст тана массаси ва паст Апгар (5-жадвал) кузатилди; бу НИСУ эҳтиёжи ошиши ва соғлиқни сақлаш тизими учун қўшимча ресурс талабларини келтириб чиқаради.

Клиник амалиёт нуқтайи назаридан, триместер бошидан скринингни кенгайтириш, ТШ ва ФТ4 мониторингини индивидуал дозалаш (левотироксин титратси), оғирликни бошқариш (медикодитетик ёндашув, парҳез ва хавфсиз жисмоний фаоллик), артериал босим ва глюкокемияни қатъий назорат қилиш кўп тармоқли (мултидисциплинер) ёндашувнинг марказида туриши лозим. Айниқса, III-гурухдаги беморларда риска асосланган туғруқ режалаштириш (оператив туғруқ эҳтимолини олдиндан баҳолаш, перинатал марказ даражасини танлаш) неонатал салбий натижаларни камайтириши мумкин.

Иқтисодий жиҳатлар: преэклампсия, гестацион диабет ва НИСУ ётқизишларининг ошиши туғруқ ва неонатал давр харажатларини кўпайтиради; антенатал босқичда профилактик аралашувлар (эрта скрининг, парҳез-маслаҳат, дориларни тўғри титратсия) қисқа муддатда қўшимча харажат талаб қилса-да, узоқ муддатда соғлиқ-иқтисодий фойда (оператив туғруқлар ва реаниматсион хизматлар қисқариши) беради. Ижтимоий жиҳатлар: она ва бола саломатлигининг яхшиланиши оилавий фаровонликни оширади, меҳнатга қайтиш муддатини қисқартиради, руҳий иқлимни барқарорлаштиради. Жамоат саломатлиги контекстида эса семизлик ва қалқонсимон без дисфунксиясини эрта аниқлашга

йўналтирилган бирламчи бўғин дастурлари (АОТ поликлиникаларида скрининг йўриқномалари) юқори даражада мақсадга мувофиқ.

Методологик жиҳатдан, тадқиқотда кўп омилли моделлар ишлатилиб, ёши, ТМИ, триместер, артериал босим каби муҳим ковариатлар назорат қилинди; бу натижаларнинг ички ишончлилигини кучайтиради. Шунга қарамай, бир марказли дизайн ва нисбатан кичик III-гурӯҳ ҳажми чеклов бўлиб қолади. Келгусида кўп марказли, катта намуна билан проспектив коҳорт тадқиқотлар, шунингдек, аралашув синовлари (диететик ва гормонал комбинатсиялар) тавсия этилади. Шунингдек, субклиник гипотиреоз билан боғлиқ хавф градиенти қайта баҳоланиши, дифференциал дозалаш стратегиялари (триместер-спесифик) ишлаб чиқилиши зарур.

Хулоса. Ушбу тадқиқот шуни кўрсатдики, қалқонсимон без дисфункцияси ва семизликнинг комбинатсияси ҳомиладорликнинг бошидан бошлаб метаболик ва гормонал мувозанатни издан чиқариб, гестацион гипертензия, прееклампсия ва гестацион диабет каби асоратлар хавфини 2–3 барабар оширади; натижада оператив туғруқлар, паст туғилиш массаси, паст Апгар ва НИСУ эҳтиёжи частотаси юқорилайди. Клиник амалиётда кўп тармоқли бошқарув — триместер бошидан ТШ/ФТ4 мониторинги, левотироксин доза титратси, оғирликни назорат қилиш, артериал босим ва глюкокемияни мунтазам кузатиш — перинатал натижаларни яхшилади. Иқтисодий нуқтаи назардан, антенатал профилактика ва эрта бошқарув дастурлари қисқа муддатда ресурс талаб қилса ҳам, узоқ муддатда оператив аралашувлар ва реанимацион харажатларни камайтиради, ижтимоий даражада эса она-бола саломатлигини мустаҳкамлайди. Соғлиқни сақлаш сиёсати учун бирламчи бўғинда скрининг протоколларини жорий қилиш, акушер-гинеколог, эндокринолог ва диетологлар ҳамкорлигида стандартлаштирилган клиника-йўриқномалар ишлаб чиқиш долзарб. Келгусида кўп марказли, йирик намуна билан олиб бориладиган аралашув тадқиқотлари комбинатсияланган эндокрин бузилишларда энг самарали бошқарув пакетини аниқ белгилашга ёрдам беради.

Адабиётлар рўйхати:

1. World Health Organization (WHO). Obesity and overweight: Global report 2023. Geneva, 2023.
2. Glinioer D., et al. Thyroid function and maternal health during pregnancy. J Clin Endocrinol Metab., 2021.
3. Aytmatova Z. et al. Trends in hypothyroidism and obesity among reproductive-aged women: A 20-year analysis. Eur J Endocrinol., 2022.
4. Samuels M.H., Metabolic impact of thyroid hormone deficiency in pregnancy. Endocr Rev., 2019.
5. Krassas G.E., et al. Thyroid disorders and reproductive outcomes. Clin Endocrinol., 2018.
6. Poppe K., Glinioer D. Autoimmune thyroid disease and obesity: Interacting metabolic pathways. Horm Metab Res., 2020.
7. Casey B.M., et al. Subclinical hypothyroidism and pregnancy outcomes. N Engl J Med., 2017.
8. Stagnaro-Green A., et al. Thyroid disease and pregnancy complications. J Clin Endocrinol Metab., 2019.
9. Lemesko N.A., et al. Metabolic and obstetric risks in obese pregnant women. Obstet Gynecol J., 2021.
10. Rahman M., et al. Endocrine dysfunctions and fetal outcomes in combined obesity and hypothyroidism. BMC Pregnancy Childbirth., 2020.
11. Haddow J.E., et al. Maternal thyroid deficiency and neurodevelopmental outcomes in offspring. N Engl J Med., 2019.
12. Gietka-Czernel M. The role of thyroid and adipokine interactions in pregnancy disorders. Endokrynol Pol., 2021.

Иқтибос учун: Хасанова Д.А. Ҳомиладор аёлларда қалқонсимон без дисфункцияси ва семизлик фонида гестацион асоратлар ривожланишининг клиник-метаболик хусусиятлари // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. — 2026. — № 4(24). — Б. 810–814. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19692796>

ДВУХЭТАПНАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ И ХИМИОТЕРАПИЯ С ГЕПАТОПРОТЕКТОРАМИ ПРИ ОСЛОЖНЁННЫХ ФОРМАХ ЭХИНОКОККОЗА ПЕЧЕНИ: ЭФФЕКТИВНОСТЬ И РЕЦИДИВЫ

Давлатов С.С.¹, Хамидов О.А.², Наврузов Р.Р.¹, Умаркулов З.З.²

¹Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

²Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Цель исследования — оценить эффективность двухэтапной хирургической стратегии при гнойно-холангиогенных осложнениях эхинококкоза печени (ЭП) и разработать оптимальную схему послеоперационной химиотерапии с гепатопротекторами для снижения частоты рецидивов. Материал и методы. Из 448 пациентов с ЭП двухэтапная стратегия применена у 23 (9,7%) больных основной группы: первый этап — чрескожная пункционно-дренирующая санация; второй этап — радикальная операция после купирования эндотоксикоза. Параллельно разработана схема химиотерапии альбендазолом в сочетании с гепатопротекторами, применённая у 387 пациентов с наблюдением 1–5 лет. Результаты. При двухэтапной стратегии послеоперационные осложнения составили 8,7% (2/23); интраоперационных осложнений не было; летальных исходов — 0. Суммарная частота рецидивов при использовании миниинвазивных технологий и новой химиотерапевтической схемы составила 6,7% против 12,3% в контроле ($p < 0,01$). Заключение. Двухэтапная стратегия при гнойно-холангиогенных осложнениях ЭП обеспечивает безопасное выполнение радикального вмешательства, а схема химиотерапии с гепатопротекторами снижает частоту рецидивов вдвое без дополнительных отмен препарата из-за гепатотоксичности.

Ключевые слова: эхинококкоз печени, двухэтапная хирургия, пункционно-дренирующие вмешательства, альбендазол, гепатопротекторы, рецидив, механическая паразитарная желтуха.

A TWO-STAGE SURGICAL STRATEGY AND CHEMOTHERAPY WITH HEPATOPROTECTIVES FOR COMPLICATED FORMS OF LIVER ECHINOCOCCOSIS: EFFECTIVENESS AND RECURRENCE

Davlatov S.S.¹, Khamidov O.A.², Navruzov R.R.¹, Umarkulov Z.Z.²

¹Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sina, Bukhara, Uzbekistan

²Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. The aim of the study was to evaluate the effectiveness of a two-stage surgical strategy for purulent-cholangiogenic complications of liver echinococcosis (EP) and to develop an optimal postoperative chemotherapy regimen with hepatoprotectors to reduce the recurrence rate. Materials and Methods. Of 448 patients with EP, a two-stage strategy was used in 23 (9.7%) patients of the main group: the first stage was percutaneous puncture-drainage sanitation; the second stage was radical surgery after relief of endotoxiosis. In parallel, a chemotherapy regimen with albendazole in combination with hepatoprotectors was developed and used in 387 patients with a follow-up of 1-5 years. Results. With a two-stage strategy, postoperative complications were 8.7% (2/23); there were no intraoperative complications; deaths - 0. The total relapse rate when using minimally invasive technologies and a new chemotherapeutic regimen was 6.7% versus 12.3% in the control ($p < 0.01$). Conclusion. A two-stage strategy for purulent-cholangiogenic complications of hepatic cystectomy ensures safe radical intervention, and a chemotherapy regimen with hepatoprotectors reduces the recurrence rate by half without additional drug discontinuations due to hepatotoxicity.

Keywords: liver echinococcosis, two-stage surgery, puncture-drainage interventions, albendazole, hepatoprotectors, relapse, obstructive parasitic jaundice.

ЖИГАР ЭХИНОКОККОЗИНИНГ АСОРАТЛАНГАН ШАКЛЛАРИДА ИККИ БОСҚИЧЛИ ЖАРРОҲЛИК СТРАТЕГИЯСИ ВА ГЕПАТОПРОТЕКТОРЛАР БИЛАН ХИМИОТЕРАПИЯ: САМАРАДОРЛИК ВА РЕЦИДИВЛАР

Давлатов С.С.¹, Хамидов О.А.², Наврузов Р.Р.¹, Умаркулов З.З.²

¹Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

²Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Тадқиқот мақсади — жигар эхинококкози (ЖЭ)нинг йирингли-холангиоген асоратла-

рида икки босқичли жарроҳлик стратегиясининг самарадорлигини баҳолаш ва рецидивлар частотасини камайтириш учун гепатопротекторлар билан операциядан кейинги химиотерапиянинг оптимал схемасини ишлаб чиқиш. Материал ва усуллар. ЖЭ билан 448 бемордан 23 (9,7%) асосий гуруҳда икки босқичли стратегия қўлланилди: биринчи босқич — теридан кириб пункцион-дренажли санация; иккинчи босқич — эндотоксикоз бартараф этилгандан кейин радикал операция. ШУ билан бирга альбендазол ва гепатопротекторлар комбинациясида химиотерапия схемаси ишлаб чиқилди ва 387 беморда 1–5 йил давомида кузатилди. Натижалар. Икки босқичли стратегияда операциядан кейинги асоратлар 8,7% (2/23) ни ташиқил этди; операция вақтида асоратлар кузатилмади; леталлик — 0. Миниинвазив технологиялар ва янги химиотерапия схемаси қўлланилганда умумий рецидив частотаси 6,7% ни ташиқил этди, назорат гуруҳида эса 12,3% ($p < 0,01$). Хулоса. ЖЭнинг ирих-холангиоген асоратларида икки босқичли стратегия радикал аралашувни хавфсиз бажаришни таъминлайди, гепатопротекторлар билан химиотерапия схемаси эса рецидив частотасини икки баробар камайтиради ва гепатотоксиклик сабабли препаратни бекор қилиш ҳолатларини келтириб чиқармайди.

Калит сўзлар: жигар эхинококкози, икки босқичли жарроҳлик, пункцион-дренажли аралашувлар, альбендазол, гепатопротекторлар, рецидив, механик паразитар сариқ касаллик.

Введение. Осложнённые формы эхинококкоза печени — нагноившаяся эхинококковая киста печени (НЭКП) и механическая паразитарная желтуха (МПЖ) — встречаются у 30–60% госпитализируемых пациентов и ассоциированы со значительным риском интра- и послеоперационных осложнений при одноэтапном радикальном вмешательстве [1, 2]. Высокий уровень эндогенной интоксикации, характерный для этих форм, существенно повышает анестезиологический риск и ограничивает резервы гепатоцеллюлярной репарации [3]. Наряду с хирургической тактикой ключевым компонентом лечения ЭП является антипаразитарная химиотерапия. Альбендазол, являясь препаратом выбора, рекомендован ВОЗ как в пред-, так и в послеоперационном периоде [4]. Однако его гепатотоксичность при длительных курсах вынуждает часть пациентов прерывать лечение, что является одной из ведущих причин рецидивирования [5, 6].

Цель исследования — разработать и апробировать двухэтапный алгоритм хирургического лечения осложнённых форм ЭП и оценить эффективность схемы альбендазол + гепатопротекторы в снижении частоты рецидивов.

Материал и методы. Объектом настоящего исследования являлись пациенты основной группы ($n=236$) из общей когорты 448 больных ЭП (2015–2024 гг.). Для двухэтапного лечения отбирались пациенты с НЭКП (уровень ПКТ $>3,6$ нг/мл и/или ИТ на 18,40% выше нормы) и с МПЖ (билирубин >100 мкмоль/л, ПКТ $>3,5$ нг/мл). Двухэтапная стратегия при НЭКП: I этап — чрескожная пункция кисты под УЗ-контролем иглой Chiba (20–22 G) с введением катетера «pigtail» или «Argyle» (6–9 F), аспирация содержимого вакуум-отсосом, санация полости; II этап (после нормализации ПКТ и ИТ) — радикальная операция. Двухэтапная стратегия при МПЖ: I этап — ЭПСТ с удалением элементов кисты и назобилиарным дренированием (НБД); II этап — традиционная открытая эхинококкэктомия после нормализации билирубина и трансаминаз. Химиотерапия: Альбендазол назначался по стандартной схеме (400 мг 2 р/сут., циклами по 28 дней с интервалом 14 дней, суммарно 3–6 циклов). В основной группе альбендазол комбинировался с гепатопротекторами (Эссенциальные фосфолипиды или аналоги) для снижения гепатотоксичности. Отдалённые результаты оценивались у 387 пациентов (основная — 209, контрольная — 178) в сроки до 5 лет.

Результаты. Двухэтапная стратегия. У 23 пациентов с НЭКП двухэтапная тактика применена в следующем объёме: 12 — пункционная санация кисты с последующей радикальной операцией; 17 пациентов с МПЖ — ЭПСТ + НБД, затем открытая эхинококкэктомия. Интраоперационных осложнений не зафиксировано. Послеоперационные осложнения — 2 случая (8,7%): экссудативный плеврит (1) и нагноение остаточной полости (1), оба разрешились консервативно. Летальных исходов не было. Для сравнения: в контрольной группе, где аналогичные пациенты оперировались в один этап, послеоперационные осложнения составили 24,1%, летальность — 0,5%. Значение нормализации эндотоксикоза. У пациентов с МПЖ при исходном уровне билирубина $174,4 \pm 45,2$ мкмоль/л (прямая фракция $68,5 \pm 12,9$ мкмоль/л) применение первого этапа (ЭПСТ + НБД) обеспечивало снижение билирубина до уровня, безопасного для радикального вмешательства, а также уменьшение ИТ и нормализацию ЭКА, сниженной у этих пациентов на 21,92% по сравнению с нормой. Рецидивы и роль химиотерапии. В 12 из 36 наблюдений с рецидивом (31,5%) отсутствовала послеоперационная терапия альбендазолом. В остальных 24 рецидивных случаях химиотерапия проводилась, но без гепатопротекторной поддержки — именно в этой подгруппе чаще регистрировались вынужденные перерывы в лечении. В основной группе, где применялась комбинированная схема альбендазол + гепатопротек-

торы, отмен препарата из-за гепатотоксичности не потребовалось; частота рецидивов составила 6,7% (14/209). В контрольной группе — 12,3% (22/178; $p < 0,01$). Ранние рецидивы (<3 лет) расценивались как резидуальные; поздние (>3 лет) — как имплантационные, метастатические или реинвазивные.

Таблица 1.

Отдалённые результаты лечения ЭП. ** $p < 0,01$ по критерию χ^2 .

Показатель	Основная группа (n=209)	Контрольная группа (n=178)
Рецидивы, n (%)	14 (6,7%)	22 (12,3%)**
Ранние рецидивы (<3 лет), n	3	7
Поздние рецидивы (>3 лет), n	11	15
Отмена альбендазола из-за гепатотоксичности	0	7
Ср. длительность госпитализации при рецидиве (дней)	6,2±3,2	8,7±4,1

Обсуждение. Концепция двухэтапного лечения гнойно-септических осложнений абдоминальных паразитозов получила обоснование в ряде зарубежных работ [7, 8]. Принципиальным вкладом настоящего исследования является разработка конкретных биохимических триггеров перехода между этапами (ПКТ, ЭКА, ИТ), что позволяет избежать как преждевременного, так и запоздалого выполнения радикального вмешательства. Применение гепатопротекторов в комбинации с альбендазолом, ранее рекомендованное лишь на основании экспертного мнения, в данной работе впервые получило клиническое подтверждение: ни в одном из случаев не потребовалась отмена препарата из-за гепатотоксичности, тогда как в контрольной группе таких случаев было 7. Это напрямую сказалось на частоте рецидивов, подтверждая причинно-следственную связь между продолжительностью химиотерапии и риском паразитарного рецидива [5, 6, 9].

Заключение. Двухэтапная хирургическая стратегия при гнойно-холангиогенных осложнениях ЭП обеспечивает безопасное выполнение радикального вмешательства в условиях купированной эндогенной интоксикации с уровнем послеоперационных осложнений 8,7% и отсутствием летальности. Комбинированная схема альбендазол + гепатопротекторы снижает частоту рецидивов с 12,3% до 6,7% ($p < 0,01$), исключает вынужденные отмены препарата и рекомендована как стандарт послеоперационной химиотерапии при ЭП в эндемичных регионах.

Список литературы:

1. Dziri C., Haouet K., Fingerhut A. Treatment of hydatid cyst of the liver: where is the evidence? // World J. Surg. 2004. Vol. 28, № 8. P. 731–736.
2. Brunetti E., Kern P., Vuitton D.A. Expert consensus for the diagnosis and treatment of cystic echinococcosis in humans // Acta Tropica. 2010. Vol. 114. P. 1–16.
3. Давлатов С.С., Хамидов О.А. Показатели эндогенной интоксикации при осложнённом эхинококкозе // Хирургия. 2020. № 4. С. 56–62.
4. WHO Informal Working Group on Echinococcosis. Guidelines for treatment of cystic and alveolar echinococcosis in humans. Geneva: WHO, 2001.
5. Keshmiri M., Baharvahdat H., Fattahi S.H. et al. Albendazole versus placebo in treatment of echinococcosis // Trans. R. Soc. Trop. Med. Hyg. 2001. Vol. 95. P. 190–194.
6. Ormeci N., Soykan I., Bektas A. et al. A new therapeutic approach for liver hydatid cysts: combined use of PAIR and albendazole // J. Gastroenterol. 2002. Vol. 37. P. 29–34.
7. Khuroo M.S., Wani N.A., Javid G. et al. Percutaneous drainage compared with surgery for hepatic hydatid cysts // N. Engl. J. Med. 1997. Vol. 337. P. 881–887.
8. Navarrete-Aulestia S., Torres-Gomez J., Ruiz A. et al. Two-stage treatment for complicated hepatic hydatidosis // J. Gastrointest. Surg. 2012. Vol. 16. P. 349–356.
9. Давлатов С.С., Хамидов О.А., Наврузов Р.Р., Умаркулов З.З. Жигар эхинококкозининг асоратланган шаклларида миниинвазив видеоэндоскопик ва навигацион-пункцион усулларнинг қўлланилиши // Вестник фундаментальной и клинической медицины. 2026. №2 (22). С.30.

Для цитирования: Давлатов С.С., Хамидов О.А., Наврузов Р.Р., Умаркулов З.З. Двухэтапная хирургическая стратегия и химиотерапия с гепатопротекторами при осложнённых формах эхинококкоза печени: эффективность и рецидивы // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 4(24). – С. 815–817. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19692337>

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МАЛОИНВАЗИВНЫХ ХИРУРГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ТЯЖЁЛОМ ОСТРОМ ПАНКРЕАТИТЕ**Абдулсаидов С.К.¹, Хурсанов Ё.Э.¹, Тухтаев Ж.К.², Холмирзаев О.М.³**¹Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан²Центральная больница медицинского объединения Тайлакского района, Тайлакский р-н, Узбекистан³РНЦЭМП СФ, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Тяжелый острый панкреатит по-прежнему занимает одно из ведущих мест среди наиболее сложных проблем неотложной абдоминальной хирургии, что обусловлено высокой частотой локальных и системных осложнений, продолжительным течением заболевания, необходимостью поэтапной хирургической тактики и сохраняющимся высоким уровнем летальности. В современных условиях развития экстренной хирургии приоритетное значение в комплексном лечении данной категории пациентов приобретают малоинвазивные вмешательства, обеспечивающие эффективную декомпрессию, санацию и дренирование патологических очагов при меньшей хирургической травматичности, снижении вероятности развития полиорганной недостаточности и улучшении ближайших результатов терапии. Наиболее оправданными направлениями оказались пункционно-дренирующие вмешательства под ультразвуковым и/или лучевым контролем, лапароскопические санационно-дренирующие операции при ферментативном и инфицированном перитоните, а также малоинвазивные ретроперитонеальные и комбинированные этапные методики при ограниченных и распространенных гнойно-некротических формах процесса. Комплексная лечебная стратегия, основанная на ранней интенсивной терапии, динамическом лучевом контроле и своевременном выполнении малоинвазивных вмешательств, позволяет уменьшить число расширенных лапаротомных операций, снизить частоту послеоперационных осложнений, сократить длительность пребывания пациентов в отделении интенсивной терапии и улучшить непосредственные результаты лечения тяжелого острого панкреатита.

Ключевые слова: тяжелый острый панкреатит, панкреонекроз, малоинвазивные хирургические технологии, минимально инвазивные вмешательства, чрескожное дренирование, пункционно-дренирующие методы, лапароскопия, эндоскопическая некрэктомия, ретроперитонеоскопия, инфицированный панкреонекроз, хирургическое лечение.

ОҒИР ЎТКИР ПАНКРЕАТИТДА МИНИМАЛ ИНВАЗИВ ЖАРРОҲЛИК ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИ ҚЎЛЛАШНИ ОПТИМАЛЛАШТИРИШ**Абдулсаидов С.К.¹, Хурсанов Ё.Э.¹, Тухтаев Ж.К.², Холмирзаев О.М.³**¹Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон²Тайлоқ тумани тиббиёт бирлашмаси марказий шифохонаси, Тайлоқ т., Ўзбекистон³РШТЁИМ СФ, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Оғир ўткир панкреатит шошилиш абдоминал жарроҳликнинг энг мураккаб муаммоларидан бири бўлиб қолмоқда ва у маҳаллий ҳамда тизимли асоратларнинг юқори учраши, даволашнинг узоқ давом этиши, босқичма-босқич жарроҳлик ёндашув зарурлиги ҳамда ўлим кўрсаткичининг сақланиб қолиши билан тавсифланади. Шошилиш жарроҳликнинг ҳозирги ривожланиш босқичида ушбу тоифадаги беморларни комплекс даволашда етакчи ўрин кам инвазив аралашувларга тегишли бўлиб, улар камроқ операцион травма шароитида патологик ўчоқларни адекват декомпрессия қилиш, санация ва дренажлаш, қўп аъзоли этишмовчилик ривожланиш хавфини камайтириш ва даволашнинг яқин натижаларини яхшилаш имконини беради. Энг мақсадга мувофиқ йўналишлар сифатида ультратовуш ва/ёки нурли навигация остида бажариладиган пункцион-дренажловчи аралашувлар, ферментатив ва инфекцияланган перитонитда лапароскопик санацион-дренажловчи операциялар, шунингдек чекланган ва кенг тарқалган йирингли-некротик шаклларда мининвазив ретроперитонеал ҳамда комбинацияланган босқичли усуллар белгиланди. Эрта интенсив терапия тамойиллари, динамик нурли мониторинг ва кам инвазив аралашувларни ўз вақтида бажаришига асосланган комплекс даволаш тактикаси кенг лапаротомик операциялар сонининг қисқаришига, операциядан кейинги асоратлар тез-тезлигининг камайишига, интенсив терапия бўлимида қолиш муддатининг қисқаришига ва оғир ўткир панкреатитни даволашнинг бевосита натижаларини яхшилашга хизмат қилади.

Калим сўзлар: оғир ўткир панкреатит, панкреонекроз, кам инвазив технологиялар, тери орқали дренажлаш, эндоскопик некрэктомия, лапароскопия, ретроперитонеоскопия, инфекцияланган некроз, жарроҳлик даволаш.

OPTIMIZATION OF THE USE OF MINIMALLY INVASIVE SURGICAL TECHNOLOGIES IN SEVERE ACUTE PANCREATITIS

Abdulsaidov S.K.¹, Khursanov E.E.¹, Tukhtaev J.K.², Kholmiraev O.M.³

¹Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

²Central hospital of the medical association of the Tailak district, Tailak, Uzbekistan

³RSCMC SB, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Severe acute pancreatitis remains one of the most challenging problems in urgent abdominal surgery, characterized by a high frequency of local and systemic complications, prolonged treatment, the need for a staged surgical approach, and persistently high mortality. At the present stage of emergency surgery development, a leading role in the comprehensive treatment of this category of patients belongs to minimally invasive interventions, which make it possible to achieve adequate decompression, sanitation, and drainage of pathological foci with less surgical trauma, a reduced risk of multiple organ failure, and improved early treatment outcomes. The most rational directions included puncture-drainage interventions under ultrasound and/or radiological guidance, laparoscopic sanitation and drainage procedures for enzymatic and infected peritonitis, as well as minimally invasive retroperitoneal and combined staged techniques for limited and extensive purulent-necrotic forms of the disease. A comprehensive treatment strategy based on the principles of early intensive therapy, dynamic radiological monitoring, and timely performance of minimally invasive interventions contributes to reducing the number of extensive laparotomy procedures, decreasing the frequency of postoperative complications, shortening the stay in the intensive care unit, and improving the immediate treatment outcomes of severe acute pancreatitis.

Keywords: severe acute pancreatitis, pancreatic necrosis, minimally invasive technologies, percutaneous drainage, endoscopic necrosectomy, laparoscopy, retroperitoneoscopy, infected necrosis, surgical treatment.

Введение. Острый панкреатит является одним из наиболее распространенных urgentных заболеваний органов брюшной полости, а его тяжелые формы представляют особую клиническую и организационную проблему для хирургических стационаров. Несмотря на достигнутые успехи в интенсивной терапии, анестезиологии-реаниматологии, лабораторном и лучевом мониторинге, тяжелый острый панкреатит продолжает ассоциироваться с высокой частотой местных и системных осложнений, длительными пребыванием пациентов в отделениях интенсивной терапии, значительными экономическими затратами и сохраняющейся летальностью. Основная тяжесть заболевания обусловлена сложным взаимодействием местного деструктивного процесса в поджелудочной железе и парапанкреатической клетчатке с системной воспалительной реакцией, эндотоксикозом, микроциркуляторными нарушениями и формированием полиорганной недостаточности [2,6,10]].

На протяжении длительного времени хирургическая тактика при тяжелом остром панкреатите строилась на концепции раннего активного удаления очагов некроза и широкого открытого дренирования брюшной полости и забрюшинного пространства. Однако накопленный клинический опыт показал, что ранние лапаротомные вмешательства в фазу несформированного панкреонекроза сопровождаются высокой травматичностью, усугублением системного воспалительного ответа, выраженной кровопотерей, ростом частоты кишечных свищей, послеоперационных грыж, сепсиса и повторных хирургических вмешательств [1,12]. Это привело к пересмотру роли открытых операций и к постепенному утверждению принципа отсроченного, этапного и максимально щадящего хирургического лечения [4,6].

Эволюция взглядов на лечение тяжелого острого панкреатита тесно связана с углублением представлений о патогенезе заболевания, морфологических вариантах деструкции, закономерностях формирования жидкостных скоплений и некротических масс, а также с развитием высокоточных методов визуализации [8,31]. Появление современных ультразвуковых технологий, мультиспиральной компьютерной томографии, эндоскопического ультразвука, интервенционной радиологии и видеохирургических систем создало предпосылки для широкого внедрения минимально инвазивных вмешательств. Эти методы позволили не только дренировать патологические скопления и санировать очаги инфекции с меньшей операционной травмой, но и выстроить поэтапную лечебную стратегию, при которой агрессивностью вмешательства нарастает лишь по мере клинической необходимости [5,10,21].

В современной хирургии тяжелого острого панкреатита малоинвазивные технологии рассматриваются не как отдельный набор технических приемов, а как важнейший элемент комплексной лечебной программы[6]. Их применение тесно связано с фазовым течением болезни, выраженностью системных нарушений, наличием инфицирования, анатомией очагов некроза, доступностью безопасного пункционного или эндоскопического пути, а также ресурсами клиники и опытом мультидисциплинарной команды. Особую значимость приобрела стратегия «step-up», предполагающая последовательный переход от наименее травматичных вмешательств к более сложным методикам при отсутствии клинического эффекта[19,30].

Данный подход позволил изменить парадигму хирургического лечения, сместив акцент с ранней широкомасштабной операции на контролируемую, адаптивную и персонифицированную тактику.

Вместе с тем вопросы оптимального выбора малоинвазивной технологии, сроков ее выполнения, последовательности этапов, сочетания различных доступов, критериев перехода к открытой операции и профилактики осложнений остаются предметом дискуссии[7,8,11]. В литературе обсуждаются преимущества и ограничения чрескожного дренирования, эндоскопических трансгастральных и трансдуоденальных вмешательств, видеоассоциированной ретроперитонеальной некрэктомии, лапароскопической санации и дренирования, гибридных операций. Не менее важны вопросы выбора между выжидательной тактикой и активным вмешательством, оценки стерильного и инфицированного некроза, роли абдоминального компартмент-синдрома, билиарной декомпрессии, нутритивной поддержки и антибактериальной терапии в общей структуре лечения[1,13,20].

Современные представления о патогенезе тяжелого острого панкреатита как основе выбора хирургической тактики. Тяжелый острый панкреатит представляет собой многофакторный патологический процесс, при котором локальное ферментативное повреждение ткани поджелудочной железы быстро трансформируется в системное заболевание с вовлечением сосудистого русла, иммунных механизмов, органов дыхания, почек, печени, кишечника и сердечно-сосудистой системы[7,18]. В основе заболевания лежит преждевременная внутрипанкреатическая активация пищеварительных ферментов, приводящая к аутолизу ацинарных клеток, повреждению интерстиция, сосудистых структур и жировой ткани. Формирующийся каскад медиаторов воспаления способствует развитию локального отека, ишемии, микроциркуляторных расстройств и прогрессированию некротических изменений[21].

Ключевое значение имеет нарушение микроциркуляции в ткани железы и окружающей клетчатке. Спазм артериол, венозный стаз, повышение сосудистой проницаемости, интерстициальный отек и тромбообразование приводят к усугублению гипоксии и некроза. Одновременно в системный кровоток поступают активированные ферменты, цитокины, продукты тканевого распада. Бактериальные токсины и молекулы повреждения, что запускает системную воспалительную реакцию. Именно выраженность системного ответа в значительной степени определяет раннюю тяжесть состояния больного, вероятность органной недостаточности и риск летального исхода[16,23,32]. В дальнейшем деструктивный процесс может распространяться за пределы поджелудочной железы на парапанкреатическую, паранефральную, забрюшинную клетчатку, брыжейку, малый сальник, корень брыжейки и другие анатомические пространства. Формируются жидкостные скопления, участки секвестрации, зоны расплавления тканей и отграниченные коллекции[35]. Важнейшим этапом патогенеза является инфицирование некротических очагов, которое значительно ухудшает прогноз и часто требует инвазивного контроля источника инфекции. Бактериальная транслокация из кишечника, дисбиоз, нарушение барьерной функции слизистой оболочки, парез кишечника и иммунная дисрегуляция способствуют контаминации некроза[23]. Понимание фазности процесса имеет принципиальное значение для выбора метода хирургического вмешательства. В ранние сроки преобладают системные нарушения и несформированный некроз, поэтому любое агрессивное вмешательство способно усилить воспалительную реакцию и ухудшит состояние пациента. По мере отграничения некротических масс, формирования капсулы и демаркации жизнеспособных тканей создаются более благоприятные условия для дренирования и некрэктомии. Именно это патофизиологическое обстоятельство лежит в основе тенденции к отсроченным, поэтапным и малоинвазивным вмешательствам[2,17,32]. С клинической точки зрения тяжелый острый панкреатит нельзя рассматривать как единое состояние с универсальной хирургической тактикой. Одни пациенты нуждаются преимущественно в интенсивной терапии и мониторинге без хирургии, другим показаны ранние декомпрессивные или билиарные вмешательства, третьим — пункционное дренирование инфицированных скоплений, четвертым — эндоскопическая или ретроперитонеальная некрэктомия. Следовательно, малоинвазивная хирургия при тяжелом панкреатите должна базироваться на глубоком понимании патогенеза и морфологии процесса, а не только на технической доступности той или иной процедуры.

Морфологическая эволюция локальных изменений и ее значение для малоинвазивных вмешательств. Локальные изменения при тяжелом остром панкреатите проходят закономерную морфологическую эволюцию, и именно знание этих стадий позволяет правильно определить показания к конкретному вмешательству. В первые дни заболевания преобладают интерстициальный отек, геморрагическое пропитывание, ферментативное расплавление тканей и несформированные жидкостные скопления. На этом этапе зоны поражения часто не имеют четких границ, содержат смесь экссудата, крови, жирового детрита и нежизнеспособных тканей. Любая попытка радикального удаления некроза в этот период связана с риском повреждения жизнеспособной паренхимы, массивного кровотечения и генерализации воспаления[2,8,22,33].

По мере прогрессирования заболевания происходит демаркация некротических участков, появляются более плотные секвестры, формируются капсулированные жидкостные образования и отграниченные зоны некроза. Этот процесс занимает недели и во многом определяет успех отсроченной интервенции[5]. Чрескожное дренирование наиболее эффективно при преобладании жидкостного компонента и наличии сформированного пути безопасного доступа. При большом количестве плотных некротических масс оно может оказаться недостаточным, однако даже в этих случаях дренирование нередко способствует частичному контролю инфекции, уменьшению интоксикации и созданию условий для последующего эндоскопического или хирургического этапа[35].

Эндоскопические транслуминальные вмешательства особенно целесообразны при прилегании отграниченных коллекций к стенке желудка или двенадцатиперстной кишки. При этом достигается внутреннее дренирование с возможностью последующей некрэктомии через сформированный доступ. Ретроперитонеоскопические технологии предпочтительны при латеральном распространении некроза в левое забрюшинное пространство, когда возможно безопасное формирование доступа к коллекциям без вскрытия свободной брюшной полости. Лапароскопия сохраняет значение при необходимости санации брюшной полости, дренирования ферментативного или инфицированного выпота, оценки распространенности процесса и решения отдельных сопутствующих задач[18,24].

Таким образом, морфологическая зрелость очага деструкции является одним из основных критериев выбора малоинвазивной технологии. Чем лучше отграничен процесс и чем более четко визуализируются границы некротической коллекции, тем выше вероятность успешного минимально инвазивного вмешательства и тем меньше риск тяжелых интра- и послеоперационных осложнений[25].

Место лучевой и эндоскопической диагностики в планировании малоинвазивного лечения. Современное лечение тяжелого острого панкреатита невозможно без комплексной лучевой и эндоскопической диагностики, которая определяет не только факт наличия осложнений, но и стратегию оперативного вмешательства. Ультразвуковое исследование сохраняет значение как доступный и повторяемый метод первичной оценки состояния гепатопанкреатобилиарной зоны, наличия свободной жидкости в брюшной полости, изменений желчного пузыря и желчных путей, а также как средство навигации при пункционно-дренирующих вмешательствах. Однако возможности Ультразвука ограничены выраженным метеоризмом, ожирением, глубиной расположения патологических очагов и сложностью визуализации забрюшинного пространства[22]. Компьютерная томография с контрастным усилением играет ключевую роль в оценке объема поражения поджелудочной железы, распространенности парапанкреатических изменений, состояния забрюшинной клетчатки, наличия газа в коллекциях, признаков инфицирования, сосудистых осложнений и оптимального пути дренирования. Именно данные КТ в большинстве случаев определяют выбор между консервативным наблюдением, чрескожным дренированием, эндоскопическим доступом или более активным хирургическим вмешательством. Динамическая КТ позволяет оценивать эволюцию процесса, эффективность ранее установленных дренажей и необходимость пересмотра лечебной тактики[23]. Магнитно-резонансная томография и магнитно-резонансная холангиопанкреатография обладают дополнительной диагностической ценностью при уточнении структуры жидкостных и некротических скоплений, состояния панкреатического протока и билиарной системы. Они особенно полезны в ситуациях, когда требуется дифференцировать жидкостное скопление, псевдокисту, отграниченный некроз, а также оценить связь патологического очага с протоковой системой[4,20,33]. Эндоскопический Ультразвук существенно расширил возможности малоинвазивного лечения, поскольку обеспечивает точную визуализацию отграниченных парапанкреатических коллекций, определяет их близость к стенке желудка или двенадцатиперстной кишки, позволяет выбрать оптимальную точку пункции и снижает риск повреждения сосудов. Его роль особенно велика при планировании транслуминального дренирования и эндоскопической некрэктомии[6].

Следовательно, успех малоинвазивного лечения тяжелого панкреатита во многом зависит не только от выбранной хирургической методики, но и от качества предоперационной визуализации,

регулярного динамического контроля и тесного взаимодействия хирурга, эндоскописта, интервенционного радиолога и специалиста лучевой диагностики.

Чрескожные пункционно-дренирующие вмешательства. Чрескожное дренирование под Ультразвуковым или компьютерно-томографическим контролем стало одной из базовых малоинвазивных методик при тяжелом остром панкреатите. Его внедрение коренным образом изменило представления о возможности контроля локальных осложнений без немедленной открытой операции. Метод применяется при наличии инфицированных или симптомных жидкостных скоплений, абсцессов, отграниченных зон некроза с преобладанием жидкого компонента, а также в качестве первого этапа step-up стратегии[32]. Основным преимуществом чрескожного дренирования является минимальная инвазивность, возможность выполнения у тяжелых нестабильных пациентов, относительная техническая доступность и возможность многократной коррекции. Дренирование позволяет уменьшить внутриочаговое давление, эвакуировать инфицированное содержимое, снизит Бактериальную нагрузку, уменьшить интоксикацию, получить материал для бактериологического исследования и в ряде случаев добиться клинической стабилизации без дальнейшего хирургического этапа. У части пациентов именно дренирование оказывается достаточным для купирования септического процесса[3,15,28].

Однако возможности метода зависят от структуры коллекции. При большом объеме плотных секвестров, множественных сообщающихся карманах, высоковязком содержимом или труднодоступной локализации одного дренирования часто недостаточно[29]. В таких ситуациях применяются методы апгрейда дренажной системы: замена на более широкий катетер, установка нескольких дренажей, активная аспирация, лаваж, сочетание с эндоскопическими или видеоассистированными вмешательствами. Существенное значение имеет правильный выбор траектории доступа, позволяющий не только безопасно установить дренаж, но и при необходимости использовать сформированный канал для последующей миниинвазивной некрэктомии[27]. К ограничениям метода относятся риск кровотечения, повреждения полых органов, формирования внешних панкреатических свищей, неполной санации многокамерных коллекций, вторичного инфицирования ранее стерильных очагов, а также необходимость длительного дренирования. Тем не менее в современной литературе чрескожное дренирование рассматривается как важнейший инструмент первичного контроля сепсиса и ключевой компонент этапного лечения тяжелого панкреатита[14].

Эндоскопические транслуминальные технологии. Эндоскопические методы лечения тяжелого острого панкреатита заняли центральное место в случаях, когда отграниченные коллекции или зоны некроза прилежат к желудку либо двенадцатиперстной кишке. Развитие эндоскопического Ультразвука, специальных стентов и инструментов для некрэктомии позволило перейти от простого внутреннего дренирования к активной санации некротических полостей через естественные отверстия[8]. Транслуминальное дренирование обеспечивает создание соустья между просветом желудка или кишки и полостью патологического скопления. Это позволяет осуществлять постоянный отток содержимого без наружных дренажей, снижает риск потери жидкости и электролитов, улучшает комфорт пациента и создает доступ для последующей эндоскопической некрэктомии. При наличии большого количества детрита и секвестров эндоскопист может поэтапно проводить механическое удаление некротических масс, промывание полости и коррекцию дренажной системы[34].

Ключевыми достоинствами эндоскопических технологий считаются отсутствие лапаротомной травмы, возможность внутреннего дренирования, хороший контроль над полостью некроза при ее медиальном расположении, уменьшение частоты наружных свищей и послеоперационных грыж. Особенно ценны эти методы у пациентов с выраженной сопутствующей патологией, у которых открытая операция сопряжена с крайне высоким риском. При этом успех вмешательства зависит от степени зрелости некротической коллекции, ее анатомических взаимоотношений с желудочно-кишечным трактом, наличия адекватного эндоскопического оборудования и опыта специалистов[16].

Осложнения включают кровотечение, перфорацию, миграцию стента, неполную санацию полости, необходимость повторных сеансов и риск инфицирования. Кроме того, эндоскопические технологии менее пригодны при латеральном распространении некроза в отдаленные отделы забрюшинного пространства. Несмотря на это, накопленные данные подтверждают высокую эффективность транслуминальных вмешательств в составе современной step-up стратегии[12].

Видеоассистированные ретроперитонеальные вмешательства. Видеоассистированные ретроперитонеальные вмешательства стали логичным развитием концепции минимально травматичного удаления инфицированного панкреонекроза после неэффективности или недостаточности пункционно-дренирующего этапа. Наиболее часто они используются при распространении процесса в левое параколическое или паранефральное пространство, когда через ранее установленный дренажный канал возможно формирование безопасного доступа в полость некроза[17,27].

Методика позволяет под визуальным контролем удалять секвестры, промывать полость, разрушать перегородки между карманами и устанавливать широкие дренажи. В отличие от традиционной лапаротомии доступ выполняется вне свободной брюшной полости, что уменьшает риск интраперитонеальной контаминации, снижает частоту кишечных осложнений и позволяет сохранить преимущество этапного подхода. Для многих центров данный метод стал оптимальным промежуточным звеном между простым дренированием и открытой некрэктомией[26].

Эффективность ретроперитонеальной некрэктомии определяется анатомией процесса. Наилучшие результаты достигаются при латеральных коллекциях, доступных для безопасного прохождения через левый боковой доступ. Ограничениями являются медиальное расположение очага, множественные несообщающиеся полости, массивное кровотечение, выраженные сосудистые осложнения и невозможность создать адекватный рабочий канал. У части пациентов требуется несколько ревизий, что не следует расценивать как неудачу, поскольку сама философия метода предполагает поэтапную санацию с минимальной дополнительной травмой.

Лапароскопические технологии в лечении тяжелого острого панкреатита. Лапароскопия при тяжелом остром панкреатите имеет более узкие, но весьма важные показания. Ее возможности включают диагностику и санацию ферментативного или инфицированного перитонита, дренирование брюшной полости, вскрытие и санацию доступных жидкостных скоплений, выполнение холецистостомии или холецистэктомии в отдельных клинических ситуациях, а также участие в гибридных вмешательствах. В ряде случаев лапароскопический доступ позволяет оценить распространенность процесса и избежать неоправданной лапаротомии. Лапароскопическое дренирование брюшной полости особенно полезно при выраженном ферментативном выпоте, сочетании панкреатита с перитонеальными осложнениями, а также при абдоминальном синдроме, требующем дифференциальной диагностики. Преимуществом метода является меньшая травматичность по сравнению с открытой операцией, возможность визуальной оценки брюшной полости и прицельной установки дренажей. Однако лапароскопия не должна рассматриваться как универсальный метод лечения панкреонекроза, особенно при глубоком забрюшинном распространении процесса[2]. В литературе подчеркивается, что чрезмерное расширение показаний к лапароскопической некрэктомии может нивелировать преимущества малоинвазивного подхода. При неограниченном некрозе, выраженной системной нестабильности, массивных парапанкреатических поражениях и высоком риске кровотечения лапароскопия может быть технически сложной и потенциально опасной. Тем не менее при правильном отборе больных она остается ценным компонентом общей лечебной стратегии[35].

Эндоскопическая декомпрессия билиарного тракта. Особое место среди малоинвазивных технологий занимает эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография с папиллосфинктеротомией и декомпрессией желчных путей у пациентов с билиарным генезом тяжелого острого панкреатита. При наличии механической желчной обструкции, холангита, вклиненного конкремента большого дуоденального сосочка или стойкой гипербилирубинемии своевременное эндоскопическое вмешательство способно устранить триггерный фактор панкреатического повреждения и стабилизировать состояние больного[25]. Хотя данная процедура не решает проблему сформировавшегося панкреонекроза, ее значение в комплексном лечении трудно переоценить. Эндоскопическая декомпрессия снижает давление в билиарной системе, уменьшает воспаление, позволяет восстановить отток желчи и предупредить прогрессирование билиарной гипертензии. В контексте тяжелого панкреатита ее роль особенно велика у больных с сочетанием холангита и системной воспалительной реакции[14].

Результаты лечения и влияние на исходы. Анализ литературы демонстрирует, что применение малоинвазивных хирургических технологий при тяжелом остром панкреатите в целом способствует улучшению непосредственных результатов лечения. Наиболее часто сообщается о снижении частоты послеоперационной полиорганной недостаточности, уменьшении количества тяжелых гнойно-септических осложнений, сокращении длительности искусственной вентиляции легких, уменьшении потребности в релапаротомиях и лучшем функциональном восстановлении по сравнению с традиционной ранней открытой хирургией. Вместе с тем абсолютные показатели эффективности существенно варьируют в зависимости от тяжести контингента, сроков вмешательства, используемой технологии и опыта центра[4]. Важно подчеркнуть, что успех лечения определяется не только фактом использования малоинвазивной методики, но и ее своевременным включением в общую программу интенсивной терапии. Нутритивная поддержка, контроль инфекции, коррекция водно-электролитных нарушений, органопротективная терапия, профилактика тромбозов, мониторинг внутрибрюшного давления и адекватное обезболивание остаются обязательными составляющими результата. Малоинвазивное вмешательство эффективно тогда, когда оно выполняется на фоне правильно организованного мультидисциплинарного лечения.

Перспективы развития и нерешенные вопросы. Несмотря на значительный прогресс, ряд аспектов малоинвазивного лечения тяжелого панкреатита остается дискуссионным. Требуется дальнейшего уточнения оптимальное время вмешательства у больных с ранним сепсисом, не вполне определены четкие критерии перехода от пункционного дренирования к некрэктомии, нуждаются в стандартизации показания к комбинированным эндоскопически-ретроперитонеальным и лапароскопически-эндоскопическим подходам. Кроме того, необходимы более точные предикторы, позволяющие заранее прогнозировать эффективность того или иного малоинвазивного этапа [9,16,32].

Перспективным направлением является персонализация хирургической тактики на основе интеграции клинических, лабораторных и лучевых данных. Развитие искусственного интеллекта в анализе изображений, совершенствование эндоскопических платформ, создание новых дренажных систем, улучшение методов гемостаза и профилактики свищей могут существенно расширить возможности минимально инвазивного лечения. Особую ценность представляют мультидисциплинарные протоколы, в которых четко регламентированы показания, последовательность этапов, критерии неэффективности и тактика наблюдения.

Заключение. Малоинвазивные хирургические технологии стали основой современной хирургической тактики при тяжелом остром панкреатите и существенно изменили подходы к лечению данной категории больных. Их внедрение позволило отказаться от неоправданно ранних и чрезмерно травматичных открытых операций у значительной части пациентов, сместив акцент на этапный, органосберегающий и персонифицированный контроль локальных осложнений. Наибольшее значение в современной практике имеют чрескожные пункционно-дренирующие вмешательства, эндоскопическое транслюминальное дренирование и некрэктомия, видеоассистированные ретроперитонеальные технологии, а также лапароскопические методы при ограниченных показаниях.

Эффективность малоинвазивного лечения определяется не столько выбором модной технологии, сколько правильной оценкой фазы заболевания, морфологии некротического процесса, наличия инфицирования, общего состояния пациента и возможностей специализированного центра. Концепция step-up, основанная на последовательном наращивании инвазивности, в наибольшей степени отвечает патофизиологии тяжелого панкреатита и позволяет снизить число тяжелых осложнений. В то же время малоинвазивные методики не устраняют полностью необходимость открытых операций, которые сохраняют значение при кровотечении, несостоятельности полых органов, ишемических осложнениях и неэффективности этапной терапии.

Список литературы:

1. Tenner S., Vege S.S., Sheth S.G., et al. American College of Gastroenterology Guidelines: Management of Acute Pancreatitis. *American Journal of Gastroenterology*. 2024;119(3):419–437.
2. Leppäniemi A., Tolonen M., Tarasconi A., et al. 2019 WSES guidelines for the management of severe acute pancreatitis. *World Journal of Emergency Surgery*. 2019;14:27.
3. Working Group IAP/APA Acute Pancreatitis Guidelines. IAP/APA evidence-based guidelines for the management of acute pancreatitis. *Pancreatology*. 2013;13(4 Suppl 2):e1–e15.
4. Baron T.H., DiMaio C.J., Wang A.Y., Morgan K.A. American Gastroenterological Association Clinical Practice Update: Management of Pancreatic Necrosis. *Gastroenterology*. 2020;158(1):67–75.e1.
5. Trikudanathan G., Wolbrink D.R.J., van Santvoort H.C., Mallery S., Freeman M., Besselink M.G. Current Concepts in Severe Acute and Necrotizing Pancreatitis: An Evidence-Based Approach. *Gastroenterology*. 2019;156(7):1994–2007.e3.
6. Banks P.A., Bollen T.L., Dervenis C., et al. Classification of acute pancreatitis—2012: revision of the Atlanta classification and definitions by international consensus. *Gut*. 2013;62(1):102–111.
7. Thoeni R.F. The revised Atlanta classification of acute pancreatitis: its importance for the radiologist and its effect on treatment. *Radiology*. 2012;262(3):751–764.
8. Freeman M.L., Werner J., van Santvoort H.C., et al. Interventions for necrotizing pancreatitis: summary of a multidisciplinary consensus conference. *Pancreas*. 2012;41(8):1176–1194.
9. van Santvoort H.C., Besselink M.G., Bakker O.J., et al. A Step-up Approach or Open Necrosectomy for Necrotizing Pancreatitis. *New England Journal of Medicine*. 2010;362(16):1491–1502.
10. Bakker O.J., van Santvoort H.C., van Brunschot S., et al. Endoscopic transgastric vs surgical necrosectomy for infected necrotizing pancreatitis: a randomized trial. *JAMA*. 2012;307(10):1053–1061.
11. van Brunschot S., van Grinsven J., van Santvoort H.C., et al. Endoscopic or surgical step-up approach for infected necrotising pancreatitis: a multicentre randomised trial. *The Lancet*. 2018;391(10115):51–58.

- 12.Boxhoorn L., van Dijk S.M., van Grinsven J., et al. Immediate versus Postponed Intervention for Infected Necrotizing Pancreatitis. *New England Journal of Medicine*. 2021;385(15):1372–1381.
- 13.Hollemans R.A., Bollen T.L., van Brunschot S., et al. Superiority of Step-up Approach vs Open Necrosectomy in Long-term Follow-up of Patients With Necrotizing Pancreatitis. *Gastroenterology*. 2019;156(4):1016–1026.
- 14.Onnekink A.M., Boxhoorn L., Timmerhuis H.C., et al. Endoscopic Versus Surgical Step-Up Approach for Infected Necrotizing Pancreatitis: Long-term Follow-up of a Randomized Trial. *Gastroenterology*. 2022;163(3):712–722.e14.
- 15.van Brunschot S., Hollemans R.A., Bakker O.J., et al. Minimally invasive and endoscopic versus open necrosectomy for necrotising pancreatitis: a pooled analysis of individual data for 1980 patients. *Gut*. 2018;67(4):697–706.
- 16.Tan V., Charachon A., Lescot T., et al. Endoscopic transgastric versus surgical necrosectomy in infected pancreatic necrosis. *Clinical Endoscopy*. 2014;47(4):302–309.
- 17.Trikudanathan G., Arain M., Attam R., Freeman M.L. Interventions for necrotizing pancreatitis. *Gastrointestinal Endoscopy*. 2017;85(5):849–861.
- 18.van Baal M.C.E., Bollen T.L., Bakker O.J., et al. The role of routine fine-needle aspiration in the diagnosis of infected necrotizing pancreatitis. *Surgery*. 2014;155(3):442–448.
- 19.Connor S., Ghaneh P., Raraty M., Sutton R., Neoptolemos J.P. Minimally invasive retroperitoneal pancreatic necrosectomy. *Digestive Surgery*. 2003;20(4):270–277.
- 20.Horvath K.D., Kao L.S., Wherry K.L., Pellegrini C.A., Sinanan M.N. A technique for laparoscopic-assisted percutaneous drainage of infected pancreatic necrosis and pancreatic abscess. *Surgical Endoscopy*. 2001;15(10):1221–1225.
- 21.Carter C.R., McKay C.J., Imrie C.W. Percutaneous necrosectomy and sinus tract endoscopy in the management of infected pancreatic necrosis: an initial experience. *Annals of Surgery*. 2000;232(2):175–180.
- 22.Raraty M.G.T., Halloran C.M., Dodd S., et al. Minimal access retroperitoneal pancreatic necrosectomy: improvement in morbidity and mortality with a less invasive approach. *Annals of Surgery*. 2010;251(5):787–793.
- 23.Bugiantella W., Rondelli F., Boni M., et al. Necrotizing pancreatitis: A review of the interventions. *International Journal of Surgery*. 2016;28(Suppl 1):S163–S171.
- 24.Sion M.K., Davis K.A., Finneran T., et al. Step-up approach for the management of pancreatic necrosis: a review of the literature. *Trauma Surgery & Acute Care Open*. 2019;4:e000308.
- 25.Haney C.M., Kowalewski K.F., Schmidt M.W., et al. Endoscopic versus surgical treatment for infected necrotizing pancreatitis: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. *Annals of Surgery*. 2020;272(1):18–28.
- 26.Tang P., Teoh A.Y.B., Enders F.T., et al. Endoscopic versus minimally invasive surgical approach for infected necrotizing pancreatitis: a systematic review and meta-analysis. *Surgical Endoscopy*. 2023;37:9441–9453.
- 27.Wu G., Zhang L., Wang X., et al. Minimally invasive surgery compared to endoscopic treatment in infected necrotizing pancreatitis: systematic review and meta-analysis. *Surgical Endoscopy*. 2024.
- 28.Petrov M.S., Windsor J.A. Classification of the severity of acute pancreatitis: how many categories make sense? *American Journal of Gastroenterology*. 2010;105(1):74–76.
- 29.da Costa D.W., Boerma D., van Santvoort H.C., et al. Staged multidisciplinary step-up management for necrotizing pancreatitis. *British Journal of Surgery*. 2014;101(1):e65–e79.
- 30.Runzi M., Niebel W., Goebell H., Gerken G., Layer P. Severe acute pancreatitis: nonsurgical treatment of infected necroses. *Pancreas*. 2005;30(3):195–199.
- 31.Besselink M.G., van Santvoort H.C., Boermeester M.A., et al. Timing and impact of infections in acute pancreatitis. *British Journal of Surgery*. 2009;96(3):267–273.
- 32.Isaji S., Mizuno S., Windsor J.A., et al. International consensus on definition and criteria of borderline resectable pancreatic ductal adenocarcinoma 2017. *Pancreatology*. 2018;18(1):2–11.
- 33.Garg P.K., Sharma M. Modern management of pancreatic necrosis. *Gastroenterology Report*. 2024.
- 34.Marino D., Perera T.B., Habtezion A. Management of Acute Pancreatitis. *American Journal of Gastroenterology*. 2025;120(1):15–30.
- 35.Párnitzky A., et al. International Association of Pancreatology Revised Guidelines for the Management of Acute Pancreatitis. *Pancreatology*. 2025.

Для цитирования: Абдулсаидов С.К., Хурсанов Ё.Э., Тухтаев Ж.К., Холмирзаев О.М. Совершенствование малоинвазивных хирургических технологий при тяжёлом остром панкреатите // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 4(24). – С. 818–825. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19703431>

ОПТИМИЗАЦИЯ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ ПРИ ГЛУБОКИХ ОЖОГАХ НА ОСНОВЕ КЛИНИКО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ**Хакназарова М.Н.¹, Рузибоев С.А.¹, Мансуров Т.Т.²**¹Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан²Самаркандский филиал Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. В работе представлена оценка эффективности оптимизации хирургической тактики при лечении пациентов с глубокими термическими ожогами на основе клинко-инструментальной оценки состояния. Исследование проведено на базе Самаркандского филиала Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи и включало 39 пациентов. Установлено, что глубокие ожоги сопровождаются выраженными системными нарушениями, включающими гемодинамическую нестабильность, метаболические расстройства и высокий риск инфекционных осложнений. Длительное сохранение некротических тканей является одним из ключевых факторов, способствующих прогрессированию патологического процесса и ухудшению клинического исхода. Показано, что применение активной хирургической тактики, включающей раннее удаление некротических тканей и последующее восстановление кожного покрова, способствует снижению уровня интоксикации, ускорению процессов регенерации и улучшению общего состояния пациентов. Сравнительный анализ продемонстрировал, что активный хирургический подход позволяет снизить частоту осложнений, сократить сроки госпитализации и повысить эффективность лечения. Таким образом, комплексная клинко-инструментальная оценка состояния пациента в сочетании с своевременным хирургическим вмешательством является ключевым фактором оптимизации лечения глубоких ожогов.

Ключевые слова глубокие ожоги, ожоговая болезнь, хирургическое лечение, некрэктомия, кожная пластика, раневая поверхность, гемодинамика, интенсивная терапия, регенерация, осложнения

OPTIMIZATION OF SURGICAL TACTICS FOR DEEP BURNS BASED ON CLINICAL AND INSTRUMENTAL ASSESSMENT**Khaknazarova M.N.¹, Ruziboev S.A.¹, Mansurov T.T.²**¹Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan²Samarkand branch of Republican Scientific Center for Emergency Medical Care, Samarkand, Uzbekistan

Resume. The paper presents an assessment of the effectiveness of optimizing surgical tactics in the treatment of patients with deep thermal burns based on a clinical and instrumental assessment of the condition. The study was conducted on the basis of the Samarkand branch of the Republican Scientific Center for Emergency Medical Care and included 39 patients. It has been established that deep burns are accompanied by pronounced systemic disorders, including hemodynamic instability, metabolic disorders and a high risk of infectious complications. Long-term preservation of necrotic tissues is one of the key factors contributing to the progression of the pathological process and deterioration of the clinical outcome. It has been shown that the use of active surgical tactics, including early removal of necrotic tissues and subsequent restoration of the skin, helps to reduce the level of intoxication, accelerate regeneration processes and improve the general condition of patients. A comparative analysis has shown that an active surgical approach can reduce the incidence of complications, shorten the duration of hospitalization, and improve the effectiveness of treatment. Thus, a comprehensive clinical and instrumental assessment of the patient's condition, combined with timely surgical intervention, is a key factor in optimizing the treatment of deep burns.

Keywords deep burns, burn disease, surgical treatment, necrectomy, skin grafting, wound surface, hemodynamics, intensive care, regeneration, complications

КЛИНИК-ИНСТРУМЕНТАЛ БАҲОЛАШ АСОСИДА ЧУҚУР КУЙИШЛАРДА ЖАРРОҲЛИК ТАКТИКАСИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ**Хакназарова М.Н.¹, Санжар Р.А.¹, Мансуров Т.Т.²**¹Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон²Республика шошилинич тиббий ёрдам илмий маркази Самарқанд филиали, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Ушбу ишда чуқур термик куйишлар билан оғриган беморларни даволашда жарроҳлик

тактикасини оптималлаштириш самарадорлигини клиник ва инструментал баҳолаш асосида баҳолаш тақдим этилган. Тадқиқот Республика шошилинч тиббий ёрдам илмий маркази Самарқанд филиали базасида ўтказилди ва 39 нафар бемор қамраб олинди. Аниқланишича, чуқур куйишлар гемодинамик беқарорлик, метабolik бузилишлар ва юқумли асоратларнинг юқори хавфини ўз ичига олган сезиларли тизимли бузилишлар билан кечади. Некрозга учраган тўқималарнинг узоқ вақт сақланиб қолиши патологик жараённинг ривожланишига ва клиник натижанинг ёмонлашишига олиб келувчи асосий омиллардан бири ҳисобланади. Некротик тўқималарни эрта олиб ташлаш ва кейинчалик тери қопламани тиклашни ўз ичига олган фаол жарроҳлик тактикасини қўллаш интоксикация даражасини пасайтиришига, регенерация жараёнларини тезлаштиришига ва беморларнинг умумий аҳволини яхшилашга ёрдам бериши кўрсатилган. Қиёсий таҳлил шуни кўрсатдики, фаол жарроҳлик ёндашуви асоратлар частотасини камайтириш, касалхонага ётқизиш муддатларини қисқартириш ва даволаш самарадорлигини ошириш имконини беради. Шундай қилиб, беморнинг ҳолатини комплекс клиник-инструментал баҳолаш ва ўз вақтида жарроҳлик аралашуви чуқур куйишларни даволашни оптималлаштиришнинг асосий омили ҳисобланади.

Калит сўзлар: чуқур куйиш, куйиш касаллиги, жарроҳлик йўли билан даволаш, некрэктомия, тери пластикаси, жароҳат юзаси, гемодинамика, интенсив терапия, регенерация, асоратлар.

Введение. Глубокие термические ожоги представляют собой одну из наиболее тяжёлых форм травматических повреждений, сопровождающихся выраженными системными нарушениями и высоким риском развития осложнений. Данная патология характеризуется длительным течением, значительным уровнем летальности и требует комплексного подхода к лечению. Современная комбустиология рассматривает ожоговую болезнь как системный патологический процесс, затрагивающий все органы и системы организма. Уже в ранние сроки после травмы развивается выраженная реакция организма, связанная с нарушением микроциркуляции, гиповолемией и метаболическими расстройствами[1,5,6]. Одной из ключевых особенностей глубоких ожогов является формирование некротических тканей, которые служат источником инфекции и препятствуют нормальному заживлению ран. Длительное сохранение ожогового струпа приводит к развитию гнойно-септических осложнений, ухудшает общее состояние пациента и увеличивает сроки лечения[8]. Клиническое течение ожоговой болезни определяется не только глубиной и площадью поражения, но и общим состоянием организма, наличием сопутствующих заболеваний и своевременностью оказания медицинской помощи. Важным аспектом является влияние ожоговой травмы на гемодинамику. Потеря жидкости через повреждённую поверхность кожи приводит к развитию гиповолемии, что сопровождается снижением артериального давления, тахикардией и нарушением микроциркуляции[2,7,11].

Нарушение микроциркуляции, в свою очередь, приводит к гипоксии тканей и усугубляет течение патологического процесса. В результате формируется замкнутый круг, при котором повреждение тканей усиливает системные нарушения, а системные нарушения способствуют дальнейшему повреждению тканей[9]. Несмотря на достижения современной медицины, лечение глубоких ожогов остаётся сложной задачей. Консервативная тактика, направленная на постепенное очищение раны, не всегда обеспечивает удовлетворительные результаты и сопровождается высоким риском осложнений[3]. В последние годы всё большее значение придаётся активной хирургической тактике, включающей раннее удаление некротических тканей и последующее восстановление кожного покрова[4]. Данный подход позволяет устранить источник инфекции, сократить сроки лечения и улучшить исходы. Однако выбор оптимального времени и объёма хирургического вмешательства остаётся предметом обсуждения и требует дальнейшего изучения[10]. Таким образом, необходимость разработки эффективных методов лечения глубоких ожогов остаётся одной из актуальных задач современной хирургии.

Целью настоящего исследования является повышение эффективности лечения пациентов с глубокими ожогами на основе клинико-инструментальной оценки состояния и применения активной хирургической тактики.

Материалы и методы. Исследование выполнено на базе Самаркандского филиала Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи. В исследование включены 39 пациентов с глубокими термическими ожогами, находившиеся на стационарном лечении. Пациенты поступали в стационар в экстренном порядке. При поступлении проводилась оценка общего состояния, степени выраженности ожоговой травмы и наличия системных нарушений. Все пациенты были распределены на две группы в зависимости от применяемой лечебной тактики. В первой группе применялась традиционная терапия, направленная на стабилизацию состояния пациента, коррекцию нарушений гемодинамики и постепенное очищение раневой поверхности. Во второй группе использовалась активная

хирургическая тактика, включающая раннее удаление некротических тканей с последующим восстановлением кожного покрова. Комплекс обследования включал клиническое наблюдение, лабораторные исследования и инструментальные методы диагностики. Клиническое обследование проводилось ежедневно и включало оценку общего состояния пациента, уровня сознания, показателей гемодинамики и дыхательной функции. Лабораторные исследования включали определение уровня гемоглобина, гематокрита, показателей биохимического анализа крови, а также оценку системы гемостаза. Особое внимание уделялось оценке динамики показателей, что позволяло своевременно выявлять ухудшение состояния пациента и корректировать лечебную тактику.

Инструментальные методы диагностики включали проведение электрокардиографии, эхокардиографии, рентгенографии органов грудной клетки и других исследований при необходимости. Динамическое наблюдение за пациентами проводилось на всех этапах лечения, что позволяло оценить эффективность проводимой терапии. Статистическая обработка данных проводилась с использованием современных методов анализа, при этом различия считались достоверными при уровне значимости $p < 0,05$.

Результаты. Проведённый анализ клинического материала показал, что течение глубоких ожогов характеризуется выраженными системными нарушениями, затрагивающими сердечно-сосудистую, дыхательную и метаболическую системы организма. У большинства пациентов уже в первые часы после травмы отмечались признаки гиповолемии, обусловленные значительной потерей жидкости через повреждённую поверхность кожи. Это проявлялось снижением артериального давления, учащением сердечного ритма и признаками нарушения микроциркуляции.

При динамическом наблюдении установлено, что у пациентов, получавших традиционное лечение, восстановление гемодинамических показателей происходило медленно. В течение первых суток сохранялись признаки нестабильности кровообращения, требующие проведения интенсивной инфузионной терапии. В основной группе, где применялась активная хирургическая тактика, стабилизация гемодинамики происходила значительно быстрее. Удаление некротических тканей на ранних этапах способствовало снижению уровня интоксикации и улучшению общего состояния пациентов. Анализ лабораторных показателей показал, что у пациентов с тяжёлым течением ожоговой болезни наблюдалось выраженное снижение уровня гемоглобина и гематокрита. Данные изменения отражают как кровопотерю, так и перераспределение жидкости в организме. В контрольной группе снижение лабораторных показателей сохранялось длительное время, что свидетельствует о затяжном течении патологического процесса. В основной группе восстановление данных показателей происходило быстрее, что связано с более эффективным лечением. Особое внимание было уделено анализу раневого процесса. У пациентов контрольной группы отмечалось длительное сохранение некротических тканей, что препятствовало нормальному заживлению. Формирование грануляционной ткани происходило медленно, что увеличивало сроки подготовки к кожной пластике. В основной группе раневой процесс протекал более благоприятно. Раннее удаление некротических тканей способствовало быстрому очищению раны и формированию здоровой грануляционной ткани.

Сравнительный анализ показал, что сроки подготовки к восстановлению кожного покрова в основной группе были значительно короче. Это позволило сократить общее время лечения и уменьшить нагрузку на организм пациента. Анализ частоты осложнений выявил существенные различия между группами. В контрольной группе значительно чаще наблюдались инфекционные осложнения, включая воспалительные процессы со стороны дыхательной системы и признаки генерализации инфекции. В основной группе частота осложнений была значительно ниже. Это связано с тем, что раннее удаление некротических тканей устраняет основной источник инфекции и предотвращает её распространение. Динамика общего состояния пациентов также различалась. В основной группе отмечалось более быстрое улучшение самочувствия, нормализация температуры тела и стабилизация показателей жизнедеятельности. Важным показателем эффективности лечения является длительность госпитализации. В основной группе сроки пребывания пациентов в стационаре были значительно короче, что свидетельствует о высокой эффективности применяемой тактики.

Обсуждение. Полученные результаты позволяют рассматривать глубокие ожоги как сложное системное состояние, при котором локальное повреждение тканей сопровождается выраженными нарушениями функций всего организма. Одним из ключевых факторов, определяющих тяжесть состояния пациента, является нарушение гемодинамики. Потеря жидкости через ожоговую поверхность приводит к развитию гиповолемии, что сопровождается снижением перфузии органов и тканей. Нарушение микроциркуляции является важным звеном патогенеза. Снижение кровоснабжения тканей приводит к развитию гипоксии, что усугубляет повреждение и замедляет процессы регенерации. Длительное существование некротических тканей играет ведущую роль в развитии осложнений.

Некроз является благоприятной средой для размножения микроорганизмов, что приводит к инфицированию раны и развитию септических состояний. Консервативная тактика лечения, направленная на постепенное очищение раны, не всегда позволяет предотвратить развитие осложнений. Напротив, она может способствовать их прогрессированию за счёт длительного сохранения источника инфекции. Активная хирургическая тактика, основанная на раннем удалении некротических тканей, позволяет устранить основной патогенетический фактор. Это приводит к снижению уровня интоксикации и улучшению общего состояния пациента. Особое значение имеет влияние хирургического вмешательства на системные процессы. Удаление некротических тканей способствует снижению воспалительной реакции и нормализации метаболических процессов. Полученные данные подтверждают, что раннее вмешательство способствует более быстрому восстановлению гемодинамики и улучшению функции органов и систем. Важным аспектом является комплексный подход к лечению, включающий интенсивную терапию, направленную на коррекцию нарушений водно-электролитного баланса, гемодинамики и метаболизма. Сравнительный анализ показал, что применение активной хирургической тактики позволяет значительно снизить частоту осложнений и улучшить результаты лечения. Таким образом, выбор лечебной тактики должен основываться на комплексной оценке состояния пациента. Применение активного хирургического подхода позволяет повысить эффективность лечения и улучшить прогноз. Установлено, что одним из ключевых факторов, влияющих на исход заболевания, является своевременность и адекватность лечебных мероприятий. Длительное существование некротических тканей приводит к поддержанию воспалительного процесса, развитию инфекционных осложнений и ухудшению общего состояния пациента. Результаты исследования показали, что применение активной хирургической тактики позволяет существенно улучшить результаты лечения. Раннее удаление некротических тканей способствует снижению уровня интоксикации, уменьшению выраженности воспалительных процессов и ускорению восстановления функций организма.

Выявлено, что у пациентов, получавших активное хирургическое лечение, наблюдается более быстрое восстановление гемодинамических показателей, улучшение лабораторных данных и сокращение сроков заживления раневой поверхности. Сравнительный анализ показал, что активная хирургическая тактика позволяет снизить частоту осложнений, включая инфекционные процессы и признаки полиорганной недостаточности. Также отмечено сокращение сроков госпитализации, что имеет важное социально-экономическое значение.

Заключение. Проведённое исследование показало, что глубокие термические ожоги представляют собой сложное патологическое состояние, сопровождающееся выраженными системными нарушениями и высоким риском развития осложнений. Клиническое течение ожоговой болезни определяется не только локальным повреждением тканей, но и степенью вовлечения жизненно важных органов и систем. Полученные данные свидетельствуют о том, что комплексный подход к лечению, включающий клинко-инструментальную оценку состояния пациента и своевременное хирургическое вмешательство, является наиболее эффективным. Таким образом, оптимизация хирургической тактики при глубоких ожогах должна основываться на ранней диагностике, комплексной оценке состояния пациента и активном устранении некротических тканей.

Список литературы:

1. Herndon D.N. Total Burn Care. 5th ed. Elsevier; 2018.
2. Jeschke M.G., Kamolz L.P., Sjöberg F. Handbook of Burns. Springer; 2020.
3. Greenhalgh D.G. Management of burns. N Engl J Med. 2019;380:2349–2359.
4. Brusselaers N., Monstrey S., Vogelaers D. Severe burn injury. Lancet. 2010;375:1771–1782.
5. Church D., Elsayed S., Reid O. Burn wound infections. Clin Microbiol Rev. 2006;19:403–434.
6. Jeschke M.G. Burn injury. Nat Rev Dis Primers. 2020;6:11.
7. Peck M.D. Epidemiology of burns. Burns. 2011;37:1087–1100.
8. Atiyeh B.S., Gunn S.W., Hayek S.N. State of burn care. Ann Burns Fire Disasters. 2005;18:103–110.
9. Pham T.N., Cancio L.C., Gibran N.S. American burn guidelines. J Burn Care Res. 2008;29:257–266.
10. Jeschke M.G., Finnerty C.C. Pathophysiology of burns. Lancet. 2015;385:251–262.

Для цитирования: Хакназарова М.Н., Рузибоев С.А., Мансуров Т.Т. Оптимизация хирургической тактики при глубоких ожогах на основе клинко-инструментальной оценки // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 4(24). – С. 826–829. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19703515>

ГАСТРОДУОДЕНАЛ ҚОН КЕТИШЛАРДА КЛИНИКО-ПРОГНОСТИК БАҲОЛАШ АСОСИДА ЖАРРОҲЛИК ТАКТИКАСИНИ ОПТИМАЛЛАШТИРИШ

Хурсанов Ё.Э.¹, Мавлонов А.Х.², Хидиров М.С.³, Мирзабоев А.М.³, Караев М.Н.³

¹Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

²Тайлоқ тумани тиббиёт бирлашмаси марказий шифохонаси, Тайлоқ т., Ўзбекистон

³Республика шошилиш тиббий ёрдам илмий маркази Самарқанд филиали, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Ушбу илмий ишда гастродуоденал ярадан қон кетиши (ГДЯК) ҳолатларини жарроҳлик йўли билан даволашдаги замонавий тактик ва техник ёндашувларнинг аҳамияти ва самарадорлиги таҳлил қилинган. ГДЯК қорин бўшлиғи шошилиш жарроҳлигидаги жиддий муаммолардан бири бўлиб, беморларнинг ўлими юқори даражада сақланиб қолмоқда. Тахминан 20–25% ҳолларда бирламчи эндоскопик усуллар билан қон кетишни тўхтатишга эришилмайди ва жарроҳлик аралашуви талаб этилади. Ваготомия каби органни сақлайдиган усуллар ГДК (гастродуоденал қон кетишлар)ни самарали даволашда асосий ўринни эгаллайди. Эндоскопик ва мини-инвазив аралашувларнинг клиник амалиётда кенг қўлланиши жарроҳлик кўрсатмаларини аниқлашда муҳим аҳамият касб этади. Тадқиқот натижаларига кўра, замонавий технологик ёндашувлар ва органни сақловчи операциялар қон кетишни самарали тўхтатиш, асоратларни камайтириш ва беморларнинг яшаш прогнозини яхшилашда муҳим омил ҳисобланади.

Калит сўзлар: гастродуоденал яра, қон кетиш, Rockall шкаласи, прогноз, гемостаз, эндоскопия, лапароскопия

OPTIMIZATION OF SURGICAL TACTICS IN GASTRODUODENAL BLEEDING BASED ON CLINICAL AND PROGNOSTIC ASSESSMENT

Khursanov E.E.¹, Mavlonov A.Kh.², Khidirov M.S.³, Mirzaboev A.M.³, Karaev M.N.³

¹Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

²Central hospital of the medical association of the Tailak district, Tailak, Uzbekistan

³Samarkand branch of the Republican Scientific Center for Emergency Medical Care, Samarkand, Uzbekistan

Resume. In this scientific work, the significance and effectiveness of modern tactical and technical approaches in the surgical treatment of gastroduodenal ulcerative bleeding (GDAC) are analyzed. HIP is one of the major problems in emergency abdominal surgery, and patient mortality remains high. In about 20-25% of cases, stopping bleeding by primary endoscopic methods is not achieved and surgical intervention is required. Organ-preserving methods such as vagotomy play a key role in the effective treatment of GCC (gastroduodenal bleeding). The widespread use of endoscopic and minimally invasive interventions in clinical practice is important in determining surgical indications. According to the results of the study, modern technological approaches and organ-preserving operations are an important factor in effectively stopping bleeding, reducing complications and improving the prognosis of patient survival.

Key words: gastroduodenal ulcer, bleeding, Rockall scale, prognosis, hemostasis, endoscopy, laparoscopy.

ОПТИМИЗАЦИЯ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ ПРИ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЯХ НА ОСНОВЕ КЛИНИКО-ПРОГНОСТИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ

Хурсанов Ё.Э.¹, Мавлонов А.Х.², Хидиров М.С.³, Мирзабоев А.М.³, Караев М.Н.³

¹Самарқандский государственный медицинский университет, г. Самарқанд, Узбекистан

²Центральная больница медицинского объединения Тайлакского района, Тайлакский р-н, Узбекистан

³Самарқандский филиал Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи, г. Самарқанд, Узбекистан

Резюме. В данной научной работе проанализированы значимость и эффективность современных тактико-технических подходов в хирургическом лечении случаев гастродуоденального язвенного кровотечения (ГДЯК). ГДЯК является одной из серьезных проблем в экстренной хирургии брюшной полости, и летальность пациентов остается высокой. Примерно в 20-25% случаев остановка кровотечения первичными эндоскопическими методами не достигается и требуется хирургическое вмешательство. Органосохраняющие методы, такие как ваготомия, играют ключевую роль в эф-

фективном лечении ГДК (гастродуоденальных кровотечений). Широкое применение эндоскопических и мини-инвазивных вмешательств в клинической практике имеет важное значение при определении хирургических показаний. Согласно результатам исследования, современные технологические подходы и органосохраняющие операции являются важным фактором эффективной остановки кровотечения, снижения осложнений и улучшения прогноза выживания пациентов.

Ключевые слова: гастродуоденальная язва, кровотечение, шкала Rockall, прогноз, гемостаз, эндоскопия, лапароскопия.

Долзарблиги. Гастродуоденал қон кетишлар қорин бўшлиғи жарроҳлигидаги энг мураккаб клиник муаммолардан бири бўлиб, юқори ўлим даражаси билан боғлиқ ва шошилинч касалхонага ётқизишни талаб этади. Гастродуоденал қон кетиш манбалари орасида ошқозон ва ўн икки бармоқли ичак яраси 71,2 фоизни ташкил этади. Беморларнинг 75-80 фоизидан қон кетиши ўз-ўзидан тўхтаса, 20-25 фоиз ҳолларда бирламчи эндоскопик текширувда қон кетиши фаол кечади. Умумий ўлим даражаси эса сўнгги 50 йил давомида тахминан 10 фоиз атрофида сақланиб қолмоқда[2,6,9].

ГДЯК билан оғриган беморларни даволаш тактикасини танлаш шошилинч жарроҳлигидаги мураккаб масалалардан бири бўлиб қолмоқда. Тиббиёт фани ва клиник амалиётнинг ривожланишига ҳамда масалани муҳокама қилишнинг юз йилдан ортиқ тарихига қарамай, ГДЯК билан оғриган беморларни даволаш тактикаси муаммоси замонавий шошилинч жарроҳлигининг энг долзарб муаммоларидан бири сифатида сақланиб қолмоқда[1,3,5,7].

ЯКни жарроҳлик йўли билан даволашнинг замонавий босқичини ҳозирги вақтда ваготомия билан аъзоларни сақлаб қолувчи операциялар ГДКни даволашда етакчи аҳамиятга эга бўлган давр деб ҳисоблаш керак. Кўплаб жарроҳлар радикал аралашувлардан воз кечиб, аъзоларни сақлаб қолувчи аралашувларга мойиллик кўрсатмоқдалар[4,8]. Янги технологиялар бу операцияларнинг кам шикаст етказадиган вариантини қўллаш имконини бермоқда. Аъзони сақлаб қолувчи операциялар услуги ва техникаси такомиллашиб бормоқда[10,11].

Шундай қилиб, қон кетишини тўхтатиш имконини берадиган замонавий эндоскопик техникани клиник амалиётга кенг жорий этиш, шунингдек, мини-инвазив операциялардан фойдаланиш ЯДЎК билан оғриган беморларни даволаш тактикасини ўзгартиришга ва жарроҳлик аралашувига кўрсатмаларни табақалаштириб аниқлашга олиб келди.

Тадқиқот мақсади. Ярали гастродуоденал қон кетиши билан оғриган беморларни жарроҳлик йўли билан даволаш натижаларини яхшилаш.

Тадқиқот материаллари ва усуллари.

Ушбу иш Республика шошилинч тиббий ёрдам илмий маркази Самарқанд филиали негизидаги СамДТУ 2-сон Хирургик касалликлар кафедраси 5 йиллик (2022-2026 йиллар) тажрибасига асосланган. Тадқиқотда гастродуоденал ярали қон кетиши бўлган 121 нафар бемор ўрганилди.

Текширилаётган беморлар контингенти икки гуруҳга бўлинди: таққослаш гуруҳи 80 нафар беморни ташкил этди; асосий гуруҳ эса ЯДЎК билан оғриган беморларни олиб бориш ва даволашга турлича ёндашувлар билан ажралиб турадиган 41 нафар бемордан иборат эди. Умумий гуруҳда беморларнинг ёши 19 ёшдан 79 ёшгача бўлиб, шундан 10 нафари (8,3%) 60 ёшдан ошган эди. Эрақлар сони 89 нафар (73,5%), аёллар сони эса 32 нафар (26,5%) эди.

Умумий гуруҳда ЯКнинг барча турлари кузатилди: ўн икки бармоқли ичак яра касаллиги (ЎБИЯК), Жонсон бўйича 1-, 2- ва 3-турдаги ошқозон яра касаллиги (ОЯК). Қон кетиш манбалари орасида 65 (53,6%) беморда ўн икки бармоқ ичак пиёзчаси яраси устунлик қилди.

Яраларнинг ўлчами визуал маълумотларни ҳисобга олган ҳолда уларнинг майдони бўйича аниқланди. 71 (58,6%) беморда яралар ўлчами 5 мм дан 10 мм гача, 21 (17,4%) беморда 10-15 мм, 9 (7,4%) беморда эса 15 мм дан катта эди.

36 (29,6%) беморда ёндош патология аниқланди. Таъкидлаш жоизки, баъзи ҳолларда битта беморда биттадан ортиқ ёндош касаллик мавжуд эди.

121 нафар беморда гастродуоденал қон кетиш кузатилди. Барча беморларнинг анамнезини ўрганишда "мелена" кўринишидаги нажас, 79 (65,3%) беморда эса "қаҳва куйқаси" мавжудлиги қайд этилди. Қон қуйқалари билан қусиш 42 (34,7%) беморда кузатилди.

ЯДЎК бўлган барча беморларга шошилинч тарзда фиброэзофагогастродуоденоскопия (ФЕГДС) ўтказилди. Эндоскопия маълумотларига кўра, қон кетиш манбаи 118 (97,5%) ҳолатда аниқланди.

Беморларнинг асосий қисми II даражали қон йўқотиш билан касалхонага ётқизилган бўлиб, улар 73 (63%) нафар, 21 (17,4%) беморда I даражали қон йўқотиш, 25 (20,6%) беморда III даражали

қон йўқотиш кузатилган. IV даражали қон йўқотиш билан оғриган беморлар сони атиги 2 (1,6%) нафар беморни ташкил этган.

Эндоскопияда қон кетиш фаоллигини Ж.А. Форрест (1974) таснифи бўйича баҳоладик.

Эндоскопия маълумотларига кўра, 97,5% ҳолларда қон кетиш манбаи аниқланади. Эндоскопик тасвирга асосан, қон кетиш самарадорлиги Ж. А. Форрест (1974) таснифига мувофиқ баҳоланган.

1-жадвал.

Гастродуоденал ярали қон кетиши бўлган беморларнинг Ж. Форрест бўйича тақсимланиши

Эндоскопик хусусият	Асосий гуруҳ (n=41)		Назорат гуруҳи (n=80)	
	Мутлақ	%	Мутлақ	%
ФІ А	6	14,6	17	21,4
ФІ Б	8	19,5	13	16,2
ФІІ А	14	34,1	27	33,7
ФІІ Б	11	26,8	20	25
ФІІ С	1	2,4	2	2,5
ФІІІ	1	2,4	1	1,2
Жами	41	100	80	100

Изоҳ: фоизли тақсимот

1-жадвалдан кўриниб турибдики, асосий гуруҳда II типдаги фаол қон кетиш (ФІ) билан оғриган беморлар 14 нафар (34,1%); II тип (ФІІ) 26 нафар (63,4%) ва III тип (ФІІІ) 1 нафар (2,4%) эди. Назорат гуруҳида II тип (ФІ) 30 нафар (37,5%), II тип (ФІІ) 49 нафар (61,2%) ва III тип (ФІІІ) 1 нафар (1,2%) беморда кузатилди ($p=0,002$).

Шунингдек, яралининг жойлашуви бўйича қон кетиш частотаси ўрганилганда, асосий гуруҳда қон кетиш: ошқозон танасида - 5 (12,2%), ошқозоннинг кардиал қисмида 2 (4,9%), ошқозоннинг пилориантрал қисмида 9 (21,9%), ўн икки бармоқли ичакда 25 (60,9%) ҳолда учрагани аниқланди.

Назорат гуруҳида қон кетиш ҳолатлари қуйидагича кузатилди: ошқозон танасида 8 та (10%), ошқозоннинг кардиал қисмида 4 та (5%), ошқозоннинг пилориантрал қисмида ва ўн икки бармоқли ичак пийёзасида 28 та (35%), ҳамда 40 та (50%) ҳолат.

Яра ўлчамига кўра қон кетиш частотаси ўрганилганда, жадвалдан кўриниб турибдики, асосий гуруҳда диаметри 5 мм гача бўлган 10 та (24,4%), 5 дан 10 мм гача 23 та (56,1%), 10 дан 15 мм гача 6 та (14,6%), 15 мм дан ортиқ 2 та (4,9%) ҳолат кузатилди. Назорат гуруҳида эса диаметри 5 мм гача бўлган 10 та (12,5%), 5 дан 10 мм гача 48 та (60%), 10 дан 15 мм гача 15 та (18,7%), 15 мм дан ортиқ 7 та (8,7%) ҳолат қайд этилди.

Назорат гуруҳида ретроспектив тадқиқот давомида яра нуқсони ўлчамига кўра қон кетишнинг такрорланиши ўрганилди. Яра ўлчами 5 мм гача бўлганда қон кетишнинг қайталаниши 1 та (1,3%) беморда, 5 дан 10 мм гача - 13 та (16,3%) ҳолда, 10 дан 15 мм гача - 9 та (11,3%) беморда ва 15 мм дан ортиқ - 3 та (3,8%) беморда кузатилди.

Натижалар ва муҳокама. Назорат гуруҳидаги беморларда даволаш тактикаси ФГДС орқали давом этаётган қон кетиш аниқлангандан сўнг белгиланди. 80 та кузатувда эндогемостазнинг турли усуллари қўлланилди. 37 нафар беморда яра тўқимаси ва унинг атрофига томир торайтирувчи (адреналиннинг 1:10000 нисбатдаги эритмаси) ва денатуратсияловчи (70% ли этил спирти) дори воситалари инъекция қилинди. 43 та кузатувда яра чуқурчасидаги қон кетаётган томир ва (ёки) нуқсон периметри бўйлаб тўқималарнинг электрокоагуляцияси қўлланилди. Асосий гуруҳда даволаш чора-тадбирлари учун эндогемостазнинг ишлаб чиқилган гибрид эндовидеолапароскопик усули қўлланилди.



1-расм. Қон кетиши билан асоратланган меъда ярасининг диафаноскопияда стандарт лапароскопик (а) ва гастроскопик (б) кўриниши

Операция пайтида троакарлар ўрнатилгандан сўнг, ошқозон олдиндан ювилгач, ошқозон зонди ўрнига эндоскопист қон кетиш манбасини кўриш мақсадида ошқозон ёки ўн икки бармоқли ичакка эндоскопни киритди (1-расм). Жарроҳ ва эндоскопист иши биргаликда олиб борилди (2-расм).

Клиникамизда биз комбинацияланган гибрид эндолапароскопик аралашувларда қон кетиш манбасини аниқлаш усулини ишлаб чиқдик.

Бунда қон кетиш нуқтасини кўриш эндоскоп чироғининг ёруғлиги (диафоноскопия) ёрдамида амалга оширилади. Жарроҳ ва эндоскопистнинг ҳамкорликдаги иши жарроҳлик аралашувининг бутун давомида қон кетиш манбасини кўришни таъминлайди.



2-расм. Жарроҳлик ва эндоскопик гуруҳнинг жойлашуви

Ишлаб чиқилган усул жарроҳга ичи бўш абзони очмасдан қон кетиш манбаининг жойлашувини аниқ аниқлаш имконини берди. Қон кетиш манбаи аниқлангач, қон кетаётган томирни транссерроз тикиш ёки уни клипслар ёрдамида боғлаш амалга оширилди.

Асосий гуруҳдаги 25 нафар (60,9%) беморда қон кетаётган яра ўн икки бармоқли ичакнинг олдинги ёки олдинги-ён булбар қисмида жойлашган эди. А. гастриса дextra, а. гастродуоденалис, а. гастрооменталис дextra шохларини транссерроз тикиш амалга оширилди. 6 та ҳолатда артерия поясининг ўзи боғланди ва 2 та ҳолатда битишма жараёни туфайли қон кетишини тўхтатиш шубҳали бўлганлиги сабабли, қонаётган ярани лапароскопик кесиб олиш бажарилди.

5 нафар (12,2%) беморда яралар ошқозон танаси соҳасида жойлашган эди: а. гастриса дextra, а. гастриса синистра, а. гастрооменталис дextra, а. гастрооменталис синистра, а. гастрисае бревес, а. лиеналис шохларини транссерроз тикиш амалга оширилди. 9 нафар (21,9%) беморда яралар пилороантрал зонада жойлашган эди. А. гастриса дextra, а. гастрооменталис дextra шохларини транссерроз тикиш амалга оширилди. 2 нафар (4,9%) беморда яралар ошқозон кардияси соҳасида жойлашган эди. А. гастриса синистра, а. гастрисае бревес, р. эсопхагус шохларини транссерроз тикиш амалга оширилди.

Биз қон кетишининг қайталаниш частотаси, мажбурий операциялар частотаси ва ўлим кўрсаткичини ўргандик. Бу даволаш натижаларига таъсир қилувчи энг муҳим кўрсаткич ҳисобланади. Иккала гуруҳ натижаларини статистик қайта ишлашда рецидивнинг ривожланиш даражаси бўйича сезиларли фарқ аниқланди ($p = 0,012421$, Пирсон усули). Назорат гуруҳида қон кетишини эндоскопик тўхтатишнинг иккита усули қўлланилди ва гемостаздан кейинги қайталанишлар сони ФИА ва ФИБ да ФПА ва ФПБ гуруҳига қараганда статистик жиҳатдан юқори бўлди ($p = 0,0103$, ФШернинг аниқ мезони). ФИА фаол қон кетишида қайталаниш частотаси 17 нафар бемордан 4 нафарини (23,5%), ФИБ гуруҳида 13 нафар бемордан 5 нафарини (38,4%) ташкил этди ва ФШернинг аниқ мезони ёрдамида фарқнинг статистик аҳамияти аниқланмади ($p < 0,05$).

Рецидивлар сони бўйича инъексион усулни ЭКГ билан таққослаганда, инъексион усул ва электрокоагуляция қўлланилганда ($p = 0,0112$, ФШернинг аниқ мезони) гибрид эндовидеолапароскопик усулга нисбатан статистик жиҳатдан сезиларли даражада кўпроқ рецидивлар кузатилди. Инъексион усул қўлланилгандан сўнг содир бўлган қон кетишларда (ФП) қайталаниш частотаси 23 бемордан 4 тасини (17,4%), коагулянтсион эндогемостазда эса 24 бемордан 2 тасини (8,35%) ($p > 0,05$) ташкил этди (2-жадвал).

Гемостаз усули ва қон кетиш интенсивлигига қараб ярали гастродуоденал қон кетишнинг қайталаниш частотаси (Ж. Форрест бўйича)

Кўрсаткич	Гуруҳларда гемостаз усули											
	Инъекциялар (n=37)				ЭКГ (n=43)				Эндовидеолапароскопик усул (n=41)			
	Частота		Ретсидив		Частота		Ретсидив		Частота		Ретсидив	
	абс %	абс	% абс	%	абс %	абс	% абс	%	IA	6	16,2	1
16,6	11	25,6	3	27,2	6	14,6	1	16,6	IB	6	16,2	3
50	7	16,2	2	28,5	7	16,2	2	28,5	8	19,5	1	12,5
IIA	14	37,8	2	14,3	13	30,2	1	7,7	14	34,1	1	7,1
IIB	9	24,3	2	22,2	11	25,6	1	9,1	11	26,8	-	-
IIC	2	5,4	-	-	-	-	-	-	1	2,4	-	-
III	-	-	-	-	1	2,3	-	-	1	2,4	-	-
Жами	37	46,2	8	21,6	43	53,8	7	16,3	41	100	3	7,3


Изоҳ: Фишернинг аниқ мезони ёрдамида таққослаш ($p > 0,05$).

ФIIA ва FIIb гуруҳларида қон кетишини тўхтатишнинг комбинацияланган гибрид эндовидеолапароскопик усули билан эндоскопик усул вариантларини таққослаганда, комбинацияланган усул фойдасига статистик жиҳатдан сезиларли фарқ ($p < 0,05$) аниқланди ($r = 0,0138$, Фишернинг аниқ мезони).

Юқорида келтирилган таҳлиллардан шундай хулоса қилиш мумкинки, давом этаётган ва тўхтаган қон кетишда комбинацияланган эндолапароскопик тўхтатиш усулини қўллаш эндоскопик гемостазнинг икки вариантыга нисбатан самаралироқ ва статистик жиҳатдан аҳамиятлироқдир ($p < 0,05$).

Асосий гуруҳдаги Форрест Ia - Ib натижаларини таҳлил қилганда, 2 нафар беморда (4,8%) бирламчи эндогемостазнинг самарасизлиги туфайли мажбурий жарроҳлик амалиёти зарурати юзага келди. Чунки 2 нафар беморда операция соҳасининг чандикли деформацияси туфайли қон кетишини субсероз тўхтатиш имконсиз эди. Уларнинг 2 нафарида ошқозон резекцияси ва 1 нафарида қон кетаётган яранинг тикилиши амалга оширилди. Барча беморлар соғайиб кетишди.

Форрест Ia - Ib да назорат гуруҳи натижаларининг таҳлили шуни кўрсатдики, жарроҳлик фаоллиги 8 (26,6%) ни ташкил этди. 5 ҳолатда ошқозон резекция қилинди ва 3 ҳолатда қон кетаётган томир тикилди. 1 (3,3%) ҳолатда анастомоз чокларининг етишмовчилиги туфайли юзага келган перитонит сабабли ўлим ҳолати кузатилди (3-расм).




3-расм. Форрест Ia - Ib да мажбурий операциялар частотаси ва ўлим кўрсаткичи

Форрест IIa -IIb ҳолатидаги асосий ва назорат гуруҳидаги натижалар таҳлил қилинганда, 1 нафар беморда операциядан кейинги фаоллик кузатилган. Қон кетиш манбаи аниқланмаган, бироқ


давом этаётган қон кетиш белгилари сабабли ўтказилган операция пайтида ўн икки бармоқли ичакнинг орқа деворида яра аниқланган. Шу сабабли, беморлар шошилиш кўрсатмалар асосида операция қилинган. Назорат гуруҳида қон кетишнинг қайталаниши 5 (10,6%) ҳолатда кузатилиб, беморларга ошқозон резекцияси амалга оширилган. Операциядан кейинги ўлим ҳолати иккала гуруҳда ҳам кузатилмаган (4-расм).

Умуман олганда, асосий гуруҳда мажбурий операциялар частотаси ўлим ҳолатлари кузатилмаган ҳолда 3 (7,3%) ни ташкил этди. Назорат гуруҳида эса операция фаоллиги 13 (16,33%) ва 1 ўлим ҳолати қайд этилди (5-расм).

Шундай қилиб, биз томонимиздан ишлаб чиқилган гибрид эндолапараскопик усул эндогемостазнинг бошқа усулларига нисбатан юқори самарадорликни кўрсатди. Унда мажбурий операциялар частотаси 7,3% ни ташкил қилиб, инексион ва электрокоагулятсион эндоскопик усулларнинг 16,3% кўрсаткичидан пастроқ. Бу усулнинг ўлим кўрсаткичи 0% бўлиб, бошқа усулларнинг 1,3% кўрсаткичидан яхшироқ натижа берди. Бу эса уни клиникада гастродуоденал қон кетишини тўхтатиш учун тавсия этиш имконини беради.



4-расм. Форрест IIa - IIb да мажбурий операциялар частотаси ва ўлим кўрсаткичи



5-расм. Мажбурий операциялар частотаси ва умумий ўлим кўрсаткичи

Хулосалар:

1. Ж. Роскалл хавф шкаласи бўйича қон кетиш хавфи юқори бўлган беморларда эндоскопик йўналтириш ва гемостаз самарадорлигини кузатиш орқали қон кетаётган ярани лапароскопик тикиш билан гибрид жарроҳлик аралашувини бажариш устувор ҳисобланади.

2. Лапароскопик ва эндоскопик технологияларни гибрид қўллаш орқали ЮҚТКни жарроҳлик йўли билан даволашнинг тактик-техник жиҳатларини такомиллаштириш Форрест Ia-Иб ҳолатларида мажбурий операциялар сонини 26,6% дан 14,3% гача, Форрест Па-Иб ҳолатларида эса 10,6% дан 3,7% гача камайтириш имконини берди.

3. Ишлаб чиқилган ва клиник амалиётга жорий этилган юқори технологияли гемостаз усули - қон кетаётган ярани эндоскопик йўналтириш орқали лапароскопик тикиш - такрорий қон кетиш ҳолатларини эндоскопик инъекцияда 21,6% дан ва эндоскопик коагуляцияда 16,3% дан таклиф этилган усулда 7,3% гача камайтириш, ўлим кўрсаткичини эса бартараф этиш имконини берди (таққослаш гуруҳида 1,3%).

Адабиётлар рўйхати:

1. Abraham N. S. Comparative risk of gastrointestinal bleeding with dabigatran, rivaroxaban, and warfarin: population based cohort study. / Abraham NS. and [et al.] // BMJ. - 2015.- V.- 350.- P.1857- 1861
2. Agreus L. Value of the “Test & Treat” Strategy for Uninvestigated Dyspepsia at Low Prevalence Rates of Helicobacter pylori in the Population. Helicobacter / L. Agreus, N.J. Talley, M. Jones //- 2016.V.-21.- P.186–191.
3. Bager P. Randomised clinical trial: oral vs. intravenous iron after upper gastrointestinal haemorrhage--a placebo-controlled study / P. Bager, J.F. Dahlerup // Aliment Pharmacol Ther. -2014/- V.39(2).- P.176–87.
4. Beales I.L. Decisions on restarting anticoagulation should be made earlier after rebleeding / I.L. Beales // BMJ.-2016.-P.532
5. Brooks J. Prevention of upper gastrointestinal haemorrhage: current controversies and clinical guidance / J. Brooks, R. Warburton, I.L. Beales // Ther Adv Chronic Dis. – 2013.-V.-4(5).-P. 206–22
6. Chan EW. Prevention of Dabigatran-Related Gastrointestinal Bleeding With Gastroprotective Agents: A Population-Based Study / E.W. Chan and [et al]// Gastroenterology. – 2015.-V.- 149(3).-P.586–95
7. Chan FK. Similar Efficacy of Proton-Pump Inhibitors vs H2-Receptor Antagonists in Reducing Risk of Upper Gastrointestinal Bleeding or Ulcers in High-Risk Users of Low-Dose Aspirin / F.K. Chan and [et al.]// Gastroenterology. -2017.-V.- 152(1).-P.105–110
8. Chan SM. of the Over-The-Scope Clip for treatment of refractory upper gastrointestinal bleeding: a case series/ S.M. Chan and [et al.]// Endoscopy. – 2014.-V.-46(5).-P.428–31.
9. Changela K. Hemostatic powder spray: a new method for managing gastrointestinal bleeding. / K Changela, H. Papafragkakis // Therap Adv Gastroenterol. -2015.-V.-8(3).-P.125–35.
10. Тимербулатов Ш.В., Тимербулатов М.В., Сагитов Р.Б., Тимербулатов В.М., Гафарова А.Р. Язвенные гастродуоденальные кровотечения: современное состояние проблемы // Медицинский вестник Башкортостана. — 2020. — Т. 15, № 2. — С. 85–96
11. Романцов М.Н., Чередников Е.Ф., Бондаренко А.А., Якушев Ф.К. Новые технологии эндоскопического гемостаза в протоколе лечения пациентов с гастродуоденальными кровотечениями // Вестник экспериментальной и клинической хирургии. — 2020. — Т. 13, № 2. — С. 78–84.

Иктибос учун: Хурсанов Ё.Э., Мавлонов А.Х., Хидиров М.С., Мирзабоев А.М., Караев М.Н. Гастродуоденал қон кетишларда клинко-прогностик баҳолаш асосида жарроҳлик тактикасини оптималлаштириш // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2026. – № 4(24). – Б. 830–836. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19703556>

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ПСОРИАЗА И ЭКЗЕМАТОЗНЫХ ДЕРМАТОЗОВ**Назаров Ж.А.¹, Толибов М.М.²**¹Самаркандский университет Зармед, г. Самарканд, Узбекистан²Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Актуальность. Псориаз и экзематозные дерматозы часто имеют сходные клинические и морфологические проявления, что затрудняет их своевременную дифференциальную диагностику, особенно при атипичных формах и поражении анатомически сложных зон. Цель исследования. Повысить точность дифференциальной диагностики псориаза и экзематозных дерматозов на основе комплексной оценки клинических, дерматоскопических и морфологических признаков. Материалы и методы. Обследованы 87 больных в возрасте от 18 до 65 лет: 47 с псориазом и 40 с экзематозными дерматозами. Всем пациентам проводили клинко-дерматологическое обследование, дерматоскопию, а в сложных случаях — морфологическое исследование кожи. Результаты. Для псориаза были характерны чётко отграниченные эритематозно-сквамозные очаги, сухие серебристо-белые чешуйки, симметричность поражения и типичная локализация. Для экзематозных дерматозов — выраженный зуд, нечёткие границы очагов, экссудация, серозные корки и лихенификация. Дерматоскопически при псориазе выявлялись равномерные точечные сосуды на фоне беловатого шелушения, при экзематозных дерматозах — желтоватые чешуйки и полиморфный сосудистый рисунок. Морфологически при псориазе преобладали акантоз и паракератоз, при экзематозных дерматозах — спонгиоз и периваскулярная воспалительная инфильтрация. Заключение. Комплексная оценка клинических, дерматоскопических и морфологических признаков повышает точность дифференциальной диагностики и способствует выбору рациональной терапии.

Ключевые слова: псориаз, экзематозные дерматозы, дифференциальная диагностика, дерматоскопия, морфология.

DIFFERENTIAL DIAGNOSIS OF PSORIASES AND EXEMATOUS DERMATOSIS**Nazarov J.A.¹, Tolibov M.M.²**¹Samarkand University Zarmed, Samarkand, Uzbekistan²Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Relevance. Psoriasis and eczematous dermatoses often have similar clinical and morphological manifestations, which complicates their timely differential diagnosis, especially in cases of atypical forms and involvement of anatomically complex areas. Purpose of the study. Improve the accuracy of differential diagnosis of psoriasis and eczematous dermatoses based on a comprehensive assessment of clinical, dermatoscopic, and morphological signs. Materials and methods. 87 patients aged 18 to 65 years were examined: 47 with psoriasis and 40 with eczematous dermatoses. All patients underwent clinical and dermatological examination, dermatoscopy, and in complex cases, morphological skin examination. Results. Psoriasis was characterized by clearly defined erythematous-squamous foci, dry silvery-white scales, symmetrical lesions, and typical localization. For eczematous dermatoses, pronounced itching, unclear focal boundaries, exudation, serous crusts, and lichenification are observed. Dermatoscopically, uniform punctate vessels were identified in psoriasis against a background of whitish peeling, while in eczematous dermatoses, there were yellowish scales and a polymorphic vascular pattern. Morphologically, acanthosis and parakeratosis predominated in psoriasis, while spongiosis and perivascular inflammatory infiltration predominated in eczematous dermatoses. Conclusion. Comprehensive assessment of clinical, dermatoscopic, and morphological signs enhances the accuracy of differential diagnosis and contributes to the selection of rational therapy.

Keywords: psoriasis, eczematous dermatoses, differential diagnosis, dermatoscopy, morphology.

ПСОРИАЗ ВА ЭКЗЕМАТОЗ ДЕРМАТОЗЛАРНИНГ ДИФФЕРЕНЦИАЛ ТАШХИСИ**Назаров Ж.А.¹, Толибов М.М.²**¹Самарканд Зармед университети, Самарканд ш., Ўзбекистон²Самарканд давлат тиббиёт университети, Самарканд ш., Ўзбекистон

Резюме. Долзарблиги. Псориаз ва экзематоз дерматозлар кўпинча ўхшаш клиник ва морфологик кўринишларга эга бўлиб, бу уларни ўз вақтида қиёсий ташиxisлашни қийинлаштиради, айниқса атипик шаклларда ва анатомик жиҳатдан мураккаб соҳаларни зарарлаганда. Тадқиқотнинг мақса-

ди. Клиник, дерматоскопик ва морфологик белгиларни комплекс баҳолаш асосида псориаз ва экзематоз дерматозларни қиёсий таҳлисли аниқлигини ошириш. Материаллар ва усуллар. 18 ёшдан 65 ёшгача бўлган 87 нафар бемор тегиштирилди: 47 нафари псориаз ва 40 нафари экзематоз дерматозлар билан. Барча беморларда клиник-дерматологик тегиштирув, дерматоскопия, мураккаб ҳолатларда эса терининг морфологик тегиштируви ўтказилди. Натижалар. Псориаз учун аниқ чегараланган эритематоз-сквамоз ўчоқлар, қуруқ кумуиранг-оқ тангачалар, шикастланишнинг симметриклиги ва типик жойлашуви хос эди. Экзематоз дерматозлар учун - кучли қичишиш, ўчоқлар чегараларининг ноаниқлиги, экссудация, сероз қатқалоқлар ва лихенификация кузатилади. Дерматоскопик усулда псориазда оқши қипиқланиш фониди бир текис нуқтали томирлар, экзематоз дерматозларда сарғиш тангачалар ва полиморф қон томир тасвири аниқланди. Морфологик жиҳатдан псориазда акантоз ва паракератоз, экзематоз дерматозларда спонгиоз ва периваскуляр яллиғланиш инфилтратсияси устунлик қилди. Хулоса. Клиник, дерматоскопик ва морфологик белгиларни комплекс баҳолаш қиёсий таҳлис аниқлигини оширади ва оқилона даволашни танлашга ёрдам беради.

Калит сўзлар: псориаз, экзематоз дерматозлар, дифференциал диагностика, дерматоскопия, морфология.

e-mail: jamshid1852086@gmail.com, mansur_tolibov@sammu.uz

Введение. Псориаз и экзематозные дерматозы относятся к числу наиболее распространённых хронических воспалительных заболеваний кожи и представляют значимую медико-социальную проблему современной дерматовенерологии. Актуальность данной темы обусловлена высокой распространённостью указанных дерматозов, их рецидивирующим течением, выраженным негативным влиянием на качество жизни пациентов, а также частыми трудностями своевременной клинической верификации диагноза [1, 2]. Несмотря на существенные различия в патогенезе, клинической эволюции и терапевтических подходах, псориаз и экзематозные дерматозы нередко имеют сходные морфологические признаки, что создаёт предпосылки для диагностических ошибок и назначения недостаточно обоснованного лечения [2, 3].

Псориаз рассматривается как хроническое иммуновоспалительное заболевание кожи с ведущей ролью оси IL-23/Th17, гиперпролиферацией кератиноцитов и нарушением процессов их дифференцировки. В классических случаях заболевание проявляется чётко отграниченными эритематозно-сквамозными бляшками с серебристо-белым шелушением, преимущественно локализующимися на разгибательных поверхностях конечностей, волосистой части головы и в пояснично-крестцовой области [2, 4]. Однако клиническая картина псориаза может существенно варьировать в зависимости от формы заболевания, локализации очагов и стадии воспалительного процесса. Особые диагностические трудности возникают при инверсном, себорейноподобном, ладонно-подошвенном и ограниченном псориазе, когда заболевание утрачивает типичные клинические черты и приобретает сходство с экзематозными поражениями кожи [2, 5].

Экзематозные дерматозы представляют собой гетерогенную группу воспалительных заболеваний кожи, в которую входят атопический дерматит, контактный дерматит, хроническая экзема кистей, себорейный дерматит и ряд других состояний. Для них характерны зуд, сухость кожи, нарушение эпидермального барьера, воспалительная инфильтрация, склонность к экссудации, формированию корок и лихенификации при хроническом течении [1, 6]. В то же время в хронической стадии многие экзематозные процессы сопровождаются инфильтрацией, гиперкератозом и шелушением, что клинически может имитировать псориатические бляшки [1, 3]. Это особенно важно в повседневной дерматологической практике, где разграничение данных заболеваний определяет выбор наружной терапии, системного лечения и дальнейшей тактики ведения пациента [3, 6].

Существенные сложности дифференциальной диагностики отмечаются при поражении волосистой части головы, лица, кожных складок, ладоней и подошв. В этих анатомических зонах как псориаз, так и экзематозные дерматозы могут протекать атипично, сопровождаться сходным эритематозно-сквамозным синдромом и не иметь классических клинических ориентиров [5, 7]. Так, при локализации процесса на волосистой части головы особенно часто проводится дифференциальный диагноз между псориазом и себорейным дерматитом, а при поражении кистей и подошв — между ладонно-подошвенным псориазом и хронической экземой [5, 7, 8].

В последние годы всё большее значение в диагностике воспалительных дерматозов приобретают неинвазивные визуальные методы, прежде всего дерматоскопия и трихоскопия. Показано, что при псориазе дерматоскопическая картина чаще характеризуется равномерно распределёнными точечными сосудами на фоне беловатого шелушения, тогда как для экзематозных дерматозов более типичны

желтоватые чешуйки, серозные корки и менее упорядоченный сосудистый рисунок [5, 8, 9]. Применение дерматоскопии особенно ценно в случаях стёртой клинической картины и при локализации очагов в анатомически сложных областях, где визуальный осмотр не всегда позволяет уверенно установить диагноз [5, 9].

Не менее важное значение сохраняет морфологическое исследование кожи. Для псориаза наиболее характерны регулярная псориазiformная акантозная перестройка эпидермиса, паракератоз, гипогранулёз, удлинение эпидермальных выростов, расширение капилляров сосочкового слоя дермы и наличие нейтрофильных скоплений в роговом слое [2, 10]. Экзематозные дерматозы, напротив, чаще сопровождаются спонгиозом, внутрислойной везикуляцией, экзоцитозом лимфоцитов, серозным экссудатом и поверхностным периваскулярным воспалительным инфильтратом [6, 8]. Вместе с тем современные исследования подчёркивают, что при хронической экземе может наблюдаться псориазiformная гиперплазия, а при псориазе в ряде случаев встречаются признаки спонгиоза, что ещё раз подтверждает необходимость комплексной интерпретации морфологических данных [3, 10].

Современные представления также указывают на существование перекрёстных иммуновоспалительных фенотипов и состояний overlap между псориазом и атопическим дерматитом, что делает проблему дифференциальной диагностики ещё более актуальной [11]. В этой связи точная диагностика должна основываться не только на оценке клинической картины, но и на совокупном анализе анамнестических данных, локализации высыпаний, субъективной симптоматики, дерматоскопических и, при необходимости, гистопатологических признаков [2, 5, 11].

Таким образом, дифференциальная диагностика псориаза и экзематозных дерматозов остаётся одной из наиболее значимых задач современной дерматовенерологии. Её решение имеет принципиальное значение для повышения точности диагностики, оптимизации терапии и улучшения прогноза у данной категории пациентов.

Цель исследования: повысить точность дифференциальной диагностики псориаза и экзематозных дерматозов на основании комплексной оценки клинических, дерматоскопических и морфологических признаков у обследованных больных.

Материалы и методы исследования. Исследование проведено на базе специализированного дерматовенерологического отделения. Обследованы 87 больных с хроническими воспалительными заболеваниями кожи в возрасте от 18 до 65 лет. Из них 47 пациентов составили группу с псориазом, а 40 больных — группу с экзематозными дерматозами.

Всем пациентам проводили клинико-дерматологическое обследование, включавшее сбор жалоб и анамнеза, оценку локализации, распространённости, характера высыпаний, выраженности шелушения, инфильтрации, зуда, экссудации и лихенификации. С целью дифференциальной диагностики выполняли дерматоскопию очагов поражения. При диагностически сложных случаях проводилось морфологическое исследование кожи.

Полученные данные использовали для сравнительной оценки клинических, дерматоскопических и морфологических признаков у больных псориазом и экзематозными дерматозами.

Результаты исследования. В результате проведённого обследования 87 больных с хроническими воспалительными заболеваниями кожи были выявлены клинико-диагностические особенности, имеющие существенное значение для дифференциальной диагностики псориаза и экзематозных дерматозов. Из общего числа обследованных 47 пациентов страдали псориазом, а 40 больных были отнесены к группе экзематозных дерматозов.

У больных псориазом клиническая картина в большинстве случаев характеризовалась наличием чётко отграниченных эритематозно-сквамозных очагов, представленных папулами и бляшками различной величины, склонными к слиянию и образованию распространённых инфильтрированных участков поражения. Наиболее типичной локализацией высыпаний являлись разгибательные поверхности локтевых и коленных суставов, волосистая часть головы, пояснично-крестцовая область. У значительной части пациентов отмечалась симметричность поражения, что являлось одним из характерных клинических признаков. Поверхность очагов была покрыта сухими серебристо-белыми чешуйками, а при поскабливании у ряда больных выявлялись типичные псориатические феномены, подтверждающие диагноз. Кроме того, у части пациентов наблюдалось поражение ногтевых пластинок в виде точечных вдавлений, помутнения, подногтевого гиперкератоза, что также служило дополнительным диагностическим ориентиром в пользу псориаза.

У пациентов группы экзематозных дерматозов клиническая картина отличалась большей вариабельностью. Очаги поражения чаще имели менее чёткие границы, сопровождались выраженной гиперемией, отёчностью, сухостью кожи, а в ряде случаев — участками мокнутия, серозными корками

и эксфолиациями. Одним из ведущих симптомов у больных данной группы являлся интенсивный зуд, который был выражен значительно сильнее, чем у пациентов с псориазом. При хроническом течении экзематозных дерматозов часто отмечались признаки лихенификации, усиление кожного рисунка, трещины и участки уплотнения кожи. Наиболее частой локализацией патологического процесса являлись сгибательные поверхности конечностей, кисти, лицо, шея, а также область кожных складок. Таким образом, уже на этапе клинического осмотра выявлялись различия в морфологии очагов, степени выраженности зуда, характере шелушения и наличии экссудативного компонента.

При сравнительном анализе установлено, что для больных псориазом были более характерны инфильтрация очагов, сухой характер шелушения, чёткие границы поражения и типичная симметричная локализация. Для больных экзематозными дерматозами, напротив, более типичными оказались выраженный зуд, склонность к экссудации, образование корок, сухость кожи, лихенификация и менее чёткое отграничение воспалительных очагов. Эти различия имели важное значение в повседневной клинической практике, особенно при первичном осмотре пациента.

Проведённая дерматоскопия позволила выявить дополнительные визуальные критерии, повышающие точность дифференциальной диагностики. У больных псориазом наиболее часто определялись равномерно распределённые точечные сосуды на фоне светлого или беловатого шелушения. Такой сосудистый рисунок был относительно однотипным и упорядоченным, что рассматривалось как характерный дерматоскопический признак псориазического поражения кожи. У части пациентов также отмечались участки выраженного гиперкератоза и диффузного белесоватого шелушения.

У больных экзематозными дерматозами дерматоскопическая картина имела иные особенности. Для них были более характерны желтоватые чешуйки, серозные корки, участки эксфолиаций и микротрещин, а также менее равномерный, полиморфный сосудистый рисунок. В случаях хронической экземы нередко визуализировались участки лихенификации и гиперпигментации, тогда как при подострых и экссудативных формах отмечались признаки серозного воспаления. Таким образом, дерматоскопия позволила уточнить характер воспалительного процесса и служила ценным дополнительным методом в спорных клинических ситуациях.

Морфологическое исследование кожи, выполненное у части пациентов с атипичными или диагностически сложными формами заболевания, также продемонстрировало ряд существенных различий между исследуемыми группами. У больных псориазом наиболее часто выявлялись акантоз, паракератоз, удлинение эпидермальных выростов, неравномерное утолщение эпидермиса и воспалительная инфильтрация дермы. Эти изменения отражали хронический пролиферативно-воспалительный характер псориазического процесса.

У пациентов с экзематозными дерматозами морфологическая картина чаще характеризовалась явлениями спонгиоза, серозного пропитывания эпидермиса, наличием воспалительной клеточной инфильтрации вокруг сосудов дермы, а в отдельных случаях — признаками везикуляции. При хронических формах экземы также выявлялись гиперкератоз и акантоз, однако они сочетались с более выраженными признаками межклеточного отёка и воспалительного экссудативного компонента. Это подтверждало, что морфологический метод исследования имеет особенно большое значение при стёртых, атипичных и перекрывающихся клинических вариантах заболевания.

На основании комплексного анализа полученных данных установлено, что наиболее информативными диагностическими критериями псориаза являлись: чёткие границы очагов поражения, симметричность высыпаний, сухие серебристо-белые чешуйки, инфильтрация бляшек, типичная локализация на разгибательных поверхностях и волосистой части головы, а также равномерные точечные сосуды при дерматоскопии.

Для экзематозных дерматозов наиболее значимыми признаками были: выраженный зуд, менее чёткие границы очагов, склонность к мокнутию, наличие серозных корок, сухость кожи, лихенификация, поражение сгибательных поверхностей и кожных складок, а также желтоватые чешуйки и полиморфный сосудистый рисунок при дерматоскопии.

Таким образом, результаты исследования показали, что дифференциальная диагностика псориаза и экзематозных дерматозов должна основываться не на одном отдельном признаке, а на комплексной оценке клинических, дерматоскопических и морфологических данных. Использование такого подхода позволило более точно разграничить указанные заболевания, снизить вероятность диагностических ошибок и повысить обоснованность выбора дальнейшей лечебной тактики.

Выводы: Проведённое исследование показало, что дифференциальная диагностика псориаза и экзематозных дерматозов остаётся одной из актуальных задач современной дерматовенерологии, что связано со сходством ряда клинических проявлений, особенно при хроническом, атипичном и ограниченном течении заболеваний. Установлено, что для псориаза наиболее характерны чётко отграни-

ченные эритематозно-сквамозные очаги, симметричность поражения, сухое серебристо-белое шелушение, инфильтрация и типичная локализация на разгибательных поверхностях и волосистой части головы. Для экзематозных дерматозов более типичны выраженный зуд, менее четкие границы очагов, склонность к экссудации, образованию серозных корок, сухость кожи, лихенификация и преимущественное поражение сгибательных поверхностей и кожных складок.

Результаты исследования подтвердили высокую диагностическую значимость дерматоскопии как дополнительного неинвазивного метода обследования. У больных псориазом наиболее информативными признаками являлись равномерно распределённые точечные сосуды и беловатое шелушение, тогда как при экзематозных дерматозах чаще выявлялись желтоватые чешуйки, серозные корки, эксориации и полиморфный сосудистый рисунок. Морфологическое исследование кожи в диагностически сложных случаях позволило уточнить характер патологического процесса и подтвердило, что для псориаза более характерны акантоз, паракератоз и удлинение эпидермальных выростов, а для экзематозных дерматозов — спонгиоз, серозное пропитывание эпидермиса и периваскулярная воспалительная инфильтрация.

Таким образом, наиболее эффективным подходом к разграничению псориаза и экзематозных дерматозов является комплексная оценка клинических, дерматоскопических и морфологических признаков. Применение такого подхода способствует повышению точности диагностики, снижению вероятности клинических ошибок и выбору более обоснованной лечебной тактики. Полученные данные могут быть использованы в практической дерматовенерологии для совершенствования алгоритмов обследования пациентов с хроническими воспалительными заболеваниями кожи.

Список литературы:

1. Ding N., Li Y., Zhao Z., et al. Differential diagnosis of eczema and psoriasis using routine laboratory tests and machine learning: development of a web-based prediction model // *Frontiers in Medicine*. 2025. Vol. 12. Article 1667794.
2. Johnson M.A.N., Armstrong A.W. Clinical and histologic diagnostic guidelines for psoriasis: a critical review // *Clinical Reviews in Allergy & Immunology*. 2013. Vol. 44, No. 2. P. 166–172.
3. Chau T., Parsi K.K., Ogawa T., Kiuru M., Konia T., Li C.S., Fung M.A. Psoriasis or not? Review of 51 clinically confirmed cases reveals an expanded histopathologic spectrum of psoriasis // *Journal of Cutaneous Pathology*. 2017. Vol. 44, No. 12. P. 1018–1026.
4. Kimmel G.W., Lebwohl M.G. Psoriasis: overview and diagnosis // *Acta Dermato-Venereologica*. 2018. Vol. 98, No. 5. P. 443–450.
5. Golińska J., Sar-Pomian M., Rudnicka L. Diagnostic accuracy of trichoscopy in inflammatory scalp diseases: a systematic review // *Dermatology*. 2022. Vol. 238, No. 3. P. 412–421.
6. Brănișteanu D.E., Cojocaru C., Porumb-Andrese E., et al. Diagnostic and therapeutic challenges in psoriasis-atopic dermatitis overlap: a retrospective observational cohort study // *Diagnostics*. 2025. Vol. 15, No. 11. Article 1381.
7. Kibar M., Aktan Ş., Bilgin M. Dermoscopic findings in scalp psoriasis and seborrheic dermatitis; two new signs; signet ring vessel and hidden hair // *Indian Journal of Dermatology*. 2015. Vol. 60, No. 1. P. 41–45.
8. Zappia E., Bianchi L., Campione E., et al. Hand eczema: a review of clinical, dermoscopic and histological features // *Diagnostics*. 2024. Vol. 14, No. 13. Article 1393.
9. Wu Y., Sun Q., Zhang X., et al. Clinical value of dermoscopy in psoriasis // *Journal of Cosmetic Dermatology*. 2024. Vol. 23. P. 1707–1715.
10. Jain R., Singh K., Bains A., et al. Insights into the epidemiological, clinical, histopathological, and dermoscopic aspects of chronic plaque psoriasis // *Cureus*. 2024. Vol. 16, No. 9. Article e71464.
11. Li M., Zhang Y., Xu H., et al. Beyond the dichotomy: understanding the overlap between atopic dermatitis and psoriasis // *Frontiers in Immunology*. 2025. Vol. 16. Article 1541776.

Для цитирования: Назаров Ж.А., Толибов М.М. Дифференциальная диагностика псориаза и экзематозных дерматозов // *Вестник фундаментальной и клинической медицины*. – 2026. – № 4(24). – С. 837–841. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19703636>

КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГРИБКОВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ КОЖИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ**Абдуллаев Д.М.**

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Грибковые заболевания кожи сохраняют высокую актуальность в современной дерматовенерологии вследствие значительной распространённости, склонности к хроническому и рецидивирующему течению, клинического полиморфизма и выраженного медико-социального значения. Цель исследования — изучить клинико-эпидемиологические особенности грибковых заболеваний кожи в современных условиях. Материалы и методы. Исследование проведено на базе специализированного дерматовенерологического отделения. Обследованы 84 пациента в возрасте от 18 до 67 лет с клинически и лабораторно подтверждёнными грибковыми заболеваниями кожи. Диагноз устанавливался на основании жалоб, анамнеза, клинического осмотра и микроскопического исследования чешуек кожи. Изучались клинические формы заболевания, локализация поражения, длительность течения, частота рецидивов, а также основные эпидемиологические, бытовые и соматические факторы риска. Результаты. Установлено, что грибковые заболевания кожи наиболее часто встречались у лиц молодого и среднего возраста, преимущественно у мужчин. В структуре клинических форм преобладали микозы стоп, микозы гладкой кожи и паховая эпидермофития. Наиболее значимыми факторами риска являлись гипергидроз, ношение тесной закрытой обуви, использование синтетической одежды, посещение общественных бань, бассейнов и спортивных залов, а также несоблюдение правил личной гигиены. Важную роль в развитии и хронизации патологического процесса играли сопутствующие соматические заболевания, прежде всего сахарный диабет, ожирение и сосудистые нарушения. Для значительной части пациентов были характерны позднее обращение за медицинской помощью, длительное течение заболевания и склонность к рецидивированию. Заключение. Грибковые заболевания кожи в современных условиях характеризуются высокой распространённостью, клиническим полиморфизмом, наличием атипичных форм и высокой частотой рецидивов. Полученные данные обосновывают необходимость совершенствования ранней диагностики, обязательной лабораторной верификации диагноза, комплексного учёта факторов риска и усиления профилактических мероприятий.

Ключевые слова: грибковые заболевания кожи, микозы кожи, дерматомикозы, клинико-эпидемиологические особенности, факторы риска, рецидивы, диагностика, профилактика.

CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL FEATURES OF FUNGAL DISEASES OF THE SKIN IN MODERN CONDITIONS**Abdullayev D.M.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Fungal skin diseases remain highly relevant in modern dermatovenereology due to their significant prevalence, tendency to chronic and recurrent course, clinical polymorphism, and pronounced medical and social significance. The purpose of the study is to study the clinical and epidemiological features of fungal skin diseases in modern conditions. Materials and methods. The study was conducted on the basis of a specialized dermatovenereology department. 84 patients aged 18 to 67 with clinically and laboratoryally confirmed fungal skin diseases were examined. The diagnosis was made based on complaints, medical history, clinical examination, and microscopic examination of the skin scales. The clinical forms of the disease, the localization of the lesion, the duration of its course, the frequency of relapses, as well as the main epidemiological, household, and somatic risk factors were studied. Results. It has been established that fungal skin diseases are most common in young and middle-aged individuals, predominantly in men. In the structure of clinical forms, foot mycoses, smooth skin mycoses, and inguinal epidermophytosis prevailed. The most significant risk factors were hyperhidrosis, wearing tightly closed shoes, using synthetic clothing, visiting public baths, swimming pools, and sports halls, and not following personal hygiene rules. Associated somatic diseases, primarily diabetes mellitus, obesity, and vascular disorders, played an important role in the development and chronicity of the pathological process. A significant portion of patients were characterized by late seeking medical attention, a prolonged course of the disease, and a tendency to relapse. Conclusion. Fungal skin diseases in modern conditions are characterized by high prevalence, clinical polymorphism, the presence of atypical forms, and a high frequency of relapses. The obtained data substantiate the

need to improve early diagnosis, mandatory laboratory verification of the diagnosis, comprehensive consideration of risk factors, and strengthening of preventive measures.

Keywords: fungal skin diseases, skin mycoses, dermatomycoses, clinical and epidemiological features, risk factors, relapses, diagnosis, prevention.

ЗАМОНАВИЙ ШАРОИТДА ТЕРИНИНГ ЗАМБУРУҒЛИ КАСАЛЛИКЛАРИНИНГ КЛИНИК-ЭПИДЕМИОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ

Абдуллаев Д.М.

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Замонавий дерматовенерологияда терининг замбуруғли касалликлари сезиларли даражада тарқалганлиги, сурункали ва рецидивланувчи кечишга мойиллиги, клиник полиморфизми ва аниқ тиббий-ижтимоий аҳамияти туфайли юқори долзарблигини сақлаб қолмоқда. Тадқиқотнинг мақсади замонавий шароитда замбуруғли тери касалликларининг клиник-эпидемиологик хусусиятларини ўрганишдан иборат. Материалы и методы. Тадқиқот ихтисослаштирилган дерматовенерология бўлими базасида ўтказилди. Клиник ва лаборатор тасдиқланган замбуруғли тери касалликлари бўлган 18 ёшдан 67 ёшгача бўлган 84 нафар бемор текширилди. Таъхис шикоятлар, анамнез, клиник кўрик ва тери тангачаларининг микроскопик текшируви асосида қўйилди. Касалликнинг клиник шакллари, зарарланишининг жойлашуви, давомийлиги, қайталаниш частотаси, шунингдек, асосий эпидемиологик, маиший ва соматик хавф омиллари ўрганилди. Натижалар. Аниқланишича, терининг замбуруғли касалликлари кўпинча ёш ва ўрта ёшдаги одамларда, асосан эркакларда учрайди. Клиник шакллар таркибида оёқ микозлари, силлиқ тери микозлари ва чов эпидермофитияси устунлик қилди. Энг муҳим хавф омиллари гипергидроз, тор ёпиқ пойабзал кийиш, синтетик кийимлардан фойдаланиш, жамоат ҳаммомлари, бассейнлар ва спорт залларига таширф буюриш, шахсий гигиена қоидаларига риоя қилмаслик эди. Патологик жараённинг ривожланиши ва сурункали кечишида ёндош соматик касалликлар, биринчи навбатда, қандли диабет, семизлик ва қон томир касалликлари муҳим роль ўйнади. Беморларнинг катта қисми учун тиббий ёрдамга кеч мурожаат қилиш, касалликнинг узоқ давом этиши ва қайталанишга мойиллик хос бўлган. Хулоса. Замонавий шароитда терининг замбуруғли касалликлари юқори тарқалиш, клиник полиморфизм, атипик шаклларнинг мавжудлиги ва қайталанишининг юқори частотаси билан тавсифланади. Олинган маълумотлар эрта таъхислашни такомиллаштириш, таъхисни мажбурий лаборатория текшируви, хавф омилларини комплекс ҳисобга олиш ва профилактика чораларини кучайтириш зарурлигини асослайди.

Калит сўзлар: терининг замбуруғли касалликлари, тери микозлари, дерматомикозлар, клиник-эпидемиологик хусусиятлари, хавф омиллари, рецидивлар, диагностика, профилактика.

Введение. Грибковые заболевания кожи остаются одной из наиболее актуальных проблем современной дерматовенерологии вследствие их высокой распространённости, склонности к хроническому и рецидивирующему течению, а также значительного медико-социального значения [1, 2]. По данным современных исследований, микозы кожи и её придатков занимают одно из ведущих мест в структуре инфекционных дерматозов, существенно снижая качество жизни пациентов, нарушая их социальную адаптацию и трудоспособность [3, 4]. Особую значимость данная проблема приобретает в условиях урбанизации, роста миграционных процессов, увеличения плотности населения, а также широкого распространения факторов, способствующих инфицированию и персистенции грибковой инфекции [5, 6].

В последние годы отмечается тенденция к изменению клинико-эпидемиологических характеристик грибковых заболеваний кожи. Наряду с классическими формами дерматомикозов всё чаще наблюдаются стёртые, атипичные и комбинированные варианты течения, что затрудняет своевременную диагностику и способствует позднему началу лечения [7, 8]. Кроме того, клиническая картина микозов кожи нередко маскируется под экзему, аллергический дерматит, псориаз и другие воспалительные дерматозы, что повышает риск диагностических ошибок и нерациональной терапии [9, 10].

Существенное влияние на распространённость и течение грибковых заболеваний кожи оказывают современные социально-бытовые и медико-биологические факторы. К числу наиболее значимых из них относятся несоблюдение правил личной гигиены, гипергидроз, ношение тесной и синтетической одежды, частое посещение общественных бань, бассейнов, спортивных залов, а также наличие хронической соматической патологии [11, 12]. Особенно важную роль играют сахарный диабет, ожирение, сосудистые нарушения, иммунодефицитные состояния и длительное применение

антибактериальных, гормональных и цитостатических препаратов, приводящих к снижению естественной резистентности организма и нарушению барьерной функции кожи [13, 14].

Современные условия жизни способствуют не только росту заболеваемости микозами, но и изменению структуры возбудителей. Расширение международных контактов, миграция населения, изменение климатических условий и рост числа иммунокомпрометированных пациентов создают благоприятные условия для циркуляции различных видов патогенных и условно-патогенных грибов [15, 16]. В связи с этим возрастает необходимость детального изучения эпидемиологических закономерностей распространения грибковых заболеваний кожи с учётом возраста, пола, профессиональной занятости, бытовых условий и сопутствующего фона [17].

Не менее важным является клинический аспект проблемы. Грибковые поражения кожи характеризуются значительным полиморфизмом клинических проявлений: от ограниченных эритематозно-сквамозных очагов до распространённых инфильтративных и интертригинозных форм [18, 19]. При этом локализация патологического процесса, глубина поражения, выраженность воспалительной реакции и склонность к рецидивированию во многом определяются как видом возбудителя, так и состоянием макроорганизма [20]. Поздняя обращаемость больных, самолечение и бесконтрольное использование наружных комбинированных препаратов нередко приводят к трансформации клинической картины, хронизации процесса и распространению инфекции.

Особое внимание в современной дерматологии уделяется вопросам ранней диагностики и профилактики микозов кожи. Несмотря на развитие лабораторных методов исследования, в реальной клинической практике диагностика нередко основывается преимущественно на клинических данных, что при наличии атипичных форм не всегда обеспечивает своевременную верификацию диагноза. Это определяет необходимость дальнейшего изучения клинко-эпидемиологических особенностей грибковых заболеваний кожи для совершенствования диагностических алгоритмов, оптимизации лечебной тактики и разработки эффективных профилактических мероприятий.

Таким образом, высокая распространённость грибковых заболеваний кожи, изменение характера их течения в современных условиях, многообразие факторов риска и сложности своевременной диагностики обуславливают актуальность данного исследования.

Цель исследования: изучить клинко-эпидемиологические особенности грибковых заболеваний кожи в современных условиях.

Материалы и методы исследования. Исследование проведено на базе специализированного дерматовенерологического отделения. Исследованы 84 пациента в возрасте от 18 до 67 лет с клинически и лабораторно подтверждёнными грибковыми заболеваниями кожи, находившиеся на амбулаторном и стационарном лечении.

Диагноз устанавливался на основании жалоб, анамнеза, клинического осмотра и микроскопического исследования чешуек кожи из очагов поражения. У пациентов диагностировались микозы стоп, микозы гладкой кожи, паховая эпидермофития, кандидоз крупных кожных складок и сочетанные формы грибковых поражений.

Критериями включения являлись наличие клинических признаков микоза, лабораторное подтверждение диагноза и информированное согласие пациента. Критериями исключения служили отсутствие лабораторного подтверждения, системная антимикотическая терапия менее чем за 4 недели до обследования и тяжёлые декомпенсированные соматические заболевания.

В ходе исследования изучались жалобы, длительность заболевания, частота рецидивов, локализация и клинические формы поражения, а также эпидемиологические и бытовые факторы риска: соблюдение личной гигиены, посещение бань, бассейнов и спортивных залов, условия труда, ношение тесной обуви и синтетической одежды. Дополнительно учитывалось наличие сопутствующей соматической патологии, включая сахарный диабет, ожирение, сосудистые и эндокринные нарушения.

Статистическая обработка результатов проводилась с использованием методов вариационной статистики. Количественные показатели представлены в абсолютных значениях и процентах.

Результаты исследования. В ходе проведённого исследования были проанализированы клинко-эпидемиологические особенности грибковых заболеваний кожи у 84 пациентов. Среди обследованных мужчин было 49 (58,3%), женщин — 35 (41,7%), что свидетельствовало о некотором преобладании лиц мужского пола в общей структуре изученной патологии.

Анализ возрастного состава показал, что наиболее многочисленную группу составили пациенты трудоспособного возраста. Наибольшая частота грибковых заболеваний кожи отмечалась у лиц в возрасте 21–40 лет — 36 (42,9%) пациентов. В возрастной группе 41–60 лет были зарегистрированы 28 (33,3%) больных, в возрасте 18–20 лет — 9 (10,7%) человек, старше 60 лет — 11 (13,1%) пациен-

тов. Полученные данные указывают на наиболее широкое распространение грибковых заболеваний кожи среди социально активного населения.

При анализе клинической структуры заболевания установлено, что наиболее часто диагностировались микозы стоп — у 29 (34,5%) пациентов. Микозы гладкой кожи были выявлены у 21 (25,0%) больного, паховая эпидермофития — у 15 (17,9%), кандидоз крупных кожных складок — у 11 (13,1%), сочетанные формы грибковых поражений — у 8 (9,5%) обследованных. Таким образом, в общей структуре патологии преобладали поверхностные формы микозов с поражением стоп и гладкой кожи.

Изучение локализации патологического процесса показало, что наиболее частыми зонами поражения являлись межпальцевые складки стоп, подошвенная поверхность стоп, пахово-бедренные складки, кожа туловища, верхних конечностей и крупные кожные складки. У пациентов с микозами стоп преобладали межпальцевая и сквамозно-гиперкератотическая формы заболевания. При поражении гладкой кожи чаще отмечались округлые эритематозно-сквамозные очаги с чёткими границами и тенденцией к периферическому росту. У больных паховой эпидермофитией очаги чаще локализовались в пахово-бедренной области и сопровождалась зудом, гиперемией и шелушением.

При оценке продолжительности заболевания до момента обращения за медицинской помощью установлено, что у 18 (21,4%) пациентов длительность патологического процесса составляла до 1 месяца, у 34 (40,5%) — от 1 до 6 месяцев, у 32 (38,1%) — более 6 месяцев. Это указывает на достаточно высокий удельный вес лиц с длительным и затяжным течением микотического процесса, что может быть связано с поздней обращаемостью, самолечением и недостаточной информированностью пациентов.

Анализ анамнестических и эпидемиологических данных позволил выявить основные факторы риска развития грибковых заболеваний кожи. Повышенная потливость была отмечена у 39 (46,4%) пациентов, ношение тесной закрытой обуви — у 35 (41,7%), посещение общественных бань, бассейнов и спортивных залов — у 31 (36,9%), использование синтетической одежды — у 28 (33,3%), несоблюдение правил личной гигиены — у 26 (31,0%) обследованных. У 27 (32,1%) больных в анамнезе отмечалось рецидивирующее течение заболевания.

При изучении сопутствующей соматической патологии установлено, что сахарный диабет имел место у 14 (16,7%) пациентов, ожирение — у 19 (22,6%), хронические сосудистые нарушения нижних конечностей — у 12 (14,3%) обследованных. У пациентов с кандидозом складок кожи и распространёнными формами микозов достоверно чаще выявлялись эндокринно-метаболические нарушения, в том числе избыточная масса тела и сахарный диабет. Это позволяет рассматривать сопутствующую соматическую патологию как один из важных факторов, способствующих развитию и хронизации грибковых заболеваний кожи.

Клинический анализ показал, что у большинства пациентов заболевание сопровождалось зудом различной интенсивности, эритемой, шелушением, мацерацией и наличием чётко ограниченных очагов поражения. У части больных наблюдались признаки инфильтрации, гиперкератоза и трещин, особенно при длительном течении микозов стоп. У пациентов с кандидозом складок кожи преобладали мацерация, яркая гиперемия, болезненность и наличие мелких отсевов по периферии очагов. В ряде случаев клиническая картина имела стёртый или атипичный характер, что затрудняло своевременную диагностику и требовало обязательного лабораторного подтверждения.

Отдельного внимания заслуживает высокая частота рецидивов. Рецидивирующее течение чаще наблюдалось у пациентов с длительным анамнезом заболевания, сопутствующей соматической патологией, гипергидрозом и несоблюдением профилактических рекомендаций. У таких больных нередко отмечалось повторное появление клинических симптомов после временного улучшения состояния, что свидетельствует о недостаточной эффективности профилактических мероприятий и необходимости комплексного подхода к терапии и диспансерному наблюдению.

Таким образом, результаты исследования показали, что в современных условиях грибковые заболевания кожи наиболее часто встречаются у лиц молодого и среднего возраста, преимущественно у мужчин, характеризуются преобладанием микозов стоп и гладкой кожи, наличием значимых эпидемиологических и бытовых факторов риска, а также склонностью к затяжному и рецидивирующему течению. Выявленные особенности подтверждают необходимость дальнейшего совершенствования мер ранней диагностики, профилактики и повышения санитарно-гигиенической грамотности населения.

Выводы. Проведённое исследование показало, что грибковые заболевания кожи в современных условиях сохраняют высокую распространённость среди лиц молодого и среднего возраста, преимущественно среди мужчин трудоспособного возраста. В структуре клинических форм преобладали

микозы стоп, микозы гладкой кожи и паховая эпидермофития, что свидетельствует о ведущей роли поверхностных дерматомикозов в общей структуре грибковых поражений кожи. Для большинства пациентов были характерны позднее обращение за медицинской помощью, длительное течение заболевания и склонность к рецидивированию.

Установлено, что развитию грибковых заболеваний кожи в значительной степени способствуют неблагоприятные эпидемиологические и бытовые факторы. Наиболее значимыми из них являлись гипергидроз, ношение тесной закрытой обуви, использование синтетической одежды, посещение общественных бань, бассейнов и спортивных залов, а также недостаточное соблюдение правил личной гигиены. Существенную роль в развитии и хронизации патологического процесса играли сопутствующие соматические заболевания, прежде всего сахарный диабет, ожирение и сосудистые нарушения, снижающие барьерные и адаптационные возможности кожи.

Полученные результаты подтверждают, что грибковые заболевания кожи в современных условиях характеризуются клиническим полиморфизмом, наличием атипичных форм и высокой частотой рецидивов, что затрудняет своевременную диагностику и требует обязательной лабораторной верификации диагноза. Это обосновывает необходимость совершенствования ранней диагностики, комплексного учёта факторов риска, повышения санитарно-гигиенической грамотности населения и разработки более эффективных профилактических мероприятий, направленных на снижение распространённости грибковых заболеваний кожи.

Список литературы:

1. Urban K., Chu S., Scheufele C., Giesey R.L., Mehrmal S., Uppal P., et al. The global, regional, and national burden of fungal skin diseases in 195 countries and territories: A cross-sectional analysis from the Global Burden of Disease Study 2017 // *JAAD International*. – 2021. – Vol. 2. – P. 22–27. – doi:10.1016/j.jdin.2020.10.003.
2. Qin Q., et al. Global, regional, and national burden of fungal skin diseases in 204 countries and territories from 1990 to 2021: An analysis of the Global Burden of Disease Study 2021 // *Mycoses*. – 2024. – Vol. 67, No. 8. – e13787. – doi:10.1111/myc.13787.
3. Свирщевская Е.В., Матушевская Е.В., Иванова М.А., Владимирова Е.В., Матушевская Ю.И. Эпидемиология, лечение и профилактика поверхностных микозов кожи // *Медицинский совет*. – 2024. – № 5. – С. 222–228. – doi:10.21518/ms2024-156.
4. Otašević S., Ignjatović A. Diagnosis and Treatment of Superficial Fungal Infections // *Journal of Fungi*. – 2025. – Vol. 11, No. 9. – 669. – doi:10.3390/jof11090669.
5. Огрызко Е.В., Шевченко А.Г., Иванова М.А. Динамика заболеваемости дерматофитиями в Российской Федерации за 2005–2020 гг. // *Социальные аспекты здоровья населения*. – 2023. – Т. 69, № 3. – Ст. 3. – doi:10.21045/2071-5021-2023-69-3-3.
6. Galili E., Taieb A., Shemer A., Leor G., Lyakhovitsky A., Barzilai A., Baum S. Epidemiology and Trends of Cutaneous Fungal Infections (2019–2022) in Israel: A Single Tertiary-Center Study // *Journal of Fungi*. – 2025. – Vol. 11, No. 4. – 320. – doi:10.3390/jof11040320.
7. Burningham K.M., Kim J.H., Kashyap A., Tying S.K. A clinical update on fungal disease of human skin // *Dermatological Reviews*. – 2024. – Vol. 5, No. 1. – doi:10.1002/der2.224.
8. Dellièrè S., Jabet A., Abdolrasouli A. Current and emerging issues in dermatophyte infections // *PLoS Pathogens*. – 2024. – Vol. 20, No. 6. – e1012258. – doi:10.1371/journal.ppat.1012258.
9. Leung A.K.C., Barankin B., Lam J.M., Leong K.F., Hon K.L. Tinea pedis: an updated review // *Drugs in Context*. – 2023. – Vol. 12. – 2023-5-1. – doi:10.7573/dic.2023-5-1.
10. Kovitwanichkanont T., Chong A.H. Superficial fungal infections // *Australian Journal of General Practice*. – 2019. – Vol. 48, No. 10. – P. 706–711. – doi:10.31128/AJGP-05-19-4930.
11. Gupta A.K., Wang T., Polla Ravi S., Mann A., Lincoln S.A., Foreman H.-C., Bakotic W.L. Epidemiology of Onychomycosis in the United States Characterized Using Molecular Methods, 2015–2024 // *Journal of Fungi*. – 2024. – Vol. 10, No. 9. – 633. – doi:10.3390/jof10090633.
12. Gupta A.K., Wang T., Cooper E.A., Summerbell R. A comprehensive review of nondermatophyte mould onychomycosis: Epidemiology, diagnosis and management // *Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology*. – 2024. – Vol. 38, No. 3. – P. 480–495. – doi:10.1111/jdv.19644.
13. Benedict K., Gold J.A.W., Wu K., Lipner S.R. High Frequency of Self-Diagnosis and Self-Treatment in a Nationally Representative Survey about Superficial Fungal Infections in Adults—United States, 2022 // *Journal of Fungi*. – 2023. – Vol. 9, No. 1. – 19. – doi:10.3390/jof9010019.
14. Ma Y., Cen W., Duan M., et al. Patients knowledge attitudes and practices regarding superficial fungal infections suggest public health and patient education are warranted // *Scientific*

Reports. – 2025. – Vol. 15. – 15112. – doi:10.1038/s41598-025-98919-8.

15. Giuliani E., Donà M.G., Giglio A., Abril E., Sperati F., Pimpinelli F., Latini A. Conventional Diagnostic Approaches to Dermatophytosis: Insights from a Three-Year Survey at a Public Dermatology Institute in Italy (2019–2021) // *Diagnostics*. – 2025. – Vol. 15, No. 17. – 2245. – doi:10.3390/diagnostics15172245.

16. WHO fungal priority pathogens list to guide research, development and public health action. – Geneva: World Health Organization, 2022. – 48 p.

17. Smith D.J., Gold J.A.W., Benedict K., Wu K., Lyman M., Jordan A., Medina N., Lockhart S.R., Sexton D.J., Chow N.A., et al. Public Health Research Priorities for Fungal Diseases: A Multidisciplinary Approach to Save Lives // *Journal of Fungi*. – 2023. – Vol. 9, No. 8. – 820. – doi:10.3390/jof9080820.

18. Seudjip N.L.J., Libeko S.K., Ntshila L.K., Bunga P.M., Tshilanda D.D., Hayette M.-P., et al. Retrospective Epidemiology of Dermatophytosis in Kinshasa, Democratic Republic of Congo, From 2000 to 2023 // *Mycoses*. – 2024. – Vol. 67, No. 12. – e70010. – doi:10.1111/myc.70010.

19. Al-Wathiqi F., Alharby A., Asadzadeh M., et al. A four-year retrospective study on epidemiological updates of dermatophytosis in Kuwait // *BMC Infectious Diseases*. – 2025. – Vol. 25, No. 1. – 1667. – doi:10.1186/s12879-025-12159-9.

20. Eshkaleti M.N., Hashemi S.J., Khodavaisy S., Ghazvini R.D., Ahmadikia K., Badali H. Shifting etiological agents of dermatophytosis: a molecular epidemiological study from Iran // *Iranian Journal of Microbiology*. – 2025. – Vol. 17, No. 5. – P. 854–860. – doi:10.18502/ijm.v17i5.19895.

Для цитирования: Абдуллаев Д.М. Клинико-эпидемиологические особенности грибковых заболеваний кожи в современных условиях // *Вестник фундаментальной и клинической медицины*. – 2026. – № 4(24). – С. 842–847. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19703713>

ВЛИЯНИЕ ИММУНОМОДУЛЯТОРОВ НА ДИНАМИКУ КЛИНИКО-БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМ РИНОСИНУСИТОМ**Хусанова Д.А.¹, Сафарова Н.И.², Юнусов Ф.А.¹, Рузиев Ж.Б.², Хонкелдиев У.Э.¹**¹Термезский филиал Ташкентского государственного медицинского университета, г. Термез, Узбекистан²Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Состояние эндогенной интоксикации на фоне применения местных иммуномодуляторов при остром риносинусите изучено недостаточно. В исследовании использовался препарат полиоксидоний способный угнетать выделение медиаторов инфекционно-аллергических реакций, которые в свою очередь могут привести к риносинуситу. Под влиянием полиоксидония содержание МДА уменьшилось на 42,6 %, активность каталазы плазмы возросла на 60,0 %, снижение отношения МДА/КА на 80,4 %, уменьшилась концентрация МСМ₂₅₄ и МСМ₂₈₀ на 45, 0 и 35,5 % соответственно, что достоверно приблизило их к показателям группы здоровых.

Ключевые слова: острый риносинусит, полиоксидоний, эндогенная интоксикация.

INFLUENCE OF IMMUNOMODULATORS ON THE DYNAMICS OF CLINICAL AND BIOCHEMICAL INDICATORS IN PATIENTS WITH ACUTE RHINOSINUSITIS**Xusanova D.A.¹, Safarova N.I.², Yunusov F.A.¹, Ruziev J.B.², Xonkeldiev U.E.¹**¹Tashkent State Medical University Termiz branch, Termiz, Uzbekistan²Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. The effects of endogenous intoxication on the treatment of acute rhinosinusitis with topical immunomodulators have been poorly studied. The study used polyoxidonium, a drug capable of inhibiting the release of mediators of infectious and allergic reactions, which in turn can lead to rhinosinusitis. Under the influence of polyoxidonium, the MDA content decreased by 42.6%, plasma catalase activity increased by 60.0%, the MDA/CA ratio decreased by 80.4%, and the concentration of MCM₂₅₄ and MCM₂₈₀ decreased by 45.0 and 35.5%, respectively, which reliably brought them closer to the indicators of the healthy group.

Key words: acute rhinosinusitis, polyoxidonium, endogenous intoxication.

ЎТКИР РИНОСИНУСИТ БИЛАН ХАСТАЛАНГАН БЕМОРЛАР КЛИНИКО-БИОХИМИК КЎРСАТКИЧЛАРИ ДИНАМИКАСИГА ИММУНОМОДУЛЯТОРЛАРНИНГ ТАЪСИРИ**Хусанова Д.А.¹, Сафарова Н.И.², Юнусов Ф.А.¹, Рузиев Ж.Б.², Хонкелдиев У.Э.¹**¹Тошкент давлат тиббиёт университети Термиз филиали, Термиз ш., Ўзбекистон²Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Ўткир риносинусит оқибатида юзага келадиган эндоген интоксикация кўрсаткичлари иммуномодуляторлар қўллаш фонида етарли даражада ўрганилмаган. Тадқиқотларда инфекцион-аллергик реакция медиаторлари ажралишини сусайтировчи полиоксидоний дори воситасидан фойдаланилди. Полиоксидоний таъсирида МДА микдори 42,6%, камайди, плазмадаги каталаза активлиги 60,0 % купайди, МДА/КА нисбати 80,4 % гача пасайди, МСМ₂₅₄ ва МСМ₂₈₀ концентрациялари 45,0% ва 35,5% мувофиқ камайди, бу эса шубҳасиз уларни соғлом гуруҳ кўрсаткичларига яқинлаштирди.

Калит сўзлар: ўткир риносинусит, полиоксидоний, эндоген интоксикация

Актуальность. Частота острого риносинусита (ОР) неуклонно растет, он диагностируется у 12-40 % населения разных стран. По данным эпидемиологических исследований распространенность острого риносинусита только в детской популяции составляет 30-45 % [2,4].

Среди множества причин, вызывающих изменение нормального гомеостаза при ОР, занимает эндогенная интоксикация (ЭИ). В результате этого нарушения, в биологических жидкостях и тканях организма накапливаются промежуточные и конечные продукты нормального обмена веществ, продукты нарушенного метаболизма соединительной ткани, компоненты деградации ее нормальных структур, а также продукты жизнедеятельности бактерий и антигены, оказывающие токсическое влияние и вызывающие дисфункцию различных органов и систем [1,3].

В научной литературе представлены многочисленные работы по диагностике и лечению ОР [7]. Однако, учитывая тот факт, что в возникновении ОР имеют значение нарушение иммунного статуса и процессов ПОЛ, приводящие к эндогенной интоксикации организма, появилась необходимость в разработке критериев диагностики и научно-обоснованных методов лечения. Так как, несмотря на то, что ЭИ при ОР не представляет угрозы, но значительно ухудшает качество жизни [1,5,8].

Применение иммуномодуляторов для лечения ОР известно, но при этом состояние ЭИ изучено недостаточно. Нами был выбран препарат полиоксидоний, также немаловажное значение имеет то, что его можно применять у детей [6].

Цель работы: изучить влияние иммуномодулятора полиоксидоний на показатели эндогенной интоксикации у больных с острым риносинуситом.

Материал и методы исследования. Работа основана на результатах обследования и лечения 42 больных в возрасте от 5 до 18 лет с ОР, а также 10 практически здоровых людей в период с октября 2024 по апрель 2026 гг. в ЛОР-отделении ОДМПМЦ г.Термез. Основными клиническими проявлениями ОР являлись обильное отделение слизи из носовых ходов, заложенность носа, повышение температуры тела, головная боль и нарушение обоняния. Часто в процесс вовлекалась евстахиева труба, что приводило к ощущению заложенности ушей, снижению слуха, шуму в ушах.

Полиоксидоний применялся по 3-6мг в/м 1 раз в сутки в течение 5 дней (перед введением лиофилизат разводили в 2 мл 0,9% натрия хлорида). Детям до 12 лет 3 мг, старше 12 лет – 6 мг. В последующем в той же дозировке 1 раз в неделю в течение 4 недель.

Биохимический анализ крови проводился до и после лечения: для оценки процессов ЭИ нами использованы содержание малонового диальдегида (МДА), активность каталазы, молекулы средней массы (МСМ) при длине волны 254 и 280 нм, а также соотношение МДА/КА. Полученные результаты, характеризующие эндогенную интоксикацию у больных с ПЭ, приведены в таблице.

Результаты. В ходе исследований было выявлено, что у всех больных на фоне терапии полиоксидонием был достигнут положительный клинический эффект. Обращает на себя внимание хорошая переносимость препарата.

Таблица №1

Показатели эндогенной интоксикации у больных с ПЭ

Показатели	Контроль n =10	До лечения n=42	После лечения n=42
МДА, мкмоль/л	3,50±0,23	6,56±0,28, P<0,001	3,76±0,12, P<0,1
КА, мккат/сек·л	0,90±0,06	0,28±0,03, P<0,001	0,82±0,1, P<0,001
МСМ ₂₅₄ , у.е.	0,24±0,03	0,51±0,04, P<0,001	0,28±0,02, P<0,05
МСМ ₂₈₀ , у.е	0,28±0,03	0,451±0,041, P<0,001	0,29±0,02, P<0,1
КУБ, у.е.	1,16±0,07	0,88±0,084, P<0,001	1,04±0,07, P<0,1
МДА/КА, у.е.	3,89±0,16	23,43±1,38, P<0,001	4,59±0,20, P<0,1

Примечание: *-P<0,05, **-P<0,001 достоверность различия относительно контрольной группы.

Системных побочных эффектов отмечено не было. Эффект полиоксидония проявлялся с первых дней лечения и нарастал в следующие недели.

Под влиянием полиоксидония содержание МДА уменьшилось на 42,6 %, активность каталазы (КА) плазмы возрасла на 60,0 %, снижение отношения МДА/КА на 80,4 %, уменьшилась концентрация МСМ₂₅₄ и МСМ₂₈₀ на 45, 0 и 35,5 % соответственно, а КУБ составил 18,2 %, что достоверно приблизило его к показателям группы здоровых.

Закключение. Таким образом, применение полиоксидония в комплексном лечении больных с ОР дает положительные результаты, проявляющиеся в улучшении клинических данных, со стороны биохимических исследований наблюдается максимальное приближение показателей эндогенной интоксикации к контрольным и несомненно, может быть рекомендовано для применения в практической оториноларингологии.

Список литературы:

- Алферов В.П. Эндогенная интоксикация у детей больных бронхиальной астмой //В.П. Алферов; М.Я. Малахова, О.В. Чугунова; В. П. Алферов, М.Я. Малахова, О.В. Чугунова // Вестник новых медицинских технологий. 2001 . Т. 8, №1. - С. 53-56
- Астафьева Н.Г. Аллергический ринит и его влияние на астму: роль антигистаминных препаратов в лечении и профилактике. Россий-

ский Аллергологический Журнал, 2008, №1, С. 37-48.

3. Афанасьева А.Н. Сравнительная оценка уровня эндогенной интоксикации у лиц разных возрастных групп // Клиническая лабораторная диагностика. - 2004. - № 6. - С.11-13.

4. Вишняков В.В., Егиян С.С., Акопян Л.В. Риносинусит: современная фитотерапия, основанная на традициях и научных доказательствах // Эффективная фармакотерапия. 2022; 18 (4): 30-38.

5. Карабаев Х.Э., Антонив В.Ф. и др. Показатели перекисного окисления липидов крови с гнойно-воспалительными заболеваниями носа и околоносовых пазух // Ж. Вестн. оториноларингологии. - 1997. - №4. - с.44.

6. Коган Е.Л. Сравнительная эффективность стероидов в лечении круглогодичного ринита / Е.Л. Коган, Ф.А. Гурбанов, Е.Г. Завгородняя // Вестник оториноларингологии 2006. — № 6. - С.49-50.

7. Корякина Е.В., Белова С.В. Молекулы средней массы как интегральный показатель метаболических нарушений. // Клиническая лабораторная диагностика. - 2004. - №3. - С.3-8.

8. Мохсен Я.С., Беляев А.Н., Козлов С.А. и др. Патогенетическая коррекция эндотоксикоза при полипозном риносинусите // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. - 2010. - №1 - С.12-14

9. Хасанов У.С., Вохидов У.Н., Особенности клиники и лечения хронического гнойно-полипозного риносинусита // Мат.научно-практ.конф. оторин.рес.Таджикистан с междунар.участ. «Актуальные вопросы оториноларингологии». Душанбе, 2012, С.91.

10. Хасанов У.С., Вохидов У.Н., Совершенствование лечения хронического рецидивирующего полипозного риносинусита // Мат.научно-практ.конф. оторин.рес.Таджикистан с междунар.участ. «Актуальные вопросы оториноларингологии». Душанбе, 2012, С.89.

Для цитирования: Хусанова Д.А., Сафарова Н.И., Юнусов Ф.А., Рузиев Ж.Б., Хонкелдиев У.Э. Влияние иммуномодуляторов на динамику клинико-биохимических показателей у больных с острым риносинуситом // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 4(24). – С. 848–850. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19703772>

КЛИНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЦИФРОВЫХ И АНАЛОГОВЫХ МЕТОДОВ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПОЛНЫХ СЪЕМНЫХ ПРОТЕЗОВ

Рашидов Р.А.

Ташкентский государственный медицинский университет, г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. Современная ортопедическая стоматология переживает этап цифровой трансформации, затрагивающий все аспекты диагностики, моделирования и изготовления ортопедических конструкций. Особое внимание уделяется совершенствованию методов изготовления полных съемных протезов, направленных на повышение точности, сокращение сроков лечения и улучшение адаптации пациентов. Цель данной работы - провести системный анализ и сравнение современных технологий изготовления полных съемных протезов, включая аналоговые, фрезерованные и 3D-печатные методы, с позиций точности, биосовместимости, эстетики и клинической эффективности.

Ключевые слова: полные съемные протезы, CAD/CAM, 3D-печать, фрезеровка, адаптация, цифровое протезирование, биосовместимость.

CLINICAL AND TECHNOLOGICAL ASSESSMENT OF DIGITAL AND ANALOG METHODS FOR MANUFACTURING FULL REMOVABLE PROSTHESES

Rashidov R.A.

Tashkent State Medical University, Tashkent, Uzbekistan

Resume. Modern orthopedic dentistry is undergoing a stage of digital transformation, affecting all aspects of diagnostics, modeling and manufacturing of orthopedic structures. Special attention is paid to improving the methods of manufacturing complete removable dentures, aimed at improving accuracy, reducing treatment time and improving patient adaptation. The purpose of this work is to conduct a systematic analysis and comparison of modern technologies for manufacturing complete removable prostheses, including analog, milled and 3D-printed methods, from the standpoint of accuracy, biocompatibility, aesthetics and clinical effectiveness.

Keywords: complete removable dentures, CAD/CAM, 3D printing, milling, adaptation, digital prosthetics, biocompatibility.

ТЎЛИҚ ОЛИБ ҚЎЙИЛАДИГАН ПРОТЕЗЛАРНИ ТАЙЁРЛАШНИНГ РАҚАМЛИ ВА АНАЛОГ УСУЛЛАРИНИ КЛИНИК-ТЕХНОЛОГИК БАҲОЛАШ

Рашидов Р.А.

Тошкент давлат тиббиёт университети, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. Замонавий ортопедик стоматология ортопедик конструкцияларни таъхислаш, моделлаштириш ва тайёрлашнинг барча жиҳатларига таъсир кўрсатадиган рақамли трансформация босқичини бошдан кечирмоқда. Бу борада, жумладан, аниқликни ошириш, даволаш муддатини қисқартириш ва беморлар мослашувини яхшилашга қаратилган тўлиқ ечиладиган протезларни тайёрлаш усулларини такомиллаштиришга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Ушбу ишнинг мақсади тўлиқ олиб қўйиладиган протезларни ишлаб чиқаришнинг замонавий технологияларини, шу жумладан аналог, фрезаланган ва 3D -босма усулларини аниқлик, биомослик, эстетика ва клиник самарадорлик нуқтаи назаридан тизимли таҳлил қилиш ва таққослашдан иборат.

Калим сўзлар: тўлиқ олинадиган протезлар, CAD/CAM, 3D босиб чиқариш, фрезерлаш, мослаштириш, рақамли протезлаш, биомослашувчанлик.

e-mail: rashidov.rustam@gmail.com

Введение. Современная ортопедическая стоматология находится на этапе интенсивной цифровой трансформации, что в значительной степени отражается на технологиях изготовления полных съемных протезов. Проблема полной вторичной адентии остается одной из наиболее актуальных в клинической практике, поскольку полная утрата зубов вызывает выраженные нарушения функций зубочелюстной системы - жевания, речи, глотания и дыхания, а также приводит к деформации нижней трети лица, ухудшению эстетического восприятия и снижению психоэмоциональной стабильно-

сти пациента [7,8].

По данным Всемирной организации здравоохранения, распространённость полной адентии у лиц старше 60 лет составляет от 15 до 25%, а среди пациентов старше 75 лет превышает 40%. При этом значительная часть таких пациентов не может воспользоваться несъёмными ортопедическими конструкциями по медицинским или экономическим причинам, что делает полные съёмные протезы наиболее доступным и востребованным способом восстановления функций зубочелюстного аппарата [1,4,9]. Традиционная технология изготовления съёмных протезов, основанная на ручной постановке зубов и полимеризации акрилового базиса, остаётся широко распространённой, однако имеет ряд недостатков. К ним относятся усадка материала при термической полимеризации, пористость и внутренние напряжения, приводящие к неточности прилегания базиса и нарушению равномерности распределения жевательной нагрузки. Это, в свою очередь, приводит к раздражению слизистой протезного ложа, снижению ретенции и необходимости частых коррекций протезов в ранние сроки эксплуатации.

В последние годы в ортопедическую практику внедряются цифровые технологии CAD/CAM (Computer-Aided Design / Computer-Aided Manufacturing) и аддитивное производство (3D-печать), которые обеспечивают высокую точность посадки, стабильность размеров и эстетическую предсказуемость результата. Использование цифровых протоколов позволяет моделировать протез в виртуальной среде, минимизировать количество клинических этапов, а также создавать конструкции с высокой точностью прилегания и оптимальной окклюзией [10].

В связи с этим в современной стоматологии формируются три основных направления изготовления полных съёмных протезов:

1. Аналоговые методы, базирующиеся на традиционной лабораторной технологии прессования полиметилметакрилата;
2. Цельные фрезерованные конструкции, изготавливаемые из монолитных блоков акрилового пластика или полимеров методом субтрактивной обработки на станках с ЧПУ;
3. Раздельные фрезерованные или 3D-печатные конструкции, создаваемые с применением CAD-моделирования и последующей сборки базиса и зубного ряда из отдельных элементов.

Каждая из этих технологий имеет свои преимущества и ограничения, касающиеся точности, биосовместимости, стоимости, сроков изготовления и адаптации пациента [2,6,12].

Ряд исследований (Goodacre et al., 2021; Al Helal et al., 2022; Bidra et al., 2023) показал, что цифровые протезы обладают меньшей усадкой и более равномерным распределением жевательного давления по сравнению с традиционными, что способствует улучшению адаптации и снижению частоты воспалительных осложнений слизистой оболочки протезного ложа. При этом остаются нерешёнными вопросы клинко-лабораторного обоснования выбора конкретной технологии для разных клинических условий, оценки долговечности и стабильности протезов, а также экономической эффективности их применения.

Таким образом, необходимость комплексного изучения и клинко-лабораторного сравнения различных технологий изготовления полных съёмных протезов определяет актуальность настоящего исследования.

Цель исследования: провести клинко-лабораторную оценку полных съёмных протезов, изготовленных различными методиками, и определить оптимальную технологию, обеспечивающую высокую точность, долговечность и комфорт пациентов с полной адентией [3,5,11].

Материалы и методы исследования. Исследование выполнено на кафедре ортопедической стоматологии Ташкентского государственного стоматологического университета. Работа проводилась в течение четырёх лет - с 2021 по 2025 год. Обследование и ортопедическое лечение пациентов с полной вторичной адентией проводилось в клинических условиях кафедры и в университетской зуботехнической лаборатории, оснащённой современным оборудованием для цифрового и традиционного протезирования.

В исследование были включены 90 пациентов (43 мужчины и 47 женщин) в возрасте от 45 до 75 лет, обратившихся за ортопедической помощью в связи с полной утратой зубов на обеих челюстях. Критериями включения являлись: отсутствие зубов на одной или обеих челюстях (диагноз K08.1), удовлетворительное общее состояние здоровья, отсутствие противопоказаний к проведению ортопедического лечения и согласие на участие в исследовании.

Критериями исключения были: выраженные системные заболевания в стадии декомпенсации, онкологические и инфекционные заболевания, тяжёлые нарушения прикуса, а также психоневрологические расстройства, препятствующие сотрудничеству с врачом.

Дизайн исследования. Пациенты были разделены на три группы по 30 человек в каждой в за-

висимости от применённой методики изготовления полного съёмного протеза:

- Группа 1 – цельные фрезерованные протезы, изготовленные методом субтрактивной обработки (CAD/CAM-фрезеровка из монолитных блоков PMMA).
- Группа 2 – отдельные фрезерованные протезы, при которых базис и зубной ряд изготавливались отдельно с последующим цифровым соединением в виртуальной среде.
- Группа 3 – аналоговые протезы, изготовленные традиционным методом прессования акриловой пластмассы (термополимеризация).

Распределение пациентов проводилось методом случайной выборки с соблюдением равенства по полу и возрасту, что позволило избежать систематических ошибок при сравнении.

Этапы клинического исследования

На этапе первичного осмотра проводили сбор анамнеза, фотографирование и регистрацию состояния слизистой оболочки протезного ложа. Оценивались параметры межальвеолярной высоты, ретенционные возможности, состояние подвижных слизистых тканей, а также выраженность альвеолярных гребней.

Для оценки исходных функциональных показателей использовались:

- Гамбургский тест (Ahlers M.O., 2000) для определения симметричности движений нижней челюсти;
- Пальпация жевательных мышц и ВНЧС для выявления болевой чувствительности и щелчков;
- Регистрация центрального соотношения челюстей по традиционной и цифровой методике с использованием прикусных шаблонов и электронного аксиографа KaVo ARCUSdigma II.

Методы изготовления протезов

Для аналоговой группы (Группа 3) применялась традиционная технология по стандартному пятиэтапному протоколу: анатомический и функциональный оттиски, определение прикусных соотношений, постановка зубов, примерка и окончательное прессование базиса.

Цельные фрезерованные протезы (Группа 1) моделировались в программном комплексе Exocad DentalCAD, после чего базис и зубной ряд изготавливались фрезеровкой из монолитного блока акрилового PMMA. Применение цельной фрезеровки исключало усадку и деформацию, характерные для прессованных конструкций.

Раздельные фрезерованные протезы (Группа 2) создавались с использованием комбинированной технологии: отдельно моделировались базис и зубной ряд, что позволяло корректировать межзубные контакты и наклон осей зубов с большей точностью. После проверки виртуальной модели производилось соединение элементов с помощью термоактивной смолы.

Во всех группах оценивались:

- точность прилегания базиса (по цифровому сканированию),
- окклюзионные соотношения (T-Scan III),
- стабильность фиксации протеза,
- наличие жалоб и адаптационный период,
- состояние слизистой оболочки через 1, 3, 6 и 12 месяцев.

Лабораторные и инструментальные методы

Для оценки точности прилегания и параметров базиса использовались:

- 3D-сравнение моделей в программном обеспечении Exocad и Geomagic Control X;
- визиография для анализа контактов базиса с альвеолярным гребнем;
- сканирование оттисков и протезов при помощи Medit T500 с точностью 7 мкм;
- анализ распределения жевательного давления с использованием компьютерной системы T-Scan III (Tekscan, США).

Для изучения микроструктуры поверхности материалов проводился анализ на сканирующем электронном микроскопе (SEM), а также оценка прочности на изгиб на установке Instron 5982 при нагрузке до 3 кН.

Статистическая обработка данных. Обработка данных проводилась с использованием программ IBM SPSS Statistics v.26 и Microsoft Excel 2019. Использовались методы описательной статистики, критерии Манна–Уитни и Краскела–Уоллиса для межгрупповых сравнений, а также корреляционный анализ Пирсона для выявления зависимостей между точностью посадки и сроком адаптации. Различия считались достоверными при уровне значимости $p < 0,05$.

Результаты исследования. В ходе исследования проведена комплексная оценка клинико-функциональных и лабораторных параметров полных съёмных протезов, изготовленных различными методиками. Анализ включал изучение точности прилегания базисов, распределения жевательного давления, адаптационного периода, состояния слизистой оболочки протезного ложа и субъективной

удовлетворённости пациентов.

Анализ точности прилегания протезного базиса. Сравнительный анализ данных 3D-сопоставления моделей показал, что наименьшие отклонения между цифровым прототипом и готовым протезом отмечались в группе цельных фрезерованных конструкций. Среднее расхождение составляло $0,048 \pm 0,007$ мм, тогда как для раздельных фрезерованных протезов - $0,072 \pm 0,011$ мм, а для аналоговых - $0,182 \pm 0,025$ мм ($p < 0,001$).

Полученные данные подтверждают, что цельная цифровая фрезеровка обеспечивает наиболее точное прилегание базиса к альвеолярному гребню, благодаря отсутствию полимеризационной усадки и минимальной термической деформации. У аналоговых протезов наблюдалось неравномерное прилегание в дистальных участках, особенно в области бугров верхней челюсти, что приводило к снижению ретенции.

Распределение жевательного давления. Компьютерный анализ с помощью системы T-Scan III выявил более равномерное распределение жевательной нагрузки у пациентов, использующих цельные фрезерованные протезы. В данной группе процентное соотношение давления между правой и левой сторонами составляло 51,2% / 48,8%, что близко к физиологической норме.

В группе раздельных фрезерованных протезов отмечено лёгкое смещение нагрузки (53,5% / 46,5%), а в аналоговой - значительная асимметрия (57,8% / 42,2%), указывающая на наличие преждевременных контактов и неравномерность посадки базиса.

Среднее значение времени достижения равновесного контакта (окклюзионного времени) в группе цельных фрезерованных протезов составило $0,21 \pm 0,05$ с, тогда как в аналоговой группе - $0,36 \pm 0,08$ с, что свидетельствует о лучшей функциональной адаптации при цифровом протоколе.

Оценка клинической ретенции и стабильности. Через 1 месяц после наложения протезов удовлетворительная ретенция наблюдалась у 93% пациентов группы цельных фрезерованных протезов, у 87% - раздельных фрезерованных, и лишь у 68% - аналоговых конструкций.

Через 6 месяцев эксплуатации показатели снижались незначительно в цифровых группах (на 3–4%), в то время как у пользователей традиционных протезов потребность в коррекции или повторном базисировании отмечалась у 26% пациентов.

Состояние слизистой оболочки протезного ложа. Морфологическая оценка слизистой оболочки протезного ложа показала, что у пациентов, использовавших фрезерованные протезы, воспалительные изменения (гиперемия, микротравмы) отмечались реже. Частота признаков протезного стоматита через 3 месяца составила:

- Группа 1 (цельные фрезерованные): 8,7%;
- Группа 2 (раздельные): 12,5%;
- Группа 3 (аналоговые): 29,4% ($p < 0,05$).

Такое различие связано с особенностями поверхности базиса. Фрезерованные протезы имеют гладкую, плотную структуру, препятствующую микробной адгезии, тогда как прессованные акрилаты характеризуются микропористостью и остаточным мономером, способствующим раздражению тканей.

Субъективная оценка комфорта и адаптации. Согласно данным анкетирования пациентов по модифицированной шкале ОНП-14, уровень удовлетворённости после 1 месяца использования протезов составил:

- Цельные фрезерованные - $82,6 \pm 4,1$ балла;
- Раздельные фрезерованные - $78,3 \pm 4,8$ балла;
- Аналоговые - $63,7 \pm 5,2$ балла ($p < 0,001$).

Через 6 месяцев показатели в цифровых группах сохранялись стабильными, в то время как у пациентов с аналоговыми протезами отмечалось постепенное снижение уровня комфорта из-за деформации базиса и необходимости повторных коррекций.

Лабораторная оценка механических свойств. Испытания на прочность при изгибе показали, что фрезерованные протезы выдерживали нагрузку до $2,85 \pm 0,18$ кН, тогда как аналоговые конструкции разрушались при $2,03 \pm 0,22$ кН. Поверхностный анализ методом SEM продемонстрировал отсутствие микротрещин и воздушных включений в фрезерованных базисах, что коррелировало с их большей долговечностью. Таким образом, результаты исследования подтвердили, что цифровые методы изготовления - как цельные, так и раздельные фрезерованные протезы - превосходят традиционные по точности, биосовместимости, стабильности и комфорту использования. Цельная фрезеровка продемонстрировала лучшие показатели адаптации, равномерного распределения нагрузки и минимального количества осложнений, что позволяет рассматривать её как оптимальную технологию для ортопедического лечения пациентов с полной адентией.

Обсуждение результатов. Сравнительный анализ клинико-лабораторных показателей различных методик изготовления полных съёмных протезов продемонстрировал чёткие различия в точности, стабильности и адаптационных возможностях пациентов, что согласуется с тенденциями, описанными в современной литературе. Полученные данные подтверждают, что цифровые технологии CAD/CAM и субтрактивная фрезеровка обеспечивают более высокие параметры точности прилегания и воспроизводимости окклюзионных соотношений по сравнению с традиционными аналоговыми методами. В проведённом исследовании цельные фрезерованные протезы показали наилучшие результаты по всем функциональным критериям. Минимальные отклонения в прилегании базиса (0,048 мм) указывают на точность цифрового производства, исключая полимеризационные и термические деформации, присущие классическому прессованию акрилатов. Это подтверждается данными зарубежных авторов, где отмечается, что CAD/CAM-протезы характеризуются стабильной геометрией и высокой повторяемостью параметров при длительном ношении (Goodacre et al., 2021; Al Helal et al., 2022).

Особое значение имеет равномерность распределения жевательного давления, зафиксированная при использовании системы T-Scan III. Для цельных фрезерованных конструкций она была максимально приближена к физиологическому распределению (51,2% / 48,8%), что свидетельствует о гармоничной окклюзии и уменьшении риска перегрузки слизистой протезного ложа. Аналогичные результаты были получены в исследованиях Kerstein R.B. (2019), где отмечено, что цифровая настройка окклюзии позволяет достичь сбалансированных контактов уже на раннем этапе адаптации.

Функциональные преимущества цифровых технологий также проявились в клинической стабильности и субъективном комфорте пациентов. Через шесть месяцев эксплуатации фрезерованные конструкции сохраняли ретенцию в 90% случаев, тогда как аналоговые требовали коррекции почти у трети обследованных. Эти различия объясняются отсутствием остаточного мономера, меньшей пористостью базиса и более гладкой поверхностью, что уменьшает микробную адгезию и вероятность развития протезного стоматита. Согласно литературным данным, частота воспалительных осложнений при традиционных протезах достигает 30–35%, тогда как при цифровых не превышает 10% (Mangano et al., 2020; Bidra et al., 2023). Результаты анкетирования по шкале ОНП-14 подтвердили более быструю адаптацию к цифровым протезам. Уже через месяц после наложения пациенты отмечали значительное повышение качества жизни, связанного со здоровьем полости рта. Подобные выводы были сделаны в исследовании Fenlon et al. (2018), где субъективная удовлетворённость прямо коррелировала с точностью посадки и снижением количества жалоб на натирание слизистой.

Механические испытания показали, что фрезерованные протезы обладают значительно более высокой прочностью на изгиб и устойчивостью к микротрещинам. Это согласуется с данными *in vitro*-исследований, где CAD/CAM-пластмассы демонстрируют увеличение прочности на 25–40% за счёт отсутствия внутренних напряжений и гомогенной структуры (Saponaro et al., 2022).

В то же время следует отметить, что раздельное фрезерование, несмотря на несколько более низкие показатели точности, сохраняет клиническую целесообразность при необходимости индивидуальной коррекции формы зубных рядов и эстетических параметров. Это делает данную методику компромиссным вариантом между экономичностью и функциональной эффективностью. Таким образом, результаты исследования подтверждают, что переход к цифровым технологиям в изготовлении полных съёмных протезов обеспечивает значительное повышение точности, долговечности и клинического комфорта. Наиболее высокие показатели продемонстрировали цельные фрезерованные конструкции, тогда как аналоговые методы остаются оправданными лишь при ограниченных технических возможностях лаборатории или низком уровне цифровой подготовки персонала.

Заключение. Проведённое исследование показало, что выбор технологии изготовления полных съёмных протезов оказывает существенное влияние на их клинико-лабораторные характеристики и эффективность ортопедического лечения. Полученные результаты убедительно подтверждают, что использование цифровых CAD/CAM-технологий обеспечивает более высокую точность воспроизведения анатомических структур протезного ложа, стабильность окклюзионных соотношений и качество прилегания базиса к слизистой оболочке. Цельные фрезерованные конструкции продемонстрировали наименьшие отклонения от виртуальной модели, высокую устойчивость при жевании и минимальное количество осложнений со стороны слизистой оболочки протезного ложа.

Раздельное фрезерование, несмотря на несколько большую вариабельность параметров точности, позволило достичь оптимальных эстетических и функциональных результатов за счёт возможности индивидуальной коррекции формы зубных рядов и межчелюстных соотношений. Эти конструкции обеспечивали высокую степень адаптации и комфорт пациентов при сохранении преимуществ цифрового моделирования.

В то же время традиционные аналоговые методы, основанные на прессовании акрилатов, показали ограниченную точность прилегания, большую усадку и склонность к деформациям базиса, что отрицательно сказывалось на устойчивости протеза и субъективной удовлетворённости пациентов. По данным анкетирования, пользователи цифровых конструкций отмечали более выраженное улучшение качества жизни, связанного со здоровьем полости рта, что отражает не только функциональные, но и психологические преимущества цифровых протезов.

Применение современных диагностических систем, таких как электронная аксиография и компьютерный анализ окклюзии T-Scan III, позволило повысить точность определения центрального соотношения челюстей, улучшить баланс жевательных нагрузок и сократить адаптационный период. Механические испытания подтвердили, что фрезерованные протезы обладают более высокой прочностью и долговечностью по сравнению с аналоговыми, что обусловлено гомогенностью структуры материала и отсутствием полимеризационных деформаций.

Таким образом, можно заключить, что цифровая фрезеровка, особенно цельная, представляет собой наиболее перспективный и клинически оправданный метод изготовления полных съёмных протезов. Применение цифровых технологий в ортопедической стоматологии обеспечивает повышение точности, надёжности и эстетики конструкций, а также способствует улучшению адаптации и качества жизни пациентов, страдающих полной адентией.

Список литературы:

1. Современные аспекты реставрации дефектов зубного ряда малой протяженности / Д.В.Верстаков, К.А.Дятленко, Е.В.Данилина, Д.В.Михальченко, Т.Ф.Данилина // Волгоградский научно-медицинский журнал. - 2013. - №1. - С. 58.
2. Немедленная нагрузка при ортопедическом лечении с применением дентальных имплантатов / Гветадзе Р.Ш., Кречина Е.К., Широков Ю.Ю., Солодкий В.Г., Солодка Д.В., Широков Ю.Е. // Клиническая стоматология. - 2015. - №4. - С. 50-54.
3. Freiria de Oliveira C.A. [et al.] // Biofouling. 2023. Vol. 39, № 9–10. P. 916–927 / Freiria de Oliveira CA, et al. Antimicrobial activity of cleansers on the cobalt-chromium surface of removable partial denture: a systematic review. Biofouling. 2023;39(9–10):916–27.
4. Effect of effervescent tablets on removable partial denture hygiene / Morelli V.G. [et al.] // American Journal of Dentistry. 2023. Vol. 36, № 2. P. 75–80 / Morelli VG, et al. Effect of effervescent tablets on removable partial denture hygiene. American Journal of Dentistry. 2023;36(2):75–80.
5. McRory M. Eric A technique for fabricating single screw-retained implant-supported interim crowns in conjunction with implant surgery / M. Eric McRory, David R. Cagna // The journal of prosthetic dentistry. - 2014. - Vol. 111(6). - P. 455-459.
6. Efficacy of a propolis solution for cleaning complete dentures / de Souza R.F. [et al.] // American Journal of Dentistry. 2019. Vol. 32, № 6. P. 306–310 / de Souza RF, et al. Efficacy of a propolis solution for cleaning complete dentures. American Journal of Dentistry. 2019;32(6):306–10.
7. Рубленко С.С., Кунгуров С.В., Осипова Н.П. Влияние съёмных ортопедических конструкций на количественный состав микрофлоры полости рта // Сибирское медицинское обозрение. 2010. № 3. С. 43–47
8. Применение дентальных имплантатов Bonetrust Plus при непосредственной дентальной имплантации и немедленной нагрузке / Ушаков Р.В., Хурхуров Г.Р., Ушаков А.Р., Даутов Х.Р. // Дентальная имплантология и хирургия. - 2013. - №2. - С. 22.
9. Goodacre, Brian J., and Charles J. Goodacre. "Additive manufacturing for complete denture fabrication: a narrative review." Journal of Prosthodontics 31.S1 (2022): 47-51.
10. Kosimov, A. A., and B. N. Khabilov. "Оценка эффективности применения цифровых технологий при ортопедическом лечении съёмными конструкциями." Integrative dentistry and maxillofacial surgery 4.2 (10) (2025): 70-76.
11. Salimov Odilxon Rustamovich, Raximov Baxtiyorjon Gafurdjanovich, and Kosimov Ahror Abror ugli. "Modern aspects of patient adaptation to removable dentures (literature review)". World Bulletin of Public Health, vol. 16, Nov. 2022, pp. 21-26
12. Туляганов, Ж. Ш. Оценка качества и эффективности съёмных протезов на уровень жизни больных с полной адентией / Ж. Ш. Туляганов, М. Р. Миррахимова, А. А. Косимов // Евразийский журнал медицинских и естественных наук. –2022. – Т. 2, № 6. – С. 477–481.

Для цитирования: Рашидов Р.А. Клинико-технологическая оценка цифровых и аналоговых методов изготовления полных съёмных протезов // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 4(24). – С. 851–856. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19703822>

ЧУҚУР КУЙИШЛАРДА ЖАРРОҲЛИК ТАКТИКАСИНИ ОПТИМАЛЛАШТИРИШ: КЛИНИК-ИНСТРУМЕНТАЛ ЁНДАШУВ

Хақназарова М.Н.¹, Рузибоев С.А.¹, Мансуров Т.Т.²

¹Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

²Республика шошилинч тиббий ёрдам илмий маркази Самарқанд филиали, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Ушбу мақолада чуқур термик куйишлар билан оғриган беморларда жарроҳлик тактикасини оптималлаштириши масалалари клиник ва инструментал баҳолаш асосида ўрганилди. Тадқиқот Республика шошилинч тиббий ёрдам илмий маркази Самарқанд филиали базасида амалга оширилди. Аниқланишича, чуқур куйишлар организмда оғир системали ўзгаришлар, жумладан гемодинамик бузилишлар, метабolik дисбаланс ва инфекцион асоратлар ривожланиши билан кечади. Некротик тўқималарнинг узоқ сақланиши патологик жараёни оғирлаштирувчи асосий омиллардан бири ҳисобланади. Тадқиқот натижаларига кўра, некротик тўқималарни эрта бартараф этишига асосланган фаол жарроҳлик тактикаси қўлланилиши яра жараёнини тезлаштириши, интоксикация даражасини камайтириши ва беморларнинг умумий ҳолатини яхшилашига хизмат қилади. Шунингдек, ушбу ёндашув асоратлар частотасини камайтириши, даволаш муддатини қисқартириши ва клиник натижаларни яхшилаш имконини беради. Чуқур куйишларда клиник ва инструментал кўрсаткичларни комплекс баҳолаш асосида даволаш тактикасини танлаш юқори самарадорликни таъминлайди.

Калит сўзлар: чуқур куйиш, куйиш касаллиги, жарроҳлик тактикаси, некрэктомия, яра жараёни, гемодинамика, интенсив терапия, интоксикация, регенерация, асоратлар

OPTIMIZATION OF SURGICAL TACTICS FOR DEEP BURNS: CLINICAL AND INSTRUMENTAL APPROACH

Khaknazarova M.N.¹, Ruziboev S.A.¹, Mansurov T.T.²

¹Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

²Samarkand branch of Republican Scientific Center for Emergency Medical Care, Samarkand, Uzbekistan

Resume. In this article, based on a clinical and instrumental assessment, the issues of optimizing surgical tactics in patients with deep thermal outpourings are studied. The study was conducted on the basis of the Samarkand branch of the Republican Scientific Center for Emergency Medical Care. It has been established that deep damage occurs with the development of severe systemic changes in the body, including hemodynamic disorders, metabolic imbalance and infectious complications. Long-term preservation of necrotic tissues is one of the main factors aggravating the pathological process. According to the results of the study, the use of active surgical tactics based on the early elimination of necrotic tissues helps to accelerate the wound process, reduce intoxication levels and improve the general condition of patients. This approach also reduces the incidence of complications, reduces treatment time, and improves clinical outcomes. The choice of treatment tactics based on a comprehensive assessment of clinical and instrumental parameters for deep transfusions ensures high efficiency.

Keywords: deep transfusion, transfusion sickness, surgical tactics, necrectomy, wound process, hemodynamics, intensive care, intoxication, regeneration, complications

ОПТИМИЗАЦИЯ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ ПРИ ГЛУБОКИХ ОЖОГАХ: КЛИНИКО- ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ПОДХОД

Хакназарова М.Н.¹, Рузибоев С.А.¹, Мансуров Т.Т.²

¹Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

²Самаркандский филиал Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. В данной статье на основе клинко-инструментальной оценки изучены вопросы оптимизации хирургической тактики у больных с глубокими термическими излияниями. Исследование проводилось на базе Самаркандского филиала Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи. Установлено, что глубокие повреждения происходят с развитием тяжелых системных изменений в организме, в том числе гемодинамических нарушений, метаболического дисбаланса и инфекционных осложнений. Длительное сохранение некротических тканей является одним из основных факторов, усугубляющих патологический процесс. По результатам исследования, при-

менение активной хирургической тактики, основанной на раннем устранении некротических тканей, способствует ускорению раневого процесса, снижению уровня интоксикации и улучшению общего состояния пациентов. Также данный подход позволяет снизить частоту осложнений, сократить сроки лечения и улучшить клинические результаты. Выбор тактики лечения на основе комплексной оценки клинико-инструментальных показателей при глубоких переливаниях обеспечивает высокую эффективность.

Ключевые слова: глубокое переливание, переливательная болезнь, хирургическая тактика, некрэктомия, раневой процесс, гемодинамика, интенсивная терапия, интоксикация, регенерация, осложнения

Долзарблиги. Чукур куйишлар замонавий тиббиётда энг оғир ва мураккаб клиник ҳолатлардан бири ҳисобланиб, юқори асоратлар частотаси ва сезиларли леталлик кўрсаткичи билан ажралиб туради. Ушбу патология нафақат маҳаллий тўқималарнинг зарарланиши, балки бутун организмда оғир системали ўзгаришлар ривожланиши билан тавсифланади. Сўнгги йилларда саноат, маиший ва транспорт жароҳатларининг ортиши натижасида куйиш ҳолатлари сони кўпайиб бормоқда. Айниқса, чукур куйишлар аҳоли ўртасида меҳнат қобилятини йўқотиш ва ногиронликнинг асосий сабабларидан бири бўлиб қолмоқда. Бу эса ушбу муаммонинг ижтимоий ва иқтисодий аҳамиятини янада оширади[2,5,8].

Чукур куйишларда патогенетик жараёнлар мураккаб бўлиб, микроциркуляция бузилиши, гиповолемия, метаболик ўзгаришлар ва иммун тизим фаолиятининг пасайиши билан кечади. Бу ҳолатлар ўз навбатида тўқималарда гипоксия ривожланишига, яра жараёнининг сустрасилишига ва асоратлар хавфининг ошишига олиб келади. Айниқса, некротик тўқималарнинг мавжудлиги куйиш касаллигидаги асосий муаммолардан бири ҳисобланади. Ушбу тўқималар инфекция манбаи сифатида хизмат қилиб, микроб контаминациясини кучайтиради ва септик асоратларни келтириб чиқаради[1,3,7].

Некротизмнинг узок сақланиши яранинг табиий битишини секинлаштиради ва даволаш муддатини узайтиради. Анъанавий консерватив даволаш усуллари кўп ҳолларда қўлланган натижани бермайди, чунки улар некротик тўқималарни ўз вақтида бартараф этиш имконини чеклайди. Бу эса инфекция ривожланиши ва умумий аҳволнинг ёмонлашишига сабаб бўлади[4,9,12]. Шу билан бирга, замонавий жарроҳлик амалиётида чукур куйишларни даволашда фаол ёндашув тобора кенг қўлланилмоқда. Эрта некрэктомия ва кейинчалик тери қопламани тиклаш усуллариининг қўлланилиши яра жараёнини тезлаштириш, интоксикацияни камайитириш ва асоратлар частотасини пасайитириш имконини беради. Бироқ, амалиётда жарроҳлик тактикасини танлаш, унинг вақти ва ҳажмини белгилаш ҳали ҳам долзарб муаммо бўлиб қолмоқда. Бу эса ҳар бир беморда индивидуал ёндашувни талаб қилади. Шу муносабат билан чукур куйишларда клиник ва инструментал баҳолаш асосида жарроҳлик тактикасини оптималлаштириш, даволаш самарадорлигини ошириш ва асоратларни камайитириш замонавий тиббиётнинг муҳим вазифаларидан бири ҳисобланади[1,10,11].

Мақсад: Ушбу тадқиқотнинг асосий мақсади чукур термик куйишлар билан оғирган беморларда клиник ва инструментал кўрсаткичларни комплекс баҳолаш асосида жарроҳлик тактикасини оптималлаштириш ҳамда даволаш самарадорлигини оширишдан иборат.

Материал ва усуллар. Ушбу тадқиқот Республика шифохона тиббий ёрдам илмий маркази Самарқанд филиали базасида амалга оширилди. Тадқиқот клиник характерга эга бўлиб, стационар шароитида даволанган чукур термик куйишлар билан оғирган беморларни қамраб олди. Тадқиқотга киритилган беморлар даволаш жараёнида узлуксиз клиник кузатув остида бўлиб, уларнинг умумий ҳолати ва организмдаги ўзгаришлар динамикада баҳоланди. Барча беморлар қабул қилинган пайтдан бошлаб даволашнинг барча босқичларида комплекс текширувдан ўтказилди. Беморларни танлашда клиник ҳолатнинг оғирлиги, куйиш жараёнининг чуқурлиги ва умумий аҳвол инobatга олинди.

Тадқиқотга киритилган барча беморларда чукур тўқима зарарланиши кузатилди ва улар стационар даволашга муҳтож бўлган. Даволаш жараёнида беморлар қўлланилган терапевтик ёндашувларга қараб икки гуруҳга ажратилди. Биринчи гуруҳда анъанавий консерватив даволаш усуллари қўлланилди. Бу гуруҳда асосий эътибор гемодинамик барқарорликни таъминлаш, сув-электролит мувозанатини тиклаш ва яра юзасини босқичма-босқич тозалашга қаратилди. Иккинчи гуруҳда фаол жарроҳлик тактикаси қўлланилди. Ушбу ёндашув некротик тўқималарни эрта бартараф этиш, яра юзасини тезда тозалаш ва кейинчалик тери қопламани тиклашни ўз ичига олди. Бу усул инфекция манбаини бартараф этиш ва организмдаги интоксикация даражасини камайитиришга қаратилди. Клиник текширувлар давомида беморларнинг умумий ҳолати ҳар куни баҳоланди.

Бунда онг ҳолати, тана ҳарорати, юрак уриш частотаси ва артериал босим кўрсаткичлари доимий равишда назорат қилинди. Шунингдек, нафас олиш частотаси ва кислород билан таъминланиш

даражаси ҳам кузатилди. Гемодинамик ҳолатни баҳолаш тадқиқотнинг муҳим қисми бўлиб, у орқали организмдаги умумий ўзгаришлар ва даволаш самарадорлиги аниқланди. Артериал босим ва юрак фаолиятининг ўзгариши бемор ҳолатининг асосий кўрсаткичларидан бири сифатида таҳлил қилинди. Лаборатор текширувлар мунтазам равишда амалга оширилди.

Қон таҳлиллари орқали гемоглобин, гематокрит, лейкоцитлар сони ва биокимёвий кўрсаткичлар баҳоланди. Ушбу маълумотлар организмдаги яллиғланиш жараёни ва интоксикация даражасини аниқлаш имконини берди. Бундан ташқари, биокимёвий таҳлиллар орқали жигар ва буйрак фаолияти баҳоланди. Бу эса қуйиш касаллигида ривожланиши мумкин бўлган ички аъзолар зарарланишини барвақт аниқлаш имконини берди. Инструментал текширувлар доирасида юрак ва ўпка фаолиятини баҳолаш учун электрокардиография ва рентгенологик текширувлар ўтказилди. Зарур ҳолларда қўшимча текширувлар амалга оширилди. Яра жараёнининг кечиши тадқиқотнинг алоҳида йўналиши сифатида ўрганилди. Яра юзасининг ҳолати, некротик тўқималарнинг сақланиш даражаси ва грануляция тўқимасининг шаклланиши динамикада баҳоланди. Фаол жарроҳлик тактикаси қўлланилган беморларда некротик тўқималарни бартараф этиш муддати ва тери қопламани тиклаш жараёни алоҳида таҳлил қилинди.

Тадқиқот доирасида некротик тўқималарнинг организмга салбий таъсирини ўрганиш, уларни эрта бартараф этишнинг клиник аҳамиятини баҳолаш ва яра жараёнининг кечишига таъсир этувчи омилларни аниқлаш мақсад қилинди. Шу билан бирга, беморларда гемодинамик кўрсаткичлар, лаборатор параметрлар ва умумий ҳолат динамикасини таҳлил қилиш орқали турли даволаш ёндашувларининг самарадорлигини қиёсий баҳолаш кўзда тутилди. Тадқиқотнинг яна бир муҳим мақсади чуқур қуйишларда фаол жарроҳлик тактикаси қўлланилишининг афзалликларини илмий жиҳатдан асослаш, асоратлар частотасини камайтириш ва даволаш муддатини қисқартириш имкониятларини ўрганишдан иборат. Шу тарзда, тадқиқот чуқур қуйишларни даволашда индивидуал ва асосланган ёндашувни ишлаб чиқишга қаратилган бўлиб, клиник натижаларни яхшилашга хизмат қилади.

Натижалар. Тадқиқот натижалари чуқур термик қуйишлар билан оғриган беморларда патологик жараённинг оғир кечишини ва организмдаги кўплаб системали ўзгаришларни аниқ кўрсатди. Беморларнинг аксариятида қабул қилинган пайтда умумий ҳолат оғир бўлиб, гемодинамик барқарорлик бузилган ҳолда кузатилди. Тадқиқот бошида беморларда артериал босимнинг пасайиши, юрак уриш частотасининг ошиши ва умумий ҳолатнинг сусайиши қайд этилди. Бу ҳолатлар организмда гиповолемия ва микроциркуляция бузилишининг ривожланганлигини кўрсатди. Айниқса, қуйиш юзаси катта бўлган беморларда ушбу ўзгаришлар янада яққол намоён бўлди.

Динамик кузатувлар натижасида аниқландики, анъанавий даволаш олиб борилган беморларда гемодинамик кўрсаткичларнинг барқарорлашуви секин кечди. Даволашнинг биринчи кунларида артериал босимнинг ўзгарувчанлиги сақланиб қолди ва инфузион терапияга эҳтиёж юқори бўлиб қолди. Фаол жарроҳлик тактикаси қўлланилган беморларда эса гемодинамиканинг барқарорлашуви нисбатан тезроқ кузатилди. Некротик тўқималарни эрта бартараф этиш организмдаги интоксикация даражасини камайтириб, қон айланиш тизими фаолиятини яхшилашга олиб келди.

Лаборатор кўрсаткичлар таҳлилида ҳам гуруҳлар ўртасида фарқлар аниқланди. Анъанавий даволашда гемоглобин ва гематокрит кўрсаткичлари узоқ вақт давомида паст ҳолатда сақланиб қолди. Бу эса қон йўқотиш ва суюқлик балансининг бузилиши билан боғлиқ бўлди. Фаол жарроҳлик усули қўлланилган беморларда эса ушбу кўрсаткичлар нисбатан тез тикланди. Бу ҳолат даволаш самарадорлигининг юқорилигини кўрсатди. Яра жараёнининг кечиши таҳлили шуни кўрсатдики, анъанавий даволаш олиб борилган беморларда некротик тўқималар узоқ вақт сақланиб қолди. Бу ҳолат яранинг тозаланишини секинлаштириб, грануляция тўқимасининг шаклланишини кечиктирди. Шу билан бирга, ушбу гуруҳда инфекцион асоратлар кўпроқ кузатилди. Пневмония, септик ҳолатлар ва умумий интоксикация белгилари кўп ҳолларда қайд этилди.

Фаол жарроҳлик тактикаси қўлланилган беморларда эса яра жараёни анча тез кечди. Некротик тўқималарнинг эрта бартараф этилиши яранинг тез тозаланишига ва соғлом грануляция тўқимасининг шаклланишига олиб келди. Бу гуруҳда яра юзасининг тикланиши тезроқ кузатилди ва кейинги босқичларда тери қопламани тиклаш ишлари самарали амалга оширилди. Асоратлар таҳлили шуни кўрсатдики, анъанавий даволаш гуруҳида асоратлар частотаси юқори бўлди. Инфекцион жараёнлар, умумий ҳолатнинг оғирлашиши ва ички аъзолар фаолиятининг бузилиши кўпроқ қайд этилди. Фаол жарроҳлик гуруҳида эса асоратлар анча кам учради. Бу ҳолат некрознинг эрта бартараф этилиши билан боғлиқ бўлиб, инфекция манбаининг бартараф этилишига олиб келди. Беморларнинг умумий ҳолатини баҳолаш натижасида фаол жарроҳлик усули қўлланилган гуруҳда тезроқ тикланиш кузатилди. Тана ҳарорати нормаллашди, иштаҳа тикланди ва умумий ҳолат яхшиланди.

Даволаш муддати ҳам гуруҳлар ўртасида фарқ қилди. Анъанавий даволашда стационарда ётиш муддати узоқ бўлди. Фаол жарроҳлик гуруҳида эса даволаш муддати сезиларли даражада қисқарди. Шундай қилиб, олинган натижалар фаол жарроҳлик тактикасининг чуқур куйишларда юқори самарадорлигини кўрсатди. Ушбу усул яра жараёнини тезлаштириш, асоратларни камайтириш ва беморларнинг умумий ҳолатини яхшилаш имконини берди. Олинган натижалар чуқур термик куйишларни замонавий тиббиёт нуқтаи назаридан мураккаб ва кўп омилли патологик жараён сифатида баҳолаш мумкинлигини кўрсатди. Кузатувлар шуни тасдиқладики, куйиш жараёни нафақат маҳаллий тўқима зарарланиши билан чекланиб қолмайди, балки бутун организмда чуқур системали ўзгаришларни келтириб чиқаради.

Тадқиқот натижаларига кўра, чуқур куйишларда асосий патогенетик омиллардан бири микроциркуляция бузилиши ҳисобланади. Қон айланишининг бузилиши тўқималарда гипоксия ривожланишига олиб келиб, регенерация жараёнларини секинлаштиради. Бу эса яра жараёнининг узоқ давом этишига ва асоратлар хавфининг ошишига сабаб бўлади. Шу билан бирга, организмдаги гиповолемия ҳолати ҳам муҳим аҳамиятга эга. Куйиш юзасидан суюқлик йўқотилиши қон ҳажмининг камайишига олиб келиб, гемодинамиканинг издан чиқишига сабаб бўлади. Бу ҳолат ички аъзолар перфузиясининг пасайишига ва улар фаолиятининг бузилишига олиб келади. Тадқиқот натижалари шундан далолат берадики, некротик тўқималарнинг узоқ сақланиши куйиш касаллигида асоратлар ривожланишининг асосий омилларидан бири ҳисобланади. Некроз инфекция учун қулай муҳит яратиб, микробларнинг фаол кўпайишига шароит туғдиради.

Бу эса септик ҳолатларнинг ривожланишига олиб келиши мумкин. Анъанавий даволаш усулларида некротик тўқималарнинг табиий равишда ажралишига интилиш кўп ҳолларда даволаш жараёнини секинлаштиради. Бу вақт давомида инфекция ривожланиши ва умумий ҳолатнинг ёмонлашиши эҳтимоли юқори бўлиб қолади. Фаол жарроҳлик тактикаси қўлланилган ҳолларда эса патогенетик жараёнга тўғридан-тўғри таъсир кўрсатиш имконияти пайдо бўлади. Некротик тўқималарни эрта бартараф этиш инфекция манбаини йўқотади ва яра юзасини тез тозаланишига олиб келади. Бу эса организмдаги интоксикация даражасининг камайишига ва умумий ҳолатнинг яхшиланишига хизмат қилади. Шу билан бирга, эрта жарроҳлик аралашуви яра жараёнининг кейинги босқичларини тезлаштиради. Соғлом грануляция тўқимасининг шаклланиши тезроқ кузатилади, бу эса кейинги тиклаш ишларини самарали амалга ошириш имконини беради. Тадқиқотда олинган маълумотлар шуни кўрсатдики, фаол жарроҳлик тактикаси қўлланилган беморларда гемодинамик кўрсаткичлар тезроқ барқарорлашади. Бу ҳолат организмдаги умумий ҳолатнинг тикланишини тезлаштиради ва даволаш самарадорлигини оширади.

Бундан ташқари, комплекс даволаш ёндашуви, жумладан интенсив терапия, организмдаги метаболик ўзгаришларни барқарорлаштиришда муҳим аҳамиятга эга. Бу усуллар биргаликда қўлланилганда, даволаш натижалари сезиларли даражада яхшиланади. Шуни таъкидлаш жоизки, чуқур куйишларда даволаш тактикасини танлашда ҳар бир беморга индивидуал ёндашув талаб этилади. Беморнинг умумий ҳолати, гемодинамик кўрсаткичлари ва яра жараёнининг кечиши ҳисобга олиниши лозим. Олинган натижалар фаол жарроҳлик тактикасининг устунлигини тасдиқлаб, уни амалиётга кенг жорий этиш зарурлигини кўрсатади. Бу ёндашув асоратларни камайтириш, даволаш муддатини қисқартириш ва беморларнинг ҳаёт сифатини яхшилаш имконини беради. Шундай қилиб, чуқур куйишларни даволашда клиник ва инструментал баҳолаш асосида фаол жарроҳлик тактикасини қўллаш энг самарали йўналишлардан бири ҳисобланади.

Хулоса. Олинган натижалар шуни кўрсатдики, анъанавий даволаш усуллари кўп ҳолларда қўлланган самарани бермайди, чунки улар некротик тўқималарни ўз вақтида бартараф этиш имконини чеклайди. Бу эса даволаш муддатининг узайиши ва асоратлар частотасининг ошишига сабаб бўлади. Фаол жарроҳлик тактикаси қўлланилган ҳолларда эса даволаш жараёни сезиларли даражада самарали кечиши аниқланди. Некротик тўқималарни эрта бартараф этиш инфекция манбаини йўқотиб, интоксикация даражасини камайтиради ва яра жараёнини тезлаштиради. Шу билан бирга, фаол жарроҳлик ёндашуви гемодинамик кўрсаткичларнинг тезроқ барқарорлашувига ва организм функцияларининг тикланишига ижобий таъсир кўрсатди. Бу эса беморларнинг умумий ҳолатини яхшилаш ва даволаш натижаларини оширишга хизмат қилди.

Адабиётлар рўйхати:

1. Рузибоев С.А. Ожог касаллигида замонавий даволаш усуллари. – Самарқанд: СамДТУ, 2018.
2. Курбаниязов З.Б. Чуқур куйишларда жарроҳлик даволаш тактикаси. – Тошкент, 2019.

3. Хурсанов Ё.Э. Куйиш жароҳатларида жарроҳлик ёндашувни оптималлаштириш. – Самарқанд, 2022.

4. Амонов Х.Р. Куйиш яраларини даволашда замонавий усуллар. – Самарқанд, 2021.

5. Мустафакулов И.Б. Куйиш касаллигида интенсив терапия. – Тошкент, 2017.

6. Хакимов Э.А. Куйиш билан оғриган беморларни комплекс даволаш. – Самарқанд, 2020.

7. Умедов Х.А. Куйиш жараёнларининг клиник кечиши. – Самарқанд, 2019.

8. Авазов А.А. Чуқур куйишларда жарроҳлик тактикаси. – Самарқанд, 2021.

9. Матлубов М.М. Жарроҳлик амалиётида куйиш яраларини даволаш. – Тошкент, 2016.

10. Даминова Ф.А. Куйишларда инфузион терапиянинг аҳамияти. – Тошкент, 2018.

11. Шербеков У.А. Куйиш касаллигида замонавий ёндашувлар. – Тошкент, 2020.

12. Рахманов Қ.Е. Куйиш касаллигида интенсив терапия асослари. – Самарқанд, 2019.

Иқтибос учун: Хақназарова М.Н., Рузибоев С.А., Мансуров Т.Т. Чуқур куйишларда жарроҳлик тактикасини оптималлаштириш: клиник-инструментал ёндашув // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2026. – № 4(24). – Б. 857–861. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19703861>

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ МАЛОИНВАЗИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ТЯЖЁЛОМ ОСТРОМ ПАНКРЕАТИТЕ**Абдулсаидов С.К.¹, Хурсанов Ё.Э.¹, Тухтаев Ж.К.²**¹Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан²Центральная больница медицинского объединения Тайлакского района, Тайлакский р-н, Узбекистан

Резюме. Тяжелый острый панкреатит остается одной из наиболее сложных проблем ургентной абдоминальной хирургии, характеризуясь высокой частотой местных и системных осложнений, значительной длительностью лечения, необходимостью этапного хирургического подхода и сохраняющейся летальностью. В работе представлены современные возможности минимально инвазивных вмешательств при тяжелом остром панкреатите по материалам Самаркандского филиала Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи. Проведен клинико-аналитический анализ результатов обследования и лечения больных с тяжелым острым панкреатитом, находившихся на стационарном лечении в профильных отделениях центра. Оценены диагностические критерии тяжести состояния, особенности локальных панкреатогенных осложнений, показания к различным видам миниинвазивных вмешательств, последовательность этапного лечения и их влияние на клинические исходы.

Ключевые слова: тяжелый острый панкреатит, панкреонекроз, минимально инвазивные вмешательства, пункционное дренирование, лапароскопия, забрюшинная некрэктомия, инфицированный панкреонекроз, Самарканд, экстренная хирургия.

MINIMALLY INVASIVE TECHNOLOGIES IN THE TREATMENT OF SEVERE FORMS OF ACUTE PANCREATITIS**Abdulsaidov S.K.¹, Khursanov E.E.¹, Tukhtaev J.K.²**¹Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan²Central hospital of the medical association of the Tailak district, Tailak, Uzbekistan

Resume. Severe acute pancreatitis remains one of the most challenging problems in urgent abdominal surgery, characterized by a high incidence of local and systemic complications, prolonged treatment, the need for a staged surgical approach, and persistently high mortality. At the present stage of emergency surgery development, minimally invasive interventions play a leading role in the comprehensive treatment of this category of patients, making it possible to achieve adequate decompression, sanitation, and drainage of pathological foci with less surgical trauma, a lower risk of multiple organ failure, and improved short-term treatment outcomes. This paper presents the modern possibilities of minimally invasive interventions in severe acute pancreatitis based on the materials of the Samarkand branch of the Republican Scientific Center for Emergency Medical Care. A clinical and analytical assessment of the examination and treatment outcomes of patients with severe acute pancreatitis who were hospitalized in the specialized departments of the center was performed. The diagnostic criteria of disease severity, the features of local pancreatogenic complications, the indications for various types of minimally invasive interventions, the sequence of staged treatment, and their influence on clinical outcomes were evaluated.

Keywords: severe acute pancreatitis, pancreatic necrosis, minimally invasive interventions, puncture drainage, laparoscopy, retroperitoneal necrosectomy, infected pancreatic necrosis, Samarkand, emergency surgery.

ЎТКИР ПАНКРЕАТИТНИНГ ОВИР ШАКЛЛАРИНИ ДАВОЛАШДА МИНИМАЛ ИНВАЗИВ ТЕХНОЛОГИЯЛАР**Абдулсаидов С.К.¹, Хурсанов Ё.Э.¹, Тухтаев Ж.К.²**¹Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон²Тайлоқ тумани тиббиёт бирлашмаси марказий шифохонаси, Тайлоқ т., Ўзбекистон

Резюме. Оғир ўткир панкреатит шошилиш абдоминал жарроҳликнинг энг мураккаб муаммоларидан бири бўлиб қолмоқда ва у маҳаллий ҳамда тизимли асоратларнинг юқори учраши, даволашнинг узоқ давом этиши, босқичма-босқич жарроҳлик ёндашув зарурлиги ҳамда ўлим қўрсаткичининг ҳануз юқорилиги билан тавсифланади. Мазкур ишда Республика шошилиш тиббий ёрдам илмий маркази Самарқанд филиали материаллари асосида оғир ўткир панкреатитда минимал

инвазив аралашувларнинг замонавий имкониятлари ёритилган. Марказнинг ихтисослаштирилган бўлимларида статсионар даволанган оғир ўткир панкреатитли беморларни текшириши ва даволаш натижаларининг клиник-аналитик таҳлили ўтказилди. Ҳолат оғирлигининг диагностик мезонлари, панкреатоген маҳаллий асратларнинг хусусиятлари, минимал инвазив аралашувларнинг турли кўринишларига кўрсатмалар, босқичли даволаш кетма-кетлиги ва уларнинг клиник натижаларга таъсири баҳоланди.

Калит сўзлар: оғир ўткир панкреатит, панкреонекроз, минимал инвазив аралашувлар, пункцион дренажлаш, лапароскопия, ретроперитонеал некрэктомия, инфекцияланган панкреонекроз, Самарқанд, шошилинч жарроҳлик.

Введение. Тяжелый острый панкреатит представляет собой одно из наиболее драматичных и прогностически неблагоприятных заболеваний органов брюшной полости. Несмотря на развитие интенсивной терапии, совершенствование лучевой диагностики, внедрение современных антибактериальных, инфузионных и органопротективных технологий, проблема лечения данной патологии сохраняет высокую актуальность[5,8]. Это обусловлено быстрым развитием системной воспалительной реакции, эндогенной интоксикации, расстройств микроциркуляции, полиорганной дисфункции, а также формированием парапанкреатических инфильтратов, жидкостных скоплений, забрюшинных флегмон, инфицированного панкреонекроза и аррозивных кровотечений[1,2].

Особая сложность тяжелого острого панкреатита состоит в неоднородности клинического течения. Даже при схожей начальной симптоматике у одних пациентов заболевание может регрессировать на фоне интенсивной терапии, тогда как у других быстро прогрессирует с развитием деструктивных изменений поджелудочной железы и множественных осложнений. В этой связи успех лечения определяется не только своевременной диагностикой, но и правильным выбором хирургической тактики, в том числе объема, способа и сроков вмешательства[3,7,9].

Традиционные открытые операции, ранее широко применявшиеся при деструктивных формах панкреатита, нередко сопровождались значительной операционной травмой, усугублением системного воспалительного ответа, высоким риском послеоперационных осложнений и повторных вмешательств[6,10]. На этом фоне закономерным стало формирование концепции щадящего этапного лечения, в которой минимально инвазивные вмешательства заняли центральное место. В современной клинической практике они рассматриваются не как альтернатива всем другим методам, а как основа рационального хирургического менеджмента тяжелого острого панкреатита[4].

Цель исследования. Изучить современные возможности минимально инвазивных вмешательств при тяжелом остром панкреатите.

Материал и методы исследования. Работа основана на анализе результатов обследования и лечения больных с тяжелым острым панкреатитом, проходивших лечение в Самаркандском филиале Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи за период 2022-2026 годы.

В исследование были включены пациенты с клинико-лабораторными и инструментально подтвержденными тяжелыми формами острого панкреатита, сопровождавшимися выраженной системной воспалительной реакцией, органной дисфункцией, формированием жидкостных скоплений, панкреатогенного перитонита, распространенных поражений забрюшинной клетчатки, стерильных и/или инфицированных некротических изменений.

Общее число больных составило $n=126$. Мужчин было 68 (54%), женщин — 58 (46%). Средний возраст пациентов составил $[46\pm 10]$ лет. Основными этиологическими факторами были билиарный генез, алиментарно-алкогольные причины, смешанные механизмы, а также другие факторы.

Результаты исследования. Анализ клинического материала показал, что у значительной части больных тяжелый острый панкреатит протекал на фоне выраженного эндотоксикоза, гиповолемии, гемоконцентрации и нарастающей дисфункции жизненно важных органов. Уже на этапе поступления у многих пациентов отмечались тахикардия, гипертермия, выраженный болевой синдром, парез желудочно-кишечного тракта, лабораторные признаки воспаления и метаболических нарушений. У части больных имели место дыхательная недостаточность, гипотензия, олигурия и признаки почечной дисфункции.

Инструментальные исследования выявляли увеличение размеров поджелудочной железы, неоднородность ее структуры, перифокальный отек, наличие жидкостных скоплений в сальниковой сумке, парапанкреатической клетчатке, латеральных каналах и малом тазу. В более поздние сроки заболевания определялись организующиеся и/или инфицированные жидкостные образования, участки некротических изменений и распространение процесса на забрюшинную клетчатку.

Одним из ключевых моментов лечебной тактики явилось выделение группы пациентов, у которых минимально инвазивные вмешательства могли быть применены как основной метод хирургической коррекции локальных осложнений. Наиболее часто показаниями к таким вмешательствам служили напряженные жидкостные скопления, признаки их инфицирования, компрессионный синдром, прогрессирующий эндотоксикоз на фоне неэффективности консервативной терапии, наличие ферментативного или гнойного выпота в брюшной полости, а также необходимость морфологической верификации характера содержимого.

В ранние сроки заболевания лечебно-диагностические пункции под ультразвуковым контролем позволяли оценить характер экссудата, уменьшить внутриочаговое давление и, в ряде случаев, добиться временной стабилизации состояния. Наиболее выраженный эффект отмечался у пациентов с ограниченными жидкостными образованиями без грубого тканевого детрита. Получение инфицированного содержимого, высокая бактериальная контаминация и наличие большого количества некротических масс являлись показателями к более активному дренирующему или этапному вмешательству.

Таблица 1.

Виды минимально инвазивных вмешательств

Вид вмешательства	Число больных	Доля, %
Пункция жидкостного скопления под УЗ-контролем	24	19,0
Чрескожное катетерное дренирование	38	30,2
Лапароскопическая санация и дренирование	29	23,0
Повторное/этапное дренирование	17	13,5
Комбинированные миниинвазивные вмешательства	12	9,5
Конверсия к открытой операции	6	4,8

Особое значение в лечении тяжелого острого панкреатита имела этапность. В ряде наблюдений минимально инвазивные вмешательства выполнялись не как единичная процедура, а как элемент последовательной лечебной стратегии. На первом этапе проводилось дренирование наиболее крупных и клинически значимых скоплений, на втором — коррекция положения дренажей, их замена, расширение дренирующих каналов, дополнительное катетерирование новых очагов, а при необходимости — миниинвазивное удаление детрита. Подобная тактика позволяла индивидуализировать лечение и избегать неоправданно агрессивных операций в крайне тяжелой фазе заболевания.

Важным клиническим наблюдением явилось то, что положительная динамика после минимально инвазивного вмешательства нередко проявлялась уже в ближайшие сутки и выражалась в уменьшении тахикардии, стабилизации температуры тела, снижении уровня лейкоцитоза, уменьшении болевого синдрома и улучшении респираторных показателей. Однако окончательная оценка эффективности требовала обязательного сопоставления клинической картины с данными динамического ультразвукового и/или компьютерно-томографического контроля.

У части пациентов после первичного дренирования отмечалось неполное разрешение патологического процесса. Причиной этого служили многокамерность полостей, наличие перегородок, высокая вязкость содержимого, преобладание тканевого детрита, распространение деструкции в труднодоступные отделы забрюшинного пространства. В таких случаях проводилась коррекция миниинвазивной тактики: устанавливались дополнительные дренажи, выполнялась их ревизия, промывание, расширение тракта, либо принималось решение о переходе к более радикальному вмешательству.

Наиболее сложными оставались наблюдения с инфицированным панкреонекрозом и септическими осложнениями. В этих ситуациях минимально инвазивные методики не всегда являлись окончательным методом лечения, однако часто выполняли критически важную роль в снижении септической нагрузки и подготовке пациента к следующему этапу. Именно в этой группе больных концепция «от меньшего к большему» демонстрировала наибольшую клиническую целесообразность.

Ближайшие клинические результаты оценивались по динамике температуры тела, частоты сердечных сокращений, уровню лейкоцитов, С-реактивного белка, прокальцитонина, а также по продолжительности интенсивной терапии и общему сроку госпитализации. У пациентов с положительным ответом на миниинвазивное лечение показатели системного воспаления снижались быстрее, чем у больных, потребовавших последующих открытых операций.

Кроме того, у таких больных отмечалась тенденция к более раннему восстановлению моторики кишечника и уменьшению длительности парентеральной поддержки.

Таблица 2.

Показания к минимально инвазивным вмешательствам

Показание	Число больных	Доля, %
Напряженные жидкостные скопления	34	27,0
Подозрение на инфицирование	28	22,2
Панкреатогенный перитонит	19	15,1
Прогрессирующий эндотоксикоз	16	12,7
Неэффективность консервативной терапии	14	11,1
Компрессионный синдром	7	5,6
Диагностическая верификация содержимого	8	6,3

В то же время анализ неудовлетворительных исходов показал, что основными причинами недостаточной эффективности минимально инвазивной тактики являлись позднее поступление больных, массивный инфицированный некроз, многокамерность патологических полостей, сочетание панкреатогенных и сосудистых осложнений, а также выраженная полиорганная недостаточность уже на момент первого вмешательства. Это подчеркивает, что миниинвазивные методы не являются универсальным решением и должны использоваться строго в рамках патогенетически обоснованной стратегии.

Таблица 3.

Ближайшие результаты лечения

Показатель	Значение
Улучшение после первичного миниинвазивного вмешательства	88 (69,8%)
Потребность в повторных вмешательствах	17 (13,5%)
Переход к открытой операции	6 (4,8%)
Послеоперационные осложнения	21 (16,7%)
Средняя длительность пребывания в ОРИТ	4,8±1,6 суток
Средняя длительность стационарного лечения	14,6±5,2 суток
Летальность	9 (7,1%)

Обсуждение. Полученные данные подтверждают, что современное лечение тяжелого острого панкреатита не может базироваться на шаблонном хирургическом подходе. Для этой патологии характерны многофакторность патогенеза, динамичность морфологических изменений и существенное влияние сроков заболевания на эффективность вмешательств. Именно поэтому минимально инвазивные технологии наиболее результативны тогда, когда используются не изолированно, а как часть многоэтапной системы принятия решений.

Одним из главных преимуществ минимально инвазивных вмешательств является снижение хирургической агрессии у пациентов с тяжелым метаболическим и полиорганным дисбалансом. В условиях выраженного системного воспалительного ответа даже технически успешная широкая операция может приводить к усугублению органной дисфункции, тогда как щадящее дренирование позволяет выиграть время, стабилизировать состояние и перевести течение заболевания в более контролируемую фазу. Эта особенность имеет принципиальное значение для экстренной хирургии, где значительная часть больных поступает уже в тяжелом или крайне тяжелом состоянии.

Вторым важным моментом является возможность индивидуализации тактики. Жидкостные скопления при тяжелом панкреатите неоднородны по локализации, объему, структуре и степени инфицирования. Соответственно, и подход к ним должен быть дифференцированным. При преобладании жидкого компонента более оправдано чрескожное дренирование; при наличии выпота в брюшной полости и перитонеальных проявлений — лапароскопическая санация; при глубоком забрюшинном распространении и организованных очагах — комбинированные и этапные ретроперитонеальные вмешательства. Таким образом, универсального метода не существует, а успех лечения определяется точным сопоставлением морфологии очага с типом вмешательства.

Заключение. Современные возможности минимально инвазивных вмешательств при тяжелом остром панкреатите существенно расширили потенциал экстренной абдоминальной хирургии. Эти технологии не только изменили представления о допустимом объеме хирургической агрессии, но и

позволили сформировать новую философию лечения данной патологии — более щадящую, этапную, динамически контролируемую и ориентированную на морфологические особенности процесса.

Минимально инвазивные методики должны рассматриваться как важнейший компонент комплексного лечения, а не как техническая альтернатива открытым операциям. Их оптимальное применение требует тесной интеграции хирургической, реанимационной и лучевой служб. Именно такая междисциплинарная модель обеспечивает своевременность принятия решений, позволяет объективно оценивать эффективность каждого этапа лечения и минимизировать хирургические риски у наиболее тяжелого контингента больных. Для практики Самаркандского филиала РНЦЭМП это направление представляется особенно значимым, поскольку позволяет улучшить результаты лечения пациентов с наиболее тяжелыми формами панкреатической деструкции, сократить число необоснованных ранних лапаротомий и повысить общую эффективность экстренной хирургической помощи.

Список литературы:

1. Tenner S., Vege S.S., Sheth S.G., et al. American College of Gastroenterology Guidelines: Management of Acute Pancreatitis. *American Journal of Gastroenterology*. 2024;119(3):419–437.
2. Leppäniemi A., Tolonen M., Tarasconi A., et al. 2019 WSES guidelines for the management of severe acute pancreatitis. *World Journal of Emergency Surgery*. 2019;14:27.
3. Working Group IAP/APA Acute Pancreatitis Guidelines. IAP/APA evidence-based guidelines for the management of acute pancreatitis. *Pancreatology*. 2013;13(4 Suppl 2):e1–e15.
4. Baron T.H., DiMaio C.J., Wang A.Y., Morgan K.A. American Gastroenterological Association Clinical Practice Update: Management of Pancreatic Necrosis. *Gastroenterology*. 2020;158(1):67–75.e1.
5. Trikudanathan G., Wolbrink D.R.J., van Santvoort H.C., Mallory S., Freeman M., Besselink M.G. Current Concepts in Severe Acute and Necrotizing Pancreatitis: An Evidence-Based Approach. *Gastroenterology*. 2019;156(7):1994–2007.e3.
6. Banks P.A., Bollen T.L., Dervenis C., et al. Classification of acute pancreatitis—2012: revision of the Atlanta classification and definitions by international consensus. *Gut*. 2013;62(1):102–111.
7. Thoeni R.F. The revised Atlanta classification of acute pancreatitis: its importance for the radiologist and its effect on treatment. *Radiology*. 2012;262(3):751–764.
8. Freeman M.L., Werner J., van Santvoort H.C., et al. Interventions for necrotizing pancreatitis: summary of a multidisciplinary consensus conference. *Pancreas*. 2012;41(8):1176–1194.
9. van Santvoort H.C., Besselink M.G., Bakker O.J., et al. A Step-up Approach or Open Necrosectomy for Necrotizing Pancreatitis. *New England Journal of Medicine*. 2010;362(16):1491–1502.
10. Bakker O.J., van Santvoort H.C., van Brunschot S., et al. Endoscopic transgastric vs surgical necrosectomy for infected necrotizing pancreatitis: a randomized trial. *JAMA*. 2012;307(10):1053–1061.

Для цитирования: Абдулсаидов С.К., Хурсанов Ё.Э., Тухтаев Ж.К. Дифференцированный подход к использованию малоинвазивных технологий при тяжёлом остром панкреатите // Вестник фундаментальной и клинической медицины. — 2026. — № 4(24). — С. 862–866. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19703940>

РОЛЬ КОНТРАСТНОЙ МРТ В ВЫЯВЛЕНИИ И ОЦЕНКЕ МЕТАСТАЗОВ ИЗ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Наврузов Р.Р.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. В работе представлены данные о диагностических возможностях магнитно-резонансной томографии с контрастным усилением в выявлении и оценке злокачественных опухолей головного мозга. Актуальность исследования обусловлена высокой частотой встречаемости опухолевых поражений центральной нервной системы и необходимостью повышения точности их ранней диагностики. Целью исследования явилось изучение информативности МРТ с контрастированием в диагностике злокачественных новообразований головного мозга, а также определение характерных морфологических и радиологических признаков опухолевого процесса. В ходе исследования проведена оценка МРТ-изображений пациентов с подозрением на злокачественные опухоли головного мозга с анализом размеров, структуры, контуров образований, характера накопления контрастного вещества и степени перифокального отёка. Результаты показали, что применение контрастной МРТ позволяет более точно визуализировать границы опухоли, выявлять её распространённость, оценивать степень васкуляризации и дифференцировать злокачественные процессы от доброкачественных и неопухолевых изменений. Отмечено, что контрастное усиление значительно повышает диагностическую чувствительность метода. Полученные данные подтверждают высокую диагностическую значимость МРТ с контрастированием и обосновывают её применение в клинической практике для раннего выявления и уточнённой диагностики злокачественных опухолей головного мозга.

Ключевые слова: магнитно-резонансная томография, контрастное усиление, злокачественные опухоли, головной мозг, нейровизуализация, диагностика, опухолевые образования.

THE ROLE OF CONTRAST-ENHANCED MRI IN THE DETECTION AND EVALUATION OF BRAIN METASTASES FROM MALIGNANT TUMORS

Navruzov R.R.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. This study presents the diagnostic value of contrast-enhanced magnetic resonance imaging (MRI) in the detection and evaluation of brain metastases originating from malignant tumors. The relevance of the study is determined by the high incidence of central nervous system metastatic lesions and the need to improve early and accurate diagnosis. The aim of the study was to assess the diagnostic informativeness of contrast-enhanced MRI in brain metastatic lesions and to identify characteristic morphological and radiological features of metastatic processes. MRI scans of patients with suspected brain metastases were analyzed, including evaluation of lesion size, structure, margins, pattern of contrast enhancement, and degree of peritumoral edema. The results demonstrated that contrast-enhanced MRI provides improved visualization of lesion boundaries, better assessment of tumor extent, vascularity, and differentiation between malignant, benign, and non-tumorous processes. It was found that contrast enhancement significantly increases diagnostic sensitivity. The obtained data confirm the high diagnostic value of contrast-enhanced MRI and support its use in clinical practice for early detection and accurate assessment of brain metastases.

Keywords: magnetic resonance imaging, contrast enhancement, brain metastases, malignant tumors, neuroimaging, diagnosis, brain lesions.

КОНТРАСТЛИ МРТНИНГ БОШ МИЯ ХАВФЛИ ЎСМАЛАРИДАН КЕЛИБ ЧИҚҚАН МЕТАСТАЗЛАРНИ АНИҚЛАШ ВА БАҲОЛАШДАГИ РОЛИ

Наврузов Р.Р.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Мазкур ишда бош миянинг хавфли ўсмаларидан келиб чиққан метастазларни аниқлаш ва баҳолашда контраст кучайтирилган магнит-резонанс томографиянинг диагностик имкониятлари ёритилган. Тадқиқотнинг долзарблиги марказий нерв тизими ўсмаларининг кенг тарқалганлиги ва уларни эрта ҳамда аниқ таъхислаш зарурати билан белгиланади. Тадқиқотнинг мақсади контрастли МРТнинг бош мия метастатик шикастланишларини таъхислашдаги информативлигини ўрганиш ҳамда ўсма жараёнига хос морфологик ва радиологик белгиларни аниқлашдан иборат. Тадқиқот

давомида бош мияда метастазга шубҳа қилинган беморларнинг МРТ тасвирлари баҳоланиб, ўлчамлар, тузилма, контурлар, контраст модданинг тўпланиш хусусияти ва перифокал шийи даражаси таҳлил қилинди. Натижалар шуни кўрсатдики, контрастли МРТ қўлланилиши ўсма чегараларини аниқроқ кўрсатиш, унинг тарқалиш даражасини баҳолаш, васкуляризация даражасини аниқлаш ҳамда хавфли ва хавфсиз жараёнларни дифференциал таххислаш имконини беради. Контраст кучайтириш усули диагностик сезгирликни сезиларли даражада ошириш қайд этилди. Олинган натижалар контрастли МРТнинг юқори диагностик аҳамиятини тасдиқлайди ва уни клиник амалиётда бош мия метастазларини эрта аниқлаш ҳамда аниқлаштирилган таххис қўйишида қўллашни асослайди.

Калит сўзлар: магнит-резонанс томография, контраст кучайтириш, метастазлар, хавфли ўсмалар, бош мия, нейровизуализация, диагностика, ўсма ҳосилалари.

Введение. Метастатическое поражение головного мозга является одной из наиболее частых форм вторичного опухолевого поражения центральной нервной системы и встречается при различных злокачественных новообразованиях. Развитие метастазов существенно ухудшает прогноз заболевания, ограничивает терапевтические возможности и требует своевременной и точной диагностики.

В современной клинической практике ведущую роль в выявлении метастатических поражений головного мозга играет магнитно-резонансная томография (МРТ), особенно с применением контрастного усиления. Контрастная МРТ позволяет значительно повысить чувствительность метода, улучшить визуализацию мелких очагов, определить их локализацию, структуру, степень васкуляризации и характер распространения.

Несмотря на высокую диагностическую значимость метода, остаются вопросы стандартизации оценки морфологических и радиологических признаков метастатических очагов, а также интерпретации данных МРТ в зависимости от особенностей опухолевого процесса. Это обуславливает необходимость дальнейшего изучения возможностей контрастной МРТ в диагностике метастазов головного мозга.

В связи с этим актуальным является анализ роли контрастно-усиленной МРТ в выявлении и оценке метастатических поражений головного мозга, что позволяет повысить точность диагностики и улучшить выбор тактики лечения пациентов.

Методы диагностики. В исследовании использовались современные методы лучевой диагностики, направленные на выявление и оценку метастатических поражений головного мозга.

Основным методом являлась магнитно-резонансная томография (МРТ), выполненная в стандартных режимах (T1-, T2-взвешенные изображения, FLAIR) с обязательным применением контрастного усиления на основе гадолинийсодержащих препаратов. Контрастная МРТ позволяла оценить характер накопления контрастного вещества, определить границы очагов, их структуру, наличие некротических изменений и степень перифокального отека.

Дополнительно применялась компьютерная томография (КТ) для уточнения локализации очагов, оценки кальцификации, кровоизлияний и состояния костных структур черепа.

Морфологический анализ включал оценку размеров метастатических очагов, их формы, контуров, плотности/сигнальных характеристик, а также взаимосвязи с окружающими структурами головного мозга.

Полученные данные анализировались в сравнительном аспекте с целью определения диагностической эффективности контрастной МРТ и уточнения типичных признаков метастатического поражения головного мозга.

Результаты. Метастатическое поражение головного мозга представляло собой вторичные опухолевые очаги, возникающие вследствие гематогенного распространения злокачественных клеток из первичного опухолевого процесса. В диагностике данной патологии ведущая роль принадлежит магнитно-резонансной томографии (МРТ), обладающей высокой чувствительностью и специфичностью в выявлении очаговых изменений вещества мозга.

По данным МРТ метастазы чаще локализовались в субкортикальных отделах полушарий большого мозга, преимущественно на границе серого и белого вещества, что обусловлено особенностями сосудистой архитектоники и гематогенного заноса опухолевых клеток. Нередко очаги определялись в мозжечке и структурах задней черепной ямки. В большинстве случаев выявлялось множественное поражение, реже — солитарные очаги.

На T1-взвешенных изображениях метастазы, как правило, имели изоинтенсивный или гипоинтенсивный сигнал по отношению к серому веществу. На T2-взвешенных изображениях и в режиме FLAIR очаги характеризовались гиперинтенсивным сигналом, при этом вокруг них определялся вы-

раженный перифокальный вазогенный отёк, распространяющийся преимущественно по белому веществу. Размеры зоны отёка нередко превышали размеры самого опухолевого узла, что сопровождалось формированием масс-эффекта различной степени выраженности (смещение срединных структур, компрессия желудочковой системы).

После внутривенного контрастного усиления препаратами гадолиния отмечалось интенсивное накопление контраста по периферии очага. Наиболее типичным являлось кольцевидное контрастирование, обусловленное наличием центрального некроза. В ряде случаев наблюдалось узловое гомогенное усиление сигнала.

При использовании диффузионно-взвешенных изображений (DWI) выраженного ограничения диффузии, характерного для абсцессов, как правило, не отмечалось; значения коэффициента диффузии (ADC) в зоне некроза были повышены. Перфузионные методы МРТ выявляли увеличение показателей регионарного церебрального кровотока по периферии опухолевого узла, что способствовало дифференциальной диагностике метастазов и лучевого некроза.




Рис.1. МРТ головного мозга. Метастаз (аксиальная T2 (А)-взвешенная и STIR (Б)-магнитно-резонансная томография)

Аксиальная T2-взвешенная и STIR-магнитно-резонансная томография головного мозга демонстрирует интрапаренхиматозное образование в правой теменно-затылочной области. Повреждение имеет неправильную округлость и демонстрирует неоднородную гиперинтенсивность при T2-взвешенной визуализации. В центральной области наблюдается заметно повышенная интенсивность сигнала, что свидетельствует о некротических изменениях [рис.4,2].

Выраженный вазогенный перифокальный отек окружает очаг поражения, распространяясь на прилегающее белое вещество. Эффект массирования проявляется в сглаживании кортикальных борозд, сдавлении заднего рога бокового желудочка и легком смещении средней линии влево.




Рис.2. МРТ головного мозга. Метастаз (сагиттальная T1-взвешенная визуализация)

Сагиттальная T1-взвешенная МРТ выявила интрапаренхиматозное образование в правой теменно-затылочной области. По сравнению с нормальной паренхимой головного мозга очаг поражения был от гипо- до изоинтенсивен, а в центре располагалась область выраженной гипоинтенсивности, что соответствовало некрозу. Массирование вызвало значительный масс-эффект, вызвав деформацию прилегающих участков бокового желудочка и незначительное смещение как супра-, так и инфратенториальных структур. Примечательно, что наблюдалась диспропорция между размером твер-

дого компонента и клинически значимым массовым эффектом, что более характерно для метастатического заболевания. Признаков инфильтративного распространения по мозолистому телу или вовлечения структур ствола мозга обнаружено не было.

Выводы. Проведённое исследование показало, что магнитно-резонансная томография с контрастным усилением является высокоинформативным методом диагностики метастатических поражений головного мозга. Она позволяет более точно визуализировать очаги, определять их размеры, структуру, границы и характер накопления контрастного вещества.

Установлено, что применение контрастной МРТ значительно повышает чувствительность и специфичность диагностики по сравнению с нативными методами визуализации, способствует выявлению даже мелких метастатических очагов и более раннему обнаружению распространённости процесса.

Список литературы:

1. Henson J. W. et al. Brain metastases: diagnosis and management. Radiology, 2018.
2. Osborn A. G., Salzman K. L. Diagnostic Imaging: Brain. Elsevier, 2019.
3. Linn J., Peters C. Contrast-enhanced MRI in brain metastases. Neuroradiology Journal, 2021.
4. Михайлов И. Б. Лучевая диагностика опухолей головного мозга. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020.
5. Зубарев А. Р. КТ и МРТ в нейроонкологии. — СПб.: СпецЛит, 2019.
6. Левин О. С. Клиническая нейрорадиология. — М.: МЕДпресс-информ, 2021.
7. Bradley W. G. MRI of the Brain. — Philadelphia: Saunders, 2019.
8. Osborn A. G., Salzman K. L. Imaging of Brain Tumors. — Elsevier, 2020.
9. Михайлов И. Б. Лучевая диагностика заболеваний головного мозга. — СПб.: СпецЛит, 2017.
10. Зубарев А. Р. КТ и МРТ в диагностике заболеваний центральной нервной системы. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021.

Для цитирования: Наврузов Р.Р. Роль контрастной МРТ в выявлении и оценке метастазов из злокачественных новообразований головного мозга // Вестник фундаментальной и клинической медицины. — 2026. — № 4(24). — С. 867–870. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19704100>

КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПНЕВМОНИИ У ДЕТЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТА**Ахмедова М.М.**

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Пневмония у детей остаётся одной из наиболее актуальных проблем современной педиатрии вследствие высокой распространённости, частой необходимости госпитализации и значимого вклада в структуру детской заболеваемости. Особую практическую значимость представляет изучение возрастных клинико-лабораторных особенностей течения данного заболевания. Цель исследования — изучить клинико-лабораторные особенности пневмонии у детей различных возрастных групп. Проведено наблюдательное клинико-лабораторное исследование 96 детей с пневмонией, распределённых на 4 возрастные группы: от 1 месяца до 3 лет, 4–6 лет, 7–11 лет и 12–17 лет. Оценивали клинические проявления заболевания, показатели сатурации кислорода, данные общего анализа крови, уровень С-реактивного белка и результаты рентгенологического исследования. Установлено, что у детей раннего возраста пневмония протекала наиболее тяжело и чаще сопровождалась дыхательной недостаточностью, тахипноэ, снижением сатурации, периоральным цианозом и менее специфичной симптоматикой. У детей дошкольного возраста преобладали лихорадка, влажный кашель и интоксикационный синдром. У школьников и подростков заболевание чаще имело более типичную клиническую картину с продуктивным кашлем, болями в грудной клетке, локальными аускультативными изменениями и более чёткой рентгенологической локализацией воспалительного процесса. Лабораторные показатели у детей младших возрастных групп характеризовались более выраженной воспалительной реакцией, проявляющейся лейкоцитозом, нейтрофилёзом, повышением СОЭ и уровня С-реактивного белка. Сделан вывод о наличии выраженных возрастных различий клинико-лабораторной характеристики пневмонии у детей, что необходимо учитывать при ранней диагностике, оценке тяжести состояния и выборе лечебной тактики.

Ключевые слова: пневмония, дети, возрастные особенности, клинико-лабораторная характеристика, дыхательная недостаточность, воспалительные маркеры.

CLINICAL AND LABORATORY CHARACTERISTICS OF PNEUMONIA IN CHILDREN DEPENDING ON AGE**Axmedova M.M.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Pneumonia in children remains one of the most pressing issues in modern pediatrics due to its high prevalence, frequent need for hospitalization, and significant contribution to the structure of childhood morbidity. Studying the age-related clinical and laboratory characteristics of this disease is of particular practical importance. The aim of the study is to study the clinical and laboratory features of pneumonia in children of various age groups. Observational clinical and laboratory studies were conducted on 96 children with pneumonia, divided into 4 age groups: from 1 month to 3 years, 4–6 years, 7–11 years, and 12–17 years. The clinical manifestations of the disease, oxygen saturation indicators, general blood analysis data, C-reactive protein levels, and radiological examination results were evaluated. It has been established that in young children, pneumonia was most severe and was often accompanied by respiratory failure, tachypnoea, decreased saturation, perioral cyanosis, and less specific symptoms. In preschool children, fever, wet coughing, and intoxication syndrome predominated. In schoolchildren and adolescents, the disease often had a more typical clinical picture with productive coughing, chest pain, local auscultative changes, and a clearer radiological localization of the inflammatory process. Laboratory indicators in younger age groups were characterized by a more pronounced inflammatory reaction manifested by leukocytosis, neutrophilosis, increased ESR, and elevated C-reactive protein levels. It was concluded that there are pronounced age differences in the clinical and laboratory characteristics of pneumonia in children, which must be taken into account during early diagnosis, assessment of the severity of the condition, and selection of treatment tactics.

Keywords: pneumonia, children, age characteristics, clinical and laboratory characteristics, respiratory failure, inflammatory markers.

БОЛАЛАРДА ЁШГА БОҒЛИҚ ПНЕВМОНИЯНИНГ КЛИНИК-ЛАБОРАТОР ТАВСИФИ

Ахмедова М.М.

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Болаларда пневмония юқори тарқалиши, тез-тез касалхонага ётқизиш зарурати ва болалар касалланиш тузилмасига сезиларли ҳисса қўиши туфайли замонавий педиатриянинг энг долзарб муаммоларидан бири бўлиб қолмоқда. Ушбу касаллик кечилишининг ёшга боғлиқ клиник-лаборатор хусусиятларини ўрганиш алоҳида амалий аҳамиятга эга. Тадқиқотнинг мақсади турли ёшдаги болаларда пневмониянинг клиник-лаборатор хусусиятларини аниқлашдан иборат. Пневмония билан касалланган 96 нафар боланинг 4 та ёш гуруҳига бўлинган кузатув клиник-лаборатор текшируви ўтказилди: 1 ойдан 3 ёшгача, 4-6 ёш, 7-11 ёш ва 12-17 ёш. Касалликнинг клиник кўринишлари, кислород сатурацияси кўрсаткичлари, умумий қон таҳлили маълумотлари, С-реактив оқсил даражаси ва рентгенологик текширув натижалари баҳоланди. Аниқланишича, эрта ёшдаги болаларда пневмония энг оғир кечган ва кўпинча нафас етишмовчилиги, тахипноэ, сатурациянинг пасайиши, периорал цианоз ва камроқ специфик симптоматика билан кечган. Мактабгача ёшдаги болаларда иситма, нам йўтал ва интоксикация синдроми устунлик қилди. Мактаб ўқувчилари ва ўсмирларда касаллик кўпинча маҳсулдор йўтал, кўкрак қафасидаги оғриқлар, маҳаллий аускултатив ўзгаришлар ва яллиғланиш жараёнининг аниқроқ рентгенологик жойлашуви билан характерли клиник кўринишга эга эди. Кичик ёшдаги гуруҳлардаги болаларда лаборатор кўрсаткичлар лейкоцитоз, нейтрофилёз, ЭЧТ ва С-реактив оқсил даражасининг ошиши билан намоён бўладиган яққолроқ яллиғланиш реакцияси билан тавсифланган. Болаларда пневмониянинг клиник-лаборатор тавсифида ёшга боғлиқ сезиларли фарқлар мавжудлиги тўғрисида хулоса қилинган, бунини эрта таъхислаш, ҳолатнинг оғирлигини баҳолаш ва даволаш тактикасини танлашда ҳисобга олиш зарур.

Калит сўзлар: пневмония, болалар, ёш хусусиятлари, клиник-лаборатор тавсиф, нафас етишмовчилиги, яллиғланиш маркерлари.

Введение. Пневмония у детей остаётся одной из наиболее значимых проблем современной педиатрии и детской пульмонологии, поскольку сохраняет высокую распространённость, нередко требует госпитализации и продолжает вносить существенный вклад в структуру заболеваемости и смертности детского населения [1–3]. По данным международных организаций, наибольшее бремя пневмонии приходится на детей раннего возраста, особенно младше 5 лет, что определяет её высокую медико-социальную значимость [1, 3, 4].

Актуальность проблемы обусловлена не только широкой распространённостью заболевания, но и выраженной вариабельностью его клинических проявлений в разные возрастные периоды [1, 5, 6]. У детей раннего возраста пневмония нередко протекает с преобладанием общих симптомов, дыхательных расстройств и признаков интоксикации, тогда как у детей школьного возраста и подростков клиническая картина чаще становится более типичной, с локальными физикальными симптомами и более чёткой субъективной симптоматикой [5–7].

Возрастные различия течения пневмонии во многом связаны с анатомо-физиологическими особенностями органов дыхания, степенью зрелости иммунной системы, особенностями воспалительного ответа и спектром вероятных возбудителей [5, 7, 8]. В раннем детском возрасте значительную роль играют вирусные патогены, а также смешанные вирусно-бактериальные инфекции, тогда как у детей старшего возраста возрастает значение атипичных возбудителей, в том числе *Mycoplasma pneumoniae* [5, 7, 9]. Это отражается не только на клинической картине, но и на лабораторных показателях воспаления, выраженности дыхательной недостаточности и риске осложнённого течения [5, 6, 8].

Диагностика пневмонии у детей требует комплексного подхода, включающего оценку жалоб, анамнеза, физикальных данных и лабораторно-инструментальных показателей [2, 5, 6]. При этом возраст пациента существенно влияет на диагностическую ценность отдельных симптомов. У детей младшего возраста заболевание может манифестировать неспецифическими признаками — вялостью, отказом от еды, беспокойством, тахипноэ, снижением сатурации, тогда как локальные аускультативные изменения в дебюте заболевания могут быть выражены недостаточно [1, 5, 8]. В старших возрастных группах чаще наблюдаются кашель, боль в грудной клетке, локальное ослабление дыхания, влажные хрипы и более очерченные рентгенологические изменения [5, 7, 9].

В последние годы особое внимание уделяется совершенствованию возраст-ориентированных подходов к диагностике и лечению внебольничной пневмонии у детей, а также поиску клинико-лабораторных критериев, позволяющих своевременно оценить тяжесть состояния и прогноз заболевания [2, 6, 10]. Несмотря на наличие клинических рекомендаций и значительного количества публи-

каций, вопросы сопоставления клинических и лабораторных характеристик пневмонии у детей разных возрастных групп сохраняют практическую значимость и требуют дальнейшего изучения [5, 7, 10].

В связи с этим изучение клинико-лабораторной характеристики пневмонии у детей в зависимости от возраста представляется актуальным и обоснованным как с научной, так и с практической точки зрения.

Цель исследования: изучить клинико-лабораторные особенности пневмонии у детей различных возрастных групп.

Материалы и методы исследования. Исследование носило наблюдательный клинико-лабораторный характер. Пациенты были распределены на 4 возрастные группы: I группа — дети раннего возраста (от 1 месяца до 3 лет) — 24 ребёнка; II группа — дети дошкольного возраста (4–6 лет) — 23 ребёнка; III группа — дети младшего школьного возраста (7–11 лет) — 25 детей; IV группа — подростки (12–17 лет) — 24 пациента.

Критерии включения. В исследование включали детей: с клиническими признаками пневмонии; с подтверждением диагноза по данным рентгенографии органов грудной клетки; с наличием полного клинико-лабораторного обследования.

Критерии исключения. Из исследования исключали: детей с врождёнными пороками лёгких и сердца; пациентов с тяжёлыми иммунодефицитными состояниями; случаи госпитальной пневмонии; детей с неполным объёмом медицинской документации.

Методы исследования. Оценивали: жалобы и анамнестические данные; длительность заболевания до поступления; температуру тела, частоту дыхательных движений, наличие одышки, цианоза; аускультативные и перкуторные изменения; показатели сатурации кислорода; данные общего анализа крови: гемоглобин, количество лейкоцитов, нейтрофилов, лимфоцитов, СОЭ; биохимические маркеры воспаления: С-реактивный белок; результаты рентгенологического исследования.

Статистическую обработку проводили с использованием общепринятых методов вариационной статистики. Количественные показатели представлены в виде среднего значения и стандартной ошибки среднего ($M \pm m$), качественные — в виде абсолютных значений и процентов. Различия считали статистически значимыми при $p < 0,05$.

Результаты исследования. При анализе клинической картины установлено, что течение пневмонии у детей существенно различалось в зависимости от возраста.

У детей I группы заболевание чаще начиналось остро, сопровождалось выраженным нарушением общего состояния, отказом от еды, беспокойством, тахипноэ и признаками дыхательной недостаточности. Повышение температуры тела до фебрильных цифр отмечалось у 79,2% детей, одышка — у 70,8%, снижение сатурации ниже 94% — у 41,7%, периоральный цианоз — у 25,0% пациентов. Кашель в этой группе нередко был малопродуктивным или слабовыраженным.

У детей II группы доминировали симптомы интоксикации, фебрильная лихорадка, влажный кашель и общая слабость. Температура тела выше 38,5°C наблюдалась у 82,6% больных, кашель — у 91,3%, тахипноэ — у 47,8%. У части детей отмечались рвота и снижение аппетита как проявления общего токсикоза.

У пациентов III группы клиническая картина была более типичной: продуктивный кашель, локальные физикальные изменения в лёгких, умеренная лихорадка, боль в грудной клетке при кашле. Аускультативно чаще выслушивались мелкопузырчатые влажные хрипы и локальное ослабление дыхания.

У подростков IV группы пневмония чаще проявлялась жалобами на кашель, боль в грудной клетке, слабость и повышение температуры тела. В этой группе реже наблюдались выраженные признаки дыхательной недостаточности, однако чаще отмечались субъективные жалобы на боль при глубоком вдохе и кашле (таблица 1).

При анализе лабораторных данных установлено, что наиболее выраженные воспалительные изменения регистрировались у детей младших возрастных групп. У детей I группы среднее количество лейкоцитов составило $14,8 \pm 0,9 \times 10^9/\text{л}$, нейтрофильный сдвиг влево выявлен у 66,7% пациентов, СОЭ была повышена до $24,6 \pm 1,8$ мм/ч. У детей II группы аналогичные показатели составили $13,9 \pm 0,8 \times 10^9/\text{л}$ и $22,8 \pm 1,5$ мм/ч соответственно.

У детей III группы лейкоцитоз был менее выраженным — $12,1 \pm 0,7 \times 10^9/\text{л}$, СОЭ — $19,7 \pm 1,4$ мм/ч. У подростков IV группы отмечалось наиболее умеренное повышение лейкоцитов — $10,8 \pm 0,6 \times 10^9/\text{л}$, а С-реактивный белок возрастал в меньшей степени по сравнению с младшими возрастными группами (таблица 2).

Таблица 1.

Основные клинические проявления пневмонии у детей в зависимости от возраста, n (%)

Клинический признак	I группа (1 мес.–3 года), n=24	II группа (4–6 лет), n=23	III группа (7–11 лет), n=25	IV группа (12–17 лет), n=24
Лихорадка >38°C	19 (79,2%)	19 (82,6%)	18 (72,0%)	17 (70,8%)
Кашель	17 (70,8%)	21 (91,3%)	24 (96,0%)	23 (95,8%)
Одышка	17 (70,8%)	11 (47,8%)	7 (28,0%)	5 (20,8%)
Снижение SpO ₂ <94%	10 (41,7%)	5 (21,7%)	3 (12,0%)	2 (8,3%)
Периоральный цианоз	6 (25,0%)	2 (8,7%)	1 (4,0%)	0
Боль в грудной клетке	0	2 (8,7%)	8 (32,0%)	10 (41,7%)
Локальные хрипы	12 (50,0%)	16 (69,6%)	20 (80,0%)	19 (79,2%)

Таблица 2.

Лабораторные показатели у детей с пневмонией в зависимости от возраста (M±m)

Показатель	I группа	II группа	III группа	IV группа
Лейкоциты, ×10 ⁹ /л	14,8±0,9	13,9±0,8	12,1±0,7	10,8±0,6
Нейтрофилы, %	68,4±2,1	66,2±1,9	61,8±1,7	58,3±1,6
Лимфоциты, %	23,6±1,8	25,1±1,7	29,4±1,5	31,8±1,4
СОЭ, мм/ч	24,6±1,8	22,8±1,5	19,7±1,4	17,3±1,2
С-реактивный белок, мг/л	26,4±2,3	24,1±2,0	18,7±1,7	15,9±1,4
SpO ₂ , %	93,1±0,7	95,0±0,5	96,2±0,4	96,8±0,3

Рентгенологически у детей раннего возраста чаще выявлялись двусторонние и сегментарные изменения, тогда как у школьников и подростков преобладали очаговые и долевые инфильтраты с более четкой локализацией.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что пневмония у детей имеет отчетливые возрастные клиничко-лабораторные различия. У детей раннего возраста доминировали признаки дыхательной недостаточности, выраженные нарушения общего состояния и менее специфичная клиническая симптоматика. Это может быть обусловлено анатомо-физиологическими особенностями бронхолегочной системы, незрелостью местных механизмов защиты и ограниченными компенсаторными возможностями организма.

У детей дошкольного возраста наряду с респираторными симптомами сохранялась значительная выраженность интоксикационного синдрома, что отражалось в высокой температурной реакции, слабости и снижении аппетита. В школьном и подростковом возрасте клиническая картина становилась более классической: кашель, боль в грудной клетке, локальные физикальные и рентгенологические признаки воспалительного процесса.

Лабораторные данные показали, что младшие возрастные группы характеризовались более выраженной воспалительной реакцией, что проявлялось лейкоцитозом, нейтрофилёзом, ускорением СОЭ и повышением уровня С-реактивного белка. У подростков воспалительные изменения были менее выраженными, что, вероятно, связано с большей зрелостью иммунного ответа и более локализованным характером инфекционного процесса.

Практическая значимость исследования заключается в том, что знание возрастных особенностей пневмонии позволяет врачу своевременно заподозрить заболевание даже при атипичном начале, особенно у детей младшего возраста, у которых пневмония может протекать с преобладанием общей симптоматики над местными проявлениями.

Выводы. Пневмония у детей характеризуется выраженными возрастными клиничко-лабораторными различиями, что необходимо учитывать при диагностике и оценке тяжести заболевания.

У детей раннего возраста пневмония протекает наиболее тяжело и чаще сопровождается дыхательной недостаточностью, тахипноэ, снижением сатурации, периоральным цианозом и менее специфичной клинической симптоматикой.

У детей дошкольного возраста в клинической картине преобладают лихорадка, влажный кашель и выраженный интоксикационный синдром, что отражает активность воспалительного процесса.

У детей школьного возраста и подростков пневмония чаще имеет более типичное течение с продуктивным кашлем, болями в грудной клетке, локальными аускультативными изменениями и более четкой рентгенологической локализацией очагов воспаления.

Лабораторные показатели у детей младших возрастных групп характеризуются более выраженной воспалительной реакцией, проявляющейся лейкоцитозом, нейтрофилёзом, повышением СОЭ и уровня С-реактивного белка, тогда как у подростков эти изменения выражены умереннее.

Учёт возрастных особенностей клинических и лабораторных проявлений пневмонии имеет важное практическое значение для ранней диагностики, своевременного начала терапии и профилактики осложнений у детей различных возрастных групп.

Список литературы:

1. World Health Organization. Pneumonia in children. Geneva: World Health Organization; 2022.
2. World Health Organization. Guideline on management of pneumonia and diarrhoea in children up to 10 years of age. Geneva: World Health Organization; 2024.
3. UNICEF. Pneumonia in children statistics. New York: UNICEF; 2025.
4. World Health Organization, UNICEF. Ending preventable child deaths from pneumonia and diarrhoea by 2025: the integrated Global Action Plan for Pneumonia and Diarrhoea (GAPD). Geneva: World Health Organization; 2013.
5. Yun K.W. Community-acquired pneumonia in children: updated perspectives on its etiology, diagnosis, and treatment // *Clinical and Experimental Pediatrics*. 2024. Vol. 67, No. 2. P. 80–89.
6. Harris M., Clark J., Coote N., Fletcher P., Harnden A., McKean M., Thomson A. British Thoracic Society guidelines for the management of community-acquired pneumonia in children: update 2011 // *Thorax*. 2011. Vol. 66, Suppl. 2. P. ii1–ii23.
7. Cardinale F., Cappiello A.R., Mastrototaro M.F., Barberi S., Cobos-Barroso N. Community-acquired pneumonia in children // *Early Human Development*. 2013. Vol. 89, Suppl. 3. P. S49–S52.
8. le Roux D.M., Zar H.J. Community-acquired pneumonia in children — a changing spectrum of disease // *Pediatric Radiology*. 2017. Vol. 47, No. 11. P. 1392–1398.
9. Sharplin L., Blyth C.C., Currie A.J., Wurzel D., Sheets R., Kesson A. Mycoplasma pneumoniae respiratory tract infections in children // *Journal of Paediatrics and Child Health*. 2025. Published online.
10. Gong W., Gao Y., Wang S., Yang M., Chen S., Li Q. Research progress of biomarkers in evaluating the severity and prognostic value of severe pneumonia in children // *Frontiers in Pediatrics*. 2024. Vol. 12. Article 1417644

Для цитирования: Ахмедова М.М. Клинико-лабораторная характеристика пневмонии у детей в зависимости от возраста // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 4(24). – С. 871–875. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19712623>

**ХИРУРГИК СТОМАТОЛОГИЯДА ЗАМОНАВИЙ ДИАГНОСТИКА УСУЛЛАРИНИНГ РОЛИ
ВА АҲАМИЯТИ****Бузрукзода Ж.Д., Абдуллоев Р.Р., Субхонкулов М.С.**

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Мақолада хирургик стоматологияда диагностика жараёнида замонавий текширув усулларининг роли таҳлил қилинади. Яқинги йилларда рақамли технологиялар, уч ўлчамли компьютер томографияси (СВСТ), 3D тасвирлаш ва дигитал сканерлаш каби инновацион усуллар клиник таъхиснинг аниқлигини ошириш, жарроҳлик аралашувни олдиндан режаслаштириш ва даволаш самарадорлигини ошириш имконини яратганлиги кўрсатилади. Мақола клиник, радиологик, инструментал ва лаборатор текширувларни комплекс қўллаш орқали таъхис аниқлигини ошириш ва беморнинг индивидуал хусусиятларига мос даволаш стратегиясини ишлаб чиқишнинг аҳамиятини таъкидлайди. Шу билан бирга, замонавий диагностика усулларининг бемор ҳаёт сифати ва даволаш натижаларини яхшилашдаги роли батафсил ёритилган.

Калим сўзлар: хирургик стоматология, диагностика, СВСТ, 3D тасвирлаш, рақамли сканерлаш, жағ-юз соҳасидаги патологиялар, индивидуал даволаш стратегияси.

**THE ROLE AND IMPORTANCE OF MODERN DIAGNOSTIC METHODS IN SURGICAL
DENTISTRY****Buzrukzoda J.D., Abdulloyev R.R., Subxonkulov M.S.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. The article analyzes the role of modern diagnostic methods in the process of surgical dentistry. In recent years, innovative techniques such as digital technologies, cone-beam computed tomography (CBCT), 3D imaging, and digital scanning have enhanced the accuracy of clinical diagnosis, facilitated pre-operative planning, and improved treatment effectiveness. The article emphasizes the importance of a comprehensive approach, combining clinical, radiological, instrumental, and laboratory examinations to increase diagnostic accuracy and develop treatment strategies tailored to the individual characteristics of patients. Additionally, the study highlights the role of modern diagnostic methods in improving patients' quality of life and treatment outcomes.

Keywords: surgical dentistry, diagnostics, CBCT, 3D imaging, digital scanning, maxillofacial pathologies, individualized treatment strategy.

**РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В
ХИРУРГИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ****Бузрукзода Ж.Д., Абдуллоев Р.Р., Субхонкулов М.С.**

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. В статье анализируется роль современных методов обследования в диагностическом процессе хирургической стоматологии. В последние годы внедрение цифровых технологий, трёхмерной компьютерной томографии (СВСТ), 3D-визуализации и цифрового сканирования позволило повысить точность клинической диагностики, заранее планировать хирургические вмешательства и улучшить эффективность лечения. Статья подчеркивает важность комплексного использования клинических, радиологических, инструментальных и лабораторных исследований для повышения точности диагностики и разработки индивидуальных стратегий лечения с учётом особенностей пациента. Также подробно освещается роль современных диагностических методов в улучшении качества жизни пациентов и результатов лечения.

Ключевые слова: хирургическая стоматология, диагностика, СВСТ, 3D-визуализация, цифровое сканирование, патологии челюстно-лицевой области, индивидуальная стратегия лечения

e-mail: eshonbobo.1992@gmail.com, rustam-abdullov@bk.ru

Кириш. Хирургик стоматология замонавий тиббиётнинг жадал ривожланаётган йўналишларидан бири бўлиб, у оғиз бўшлиғи ҳамда жағ-юз соҳасида учрайдиган турли патологик ҳолатларни аниқлаш, уларни жарроҳлик йўли билан даволаш ва беморларнинг ҳаёт сифатини яхшилашга қара-

тилган комплекс чораларни ўз ичига олади. Ушбу соҳада муваффақиятли даволаш натижаларига эришиш кўп жиҳатдан тўғри, аниқ ва ўз вақтида қўйилган ташхисга боғлиқ бўлиб, диагностика жараёни бутун даволаш стратегиясининг асосини ташкил этади. Сўнгги йилларда тиббиёт соҳасида кузатилаётган инновацион ривожланишлар, айниқса, рақамли технологиялар, сунъий интеллект элементлари ва юқори аниқликдаги тасвирлаш усулларининг жорий этилиши хирургик стоматологияда диагностика жараёнини янги босқичга олиб чиқди. Илгари фақат клиник кўрик ва оддий рентген текширувларига асосланган ташхис қўйиш тизими бугунги кунда анча кенгайиб, кўп босқичли ва комплекс ёндашувга айланган. Замонавий диагностика усуллари ёрдамида патологик жараёнларни нафақат аниқлаш, балки уларнинг бошланғич босқичларини аниқлаш, яширин кечаётган касалликларни эрта босқичда аниқлаш ҳамда индивидуал даволаш режасини ишлаб чиқиш имконияти пайдо бўлмоқда. Айниқса, жағ-юз соҳасининг мураккаб анатомик тузилиши ва турли касалликларнинг ўзига хос клиник кечиши диагностика жараёнида юқори аниқлик ва чуқур таҳлилни талаб қилади. Шу сабабли замонавий хирургик стоматологияда қўшимча текширув усулларининг роли тобора ортиб бормоқда ва улар клиник қарор қабул қилиш жараёнининг ажралмас қисмига айланмоқда. Бугунги кунда диагностик хатоликларнинг олдини олиш, асоратларни камайтириш ва даволаш самарадорлигини оширишда илғор технологиялардан фойдаланиш муҳим аҳамият касб этади. Шунингдек, беморнинг индивидуал хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда дифференциал диагностика ўтказиш, касалликнинг этиологик ва патогенетик омилларини чуқур таҳлил қилиш ҳам замонавий текширув усулларисиз деярли имконсиздир. Шу жиҳатдан қараганда, диагностика жараёнини такомиллаштириш ва унда инновацион технологияларни кенг қўллаш бугунги кун хирургик стоматологиясининг устувор йўналишларидан бири ҳисобланади.

Сўнгги беш йил давомида олиб борилган илмий тадқиқотлар шуни кўрсатадики, хирургик стоматологияда қўлланилаётган диагностик усуллар сезиларли даражада такомиллашган ва уларнинг аниқлик даражаси ошган. Айниқса, уч ўлчамли тасвирлаш технологиялари, компьютер томографияси ва рақамли диагностика тизимлари ёрдамида касалликларни аниқлаш жараёни янада самарали бўлиб бормоқда. Ушбу усуллар шифокорларга патологик ўзгаришларни чуқурроқ таҳлил қилиш, жарроҳлик аралашув ҳажмини тўғри режалаштириш ҳамда асоратлар хавфини камайтириш имконини бермоқда.

Замонавий адабиётлар таҳлиliga кўра, диагностика жараёнида қўлланилаётган усулларни бир неча гуруҳларга ажратиш мумкин, жумладан, клиник, радиологик, инструментал ва лаборатор текширувлар. Ҳар бир усулнинг ўзига хос афзалликлари ва чекловлари мавжуд бўлиб, уларни тўғри танлаш ташхиснинг аниқлигига бевосита таъсир кўрсатади. Масалан, клиник текширув беморнинг умумий ҳолатини баҳолашда муҳим бўлса-да, кўплаб ҳолларда яширин кечаётган патологияларни аниқлашда етарли бўлмаслиги мумкин. Шу сабабли радиологик ва замонавий инструментал усуллар билан биргаликда қўлланилиши тавсия этилади. Хусусан, уч ўлчамли тасвирлаш технологиялари ёрдамида жағ суякларининг ҳолати, патологик ўзгаришларнинг жойлашуви ва тарқалиш даражаси аниқ баҳоланади. Бундан ташқари, лаборатор текширувлар орқали яллиғланиш жараёнлари ва инфекцион омиллар ҳақида қўшимча маълумот олиш мумкин.

Юқоридагиларни инобатга олган ҳолда, замонавий диагностик текширув усулларининг хирургик стоматологиядаги ўрни ва аҳамиятини чуқур ўрганиш долзарб масалалардан бири ҳисобланади. Ушбу мақоланинг мақсади диагностика жараёнида қўлланилаётган замонавий текширув усулларининг имкониятлари, афзалликлари ва клиник аҳамиятини таҳлил қилишдан иборат.

Методология. Мазкур мақола назарий таҳлил усулига асосланган бўлиб, унда хирургик стоматологияда диагностика жараёнида қўлланилаётган замонавий текширув усулларига оид сўнгги илмий адабиётлар тизимли равишда ўрганилди. Тадқиқот жараёнида 2020–2025 йилларда чоп этилган мақолалар, илмий шарҳлар ва клиник тадқиқотлар таҳлил қилинди. Маълумотлар асосан халқаро илмий базалар орқали танлаб олинди ва уларнинг ишончлилиги, долзарблиги ҳамда илмий аҳамияти инобатга олинди. Танланган манбалар диагностик усулларни қўллаш самарадорлиги, аниқлик даражаси ва клиник натижаларга таъсири бўйича гуруҳлаштирилди ҳамда солиштирма таҳлил асосида умумлаштирилди.

Таҳлил жараёнида турли диагностик усуллар ўзаро солиштирилиб, уларнинг афзалликлари ва чекловлари аниқлаштирилди. Олинган натижалар асосида амалий тавсиялар ишлаб чиқилди ва илмий ҳулосалар шакллантирилди.

Натижалар. Хирургик стоматологияда диагностика жараёнида қўлланилаётган замонавий текширув усулларини таҳлил қилиш натижалари шуни кўрсатадики, уч ўлчамли компьютер томографияси (СВСТ) энг юқори аниқлик ва клиник ишонччилик даражасини таъминлайди. Сўнгги беш йиллик тадқиқотлар асосида СВСТ ёрдамида жағ суякларининг анатомик тузилиши, патологик ўзгаришларнинг жойлашуви ва ўлчамлари юқори аниқликда баҳоланиши мумкинлиги аниқланган. Шу билан

бирга, СВСТ асоратларни камайтириш, жарроҳлик аралашувни олдиндан режалаштириш ва индивидуал даволаш стратегиясини ишлаб чиқишда муҳим рол ўйнайди.

Рақамли ортопантомография (OPG) ва анъанавий рентгенография диагностика жараёнида кўшимча восита сифатида ишлатилади, улар асосий патологияларни аниқлашда самарали бўлса-да, 3D тасвирлаш имкониятларини етарли даражада таъминламайди. Шунингдек, сўнгги тадқиқотларда интраорал сканерлаш технологияси ҳам кенг қўлланилиши қайд этилган бўлиб, у индивидуал протезлар ва имплантлар учун юқори аниқликдаги рақамли моделлар яратишда самарали эканлиги кўрсатилди. Лаборатор ва микробиологик текширувлар эса яллиғланиш жараёнлари ва инфекция омиллари аниқлашда ёрдам беради.

Шу тарзда, комплекс диагностика ёндашуви — яъни клиник, радиологик, инструментал ва лаборатор усулларни биргаликда қўллаш — ташхис аниқлигини сезиларли даражада оширади ва ногўри даволаш хавфини камайтиради. Тадқиқотлар шуни кўрсатадики, индивидуал ёндашувни қўллаш ва беморнинг клиник ҳолатига мос усулларни танлаш диагностика самарадорлигини оширади.

Таҳлил натижалари шуни кўрсатдики, СВСТ билан солиштирганда, OPG ва оддий рентгенография кичик ўзгаришларни аниқлашда камроқ самарали ҳисобланади. Шу билан бирга, OPG беморнинг умумий жағ ҳолатини баҳолашда ва тезкор скрининг сифатида жуда қулай бўлиб, ташхисни дастлабки босқичда аниқлаш имконини беради. Бироқ, мураккаб анатомик тузилиш ёки яширин патологиялар мавжуд бўлганда, фақат анъанавий усулларга таяниш диагностика ҳатолигига олиб келиши мумкин. Шу сабабли, замонавий илмий адабиётлар комплекс ёндашувни тавсия қилади.

Замонавий методлар орасида 3D тасвирлаш технологиялари ва рақамли сканерлаш усуллари энг инновацион воситалардан бири сифатида ажралиб туради. Ушбу усуллар ёрдамида жағ суяқларининг геометрияси, имплантлар жойлашуви ва патологик ўзгаришлар аниқланади. Шу билан бирга, рақамли технологиялар жарроҳлик аралашувларни олдиндан режалаштиришга ёрдам беради ва беморнинг индивидуал анатомик хусусиятларига мослаштирилган даволаш стратегиясини ишлаб чиқишга имкон яратади. Сўнгги тадқиқотлар шуни кўрсатадики, рақамли моделлаш ва 3D технологияларни қўллаш имплантлар муваффақиятини оширади, жарроҳлик вақтини камайтиради ва асоратлар хавфини сезиларли даражада пасайтиради. Шунингдек, лаборатор ва микробиологик текширувлар яллиғланиш жараёнлари ва инфекция хавфини баҳолашда ёрдам беради. Шу тарзда, замонавий усуллар беморнинг умумий ҳолатини баҳолаш, диагностика аниқлигини ошириш ва индивидуал даволаш стратегиясини ишлаб чиқишда муҳим аҳамият касб этади.

Таҳлиллар шуни кўрсатдики, комплекс диагностика ёндашуви энг самарали ҳисобланади. Клиник текширув, радиологик усуллар ва замонавий инструментал методларни биргаликда қўллаш ташхис аниқлигини сезиларли даражада оширади. Шу билан бирга, беморнинг индивидуал анатомик хусусиятлари ва патологиянинг мураккаблиги ҳисобга олинади. Лаборатор текширувлар ёрдамида яллиғланиш жараёнлари ва инфекция хавфи аниқланади. Натижада, диагностика жараёни янада аниқ, тезкор ва ишончли бўлади.

Шунингдек, таҳлиллар шуни кўрсатдики, замонавий диагностик усуллар беморларнинг ҳаёт сифатини ошириш ва даволаш самарадорлигини максимал даражада таъминлаш имконини беради. СВСТ, 3D тасвирлаш, рақамли сканерлаш ва рақамли моделлаш технологиялари ёрдамида жарроҳлик аралашувлар олдиндан режалаштирилади, патологик жараёнлар аниқланади ва даволаш натижаларини прогноз қилиш осонлашади. Шу билан бирга, OPG ва оддий рентгенография каби анъанавий усуллар ҳам скрининг ва дастлабки ташхис босқичида самарали ишлатилади, аммо мураккаб анатомик ёки яширин патологияларни аниқлашда улар етарли бўлмайди.

Лаборатор ва микробиологик текширувлар эса яллиғланиш ва инфекция хавфини баҳолашда кўшимча маълумот беради, бу эса беморнинг индивидуал даволаш режасини ишлаб чиқишга ёрдам беради. Тадқиқот натижалари шуни кўрсатадики, замонавий технологияларни комплекс қўллаш диагностика аниқлигини оширади, ногўри даволаш хавфини камайтиради ва жарроҳлик вақтини қисқартиради. Шу асосда, таҳлил шуни кўрсатадики, замонавий усуллар нафақат касалликни эрта аниқлаш, балки даволаш натижаларини прогноз қилиш ва беморларнинг ҳаёт сифатини яхшилашда ҳам муҳим аҳамият касб этади. Шу билан бирга, индивидуал ёндашув, беморнинг анатомик хусусиятлари ва клиник ҳолатини ҳисобга олган ҳолда усулларни танлаш самарадорликни оширади ва асоратларни минимал даражага туширади.

Муҳокама. Таҳлиллар шуни кўрсатадики, замонавий текширув усулларининг, хусусан СВСТ, 3D тасвирлаш ва рақамли сканерлаш технологияларининг жорий этилиши хирургик стоматологияда диагностика жараёнини сезиларли даражада такомиллаштирди. Илгари диагностика кўпинча клиник текширув ва оддий рентгенографияга таяниб амалга оширилган бўлса, ҳозирги замонавий усуллар

ёрдамида патологик жараёнлар, суяк тузилиши ва тиш илдизларидаги яширин ўзгаришлар аниқ ва тез аниқланиши мумкин. Шу билан бирга, комплекс ёндашув — яъни клиник, радиологик, инструментал ва лаборатор текширувларни биргаликда қўллаш — ташхис аниқлигини оширади, нотўғри даволаш хавфини камайтиради ва жарроҳлик аралашувни олдиндан режалаштириш имконини беради. Тадқиқот натижалари шуни кўрсатадики, СВСТ нинг уч ўлчамли тасвирлаш имконияти суякнинг анатомик мураккаб тузилишини аниқлашда, имплантлар жойлашувини режалаштиришда ва яллиғланиш жараёнларини баҳолашда энг самарали восита ҳисобланади. Шу билан бирга, рақамли сканерлаш ва 3D моделлаш технологиялари беморларнинг индивидуал анатомик хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда шахсий даволаш стратегиясини ишлаб чиқишга ёрдам беради. Ушбу технологиялар орқали жарроҳлик вақтини қисқартириш, асоратлар хавфини камайтириш ва даволаш самарадорлигини ошириш мумкин. Шу нуқтаи назардан, замонавий диагностик усуллар беморнинг ҳаёт сифатини ошириш ва даволаш натижаларини максимал даражада таъминлашда муҳим аҳамият касб этади.

Таҳлиллар шуни кўрсатадики, анъанавий рентген ва OPG усуллари тезкор скрининг ва дастлабки ташхис босқичида самарали бўлса-да, мураккаб патологияларни аниқлашда етарли даражада аниқлик бермайди. Шу сабабли замонавий технологиялар билан уларни бирлаштириш оптимал натижага олиб келади. Шунингдек, лаборатор ва микробиологик текширувлар яллиғланиш ва инфекция хавфини баҳолашда қўшимча маълумот беради, бу эса даволаш режасини индивидуал равишда шакллантириш имконини яратади. Шу тарзда, комплекс ёндашув диагностика аниқлигини оширади ва беморнинг индивидуал эҳтиёжларига мослаштирилган даволашни таъминлайди. Шу билан бирга, таҳлиллар шуни кўрсатадики, замонавий усуллар билан ишлаш жараёнида шифокорларнинг тажрибаси ва технологияни тўғри қўллаш муҳим аҳамият касб этади, чунки нотўғри интерпретация ёки техник хатолик диагностика хатолигига олиб келиши мумкин.

Шу билан бирга, методологик таҳлил шуни кўрсатадики, замонавий диагностика усуллариининг самарадорлиги доимий янгиланиш ва малака ошириш билан боғлиқ. Технологик янгиликлар тез суръатлар билан ривожланаётганлиги сабабли, шифокорлар замонавий қурилмаларни ва рақамли технологияларни тўғри қўллашни доимий равишда ўрганиши лозим. Шу нуқтаи назардан, комплекс ва индивидуал ёндашувни қўллаш диагностика аниқлигини оширади, даволаш натижаларини яхшилади ва бемор хавфсизлигини таъминлайди.

Хулоса. Таҳлиллар шуни кўрсатадики, замонавий текширув усуллари, хусусан СВСТ, 3D тасвирлаш ва рақамли сканерлаш, хирургик стоматологияда диагностика жараёнини сезиларли даражада такомиллаштиради. Ушбу технологиялар орқали жағ-юз соҳасининг мураккаб анатомик тузилиши, патологик ўзгаришлар ва тиш илдизларидаги яширин жараёнлар аниқ аниқланади.

Комплекс ёндашув — клиник, радиологик, инструментал ва лаборатор текширувларни биргаликда қўллаш — ташхис аниқлигини оширади, нотўғри даволаш хавфини камайтиради ва жарроҳлик аралашувни олдиндан режалаштириш имконини беради. Шу билан бирга, индивидуал ёндашув ва беморнинг клиник ҳолатини ҳисобга олиш даволаш самарадорлигини максимал даражада оширади.

Замонавий технологиялар нафақат касалликни эрта аниқлаш, балки даволаш стратегиясини ишлаб чиқиш ва беморнинг ҳаёт сифатини яхшилашда ҳам муҳим аҳамият касб этади. Шу асосда, замонавий диагностик усуллар хирургик стоматологиянинг ажралмас қисми сифатида самарали қўлланилиши зарур.

Адабиётлар рўйхати:

1. T. Kaasalainen, M. Ekholm, T. Siiskonen, and M. Kortenesniemi, “Dental cone beam CT: An updated review,” *Phys. Medica*, vol. 88, pp. 193–217, Aug. 2021, doi: 10.1016/j.ejmp.2021.07.007.
2. F. Alshomrani, “Cone-beam computed tomography (CBCT)-based diagnosis of dental bone defects,” *Diagnostics*, vol. 14, no. 13, Art. no. 1404, Jul. 2024, doi: 10.3390/diagnostics14131404.
3. S. Abesi and M. Alimohamadi, “Performance of artificial intelligence using cone-beam computed tomography for segmentation of oral and maxillofacial structures: A systematic review and meta-analysis,” *J. Clin. Exp. Dent.*, vol. 15, no. 11, pp. e954–e962, 2023, doi: 10.4317/jced.60287.
4. S. Z. Tsolakis et al., “Artificial intelligence as an aid in CBCT airway analysis: A systematic review,” *Life (Basel)*, vol. 12, no. 11, Art. no. 1894, 2022, doi: 10.3390/life12111894.
5. F. Gillot et al., “Automatic segmentation and deep learning methods for CBCT image analysis,” *J. Dent.*, vol. 115, Art. no. 103865, 2021, doi: 10.1016/j.jdent.2021.103865.
6. L. Lim et al., “Deep semi-supervised learning for automatic segmentation of inferior alveolar nerve using CBCT,” *BMC Oral Health*, vol. 21, Art. no. 630, 2021, doi: 10.1186/s12903-021-01983-5.
7. S. Horsch, C. Labis, C. Trebing et al., “Predictability and image quality of low-dose cone-beam computed tomography in computer-guided implan-

tology,” J. Dent., vol. 112, Art. no. 103744, 2021, doi: 10.1016/j.jdent.2021.103744.

8. W. Al-Humairi, R. H. L. Ip, K. Spuur, X. Zheng, and B. Huang, “Visual grading and optimization in CBCT dental implantology imaging: Application of integrated visual grading regression,” Radiat. Environ. Biophys., vol. 61, no. 1, pp. 133–145, 2022, doi: 10.1007/s00411-021-00959-x.

9. “Diagnostic reference levels and dose optimization in dental cone-beam CT,” Phys. Medica, vol. 89, pp. 147–150, Aug. 2025, doi: 10.1016/j.ejmp.2025.147150.

10. S. Song et al., “Diagnostic accuracy of CBCT versus intraoral imaging for peri-implant bone defects,” BMC Med. Imaging, vol. 21, Art. no. 23, 2021, doi: 10.1186/s12880-021-00557-9.

11. E. Koch et al., “Accuracy of linear measurements on CBCT images related to presurgical implant treatment planning: A systematic review,” Clin. Oral Implants Res., vol. 29, Suppl. 16, pp. 393–415, 2018, doi: 10.1111/clr.13141.

12. A. Bianchi et al., “Three-dimensional digital applications for implant space planning in ortho-

dontics: A narrative review,” J. World Fed. Orthod., vol. 11, no. 6, pp. 207–215, 2022, doi: 10.1016/j.ejwf.2022.10.006.

13. C. De Vos, J. Casselman, and G. R. J. Swennen, “Cone-beam computed tomography (CBCT) imaging of the oral and maxillofacial region: A systematic review,” Int. J. Oral Maxillofac. Surg., vol. 38, no. 6, pp. 609–625, 2009, doi: 10.1016/j.ijom.2009.02.028.

14. S. Patel, J. Brown, T. Pimentel, R. D. Kelly, F. Abella, and C. Durack, “Cone beam computed tomography in endodontics—a review of the literature,” Int. Endod. J., vol. 52, no. 8, pp. 1138–1152, 2019, doi: 10.1111/iej.13115.

15. K. Kapila and J. M. Nervina, “CBCT in orthodontics: Assessment of treatment outcomes and indications for its use,” Dentomaxillofac. Radiol., vol. 44, Art. no. 20140282, 2015, doi: 10.1259/dmfr.20140282.

16. H. Tsolakis et al., “AI as an aid in CBCT airway analysis,” Life (Basel), vol. 12, Art. no. 1894, 2022, doi: 10.3390/life12111894.

Иқтибос учун: Бузрукзода Ж.Д., Абдуллоев Р.Р., Субхонкулов М.С. Хирургик стоматологияда замонавий диагностика усулларининг роли ва аҳамияти // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2026. – № 4(24). – Б. 876–880. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19712662>

ГАСТРОДУОДЕНАЛ ЯРА ҚОН КЕТИШЛАРИ РЕЦИДИВИНИ ЭРТА БАШОРАТ ҚИЛИШДА ХАВФ ОМИЛЛАРИ ВА ДИАГНОСТИК ЁНДАШУВЛАРНИ ОПТИМАЛЛАШТИРИШ

Курбаниязов З.Б.¹, Хурсанов Ё.Э.¹, Рузибоев Ш.Ж.², Мансуров Т.Т.², Эргашев А.Ф.²

¹Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

²Республика шошилинч тиббий ёрдам илмий маркази Самарқанд филиали, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Ушбу илмий тадқиқотда гастродуоденал ярали қон кетишларнинг такрорланиши хавфини баҳолаш ва башорат қилишда Rockall шкаласининг самарадорлиги ўрганилди. 121 нафар бемор мисолида ўтказилган таҳлиллар натижасида шкаланинг 7 баллик чегаравий нуқтаси қон кетиш хавфини прогноз қилишда юқори сезувчанлик (98,7%) ва ўзига хослик (95%) билан ажралиб тургани аниқланди. Тадқиқотда қон кетиш манбаси, яра ўлчами ва локализацияси, Форрест классификацияси, гемодинамик кўрсаткичлар, лаборатор таҳлиллар ва ҳамроҳ касалликлар таҳлил қилинди. Rockall шкаласи бўйича юқори балл тўплаган беморларга гибрид жарроҳлик тактикаси (эндоскопик назорат ва лапароскопик гемостаз) таклиф этилади.

Калим сўзлар: гастродуоденал яра, қон кетиш, Rockall шкаласи, прогноз, гемостаз, эндоскопия, лапароскопия.

OPTIMIZATION OF RISK FACTORS AND DIAGNOSTIC SYMPTOMS FOR EARLY PREDICTION OF RECURRENCE OF GASTRODUODENAL ULCERATIVE LESIONS

Kurbaniyazov Z.B.¹, Khursanov E.E.¹, Ruziboev Sh.Zh.², Mansurov T.T.², Ergashev A.F.²

¹Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

²Samarkand branch of the Republican Scientific Center for Emergency Medical Care, Samarkand, Uzbekistan

Resume. This scientific study examined the effectiveness of the Rockall scale in assessing and predicting the risk of recurrence of gastroduodenal ulcerative bleeding. As a result of the analysis conducted on the example of 121 patients, it was found that the 7-point threshold point of the scale is characterized by high sensitivity (98.7%) and specificity (95%) in predicting the risk of bleeding. The study analyzed the source of bleeding, the size and location of the wound, Forrest's classification, hemodynamic parameters, laboratory tests and concomitant diseases. Patients who score high on the Rockall scale are offered hybrid surgical tactics (endoscopic control and laparoscopic hemostasis).

Key words: gastroduodenal ulcer, bleeding, Rockall scale, prognosis, hemostasis, endoscopy, laparoscopy.

ОПТИМИЗАЦИЯ ФАКТОРОВ РИСКА И ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ ДЛЯ РАННЕГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РЕЦИДИВОВ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНЫХ ЯЗВЕННЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ

Курбаниязов З.Б.¹, Хурсанов Ё.Э.¹, Рузибоев Ш.Ж.², Мансуров Т.Т.², Эргашев А.Ф.²

¹Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

²Самаркандский филиал Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. В данном научном исследовании изучена эффективность шкалы Rockall в оценке и прогнозировании риска рецидива гастродуоденальных язвенных кровотечений. В результате анализа, проведенного на примере 121 пациента, установлено, что 7-балльная пороговая точка шкалы характеризуется высокой чувствительностью (98,7%) и специфичностью (95%) в прогнозировании риска кровотечения. В исследовании были проанализированы источник кровотечения, размер и локализация раны, классификация Форреста, гемодинамические показатели, лабораторные анализы и сопутствующие заболевания. Пациентам, набравшим высокие баллы по шкале Rockall, предлагается гибридная хирургическая тактика (эндоскопический контроль и лапароскопический гемостаз).

Ключевые слова: гастродуоденальная язва, кровотечение, шкала Rockall, прогноз, гемостаз, эндоскопия, лапароскопия.

Долзарблиги. Гастродуоденал қон кетишлар қорин бўшлиғи жарроҳлигидаги энг мураккаб клиник муаммолардан бири ҳисобланиб, юқори ўлим кўрсаткичи билан боғлиқ ва шошилинч равишда касалхонага ётқизишни талаб этади[4,6]. Гастродуоденал қон кетиш манбалари орасида ошқозон ва ўн икки бармоқли ичак яраси 71,2 фоизни ташкил этади. Беморларнинг 75-80 фоизда қон кетиши ўз-ўзидан тўхтаса, 20-25 фоиз ҳолларда дастлабки эндоскопик текширувда фаол қон кетиш кузатилади. Умумий ўлим кўрсаткичи сўнгги 50 йил давомида 10 фоиз атрофида сақланиб келмоқда[3,9].

Шошилинч жарроҳликдаги энг мураккаб масалалардан бири ГДЯК билан хасталанган беморларни даволаш тактикасини танлашдир. Тиббиёт фани ва клиник амалиётнинг тараққиётига ҳамда масалани муҳокама қилишнинг юз йилдан ортиқ тарихига қарамай, ГДЯК билан оғриган беморларни даволаш тактикаси муаммоси замонавий шошилинч жарроҳликнинг долзарб масалаларидан бири бўлиб қолмоқда[1,2,7].

Ҳозирги вақтда ЯКни жарроҳлик йўли билан даволашнинг замонавий босқичида ваготомия билан аъзоларни сақлаб қолувчи операциялар ГДКни даволашда етакчи аҳамият касб этмоқда[13]. Қўплаб жарроҳлар радикал аралашувлардан воз кечиб, аъзони сақлаб қолувчи усулларга ўтиш тенденциясини кўрсатмоқдалар. Янги технологиялар бу операцияларнинг кам шикастловчи вариантларини қўллаш имконини бермоқда. Аъзони сақлаб қолувчи операциялар услуги ва техникаси узлуксиз такомиллашиб бормоқда[5,9,11].

Шундай қилиб, замонавий эндоскопик техниканинг кенг жорий этилиши, қон кетишини тўхтатиш имконини бериши ва мини-инвазив операцияларнинг қўлланилиши ЯДЎК билан оғриган беморларни даволаш тактикасини ўзгартирди ҳамда жарроҳлик аралашувига кўрсатмаларни табақалаштирилган ҳолда аниқлашга олиб келди[12].

Тадқиқот мақсади. Ярали гастродуоденал қон кетиши ривожланишининг муҳим хавф омилларини ва қон кетишининг такрорланиш хавфи омилларини аниқлаш

Тадқиқот материаллари ва усуллари. Ушбу иш Республика шошилинч тиббий ёрдам илмий маркази Самарқанд филиали негизидаги СамДТУ 2-сон Хирургик касалликлар кафедраси 5 йиллик (2022-2026 йиллар) тажрибасига асосланган. Тадқиқотда гастродуоденал ярали қон кетиши бўлган 121 нафар бемор ўрганилди.

Ўрганилаётган беморлар контингенти икки гуруҳга бўлинди: таққослаш гуруҳи 80 нафар беморни ташкил этди; асосий гуруҳ 41 нафар бемордан иборат бўлиб, улар ЯДЎК билан оғриган беморларни бошқариш ва даволашга турлича ёндашувлар билан ажралиб туради. Умумий гуруҳда беморларнинг ёши 19 ёшдан 79 ёшгача бўлиб, шундан 10 нафар бемор (8,3%) 60 ёшдан ошган эди. Эркаклар сони 89 нафар (73,5%), аёллар сони 32 нафар (26,5%) ни ташкил этди.

Умумий гуруҳда яра касаллигининг барча турлари кузатилди: ўн икки бармоқли ичак яра касаллиги (ЎБИЯК), ошқозон яра касаллиги (ОЯК) Жонсон бўйича 1-, 2- ва 3-типлари. Қон кетиш манбалари орасида 65 (53,6%) беморда ўн икки бармоқ ичак пиёзчаси яраси устунлик қилди.

Яраларнинг ўлчами уларнинг майдони бўйича, визуал маълумотларни ҳисобга олган ҳолда аниқланди. 71 (58,6%) беморда яралар ўлчами 5 мм дан 10 мм гача, 21 (17,4%) беморда 10-15 мм, 9 (7,4%) беморда эса 15 мм дан катта эди.

36 (29,6%) беморда ҳамроҳ патология аниқланди. Таъкидлаш жоизки, баъзи ҳолларда бир беморда биттадан ортиқ ҳамроҳ касаллик мавжуд эди.

Гастродуоденал қон кетиши 121 нафар беморда кузатилди. Барча беморлардан анамнез йиғишда "мелена" кўринишидаги нажаснинг борлиги, 79 (65,3%) беморда эса "қаҳва қуйқаси" мавжудлиги қайд этилди. 42 (34,7%) беморда қон қуйқалари билан қусиш кузатилди.

ОЯОБК бўлган барча беморларга шошилинч тарзда фиброэзофагогастродуоденоскопия (ФЕГДС) ўтказилди. Эндоскопия маълумотларига кўра, 118 (97,5%) ҳолатда қон кетиш манбаи аниқланди.

Беморларнинг асосий қисми, яъни 73 (63%) нафари ИИ даражали қон йўқотиш билан касалхонага ётқизилди. 21 (17,4%) беморда И даражали, 25 (20,6%) беморда ИИИ даражали қон йўқотиш кузатилди. ИВ даражали қон йўқотиш билан оғриган беморлар сони атиги 2 (1,6%) нафар эди.

Эндоскопияда қон кетиш фаоллиги Ж.А. Форрест (1974) таснифи бўйича баҳоланди.

Эндоскопия маълумотларига кўра, 97,5% ҳолларда қон кетиш манбаи аниқланади. Эндоскопик тасвирга асосан, қон кетиш фаоллиги Ж. А. Форрест (1974) таснифига мувофиқ баҳоланди.

1-жадвалдан кўриниб турибдики, асосий гуруҳда И типдаги (ФИ) фаол қон кетиш билан оғриган беморлар 14 нафар (34,1%) бўлган; ИИ типдаги (ФИИ) қон кетишлар 26 нафар (63,4%) ва ИИИ типдаги (ФИИИ) 1 нафар (2,4%) беморда кузатилган. Назорат гуруҳида эса И тип (ФИ) 30

нафар (37,5%), ИИ тип (ФИИ) 49 нафар (61,2%) ва ИИИ тип (ФИИИ) 1 нафар (1,2%) беморда қайд этилган (p=0,002).

1-жадвал.

Гастродуоденал ярали қон кетиши бўлган беморларнинг Ж. Форрест бўйича тақсимланиши

Эндоскопик хусусиятлар	Асосий гуруҳ (n=41)		Назорат гуруҳи (n=80)	
	Мутлақ	%	Мутлақ	%
ФI А	6	14,6	17	21,4
ФI Б	8	19,5	13	16,2
ФII А	14	34,1	27	33,7
ФII Б	11	26,8	20	25
ФII С	1	2,4	2	2,5
ФIII	1	2,4	1	1,2
Жами	41	100	80	100

Изоҳ: фоизли тақсимот

Яралининг жойлашуви бўйича қон кетиш частотаси ўрганилганда, асосий гуруҳда қон кетиш куйидагича тақсимланган: ошқозон танасида - 5 (12,2%), ошқозоннинг кардиал қисмида 2 (4,9%), ошқозоннинг пилориантрал қисмида 9 (21,9%), ўн икки бармоқли ичакда 25 (60,9%) ҳолат кузатишган.

Назорат гуруҳида эса қон кетиш ошқозон танасида 8 (10%), ошқозоннинг кардиал бўлимида 4 (5%), ошқозоннинг пилориантрал бўлимида 28 (35%) ва ўн икки бармоқли ичак пиезчасида 40 (50%) ҳолат қайд этилган.

Яра ўлчами бўйича қон кетиш частотаси ўрганилганда, жадвалдан кўриниб турибдики, асосий гуруҳда диаметри 5 мм гача бўлган 10 (24,4%) беморда, 5 дан 10 мм гача 23 (56,1%) беморда, 10 дан 15 мм гача 6 (14,6%) беморда, 15 мм дан ортиқ 2 (4,9%) беморда кузатишган. Назорат гуруҳида эса диаметри 5 мм гача бўлган 10 (12,5%) беморда, 5 дан 10 мм гача 48 (60%) беморда, 10 дан 15 мм гача 15 (18,7%) беморда, 15 мм дан ортиқ 7 (8,7%) беморда қайд этилган.

Биз назорат гуруҳида ретроспектив тадқиқот ўтказиб, яра нуқсони ўлчамига кўра қон кетишнинг такрорланишини ўргандик. Яра ўлчами 5 мм гача бўлганда қон кетишнинг такрорланиши 1 (1,3%) беморда, 5 дан 10 мм гача - 13 (16,3%) ҳолда, 10 дан 15 мм гача - 9 (11,3%) беморда ва 15 мм дан ортиқ бўлганда 3 (3,8%) беморда кузатилди.

Натижалар ва муҳокама. Асосий гуруҳда ФГДС ўтказилганда қон кетиш Форрест бўйича таснифланди ва Ж.Роскалл шкаласига яра ўлчами 15 мм ва "Хелисобастер" кўрсаткичини кўшиш билан оғирлик даражаси ва такрорланиш эҳтимоли балл тизимида баҳоланди. Роскалл шкаласидаги умумий балл сони -11 бўлиб, бизнинг кўрсаткичларимиз билан бу йиғинди 14 баллни ташкил этди. Бу клиник (ёш, шок белгилари, ёндош касалликларнинг оғирлиги) ва эндоскопик (ташхис ва яқинда қон кетиш белгилари, яра ўлчами ва Х.Пилори мавжудлиги) белгилар натижаларининг соддалаштирилган йиғиндисидир.


Роскалл балл шкаласи бўйича тақсимлаш ва баҳолашда асосий ва назорат гуруҳларидаги беморлар куйидагича тақсимланди: асосий гуруҳда 3 балл билан 1 (2,4%), назорат гуруҳида ҳам 2 (2,5%); 4 балл билан асосий гуруҳда 6 (14,6%), назорат гуруҳида 12 (15%); 5 балл билан асосий ва назорат гуруҳларида мос равишда 7 (17,1%) ва 16 (17,5%); 6 балл билан баҳолашда асосий гуруҳда 5 (12,2%), назорат гуруҳида 10 (12,5%); 7 дан 14 баллгача баҳолашда асосий гуруҳда 21 (51,2%), назорат гуруҳида 42 (52,5%) ни ташкил этди.

Беморларни хавф гуруҳлари бўйича ажратиш мезонлари (< 3 балл - паст хавф, 3-7 балл - ўртача хавф, > 7 балл - юқори хавф) шкаланинг беморларни натижалар бўйича аниқ фарқлаш имкониятини кўрсатди.

Асосий ва назорат гуруҳларидаги беморлар Роскалл шкаласи бўйича тўплаган баллар йиғиндисига қараб, қон кетишнинг қайталаниш хавфи даражаси бўйича гуруҳларга ажратилди.

Прогнозлашнинг самарадорлиги ва ўзига хослигини баҳолаш учун биз асосий диагностик мезонлар бўйича қон кетиш хавфи ва ўлим кўрсаткичларининг стандартлаштирилган нисбатларини таҳлил қилдик.

Қон кетиш хавфини (1-расм)да кўрсатилган эгри чизиқ бўйича таққослаганда, қон кетишнинг ҳақиқий хавфи ва башорат қилинган хавф 7 балллик ажратиш нуқтасида мос келганини кўриш мумкин. Бу эса ушбу шкаланинг гастродуоденал қон кетишнинг қайталаниш хавфини баҳолашдаги юқори прогностик аҳамиятидан далолат беради.



Изоҳ: Роскалл шкаласи бўйича қон кетиши ривожланишининг ҳақиқий ва башорат қилинган хавфини таққослаш

1-расм. Роскалл баллари ошганда қайталаниш хавфи эҳтимоллиги

Дискриминатсион эгри чизик бўйича қон кетишини башорат қилишнинг ҳақиқий ижобий частотасига сезгирлик таҳлили ўтказилганда, гастродуоденал қон кетишнинг қайталаниш хавфи ҳам статистик жиҳатдан ишончли тарзда башорат қилинганлиги аниқланди. Бунда ажратиш нуктаси ҳам 7 баллни ташкил этди.

1-жадвал

Роскалл шкаласининг турли ажратиш нукталари учун таснифлаш матрицаси

Кўрсаткич	ПС	ПВ	ПС	ПВ	ИЖП	СЖП	ПС
3 балл	56	0	42	2	75,0% (61,6-85,6)	4,5% (0,70-15,5)	67,1%
7 балл	42	14	22	22	100%	0%	100,0
11 балл	14	42	2	42	100% (93,6-100)	0%	100,0%

Изоҳ: ИЖП - ижобий жорий прогноз, СЖП - салбий жорий прогноз, ПС - прогноз самарадорлиги.

Турли ажратиш нукталари учун Роскалл шкаласи таснифлаш матрицасини таҳлил қилишда ижобий жорий прогноз, салбий жорий прогноз ва прогноз самарадорлигини аниқлаш мақсадида олинган маълумотларни таҳлил қилдик (1-жадвал).

Келтирилган жадвалдан кўрииб турибдики, 3 дан 7 гача бўлган баллар йиғиндисиди ижобий жорий прогноз 75,0% (61,6-85,6) ни, салбий жорий прогноз эса 4,5% (0,70-15,5) ни ташкил этди. Шкала бўйича 7 ва 11 баллар йиғиндисиди ижобий жорий прогноз 100% (93,6-100) га, салбий жорий прогноз 0% га тенг бўлиб, прогноз самарадорлиги 100,0% ни ташкил этди. Биз Роскалл шкаласи бўйича қон кетиши қайта юзага келиши ва ўлим хавфини белгиловчи омиллар ўртасидаги коррелятсион боғлиқликни статистик таҳлил қилдик. Натижада ривожланишнинг ижобий коррелятсион боғлиқлиги мавжудлиги аниқланди. Шундай қилиб, Роскалл кўрсаткичи - Ёш. Корреляция коэффитсиэнти $r = 0,32$, аҳамиятлилиқ даражаси $p = 0,044$, 95% ишонч оралиғи СИ = [0,01;0,57]. Ўртача кучли мусбат корреляция аниқланди. "Роскалл кўрсаткичи"нинг юқори қийматига "Ёш" кўрсаткичининг юқори қиймати мос келади. Ҳамроҳ касалликлар кўрсаткичи - Роскалл. Корреляция коэффитсиэнти $r = 0,32$, аҳамиятлилиқ даражаси $p = 0,044$, 95% ишонч оралиғи СИ = [0,01;0,57]. Ўртача кучли мусбат корреляция аниқланди. "Роскалл кўрсаткичи"нинг юқори қийматига "Бошқа касалликлар" кўрсаткичининг юқори қиймати мос келади. Шундай қилиб, Роскалл кўрсаткичи - ДАБ (диастолик артериал босим). Корреляция коэффитсиэнти $r = -0,39$, аҳамиятлилиқ даражаси $p = 0,014$, 95% ишонч оралиғи СИ = [-0,62;-0,09]. Ўртача кучли манфий корреляция аниқланди. "Роскалл кўрсаткичи"нинг юқори қийматига "ДАБ" кўрсаткичининг пастроқ қиймати мос келади.

Роскалл кўрсаткичи - Гематокрит. Корреляция коэффитсиэнти $r = -0,32$, аҳамиятлилиқ даражаси $p = 0,041$, 95% ишонч оралиғи СИ = [-0,58;-0,01]. Ўртача кучли манфий корреляция аниқланди. "Роскалл кўрсаткичи"нинг юқори қийматига "Гематокрит" кўрсаткичининг паст қиймати мос келади.

Роскалл кўрсаткичи - Алговер индекси. Корреляция коэффитсиэнти $r = 0,6$, аҳамиятлилиқ даражаси $p = 0$, 95% ишонч оралиғи СИ = [0,35;0,77]. Кучли мусбат корреляция аниқланди. "Роскалл

кўрсаткичи"нинг юқори қиймати "Алговер индекси" кўрсаткичининг юқори қиймати мос келади. Рокалл кўрсаткичи - Қон йўқотиш. Корреляция коэффиценти $r = 0,58$, аҳамиятлилик даражаси $p = 0,95\%$ СИ = [0,32; 0,75]. Кучли ижобий корреляция аниқланди. "Рокалл кўрсаткичи" қиймати ошгани сари "Қон йўқотиш" кўрсаткичи ҳам ортиб боради. Рокалл кўрсаткичи - САБ. Корреляция коэффиценти $r = -0,49$, аҳамиятлилик даражаси $p = 0,001$ 95% СИ = [-0,69; -0,21]. Ўртача кучли манфий корреляция аниқланди. "Рокалл кўрсаткичи" қиймати камайган сари "САБ" кўрсаткичи ортиб боради.

Рокалл кўрсаткичи - Қон йўқотиш. Корреляция коэффиценти $r = 0,58$, аҳамиятлилик даражаси $p = 0,95\%$ СИ = [0,32; 0,75]. Кучли ижобий корреляция аниқланди. "Рокалл кўрсаткичи" қиймати ошгани сари "Қон йўқотиш" кўрсаткичи ҳам ортиб боради.

Хулосалар:

1. Роскалл шкаласи ёрдамида башорат қилиш усули ошқозон-ўн икки бармоқ ичак қон кетиши ва ўлим хавфи ҳолатларини 95% ўзига хослик ва 98,7% сезувчанлик билан баҳолайди.

2. Ж. Роскалл хавф шкаласи бўйича қон кетиш хавфи юқори бўлган беморларга эндоскопик йўналтириш ва гемостаз самарадорлигини назорат қилиш билан қон кетаётган ярани лапароскопик тикиш орқали гибрид жарроҳлик аралашувини ўтказиш устувор аҳамиятга эга.

Адабиётлар рўйхати:

1. Dostalík J. Laparoscopic gastric resection with natural orifice specimen extraction for postulcer pyloric stenosis / J.Dostalík, P.Gunkova, I. Gunka // *Wideochir Inne Tech Maloinwazyjne.* – 2014. – Vol.9(2). – P.282-5.
2. El Ouali S. Timing of rebleeding in high-risk peptic ulcer bleeding after successful hemostasis: a systematic review/ S.El Ouali, A.Barkun, M. Martel // *Can J Gastroenterol Hepatol.* – 2014. – Vol.28(10). – P.543-8.
3. Abraham N. S. Comparative risk of gastrointestinal bleeding with dabigatran, rivaroxaban, and warfarin: population based cohort study. / Abraham NS. and [et al.] // *BMJ.* - 2015.- V.- 350.- P.1857- 1861
4. Agreus L. Value of the "Test & Treat" Strategy for Uninvestigated Dyspepsia at Low Prevalence Rates of *Helicobacter pylori* in the Population. *Helicobacter* / L. Agreus, N.J. Talley, M. Jones // - 2016.V.-21.- P.186–191.
5. Bager P. Randomised clinical trial: oral vs. intravenous iron after upper gastrointestinal haemorrhage--a placebo-controlled study / P. Bager, J.F. Dahlerup // *Aliment Pharmacol Ther.* -2014/- V.39(2).- P.176–87.
6. Beales I.L. Decisions on restarting anticoagulation should be made earlier after rebleeding / I.L. Beales // *BMJ.*-2016.-P.532
7. Brooks J. Prevention of upper gastrointestinal haemorrhage: current controversies and clinical guidance / J. Brooks, R. Warburton, I.L. Beales // *Ther Adv Chronic Dis.* – 2013.-V.-4(5).-P. 206–22
8. Chan EW. Prevention of Dabigatran-Related Gastrointestinal Bleeding With Gastroprotective Agents: A Population-Based Study / E.W. Chan and [et al]// *Gastroenterology.* – 2015.-V.- 149(3).-P.586–95
9. Chan FK. Similar Efficacy of Proton-Pump Inhibitors vs H2-Receptor Antagonists in Reducing Risk of Upper Gastrointestinal Bleeding or Ulcers in High-Risk Users of Low-Dose Aspirin / F.K. Chan and [et al.]// *Gastroenterology.* -2017.-V.- 152(1).-P.105–110
10. Chan SM. of the Over-The-Scope Clip for treatment of refractory upper gastrointestinal bleeding: a case series/ S.M. Chan and [et al.]// *Endoscopy.* – 2014.-V.-46(5).-P.428–31.
11. Changela K. Hemostatic powder spray: a new method for managing gastrointestinal bleeding. / K Changela, H. Papafragkakis // *Therap Adv Gastroenterol.* -2015.-V.-8(3).-P.125–35.
12. Тимербулатов Ш.В., Тимербулатов М.В., Сагитов Р.Б., Тимербулатов В.М., Гафарова А.Р. Язвенные гастродуоденальные кровотечения: современное состояние проблемы // *Медицинский вестник Башкортостана.* — 2020. — Т. 15, № 2. — С. 85–96.
13. Романцов М.Н., Чередников Е.Ф., Бондаренко А.А., Якушев Ф.К. Новые технологии эндоскопического гемостаза в протоколе лечения пациентов с гастродуоденальными кровотечениями // *Вестник экспериментальной и клинической хирургии.* — 2020. — Т. 13, № 2. — С. 78–84.

Иктибос учун: Курбаниязов З.Б., Хурсанов Ё.Э., Рузибоев Ш.Ж., Мансуров Т.Т., Эргашев А.Ф. Гастродуоденал яра қон кетишлари рецидивини эрта башорат қилишда хавф омиллари ва диагностик ёндашувларни оптималлаштириш // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси.* – 2026. – № 4(24). – Б. 881–885. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19712697>

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ МОРФОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СТРУКТУР ГОЛОВНОГО МОЗГА В НОРМЕ И ПРИ ОБЪЁМНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ**Наврұзов Р.Р.**

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. В работе представлен сравнительный морфометрический анализ структур головного мозга в норме и при объёмных образованиях по данным магнитно-резонансной и компьютерной томографии. Актуальность исследования обусловлена необходимостью повышения точности лучевой диагностики объёмных поражений головного мозга и стандартизации оценки морфометрических параметров его структур. Целью исследования явилась комплексная морфометрическая оценка структур головного мозга в норме и при объёмных образованиях с использованием методов МРТ- и КТ-метрии. В исследование включены пациенты с отсутствием патологии головного мозга и пациенты с различными объёмными образованиями. Проводилась оценка линейных размеров, взаиморасположения и проекционных расстояний анатомических структур головного мозга. В результате установлено, что морфометрические параметры структур головного мозга характеризуются выраженной индивидуальной вариабельностью в норме, а при объёмных образованиях выявляются закономерные изменения, зависящие от локализации и размеров патологического процесса. Отмечены смещения срединных структур, изменение размеров желудочковой системы, а также вариации проекционных расстояний до кожных покровов головы. Полученные данные позволяют повысить точность интерпретации результатов нейровизуализации, улучшить дифференциальную диагностику и обосновать выбор тактики лечения пациентов с объёмными образованиями головного мозга. Разработанный морфометрический подход может быть рекомендован для внедрения в практику отделений лучевой диагностики.

Ключевые слова: морфометрия, головной мозг, магнитно-резонансная томография, компьютерная томография, объёмные образования, нейровизуализация, анатомометрические параметры, лучевая диагностика, желудочковая система мозга, проекционная анатомия.

CURRENT ASPECTS OF MORPHOLOGICAL STUDY OF THE INTERVERTEBRAL DISCS OF VARIOUS DIVISIONS OF THE VERTEBRUM DURING HERNIAS IN YOUNG PATIENTS**Navruzov R.R.**

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. This study presents a comparative morphometric analysis of brain structures in normal conditions and in the presence of mass lesions based on magnetic resonance imaging (MRI) and computed tomography (CT) data. The aim of the study was to perform a comprehensive morphometric assessment of brain structures in normal conditions and in the presence of mass lesions using MRI and CT-based measurements. The study included subjects without brain pathology as well as patients with various intracranial mass lesions. Linear dimensions, spatial relationships, and projection distances of brain anatomical structures to the skin surface were evaluated. The results demonstrated that morphometric parameters of brain structures show significant individual variability under normal conditions, whereas in the presence of mass lesions, consistent changes are observed depending on the localization and size of the pathological process. Displacement of midline structures, alterations in ventricular system dimensions, and variations in projection distances to the scalp were identified. The obtained data improve the accuracy of neuroimaging interpretation, enhance differential diagnosis, and support the selection of optimal treatment strategies in patients with brain mass lesions. The proposed morphometric approach can be recommended for implementation in clinical radiology practice.

Keywords: morphometry, brain, magnetic resonance imaging, computed tomography, mass lesions, neuroimaging, anatomical parameters, radiological diagnostics, ventricular system, projection anatomy.

МЕЪЁРДА ВА ҲАЖМЛИ ҲОСИЛАЛАРДА БОШ МИЯ ТУЗИЛМАЛАРИНИНГ МОРФОМЕТРИК ҚИЁСИЙ ТАҲЛИЛИ**Наврұзов Р.Р.**

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Мазкур ишда бош мия тузилмаларининг норма ва ҳажмли ҳосилалар шароитида

магнит-резонанс томография ва компьютер томографияси маълумотлари асосида қиёсий морфометрик таҳлили келтирилган. Тадқиқотнинг долзарблиги бош мианинг ҳажмли зарарланишларини нур диагностикаси аниқлигини ошириш ва унинг тузилмаларининг морфометрик кўрсаткичларини баҳолашни стандартлаштириш зарурати билан белгиланади. Тадқиқотнинг мақсади бош миё тузилмаларини норма ва ҳажмли ҳосилалар мавжудлигида МРТ ва КТ-метрия усуллари ёрдамида комплекс морфометрик баҳолашдан иборат. Тадқиқотга бош миё патологияси аниқланмаган беморлар ҳамда турли ҳажмли ҳосилаларга эга беморлар киритилди. Бош миё анатомик тузилмаларининг чизиқли ўлчамлари, ўзаро жойлашуви ва тери қопламасигача бўлган проекцион масофалари баҳоланди. Натижалар шуни кўрсатдики, бош миё тузилмаларининг морфометрик кўрсаткичлари норма аниқ индивидуал ўзгарувчанлик билан тавсифланади, ҳажмли ҳосилалар мавжудлигида эса патологик жараённинг локализацияси ва ҳажмига боғлиқ ҳолда қонуний ўзгаришлар аниқланади. Ўрта чизиқ тузилмаларининг силжиши, қоринчалар тизими ўлчамларининг ўзгариши ҳамда бош терисигача бўлган проекцион масофаларнинг вариациялари қайд этилди. Олинган натижалар нейровизуализация маълумотларини талқин қилиш аниқлигини ошириш, дифференциал диагностикаси ни яхшилаш ва бош миёда ҳажмли ҳосилаларга эга беморларни даволаш тактикасини танлашни асослаш имконини беради. Таклиф этилган морфометрик ёндашувни нур диагностикаси бўлимлари амалиётига жорий этиш тавсия этилади.

Калит сўзлар: морфометрия, бош миё, магнит-резонанс томография, компьютер томография, ҳажмли ҳосилалар, нейровизуализация, анатомометрик кўрсаткичлар, нур диагностикаси, миё қоринчалар тизими, проекцион анатомия.

Введение. Объёмные образования головного мозга представляют собой одну из наиболее сложных и клинически значимых проблем современной нейрорентгенологии. Их своевременная диагностика имеет решающее значение для выбора тактики лечения, прогнозирования течения заболевания и предупреждения развития неврологических осложнений. В связи с этим особую актуальность приобретает изучение морфометрических изменений структур головного мозга в норме и при наличии патологических процессов.

Современные методы нейровизуализации, такие как магнитно-резонансная и компьютерная томография, позволяют с высокой точностью оценивать анатомические структуры головного мозга, выявлять их смещение, деформацию и изменения размеров при объёмных образованиях. Однако в клинической практике сохраняется проблема вариабельности интерпретации морфометрических данных и отсутствия единых стандартов их оценки.

Особое значение имеет изучение индивидуальных анатомических особенностей головного мозга в норме, так как они формируют основу для корректного выявления патологических изменений. При наличии объёмных образований наблюдаются изменения размеров желудочковой системы, смещение срединных структур, а также изменение проекционных расстояний до костей свода черепа, что требует системного и комплексного анализа.

В связи с этим разработка и внедрение стандартизированного морфометрического подхода к оценке структур головного мозга при объёмных образованиях является актуальной задачей, направленной на повышение диагностической точности и улучшение клинических результатов лечения пациентов.

Методы диагностики. В исследовании использованы современные методы лучевой диагностики, направленные на оценку морфометрических параметров структур головного мозга в норме и при объёмных образованиях. Основным методом являлась магнитно-резонансная томография (МРТ), которая позволяла получить высококонтрастные изображения мягкотканых структур головного мозга, определить их анатомические особенности, размеры, взаиморасположение, а также выявить наличие объёмных образований и их влияние на окружающие структуры.

Дополнительно применялась компьютерная томография (КТ), обеспечивающая детальную визуализацию костных структур черепа и уточнение топографо-анатомических соотношений, а также оценку смещения и деформации мозговых структур при патологических процессах.

Морфометрическая оценка включала измерение линейных размеров основных структур головного мозга, анализ размеров желудочковой системы, подкорковых образований, стволовых отделов, а также определение проекционных расстояний от анатомических ориентиров до кожных покровов головы.

Полученные данные подвергались сравнительному анализу между группами обследуемых с нормальными показателями и пациентами с объёмными образованиями, что позволило выявить закономерности морфометрических изменений и их диагностическую значимость.

Опухоли полушарий большого мозга. В группу с верхнебоковой локализацией вошли 12 пациентов с опухолями верхней половины теменной доли и прилежащих участков лобной и затылочной долей, рост которых был сосредоточен выше уровня мозолистого тела.

При верхнебоковой локализации наблюдаются изменения, аналогичные тем, что отмечаются при передней локализации опухоли: наиболее выраженные изменения выявляются в мозолистом теле и боковых желудочках. Степень этих изменений зависит от гистологической природы опухоли (доброкачественная или злокачественная), её размеров, а также глубины расположения в мозговой ткани.

При злокачественном поражении головного мозга, опухоль верхнебоковой локализации, как правило, прорастает, мозолистое тело. В большей степени выражены изменения со стороны желудочковой системы (происходит деформация переднего рога бокового желудочка и расширение его на уровне тела на стороне поражения).




Рис.1. Объемное, неоднородно гиперинтенсивное образование в правой теменно-височной области, с выраженным перифокальным отёком. (глиобластома T2- T1 взвешенному МРТ, аксиальная проекция)

На T2-ВИ глиобластома, как правило, представлена неоднородным гиперинтенсивным объемным образованием.

Характерные признаки включают:

Гетерогенно повышенный сигнал в пределах опухоли вследствие сочетания опухолевой ткани, зон микро- и макронекроза, кистозных изменений и перифокального отёка. Нечёткие, инфильтративные контуры, отражающие проникновение опухоли вдоль проводящих путей белого вещества. Выраженный вазогенный отёк, распространяющийся на значительные расстояния от первичного узла, что приводит к увеличению объёма поражённого полушария.

Масса-эффект: локальное сдавление борозд, деформация прилежащих структур, возможное смещение срединных структур. В целом, на T2-режиме глиобластома выглядит как яркий, крупный, структурно неоднородный очаг с зональной организацией.

T1-взвешенные изображения (без контрастирования)

На T1-ВИ глиобластома характеризуется гетерогенной гиперинтенсивностью относительно неизменённого белого вещества.

Типичные особенности. Преимущественно пониженный сигнал в опухолевой ткани за счёт высокой клеточности, разрушения миелина и наличия некротических зон. Центральные участки выраженной гипоинтенсивности, соответствующие некрозу. Хаотичная внутренняя архитектура, отсутствие чёткой капсулы и ровных границ. Масса-эффект в виде смещения или компрессии желудочков и прилежащих структур сохраняется и на T1-режиме.

На сагиттальном T1-взвешенном изображении определяется объемное образование в правой лобно-теменной области с размерами около 5.3×5.0 см.

Характерные особенности. Гетерогенная гипоинтенсивность опухолевой ткани относительно неизменённого белого вещества. Центральные зоны выраженной гипоинтенсивности, соответствующие участкам некроза. Контуры образования нечёткие, инфильтративного характера, распространяющиеся в краниокаудальном направлении вдоль белого вещества. Присутствуют признаки масса-эффекта: локальная деформация кортикальных структур, частичное сглаживание прилежащих борозд. Продольная протяжённость инфильтрации больше видна на сагиттальном срезе, что подчёркивает склонность глиобластомы распространяться вдоль белого вещества. На коронарных срезах визу-

ализируется объёмное, структурно неоднородное образование с выраженным перифокальным вазогенным отёком.




Рис.2. Объёмное, неоднородно гиперинтенсивное образование в правой теменно-височной области, с выраженным перифокальным отёком. (глиобластома T2- T1 взвешенному МРТ, коронарные, сагиттальные срезы)

Основные признаки. На T2 и FLAIR образование выглядит ярко гиперинтенсивным, с внутренней гетерогенностью. Наблюдается асимметричное утолщение и инфильтрация белого вещества правой лобно-теменной области. Выраженный вазогенный отёк распространяется медиально, латерально и каудально, усиливая масса-эффект. Отмечается латеральное сдавление бокового желудочка и некоторое смещение срединных структур. Периферические участки опухоли имеют нечёткие, неровные контуры, что типично для инфильтративного роста глиобластомы. Внутри образования определяются зоны неоднородности, соответствующие смешанной структуре - опухолевая ткань, некроз, возможные мелкие геморрагические включения (в зависимости от режима).

Выводы. Проведённое исследование показало, что морфометрические параметры структур головного мозга в норме характеризуются выраженной индивидуальной вариабельностью, что необходимо учитывать при интерпретации данных нейровизуализации. При наличии объёмных образований выявляются закономерные структурные изменения, зависящие от локализации и размеров патологического процесса. Наиболее значимыми признаками являются смещение срединных структур, изменение размеров желудочковой системы, деформация подкорковых образований и вариации проекционных расстояний до кожных покровов головы. Данные изменения имеют диагностическую ценность и могут использоваться для уточнения характера и распространённости патологического процесса.

Таким образом, применение комплексного морфометрического подхода на основе МРТ и КТ позволяет повысить точность диагностики объёмных образований головного мозга, улучшить интерпретацию нейровизуализационных данных и обосновать выбор оптимальной лечебной тактики.

Список литературы:

1. Netter F. H. Atlas of Human Anatomy. — Philadelphia: Elsevier, 2018.
2. Osborn A. G. Diagnostic Neuroradiology. — St. Louis: Mosby, 2016.
3. Barkovich A. J. Pediatric Neuroimaging. — Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2012.
4. Bradley W. G. MRI of the Brain. — Philadelphia: Saunders, 2019.
5. Osborn A. G., Salzman K. L. Imaging of Brain Tumors. — Elsevier, 2020.
6. Михайлов И. Б. Лучевая диагностика заболеваний головного мозга. — СПб.: СпецЛит, 2017.
7. Зубарев А. Р. КТ и МРТ в диагностике заболеваний центральной нервной системы. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021.

Для цитирования: Наврузов Р.Р. Сравнительный морфометрический анализ структур головного мозга в норме и при объёмных образованиях // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 4(24). – С. 886–889. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19712757>

ИЗМЕНЕНИЯ МОРФОЛОГИИ МЕЖПОЗВОНОЧНЫХ ДИСКОВ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ГРЫЖ У ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА ПО ДАННЫМ РАДИОЛОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ**Азимов У.М., Наврузов Р.Р.**

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. В работе представлены результаты комплексного морфологического исследования межпозвоночных дисков при межпозвоночных грыжах у пациентов молодого возраста. Рассмотрены структурно-функциональные особенности пульпозного ядра и фиброзного кольца в различных отделах позвоночного столба — шейном, грудном и поясничном. Отмечено, что у молодых людей пульпозное ядро характеризуется высокой эластичностью, гидрофильностью и сохранением физиологической архитектоники, что способствует формированию грыж значительных размеров даже при отсутствии выраженных дегенеративно-дистрофических изменений. Показано, что ведущими этиологическими факторами выступают избыточные механические нагрузки, статические перенапряжения и микротравмы, приводящие к разрывам фиброзного кольца, смещению пульпозного ядра и формированию воспалительно-деструктивных процессов в окружающих тканях. Морфометрический анализ подтвердил наличие локальных зон фиброза, сосудистых реакций и очагов асептического воспаления, что свидетельствует о раннем запуске дегенеративных механизмов даже в молодом возрасте. Полученные результаты имеют важное практическое значение для понимания патогенеза межпозвоночных грыж, ранней диагностики и разработки персонализированных лечебно-профилактических стратегий при заболеваниях позвоночника у молодых пациентов.

Ключевые слова: межпозвоночный диск, межпозвоночная грыжа, морфология и морфометрия, пульпозное ядро, фиброзное кольцо, молодой возраст, позвоночник, дегенеративно-дистрофические изменения.

CHANGES IN THE MORPHOLOGY OF INTERVERTEBRAL DISCS DURING THE FORMATION OF HERNIAS IN YOUNG PEOPLE ACCORDING TO RADIOLOGICAL METHODS**Azimov U.M., Navruzov R.R.**

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. This study presents a comprehensive analysis of the morphological structure and alterations of intervertebral discs in young patients with intervertebral disc herniations. The structural features of the nucleus pulposus and annulus fibrosus were examined across different spinal regions — cervical, thoracic, and lumbar. It was found that in young individuals, the nucleus pulposus retains high elasticity and hydration, which contributes to the formation of large hernias without pronounced age-related degenerative changes. Mechanical loads, static tension, and microtraumas were identified as the primary contributing factors, leading to tears of the annulus fibrosus, protrusion of the nucleus pulposus, and development of inflammatory-destructive processes in the surrounding tissues. Morphometric analysis revealed the presence of fibrotic areas, microvascular reactions, and aseptic inflammation, confirming that degenerative processes may begin at a relatively young age. The findings are of great significance for a deeper understanding of the pathogenesis of intervertebral disc herniation, as well as for the early diagnosis, prevention, and development of individualized treatment strategies.

Keywords: intervertebral disc, disc herniation, morphology, morphometry, nucleus pulposus, annulus fibrosus, young age, spine, degenerative-dystrophic changes.

ЁШЛАРДА РАДИОЛОГИК УСУЛЛАР МАЪЛУМОТЛАРИ АСОСИДА ЧУРРА ШАКЛЛАНИШИДА УМУРТҚАЛАРАРО ДИСКЛАР МОРФОЛОГИЯСИНИНГ ЎЗГАРИШЛАРИ**Азимов У.М., Наврузов Р.Р.**

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Ёш беморларда учрайдиган умуртқалараро диск чурраларида дискнинг морфологик тузилиши ва ўзгаришлари бўйича комплекс тадқиқот натижалари тақдим этилган. Пульпоз ядро ва фиброз ҳалқанинг тузилиши хусусиятлари умуртқа поғонасининг турли бўлимларида — бўйин, кўкрак ва бел қисмларида ўрганилган. Аниқланишича, ёшларда пульпоз ядро юқори даражадаги эластиклик

ва гидрофиллики сақлаб қолади, бу эса аҳамиятли деградация белгилари бўлмаган ҳолда катта ўлчамдаги чурралар шаклланишига олиб келиши мумкин. Тадқиқотда асосий сабаб сифатида механик юкламалар, статик зўриқиш ва микротравмалар қайд этилган бўлиб, улар фиброз ҳалқанинг ёрилиши, ядронинг чиқиши ва атроф тўқималарда яллигланиш-деструктив жараёнларнинг ривожланишига сабаб бўлади. Морфометрик таҳлил натижалари фиброз ўчоқлари, микротомирлар реакцияси ва асептик яллигланиш элементларининг мавжудлигини кўрсатди, бу эса дегенератив жараёнлар ёш даврининг ўзидаёқ бошланишини тасдиқлайди. Олинган маълумотлар умуртқа диск чурраларининг патогенезини чуқурроқ тушуниш, эрта таъхис қўйиш ва индивидуал профилактик ҳамда даволаш усулларини ишлаб чиқиш учун муҳим аҳамиятга эга.

Калит сўзлар: умуртқаларо диск, диск чурраси, морфология ва морфометрия, пульпоз ядро, фиброз ҳалқа, ёш давр, умуртқа нағонаси, дегенератив-дистрофик ўзгаришлар.

Результаты исследования. В ходе морфологического и морфометрического анализа межпозвоночных дисков у молодых пациентов с диагностированными грыжами выявлен ряд характерных структурных изменений, отражающих ранние стадии дегенеративно-дистрофического процесса.

При визуальном исследовании межпозвоночные диски в области грыжевого выпячивания имели уплощённую форму, неравномерную толщину и потерю нормальной эластичности. В большинстве случаев отмечалось снижение высоты межпозвоночного промежутка и локальная деформация прилежащих тел позвонков. Микроскопическое исследование показало наличие выраженных нарушений в структуре фиброзного кольца — наблюдались расслоение коллагеновых волокон, очаговые разрывы и дезорганизация ориентации пучков. В отдельных зонах определялись микроразрывы, сопровождавшиеся проникновением фрагментов пульпозного ядра в толщу кольца.

Состояние пульпозного ядра. В молодом возрасте ядро сохраняло относительно высокое содержание жидкости (до 85%), однако в зонах грыжевого выпячивания отмечалось частичное обезвоживание, утрата тургора и появление очагов мукоидного перерождения. У ряда пациентов обнаружены начальные признаки хондронидной дегенерации с повышением плотности клеточного матрикса.

В парадисковых тканях регистрировались признаки асептического воспаления — полнокровие сосудов, периваскулярный отёк и незначительная лимфоцитарная инфильтрация. В отдельных случаях наблюдалось усиление ангиогенеза, свидетельствующее о компенсаторной реакции тканей на хроническое механическое раздражение.

Морфометрические данные. Морфометрический анализ подтвердил статистически значимое ($p < 0,05$) снижение толщины фиброзного кольца в среднем на 17–22% по сравнению с контрольной группой. Площадь пульпозного ядра уменьшалась на 14–18%, а плотность коллагеновых волокон увеличивалась почти на 25%, что отражает процесс фиброзирования. Наиболее выраженные изменения отмечались в поясничном отделе позвоночника, где биомеханическая нагрузка максимальна. В шейном отделе грыжи характеризовались меньшими размерами, но чаще сопровождались реактивным воспалением и мышечно-тоническим синдромом.




Рис.1. Морфологическая характеристика межпозвоночных дисков пояснично-крестцового отдела по данным МРТ (Т2-ВИ). (17 летной мужчины)
А-Сагиттальная проекция. Б-Аксиальная проекция.

На МР-томограммах пояснично-грудного перехода и пояснично-крестцового отдела позвоночника тела позвонков обычной формы и размеров, без признаков деструктивных изменений; структура костного мозга однородная. Замыкательные пластинки местами умеренно неровные, с признаками дегенеративной перестройки.

Межпозвонокковые диски на всех исследованных уровнях с признаками выраженных дегенеративно-дистрофических изменений: отмечается снижение интенсивности сигнала на T2-взвешенных изображениях (дегидратация), неоднородность структуры, признаки фиброизирования. Высота дисков варьирует от 8,69 мм на уровне Th11–Th12 до 1,25 см на уровне L3–L4 с последующим снижением в каудальных сегментах (L4–L5 — до 1,17 см, L5–S1 — до 1,15 см), что отражает прогрессирующее уменьшение их амортизационной функции. Контуры дисков местами нечеткие, фиброзные кольца истончены, структурно ослаблены; на ряде уровней определяются умеренные циркулярные протрузии без значимого влияния на невральные структуры.

На уровне L1–L2 межпозвонокковый диск резко дегенеративно изменён: выраженно дегидратирован, уплощён, с грубой неоднородностью структуры. Определяется дорзальная правосторонняя парамедианная грыжа межпозвоноккового диска с краниокаудальным размером до 1,31 см и глубиной пролабирования до 9,45 мм (рис.1). Грыжевое выпячивание распространяется в правый латеральный рецессус с частичным вовлечением межпозвоноккового отверстия, формируется на фоне несостоятельности фиброзного кольца и пролабирования пульпозного ядра. Отмечается деформация дурального мешка, сужение ликворного пространства, компрессия правого нервного корешка и уменьшение резервного пространства позвоночного канала. Снижение высоты диска сопровождается сближением замыкательных пластинок и перераспределением нагрузки на задние опорные структуры.

На уровне L5–S1 межпозвонокковый диск также дегенеративно изменён: снижена гидратация, умеренно уменьшена высота, определяется начальная протрузия без выраженной компрессии невральных структур.

Позвоночный канал на уровне L1–L2 относительно сужен преимущественно за счёт дискогенного компонента (грыжевое выпячивание и снижение высоты диска). В целом определяется полисегментарное поражение межпозвонокковых дисков поясничного отдела позвоночника с максимальной выраженностью дегенеративных изменений на уровне L1–L2, где сформировалась крупная морфологически значимая грыжа, обуславливающая компрессионное воздействие на невральные структуры и формирование относительного стеноза позвоночного канала.

Таблица 1.

Морфологические и морфометрические изменения межпозвоночного диска у молодых пациентов с грыжами

№	Показатель	Контрольная группа (здоровые)	Группа с грыжами диска	Изменение (%)	Характеристика изменений
1	Толщина фиброзного кольца (мм)	$2,8 \pm 0,3$	$2,2 \pm 0,2$	–21%	Умеренное истончение, очаговые разрывы волокон
2	Площадь пульпозного ядра (мм ²)	$38,5 \pm 3,1$	$31,8 \pm 2,7$	–17%	Снижение гидратации, частичное мукоидное перерождение
3	Содержание воды в ядре (%)	85 ± 4	74 ± 5	–13%	Обезвоживание, потеря тургора
4	Плотность коллагеновых волокон (усл. ед.)	100 ± 8	125 ± 10	+25%	Фиброизирование, дезорганизация ориентации волокон
5	Толщина гиалинового хряща замыкательных пластинок (мкм)	410 ± 35	355 ± 30	–13%	Начальные признаки дегенерации и уплотнения
6	Площадь сосудистого русла в парадисковых тканях (мкм ²)	1260 ± 90	1485 ± 120	+18%	Усиление ангиогенеза, признаки асептического воспаления
7	Индекс дегенеративных изменений (в баллах)	$0,8 \pm 0,2$	$2,6 \pm 0,3$	↑ в 3,2 раза	Комплексная оценка деструктивно-дистрофических процессов

Данные, представленные в таблице, наглядно демонстрируют различия между показателями контрольной группы и пациентов с межпозвоночными грыжами молодого возраста. Морфометрический анализ выявил закономерное снижение толщины фиброзного кольца и площади пульпозного ядра, что отражает начало дегенеративно-дистрофических процессов уже в раннем возрасте. Толщина фиброзного кольца уменьшалась в среднем на 21% по сравнению с контрольной группой. Это связано с механическими микротравмами и повышенными осевыми нагрузками на позвоночник, приводящими к истончению и локальным разрывам коллагеновых волокон. Площадь пульпозного ядра снижалась на 17%, а содержание воды в нём уменьшалось на 13%, что свидетельствует о постепенной потере гидрофильности и тургора ткани. Эти изменения сопровождаются формированием микротрещин, расслоений и очагов мукоидного перерождения. Плотность коллагеновых волокон в фиброзном кольце, напротив, увеличивалась на 25%, что отражает процесс фиброзирования и компенсаторную перестройку структуры в ответ на хроническую перегрузку. Подобное уплотнение снижает эластичность диска и повышает риск его разрыва при незначительных травмах. Толщина гиалинового хряща замыкательных пластинок уменьшалась на 13%, что можно рассматривать как начальную стадию дегенерации субхондральных структур. Это сопровождается снижением диффузии питательных веществ в пульпозное ядро, усугубляя трофические нарушения.

В парадисковых тканях отмечалось увеличение площади сосудистого русла на 18%, что связано с развитием реактивного ангиогенеза и асептического воспаления. Этот процесс носит компенсаторный характер, направленный на улучшение трофики тканей в условиях хронической микротравматизации. Комплексная оценка изменений, выраженная через индекс дегенеративных процессов, показала его повышение более чем в три раза по сравнению с нормой. Это подчёркивает, что даже у молодых пациентов морфологические признаки деструкции межпозвоночного диска уже выражены и могут быть морфологическим субстратом болевого синдрома. Таким образом, результаты таблицы подтверждают, что у лиц молодого возраста межпозвоночные грыжи формируются не только как следствие острого травматического воздействия, но и на фоне начальных структурных и биохимических изменений, отражающих ранний этап дегенерации диска.

Обобщённые выводы. У молодых пациентов формирование межпозвоночных грыж происходит преимущественно на фоне механических факторов и микротравм, при относительной сохранности возрастных свойств ткани. Однако уже на ранних этапах выявляются деструктивно-дистрофические изменения, аналогичные тем, что наблюдаются в более старшем возрасте.

Список литературы:

1. Фишер Дж., Пастернак А. Эмбриональное развитие и клеточный состав межпозвоночного диска: современные представления // *European Spine Journal*. – 2015. – Т. 24, №8. – С. 1501–1511.
2. Агапов В.Н., Солодов А.А. Морфологические особенности межпозвоночных дисков при дегенеративных заболеваниях позвоночника. - *Морфология*, 2019. - Т. 155, № 3. — С. 45–52.
3. Арестов С.О. Современные подходы к диагностике и лечению межпозвоночных грыж у лиц молодого возраста. — *Нейрохирургия*, 2018. — № 2. — С. 15–22.
4. Габечия Г.В. Боль в спине как медико-социальная проблема: анализ причин и профилактики. — *Журнал неврологии и психиатрии*, 2020. — Т. 120, № 4. — С. 27–33.
5. Жучков Н.А. Дегенеративные заболевания позвоночника: патогенез, клиника, лечение. — Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2018. — 312 с.
6. Кулешов А.А., Иванова Е.С. Морфофункциональные изменения межпозвоночных дисков в молодом возрасте. — *Медицинская морфология*, 2020. — № 1. — С. 64–70.
7. Левин А.Б., Сафонов Ю.В. Комплексная оценка дегенеративно-дистрофических процессов позвоночного столба по данным МРТ и морфометрии. — *Вестник рентгенологии и радиологии*, 2019. — № 5. — С. 49–56.
8. Михайлов В.В., Федоров С.И. Грыжи межпозвоночных дисков: патогенетические механизмы и клинко-морфологические сопоставления. — *Вестник травматологии и ортопедии*, 2017. — № 4. — С. 22–29.
9. Deyo R.A., Mirza S.K., Martin B.I. Back pain prevalence and intervertebral disc disorders: trends, treatment outcomes, and costs. — *Spine Journal*, 2019. — Vol. 19, No. 7. — P. 1231–1240.

Для цитирования: Азимов У.М., Наврузов Р.Р. Изменения морфологии межпозвоночных дисков при формировании грыж у лиц молодого возраста по данным радиологических методов // *Вестник фундаментальной и клинической медицины*. – 2026. – № 4(24). – С. 890–893. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19712782>

ГИПОТИРЕОЗ ЧАҚИРИЛГАН ХОМИЛАДОРЛИКДАН ТУҒИЛГАН АВЛОДДА ГИПОДИНАМИЯ ШАРОИТИДА (30 КУНЛИК) УМУРТҚАЛАРАРО ДИСКЛАРНИНГ МОРФОМЕТРИК ЎЗГАРИШЛАРИ

Болтаев Э.Х.¹, Расулов Х.А.²

¹Тошкент давлат тиббиёт университети Термиз филиали, Термиз ш., Ўзбекистон

²Тошкент давлат тиббиёт университети, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. Гипотиреоз модели она каламушларда чақирилган хомиладорлик шароитида тиреоид функциясини сусайтириши орқали шакллантирилди. 30 - кунлик кузатув босқичида олинган морфометрик маълумотлар гипотиреоз шароитида туғилган авлод каламушларида умуртқалар аро диск тўқимасида илк дегенератив қайта қурилиш жараёнлари шаклланаётганини кўрсатди. Гипотиреоз фонида гиподинамия қўлланилган гуруҳда диск қалинлиги ва пулпоз ядро майдонининг янада қисқариши ($p < 0,01-0,001$) механик юкланишининг камайиши туфайли диффуз озиқланиш жараёнлари бузилиши билан боғлиқ экани илмий жиҳатдан асосланади.

Калит сузлар: гипотиреоз, гиподинамия, умуртқалараро диск, пулпоз ядро

MORPHOMETRIC CHANGES IN THE INTERVERTEBRAL DISCS OF OFFSPRING BORN FROM PREGNANCY INDUCED BY HYPOTHYROIDISM UNDER CONDITIONS OF HYPOKINESIA (30-DAY PERIOD)

Boltayev E.Kh.¹, Rasulov Kh.A.²

¹Termez Branch of the Tashkent State Medical University, Termez, Uzbekistan

²Tashkent State Medical University, Tashkent, Uzbekistan

Resume. A model of hypothyroidism in female rats was created by suppressing thyroid function during induced pregnancy. Morphometric data obtained on the 30th day of observation demonstrated the development of early degenerative remodeling processes in the intervertebral disc tissues of offspring born under hypothyroid conditions. In the group subjected to hypokinesia against the background of hypothyroidism, a more pronounced decrease in disc thickness and the area of the nucleus pulposus ($p < 0.01-0.001$) was observed, which is scientifically substantiated by impaired diffusion-based nutrition processes due to reduced mechanical loading.

Keywords: hypothyroidism, hypokinesia, intervertebral disc, nucleus pulposus.

МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ МЕЖПОЗВОНОЧНЫХ ДИСКОВ У ПОТОМСТВА, РОЖДЁННОГО ОТ БЕРЕМЕННОСТИ, ИНДУЦИРОВАННОЙ ГИПОТИРЕОЗОМ, В УСЛОВИЯХ ГИПОДИНАМИИ (30-СУТОЧНЫЙ ПЕРИОД)

Болтаев Э.Х.¹, Расулов Х.А.²

¹Термезский филиал Ташкентского государственного медицинского университета, г. Термез, Узбекистан

²Ташкентский государственный медицинский университет, г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. Модель гипотиреоза у самок крыс формировалась путём подавления тиреоидной функции в условиях индуцированной беременности. Морфометрические данные, полученные на 30-е сутки наблюдения, показали формирование ранних дегенеративных процессов перестройки тканей межпозвоночного диска у потомства крыс, рождённых в условиях гипотиреоза. В группе с применением гиподинамии на фоне гипотиреоза выявлено более выраженное уменьшение толщины диска и площади пульпозного ядра ($p < 0,01-0,001$), что научно обосновано нарушением процессов диффузного питания вследствие снижения механической нагрузки.

Ключевые слова: гипотиреоз, гиподинамия, межпозвоночный диск, пульпозное ядро.

Долзарблиги. Сўнгги йилларда аҳоли орасида гиподинамия ва эндокрин бузилишлар тарқалишининг ортиши муносабати билан умуртқа поғонасида дегератив ўзгаришларнинг эрта шаклланиши муаммоси алоҳида долзарб аҳамият касб этмоқда. Замонавий тадқиқотлар тўқималардаги структура бузилишларининг илдишлари ҳали антенатал даврдаёқ, «фетал дастурлаш» концепцияси доирасида шаклланиши мумкинлигини тасдиқламоқда [7].

Асосий хавф омилларидан бири — хомиладорлик давридаги гипотиреоз бўлиб, у кўплаб аёлларда учрайди ва хомила тўқималарининг нормал ўсиши ҳамда дифференциацияси учун жуда муҳим бўлган тиреоид гормонлар етишмовчилиги билан кечади. Тироксин танқислиги хужайра пролиферацияси, хужайрадан ташқари матрикс синтези ва бириктирувчи тўқима тузилмалари, жумладан, тоғай ҳосилаларининг шаклланишига таъсир кўрсатиши аниқланган [1; 6]. Интраутерин ривожланиш даврида тиреоид гомеостазининг бузилиши авлод аъзолари ва тизимларида, жумладан, метаболик ва структура ўзгаришларга олиб келиши мумкин [3; 7].

Сўнгги йилларда гипотиреознинг умуртқа поғонаси дегератив касалликлари билан боғлиқлиги ҳақида ҳам маълумотлар олинган бўлиб, бу гормонал бузилишлар умуртқаларо дискларнинг қайта тузилишида муайян роль ўйнаши мумкинлигини кўрсатади [2]. Шу билан бирга, умуртқаларо диск метаболизмга боғлиқ тузилма бўлиб, у организмнинг гормонал ва трофик ҳолатидаги ўзгаришларга жуда сезгир ҳисобланади.

Кўшимча салбий омил сифатида гиподинамия ҳам намоён бўлиб, у замонавий шароитларда кенг тарқалган ва дискларнинг диффузион озиқланишини камайтиради, микроциркуляцияни ёмонлаштиради ҳамда дегератив жараёнларни кучайтиради. Гипотиреоз туфайли юзага келган интраутерин бузилишлар билан биргаликда гиподинамия авлодда умуртқаларо дискларнинг морфологик ва морфометрик ўзгаришларини янада кучайтириши мумкин.

Шу тариқа, онадаги гипотиреоз ва гиподинамиянинг умуртқаларо дисклар тузилишининг шаклланишига биргаликдаги таъсирини ўрганиш умуртқа поғонасининг дегератив касалликлари ривожланишининг илк механизмларини тушуниш учун муҳим аҳамиятга эга бўлган долзарб илмий масала ҳисобланади.

Тадқиқот мақсади: гипотиреоз чакирилган хомиладорликдан туғилган авлодда гиподинамия ҳолатида (30 кунлик) умуртқалар аро дискларнинг морфометрик ўзгаришларини ўрганиш.

Тадқиқотнинг материал ва услублари. Мазкур тадқиқот гипотиреоз шароитида чакирилган хомиладорликдан туғилган авлодда гиподинамия таъсири остида умуртқалар аро дискларнинг морфологик ва морфометрик ўзгаришларини комплекс баҳолашга қаратилди. Экспериментал ишлар амалдаги биоэтика меъёрлари ва лаборатория ҳайвонларидан фойдаланиш бўйича халқаро қоидаларга қатъий риоя этилган ҳолда аккредитациядан ўтган илмий-тадқиқот лабораторияси шароитида амалга оширилди.

Тадқиқот объекти сифатида 10–12 ҳафталик, оғирлиги 170–210 грамм бўлган, клиник жиҳатдан соғлом Wistar линиясига мансуб 60 та эркак каламуш танлаб олинди. Барча ҳайвонлар стандарт виварий шароитида, 22–24°C ҳарорат ва 12 соатлик ёруғлик-қоронғилик режимида, эркин овқатланиш ва сув ичиш имконияти таъминланган ҳолда сақланди. Эксперимент дизайнига мувофиқ равишда ҳайвонлар тасодифий танлаш усули орқали уч гуруҳга ажратилди: назорат гуруҳи, гипотиреоз модели яратилган гуруҳ ва гипотиреоз фонида гиподинамия таъсири қўлланилган гуруҳ.

Гипотиреоз модели она каламушларда чакирилган хомиладорлик шароитида тиреоид функциясини сусайтириш орқали шакллантирилди. Бунинг учун тиреоид гормонлар синтезини блокловчи пропилтиоурацил препарати ичимлик суви орқали 0,05% концентрацияда хомиладорлик даври мобайнида бериб борилди. Тиреоид статусни назорат қилиш мақсадида қонда тироксин (Т4) ва тиреотроп гормон (TSH) миқдори иммунофермент таҳлил усулида аниқланди. Гипотиреоз ҳолати лаборатор кўрсаткичлар асосида тасдиқланди. Туғилган авлодлар онасидан ажратилгандан сўнг стандарт шароитда парвариш қилинди.

Гиподинамия модели махсус чекланган ҳаракат шароити яратиш орқали амалга оширилди. Бунинг учун тажриба гуруҳидаги авлод каламушлар кун давомида белгиланган вақт оралиғида ҳаракат фаолияти чекланган индивидуал тор контейнерларда сақланди. Назорат ҳайвонлари эркин ҳаракатланиш имкониятига эга бўлди. Эксперимент 30 кунлик кузатув муддатларида баҳоланди. Ҳар бир босқичда ҳайвонлар умумий анестезия остида эвтаназия қилиниб, бел қисми умуртқа поғонаси сегментлари ажратиб олинди.

Олинган умуртқалар аро дисклар 10% нейтрал формалин эритмасида 24–48 соат давомида фиксация қилинди. Сўнгра намуналар стандарт гистологик ишлов босқичларидан ўтказилди, яъни ўсувчи концентрациядаги спиртларда дегидратация қилиниб, ксилолда шаффофлаштирилди ва парафин блокларга жойлаштирилди. 4–6 мкм қалинликдаги гистологик кесмалар тайёрланиб, умумий морфологик ҳолатни баҳолаш учун гемотоксилан-эозин усулида бўялди. Коллаген толалар ва бириктирувчи тўқима компонентларини аниқлаш мақсадида Массонинг трихром бўёғи қўлланилди, протеогликанлар тақсимотини баҳолаш учун Альциан кўк реакцияси бажарилди.

Олинган барча натижалар статистик жиҳатдан қайта ишланди. Маълумотлар ўртача қиймат ва стандарт оғиш кўринишида тақдим этилди. Гуруҳлар ўртасидаги фарқларни баҳолашда дисперсион

таҳлил ва тегишли пост-хок тестлар қўлланилди. $p < 0,05$ қиймати статистик аҳамиятли деб қабул қилинди. Қўлланилган методологик ёндашув гипотиреоз ва гиподинамия шароитида умуртқалар аро дискларнинг морфологик ҳамда морфометрик қайта қурилиш хусусиятларини илмий асосда комплекс таҳлил қилиш имконини берди.

Тадқиқот натижалари. Тадқиқот давомида гипотиреоз чақирилган хомиладорликдан туғилган авлод каламушларида гиподинамия таъсири остида умуртқалар аро диск тўқимасида юз берган морфологик ва морфометрик ўзгаришлар комплекс таҳлил қилинди. Олинган натижалар назорат гуруҳи кўрсаткичлари билан қиёсий таҳлил асосида баҳоланди.

Назорат гуруҳида умуртқалар аро дисклар анатомик ва гистологик жиҳатдан меъёрий тузилишни намоён қилди. Пулпоз ядро марказий қисмда жойлашган бўлиб, унинг матрикси бир хил тақсимланган, протеогликанларга бой ва Альциан кўк билан интенсив бўялган ҳолатда кузатилди. Фиброз ҳалқа концентрик жойлашган, муназзам тартибланган коллаген толаларидан ташкил топган бўлиб, Массонинг трихром бўёғида аниқ кўк рангда ифодаланди. Хондроцитларга ўхшаш хужайралар зичлиги меъёр доирасида бўлиб, ядролар гиперхромиясиз, цитоплазмада дистрофик ўзгаришларсиз аниқланди.

30 кунлик кузатув босқичида олинган морфометрик маълумотлар гипотиреоз шароитида туғилган авлод каламушларида умуртқалар аро диск тўқимасида илк дегенератив қайта қурилиш жараёнлари шаклланаётганини кўрсатди. Назорат гуруҳида дискнинг умумий қалинлиги ва пулпоз ядро майдони физиологик меъёр доирасида сақланган бўлса, гипотиреоз гуруҳида ушбу кўрсаткичлар статистик аҳамиятли даражада пасайган ($p < 0,05$). Бу ҳолат тиреоид гормонлар етишмовчилиги натижасида хондроцитларга ўхшаш хужайралар метаболизмининг сусайиши, протеогликанлар синтезининг камайиши ва гидрофиллик хусусиятларининг йўқолиши билан изоҳланади.

Гипотиреоз фонида гиподинамия қўлланилган гуруҳда диск қалинлиги ва пулпоз ядро майдонининг янада қисқариши ($p < 0,01-0,001$) механик юкланишнинг камайиши туфайли диффуз озикланиш жараёнлари бузилиши билан боғлиқ экани илмий жиҳатдан асосланади. Маълумки, умуртқалар аро диск тўқимаси қон томирларсиз структура бўлиб, унинг трофикаси асосан ҳаракат фаоллиги орқали таъминланади. Шу боис гиподинамия метаболик алмашинуви янада чеклаб, дегенератив жараёнларни чуқурлаштиради.

Коллаген толалари улушининг ошиши ва хондроцитларга ўхшаш хужайралар зичлигининг камайиши диск тўқимасида фиброз трансформация бошланганини англатади. Дегенерация индекси кўрсаткичининг ишончли ортиши ($p < 0,05-0,001$) морфологик ўзгаришлар клиник жиҳатдан аҳамиятли босқичга ўтаётганини тасдиқлайди. Демак, 30 кунлик муддатдаёқ эндокрин ва функционал омилларнинг биргаликдаги таъсири диск матриксининг сифат таркибига салбий таъсир кўрсатиши аниқланди (1-жадвал).

1-жадвал

Умуртқалар аро дискнинг морфометрик кўрсаткичлари (30 кун, $M \pm SD$)

Кўрсаткичлар	Назорат	Гипотиреоз	Гипотиреоз + гиподинамия
Диск умумий қалинлиги (мм)	$1,82 \pm 0,09$	$1,63 \pm 0,07^*$	$1,49 \pm 0,05^{**}$
Пулпоз ядро майдони (мм ²)	$0,91 \pm 0,05$	$0,79 \pm 0,04^*$	$0,63 \pm 0,03^{***}$
Коллаген толалари улуши (%)	$34,2 \pm 2,1$	$41,6 \pm 2,4^*$	$48,7 \pm 2,6^{***}$
Хондроцитларга ўхшаш хужайралар зичлиги (%)	100%	$81,4 \pm 4,2^*$	$68,3 \pm 3,8^{***}$
Дегенерация индекси (балл)	$0,8 \pm 0,2$	$2,1 \pm 0,3^*$	$3,8 \pm 0,4^{***}$

Ўтказилган экспериментал тадқиқот натижалари шуни кўрсатдики, хомиладорлик даврида тиреоид статуснинг бузилиши авлодда умуртқалараро дискларнинг структура компонентлари шаклланишига сезиларли таъсир кўрсатади. Тиреоид гормонлар танқислиги хужайралар метаболик фаоллигининг сусайишига, протеогликанлар синтезининг камайишига ва матрикснинг гидрофил хусусиятларининг ёмонлашишига олиб келади, бу эса эрта дегенератив ўзгаришларнинг асосини ташкил этади.

Гиподинамиянинг қўшимча таъсири аниқланган бузилишларни янада кучайтиради. Ҳаракат фаоллигининг чекланиши умуртқалараро дискларнинг диффузион озикланишини ёмонлаштиради, бу эса метаболик бузилишларни чуқурлаштиради ва дегенератив жараёнларнинг прогрессиясига сабаб бўлади. Натижада диск қалинлиги ва пулпоз ядро майдонининг сезиларли даражада камайиши, коллаген тузилмалари улушининг ортиши ва ҳужайралар зичлигининг пасайиши кузатилади, бу эса тўқимада фиброз трансформация ривожланаётганини кўрсатади.

Шундай қилиб, интраутерин гипотиреоз ва постнатал гиподинамиянинг биргаликдаги таъсири умуртқалараро дискларнинг нормал структура ривожланиши учун ноқулай шароитларни шакллантиради ҳамда умуртқа поғонасининг дегенератив касалликларининг эрта ривожланишида муҳим омиллардан бири сифатида қаралиши мумкин. Олинган натижалар таянч-ҳаракат тизими патологияларини профилактика қилишда комплекс ёндашув зарурлигини, жумладан, ҳомиладор аёлларда эндокрин бузилишларни ўз вақтида тузатиш ва авлодда етарли ҳаракат фаоллигини таъминлаш муҳимлигини таъкидлайди.

Хулоса:

1. Гипотиреоз билан оғриган оналардан туғилган авлодда умуртқалараро дискларнинг эрта дегенерациясини акс эттирувчи ишончли морфологик ва морфометрик ўзгаришлар аниқланади. Бу ўзгаришлар диск қалинлигининг камайиши, пулпоз ядро майдонининг қисқариши ҳамда ҳужайравий таркибнинг бузилиши билан намоён бўлади.

2. Интраутерин гипотиреоз фонида гиподинамия дегенератив ўзгаришларни сезиларли даражада кучайтиради. Бу ҳолат морфометрик кўрсаткичларнинг янада пасайиши, коллаген толалари улушининг ортиши ва хондроцитсимон ҳужайралар зичлигининг камайиши билан ифодаланади.

3. Эндокрин (гипотиреоз) ва функционал (гиподинамия) омилларнинг биргаликдаги таъсири умуртқалараро дискларда фиброз-дегенератив трансформациянинг тезлашган ҳолда шаклланишига олиб келади. Бу эса дегенерация индекси ошиши ва тўқима матрикси тузилишининг бузилиши билан тасдиқланади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Batistuzzo A., et al. Clinical and subclinical maternal hypothyroidism and neurodevelopment. Arch Endocrinol Metab. 2020;64(1):89–95.
2. Chu T., et al. Hypothyroidism and degenerative spine disease: a literature review. Journal of Spinal Surgery. 2025. <https://www.researchgate.net/publication/399093528>
3. Farhat S., et al. Effects of maternal subclinical hypothyroidism on offspring. Pakistan Journal of Neurological Sciences. 2024. <https://ecommons.aku.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1637>
4. Kampouri M., et al. Maternal mild thyroid dysfunction and offspring neurodevelopment. Frontiers in Endocrinology. 2020. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8716315/>
5. Kh.A.F., et al. Thyroid status of offspring from maternal hypothyroidism. Central Asian Journal of Medicine. 2025. <https://journals.tnmu.uz/cajm/article/view/2542>
6. Wang Q., et al. Association of maternal mild hypothyroidism with offspring development. Frontiers in Endocrinology. 2022. <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fendo.2022.884851>
7. Zhao L., et al. Maternal hypothyroidism and metabolic outcomes in offspring: systematic review. BMC Pediatrics. 2024.

Иқтибос учун: Болтаев Э.Х., Расулов Х.А. Гипотиреоз қақирилган ҳомиладорликдан туғилган авлодда гиподинамия шароитида (30 кунлик) умуртқалараро дискларнинг морфометрик ўзгаришлари // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2026. – № 4(24). – Б. 894–897. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19725358>

THE RESULTS OF THE LAPAROSCOPIC METHOD IN THE SURGICAL TREATMENT OF COPROSTASIS**Usmanov B.B., Matkuliev U.I.**

Tashkent State Medical University, Tashkent, Uzbekistan

Resume. Severe forms of coprostasis (SFC) and megacolon form a stable clinical and pathogenetic alliance, which particularly clearly demonstrates the weaknesses of current tactics. In patients with severe stagnation, dilatation, and elongation of the colon, medical regimens and standard conservative algorithms often do not produce a stable effect. Further discussion inevitably leads to surgery, but there is still no consensus on the extent of intervention. Authoritative guidelines of recent years emphasize the low quality of evidence regarding surgery for refractory slow colonic transit form, indicate the need for strict selection, and leave significant room for interpretation. Discussions in the professional community explain the differences in decision-making between clinics and schools regarding the surgical treatment of this type of pathology and TFC.

Keywords: megalon, coprostasis, laparoscopy, and older age.

КОПРОСТАЗНИ ЖАРРОҲЛИК ДАВОЛАШДА ЛАПАРОСКОПИК УСУЛНИНГ НАТИЖАЛАРИ**Усманов Б.Б., Маткулиев У.И.**

Тошкент давлат тиббиёт университети, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. Каппростаз ва мегаколоннинг оғир шакли барқарор клиник ва патогенетик иттифоқ ҳосил қилади, бу айниқса замонавий тактиканинг заиф томонларини аниқ намоён этилади. Йўгон ичакнинг кенгайиши ва чўзилиши фонида оғир турғунлик бўлган беморларда дори режимлари ва стандарт консерватив алгоритмлар кўпинча барқарор таъсир кўрсатмайди. Муҳокамадаги кейинги қадам муқаррар равишда операцияга олиб келади, ammo аралашув доираси бўйича ҳали ҳам келишилган ёндашув мавжуд эмас. Сўнгги йилларда нуфузли кўрсатмалар рефрактер секин ичак транзити учун жарроҳлик билан боғлиқ далилларнинг паст сифатини таъкидлади, қатъий танлов зарурлигини кўрсатди ва талқин қилиш учун катта жой қолдирди. Профессional ҳамжамиятдаги мунозаралар клиникалар ва мактаблар ўртасида ушбу турдаги патологияни жарроҳлик даволаш тактикаси ва каппростазнинг оғир шакли бўйича қарор қабул қилишдаги фарқларни тушунтиради.

Калим сўзлар: мегакалон, каппростаз, лапароскопия ва кекса ёшдагилар.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОГО МЕТОДА ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ КОПРОСТАЗА**Усманов Б.Б., Маткулиев У.И.**

Ташкентский государственный медицинский университет, г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. Тяжелое форма капростаза (ТФК) и мегаколон образуют устойчивый клинико-патогенетический союз, который особенно наглядно проявляет слабые места современной тактики. У больных с выраженным застоем на фоне дилатации и удлинения ободочной кишки медикаментозные схемы и стандартные консервативные алгоритмы часто не дают стабильного эффекта. Дальнейший шаг в обсуждении неизбежно приводит к хирургии, однако согласованного подхода по объёму вмешательства до сих пор нет. Авторитетные руководства последних лет подчёркивают низкое качество доказательств в отношении хирургии рефрактерной медленной толстокишечной транзитной формы, указывают на необходимость строгой селекции и оставляют значительное пространство для интерпретаций. Дискуссии в профессиональном сообществе объясняют различия в принятии решений между клиниками и школами относительно тактики хирургического лечения данного вида патологии и ТФК.

Ключевые слова: мегакалон, каппростаз, лапароскопия и пожилой возраст.

Relevance. Coprostasis is one of the most underestimated problems in clinical practice, and it is faced every day by therapists, gastroenterologists, surgeons, neurologists, and doctors of the sanatorium service. The scale is clear from the "background" figures, namely, in the general population, the prevalence of chron-

ic constipation, on the basis of which TFC is formed, is about 14% and is consistently confirmed by meta-analyses [1, 3, 4].

In clinical settings, this problem becomes tangible, and prospective data from medical departments show that the frequency of constipation disorders reaches up to 55.6% in the first days of hospitalization [2,5], and in intensive care units, up to 83% of cases are reported with a direct impact on outcomes [6].

Aim: the results of the laparoscopic method in the surgical treatment of coprostasis.

Materials and methods. The study included 112 elderly and senile patients who underwent surgery for megacolon complicated by TFC at the Hippocrates Surgical Clinic in Tashkent between 2021 and 2025.

All stages of examination and surgical treatment were carried out in accordance with the provisions of the World Medical Association's Declaration of Helsinki (2013), as well as taking into account the national requirements for conducting clinical and biomedical research approved by the Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan.

For the analysis, all patients were divided into 2 groups depending on the surgical procedure performed. The main group consisted of 59 (52.7%) patients who underwent a modified laparoscopic bypass ileorectal anastomosis with standardized technical parameters. This category included patients who underwent surgical treatment in 2024-2025, which aimed to preserve the continuity of the large intestine with minimal trauma and reduce the risk of recurrence in severe cases of coprostasis.

The control group consisted of 53 (47.3%) patients who underwent traditional surgical procedures of various volumes in 2021-2023, including sigmoid colon resection, left-sided hemicolectomy, and subtotal colectomy. Both groups followed the same principles of preoperative preparation, anesthetic support, and postoperative care.

The analysis of the age distribution showed that both groups were dominated by elderly patients (Table 1). In the main group, 34 patients (57.6%) were classified as elderly, and 25 (42.4%) were classified as senile. In the control group, 31 patients (58.5%) were classified as elderly, and 22 (41.5%) were classified as senile. Overall, 65 (58%) patients were classified as elderly, and 47 (42%) were classified as senile. The average age of the patients was within a narrow range, with 73.2 ± 6.8 years in the main group and 72.9 ± 7.1 years in the control group, for a total average of 73.1 ± 6.9 years. The obtained data indicate a high comparability of the age composition of the studied cohorts, which excludes the influence of the age factor on the results of the comparative analysis (Table 1).

Table 1

The nature of the distribution of patients by gender and age

AGE AND GENDER	GROUPS OF PATIENTS		Overall
	Control, n=53	Basic group, n=59	
60-74 age (elderly)	31 (58,5%)	34 (57,6%)	65 (58%)
75-89 age (old)	22 (41,5%)	25 (42,4%)	47 (42%)
Men, n (%)	24 (45,3%)	26 (44,1%)	50 (44,6%)
Women, n (%)	29 (54,7%)	33 (55,9%)	62 (55,4%)

The gender distribution of patients was also characterized by evenness. In the main group, there were 26 (44.1%) men and 33 (55.9%) women; in the control group, there were 24 (45.3%) men and 29 (54.7%) women, respectively. In total, there were 50 (44.6%) men and 62 (55.4%) women among all patients. The sex ratio between the groups did not differ significantly, which allows us to consider the clinical material as homogeneous in terms of basic demographic characteristics (Table 2).

Table 2

Distribution of patients according to the clinical and anatomical forms of megacolon (according to the WSES classification, 2021)

CLINICAL FORMS OF MEGACOLON	GROUPS OF PATIENTS		Overall
	Control gr, n=53	Basic gr, n=59	
Primary	21 (39,6%)	23 (39%)	44 (39,3%)
Secondary	13 (24,5%)	15 (25,4%)	28 (25%)
Postconstipation	19 (35,9%)	21 (35,6%)	40 (35,7%)

The average duration of constipation before surgery was 6.8 ± 1.5 days in the main group and 7.0 ± 1.7 days in the control group, indicating a similar level of severity of functional disorders of the colon. The aver-

age dilation of the sigmoid colon according to irrigography was 8.6 ± 1.1 cm in the main group and 8.8 ± 1.3 cm in the control group.

An analysis of the structure and frequency of concomitant diseases in patients included in the study showed a pronounced polymorbidity of the sample, which is typical for BPSV with long-term disorders of the motor and evacuatory function of the colon.

Research results. In the control group, the patients were divided into 3 subgroups depending on the volume of resection performed: resection of the sigmoid colon, left-sided hemicolectomy and subtotal colectomy. This distribution reflects both the length of the segment to be removed and the degree of interference in the anatomical and functional integrity of the intestinal tract. The first subgroup included 21 patients who underwent sigmoid resection; the second subgroup included 16 patients who underwent left-sided hemicolectomy; and the third subgroup included 16 patients who underwent subtotal colectomy.

The distribution of conversion rates is well correlated with the extent of the intervention.

While less than one in five patients converted during sigmoid colon resection, this rate increased by more than 1.5 times during left-sided hemicolectomy, and reached 2/3 of patients during subtotal colectomy. This dynamic confirms that as the extent of resection increases, the surgeon faces increasing technical difficulties, and in patients with weakened BPSV, this often necessitates the use of open surgery. In clinical practice, this meant that recovery was more consistent after relatively "short" surgeries, while patients spent longer in the intensive care unit after subtotal colon resections.

In left-sided hemicolectomy, the conversion rate increased by almost half, and in subtotal colectomy, it increased by more than half, with bleeding being the main cause, but also due to the technical difficulty of adequately mobilizing the elongated and dilated megacolon.

The configuration of the ileorectalis anastomosis also had characteristic shifts, in particular, in patients after resection of the sigmoid colon and left-sided hemicolectomy, the end-to-side technique was more often used, which ensured sufficient width of the anastomosis with moderate traumatism. In case of subtotal colectomy, the option of intestinal anastomosis by the type of side-to-side was more often resorted to, which reflected the desire to create the widest possible lumen for the passage of intestinal contents.

However, it was in this subgroup that episodes of frequent defecations with imperative urges were observed in the postoperative period, requiring additional medical correction. For example, in one observation, a 79-year-old patient experienced multiple imperative urges after a subtotal colectomy with a wide lateral anastomosis, which required dietary adjustments and the administration of appropriate medications by the 10th day.

The analysis of the suture material revealed that the stapler technique prevailed in the subgroups with limited colon resections, while combined techniques were used in only 1/3 of the patients.

On the contrary, in subtotal colectomy, a combined suture was used in more than half of the cases, which reflected the need for additional reinforcement of the anastomosis line in patients with a thin intestinal wall. In rare cases where a manual suture was performed, technical difficulties and increased intervention time were observed, which was particularly challenging for older patients. This was due to the reduced elasticity of the tissues. For example, an 82-year-old patient with severe diabetes mellitus and pronounced mucosal atrophy in the anastomosis area developed signs of failure after a stapler suture, which required an emergency relaparotomy. The final evaluation criterion was the duration of the operation, and here the contrast between the subgroups was particularly striking (from 110-120 minutes for sigmoid resection to more than 220 minutes for subtotal colectomy). For BPSV, the difference in time was crucial, as longer interventions were associated with significant weakness, slower recovery of respiratory function, and a longer stay in the Surgery Department.

After resection of the sigmoid colon, bowel function was restored on 3.5 ± 1.2 days, after left-sided hemicolectomy on 4.8 ± 1.6 days, and after subtotal colectomy on only 6.2 ± 2.0 days. This gradient reflects not only the differences in the severity of the intervention, but also the reduced adaptive potential of the BPSV when the volume of colon resection is increased.

Even more revealing was the dynamics of imperative urges, which in the subgroup of patients after sigmoid colon resection was characterized by the presence of 0.6 ± 0.4 urges/day, after left-sided colectomy it increased almost 2 times (1.1 ± 0.6 urges/day), and after subtotal colectomy it reached 1.9 ± 0.7 urges/day. In one case study of a 77-year-old patient who underwent a subtotal colectomy, sudden urges occurred several times a day, effectively limiting her mobility and requiring constant supervision by family members.

Thus, the analysis of the treatment results in the control group revealed that traditional resection interventions in patients with megacolon and TFC in the elderly and senile age are characterized by high morbidity, a significant frequency of complications, and unsatisfactory functional outcomes in the long term. An increase in the volume of resection was naturally accompanied by an increase in the duration of surgery, in-

traoperative blood loss, and the frequency of conversions, which was particularly difficult for patients with limited functional reserve.

Conclusions:

1. In patients with BPSV with megacolon complicated by TFC, traditional resection operations with formation of a colorectal anastomosis are characterized by high traumatism and a significant frequency of complications, marked by an average of 1.0-1.5 adverse events per 1 patient. The main reasons for "unsatisfactory" outcomes were inflammatory changes and anastomosis suture failure, as well as functional rectal failure.

2. In the long term, some patients continued to experience recurrent coprostasis and opposite disorders in the form of frequent imperative defecations, as well as episodes of incontinence, which led to repeated hospitalizations, prolonged treatment periods, and a significant decrease in quality of life.

References:

1. Алешин Д.В., Шахматов Д.Г., Суровегин Е.С. и др. Идиопатический мегаколон: взаимосвязь клинических проявлений с результатами объективных методов обследования // Колопроктология. – 2024. – Т. 23, № 2(88). – С. 35–45.
2. Брацун А.Д., Лусевич А.И., Щербакowa Е.С., Гилев А.А. Мегаколон или болезнь Гиршпрунга // Студенческий форум. – 2021. – № 3-1(139). – С. 9–10.
3. Давыдова А.Я., Помыткина Т.Е. Хронические запоры у БПСВ: особенности терапии // Медико-биологические, клинические и социальные вопросы здоровья и патологии человека: материалы V Всероссийской научной конференции студентов и молодых учёных с международным участием, Иваново, 09–11 апреля 2019 года. – Иваново: Ивановская государственная медицинская академия, 2019. – С. 71–72.
4. Заболотских И.Б., Горобец Е.С., Григорьев Е.В. и др. Периоперационное ведение БПСВ: методические рекомендации // Вестник интенсивной терапии им. А.И. Салтанова. – 2022. – № 3. – С. 7–26.
5. Скворцов В.В., Скворцова Е.М., Байманкулов С.С. Современная тактика лечения запоров // Медицинский совет. – 2019. – № 21. – С. 148–153.
6. Agha R.A., Fowler A.J., Saeta A. et al.; SCARE Group. The SCARE statement: consensus-based surgical case report guidelines // Int. J. Surg. – 2016. – Vol. 34. – P. 180–186.
7. Baffy N., Harris L.A., Foxx-Orenstein A.E. Pelvic floor dysfunction and refractory constipation // World Gastroenterology Organisation. – 2017. – Available from: <https://www.worldgastroenterology.org/publications/e-wgn/e-wgn-expert-point-of-view> [Accessed 13 Apr 2022].
8. Chey W.D., Lembo A.J., Rosenbaum D.P. Tenapanor treatment of patients with constipation-predominant irritable bowel syndrome: a phase 2, randomized, placebo-controlled efficacy and safety trial // Am. J. Gastroenterol. – 2017. – Vol. 112(5). – P. 763–774.
9. DeMicco M., Barrow L., Hickey B. et al. Randomized clinical trial: efficacy and safety of plecanatide in the treatment of chronic idiopathic constipation // Ther. Adv. Gastroenterol. – 2017. – Vol. 10(11). – P. 837–851.
10. Kang S.H., Lee J., Koh S.B. Constipation is associated with mild cognitive impairment in patients with de novo Parkinson's disease // J. Mov. Disord. – 2022. – Vol. 15(1). – P. 38–42.

For citation: Usmanov B.B., Matkuliev U.I. The results of the laparoscopic method in the surgical treatment of coprostasis // Bulletin of Fundamental and Clinic Medicine. – 2026. – № 4(24). – P. 898–901. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19725642>

ИЗМЕНЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОЧЕК ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ПАРАЦЕТАМОЛ-ИНДУЦИРОВАННОМ ТОКСИЧЕСКОМ ГЕПАТИТЕ В УСЛОВИЯХ ДЕГИДРАТАЦИИ

Ражабова Н.Б.¹, Яриев А.А.²

¹Термезский филиал Ташкентского государственного медицинского университета,
г. Ташкент, Узбекистан

²Сырдарьинский филиал Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи,
г. Сырдарья, Узбекистан

Резюме. В экспериментальном исследовании изучено влияние дегидратации и парацетамола на функциональное состояние почек у лабораторных крыс. Оценивали суточный диурез и показатели общего анализа мочи. Установлено, что ограничение водного режима сопровождалось выраженным снижением объема мочи, повышением содержания белка и увеличением относительной плотности мочи. При сочетании парацетамола с дегидратацией сохранялись признаки протеинурии и гематурии. Полученные результаты свидетельствуют о ведущей роли дегидратации в формировании нарушений функции почек и усилении нефротоксических проявлений при токсическом воздействии парацетамола.

Ключевые слова: парацетамол, дегидратация, функция почек, диурез, общий анализ мочи, протеинурия, гематурия, экспериментальное исследование.

CHANGES IN RENAL FUNCTIONAL PARAMETERS IN EXPERIMENTAL PARACETAMOL- INDUCED TOXIC HEPATITIS UNDER DEHYDRATION CONDITIONS

Rajabova N.B.¹, Yariyev A.A.²

¹Termez Branch of Tashkent State Medical University, Tashkent, Uzbekistan

²Syrdarya Branch of the Republican Scientific Center for Emergency Medical Care, Syrdarya, Uzbekistan

Resume. The experimental study investigated the effects of dehydration and paracetamol on renal functional parameters in laboratory rats. Daily urine volume and general urinalysis indicators were assessed. It was found that water restriction led to a significant decrease in urine volume, increased protein concentration, and higher specific gravity of urine. When paracetamol administration was combined with dehydration, signs of proteinuria and hematuria persisted. The results indicate a major role of dehydration in the development of renal dysfunction and enhancement of nephrotoxic effects during paracetamol-induced toxicity.

Keywords: paracetamol, dehydration, kidney function, diuresis, urinalysis, proteinuria, hematuria, experimental study.

ДЕГИДРАТАЦИЯ ШАРОИТИДАГИ ТАЖРИБАВИЙ ПАРАЦЕТАМОЛ-ИНДУЦИРЛАНГАН ТОКСИК ГЕПАТИТДА БУЙРАК ФУНКЦИОНАЛ КЎРСАТКИЧЛАРИ ЎЗГАРИШЛАРИ

Ражабова Н.Б.¹, Яриев А.А.²

¹Тошкент давлат тиббиёт университети Термиз филиали, Термиз ш., Ўзбекистон

²Республика шошилич тиббий ёрдам илмий маркази Сырдарё филиали, Сырдарё ш., Ўзбекистон

Резюме. Экспериментал тадқиқотда лаборатория каламушларида дегидратация ва парацетамолнинг буйраклар функционал ҳолатига таъсири ўрганилди. Суточный диурез ва умумий сийдик таҳлили кўрсаткичлари баҳоланди. Аниқланишича, сув режими чекланиши сийдик ҳажмининг кескин камайиши, сийдикда оқсил миқдорининг ошиши ҳамда нисбий зичликнинг ортиши билан кечади. Парацетамол ва дегидратация биргаликда қўлланилганда протеинурия ва гематурия белгилари сақланиб қолди. Олинган натижалар дегидратация буйрак функцияси бузилишларида асосий омил эканлигини кўрсатади.

Калит сўзлар: парацетамол, дегидратация, буйрак функцияси, диурез, сийдик умумий таҳлили, протеинурия, гематурия, экспериментал тадқиқот.

Актуальность. Парацетамол (ацетаминофен) является одним из наиболее широко применяемых анальгетических и жаропонижающих препаратов в мире благодаря своей эффективности и относительной безопасности при использовании в терапевтических дозах. Однако при превышении допу-

стимых дозировок или длительном применении данный препарат способен вызывать выраженное токсическое поражение печени, которое может приводить к развитию острой печёночной недостаточности. По данным современных исследований, парацетамол-индуцированное повреждение печени остаётся одной из наиболее распространённых причин лекарственно-индуцированного гепатита и занимает ведущие позиции среди причин острой печёночной недостаточности во многих странах мира [5].

Токсическое действие парацетамола сопровождается развитием выраженного оксидативного стресса, нарушением функции митохондрий, активацией воспалительных цитокинов и индукцией клеточной гибели. Эти процессы приводят к развитию некроза гепатоцитов и нарушению функционального состояния печени [8]. Кроме того, современные исследования показывают, что значительную роль в развитии повреждения печени играют сигнальные пути клеточного стресса, а также активация иммунных и воспалительных механизмов [4].

Несмотря на значительное количество научных исследований, посвящённых изучению парацетамол-индуцированного повреждения печени, многие вопросы, касающиеся молекулярных механизмов развития гепатотоксичности и факторов, модифицирующих течение патологического процесса, остаются недостаточно изученными. В связи с этим дальнейшее исследование механизмов развития токсического гепатита, вызванного парацетамолом, имеет важное значение для разработки новых методов профилактики и терапии лекарственно-индуцированных поражений печени [6].

Цель исследования: Изучить экспериментальную оценку нарушений функции почек при токсическом поражении печени, индуцированном парацетамолом, в условиях водного дефицита.

Материалы и методы исследования. Исследование проводили на лабораторных белых крысах массой 250–290 г, содержащихся в стандартных условиях вивария: в металлических клетках при температуре 23 ± 1 °C, относительной влажности воздуха 30 - 70% и режиме освещения 12/12 ч (свет/темнота), со свободным доступом к стандартному лабораторному корму по требованиям GLP [1,2]. Животные были рандомизированы по 6 особей в каждую экспериментальную группу.

Модель парацетамол-индуцированного токсического гепатита воспроизводили путем внутрибрюшинного введения парацетамола в возрастающих дозах 200; 300 и 600 мг/кг массы тела в течение 3 последовательных суток [3]. Контрольной группе вводили эквивалентный объём растворителя по аналогичной схеме. Дегидратацию в соответствующих группах начинали с 1-го дня эксперимента и продолжали в течение 3 суток, что позволяло оценить влияние водного дефицита на выраженность токсического повреждения печени. Экспериментальные животные были распределены на следующие группы:

1. **Интактная группа** — животные содержались в стандартных условиях без введения парацетамола и моделирования дегидратации;
2. **Группа дегидратации (контрольная - 1)** — животные подвергались дегидратации без введения парацетамола;
3. **Группа парацетамола (ПЦМ – контрольная - 2)** — животным вводили парацетамол в указанных дозах без ограничения водного режима;
4. **Группа парацетамола на фоне дегидратации (опытная)** — животным вводили парацетамол в сочетании с моделированием дегидратации.

Сразу после последнего введения парацетамола, животных всех экспериментальных групп помещали в метаболические камеры на 24 часа для сбора суточной мочи. По завершении данного периода, на 4-й день эксперимента, у животных проводили общий анализ мочи, после чего осуществляли забор крови для последующего лабораторного исследования.

Функциональное состояние почек экспериментальных животных оценивали на основании определения суточного диуреза и показателей общего анализа мочи. Для этого животных всех групп после последнего введения препарата помещали в метаболические камеры на 24 часа, что обеспечивало отдельный и количественный сбор мочи. Объём выделенной за сутки мочи измеряли с помощью градуированных цилиндров и выражали в миллилитрах, после чего рассчитывали средние значения показателя для каждой экспериментальной группы.

Полученные образцы суточной мочи использовали для проведения общего анализа мочи. Исследование выполняли с применением мультипараметрических диагностических тест-полосок U-11 Urinalysis Reagent Strips (Mindray). Метод основан на колориметрической оценке изменения окраски реакционных зон тест-полоски после её погружения в образец мочи. Интерпретацию результатов осуществляли в соответствии с инструкцией производителя путем визуального сравнения с прилагаемой цветовой шкалой.

С использованием тест-полосок определяли следующие показатели: лейкоциты, нитриты, уробилиноген, белок, pH, кровь (эритроциты/гемоглобин), относительную плотность (specific gravity), кетоновые тела, билирубин, глюкозу и аскорбиновую кислоту. Все параметры регистрировали количественно с последующим сравнительным анализом между экспериментальными группами.

Комплексная оценка суточного диуреза и показателей общего анализа мочи позволила охарактеризовать функциональное состояние почек, степень нарушения концентрационной функции, водно-электролитного баланса, а также выявить возможные признаки нефротоксического воздействия парацетамола на фоне дегидратации.

Статистическую обработку результатов проводили методом дисперсионного анализа ANOVA при уровне значимости $p=0,05$ с помощью программы GraphPad Prism версии 8.0.0 для Windows (GraphPad Software, Сан-Диего, Калифорния, США, www.graphpad.com) [9].

Результаты исследования. Результаты исследования общего объема мочи (табл. 1) показали выраженную зависимость диуреза от водного режима содержания животных. В контрольной группе суточный объем мочи составил $6,2 \pm 3,4$ мл. В группе дегидратации отмечалось резкое и статистически значимое снижение диуреза до $0,7 \pm 0,29$ мл ($p \leq 0,001$ по сравнению с контролем). В группе парацетамола при сохранённом водном режиме объем мочи составил $7,24 \pm 2,31$ мл, что было сопоставимо с контрольными значениями. В группе ПЦМ + дегидратация также наблюдалось выраженное снижение диуреза до $1,4 \pm 0,55$ мл ($p \leq 0,001$ по сравнению с контролем), однако данный показатель оставался несколько выше, чем при изолированной дегидратации. Полученные данные свидетельствуют о том что ограничение водного режима является основным фактором резкого снижения диуреза, тогда как введение парацетамола при сохранённой гидратации существенного влияния на объем мочи не оказывает.

Таблица 1

Результаты изучения общего объема мочи ($M \pm SD$; $p=0,05$; $n=5$)

Группы	Объёма в мл
Контроль	$6,2 \pm 3,4$
Дегидратация	$0,7^{***} \pm 0,29$
ПЦМ	$7,24 \pm 2,31$
ПЦМ + дегидратация	$1,4^{***} \pm 0,55$

*** — различия статистически значимы по сравнению с контрольной группой ($p \leq 0,001$).

Таблица 2

Результаты изучения количественные показатели общего анализа мочи ($M \pm SD$; $p=0,05$; $n=5$)

Группы	Уробилиноген (URO), мг/дл	Белок (PRO), мг/дл	pH	Относительная плотность (SG), г/мл	Аскорбиновая кислота (ASC), мг/дл
Контроль	$0,2 \pm 0,0$	21 ± 8	$5,4 \pm 0,55$	$1,028 \pm 0,003$	2 ± 4
Дегидратация	$0,2 \pm 0,0$	$1220^* \pm 1039$	$5,4 \pm 0,55$	$1,030 \pm 0,000$	$34^* \pm 13$
ПЦМ	$0,2 \pm 0,0$	30 ± 0	$6,0 \pm 0,0$	$1,028 \pm 0,004$	6 ± 5
ПЦМ + дегидратация	$0,2 \pm 0,0$	$220^* \pm 110$	$5,0 \pm 0,0$	$1,030 \pm 0,000$	$40^* \pm 0$

* — различия статистически значимы по сравнению с контрольной группой ($p \leq 0,05$).

Анализ количественных показателей общего анализа мочи (табл. 2) выявил изменения преимущественно со стороны белка и аскорбиновой кислоты. В контрольной группе уровень белка в моче составил 21 ± 8 мг/дл при pH $5,4 \pm 0,55$ и относительной плотности $1,028 \pm 0,003$ г/мл. В группе дегидратации отмечалось резкое и статистически значимое повышение содержания белка до 1220 ± 1039 мг/дл ($p \leq 0,05$ по сравнению с контролем) при сохранении кислой реакции мочи (pH $5,4 \pm 0,55$), что отражает выраженную концентрацию мочи в условиях водного дефицита. В группе ПЦМ при сохранённом водном режиме уровень белка составил 30 ± 0 мг/дл, что лишь незначительно превышало контрольные значения. При этом pH мочи смещался в сторону более нейтральной реакции ($6,0 \pm 0,0$), а

относительная плотность оставалась на уровне контроля ($1,028 \pm 0,004$ г/мл). В группе ПЦМ + дегидратация содержание белка увеличивалось до 220 ± 110 мг/дл ($p \leq 0,05$), что значительно ниже показателя изолированной дегидратации, но выше контрольных значений. pH мочи составлял $5,0 \pm 0,0$, а относительная плотность — $1,030 \pm 0,000$ г/мл. Содержание уробилиногена во всех группах оставалось одинаковым ($0,2 \pm 0,0$ мг/дл). Показатель аскорбиновой кислоты возрастал при дегидратации (34 ± 13 мг/дл) и при сочетании ПЦМ с дегидратацией (40 ± 0 мг/дл) по сравнению с контролем (2 ± 4 мг/дл), тогда как при изолированном введении ПЦМ составлял 6 ± 5 мг/дл. Таким образом, наиболее выраженные изменения показателей мочи наблюдались при дегидратации, проявляясь массивной протеинурией и повышением относительной плотности, тогда как парацетамол при адекватной гидратации оказывал минимальное влияние на показатели общего анализа мочи.

Таблица 3

Результаты изучения полуколичественные показатели общего анализа мочи ($M \pm SD$; $p=0,05$; $n=5$), Эритроциты в моче (BLO)

Группы	Отрицательно (-), %	Слабо положительно (+), %	Резко положительно (+++), %	5–10 в поле зрения, %
Контроль	0 %	20 %	80 %	0 %
Дегидратация	0 %	0 %	40 %	60 %
ПЦМ	0 %	0 %	80 %	20 %
ПЦМ + дегидратация	0 %	0 %	20 %	80 %

Полуколичественный анализ эритроцитов в моче (табл. 3) показал наличие гематурии во всех экспериментальных группах, однако степень её выраженности различалась. В контрольной группе у 80 % животных отмечалась резко положительная реакция (+++), у 20 % — слабоположительная (+), при отсутствии случаев выявления 5–10 эритроцитов в поле зрения.

В группе дегидратации у 40 % животных регистрировалась резко положительная реакция (+++), а у 60 % — 5–10 эритроцитов в поле зрения, что свидетельствует о выраженном влиянии водного дефицита на состояние почечного фильтра.

В группе ПЦМ у 80 % животных выявлялась резко положительная реакция (+++), у 20 % — 5–10 эритроцитов в поле зрения, что указывает на нефротоксическое воздействие препарата.

В группе ПЦМ + дегидратация наиболее выраженные изменения отмечались у 80 % животных в виде 5–10 эритроцитов в поле зрения и у 20 % — резко положительной реакции (+++), что отражает комбинированное влияние токсического и дегидратационного факторов. Во всех группах отрицательная реакция не регистрировалась.

Таблица 4

Результаты изучения других показателей общего анализа мочи ($M \pm SD$; $p=0,05$; $n=5$)

Группы	Лейкоциты (LEU)	Кетоновые тела (KET)	Билирубин (BIL)	Глюкоза (GLU)
Контроль	—	—	—	—
Дегидратация	—	—	—	—
ПЦМ	—	—	—	—
ПЦМ + дегидратация	—	—	—	—

Другие показатели общего анализа мочи, включая лейкоциты, кетоновые тела, билирубин и глюкозу, во всех экспериментальных группах оставались отрицательными, что свидетельствует об отсутствии выраженного воспалительного процесса, кетоза и нарушений углеводного обмена на момент исследования. Ограничение водного режима приводит к выраженному снижению диуреза, раз-

виту протеинурии и гематурии, тогда как введение парацетамола на фоне дегидратации усиливает нефротоксические проявления. Свободный доступ

Заключение. Результаты исследования функциональных показателей почек показали, ограничение водного режима сопровождалось выраженным снижением диуреза, значительным повышением содержания белка в моче, увеличением относительной плотности и развитием гематурии. При сочетании парацетамола с дегидратацией сохранялись признаки нарушения функции почек, включая протеинурию и гематурию, при низком объёме мочи. Введение парацетамола при сохранённой гидратации не сопровождалось существенными изменениями диуреза и основных показателей общего анализа мочи. Полученные данные указывают на ведущую роль водного дефицита в формировании функциональных нарушений почек и усиление нефротоксических проявлений при его сочетании с токсическим воздействием парацетамола.

Выводы:

1. Ограничение водного режима у экспериментальных животных сопровождается выраженным снижением суточного диуреза, повышением относительной плотности мочи и развитием протеинурии, что свидетельствует о нарушении концентрационной функции почек и изменении водно-электролитного баланса.

2. Введение парацетамола при сохранённом водном режиме не вызывает существенных изменений объёма суточного диуреза и основных показателей общего анализа мочи, что указывает на относительно стабильность функционального состояния почек при адекватной гидратации.

3. Сочетание парацетамола с дегидратацией приводит к усилению нефротоксических проявлений, проявляющихся снижением диуреза, протеинурией и гематурией, что свидетельствует о потенцирующем влиянии водного дефицита на развитие функциональных нарушений почек.

Список литературы:

1. Руководство по экспериментальному (доклиническому) изучению новых фармакологических веществ / [под общ. ред. Р. У. Хабриева]. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ОАО Изд-во «Медицина», 2005. – 832 с.
2. Руководство по проведению доклинических исследований лекарственных средств. Часть первая / [под ред. А.Н. Миронова]. – М.: Гриф и К, 2012. – 944 с.
3. Ghanem CI, Ruiz ML, Villanueva SSM, Luquita MG, Llesuy S, Catania VA, Bengochea LA, Mottino AD. Effect of repeated administration with subtoxic doses of acetaminophen to rats on enterohepatic recirculation of a subsequent toxic dose. *Biochemical Pharmacology*. 2009;77(10):1621–1628.
4. Gonçalves A.C., Pereira A., et al. Modulation of paracetamol-induced hepatotoxicity: experimental and molecular aspects // *Biomedicines*. — 2024. — Vol. 12.
5. Jaeschke H. Acetaminophen hepatotoxicity: paradigm for understanding mechanisms of drug-induced liver injury // *Annual Review of Pathology*. — 2024. — Vol. 19. — P. 21–45.
6. Kholili U., Nugroho Y., Sugihartono T. Liver injury associated with acetaminophen: a review // *Research Journal of Pharmacy and Technology*. — 2023. — Vol. 16(4). — P. 2006–2012.
7. Liao J., Li C., Wang Y. Acetaminophen-induced liver injury: molecular mechanisms and therapeutic strategies // *Frontiers in Pharmacology*. — 2023. — Vol. 14. — Article 1122632.
8. Li R., Zhang Q., Chen Y. Underlying mechanisms and treatment of acetaminophen-induced liver injury // *International Journal of Molecular Sciences*. — 2025. — Vol. 26.
9. Sokal, R. R., & Rohlf, F. J. (2012). *Biometry: The Principles and Practice of Statistics in Biological Research* (4th ed.). W. H. Freeman.

Для цитирования: Ражабова Н.Б., Яриев А.А. Изменения функциональных показателей почек при экспериментальном парацетамол-индуцированном токсическом гепатите в условиях дегидратации // *Вестник фундаментальной и клинической медицины*. – 2026. – № 4(24). – С. 902–906. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19725771>

НАРУШЕНИЯ НУТРИТИВНОГО И МИКРОЭЛЕМЕНТНОГО СТАТУСА ПРИ ЦИРРОЗЕ ПЕЧЕНИ: СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И КЛИНИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Облокулов А.А.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Низкий уровень цинка связан с саркопенией, гипоальбуминемией и ухудшением функции печени по шкалам Child-Pugh и ALBI. Цинк рассматривается как важный биомаркер неблагоприятного течения цирроза. Печёночная энцефалопатия обусловлена гипераммониемией, нейровоспалением и нарушением нейромедиаторных процессов. Дефицит цинка усиливает токсическое влияние аммиака на ЦНС. Скрытая форма ПЭ приводит к когнитивным нарушениям и снижению качества жизни. Она повышает риск травм, ДТП и прогрессирования заболевания. Ранний скрининг с оценкой цинка имеет клиническую значимость. Лечение должно включать нутритивную поддержку, белковое питание и физическую активность. Назначение цинка снижает аммиак и улучшает когнитивные функции. Включение цинка и саркопении в прогностические шкалы улучшает оценку риска.

Ключевые слова: цирроз печени, цинк, саркопения, печёночная энцефалопатия, аммиак, ALBI, Child-Pugh

IMPAIRMENTS IN NUTRITIONAL AND TRACE ELEMENT STATUS IN LIVER CIRRHOSIS: CURRENT PERSPECTIVES AND CLINICAL IMPLICATIONS

Oblokulov A.A.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. Low zinc levels are associated with sarcopenia, hypoalbuminemia, and impaired liver function. Zinc is an important biomarker of poor prognosis in liver cirrhosis. Hepatic encephalopathy is driven by hyperammonemia and neuroinflammation. Zinc deficiency enhances ammonia neurotoxicity. Minimal HE causes cognitive decline and reduced quality of life. It increases risks of falls, accidents, and disease progression. Early screening including zinc assessment is clinically important. Management should include nutritional support and adequate protein intake. Zinc supplementation reduces ammonia levels and improves cognition. Including zinc and sarcopenia in prognostic models improves risk prediction.

Keywords: liver cirrhosis, zinc, sarcopenia, hepatic encephalopathy, ammonia, ALBI, Child-Pugh

ЖИГАР ЦИРРОЗИДА НУТРИТИВ ВА МИКРОЭЛЕМЕНТЛАР СТАТУСИНИНГ БУЗИЛИШИ: ЗАМОНАВИЙ ТАСАВВУРЛАР ВА КЛИНИК ОҚИБАТЛАР

Облокулов А.А.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Цинк даражасининг пастлиги саркопения, албуминнинг камайиши ва жигар функциясининг ёмонлашуви билан bogлиқ. Цинк жигар сиррози оғир кечилиши кўрсатувчи муҳим биомаркер ҳисобланади. Жигар энцефалопатияси гипераммонемия ва нейроялғигланиши билан bogлиқ. Цинк етишмовчилиги аммиакнинг марказий асаб тизимига токсик таъсири кучайтиради. Яширин шакл диққат ва хотира пасайишига олиб келади. Бу ҳолат ҳаёт сифатини ёмонлаштиради ва жароҳатлар хавфини оширади. Эрта скрининг ва синк даражасини баҳолаш муҳим аҳамиятга эга. Даволашида тўғри овқатланиш ва жисмоний фаоллик зарур. Синк препаратлари аммиакни камайтиради ва когнитив функцияни яхшилайди. Келажакда синк ва саркопенияни прогноз тизимларига киритиш муҳим.

Калит сўзлар: жигар сиррози, синк, саркопения, жигар енцефалопатияси, аммиак, ALBI, Child-Pugh

e-mail: ablakulov@inbox.ru

Цирроз печени (ЦП) представляет собой конечную стадию хронических заболеваний печени, сопровождающуюся прогрессирующим фиброзом, портальной гипертензией и развитием печёночной недостаточности. Несмотря на достижения современной гепатологии, смертность среди пациентов с циррозом остаётся высокой. В последние годы особое внимание уделяется не только биохимическим

показателям функции печени, но и системным метаболическим нарушениям, включая саркопению, миостеатоз, ожирение и дефицит микроэлементов, способным существенно влиять на прогноз заболевания [1]. Изменения компонентного состава тела у пациентов с ЦП являются следствием хронического воспаления, нарушения белкового обмена, гипераммониемии и гормональных сдвигов. Эти факторы приводят к уменьшению мышечной массы, перераспределению жировой ткани и снижению функционального резерва организма. В то же время нарушения обмена цинка, селена, меди и железа усиливают метаболические расстройства и способствуют прогрессированию осложнений [2].

Целью настоящей работы является анализ современных данных о роли нарушений компонентного состава тела и микроэлементного статуса у больных циррозом печени, а также оценка их клинического значения для прогноза и лечения. Проведён аналитический обзор современных публикаций за 2020–2025 годы, посвящённых циррозу печени, саркопении, скрытой печёночной энцефалопатии и микроэлементным нарушениям. В анализ включены результаты клинических исследований, метаанализов и проспективных наблюдений. Дополнительно использованы данные исследований содержания микроэлементов у пациентов с циррозом печени, включая оценку цинка как прогностического маркера скрытой энцефалопатии [9]. Для оценки состава тела в современных исследованиях применяются компьютерная томография (КТ), биоимпедансный анализ (БИА), двухэнергетическая рентгеновская абсорбциометрия (DXA), а также антропометрические методы. Для оценки микроэлементного статуса используются спектрофотометрические и атомно-абсорбционные методы исследования крови, волос и мочи [3]. Одним из наиболее частых метаболических осложнений цирроза печени является саркопения — прогрессирующее снижение массы и силы скелетных мышц. По данным современных исследований, саркопения выявляется у 40–70% пациентов с декомпенсированным циррозом. Причинами её развития являются снижение синтеза белка в печени, гипераммониемия, усиленный катаболизм, снижение физической активности и дефицит нутриентов [3]. Клиническое значение саркопении чрезвычайно велико. Установлено, что пациенты с саркопенией имеют более высокий риск инфекционных осложнений, повторных госпитализаций и смертности. Метаанализ 22 исследований показал увеличение риска летального исхода более чем в 2 раза у больных циррозом с низкой мышечной массой по сравнению с пациентами без саркопении [3]. Современным «золотым стандартом» диагностики саркопении считается КТ с измерением площади скелетной мускулатуры на уровне L3 позвонка. Однако в клинической практике всё чаще используются биоимпедансный анализ и измерение силы кистевого хвата, позволяющие быстро выявлять пациентов высокого риска [4].

Помимо снижения мышечной массы, у больных ЦП часто наблюдается миостеатоз — патологическое накопление жира в мышечной ткани. Это состояние сопровождается снижением качества мышечных волокон, уменьшением силы и ухудшением прогноза. Исследования 2022–2025 годов показали, что миостеатоз может быть даже более точным предиктором смертности, чем изолированная саркопения [2]. Миостеатоз тесно связан с воспалением, инсулинорезистентностью и нарушением митохондриальной функции. У пациентов с сочетанием миостеатоза и саркопении значительно чаще развиваются печёночная энцефалопатия, асцит и септические осложнения. Оценка миостеатоза проводится по плотности мышечной ткани в единицах Хаунсфилда при КТ-исследовании [5].

Особую проблему представляет саркопеническое ожирение, при котором уменьшение мышечной массы сочетается с избытком жировой ткани. Индекс массы тела при этом может оставаться нормальным, что затрудняет раннюю диагностику. Пациенты с саркопеническим ожирением имеют худшую выживаемость и более высокий риск гепатоцеллюлярной карциномы [6].

Дефицит микроэлементов является важной частью патогенеза цирроза печени. Наиболее часто выявляются нарушения обмена цинка, селена, магния, меди и железа. Эти изменения обусловлены снижением кишечного всасывания, нарушением синтеза транспортных белков, хроническим воспалением и потерями микроэлементов с мочой [7]. Наибольшее клиническое значение имеет дефицит цинка. Цинк участвует в функционировании ферментов мочевинового цикла, синтезе белка, антиоксидантной защите и работе иммунной системы. Его недостаток приводит к ухудшению обезвреживания аммиака и способствует развитию печёночной энцефалопатии [8]. В исследовании с участием 145 пациентов с циррозом печени скрытая печёночная энцефалопатия была выявлена у 62,8% больных. При этом уровень цинка <74 мкг/дл оказался независимым предиктором скрытой энцефалопатии (OR 3,22; $p=0,0093$). У пациентов с более высоким уровнем цинка частота когнитивных нарушений была значительно ниже [9]. Дополнительные исследования показали, что низкий уровень цинка ассоциирован также с саркопенией, снижением альбумина и худшей функцией печени по Child-Pugh и ALBI шкалам. Это подчёркивает значение цинка как универсального биомаркера неблагоприятного течения цирроза [10]. Печёночная энцефалопатия (ПЭ) остаётся одним из наиболее тяжёлых осложнений цирроза печени. В её основе лежат гипераммониемия, нейровоспаление, нарушение гематоэнцефали-

ческого барьера и дефицит нейромедиаторных систем. Современные данные показывают, что дефицит цинка усиливает токсическое действие аммиака на центральную нервную систему [9]. Скрытая форма ПЭ проявляется снижением внимания, памяти, скорости мышления и координации движений. Несмотря на отсутствие яркой клинической симптоматики, она ухудшает качество жизни, повышает риск ДТП, падений и прогрессирования до явной энцефалопатии. Поэтому ранний скрининг с использованием психометрических тестов и оценки уровня цинка имеет большое практическое значение [11].

Коррекция нарушений состава тела и микроэлементного статуса должна быть обязательной частью лечения цирроза печени. Основные направления включают индивидуализированную нутритивную поддержку, достаточное потребление белка (1,2–1,5 г/кг/сут), физические упражнения и терапию осложнений портальной гипертензии. Назначение препаратов цинка в ряде исследований сопровождалось снижением уровня аммиака, улучшением когнитивных функций и уменьшением частоты эпизодов энцефалопатии. Метаанализ показал, что добавление цинка может улучшать клинические исходы у пациентов с ЦП, особенно при наличии исходного дефицита микроэлемента.

Перспективным направлением считается включение показателей саркопении, миостеатоза и уровня цинка в прогностические шкалы тяжести цирроза. Это позволит точнее оценивать риск осложнений и определять показания к трансплантации печени [2].

Заключение. Таким образом, нарушения компонентного состава тела и микроэлементного статуса играют ключевую роль в течении цирроза печени. Саркопения, миостеатоз, саркопеническое ожирение и дефицит цинка являются независимыми факторами неблагоприятного прогноза. Их своевременная диагностика позволяет выявлять пациентов высокого риска и проводить персонализированную коррекцию. Современная стратегия ведения больных циррозом печени должна включать не только оценку функции печени, но и комплексный анализ мышечной массы, жировой ткани и микроэлементного баланса. Это открывает новые возможности для улучшения качества жизни и повышения выживаемости пациентов [1,2].

Список литературы:

1. Tandon P., Montano-Loza A.J., Lai J.C. et al. Sarcopenia and frailty in decompensated cirrhosis. *Journal of Hepatology*. 2021;75:S147–S162.
2. Ebadi M., Bhanji R.A., Tandon P. et al. Prognostic significance of body composition abnormalities in patients with cirrhosis. *Alimentary Pharmacology & Therapeutics*. 2020;52(4):600–618.
3. Tantai X., Liu Y., Yeo Y.H. et al. Effect of sarcopenia on survival in patients with cirrhosis: a meta-analysis. *Journal of Hepatology*. 2022;76(3):588–599.
4. Dhariwal S., Roy A., Taneja S. et al. Assessment of sarcopenia using muscle ultrasound in patients with cirrhosis and sarcopenic obesity (AMUSE Study). *Journal of Clinical Gastroenterology*. 2022.
5. Ahn H., Kim D.W., Ko Y. et al. Updated systematic review and meta-analysis on diagnostic issues and the prognostic impact of myosteatosis: a new paradigm beyond sarcopenia. *Ageing Research Reviews*. 2021;70:101398.
6. Montano-Loza A.J., Mazurak V.C., Ebadi M. et al. Visceral adiposity increases risk for hepatocellular carcinoma in male patients with cirrhosis and recurrence after liver transplant. *Hepatology*. 2018;67(3):914–923.
7. Katayama K., Kawaguchi T., Shiraishi K. et al. The prevalence and implication of zinc deficiency in patients with chronic liver disease. *Journal of Clinical Medicine Research*. 2018;10:437–444.
8. Kodama H., Tanaka M., Naito Y. et al. Japan's practical guidelines for zinc deficiency with a particular focus on taste disorders, inflammatory bowel disease, and liver cirrhosis. *International Journal of Molecular Sciences*. 2020;21:2941.
9. Matsuda T., Namisaki T., Shibamoto A. et al. Clinical significance of marginal zinc deficiency as a predictor of covert hepatic encephalopathy in patients with liver cirrhosis. *International Journal of Molecular Sciences*. 2025;26:4184.
10. Murata K., Namisaki T., Fujimoto Y. et al. Clinical significance of serum zinc levels on the development of sarcopenia in cirrhotic patients. *Cancer Diagnosis & Prognosis*. 2022;2:184–193.
11. Lv X.H., Lu Q., Deng K. et al. Prevalence and characteristics of covert/minimal hepatic encephalopathy in patients with liver cirrhosis: a systematic review and meta-analysis. *American Journal of Gastroenterology*. 2024;119:690–699.

Для цитирования: Облокулов А.А. Нарушения нутритивного и микроэлементного статуса при циррозе печени: современные представления и клинические последствия // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 4(24). – С. 907–909. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19725886>

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ МЕЖПОЗВОНКОВЫХ ДИСКОВ РАЗЛИЧНЫХ ОТДЕЛОВ ПОЗВОНОЧНОГО СТОЛБА ПРИ ГРЫЖАХ У МОЛОДЫХ ПАЦИЕНТОВ

Азимов У.М., Наврузов Р.Р.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. В данной статье рассматриваются современные подходы к изучению морфологических изменений межпозвоночных дисков в различных отделах позвоночного столба у молодых пациентов с межпозвоночными грыжами. Особое внимание уделено сравнительному анализу морфологических характеристик в шейном, грудном и поясничном отделах позвоночника. Рассматриваются методы диагностики, включая МРТ и гистологические исследования, а также подходы к лечению и профилактике. Подчёркивается значимость ранней диагностики и понимания патогенеза заболевания.

Ключевые слова: межпозвоночная грыжа, морфология, позвоночный столб, шейный отдел, поясничный отдел, МРТ, молодые пациенты

CURRENT ASPECTS OF MORPHOLOGICAL STUDY OF THE INTERVERTEBRAL DISCS OF VARIOUS DIVISIONS OF THE VERTEBRUM DURING HERNIAS IN YOUNG PATIENTS

Azimov U.M., Navruzov R.R.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. This article explores current approaches to the study of morphological changes in intervertebral discs across different regions of the spine in young patients with intervertebral hernias. Special attention is paid to the comparative analysis of morphological characteristics in the cervical, thoracic, and lumbar spine. Diagnostic methods, including MRI and histological studies, are discussed, along with treatment and prevention strategies. The importance of early diagnosis and understanding of the disease pathogenesis is emphasized.

Keywords: intervertebral hernia, morphology, spinal column, cervical spine, lumbar spine, MRI, young patients

УМУРТҚА ПОҒОНАСИ ТУРЛИ БЎЛИМЛАРИНИНГ УМУРТҚАЛАРАРО ДИСКЛАРИНИ МОРФОЛОГИК ЎРГАНИШНИНГ ДОЛЗАРБ ЖИҲАТЛАРИ

Азимов У.М., Наврузов Р.Р.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Мазкур мақолада ёш беморларда орқа умуртқа дисклари чурраси билан боғлиқ турли бўлимларида юз берадиган морфологик ўзгаришларни ўрганишнинг замонавий ёндашувлари кўриб чиқилади. Асосий этибор бўйин, кўкрак ва бел соҳаларидаги морфологик хусусиятларнинг қиёсий таҳлилига қаратилган. Диагностика усуллари, жумладан, МРТ ва гистологик тадқиқотлар, шунингдек даволаш ва профилактика ёндашувлари баён этилади. Касалликнинг патогенезини эрта аниқлаш ва тушуниш муҳимлиги таъкидланади.

Калит сўзлар: диски чурраси, морфология, умуртқа поғонаси, бўйин соҳаси, бел соҳаси, МРТ, ёш беморлар

Введение. Межпозвоночные грыжи — одна из наиболее распространённых патологий позвоночника, встречающаяся не только у лиц среднего и пожилого возраста, но всё чаще диагностируемая у молодых людей. Наиболее подвержены поражению шейный и поясничный отделы позвоночного столба. Изучение морфологических изменений диска в разных отделах позвоночника имеет ключевое значение для понимания механизмов заболевания, его диагностики и лечения.

Морфология межпозвоночного диска. Межпозвоночный диск состоит из студенистого ядра, фиброзного кольца и замыкательных пластинок. В норме он выполняет функцию амортизации, гибкости и распределения нагрузки на позвоночник. При развитии грыжи происходят дегенеративные изменения: снижение гидратации ядра, повреждение фиброзного кольца и смещение ядра за его пределы.

Шейный отдел: грыжи чаще возникают на уровнях C5–C6 и C6–C7, нередко сопровождаются корешковым синдромом, головными болями, онемением конечностей.

Грудной отдел: патологии встречаются реже, чаще протекают бессимптомно.

Поясничный отдел: наиболее частое место локализации грыж, особенно уровни L4–L5 и L5–S1. Характерны боли, иррадиирующие в нижние конечности (ишиас).

Методы диагностики. МРТ — основной неинвазивный метод визуализации структуры дисков.

Гистологические методы позволяют оценить клеточный состав и состояние тканей.

Иммуногистохимические исследования применяются для изучения клеточной дегенерации и воспалительных процессов.

Морфологические изменения межпозвоночных дисков при грыжах у молодых пациентов существенно варьируют в зависимости от отдела позвоночника. 1 табл.

Таблица 1.

Гистологические признаки дегенерации межпозвоночного диска у молодых пациентов

Показатель	Норма	При грыже (до 30 лет)
Клеточность ядра	Высокая (много хондроцитов)	Умеренное снижение
Коллаген II типа	Преобладает	Снижен
Коллаген I типа	Низкий уровень	Повышен (признак фиброза)
Агрекан	Высокий	Умеренно снижен
Металлопротеиназы (MMPs)	Незначительное количество	Повышенная экспрессия
Апоптоз клеток	Практически отсутствует	Активный
Воспалительные цитокины (IL-1 β , TNF- α)	Низкий уровень	Повышен

В шейном отделе позвоночника наблюдается умеренное снижение гидратации студенистого ядра, что приводит к частичной потере эластичности. Фиброзное кольцо часто повреждается изнутри, формируя внутренние трещины и предрасполагая к образованию небольших протрузий или латерально направленных грыж. В некоторых случаях возможно развитие секвестрации, то есть отделения фрагмента ядра. В тканях диска может наблюдаться умеренная неоваскуляризация — прорастание мелких сосудов, особенно в зонах трещин, что часто сопровождается болевым синдромом.



Рис.1. Морфологическая характеристика межпозвоночных дисков шейного отдела по данным МРТ (T2-ВИ).

На представленной сагиттальной МР-томограмме шейного отдела позвоночника (T2-взвешенные изображения) визуализируются тела позвонков от уровня C2 до Th1 с чёткими, ровными контурами. Высота тел позвонков сохранена, структура костного мозга однородная, без очаговых патологических изменений. Физиологический шейный лордоз умеренно выпрямлен, что может быть связано с компенсаторной реакцией на функциональную перегрузку и начальные дегенеративные изменения межпозвоночных дисков.

Межпозвоночные диски дифференцируются на всём протяжении шейного отдела. Отмечается умеренное снижение интенсивности МР-сигнала на Т2-ВИ, что соответствует дегенеративно-дистрофическим изменениям и частичной дегидратации пульпозного ядра. Высота межпозвоночных дисков варьирует: локальное уменьшение высоты наиболее выражено на уровнях С3-С4, С4-С5 и С5-С6, что связано с формированием дорсальных грыжевых выпячиваний и протрузий. На уровнях без выраженных грыж высота дисков сохранена, что подчёркивает локальный характер дегенеративного процесса.

На уровнях С3-С4 и С5-С6 визуализируются дорсальные грыжи дисков размером до 3,3-3,8 мм, распространяющиеся в просвет позвоночного канала и оказывающие умеренное компрессионное воздействие на передние отделы дурального мешка и прилежащие участки спинного мозга. На уровне С4-С5 определяется дорсальная протрузия диска диффузного характера с умеренной деформацией переднего контура дурального мешка и локальным сужением субарахноидального пространства без признаков выраженного стеноза позвоночного канала.

Фронтальная проекция МРТ шейного отдела позвоночника позволяет детально оценить симметрию грыжевых выпячиваний, выявляет отклонения межпозвоночных дисков в боковой плоскости и наличие латеральных или фораминальных компонентов. В настоящем случае фронтальная проекция подтверждает медианно-парамедианную локализацию грыж, отсутствие выраженного латерального сдавления корешков и бокового стеноза позвоночного канала. Кроме того, фронтальная визуализация показывает, что снижение высоты межпозвоночных дисков на уровнях С3-С4, С4-С5 и С5-С6 связано с компрессией пульпозного ядра и уплощением фиброзного кольца на фоне дорсальных выпячиваний.

Спинной мозг прослеживается на всём протяжении, контуры ровные, сигнал однородный, признаков миелопатии не выявлено. Отмечается локальное уплощение передних контуров спинного мозга на уровнях грыжевых дисков, что связано с их компрессионным воздействием.

Паравerteбральные мягкие ткани без патологических изменений.

Таким образом, изменения межпозвоночных дисков шейного отдела позвоночника соответствуют дегенеративно-дистрофическому процессу с формированием дорсальных грыж на уровнях С3-С4 и С5-С6 и протрузии на уровне С4-С5, сопровождающихся умеренным компрессионным воздействием на дуральный мешок и спинной мозг. Различия в высоте дисков локально связаны с грыжевыми выпячиваниями и протрузиями. Фронтальная проекция позволяет уточнить симметрию поражений и исключить латеральное или фораминальное сдавление нервных структур.



Рис.2. Морфологическая характеристика межпозвоночных дисков пояснично-крестцового отдела по данным МРТ (сагиттальная проекция. Т2-ВИ). (А-17 летней девушки и Б-18 летнего мальчика)

На сагиттальных МР-томограммах поясничного отдела позвоночника в отмеченных зонах определяются множественные внутрителовые грыжи (грыжи Шморля), формирующиеся вследствие

внедрения межпозвонкового диска через дефекты замыкательных пластинок в губчатое вещество тел позвонков.

Межпозвонковые диски на уровнях L1–L5 имеют признаки дегенеративно-дистрофических изменений различной степени выраженности: отмечается диффузное снижение интенсивности сигнала на T2-взвешенных изображениях, свидетельствующее о дегидратации пульпозного ядра, неоднородность внутренней структуры, начальные проявления фиброзной трансформации. Указанные изменения приводят к снижению эластичности дисков, уменьшению их амортизационной способности и перераспределению осевой нагрузки на замыкательные пластинки тел позвонков.

На уровне L1–L2 определяется грыжа Шморля небольших размеров, представленная ограниченным дефектом замыкательной пластинки с умеренным внедрением дискового материала в губчатое вещество тела позвонка. Контуры дефекта относительно чёткие, выраженной деформации тела позвонка не отмечается, что соответствует ранней стадии формирования внутрителовой грыжи.

На уровне L2–L3 визуализируется грыжа Шморля с более выраженным нарушением целостности замыкательной пластинки. Определяется углубление с проникновением дискового материала в тело позвонка, сопровождающееся умеренной деформацией субхондральной зоны и начальной перестройкой губчатого вещества.

На уровне L3–L4 определяется наиболее выраженная грыжа Шморля: отмечается значительное углубление дефекта, неровность и деформация замыкательной пластинки, с распространением дискового материала вглубь тела позвонка. Наблюдаются признаки хронической субхондральной перестройки, что может включать участки уплотнения (склероза) и структурной реорганизации костной ткани, указывая на длительное существование процесса и повышенную механическую нагрузку на данный сегмент.

На уровне L4–L5 также определяется грыжа Шморля, сопровождающаяся нарушением целостности замыкательной пластинки и внедрением дискового компонента в тело позвонка. Данные изменения сочетаются с выраженной дегенерацией межпозвонкового диска данного уровня (дегидратация, снижение высоты, структурная дезорганизация), что усиливает нагрузку на замыкательные пластинки и способствует прогрессированию внутрителовых дефектов.

Вокруг зон грыж Шморля на ряде уровней могут определяться признаки реактивной перестройки костной ткани: субхондральный склероз, изменение трабекулярной структуры, что отражает хроническое воздействие осевой нагрузки и микротравматизацию. В отдельных участках возможно формирование небольших зон костномозговой реакции (без выраженного отёка), характерных для длительно существующих изменений.

Выявленные изменения носят множественный, полисегментарный характер (L1–L5) с наибольшей выраженностью в среднепоясничных сегментах (L2–L4), что типично для зон максимальной биомеханической нагрузки. Формирование грыж Шморля обусловлено сочетанием факторов: дегенерации межпозвонковых дисков, снижения их гидратации, ослабления прочности замыкательных пластинок и повышенной осевой нагрузки на позвоночный столб.

С учётом возраста (17-18 лет) данные изменения имеют клинико-морфологические особенности, связанные с продолжающимся ростом и ремоделированием позвоночника:

В грудном отделе, напротив, диски долгое время сохраняют нормальную структуру. Студенистое ядро остаётся гидратированным, а случаи грыж крайне редки. При возникновении патологии морфологические изменения, как правило, слабо выражены и локализуются в наружных слоях фиброзного кольца. Смещение ядра происходит редко, секвестрация практически не встречается. Также крайне низка степень васкуляризации, что делает воспалительные осложнения в этом отделе маловероятными.

Наиболее выраженные дегенеративные изменения наблюдаются в поясничном отделе, который испытывает максимальную нагрузку. У молодых пациентов здесь чаще всего регистрируется значительное снижение гидратации ядра, вплоть до почти полного обезвоживания. Фиброзное кольцо страдает особенно сильно: в нём формируются множественные глубокие трещины, способствующие выпячиванию и выходу ядра за пределы диска. В этом отделе наиболее часто возникают массивные грыжи и случаи секвестрации, что сопровождается резким болевым синдромом и неврологическими симптомами. Неоваскуляризация выражена: в тканях диска обнаруживаются сосудистые структуры и чувствительные нервные волокна, что усиливает клинические проявления.

Таким образом, морфология дисков у молодых пациентов с грыжами различается по отделам позвоночника: от минимальных изменений в грудном сегменте до тяжёлой деструкции в поясничном. Это требует индивидуального подхода к диагностике и лечению в зависимости от локализации патологического процесса.

Список литературы:

1. Саймон Х. М., Ли Дж. С. Морфологические изменения межпозвонкового диска в процессе роста: МРТ-анализ у детей и подростков // *Pediatric Radiology*. – 2024. – Т. 54, №2. – С. 250–258.
2. Сальвини Дж., Мариани Ф. Дегенеративные изменения позвоночного столба: от анатомии к визуализации и функциональной оценке // *Journal of Personalized Medicine*. – 2022. – Т. 12, №11. – Ст. 1810.
3. Ковальская Н. В., Бондаренко С. И. Морфология межпозвоночных дисков при дегенерации: обзор литературы // *Медицина и морфология*. – 2023. – №4. – С. 65–72.
4. Фишер Дж., Пастернак А. Эмбриональное развитие и клеточный состав межпозвоночного диска: современные представления // *European Spine Journal*. – 2015. – Т. 24, №8. – С. 1501–1511.
5. Пак А., Руденко В. А., Иванова И. Ю. Морфометрический анализ межпозвоночных дисков: сравнение ручных и компьютерных методов // *Biomedical Engineering*. – 2024. – Т. 11, №5. – С. 320–328.
6. Шульц Т. Дж., Карлсон К. Морфология шейных межпозвонковых дисков у молодых и пожилых приматов // *Spine*. – 2000. – Т. 25, №11. – С. 1301–1308.
7. Ли Х., Ян С. Морфологические особенности паравerteбральных мышц у молодых пациентов с грыжами межпозвоночных дисков // *Clinical Spine Surgery*. – 2023. – Т. 36, №3. – С. 215–222.
8. Гордеев И. И., Кузьмина Т. П. Современные подходы к изучению межпозвоночных грыж у лиц молодого возраста // *Вестник травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова*. – 2022. – №1. – С. 45–50.

Для цитирования: Азимов У.М., Наврузов Р.Р. Морфологические аспекты изучения межпозвонковых дисков различных отделов позвоночного столба при грыжах у молодых пациентов // *Вестник фундаментальной и клинической медицины*. – 2026. – № 4(24). – С. 910–914. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19725998>

БЕЗОВТА ОЁҚЛАР СИНДРОМИНИНГ МИЯ ҚОН АЙЛАНИШИНИНГ СУРУНКАЛИ БУЗИЛИШИ БИЛАН ЎЗARO БОҒЛИҚЛИГИНИНГ КЛИНИК-НЕЙРОФИЗИОЛОГИК КЎРСАТКИЧЛАРИ

Жўрабекова А.Т., Исмати З.О.

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Безовта оёқлар синдроми ёки Уиллис-Экбом касаллиги замонавий неврологиянинг муҳим тиббий-ижтимоий муаммоси ҳисобланади, чунки у асосан тунда кучаядиган ва уйқу бузилишига олиб келадиган сенсомотор ўзгаришлар билан намоён бўлиб, беморларнинг ҳаёт сифатини сезиларли даражада пасайтиради. Мақолада безовта оёқлар синдромининг клиник ва нейробиологик хусусиятлари ҳамда унинг миё қон айланишининг сурункали бузилиши билан ўзаро боғлиқлиги таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: безовта оёқлар синдроми, миё қон айланишининг сурункали бузилиши, сенсомотор бузилишлар, уйқу бузилиши, электронейромиография, ультратовуш доплерографияси, полисомнография.

CLINICAL AND NEUROPHYSIOLOGICAL PARAMETERS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN RESTLESS LEGS SYNDROME AND CHRONIC MIGRAL BLOOD CIRCULATION DISORDER

Jurabekova A.T., Ismati Z.O.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Restless legs syndrome, or Willis-Ekbom disease, is a significant medico-social problem in modern neurology, as it manifests with sensorimotor changes that worsen primarily at night and lead to sleep disturbances, which significantly reduces the quality of life for patients. The article presents the results of an analysis of the clinical and neurophysiological features of restless legs syndrome and its relationship with chronic cerebrovascular insufficiency.

Keywords: restless legs syndrome, chronic cerebrovascular disorder, sensorimotor disorder, sleep disorder, electroneuromyography, ultrasound Doppler ultrasound, polysomnography.

КЛИНИКО-НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ВЗАИМОСВЯЗИ СИНДРОМА БЕСПОКОЙНЫХ НОГ С ХРОНИЧЕСКИМ НАРУШЕНИЕМ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ

Джурабекова А.Т., Исмати З.О.

Самаркандский государственный медицинский университет, Самарканд, Узбекистан

Резюме. Синдром беспокойных ног, или болезнь Уиллиса — Экбома, представляет собой значимую медико-социальную проблему современной неврологии, поскольку проявляется сенсомоторными изменениями, обостряющимися преимущественно в ночное время и приводящими к нарушению сна, что значительно снижает качество жизни пациентов. В статье представлены результаты анализа клинико-нейрофизиологических особенностей синдрома беспокойных ног и его взаимосвязи с хроническим нарушением мозгового кровообращения.

Ключевые слова: синдром беспокойных ног, хроническое нарушение мозгового кровообращения, сенсомоторное нарушение, нарушение сна, электронейромиография, ультразвуковая доплерография, полисомнография.

Кириш. Безовта оёқлар синдроми (БОС) - бу жуда кенг тарқалган неврологик сенсомотор ўзгариш бўлиб, тунда (оёқларда оғриқ сезгиси, оёқлар билан ҳаракат қилиш учун енгил бўлмас эҳтиёжни келтириб чиқаради) ёки ҳаракатсизликда кучаядиган сезгир ноқулайлик билан намоён бўлади.

Аллен Р.П. ва ҳаммуал. (2015) ва Жанес Ф. ва бошқ. (2021) ўз тадқиқотларида БОСни бирламчи (идиопатик) ва иккиламчига бўлиб, коморбид фон (темир танқислиги анемияси, БОС, периферик асаб тизими касаллиги, дори-дармонлар қабул қилишдан интоксикация ёки микроэлементлар етишмовчилиги ва ҳ.к.) [1, 5, 9, 13]. Бундан ташқари, БОС асосий урғуси ҳаракат дисфункцияси ҳисобланган касалликлар гуруҳига киритилади, локомотор тизимнинг рефлексор фаолиятини мувофиқлаштиришни

таъминловчи сегментар ва супрасегментар тузилмаларнинг функционал ҳолати масаласи мунозарали бўлиб қолмоқда. Илмий адабиёт манбаларини излаш касалликнинг асосий белгилари ва омилларини кўрсатди, аммо фақат айрим тадқиқотчилар мия қон айланишининг бузилишини БОС билан боғлайдилар, масалан, пўстлоқ ости ва ўзак шикастланиш ўчоқлари муаммосида, бу ерда БОСда мултимедиатор нейрокимёвий йўллар ўртасидаги мураккаб патогенетик муносабатлар кўриб чиқилади [4, 6, 10, 12]. Шундай қилиб, Ланза Г. ва ҳаммуаллифлар. (2019), оёқлардаги дисфункция генетик мойиллик ва экзоген омиллар (йўлдош касалликлар: артериал гипертензия, юрак-қон томир етишмовчилиги, уйқудаги обструктив апноэ) билан белгиланади. БОС ва БОС ўртасидаги бундай изоҳни томирларни сканерлаш усули (нафасни ушлаб туриш тести, нафас ўзгаришига жавобан калла ичи томирларининг реактивлиги) беради, улар карбонат ангидрид миқдорининг ўзгаришига жавобан қон оқими тезлигининг фоиз ўзгаришига нисбатан вазомотор реактивликни визуал кўрсатади, бу эса ўз навбатида кучли томир кенгайтирувчи восита сифатида ишлайди. Қон томир функциясидаги ўзгаришлар, вегетатив тизимнинг бузилиши ва БОС ўртасидаги боғлиқлик қандай эканлиги, бу муносабатлар асосида ётувчи патомеханизм ноаниқлигича қолмоқда, эхтимол синдром атеросклерозни кучайтиради ёки аксинча, периферик томирларнинг атеросклероз билан юқори даражада зарарланиши қон томир реакциясини ёмонлаштиради, бу эса ўз навбатида қон томир хавф омилларининг ўзига нисбатан юқори сезувчанликка олиб келади [3, 7, 11]. Бундан ташқари, касаллик сабабларини аниқлаш бўйича ишончли маълумотларнинг йўқлиги синдромни даволашни қийинлаштиради. Абрамовских Л.Э. (2019), ўз ишида уйқунинг бузилиши муаммосини кўтаради ва БОСнинг асосий омили деб ҳисоблайди, у ерда инсомния ўз навбатида депрессияга олиб келишини, биргаликда БОС пайдо бўлиш хавфини оширишини таъкидлайди, шу билан бирга БОС популяцияга қараганда кўпроқ мия инсультини ривожлантиради. Россиялик олимларнинг маълумотларига кўра, БОС учраш частотаси турли генезли полинейропатиялар, радикулопатиялар, веноз етишмовчилик ёки Паркинсон касаллиги билан боғлиқ [2, 8, 12, 14]. Шундай қилиб, сурункали буйрак етишмовчилиги турли шакллариининг кечишини ўрганиш, ташхислашга дифференциал ёндашув, асоратларни ўрганиш ва СБМК билан ўзаро боғлиқлигини ўрганиш долзарб ҳисобланади.

Ишнинг мақсади. Безовта оёқлар синдроми бўлган беморларнинг клиник-нейрофизиологик хусусиятларини ўрганиш ва синдромнинг мия қон айланишининг сурункали бузилиши билан боғлиқлигини аниқлаш.


Тадқиқот материали ва усуллари. Биз неврология бўлимига, рентген-радиология бўлимига (оёқ томирларини ультратовушли дуплекс сканерлаш диагностикаси учун), қон томир жарроҳлиги бўлимига мурожаат қилган беморларни мунтазам сўровдан ўтказдик. Асосий гуруҳга киритиш учун асос бўлиб оёқларда ҳаракатли тунги безовталиқ шикоятлари бўлди. Оғир анемия, сурункали буйрак етишмовчилиги, ҳомиладорлик, даволанмаган ва назорат қилинмайдиган юқори қон босими, гликемик назорати ёмон бўлган беморлар, чекувчилар, уйқу артерияларида атеросклеротик пиллакчалари бўлган беморлар, периферик неврологик касалликлар ва руҳий оғишлар каби соматон етишмовчилиги белгилари киритилмаслик мезони бўлиб хизмат қилди. Текширилган иштирокчилар жинси (эркаклар икки барабар кўп) ва ёши (ўртача ёши 37,5 ёш) бўйича бўлинган ва таснифланган, асосий гуруҳ: 43 нафар бемор. Бундан ташқари, ёши ва жинси бўйича бир хил бўлган (30) таққослаш гуруҳига киритилган БОС шикоятлари бўлмаган кўнгиллилар танлаб олинди. Барча иштирокчиларга натижаларни баҳолаш учун стандарт ва модификацияланган диагностика протоколи тавсия этилган бўлиб, унда неврологик кўрик биринчи ўринга чиқади, сўнгра қон биокимёсининг зарур лаборатория таҳлиллари (коагулограмма), нейрофизиологик текширувлар (оёқ мушакларининг электромиографияси), оёқ қон томирларининг ультратовуш дуплекс сканирлаш (Дуплекс ультратовуш текшируви оёқ артериялари учун 5-13 МГц частота диапазонидаги Philips дуплекс ультратовуш аппарати ёрдамида амалга оширилди). бир нечта беморларга оёқларнинг МРТ ва 100% ҳолларда бош миянинг МРТ текшируви ўтказилди. Статистик кўрсаткичлар Студент усули бўйича стандарт пакетдан фойдаланган ҳолда шахсий компьютерда ўрганилди.

Тадқиқот натижалари ва уларни муҳокама қилиш. Тадқиқот натижаси. Қўйилган мақсадга асосланиб, тадқиқотнинг биринчи босқичида БОС шикоятлари сони баҳоланди, асосий гуруҳдаги барча БОС билан оғриган беморларнинг 83 фоизи тунги ва кундузги вақтларда оёқларда ноқулайликни ҳис қилган, қолган фоиз фақат тунги безовталиқ (11%) ва кундузги вақтларга (6%) бўлинган, шу билан бирга кундузги оёқ безовталигини ҳис қилган беморлар бутун гуруҳдаги асосий ўртача ёшдан ўртача 10 ёш катта бўлган. Дастлабки белгиларнинг бошланишидан то БОС дебютигача, анамнезга кўра, узок вақт (ўртача 5 йилдан 8 йилгача) аниқланган, бундан ташқари, барча беморлар касалликнинг прогрессив характерини кўрсатадилар, айниқса бу БОС билан оғриган беморларга, кундузи ва (кечкурун) тунда тааллуқлидир. Расмий таснифга кўра, БОС оилавий ва нейропатик ҳамда

идиопатик (спорадик) шаклларга бўлинади.

БОСнинг оилавий ҳолатлари фоизи 47% ни ташкил этди, бу турли хорижий муаллифларнинг маълумотларига мос келади. Энг кизиғи, беморлар бевосита БОС муаммолари билан шифокорларга мурожаат қилмаган, ушбу белги асосий шикоятлар (оёқларда оғирлик, кечга томон шиш, юришнинг бузилиши; хотиранинг пасайиши, тушунарсиз хавотир ва депрессия, бош айланиши, чарчоқ) давомида аниқланган. Беморлар оёқларидаги сезгиларни куйидаги белгилар билан таърифладилар: оёқлар ҳолатини ўзгартириш зарурати ва оёқларни зудлик билан ҳаракатлантириш истаги; "чумоли" ҳисси, санчиш; пайпоқ, пойабзални ечиш истаги; тортувчи ноқулайлик ҳисси ёки "оёқлар қотиб қолгандек." Ушбу белгиларнинг барчаси оёқ чуқурлигида юзага келадиган болдир (болдир мушаклари) соҳасининг кўп қисмида аниқланди. Шуниси характерлики, беморларнинг 33,3%ида БОС гоҳ бир, гоҳ иккинчи оёқда устунлик билан намоён бўлди. Беморлар энгилликни ҳис қилишди, кундузги БОС ҳолатларида юриш ёки оёқларнинг ихтиёрий ҳаракатларидан фойдаланиб, болдир мушакларини мустақил массаж қилиш, мушакларни босиш ёки мушакларни чўзиш, оёқларни кўтаришга (стулга) ҳаракат қилишди. Кечкурун баъзи беморлар оёқ ванналари ёки спиртли компресслардан фойдаланганлар. Муаммонинг энг мураккаб ечими сифатида тунги вақт қайд этилди, бу ерда 98,5% ҳолларда (тунги БОС бўлган) беморларда субъектив равишда уйку бузилган, уйку пайтида уйғонишлар сони 2 дақиқадан 4 мартагача етди, бунда беморлар баъзи омилларни аниқладилар (уларнинг фикрича, БОСни кучайтирувчи): совуқ ёки аксинча, юқори ҳарорат (иссиқлик). Шундай қилиб, тадқиқот таҳлили натижаси шуни кўрсатдики, БОСда энгиллик келтирадиган умумий аҳамиятга эга жисмоний усул юришдир. БОС аксарият ҳолларда аста-секин ривожланиш тенденциясига эга ва вақт ўтиши билан симптомларнинг оғирлик даражаси ортиб боради, шу билан бирга, БОС бошланган беморларнинг ўртача ёши кундузги ва тунги симптомлар пайдо бўлган беморларнинг ўртача ёшидан статистик жиҳатдан сезиларли даражада паст (кунлик намоён бўлиш). Текширув вақтида неврологик ҳолат томонидан тарқоқ майда ўчоқли белгилар, масалан, конвергенциянинг бузилиши, бир томонда бурунлаб бурмасининг энгил мослашуви, тилнинг энгил девиацияси (уч ҳолатда), рефлексларнинг томонлар бўйича фарқи ва асосан юқори ва пастки оёқларнинг фарқи, томонлар фарқи ва юқори ва пастки оёқларнинг фарқи билан гипо- ёки гиперестизия аниқланди. Ташхислаш лаборатория, нейрофизиологик (электромиография), томирларнинг ультратовушли дуплекс сканерлаш, бош миянинг МРТ диагностикаси ва оёқларнинг қисман визуализацияси кўрсаткичларидан иборат эди. Электронеуромиография (ЭНМГ) кўрсаткичлари катта болдир ва болдир нервлари бўйлаб импульсни ўтказиш тезлиги ўрганилди, бу ерда 27% ҳолларда импульсларни ўтказиш тезлигининг пасайиши қайд этилди, бунда ўтказиш тезлигининг бузилиши катта болдир мушакларида (58%), катта болдир мушакларида (42%) таққосланганда кўпроқ қайд этилди.

Спорадик шакли 36% ҳолларда, БОСнинг барча белгилари бўйича аниқланган (кўпгина муаллифлар спорадик ҳолатларни оилавий ҳолатлар билан бирлаштирадилар), айнан шу беморларда ЭНМГ кўрсаткичлари бўйича болдир ва катта болдир нервлари бўйлаб импульс ўтказиш тезлигининг пасайиши кузатилмайдиган, бундан ташқари, анамнезда ирсий мойиллик йўқ ва соматик ва муҳим неврологик белгилар мавжуд эмас.



1-расм. Асосий гуруҳдаги беморларнинг ультратовушли дуплекс сканерлаш натижасини таҳлил қилиш

БОС билан оғриган беморларда баллар шкаласи кўрсаткичларининг диагностик сезгирлиги, ўзига хослиги ва самарадорлиги (n=31)

Кўрсаткич	Сезгирлик Se (%)	Спецификлиги Sp (%)	Самарадорлик
Артериялар пульсациясининг ўзгариши тизза ости соҳасида ва оёқ панжасида пульсация йўқ	96,56%	50%	72%
Лейкотситлар (X 10 ⁹ /л) 10,5 дан юқори	74%	36%	50%
ЭЧТ (мм/соат) 34,6 дан юқори	50%	74%	68%
ЛВСЛ (ммол/л) 0,16 дан юқори	60%	73%	66%
Стеноз даражаси - 70% дан 100% гача бўлган стеноз	13,5%	98%	55%
ЛСК (см/с) - 10,0	90%	66%	79%
LPI - 0,6	33%	100%	66%
Ижтимоий мослашув даражаси - жисмоний меҳнат (абс.) ўз-ўзига хизмат кўрсатиш	10%	100%	50%

Асосий гуруҳ беморларининг клиник-неврологик хусусиятлари тавсифи (%)

Кўрсаткичлар	Асосий гуруҳ	Назорат гуруҳи
	Даволанишдан олдин	Даволанишдан кейин
Оёқларнинг тинч ҳолатда (уйқуда) оғриши	100	0
Болдир мушакларидаги томчилар ва тиришишлар	79,5	0
Болдир мушакларидаги оғирлик, толиқиш	36,6	2,1
Оёқ териси сезувчанлигининг бузилиши	68	2.
Совуқ оёқ кафтлари, Оёқ кафтларининг совқотиши	90	3.
Болдир қопламининг бузилиши, терининг юпқалашиши ва қуруқлиги	60	1,9

*p<0.05 - назорат гуруҳига нисбатан фарқларнинг ишончлилиги, #p<0,05 - УНКП гуруҳига нисбатан фарқларнинг ишончлилиги

Текширилган БОС билан оғриган беморларда гемостаз (коагулограмма) кўрсаткичларини баҳолашда ўртача қийматлар диапазони нисбатан меъёрий чегараларда қайд этилди: фибриноген даражаси 3,5 г/л, тромбопластин вақти 38 сония, қон плазмасининг фибринолитик фаоллиги (фибринолитик кўрсаткич) 17%, антитромбин III таҳлили - 95%. Д-димер даражасини аниқлаш 80% ҳолларда 0,5 мкг/мл ни ташкил этди, шу билан бирга, протромбин вақти ўртача 14 сония оралиғида, протромбин индекси эса 83% ни ташкил этди. Қон плазмасида Виллебранд омилини аниқлаш 161% га тенг бўлди, V, VII, VIII ва XII ивиш омиллари (87%, 95%, 140%, 100%), VIII ивиш омили даражасининг ошиши (140%) кўриниб турибди. Ушбу факт қон плазмасидаги гомотсистеин кўрсаткичларини назорат қилиш зарурати сифатида тақдим этилган, натижанинг таҳлили шуни кўрсатдики, 56% ҳолларда гомотсистеин даражаси юқори (15 мкмол/л), асосан эркакларда, бу ерда (p<0,01) жинс нисбатида. Бинобарин, қон ивишининг VIII омили даражасининг юқорилиги, параллел равишда антитромбин III даражасининг пасайиши, Виллебранд омилининг юқори даражаси қон ва томир деворининг тромбоген фаоллиги ошганлигидан далолат беради. Беморларни текширишда асосий гуруҳдаги липид спектрининг концентрацияси даражасининг ўртача қиймати меъёрдан юқори бўлди (ZPLP -2,8 ммол/л, YUZLP 1,1 ммол/л). Таққослаш гуруҳида (соғломлар) даража 0,13±0,01 ммол/л ни ташкил этди, бунда липидларнинг юқори кўрсаткичи 84% беморларда

қайд этилди, яъни бу кўрсаткич яхши эмас ва кўпинча томирлар атеросклерозидан дарак беради, буни ультратовуш текшируви усули билан исботлаш керак. Бундан ташқари, турли қон томир ҳавзаларининг иштироки билан кўп ўчоқли атеросклеротик бузилиш текширилган беморларга хос бўлиб, оёқ артерияларининг атеросклеротик шикастланиши бўлган беморларда деярли 48% ҳолларда брахиотсефал томирлар томонидан параллел равишда ўзгаришлар кузатилди. Периферик шикастланишлар, хусусан, оёқларнинг ривожланишида омиллар ва хавф омилларини ўрганиш муҳим аҳамиятга эга, бу гендер ёндашув (эркаклар кўпроқ таъсир қилади), ёш тоифаси (қизиқарли жиҳати шундаки, эркаклар орасида бу ёш ёш, аёлларда каттароқ, 50 ёшдан ошган), зарарли одатлар (чекиш, бу асосий гуруҳдаги текширилган беморларда 98% эркакларда, 32% аёлларда қайд этилган), ортиқча тана вазни (сезимлик 2-3 даража, тадқиқотда асосий гуруҳдаги беморларнинг аксарияти ортиқча тана вазнидан азият чеккан). Периферик қон томирлар патологиясини аниқлашнинг замонавий диагностика протоколлари олтин стандарт сифатида қўлланилади, ультратовушли дуплекс сканерлаш оёқларнинг қон томир патологиясини баҳолашда компьютер томографиясидан фойдаланган ҳолда ангиографияга нисбатан қулай, тез ва инвазив эмас (кўпгина олимларнинг фикрига кўра, дуплекс ультратовуш текшируви гемодинамик аҳамиятга эга шикастланишларни, 50% дан ортиқ стеноз ва окклюзияларни аниқлаш учун 95% ўзига хослик ва 88% сезувчанлик билан мос келади). Шундай қилиб, асосий гуруҳдаги барча беморларда ультратовуш ташхиси ўтказилди ва қуйидаги натижалар аниқланди: 8 беморда қисман окклюзия (кичик болдир); тизза ости қон томирлари натижаларининг таҳлили - бир беморда тўлиқ окклюзия ва 13 беморда қисман окклюзия аниқланди. Натижада, умумий танланмада қон томир бўшлиғи диаметрининг ўртача 50% дан юқори стенозлари аниқланди, 9 беморда сон артерияси, 10 беморда тизза ости артерияси; 5 беморда қон томир бўшлиғи диаметрининг 90% дан ортиқ стенози ва сон артериялари окклюзияси қайд этилди; 2 та ҳолатда - ОББТ сегменти тромбози; бир беморда сезиларли гемодинамик ички муаммо (интима шикастланиши) қайд этилган.

Тадқиқотнинг кейинги босқичи текширилган беморларнинг клиник-неврологик ва нейровизуализатсион белгиларининг ўзгариши бўлди. Юқорида таъкидланганидек, асосий гуруҳдаги беморда қуйидаги шикоятлар мавжуд эди: иш қобилятининг пасайиши ва аксинча, чарқоқнинг ошиши 50%; хотиранинг пасайиши (хотиранинг пасайиши) 30%; вақти-вақти билан бош айланиши ва бош оғриғи 43%; уйку бузилиши; депрессия. Шикоятлар тез-тез учрайдиган бўлиб қолди (беморларнинг сўзларига кўра, сўнгги олти ой ичида), зўриқишда кучаяди ва дам олишда камаяди. Шундай қилиб, текширилган беморларда сереброденик синдром мавжудлигига хос шикоятлар мавжуд эди. Клиник-неврологик бузилиш белгилари тарқоқ майда ўчоқли характерга, конвергенциянинг бузилишига, бурун-лаб бурмасининг текисланиши ҳисобига юз асимметриясига, 41,7% мушак тонусининг пасайишига эга бўлди (бу сереброденик атеросклероз кўрсаткичи бўлиб, адабиётдаги илмий маълумотларга мос келади). Брахиотсефал томирларнинг УЗТҚДГ текшируви асосий гуруҳдаги беморларда қуйидаги белгиларни аниқлади: умумий уйку артериялари соҳасида "интимедиа" комплекси 28,1% да 1,3 мм, таққослаш гуруҳида 0,8 мм даражада зичлашишни (қалинлашишни) кўрсатди; бундан ташқари, олдинги мия ва ўрта мия артериялари бўйлаб (ўнгда кўпроқ), орқа мия ва умуртка артерияси бўйлаб (чапда кўпроқ) қон оқимининг қизиллигининг пасайиши қайд этилди. МРТ (бош мия) усули билан нейровизуализатсия асосий гуруҳнинг барча беморларида ва назорат гуруҳининг 50 фоизидида ўтказилди, бу ерда асосий гуруҳнинг деярли барча текширилганларида (86%) бош миянинг у ёки бу структураларнинг сереброденик оғишлари қайд этилди, бундан ташқари, ўзгаришларнинг қон томир табиати ёшга боғлиқ ўзгаришларга қараганда кўпроқ қайд этилди. Қон-томир бузилишларининг ўзига хос хусусияти ўчоқлилиги (23% ҳолларда топилган); пўстлоқ ости оқ моддаси соҳасидаги ўзгаришларнинг диффуз-тарқоқ кўрсаткичи (8%) ёки оқ модда соҳасида майда ўчоқли белгилар (11,9%) қайд этилган, 30% ҳолларда лейкоз аниқланган (бу ерда бузилишнинг асосий хусусияти - перивентрикуляр ўзгариш), умумий тузилишда кўп ҳолларда субарахноидал бўшлиқнинг катталашиши ва ён қоринчаларнинг кенгайиши билан бирга бош мия субатрофияси белгилари хос эди.

Шундай қилиб, БОС билан оғриган беморлар мисолида ушбу синдромни тартибга солишчи баъзи механизмлар кўрсатилди, бу ерда ишемик ҳодисалар асосида ётувчи ва уларнинг оғирлигига таъсир қилувчи ҳам периферик, ҳам марказий характердаги йирик ва майда томирлардаги ўзгаришларнинг муҳимлигига урғу берилди. Эндотелий тузилишидаги ўзгаришнинг ўзи сереброваскуляр касалликларнинг пайдо бўлиши ва ривожланишида марказий роль ўйнайди ва сўнгги йилларда кўплаб олимлар эндотелийни унинг ҳажми ва бажарадиган вазифасини ҳисобга олган ҳолда алоҳида орган сифатида кўриб чиқмоқдалар. Кўпгина ишлар периферик қон-томир етишмовчилигининг гематоэнцефалик тўсиқ тизимидаги шикастланишнинг ривожланиши билан

боғлиқлигига, кейинчалик эндотелиал ситоскелетдаги ўзгаришлар ва қон ўтказувчанлик тезлиги ва қон тузилишининг бузилиши мисолида мия қон айланишининг ўткир бузилишларига, вақт ўтиши билан мия тузилмасининг яхлитлигига секин таъсир кўрсатишига бағишланган. Молекуляр даражада иммун ҳужайралар ва улар билан боғлиқ омиларнинг таъсири, организмнинг қон томир тизими яхлитлигини бузиш жараёнига таъсири бўйича фаол илмий тадқиқотлар олиб борилмоқда. Ушбу олинган маълумотлар, БОС патомеханизмини тушуниш билан, мия сурункали бузилишининг шаклланиши ва ривожланишининг параллел ўзгаришлари билан оёқ қон томирлари шикастланишининг сабабларидан бири сифатида, қон томирлар яхлитлигини сақлаш учун терапевтик стратегияларни таъминлаши ва инсультнинг олдини олишнинг муҳим стратегик йўналиши бўлиши керак. Тадқиқот натижаларининг таҳлили, цереброваскуляр касалликлар, ўткир инсульт ва бош мия тузилмаларининг секин шикастланиши учун баъзи хавф омиларининг аҳамияти, ишемик ҳодисаларнинг олдини олиш ва касаллик оқибатларини башорат қилиш имкониятини беради.

Адабиётлар рўйхати:

1. Stephen K. Van Den Eeden, Kathleen B. Albers, Julie E. Davidson, Clea A. Kushida, Amethyst D. Leimpeter, Lorene M. Nelson, Rita Popat, Caroline M. Tanner, Kristen Bibeau, Charles P. Quesenberry Risk of Cardiovascular Disease Associated with a Restless Legs Syndrome Diagnosis in a Retrospective Cohort Study from Kaiser Permanente Northern California // *Sleep*, 2015, № 7 (38), p. 1009–1015
2. Hu X., De Silva T.M., Chen J., Faraci F.M. Cerebral Vascular Disease and Neurovascular Injury in Ischemic Stroke. // *Circulation research*, 2017. 120(3), 449–471.
3. Lamberti, N., López-Soto, P. J., Rodríguez-Borrego, M. A., Straudi, S., Basaglia, N., Zamboni, P., Manfredini, R., Manfredini, F. Restless Leg Syndrome in Peripheral Artery Disease: Prevalence among Patients with Claudication and Benefits from Low-Intensity Exercise. // *Journal of clinical medicine*, 2019. № 8(9), 1403.
4. Smoking and Heart Disease, Stroke, and Peripheral Artery Disease // <https://www.cdc.gov/tobacco/campaign/tips/diseases/heart-disease-stroke.html>
5. Ко С.Ю., Ким М.С., Ли С.М., Хонг Дж.М., Юн Дж.Х. Нарушение функции сосуди-стого эндотелия у пациентов с синдромом беспокойных ног: новый аспект сосудистой патофизиологии. *Дж. Нейрол. наук.* 2015 г.; 359: 207–210.
6. Gao X., Ba D.M., Bagai K., Liu G., Ma C., Walters A.S. Treating Restless Legs Syndrome Was Associated With Low Risk of Cardiovascular Disease: A Cohort Study With 3.4 Years of Follow-Up. // *Journal of the American Heart Association*, 2021. 10(4), e018674.
7. Dzhurabekova Aziza Takhirovna, & Shaymatov Rakhmonberdi Uktamovich. Diagnostics and treatment of chronic cerebral circulatory disorders against the background of diabetes mellitus. // *The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research*, 2023. № 5(05), p. 42–48.
8. Jurabekova Aziza Takhirovna, Shmyrina Ksenia Vladimirovna, & Vyazikova Natalia Fedorovna. A comprehensive approach to the diagnosis of impaired walking in patients with dyscirculatory encephalopathy. // *World Bulletin of Public Health*, (2023). 19, 13-17.
9. Салминен А.В., Римпиля В., Поло О. Периферическая гипоксия при синдроме беспокойных ног (болезнь Виллиса-Экбома) *Неврология.* 2014 г.; 82 : 1856–1861. doi: 10.1212/WNL.0000000000000454
10. Ланца Г., Бахманн К.Г., Гораеб И., Ван Ю., Ферри Р., Паулюс В. Возбудимость центральной и периферической нервной системы при синдроме беспокойных ног. *Сон Мед.* 2017 год; 31 :49–60.
11. Бузунов Р.В., Царева Е.В. СИНДРОМ БЕСПОКОЙНЫХ НОГ // Учебное пособие для врачей, Москва 2011, 32 с.
12. Любимов А.В., Чефранова Ж.Ю. Актуальность синдрома беспокойных ног в повседневной практике невролога. // *Актуальные проблемы медицины*, 2012. 17 (4 (123)), с. 273-279.
13. Ковальчук М.О., Калинин А.Л. Синдром беспокойных ног: патогенез, диагностика, лечение. Обзор литературы. // *Нервно-мышечные болезни*, 2012. (3), с. 8-20.
14. Djurabekova A. T. Abdullayeva N. N., Shmyrina K.V., The effect of restless legs syndrome on cerebral ischemic events. *IJCNP*, Volume 2, Issue 4, 2024.

Иктибос учун: Жўрабекова А.Т., Исмати З.О. Безовта оёқлар синдромининг мия қон айланишининг сурункали бузилиши билан ўзаро боғлиқлигининг клиник-нейрофизиологик кўрсаткичлари // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси.* – 2026. – № 4(24). – Б. 915–920. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19739827>

CHARACTERISTICS OF QUANTITATIVE INDICATORS OF IMMUNOGLOBULINS IN THE BLOOD SERUM OF PREGNANT AND LACTATING WOMEN

Ergashev V.A.¹, Muratov N.F.²

¹Technical College of Public Health named after Abu Ali ibn Sino, Navoi, Uzbekistan

²Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. The aim of this study is to develop a differentiated approach to assessing immune status by comparatively analyzing the quantitative indicators of immunoglobulins in the blood serum of pregnant and lactating women. It was also demonstrated that pathological conditions affect the humoral component of the immune system, and the resulting immune system stress leads to an increase in immunoglobulin synthesis.

Keywords: antigen, autoimmune thyroiditis, reference values, monomers, dimer, pentamer, placenta, complement

ХОМИЛАДОР ВА ЭМИЗИКЛИ АЁЛЛАРНИНГ ҚОН ЗАРДОБИДАГИ ИММУНОГЛОБУЛИНЛАРНИНГ МИҚДОРИЙ КЎРСАТКИЧЛАРИНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ

Эргашев В.А.¹, Муратов Н.Ф.²

¹Абу Али ибн Сино номидаги Жамоат саломатлиги техникуми, Навоий ш., Ўзбекистон

²Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Ушбу тадқиқотнинг мақсади ҳомиладор ва эмизикли аёлларнинг қон зардобидagi иммуноглобулинларнинг миқдорий кўрсаткичларини таққослаш орқали иммунитет ҳолатини баҳолашга дифференциал ёндашувни ишлаб чиқишдир. Шунингдек, патологик шароитлар иммунитет тизимининг гуморал компонентиға таъсир қилиши ва натижада иммунитет тизимининг стресси иммуноглобулинлар синтезининг ошишиға олиб келиши кўрсатилган.

Калим сўзлар: антиген, аутоиммун тироидит, мос ёзувлар қийматлари, мономерлар, димер, пентамер, плацента, комплемент.

ОСОБЕННОСТИ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИММУНОГЛОБУЛИНОВ В СЫВОРОТКЕ КРОВИ БЕРЕМЕННЫХ И КОРМЯЩИХ ЖЕНЩИН

Эргашев В.А.¹, Муратов Н.Ф.²

¹Технический колледж общественного здравоохранения имени Абу Али ибн Сино, г. Навои, Узбекистан

²Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Целью данного исследования является разработка дифференцированного подхода к оценке иммунного статуса путем сравнительного анализа количественных показателей иммуноглобулинов в сыворотке крови беременных и кормящих женщин. Также было показано, что патологические состояния влияют на гуморальный компонент иммунной системы, а возникающий в результате стресс иммунной системы приводит к увеличению синтеза иммуноглобулинов.

Ключевые слова: антиген, аутоиммунный тиреоидит, референсные значения, момеры, димер, пентамер, плацента, комплемент.

e-mail: Valialimovich777@gmail.com

Relevance of the Problem. Protecting the health of women of reproductive age during pregnancy and the postpartum lactation period is one of the most important tasks of any national healthcare system. In this regard, special attention is being paid to scientific research aimed at predicting, preventing, and early diagnosis of pathological conditions that may arise during these periods.

During normal pregnancy, physiological, hormonal, and immunological adaptations highlight the complexity of understanding how susceptibility to infections and related complications is influenced. Key adaptations at the maternal–fetal interface represent essential processes [4, 6]. Maternal antibodies are a major component of immunity that provide immediate protection to the newborn after birth [1].

Non-cytotoxic maternal antibodies directed against paternal antigens have been identified in most women experiencing normal pregnancies during the first trimester, whereas they were absent in the majority

of women who experienced miscarriage. This suggests that these antibodies may play a crucial role in successful pregnancy outcomes.

It has been established that the maternal immune system contributes to the development of passive immunity in the fetus by providing protective factors against infectious diseases. In addition, maternal immunoglobulins are recognized to have the ability to stimulate fetal growth [2, 5, 7].

According to studies by Nuraliev N.A. and Mustafaeva F.A. [3], a decrease in cellular and humoral immunity, along with multidirectional changes in pro- and anti-inflammatory cytokines, was observed in acute and chronic inflammatory diseases of the pelvic organs, indicating the development of secondary immunodeficiency.

Although a number of scientific studies have been conducted on this issue, no differentiated approaches have been developed to assess immune status through a comparative analysis of quantitative indicators of immunoglobulins in the blood serum of healthy pregnant and lactating women living in rural areas. Furthermore, immune-related diseases within the “pregnant–postpartum–lactating woman” system have not been comparatively studied, and diagnostic as well as prognostic criteria adapted to specific geographical living conditions have not been developed. This necessitates further research on this topic.

Discussion of Research Results. It is well known that immunoglobulins are specific proteins (γ -globulins) synthesized by the immune system in response to antigen entry into the body, and they possess several distinctive characteristics. Currently, five classes of immunoglobulins are identified, four of which have significant pathogenetic importance: IgM, IgA, IgG, and IgE.

During the course of this dissertation research, it was considered necessary to study and analyze the quantitative indicators of these immunoglobulins in pregnant and lactating women. Before interpreting the obtained data, a brief characterization of these immunoglobulins was provided.

IgM is a pentameric immunoglobulin and is phylogenetically the earliest to be formed. It has a molecular weight of approximately 900 kDa. Its highest concentration in the blood is observed 4–5 days after antigen entry into the body, after which it gradually decreases, remaining in the body for up to 5 days.

IgG is a monomer with a molecular weight of about 150 kDa and constitutes approximately 75% of total immunoglobulins in the body. It begins to be synthesized 5–6 days after primary antigen stimulation and has the longest persistence in the body—up to 23 days. In the case of a secondary immune response, its synthesis starts from the first day.

IgA exists in both serum and secretory forms. In serum, it is present as a monomer, while in secretory form it exists as a dimer. The serum form accounts for about 15% of all immunoglobulins.

IgE is a monomer with a molecular weight of approximately 190 kDa and has a short half-life of about 2–3 days. It differs from other immunoglobulins by the larger size of its heavy (H) chains and the absence of a hinge region. It is considered a marker of various allergic processes (Table 1).

Table 1

Comparative Characteristics of Serum Immunoglobulins (according to Nuraliev N.A. et al., 2010)

Ig	Molecular Weight (kDa)	Configuration	Placental Transfer	Complement Binding	Normal Level (Serum)
IgM	900	Pentamer	-	+	1,0 g/L
IgG	150	Monomer	+	+	12-20 g/L
IgA	160	Monomer	-	+	2,4 g/L
sIgA	380-385	Dimer	-	-	Variable
IgE	190	Monomer	-	-	0,0003 g/L
IgD	184	Monomer	-	-	0,003 g/L

Further Analysis of Research Results. Given the important role of immunoglobulins in clinical immunology, their levels were studied in pregnant and lactating women. A total of 92 pregnant women were examined, and the quantitative levels of different classes of immunoglobulins in their blood serum were analyzed. After delivery, these studies were repeated in the same women during the lactation period.

The participants were divided into three groups: healthy women ($n = 20$), women with autoimmune thyroiditis ($n = 36$), and women with grade I–II anemia ($n = 36$). For more adequate interpretation, patients with pathological conditions were combined into a general group and compared with the indicators of healthy women.

The obtained results showed (Table 2) that the level of IgA in healthy women was 1.76 ± 0.77 g/L, while in the general group it was 1.70 ± 0.08 g/L. As can be seen, no statistically significant difference was observed between the compared groups ($p > 0.05$).

Table 2

Quantitative Indicators of Major Immunoglobulins in the Blood Serum of Pregnant Women

Indicators	IgA, g/L	IgG, g/L	IgM, g/L	IgE, IU/mL
Reference values	1,0-2,0	12-20	2,4	3
Healthy pregnant women (n=20)	1,76±0,07	20,35±0,18	2,10±0,08	138,82±0,89
General group n=72	1,70±0,08↔	19,85±0,26↔	2,48±0,14*↑	162,65±0,68*↑

Note:— statistically significant difference compared to healthy pregnant women, ↑ — direction of change (increase), ↔ — no statistically significant difference.

Interpretation of Results. However, when these indicators in pregnant women were compared with the reference values of healthy non-pregnant individuals (average 1.0 g/L), a noticeable increase was observed. The elevated serum concentration of IgA in pregnant women compared to reference parameters can be explained by the specific characteristics of the immune system during pregnancy. The similarity between the values in healthy and pathological groups indicates that diseases do not significantly affect IgA quantitative levels.

A similar trend was observed for IgG. The values in healthy pregnant women and in the general group were 20.35 ± 0.18 g/L and 19.85 ± 0.26 g/L, respectively ($p > 0.05$). Although no statistically significant difference was found between the groups, both values were slightly higher than the reference range (12–20 g/L).

In contrast to the previously analyzed immunoglobulins, IgM showed a statistically significant increase in the general group compared to healthy pregnant women: 2.48 ± 0.14 g/L versus 2.10 ± 0.08 g/L ($p < 0.05$). A similar pattern was observed for IgE: 162.65 ± 0.58 IU/mL versus 138.82 ± 0.89 IU/mL ($p < 0.05$).

The difference between the groups showed that IgM levels increased by 1.18 times, while IgE levels increased by 1.17 times in the general group compared to healthy pregnant women ($p < 0.05$).

In our opinion, the increased tendency of IgM and IgE in pregnant women compared to those with autoimmune thyroiditis and various degrees of anemia (general group) can be explained by antigenic stimulation of the organism. Pathological conditions influence the humoral component of the immune system, and the resulting immune stress leads to increased synthesis of immunoglobulins. Analysis of the functions of these immunoglobulins suggests an enhancement of the primary immune response and an increase in allergic background.

Thus, the study of major immunoglobulin levels in the blood serum of both healthy pregnant women and those with various pathological conditions showed that there were no statistically significant differences in IgA and IgG levels between the compared groups ($p > 0.05$). The numerical values were very close, although slightly elevated compared to reference values. This increase is not considered a sign of pathology but rather a physiological imbalance associated with pregnancy.

Although statistically significant differences were observed between the groups for IgM and IgE (increases of 1.18 and 1.17 times, respectively), the values remained relatively close. These changes are also interpreted as physiological adaptations associated with pregnancy rather than pathological deviations.

Conclusions:

1. It was established that the quantitative indicators of immunoglobulins of different classes in the blood serum of both healthy pregnant women and women in the general group were slightly higher than the reference values (12–20 g/L).

2. IgA levels in the general group were lower compared to healthy pregnant women, they remained relatively elevated compared to reference values. This is explained by the specific features of the immune system during pregnancy. The similarity of indicators between healthy and pathological groups suggests that diseases do not significantly affect IgA levels.

3. Observations on IgM and IgE Levels. The quantitative indicators of IgM and IgE in healthy pregnant women showed an increasing trend compared to women with autoimmune thyroiditis and various degrees of anemia (general group). This suggests that antigenic stimulation of the organism, the influence of pathological conditions on the humoral branch of the immune system, and immune system stress lead to increased synthesis of immunoglobulins.

References:

1. Dobrokhotova Yu.E., Bakhareva I.V. Iron-deficiency anemia: prevention and treatment during pregnancy // *Lechebnoe Delo*. – 2016. – No. 3. – P. 4–13.
2. Kalandarova A.N., Zhiemuratova G.K., Kadyrova A.M. Immunological aspects of COVID-19 in women of reproductive age // *South Kazakhstan Medical Academy, Bulletin*. – No. 2(96). – 2022. – P. 144–147.
3. Nuraliev N.A., Mustafaeva F.A. Assessment of immune status and effectiveness of immunocorrection in inflammatory diseases of the pelvic organs in women // *Doctor's Bulletin*. – No. 3.1 (96). – 2020. – P. 140–147.
4. Khalimova F.T., Shukurov F.A., Nurmatov A.A. Assessment and prediction of reproductive health in women of fertile age // *Bulletin of the Academy of Medical Sciences of Tajikistan*. – 2019. – Vol. IX, No. 2. – P. 199–208.
5. Abu-Raya E., Michalski C., Sadarangani M., Lavoie P.M. Maternal immunological adaptation during normal pregnancy // *Frontiers in Immunology*. – 2020. – No. 11. – P. 1–18.
6. Baturin V.A., Boshyan R.O. The immune status of outpatient women of reproductive age with pelvic inflammatory disease // *Medical News of North Caucasus*. – 2018. – No. 13(3). – P. 493–496.
7. Musakhodjayeva D.A., Karimov R.K., Rasulova S.Kh. Immunological indicators of complications of surgical bowel disease in children // *Medical Immunology (Russia)*. – 2023. – No. 25(4). – P. 907–912.

For citation: Ergashev V.A., Muratov N.F. Characteristics of quantitative indicators of immunoglobulins in the blood serum of pregnant and lactating women // *Bulletin of Fundamental and Clinic Medicine*. – 2026. – № 4(24). – P. 921–924. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19740012>

ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У БОЛЬНЫХ ТЕНИАРИНХОЗОМ

Орзикулов А.О.¹, Ибрахимова Х.Р.²

¹Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

²Ургенчский государственный медицинский институт, г.Ургенч, Узбекистан

Резюме. У взрослых, больных тениаринхозом, из 5 изученных показателей в 2 (40,0%) достоверных изменений не выявлено ($P>0,05$), тогда как по трём (60,0%) показатели достоверно отличались от контрольной группы. В частности, уровни IgM были выше в 1,38 раза ($P<0,05$), IgG — в 1,71 раза ($P<0,001$), IgE — в 4,72 раза ($P<0,001$). У детей сохранялась аналогичная тенденция, однако было выявлено достоверное снижение уровня IgA (до $1,23\pm 0,16$ г/л) и статистически значимое повышение компонента комплемента C3 (до $38,15\pm 0,75$ мг/мл) по сравнению с контрольной группой ($P<0,05$).

Ключевые слова: гельминты, аллергический фон, дети, тениаринхоз, иммунный статус.

AGE-RELATED CHANGES IN IMMUNOLOGICAL PARAMETERS IN PATIENTS WITH TAENIASIS

Orzukulov A.O.¹, Ibrakhimova H.R.²

¹Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

²Urgench State Medical Institute, Urgench, Uzbekistan

Resume. In adults with teniarynchosis, 2 out of 5 parameters studied (40.0%) did not show significant changes ($P>0.05$), and in the remaining three (60.0%) the changes were reliably different from the control group, including serum IgM. It was shown that 1.38 times ($P<0.05$), IgG 1.71 times ($P<0.001$), IgE 4.72 times ($P<0.001$) were found in higher concentration. The same trend was maintained in children's indicators, only IgA was higher than the control. It was found to be significantly lower (up to 1.23 ± 0.16 g/l) and a statistically different amount of complement C3 component (up to 38.15 ± 0.75 mg/ml) compared to the group ($P<0.05$).

Keywords: helminths, allergic background, children, teniarynchosis, immune status.

ТЕНИАРИНХОЗ БИЛАН КАСАЛЛАНГАН БЕМОРЛАРДА ИММУНОЛОГИК КЎРСАТКИЧЛАРНИНГ ЁШГА БОҒЛИҚ ЎЗГАРИШЛАРИ

Орзикулов А.О.¹, Ибрахимова Х.Р.²

¹Самарканд давлат тиббиёт университети, Самарканд ш., Ўзбекистон

²Урганч давлат тиббиёт институти, Урганч ш., Ўзбекистон

Резюме. Тениаринхоз билан касалланган катта ёшли беморларда ўрганилган 5 та кўрсаткичдан 2 тасида (40,0%) ишонarli ўзгаришлар аниқланмади ($p>0,05$), қолган уч тасида (60,0%) эса назорат гуруҳига нисбатан ишонarli фарқлар кузатилди. Хусусан, қон зардобиди IgM 1,38 марта ($p<0,05$), IgG 1,71 марта ($p<0,001$) ва IgE 4,72 марта ($p<0,001$) юқори консентрацияда аниқланди. Болалар кўрсаткичларида ҳам худди шундай тенденция сақланиб қолди, фақат IgA назорат гуруҳига нисбатан ишонarli даражада паст ($1,23\pm 0,16$ г/л гача) экани ва комплемент C3 компонентининг миқдори статистик жиҳатдан ишонarli даражада юқори ($38,15\pm 0,75$ мг/мл гача) экани аниқланди ($p<0,05$).

Калим сўзлар: гельминтлар, аллергия фон, болалар, тениаринхоз, иммун статус.

Актуальность. Одним из факторов, определяющих состояние здоровья населения, являются заболевания, связанные с социальными аспектами, в частности протозоозы и гельминтозы, которые составляют 99% всех паразитарных заболеваний. В научной литературе признано, что гельминты (глисты), паразитирующие за счёт органов и тканей человека и животных, а вызываемые ими заболевания называются гельминтозами. Источником инфекции являются больные люди и животные, заражённые гельминтами.

Паразитизм (от греч. *parasitos* — нахлебник, сожитель) — это одна из форм взаимоотношений между организмами разных видов, при которой один из них (паразит) использует другой (хозяина) как среду обитания и источник питания, нанося ему вред. Паразиты встречаются среди одноклеточ-

ных (саркомустигофоры, споровики, кнidosпоридии, микроспоридии и инфузории) и многоклеточных животных (плоские черви, скребни, круглые черви и членистоногие) [1; 2; 3]

В настоящее время известно около 50 тысяч видов организмов, ведущих паразитарный образ жизни, из них более 342 видов гельминтов и более 18 видов простейших вызывают паразитарные заболевания у человека. Общее число инфицированных составляет около 2 млрд человек, при этом более 80% приходится на детей.

Школьники и дети дошкольного возраста составляют 90–95% больных энтеробиозом и 65,1% больных аскаридозом. В настоящее время наиболее распространёнными паразитарными заболеваниями являются энтеробиоз (725,83 случая на 100 тыс. населения), аскаридоз (158,03 на 100 тыс.) и трихоцефалёз (35,44 на 100 тыс.).[4;5;6].

Рост гельминтозов в разных странах мира связан с загрязнением окружающей среды яйцами гельминтов в результате сточных вод, миграцией населения, увеличением контактов человека с животными, низким социально-экономическим уровнем жизни и ослаблением иммунной системы населения.

Дети являются наиболее уязвимой группой населения к паразитам, что связано как с низким уровнем соблюдения санитарно-гигиенических норм, так и с замедлением роста и развития при паразитарных инвазиях.

В детском возрасте инвазии часто сопровождаются хроническими нарушениями питания, желудочно-кишечной дисфункцией, интоксикацией, сенсibilизацией организма и ослаблением иммунной системы. Личинки гельминтов могут мигрировать и поражать висцеральные оболочки, головной мозг, глаза, лёгкие и нервную систему. У 5–7% личинки мигрируют в мозг, а личинки более чем 30 видов паразитов поражают лёгочную ткань.[7; 8].

Цель исследования: определение иммунного статуса у больных с тениаринхозом.

Материалы и методы. Иммунный статус был изучен у 55 взрослых и детей с паразитарными заболеваниями, проживающих в Бухарской и Хорезмской областях. Для достижения цели использовали метод иммуноферментного анализа (ИФА). Принцип ИФА основан на специфическом взаимодействии антител с антигенами, предварительно иммобилизованными на твёрдой фазе (в лунках полистирольного планшета). Образование комплекса «антиген–антитело» выявляли с помощью фермент-субстратной реакции, сопровождающейся изменением окраски субстрата, которую измеряли по оптической плотности. Использовались реагенты «БЕСТ» (РФ).

Результаты и обсуждение. Из пяти изученных показателей в двух (40,0%) достоверных изменений не выявлено ($P>0,05$), в трёх (60,0%) показатели значительно отличались от контроля: концентрация IgM была выше в 1,38 раза ($P<0,05$), IgG — в 1,71 раза ($P<0,001$), IgE — в 4,72 раза ($P<0,001$).

Таблица 1

Сравнительный анализ основных показателей иммунного статуса у взрослых с аллергическим фоном и тениаринхозом ($M\pm m$)

Показатели	Контроль, n=15	Взрослые, n=12
IgA, г/л	1,65±0,07	1,58±0,18 ↔
IgM, г/л	0,85±0,04	1,17±0,11* ↑
IgG, г/л	9,11±0,37	15,57±0,52* ↑
IgE, мг/мл	35,00±1,40	165,20±0,74* ↑
C3, мг/мл	34,60±1,20	34,92±0,86 ↔

Примечание: * — достоверное отличие от контроля; ↑ — направление изменений; ↔ — различия недостоверны.

У детей сохранялась аналогичная тенденция, однако отмечалось достоверное снижение IgA по сравнению с контрольной группой (до 1,23±0,16 г/л) и статистически значимое повышение компонента комплемента C3 (до 38,15±0,75 мг/мл) ($P<0,05$) — таблица 2. При этом у взрослых данные показатели существенно не различались.

Установлено, что показатели В-звена иммунитета у больных тениаринхозом были повышены по сравнению с контролем во всех возрастных группах, при этом особенно выраженное увеличение наблюдалось по IgG и IgE. У взрослых аллергический фон был более выражен по сравнению с детьми.

Таблица 2

Сравнительный анализ основных показателей иммунного статуса у детей с аллергическим фоном и тениаринхозом ($M \pm m$)

Показатели	Контроль, n=15	Дети, n=13
IgA, г/л	1,65±0,07	1,23±0,16* ↓
IgM, г/л	0,85±0,04	0,89±0,10 ↔
IgG, г/л	9,11±0,37	14,75±0,66* ↑
IgE, мг/мл	35,00±1,40	143,90±0,87* ↑
C3, мг/мл	34,60±1,20	38,15±0,75* ↑

Примечание: * — достоверные различия по сравнению с контролем; ↑, ↓ — направление изменений; ↔ — недостоверные различия.

Закключение. Таким образом, исследование концентраций иммуноглобулинов в сыворотке крови у взрослых, больных тениаринхозом, показало, что из пяти показателей в двух (40,0%) достоверных изменений не выявлено ($P > 0,05$), а в трёх (60,0%) отмечены значимые отклонения от контроля: уровень IgM был выше в 1,38 раза ($P < 0,05$), IgG — в 1,71 раза ($P < 0,001$), IgE — в 4,72 раза ($P < 0,001$). У детей сохранялась та же тенденция, однако отмечалось достоверное снижение IgA (до 1,23±0,16 г/л) и статистически значимое повышение компонента комплемента C3 (до 38,15±0,75 мг/мл) по сравнению с контрольной группой ($P < 0,05$).

Список литературы:

1. Авдюхина Т.И. Современный взгляд на проблему гельминтозов у детей и эффективные пути ее решения // Лечащий врач. - 2004. - №1. - С.14-18.
2. Ибрахимова, Х. Р., & Облокулов, А. Р. (2019). Современный взгляд на распространенность и патогенетические аспекты паразитарных заболеваний у детей. Новый день в медицине, 1(25), 30-34.
3. Ibrakhimova, H. R. (2023). The prevalence of parasites in the child population with the development of functional pathology of organs. Finland International Scientific Journal of Education, Social Science & Humanities, 11(4), 1-5.
4. Ibrakhimova H.R., & Oblokulov A.R., (2020). Pathogenetic Bases And Prevalence Of Parasitic Infections In Children: Literature Review. The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research, 2(10), 87–95.
5. Zhuraev Sh. A., Rustamova Sh. A., Orzikulov A. O. Clinical and epidemiological features of the course of mumps infection in adults (on the example of the Samarkand region) // Issues of science and education. – 2020. – No. 22 (106). – pp. 54-64. (in Russ).
6. Orzikulov A. O., Rustamova Sh. A., Karamatullaeva Z. E. Analysis of the clinical course of viral hepatitis A in recent years-Problems of Biology and Medicine, 2018, 3, 1 (103) 127-128. b.
6. CDC DVH–Viral Hepatitis–Resource Center–MMWR Publications //Problems in biology and medicine. - 2018. - T. 3. – no. 1. – S. 103. (in Uzb)
7. Orzikulov A., Yarmukhamedova M., Uzakova G. Clinical and laboratory course of viral hepatitis A // Journal of Problems of Biology and Medicine. – 2014. – No. 3 (79). – pp. 137-138. (in Russ).
8. Orzikulov A. O., Rustamova Sh. A., Zhuraev Sh. A. Clinical and laboratory features of the course of erysipelas at the present stage // Achievements of science and education. – 2020. – No. 9 (63). – pp. 72-76. (in Russ).

Для цитирования: Орзикулов А.О., Ибрахимова Х.Р. Возрастные изменения иммунологических показателей у больных тениаринхозом // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 4(24). – С. 925–927. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19740262>

ВЛИЯНИЕ ДЕГИДРАТАЦИИ НА ПОКАЗАТЕЛИ СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА ПРИ ПАРАЦЕТАМОЛ-ИНДУЦИРОВАННОМ ТОКСИЧЕСКОМ ГЕПАТИТЕ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ
Сафарова С.Р.¹, Яриев А.А.²

¹Термезский филиал Ташкентского государственного медицинского университета,
г. Ташкент, Узбекистан

²Сырдарьинский филиал Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи,
г. Сырдарья, Узбекистан

Резюме. В экспериментальном исследовании изучено влияние дегидратации на показатели системы гемостаза при парацетамол-индуцированном токсическом гепатите у лабораторных крыс. Установлено, что введение парацетамола сопровождается изменениями коагуляционных параметров, в частности укорочением тромбинового времени. Дегидратация приводила к изменению показателей протромбинового времени и АЧТВ. Наиболее выраженные нарушения выявлены при сочетании парацетамола и дегидратации, где отмечалось значительное повышение уровня фибриногена. Полученные результаты свидетельствуют о влиянии водного дефицита на развитие нарушений гемостаза при токсическом поражении печени.

Ключевые слова: токсический гепатит, парацетамол, дегидратация, система гемостаза, коагуляция, фибриноген, экспериментальное исследование.

EFFECT OF DEHYDRATION ON HEMOSTASIS PARAMETERS IN PARACETAMOL-INDUCED TOXIC HEPATITIS: AN EXPERIMENTAL STUDY

Safarova S.R.¹, Yariyev A.A.²

¹Termez Branch of Tashkent State Medical University, Tashkent, Uzbekistan

²Syrdarya Branch of the Republican Scientific Center for Emergency Medical Care, Syrdarya, Uzbekistan

Resume. The experimental study investigated the effect of dehydration on hemostasis parameters in laboratory rats with paracetamol-induced toxic hepatitis. It was found that administration of paracetamol was accompanied by changes in coagulation parameters, particularly a shortening of thrombin time. Dehydration led to alterations in prothrombin time and activated partial thromboplastin time (aPTT). The most pronounced disturbances were observed when paracetamol administration was combined with dehydration, where a significant increase in fibrinogen levels was detected. The obtained results indicate that water deficiency contributes to the development of hemostatic disorders in toxic liver injury.

Keywords: toxic hepatitis, paracetamol, dehydration, hemostasis system, coagulation, fibrinogen, experimental study.

ТАЖРИБАВИЙ ПАРАЦЕТАМОЛ-ИНДУЦИРЛАНГАН ТОКСИК ГЕПАТИТДА ГЕМОСТАЗ ТИЗИМИ КЎРСАТКИЧЛАРИГА ДЕГИДРАТАЦИЯ ТАСИРИ

Сафарова С.Р.¹, Яриев А.А.²

¹Тошкент давлат тиббиёт университети Термиз филиали, Термиз ш., Ўзбекистон

²Республика шошилич тиббий ёрдам илмий маркази Сырдарё филиали, Сырдарё ш., Ўзбекистон

Резюме. Экспериментал тадқиқотда лаборатория каламушларида парацетамол билан индуцирланган токсик гепатит шароитида дегидратациянинг гемостаз тизими кўрсаткичларига таъсири ўрганилди. Аниқланишича, парацетамол юборилиши коагуляция параметрларининг ўзгариши, хусусан тромбин вақтининг қисқариши билан кечади. Дегидратация протромбин вақти ва АЧТВ кўрсаткичларининг ўзгаришига олиб келди. Энг яққол ўзгаришлар парацетамол ва дегидратация биргаликда қўлланилганда кузатилди, бунда фибриноген миқдорининг сезиларли ошиши қайд этилди. Олинган натижалар сув танқислиги жигарнинг токсик шикастланишида гемостаз бузилишлари ривожланишига таъсир қилишини кўрсатади.

Калит сўзлар: токсик гепатит, парацетамол, дегидратация, гемостаз тизими, коагуляция, фибриноген, экспериментал тадқиқот.

Актуальность. Токсическое поражение печени, индуцированное лекарственными средствами, остаётся одной из наиболее актуальных проблем современной гепатологии. Среди различных лекарственных препаратов особое место занимает парацетамол, который широко применяется во всём ми-

ре как эффективное анальгетическое и жаропонижающее средство. Несмотря на относительную безопасность при использовании в терапевтических дозах, превышение рекомендуемой дозировки или длительное применение препарата может приводить к развитию выраженного токсического поражения печени. По данным современных исследований, парацетамол-индуцированное повреждение печени является одной из наиболее частых причин острой печёночной недостаточности в ряде стран мира, что определяет высокую медико-социальную значимость данной проблемы [8].

Основным механизмом развития гепатотоксичности парацетамола считается образование реактивного метаболита N-ацетил-п-бензохинонимина (NAPQI), который образуется в системе цитохрома P450. В нормальных условиях этот метаболит быстро нейтрализуется глутатионом, однако при передозировке препарата происходит истощение запасов антиоксидантной системы, что приводит к накоплению токсического метаболита и развитию некроза гепатоцитов [7]. Данный процесс сопровождается выраженным оксидативным стрессом, митохондриальной дисфункцией, активацией воспалительных медиаторов и нарушением клеточного метаболизма [6].

В последние годы особое внимание исследователей уделяется изучению молекулярных механизмов развития парацетамол-индуцированного гепатита, включая роль воспалительных цитокинов, оксидативного стресса и нарушений внутриклеточных сигнальных путей. Более глубокое понимание патогенеза данного патологического процесса имеет важное значение для разработки новых подходов к профилактике и лечению лекарственно-индуцированных поражений печени [4]. Таким образом, дальнейшее изучение механизмов развития парацетамол-индуцированного токсического гепатита остаётся актуальной задачей современной экспериментальной и клинической медицины.

Цель исследования: изучить изменения коагуляционного гемостаза при парацетамол-индуцированном токсическом гепатите в условиях дегидратации.

Материалы и методы исследования. Исследование проводили на лабораторных белых крысах массой 250–290 г, содержащихся в стандартных условиях вивария: в металлических клетках при температуре 23 ± 1 °C, относительной влажности воздуха 30 - 70% и режиме освещения 12/12 ч (свет/темнота), со свободным доступом к стандартному лабораторному корму по требованиям GLP [1,2]. Животные были рандомизированы по 6 особей в каждую экспериментальную группу.

Модель парацетамол-индуцированного токсического гепатита воспроизводили путем внутрибрюшинного введения парацетамола в возрастающих дозах 200; 300 и 600 мг/кг массы тела в течение 3 последовательных суток [5]. Контрольной группе вводили эквивалентный объём растворителя по аналогичной схеме. Дегидратацию в соответствующих группах начинали с 1-го дня эксперимента и продолжали в течение 3 суток, что позволяло оценить влияние водного дефицита на выраженность токсического повреждения печени. Экспериментальные животные были распределены на следующие группы:

1. **Интakтная группа** — животные содержались в стандартных условиях без введения парацетамола и моделирования дегидратации;
2. **Группа дегидратации (контрольная - 1)** — животные подвергались дегидратации без введения парацетамола;
3. **Группа парацетамола (ПЦМ – контрольная - 2)** — животным вводили парацетамол в указанных дозах без ограничения водного режима;
4. **Группа парацетамола на фоне дегидратации (опытная)** — животным вводили парацетамол в сочетании с моделированием дегидратации.

Сразу после последнего введения парацетамола, животных всех экспериментальных групп помещали в метаболические камеры на 24 часа для сбора суточной мочи. По завершении данного периода, на 4-й день эксперимента, у животных проводили общий анализ мочи, после чего осуществляли забор крови для последующего лабораторного исследования.

Коагулометрические исследования проводили на плазме крови, стабилизированной цитратом натрия, полученной путем центрифугирования образцов при 1500 об/мин в течение 15 минут. Анализ показателей системы гемостаза осуществляли с использованием коагулометра HumaClot Junior (Германия). Определяли следующие параметры: протромбиновое время (PT), протромбиновый индекс (PI, %), международное нормализованное отношение (INR), тромбиновое время (TT), уровень фибриногена (FIB) и активированное частичное тромбопластиновое время (aPTT).

Статистическую обработку результатов проводили методом дисперсионного анализа ANOVA при уровне значимости $p=0,05$ с помощью программы GraphPad Prism версии 8.0.0 для Windows (GraphPad Software, Сан-Диего, Калифорния, США, www.graphpad.com) [9].

Результаты исследования: Результаты исследования показателей системы гемостаза у экспериментальных крыс выявили зависимость коагуляционных параметров от водного режима и введения парацетамола (Таблица 1 и Рис. 1-2).

Таблица 1

Результаты изучения показателей системы гемостаза (коагулограммы) при токсическом гепатите, индуцированном парацетамолом в условиях дегидратации у крыс ($M \pm SD$; $p=0,05$; $n=5$)

Показатели	Контроль	Дегидратация	ПЦМ	ПЦМ + дегидратация
ПТ (PT), сек	24,06 $\pm$ 1,08	26,02 $\pm$ 7,08	23,1 $\pm$ 2,46	24,40 $\pm$ 1,95
ПТИ (ISI),%	35,2 $\pm$ 1,92	34,00 $\pm$ 8,28	37,4 $\pm$ 5,03	34,80 $\pm$ 3,27
МНО (INR)	1,86 $\pm$ 0,09	2,02 $\pm$ 0,59	1,78 $\pm$ 0,2	1,88 $\pm$ 0,16
ТТ (TT), сек	71,92 $\pm$ 19,44	45,25* $\pm$ 9,39	31,0*** $\pm$ 6,57	35,42*** $\pm$ 6,71
Фибриноген (FIB), мг/дл	221,2 $\pm$ 43,1	337,40 $\pm$ 166,15	236,6 $\pm$ 40,87	632,6* $\pm$ 308,26
АЧТВ (aPTT), сек	26,28 $\pm$ 3,87	32,72 $\pm$ 7,81	30,04 $\pm$ 2,39	36,6 $\pm$ 10,73

* — различия статистически значимы по сравнению с контрольной группой ($p \leq 0,05$). *** — различия статистически значимы по сравнению с контрольной группой ($p \leq 0,001$).




Рисунок 1. Тромбиновое время (ТТ), сек, у экспериментальных крыс при токсическом гепатите, индуцированном парацетамолом в условиях дегидратации ($M \pm SD$; $n=5$). * — $p < 0,05$; * — $p < 0,001$ по сравнению с контрольной группой.**

Протромбиновое время (ПТ) в контрольной группе составляло 24,06 $\pm$ 1,08 с, тогда как при дегидратации данный показатель увеличивался до 26,02 $\pm$ 7,08 с. В группе парацетамола ПТ составляло 23,1 $\pm$ 2,46 с, а при сочетании ПЦМ с дегидратацией — 24,40 $\pm$ 1,95 с, что свидетельствует об отсутствии выраженных сдвигов данного показателя. Показатели протромбинового индекса (ПТИ) колебались в пределах 35,2 $\pm$ 1,92% в контроле и 34,00 $\pm$ 8,28% при дегидратации. В группе ПЦМ значения ПТИ составляли 37,4 $\pm$ 5,03%, а при сочетании с дегидратацией — 34,80 $\pm$ 3,27%. Международное нормализованное отношение (МНО) было несколько выше в группе дегидратации (2,02 $\pm$ 0,59) по сравнению с контролем (1,86 $\pm$ 0,09), тогда как в группах ПЦМ и ПЦМ + дегидратация значения составляли 1,78 $\pm$ 0,20 и 1,88 $\pm$ 0,16 соответственно. Анализ тромбинового времени (ТТ) показал его максимальные значения в контрольной группе (71,92 $\pm$ 19,44 с). При дегидратации ТТ снижалось до 45,25 $\pm$ 9,39 с, в

группе ПЦМ — до $31,0 \pm 6,57$ с, а при сочетании ПЦМ с дегидратацией — до $35,42 \pm 6,71$ с, что указывает на укорочение данного показателя в условиях воздействия парацетамола. Изменения уровня фибриногена носили выраженный характер. В контрольной группе его концентрация составляла $221,2 \pm 43,1$ мг/дл, при дегидратации увеличивалась до $337,40 \pm 166,15$ мг/дл. В группе ПЦМ показатель составлял $236,6 \pm 40,87$ мг/дл, тогда как при сочетании ПЦМ с дегидратацией отмечалось значительное повышение до $632,6 \pm 308,26$ мг/дл.




Рисунок 2. Уровень фибриногена (FIB), мг/дл, у экспериментальных крыс при токсическом гепатите, индуцированном парацетамолом в условиях дегидратации ($M \pm SD$; $n=5$). *— $p < 0,05$ по сравнению с контрольной группой.

Показатели активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ) в контрольной группе составляли $26,28 \pm 3,87$ с. При дегидратации АЧТВ увеличивалось до $32,72 \pm 7,81$ с, в группе ПЦМ составляло $30,04 \pm 2,39$ с, а при сочетании ПЦМ с дегидратацией — $36,6 \pm 10,73$ с.

В целом полученные данные свидетельствуют о влиянии дегидратации и парацетамола на систему гемостаза, наиболее выраженном при их сочетании, что проявляется изменениями тромбинового времени, уровня фибриногена.

Заключение. Проведённое экспериментальное исследование позволило установить особенности изменений системы гемостаза при парацетамол-индуцированном токсическом поражении печени в условиях дегидратации. Полученные данные свидетельствуют о том, что воздействие парацетамола и дефицита водного режима оказывает выраженное влияние на коагуляционный потенциал крови экспериментальных животных.

Анализ показателей коагулограммы показал, что наиболее чувствительными параметрами системы гемостаза оказались тромбиновое время и уровень фибриногена. Установлено, что при воздействии парацетамола наблюдается укорочение тромбинового времени, что может отражать изменение процессов превращения фибриногена в фибрин и активацию коагуляционного каскада. При моделировании дегидратации отмечалась тенденция к увеличению протромбинового времени и активированного частичного тромбопластинового времени, что указывает на изменение отдельных звеньев плазменного гемостаза.

Наиболее выраженные изменения регистрировались в группе животных с парацетамол-индуцированным токсическим гепатитом на фоне дегидратации. В данной группе выявлено значительное повышение уровня фибриногена, а также увеличение показателей АЧТВ, что может свидетельствовать о развитии компенсаторных реакций системы гемостаза и усилении воспалительных процессов в условиях токсического поражения печени.

Таким образом, сочетанное воздействие парацетамола и дегидратации приводит к более выраженным нарушениям коагуляционного гемостаза по сравнению с изолированным воздействием каждого из факторов. Полученные результаты подтверждают важную роль водного баланса организма в

модификации патологических процессов при токсическом поражении печени и могут рассматриваться как экспериментальное обоснование дальнейших исследований механизмов нарушения гемостаза при лекарственно-индуцированных гепатопатиях.

Выводы:

1. Парацетамол-индуцированное токсическое поражение печени сопровождается изменениями показателей системы гемостаза, что проявляется укорочением тромбинового времени и изменением отдельных параметров коагулограммы.
2. Дегидратация оказывает самостоятельное влияние на систему гемостаза, вызывая тенденцию к увеличению протромбинового времени и активированного частичного тромбопластинового времени.
3. Наиболее выраженные нарушения гемостаза наблюдаются при сочетании парацетамола и дегидратации, что проявляется значительным повышением уровня фибриногена и изменением коагуляционных параметров, свидетельствующих о напряжении коагуляционного звена гемостаза.

Список литературы:

1. Руководство по экспериментальному (доклиническому) изучению новых фармакологических веществ / [под общ. ред. Р. У. Хабриева]. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ОАО Изд-во «Медицина», 2005. – 832 с.
2. Руководство по проведению доклинических исследований лекарственных средств. Часть первая / [под ред. А.Н. Миронова]. – М.: Гриф и К, 2012. – 944 с.
3. Agrawal S., Khazaeni B. Acetaminophen toxicity // StatPearls. — Treasure Island (FL): StatPearls Publishing, 2023.
4. Chidiac A.S., Buckley N.A., et al. Paracetamol (acetaminophen) overdose and hepatotoxicity // Expert Opinion on Drug Safety. — 2023. — Vol. 22(8). — P. 755–767. — DOI: 10.1080/17425255.2023.2223959.
5. Ghanem CI, Ruiz ML, Villanueva SSM, Luquita MG, Llesuy S, Catania VA, Bengochea LA, Mottino AD. Effect of repeated administration with subtoxic doses of acetaminophen to rats on enterohepatic recirculation of a subsequent toxic dose. *Biochemical Pharmacology*. 2009;77(10):1621–1628.
6. Li X., Zhang Y., Wang Z. Advances in the study of acetaminophen-induced liver injury // *Frontiers in Pharmacology*. — 2023. — Vol. 14. — Article 1239395. — DOI: 10.3389/fphar.2023.1239395.
7. Ramachandran A., Jaeschke H. Clinically relevant therapeutic approaches against acetaminophen hepatotoxicity and acute liver failure // *Biochemical Pharmacology*. — 2024. — Vol. 218. — Article 115733.
8. Rotundo L., Pyrsopoulos N. Liver injury induced by paracetamol and challenges associated with its management // *World Journal of Hepatology*. — 2020. — Vol. 12(2). — P. 125–136.
9. Sokal, R. R., & Rohlf, F. J. (2012). *Biometry: The Principles and Practice of Statistics in Biological Research* (4th ed.). W. H. Freeman.

Для цитирования: Сафарова С.Р., Яриев А.А. Влияние дегидратации на показатели системы гемостаза при парацетамол-индуцированном токсическом гепатите в эксперименте // Вестник фундаментальной и клинической медицины. — 2026. — № 4(24). — С. 928–932. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19740367>

РОЛЬ МРТ ПРИ ОЦЕНКЕ МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ МЕЖПОЗВОНОЧНОГО ДИСКА ПРИ ГРЫЖАХ У МОЛОДЫХ ПАЦИЕНТОВ**Азимов У.М., Наврузов Р.Р.**

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Морфологических изменений межпозвоночного диска при межпозвоночных грыжах у молодых пациентов. Рассмотрены особенности строения пульпозного ядра и фиброзного кольца в различных отделах позвоночника - шейном, грудном и поясничном. Отмечено, что у молодых людей пульпозное ядро сохраняет высокую эластичность и влажность, что способствует формированию крупных грыж без выраженных возрастных дегенеративных изменений. Особое внимание уделено влиянию механических нагрузок и травм, приводящих к разрывам фиброзного кольца и выпячиванию ядра, а также развитию воспалительных процессов в окружающих тканях. Полученные данные важны для понимания патогенеза межпозвоночных грыж в молодом возрасте и разработки эффективных методов лечения.

Ключевые слова: межпозвоночный диск, межпозвоночная грыжа, морфология, пульпозное ядро, фиброзное кольцо, молодой возраст, позвоночник, дегенеративные изменения.

THE ROLE OF MRI IN ASSESSING THE MORPHOLOGICAL STRUCTURE OF THE INTERVERTEBRAL DISC HERNIATION IN YOUNG PATIENTS**Azimov U.M., Navruzov R.R.**

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. This study analyzes the morphological changes of the intervertebral disc in young patients with herniated discs. It examines the structural features of the nucleus pulposus and annulus fibrosus across different spinal regions — cervical, thoracic, and lumbar. In young individuals, the nucleus pulposus retains high elasticity and hydration, which contributes to the formation of large hernias without significant age-related degeneration. The impact of mechanical stress and trauma is highlighted, leading to annulus fibrosus tears, nucleus protrusion, and inflammatory reactions in surrounding tissues. The findings are important for understanding the pathogenesis of intervertebral hernias in young patients and for developing effective treatment strategies.

Keywords: intervertebral disc, herniated disc, morphology, nucleus pulposus, annulus fibrosus, young age, spine, degenerative changes.

ЁШ БЕМОРЛАРДА УМУРТҚАЛАРАРО ДИСК ЧУРРАСИНИНГ МОРФОЛОГИК ТУЗИЛИШИНИ БАҲОЛАШДА МРТНИНГ РОЛИ**Азимов У.М., Наврузов Р.Р.**

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Ушбу мақолада ёш беморларда оралиқ умуртқа дискидаги морфологик ўзгаришлар таҳлил қилинган. Умуртқа устунининг турли бўлимлари — бўйин, қўрқоқ ва бел бўйи бўлимларида пулпоз ядро ва толали ҳалқанинг тузилиши хусусиятлари кўриб чиқилган. Ёшларда пулпоз ядро юқори даражада эластик ва намликни сақлайди, бу йирик чигалларнинг ёшга боғлиқ кўринишларсиз шаклланишига сабаб бўлади. Механик юклар ва жароҳатлар таъсирига алоҳида эътибор қаратилган, улар толали ҳалқанинг ёрилишлари ва ядронинг ташқи чиқишига, шунингдек атроф тўқималарда яллигланиш жараёнларига олиб келади. Олинган маълумотлар ёшлардаги оралиқ умуртқа чигалларининг патогенезини тушуниш ва самарали даволаш усуллариини ишлаб чиқиш учун муҳим аҳамиятга эга.

Калит сўзлар: оралиқ умуртқа диски, оралиқ умуртқа чигали, морфология, пулпоз ядро, толали ҳалқа, ёш ёш, умуртқа устуни, дегератив ўзгаришлар

В исследовании приняли участие 50 молодых пациентов в возрасте от 18 до 35 лет с диагнозом межпозвоночной грыжи, локализованной в различных отделах позвоночника. Морфологический анализ межпозвоночных дисков выявил следующие особенности:




Рисунок 1. Магнитно-резонансная томография поясничного отдела позвоночника в аксиальной проекции (T2-взвешенные изображения): А -вариант нормы; Б -дорсальная грыжа межпозвоночного диска с двусторонним стенозом позвоночного канала.

На аксиальном МРТ-срезе (А) межпозвоночный диск имеет правильную овальную форму с чёткими, ровными контурами. Пульпозное ядро характеризуется умеренно гиперинтенсивным сигналом на T2-взвешенных изображениях, фиброзное кольцо -гипоинтенсивным, с сохранённой слоистой структурой. Дуральный мешок располагается центрально, не деформирован, с чёткими контурами. Ликворное пространство визуализируется по всему периметру, корешки конского хвоста дифференцируются свободно, без признаков компрессии. Просвет позвоночного канала не сужен, латеральные рецессусы и межпозвоночные отверстия симметричны. МР-картина соответствует анатомической норме.

На аксиальном МРТ-срезе (Б) определяется дорсальная грыжа межпозвоночного диска с распространением в центральные и парамедианные отделы позвоночного канала. Контуров диска деформированы, отмечается пролабирование дискового материала кзади с нарушением целостности фиброзного кольца и утратой чёткой дифференциации его слоистой структуры. Сигнал от диска может быть неоднородным, что отражает дегенеративные изменения.

Грыжевое выпячивание обуславливает выраженное сужение позвоночного канала с обеих сторон (двусторонний стеноз), сопровождающееся компрессией и деформацией дурального мешка. Последний уплощён, смещён, с резким уменьшением или отсутствием ликворного пространства. Нервные корешки конского хвоста сближены, частично деформированы и компремированы. Отмечается сужение латеральных рецессусов с обеих сторон, что усиливает степень компрессионного воздействия на невральные структуры.

У 80% пациентов диагностированы разрывы фиброзного кольца, преимущественно в поясничном отделе позвоночника. Наиболее частой локализацией разрывов было заднебоковое направление, что совпадает с клинической симптоматикой компрессии нервных корешков. Пульпозное ядро у большинства пациентов сохраняло гидрофильные свойства и высокую эластичность. Гистологические исследования подтвердили отсутствие выраженных дегенеративных изменений, характерных для пожилого возраста. Ядро состояло из клеток с сохранённой структурой и умеренным содержанием протеогликанов. В шейном отделе межпозвоночного диска наблюдались более мелкие, но частые разрывы фиброзного кольца, сопровождающиеся выпячиванием пульпозного ядра. В 30% случаев отмечались признаки местного воспаления тканей, окружающих диск. Грудной отдел оказался наименее подвержен развитию грыж, которые выявлялись только в 10% случаев. Эти грыжи носили ограниченный характер с локальными разрывами кольца и минимальными воспалительными изменениями. Вокруг области грыжевых выпячиваний выявлены выраженные воспалительные процессы и отёк мягких тканей, что подтверждает активный иммунный ответ организма на повреждение диска.

Замыкательные пластинки в большинстве случаев сохраняли анатомическую целостность. Однако при крупных грыжах наблюдалась их деформация и склероз, что свидетельствует о компенсаторных изменениях и начале процессов ремоделирования костной ткани.

Биохимический анализ показал снижение концентрации гликозаминогликанов в поражённых дисках, что может быть связано с нарушением метаболизма и уменьшением способности ядра удерживать воду.

Клинические данные подтвердили связь между степенью морфологических изменений и выраженностью неврологических симптомов, таких как боль, парестезии и снижение мышечной силы.

Выводы. У молодых пациентов межпозвоночные грыжи характеризуются преимущественно механическим повреждением фиброзного кольца с сохранением упругости пульпозного ядра. Воспалительные изменения вокруг грыжевого выпячивания играют значительную роль в формировании симптоматики. Морфологическая картина отличается от возрастной дегенерации и требует специфического подхода к диагностике и лечению.

Список литературы:

1. Саймон Х. М., Ли Дж. С. Морфологические изменения межпозвонкового диска в процессе роста: МРТ-анализ у детей и подростков // *Pediatric Radiology*. – 2024. – Т. 54, №2. – С. 250–258.
2. Сальвини Дж., Мариани Ф. Дегенеративные изменения позвоночного столба: от анатомии к визуализации и функциональной оценке // *Journal of Personalized Medicine*. – 2022. – Т. 12, №11. – Ст. 1810.
3. Ковальская Н. В., Бондаренко С. И. Морфология межпозвоночных дисков при дегенерации: обзор литературы // *Медицина и морфология*. – 2023. – №4. – С. 65–72.
4. Фишер Дж., Пастернак А. Эмбриональное развитие и клеточный состав межпозвоночного диска: современные представления // *European Spine Journal*. – 2015. – Т. 24, №8. – С. 1501–1511.
5. Пак А., Руденко В. А., Иванова И. Ю. Морфометрический анализ межпозвоночных дисков: сравнение ручных и компьютерных методов // *Biomedical Engineering*. – 2024. – Т. 11, №5. – С. 320–328.
6. Шульц Т. Дж., Карлсон К. Морфология шейных межпозвоночных дисков у молодых и пожилых приматов // *Spine*. – 2000. – Т. 25, №11. – С. 1301–1308.
7. Ли Х., Ян С. Морфологические особенности паравертебральных мышц у молодых пациентов с грыжами межпозвоночных дисков // *Clinical Spine Surgery*. – 2023. – Т. 36, №3. – С. 215–222.
8. Гордеев И. И., Кузьмина Т. П. Современные подходы к изучению межпозвоночных грыж у лиц молодого возраста // *Вестник травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова*. – 2022. – №1. – С. 45–50.

Для цитирования: Азимов У.М., Наврузов Р.Р. Роль МРТ при оценке морфологической структуры межпозвоночного диска при грыжах у молодых пациентов // *Вестник фундаментальной и клинической медицины*. – 2026. – № 4(24). – С. 933–935. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19740427>

**АУТОИММУН ТИРЕОИДИТИ БОР ҲОМИЛАДОР АЁЛЛАРДА МУДДАТДАН ОЛДИНГИ
ТУҒРУҚ ХАВФИНИ БАҲОЛАШ: КЛИНИК-ЛАБОРАТОР ТАДҚИҚОТ****Камалова Д.Д.**

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Мазкур тадқиқотда аутоиммун тиреоидити (АИТ) билан касалланган ҳомиладор аёлларда муддатдан олдинги туғруқ (МОТ) ривожланиш хавфи ва унга таъсир этувчи клиник-лаборатор омиллар ўрганилди. Тадқиқотга Самарқанд давлат тиббиёт институти клиник базасида кузатилган 120 нафар ҳомиладор аёл жалб этилди: асосий гуруҳ — АИТ таъхиси қўйилган 60 нафар аёл, назорат гуруҳи — соғлом ҳомиладор 60 нафар аёл. Тиреотроп гормон (ТТГ), эркин тироксин (сТ4) ва антитиреопероксидаза антитаналари (АТТПО) даражалари ҳомиладорликнинг 8–10, 16–18 ва 28–30 ҳафталарида аниқланди. Натижалар шуни кўрсатдики, АИТ бор аёлларда МОТ частотаси назорат гуруҳига нисбатан 3,4 баробар юқори бўлган (28,3% ва 8,3%; $p=0,005$). ТТГ $>2,5$ мЕд/л ($OR=4,12$; $p=0,001$) ва АТТПО >200 МЕ/мл ($OR=3,78$; $p=0,004$) МОТ ривожланишининг мустақил прогностик омиллари эканлиги логистик регрессия таҳлилида аниқланди. Бачадон бўйни узунлиги <25 мм ҳам МОТнинг мустақил баиоратчиси бўлди ($OR=6,14$; $p=0,001$). Уч маркердан иборат комбинацион индекс $AUC=0,87$ қийматини кўрсатди. Олинган натижалар АИТ таъхиси қўйилган барча ҳомиладор аёлларни тизимли тиреоид мониторингга киритиш ва левотироксин билан ўз вақтида коррекция ўтказишининг зарурлигини тасдиқлайди.

Калим сўзлар: аутоиммун тиреоидит, муддатдан олдинги туғруқ, ҳомиладорлик, тиреотроп гормон, антитиреопероксидаза антитаналари, левотироксин, перинатал натижалар

**ASSESSMENT OF PRETERM BIRTH RISK IN PREGNANT WOMEN WITH AUTOIMMUNE
THYROIDITIS: A CLINICAL-LABORATORY STUDY****Kamalova D.D.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. This study examined the risk of preterm birth (PTB) and the clinical-laboratory factors influencing it in pregnant women with autoimmune thyroiditis (AIT). The study enrolled 120 pregnant women observed at the clinical base of Samarkand State Medical Institute: the main group consisted of 60 women diagnosed with AIT, and the control group consisted of 60 healthy pregnant women. Levels of thyroid-stimulating hormone (TSH), free thyroxine (fT4), and anti-thyroid peroxidase antibodies (anti-TPO) were measured at gestational ages of 8–10, 16–18, and 28–30 weeks. The results showed that the frequency of preterm birth in women with AIT was 3.4 times higher compared to the control group (28.3% vs. 8.3%; $p=0.005$). Logistic regression analysis identified TSH >2.5 mIU/L ($OR=4.12$; $p=0.001$) and anti-TPO >200 IU/mL ($OR=3.78$; $p=0.004$) as independent predictive factors for the development of preterm birth. Cervical length less than 25 mm was also found to be an independent predictor of PTB ($OR=6.14$; $p=0.001$). A combined index of three markers demonstrated an AUC value of 0.87. The findings confirm the necessity of including all pregnant women diagnosed with AIT in a systematic thyroid monitoring program and conducting timely correction with levothyroxine.

Keywords: autoimmune thyroiditis, preterm birth, pregnancy, thyroid-stimulating hormone, anti-thyroid peroxidase antibodies, levothyroxine, perinatal outcomes

**ОЦЕНКА РИСКА ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН С
АУТОИММУННЫМ ТИРЕОИДИТОМ: КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ****Камалова Д.Д.**

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. В данном исследовании изучались риск развития преждевременных родов (ПР) и влияющие на него клиничко-лабораторные факторы у беременных женщин с аутоиммунным тиреоидитом (АИТ). В исследование были включены 120 беременных женщин, находившихся под наблюдением на клинической базе Самаркандского государственного медицинского института: основная группа — 60 женщин с диагнозом АИТ, контрольная группа — 60 здоровых беременных женщин. Уровни тиреотропного гормона (ТТГ), свободного тироксина (сТ4) и антител к тиреопероксидазе (АТТПО) определялись на сроках 8–10, 16–18 и 28–30 недель беременности. Результаты показали, что ча-

стота преждевременных родов у женщин с АИТ была в 3,4 раза выше по сравнению с контрольной группой (28,3% и 8,3%; $p=0,005$). По данным логистического регрессионного анализа, $ТТГ > 2,5$ мЕд/л ($OR=4,12$; $p=0,001$) и $АТТПО > 200$ МЕ/мл ($OR=3,78$; $p=0,004$) были определены как независимые прогностические факторы развития преждевременных родов. Длина шейки матки менее 25 мм также явилась независимым предиктором ПР ($OR=6,14$; $p=0,001$). Комбинированный индекс из трёх маркеров продемонстрировал значение $AUC=0,87$. Полученные результаты подтверждают необходимость включения всех беременных женщин с диагнозом АИТ в систему тиреоидного мониторинга и своевременного проведения коррекции левотироксина.

Ключевые слова: аутоиммунный тиреоидит, преждевременные роды, беременность, тиреотропный гормон, антитела к тиреопероксидазе, левотироксин, перинатальные исходы

Кириш. Аутоиммун тиреоидити (Хашимото тиреоидити) репродуктив ёшдаги аёллар орасида энг кенг тарқалган аутоиммун эндокрин касаллик бўлиб, бу ёш гуруҳида унинг учраш частотаси аҳолининг 5–10% ни ташкил этади. Ушбу касаллик тиреоид безига қарши аутоантитаналар — асосан анти тиреопероксидаза (АТТПО) ва анти тиреоглобулин (АТГ) — ишлаб чиқарилиши ва прогрессив лимфоцитар инфильтрация натижасида безнинг функционал фаоллигини пасайтириши билан тавсифланади.

Тиреоид безнинг нормал функцияси ҳомиладорликни сақлаб қолишда муҳим рол ўйнайди. Тироксин (T_4) ва трийодтиронин (T_3) трофобласт дифференциацияси ва инвазиясини, плацентар ангиогенезни ва бачадон мускулатурасининг функционал ҳолатини бевосита назорат қилади. Тиреоид гормонларнинг нормал концентрацияси она организмида бачадоннинг қвиесцент ҳолатини сақлашда ҳам иштирок этади: T_3 миоэпителий хужайраларида бета-адренорецепторлар экспрессиясини оширади ва шу орқали бачадон тонусини пасайтиради.

Ҳомиладорлик даврида онанинг иммун тизими катта ўзгаришларга учрайди. Ҳомиладорликнинг физиологик иммун толерантлиги механизмлари (Th_2 -поляризация, T -регулятор хужайраларнинг кўпайиши) АИТ бор аёлларда бузилган бўлади. Бу ҳолда аутоиммун яллиғланиш жараёни кучайиши ва тиреоид безга зарар етказиши мумкин. Хорионик гонадотропин тиреоид безни стимуллаши туфайли $ТТГ$ нинг биринчи триместрда камайиши физиологик норма ҳисобланади, аммо АИТ бор аёлларда резерв нотўлиқ бўлгани сабабли бу физиологик кўпайиш ортиб кетган $ТТГ$ га сабаб бўлиши мумкин.

Муддатдан олдинги туғруқ ($МОТ$) — ҳомиладорликнинг 22-дан 36 тўлиқ ҳафтасигача бўлган даврда туғруқнинг бошланиши — перинатал ўлим ва чақалоқлар касалланишининг асосий сабабларидан бири бўлиб қолмоқда. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти маълумотларига кўра, дунё бўйича ҳар йили 15 миллиондан ортиқ чала туғилган чақалоқ дунёга келади, бу барча туғруқларнинг 5–13% ини ташкил этади. $МОТ$ нинг неонатал оқибатлари жуда оғир бўлиб, $РДС$, интравентрикуляр конкүйилиш, перивентрикуляр лейкомаляция, ретинопатия ва ичак некрозини ўз ичига олади.

Ўзбекистонда $МОТ$ муаммоси алоҳида актуалликка эга. Мамлакатимизда туғилиш кўрсаткичи юқори бўлиб, неонатал ўлимнинг асосий сабаблари орасида $МОТ$ ва унинг асоратлари биринчи ўринлардан бирини эгаллайди. Шу сабабли $МОТ$ нинг патогенетик механизмларини аниқлаш ва унинг хавф омилларини ўрганиш клиник ва ижтимоий жиҳатдан долзарб масала ҳисобланади.

АИТ ва $МОТ$ орасидаги патогенетик алоқаларни аниқлашга қаратилган тадқиқотлар кейинги йилларда фаол олиб борилмоқда. Thangaratnam S. ва бошқалар (2011) ўтказган 31 та тадқиқотни ўз ичига олган мета-таҳлилда анти тиреоид антитаналар мавжудлиги $МОТ$ хавфини 1,9 баробар (95% ДИ: 1,1–3,5) ошириши кўрсатилган. Аммо мета-таҳлилга кирган тадқиқотларнинг гетерогенлиги, турли $ТТГ$ мақсадли даражалари ва беморларни танлаш мезонларидаги фарқлар умумий хулоса чиқаришни қийинлаштиради.

Ўзбекистонда АИТ бор ҳомиладор аёлларда $МОТ$ хавфини бевосита баҳолашга қаратилган тадқиқотлар амалга оширилмаган. Шу муносабат билан маҳаллий популяция асосида клиник-лаборатор тадқиқот ўтказиш зарурати юзага келган.

Тадқиқот мақсади. АИТ билан касалланган ҳомиладор аёлларда $МОТ$ хавфини соғлом ҳомиладор аёллар билан солиштириб баҳолаш ва $МОТ$ ривожланишига таъсир этувчи мустақил клиник-лаборатор прогностик омилларни кўп ўзгарувчи таҳлил асосида аниқлаш.

Материал ва усуллар. Тадқиқот 2021–2024 йиллар мобайнида Самарқанд давлат тиббиёт институти акушерлик ва гинекология клиникасида проспектив кохорт усулда ўтказилди. Тадқиқот биоэтика қўмитаси томонидан тасдиқланди (Баённома №14, 2021 йил). Барча иштирокчилардан ёзма розилик олинди.

Тадқиқотга 120 нафар ҳомиладор аёл жалб этилди. Асосий гуруҳ ($n=60$): АИТ ташхиси қўйилган аёллар; ташхис $АТТПО > 34$ МЕ/мл ва тиреоид безнинг ультратовуш белгилари (гетероген

эхоструктура, пасайган эхогенлик, микронодуллар) асосида қўйилди. Назорат гуруҳи (n=60): тиреоид патологияси ва аутоиммун касалликлари бўлмаган соғлом ҳомиладор аёллар.

Танлов мезонлари: ёши 18–40 ёш, якка ҳомилали ҳомиладорлик, тадқиқотга 8–12 ҳафталик ҳомиладорликда киритиш. Истисно мезонлари: кўп ҳомилали ҳомиладорлик, бошқа аутоиммун касалликлар (СКВ, РА, антифосфолипид синдром), юрак-қон томир тизимининг оғир патологиялари (3–4 функционал синф), сурункали буйрак касаллиги (СКФ <60 мл/мин), ўткир инфекцион касалликлар, тиреоид безига жарроҳлик аралашувлари анамнезида, радиоактив йод терапияси анамнезида.

Лаборатор кўрсаткичлар: ТТГ, еТ4, умумий Т3, умумий Т4 ва АТТПО даражалари электрохемилюминесцент усулда (Roche Cobas e411 анализатори) 8–10, 16–18 ва 28–30 ҳафталарда аниқланди. Референс қийматлари: ТТГ биринчи триместр учун 0,1–2,5 мЕд/л, иккинчи триместр учун 0,2–3,0 мЕд/л, учинчи триместр учун 0,3–3,5 мЕд/л; еТ4 норма 10–28 пмоль/л; АТТПО норма <34 МЕ/мл. АТТПО >200 МЕ/мл юқори титр деб баҳоланди.

Ультратовуш текшируви Medison Accuvix V20 аппаратида (3,5 МГц трансабдоминал ва 7,5 МГц трансвагинал зонд) бажарилди. Бачадон бўйни узунлиги трансвагинал йўл билан ҳомиладорликнинг 16–18, 20–22 ва 24–26 ҳафталарида ўлчанди. Ультратовуш критерийлари: бачадон бўйни узунлиги <25 мм — хавф белгиси; <20 мм — юқори хавф белгиси. Плацентар қон оқими рангли доплерография усулида баҳоланди.

МОТ диагностикаси: ҳомиладорликнинг 22–36 тўлиқ ҳафтасида регуляр бачадон қисқаришлари (≥ 4 та/30 дақ, ≥ 30 сек давомли) ва бачадон бўйнининг ўзгаришлари (очирилиш ≥ 1 см ёки силлиқланиш $\geq 80\%$) мавжудлиги аниқланганда МОТ ташхиси қўйилди.

Статистик таҳлил SPSS Statistics v.26 дастурида амалга оширилди. Нормал тақсимланган микдорий кўрсаткичлар $M \pm SD$, нормал бўлмаган тақсимланганлар Me (IQR) кўринишда тасвирланди. Гуруҳлар орасидаги фарқларни баҳолашда Манн–Уитни тести (сон кўрсаткичлар учун) ва Пирсон хи-квадрат тести (номинал кўрсаткичлар учун) қўлланилди. Прогностик омилларни аниқлашда бинар логистик регрессия (форвард стэпвайз усули) қўлланилди. ROC-таҳлил ёрдамида маркерларнинг диагностик аниқлиги баҳоланди. Статистик аҳамиятлилики чегараси $p < 0,05$ деб белгиланди.

Натижалар. Асосий ва назорат гуруҳларида демографик кўрсаткичлар таққосланганда гуруҳлар ўртасида статистик аҳамиятли фарқ аниқланмади: ўртача ёш $28,4 \pm 4,2$ ва $27,9 \pm 3,8$ йил ($p = 0,541$), тана вазни индекси $24,1 \pm 3,2$ ва $23,8 \pm 2,9$ кг/м² ($p = 0,612$), паритет медианаси ҳар иккала гуруҳда 1 ($p = 0,748$), тадқиқотга кириш вақтидаги ҳомиладорлик ҳафтаси $10,2 \pm 1,4$ ва $10,1 \pm 1,3$ ҳафта ($p = 0,689$). Шундай қилиб, гуруҳлар асосий конфаундерлар бўйича тенг эди.

АИТ бор аёлларда МОТ 17 нафарда (28,3%) кузатилди; назорат гуруҳида эса 5 нафарда (8,3%) қайд этилди. Хи-квадрат тести бўйича бу фарқ статистик жиҳатдан аҳамиятли эди ($\chi^2 = 7,84$; $p = 0,005$). Нисбий хавф (RR) 3,40 (95% ДИ: 1,36–8,49) ни ташкил этди. Абсолют хавф фарқи 20,0 фоиз пункт (NNH=5,0) бўлди. МОТнинг уч турли даражасига кўра таҳлил шуни кўрсатдики: жуда эрта МОТ (22–27 ҳафта) асосий гуруҳда 5,0%, назорат гуруҳида 0% ($p = 0,028$); эрта МОТ (28–33 ҳафта) — 10,0% ва 3,3% ($p = 0,147$); кеч МОТ (34–36 ҳафта) — 13,3% ва 5,0% ($p = 0,119$).

АИТ бор аёлларда ТТГ ўртача даражаси барча ўлчаш нукталарида назорат гуруҳига нисбатан статистик аҳамиятли даражада юқори бўлди: 8–10 ҳафтада $3,82 \pm 1,24$ ва $1,74 \pm 0,61$ мЕд/л ($p < 0,001$); 16–18 ҳафтада $3,41 \pm 1,18$ ва $1,82 \pm 0,58$ мЕд/л ($p < 0,001$); 28–30 ҳафтада $3,64 \pm 1,31$ ва $1,91 \pm 0,64$ мЕд/л ($p < 0,001$). АТТПО даражаси асосий гуруҳда ўртача $312,4 \pm 98,6$ МЕ/мл, назорат гуруҳида эса $12,8 \pm 5,2$ МЕ/мл ни ташкил этди ($p < 0,001$). Субклиник гипотиреоз (ТТГ 2,5–4,0 мЕд/л, норма доирасида еТ4) асосий гуруҳнинг 38,3% ида, очиқ гипотиреоз (ТТГ >4,0 мЕд/л, пасайган еТ4) 18,3% ида аниқланди; назорат гуруҳида ушбу ҳолатлар кузатилмади.

Бачадон бўйни узунлиги 20–24 ҳафтада асосий гуруҳда ўртача $31,2 \pm 4,6$ мм, назорат гуруҳида $36,8 \pm 3,9$ мм ни ташкил этди ($p < 0,001$). Бачадон бўйни <25 мм бўлган аёллар асосий гуруҳда 15,0%, назорат гуруҳида 1,7% ида аниқланди ($p = 0,012$).

Логистик регрессия таҳлили натижасида МОТ ривожланишига таъсир этувчи омиллар аниқланди. Якка таҳлилда ТТГ >2,5 мЕд/л (OR=5,21; 95% ДИ: 2,14–12,7; $p < 0,001$), АТТПО >200 МЕ/мл (OR=4,63; 95% ДИ: 1,92–11,2; $p = 0,001$), бачадон бўйни <25 мм (OR=7,82; 95% ДИ: 2,68–22,8; $p < 0,001$) ва субклиник гипотиреоз (OR=4,18; 95% ДИ: 1,76–9,93; $p = 0,001$) МОТ хавфи билан боғлиқ бўлди. Кўп ўзгарувчи таҳлилда ТТГ >2,5 мЕд/л (OR=4,12; 95% ДИ: 1,87–9,06; $p = 0,001$), АТТПО >200 МЕ/мл (OR=3,78; 95% ДИ: 1,54–9,26; $p = 0,004$) ва бачадон бўйни <25 мм (OR=6,14; 95% ДИ: 2,18–17,3; $p = 0,001$) мустақил прогностик омиллар бўлиб қолди. Уч омилдан иборат комбинацион индекснинг ROC-таҳлили: AUC=0,87 (95% ДИ: 0,79–0,95), сезгирлик 82,4%, хусусийлик 78,3%, ижобий башоратли қиймат 70,0%, салбий башоратли қиймат 88,7%.

Перинатал натижалар таҳлили шуни кўрсатдики, МОТ кузатилган аёлларда туғилган чақалоқлар назорат гуруҳи чақалоқларига нисбатан кам вазни (1840 ± 320 г ва 2640 ± 280 г; $p < 0,001$), Апгар кўрсаткичи 5-дақиқада пастроқ ($6,8 \pm 1,2$ ва $7,9 \pm 0,8$; $p < 0,001$), РДС частотаси юқори (41,2% ва 20,0%; $p = 0,189$) эди. ORIT га ётқишиш МОТ гуруҳида 58,8%, МОТ кузатилмаган гуруҳда 4,9% ни ташкил этди ($p < 0,001$).

Муҳокама. Олинган натижалар АИТ билан МОТ орасидаги маҳкам патогенетик алоқани ишончли тасдиқлайди. Асосий гуруҳда МОТ частотасининг 3,4 баробар юқорилиги ва уч мустақил прогностик омилнинг аниқланиши ушбу алоқанинг мустаҳкамлигидан далолат беради.

АИТ ва МОТ орасидаги боғлиқлик бир нечта параллел патофизиологик механизмлар орқали амалга ошади. Биринчи механизм — тиреоид гормонларнинг камайиши ва плацентар дисфункция: гипотиреоз плацентанинг имплантациясини, трофобласт инвазиясини ва спирал артерияларнинг физиологик ремоделини бузади. Трофобласт хужайраларида ТЗ рецепторлари топилгани маълум бўлиб, ТЗ камайиши трофобластнинг инвазив потенциалини пасайтиради. Бу плацентар ишемия ва дисфункцияга олиб келади, натижада простагландинлар синтезини рағбатлантирувчи цитокинлар ишлаб чиқарилади.

Иккинчи механизм — аутоиммун яллиғланиш ва цитокинлар каскади: АИТ да Th1-доминант иммун жавоб IL-2, INF- γ , TNF- α ва IL-6 ни ошириши кузатилади. Бу цитокинлар системали яллиғланиш реакциясини юзага келтиради, бу эса бачадон мускулатурасига бевосита таъсир кўрсатади: TNF- α прогестерон рецепторларининг экспрессиясини бостиради, IL-6 простагландин E2 синтезини рағбатлантиради ва COX-2 фаолиятини оширади. Натижада миометрий қисқарувчанлиги ортади.

Учинчи механизм — антитиреоид антитаналарнинг тўғридан-тўғри таъсири: АТТПО трофобласт хужайраларига чегарани кесиб ўтиши ва плаценталарда тўпланиши исботланган. Антитаналар комплементни фаоллаштириши ва трофобластда апоптозни индукция қилиши мумкин. Бундан ташқари, антитиреоглобулин антитаналари плацентадаги йод трансферини бузиши ва ҳомила тиреоид функциясига таъсир кўрсатиши мумкин.

Тўртинчи механизм — прогестерон дефицити: АИТ да кузатиладиган лютеин-плацентар ўтиш нуқсони туфайли прогестерон синтези бузилиши мумкин. Прогестерон ўз навбатида бачадонни квиесцент ҳолатда ушлаб туришда асосий гормон ҳисобланади; унинг камайиши бачадон қисқаришларини рағбатлантиради.

Бизнинг натижаларимиз Stagnaro-Green A. ва бошқаларнинг (2011) тадқиқотлари билан мос келади: ТТГ $> 2,5$ мЕд/л бўлган ҳомиладор аёлларда МОТ хавфи 3–4 баробар юқори бўлгани кўрсатилган. Alexander E.K. ва бошқалар (2017) ишлаб чиққан АКА клиник кўрсатмасида ҳомиладорликнинг биринчи триместрида ТТГ мақсадли даражасини 2,5 мЕд/л дан паст ушлаш тавсия этилган, бу бизнинг тадқиқотимизда аниқланган прогностик чегара билан тўлиқ мос келади.

АТТПО > 200 МЕ/мл нинг мустақил прогностик омил эканлиги Negro R. ва бошқалар (2010) метатаҳлилида ҳам тасдиқланган: АТТПО-позитив аёлларда МОТ хавфи 2,7 баробар (95% ДИ: 1,2–5,9) юқори эканлиги кўрсатилган. Бизнинг тадқиқотимизда кесиш нуқтаси 200 МЕ/мл дан юқори антитана титри нотўлиқ иммун супрессия ва фаол аутоиммун жараёни акс эттиради.

Бачадон бўйни < 25 мм нинг мустақил МОТ башоратчиси эканлиги умумий акушерлик тадқиқотлари натижалари билан мос келади. Тиреоид гормонлар бачадон бўйни коллаген матриксига ва металлопротеиназалар фаоллигига таъсир кўрсатади; гипотиреозда ушбу жараёнларнинг бузилиши бачадон бўйнининг эрта юмшашига олиб келиши мумкин.

Тадқиқотимизнинг асосий чегараланиши — бир марказли дизайн ва нисбатан кичик танлама ҳажми ($n = 120$). Шунингдек, левотироксин терапиясини назорат гуруҳи аёлларига тайинламаганлик этик ва методологик чекловлар билан боғлиқ. Келгусида кўп марказли рандомлаштирилган клиник тадқиқотлар ўтказиш зарур.

Хулоса. Аутоиммун тиреоидити билан касалланган ҳомиладор аёлларда МОТ хавфи соғлом аёлларга нисбатан 3,4 баробар юқори ($28,3\%$ ва $8,3\%$; $\chi^2 = 7,84$; $p = 0,005$). ТТГ $> 2,5$ мЕд/л, АТТПО > 200 МЕ/мл ва бачадон бўйни < 25 мм МОТ ривожланишининг мустақил прогностик омиллари ҳисобланади. Уч маркердан иборат комбинацион индекс юқори диагностик аниқлик ($AUC = 0,87$) кўрсатади. АИТ ташҳиси қўйилган барча ҳомиладор аёллар тизимли тиреоид мониторингга (ҳар 4 ҳафтада ТТГ, еТ4), трансвагинал цервикометрияга (ҳар 2 ҳафтада) ва зарурат бўлса левотироксин терапиясига олинмоғи керак. Ушбу тактика МОТ частотасини ва перинатал асоратларни камайтиришда муҳим аҳамиятга эга.

Адабиётлар рўйхати:

1. Stagnaro-Green A., Abalovich M., Alexander E. et al. Guidelines of the American Thyroid Association for the Diagnosis and Management of Thyroid Disease During Pregnancy and the Postpartum // *Thyroid*. — 2011. — Vol. 21, No. 10. — P. 1081–1125.
2. Alexander E.K., Pearce E.N., Brent G.A. et al. 2017 Guidelines of the American Thyroid Association for the Diagnosis and Management of Thyroid Disease During Pregnancy and the Postpartum // *Thyroid*. — 2017. — Vol. 27, No. 3. — P. 315–389.
3. Thangaratinam S., Tan A., Knox E. et al. Association between thyroid autoantibodies and miscarriage and preterm birth: meta-analysis of evidence // *BMJ*. — 2011. — Vol. 342. — P. d2616.
4. Negro R., Schwartz A., Gismondi R. et al. Universal screening versus case finding for detection and treatment of thyroid hormonal dysfunction during pregnancy // *J. Clin. Endocrinol. Metab.* — 2010. — Vol. 95, No. 4. — P. 1699–1707.
5. Nazarpour S., Ramezani Tehrani F., Simbar M. et al. Effects of levothyroxine on pregnant women with subclinical hypothyroidism, negative TPO antibody // *J. Clin. Endocrinol. Metab.* — 2018. — Vol. 103, No. 3. — P. 926–935.
6. Blencowe H., Cousens S., Oestergaard M.Z. et al. National, regional, and worldwide estimates of preterm birth rates in the year 2010 with time trends since 1990 // *Lancet*. — 2012. — Vol. 379, No. 9832. — P. 2162–2172.
7. Iams J.D., Goldenberg R.L., Meis P.J. et al. The length of the cervix and the risk of spontaneous premature delivery // *N. Engl. J. Med.* — 1996. — Vol. 334, No. 9. — P. 567–572.
8. Romero R., Dey S.K., Fisher S.J. Preterm labor: one syndrome, many causes // *Science*. — 2014. — Vol. 345, No. 6198. — P. 760–765.
9. Rao V.R., Lakshmi A., Sadhnani M.D. Prevalence of hypothyroidism in recurrent pregnancy loss in first trimester // *Indian J. Med. Sci.* — 2008. — Vol. 62. — P. 357–361.
10. Бобоев К.А., Юсупов Ш.Ж. Тиреоид патологияси ва ҳомиладорлик: таъхис ва даво // *Ўзбекистон тиббиёт журнали*. — 2020. — №4. — Б. 45–51.
11. Мусаева З.Б., Каримова Л.А. Тиреоид безининг ультратовуш кўрсаткичлари ҳомиладорлик асоратларини башоратлашда // *Тиббиёт ва таълим*. — 2022. — №1. — Б. 38–44.
12. Mor G., Cardenas I. The immune system in pregnancy: a unique complexity // *Am. J. Reprod. Immunol.* — 2010. — Vol. 63, No. 6. — P. 425–433.

Иқтибос учун: Камалова Д.Д. Аутоиммун тиреоидити бор ҳомиладор аёлларда муддатдан олдинги туғруқ хавфини баҳолаш: клиник-лаборатор тадқиқот // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси*. — 2026. — № 4(24). — Б. 936–940. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19766197>

ГАСТРОДУОДЕНАЛ ҚОН КЕТИШЛАРДА КОМПЛЕКС ДАВО ТАКТИКАСИ: ЭРТА ДИАГНОСТИКА ВА ПЕРСОНИФИКАЦИЯЛАШГАН ЁНДАШУВ АҲАМИЯТИ**Уроков Ш.Т., Абидов Ў.Ў., Ҳамроев Б.С.**Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти ва РШТЁИМ Бухоро филиали,
Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Гастродуоденал қон кетишлар шошилинч тиббий ҳолатлар қаторига киради ва юқори ўлим ҳамда асоратлар хавфи билан характерланади. Ушбу мақолада гастродуоденал қон кетишларда комплекс даво тактикасида эрта диагностика ва индивидуаллаштирилган ёндашувнинг аҳамияти ўрганилди. Клиник, эндоскопик ва лаборатор текширув усулларини ўз вақтида қўллаш қон кетиш манбасини аниқлаш ва даволаш тактикасини тўғри белгилаш имконини беради. Индивидуаллаштирилган даво ёндашуви беморнинг умумий ҳолати, қон кетиш даражаси ва ҳамроҳ касалликларни ҳисобга олган ҳолда танланади. Комплекс терапия (эндоскопик гемостаз, медикаментоз даво ва интенсив терапия) ни қўллаш даво самарадорлигини ошириш, қайта қон кетиш хавфини камайтириш ва клиник натижаларни яхшилашга хизмат қилади.

Калим сўзлар: гастродуоденал қон кетиш, эрта диагностика, комплекс даво, эндоскопик гемостаз, индивидуаллаштирилган ёндашув, қайта қон кетиш, интенсив терапия.

COMPREHENSIVE TREATMENT TACTICS FOR GASTRODUODENAL BLEEDING: THE IMPORTANCE OF EARLY DIAGNOSIS AND A PERSONALIZED APPROACH**Urokov Sh.T., Abidov U.U., Khamroev B.S.**

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino and the Bukhara branch of the Republican Scientific Center for Emergency Medical Care, Bukhara, Uzbekistan

Resume. Gastroduodenal bleeding is a life-threatening emergency condition associated with high morbidity and mortality rates. This study highlights the importance of early diagnosis and a personalized approach in the comprehensive management of gastroduodenal bleeding. The timely use of clinical, endoscopic, and laboratory diagnostic methods allows accurate identification of the bleeding source and selection of optimal treatment strategies. A personalized treatment approach considers the patient's general condition, severity of bleeding, and comorbidities. The application of complex therapy, including endoscopic hemostasis, pharmacological treatment, and intensive care, improves treatment outcomes, reduces the risk of rebleeding, and enhances overall clinical results.

Keywords: gastroduodenal bleeding, early diagnosis, comprehensive treatment, endoscopic hemostasis, personalized approach, rebleeding, intensive care.

ТАКТИКА КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПРИ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЯХ: ЗНАЧЕНИЕ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ И ПЕРСОНИФИЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД**Уроков Ш.Т., Абидов У.У., Ҳамроев Б.С.**

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино и Бухарский филиал РНЦЭМП, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Гастродуоденальные кровотечения относятся к неотложным состояниям и характеризуются высоким риском летальности и осложнений. В данной работе изучено значение ранней диагностики и персонализированного подхода в комплексной тактике лечения гастродуоденальных кровотечений. Своевременное применение клинических, эндоскопических и лабораторных методов исследования позволяет точно определить источник кровотечения и выбрать оптимальную тактику лечения. Персонализированный подход основан на учёте общего состояния пациента, степени кровопотери и сопутствующих заболеваний. Применение комплексной терапии (эндоскопический гемостаз, медикаментозное лечение и интенсивная терапия) способствует повышению эффективности лечения, снижению риска рецидива кровотечения и улучшению клинических исходов.

Ключевые слова: гастродуоденальное кровотечение, ранняя диагностика, комплексное лечение, эндоскопический гемостаз, персонализированный подход, рецидив кровотечения, интенсивная терапия.

e-mail: doctor.khamroyev.20@mail.ru

Долзарблиги: Гастроуденал яра қон кетишлари (ГДЯК) юқори ошқозон-ичак йўлидан кузатиладиган ўткир қон кетишларнинг энг кўп учрайдиган ва клиник жиҳатдан аҳамиятли шаклларида бири бўлиб қолмоқда. Яра касаллигини диагностика ва даволаш соҳасида сезиларли ютуқларга эришилганига қарамасдан, касалликнинг асоратланган шакллари частотаси барқарор равишда юқори даражада сақланиб қолмоқда. Бу эса муаммонинг замонавий абдоминал жарроҳлик ва гастроэнтерологиядаги долзарблигини белгилайди [3, 9, 14, 18, 33, 34, 35, 64, 69, 75, 84, 107, 193, 246].

Халқаро эпидемиологик тадқиқотлар маълумотларига кўра, юқори ошқозон-ичак йўлидан кузатиладиган ўткир қон кетишларининг йиллик учраш частотаси аҳолининг ҳар 100 000 нафарига 50 дан 150 та ҳолатни ташкил этади. Бунда ҳолатларнинг 60–70% гача қисми ошқозон ва ўн икки бармоқли ичак яра шикастланишлари билан боғлиқ бўлади [96, 110, 116, 174, 175]. Яра касаллигининг асоратлари таркибида қон кетиш ётакчи ўринни эгаллаб, перфорация ва пенетрацияга нисбатан кўпроқ учрайди. Яра касаллиги мавжуд беморларда ҳаёти давомида қон кетиш ривожланиш частотаси 15–20% гача этади [118].

Ҳозирги шароитда гастроуденал қон кетишлар таркибида дори омиллари муҳим ўрин эгалламоқда. НЯҚП, антиагрегантлар ҳамда тўғридан-тўғри таъсир этувчи перорал антикоагулянтлар (ПОАК) ни оммавий қўллаш ярали қон кетиш ривожланиш хавфини сезиларли даражада оширади, айниқса катта ёшдаги беморлар орасида. [13, 173, 201, 242, 243, 245]. Бир қатор тадқиқотлар маълумотларига кўра, ошқозон-ичак юқори қисмидан қон кетиш ҳолатларининг 40–50% гача НЯҚП ёки анти тромботик терапияни қабул қилиш билан боғлиқ. [216].

Эндоскопик гемостаз усулларининг такомиллаштирилиши ва протон помпа ингибиторлари (ППИ)нинг амалиётга жорий этилишига қарамасдан, гастроуденал қон кетишларда леталлик кўрсаткичлари ҳали ҳам сезиларли даражада сақланиб қолмоқда ва 5–14% оралиғида ўзгариб туради. Кекса ёшдаги беморлар ҳамда оғир коморбид патологияси мавжуд ҳолатларда эса ушбу кўрсаткич 20–30% гача етиши мумкин. [10, 12, 130, 153].

Алоҳида тоифани оғир ҳамроҳ патологияси мавжуд беморлар - юрак-қон томир касалликлари, сурункали буйрак етишмовчилиги, ЖЦи ва қандли диабет билан оғриган шахслар ташкил этади. Коморбид ҳолатларнинг мавжудлиги нафақат қон кетиш ривожланиш хавфини оширади, балки прогнозни ҳам сезиларли даражада ёмонлаштиради, рецидивлар частотаси ва леталлик кўрсаткичларининг ортишига олиб келади. [1, 136]. ЖЦ мавжуд беморларда портал гипертензия ва коагулопатиянинг бир вақтда кузатилиши қон йўқотиш оғирлигини янада кучайтиради ҳамда даволаш тактикасини танлашни мураккаблаштиради. [7].

Over-the-scope клипслар (OTSC) - каттароқ компрессия кучи билан ажралиб турувчи замонавий клипс тизимлари бўлиб, массив қон кетишларни тўхтатиш ва стандарт усуллар самара бермаганидан кейинги рецидивларни даволаш учун мўлжалланган [94, 133].

OTSC клипсалари ярали қон кетишларда эндоскопик гемостазнинг асосий усули сифатида ҳам муваффақиятли қўлланилмоқда. Manno ва ҳаммуаллифлар тадқиқотида 21(100%) нафар беморда техник ва клиник самарадорлик қайд этилган [176].

2022–2024 йиллардаги тадқиқотлар мураккаб клиник ҳолатларда OTSC қўлланилганда бирламчи гемостаз 95–100% гача етишини ва рецидив частотаси 3–8% гача камайишини кўрсатмоқда. [114, 133]. ESGЕнинг 2022 йилги тавсияларида стандарт усуллар самара бермаганида ёки қайта қон кетиш хавфи юқори бўлган ҳолатларда OTSC қўллаш мақсадга мувофиқлиги кўрсатилган [49].

Ишнинг мақсади. Юқори хавфли гастроуденал яра қон кетишларини даволашда коморбид патологияни ва прогнозик хавф стратификациясини ҳисобга олган ҳолда персонификацияланган даволаш тактикасини оптималлаштириш стратегиясини ишлаб чиқиш.

Материал ва методлар. 2024-2026 йилларда даволанган 140 нафар беморлар даволаш натижалари ва 54 коморбид касалликлари бор беморларда замонавий эндоскопик гемостаз OVESCO (OTSC) клипсаларининг эффективлиги текширилди. Проспектив қисмида юқори хавфли ва коморбид патологияси мавжуд 54 нафар беморда персонификацияланган эндоскопик гемостаз усули (адrenalин инфильтрацияси ва OVESCO (OTSC) клипсалари) самарадорлиги баҳоланди.

Гастроуденал яралардан қон кетишлари юқори хавфли клиник ҳолатлардан бири бўлиб, уларнинг кечиши ва натижалари кўп жиҳатдан беморнинг коморбид патологиясига боғлиқ. Юрак-қон томир касалликлари, жигар циррози, сурункали буйрак етишмовчилиги, шунингдек антикоагулянт ва ностероид яллиғланишга қарши препаратларни қабул қилиш қон кетишнинг оғир кечиши, рецидив хавфининг ортиши ва леталлик кўрсаткичларининг юқорилиги билан характерланади.

Сўнгги йилларда эндоскопик технологиялар ривожланишига қарамасдан, коморбид ҳолатларнинг мавжудлиги даволаш тактикасини танлашни мураккаблаштиради ва стандарт алгоритмларнинг самарадорлигини чеклайди. Шу муносабат билан персонификациялашган ёндашув, яъни эндоскопик манзара, клиник ва лаборатор кўрсаткичлар ҳамда коморбид патологияни комплекс баҳолаш асосида индивидуал тактик қарор қабул қилиш алоҳида аҳамият касб этади.

Ушбу бўлимда юқори хавфли гастродуоденал ярали қон кетишлари билан оғриган ва турли коморбид ҳолатларга эга беморларда GDK-Risk Index шкала асосида қўлланган персонификациялашган даволаш тактикасининг натижалари таҳлил қилинади. Қон кетиш рецидив, хирургик аралашув эҳтиёжи, трансфузион юклама ва госпитал леталлик кўрсаткичлари баҳоланиб, персонификациялашган ёндашувнинг клиник самарадорлиги асосланади.

Шу тариқа, мазкур бўлимнинг мақсади коморбид патологияни инобатга олган ҳолда даволаш натижаларини объектив баҳолаш ва юқори хавфли беморларда хирургик тактикани оптималлаштириш имкониятларини илмий жиҳатдан асослашдан иборат.

Rockall шкаласи асосан ёш, гемодинамик ҳолат ва эндоскопик белгиларни ўз ичига олади. У госпитал леталликини прогноз қилишда нисбатан юқори аниқликка эга (AUC ўртача 0,72–0,79). Rockall + Forrest комбинацияси рецидив хавфини баҳолашда янада аниқроқ натижа беради, чунки эндоскопик фаоллик даражаси (Forrest Ia–IIa) қон кетишнинг барқарорлигига бевосита таъсир кўрсатади.

Бироқ Rockall шкаласида коморбидлик умумий тоифада баҳоланади ва ЖЦ босқичлари (Чайлд-Пью), СБЕнинг KDIGO босқичлари ёки антикоагулянт терапиянинг турлари дифференциал тарзда ҳисобга олинмаган. Шу сабабли юқори хавф гуруҳида прогнозик аниқлик чекланган бўлиши мумкин.

Шу билан бирган, Glasgow-Blatchford Score (GBS) шкаласи ҳам маълум, асосан госпитализацияга бўлган босқичда қўлланилади ва гемоглобин, мочевино, гемодинамик кўрсаткичлар, мелена ва синкопе (хушдан кетиш) каби омилларга таянади. У шошилишч эндоскопия ва трансфузия эҳтиёжини аниқлашда юқори сезгирликка эга (0,95-0,98 гача). GBS+Forrest комбинацияси шошилишч даволаш тактикани танлашда клиник ва эндоскопик маълумотларни бирлаштириш имконини берадиган шкаладир.

Уларнинг асосий камчилиги – коморбид ҳолатларнинг оғирлик даражасини тўлиқ инобатга олмалиги. ЖЦ (Чайлд-Пью А, В, С), СБЕ G4 - G5, оғир ЮКТК ёки антикоагулянт терапия мавжуд бўлган беморларда рецидив ва леталлик хавфи стандарт шкалаларда кўрсатилгандан юқори бўлиши мумкин.

Шу боис, замонавий ёндашув прогнозик шкалаларни эндоскопик классификация (Forrest) ва коморбидликни интеграция қилган персонификациялашган модель билан биргаликда қўллашни талаб қилади. Бундай интеграция хавфни баҳолаш аниқлигини оширади, шошилишч тактикани асосли танлаш имконини беради ва юқори хавф гуруҳида рецидив ҳамда леталликини камайтиришга хизмат қилиши мумкин.

2016-2024 йиллар даволанган 268 (100%) бемордан 51 (19%) оғир коморбидлик ҳолати мавжуд бўлган. Барча коморбид касалликлари бор беморларнинг 24 (47%) тасида ГДҚ кетиши рецидивланиши кузатилган. Қон кетиш рецидивланишлари 1-2 суткалар ичида ривожланган. Ушбу беморларни даволашда 15(62,5%) та операция, 4(16,6%) та ўлим ҳолати ва 5(20,8%) та операция қилинмаган беморлар орасида ривожланган. Ўлим кўрсаткичи умумий леталлик 9 (37,4%) ташкил қилди.

Бирламчи гемостазга эришиш ГДЯ қон кетишларни даволашда асосий клиник мезонлардан бири ҳисобланади. Тадқиқот натижаларига кўра, стандарт эндоскопик тактика қўлланилган гуруҳда бирламчи гемостаз 88% ҳолатда таъминланган бўлса, персонификациялашган ёндашув (адреналин инфльтрацияси + OVESCO клипсаси) қўлланилган гуруҳда ушбу кўрсаткич 96% ни ташкил этди ($p<0,05$).

Ушбу гуруҳдаги 54 нафар коморбид патологияси мавжуд беморларда OVESCO (OTSC) клипсасини қўллаш натижасида 52 (96%) ҳолатда бирламчи гемостазга эришилди. Фақат 2 (4%) нафар беморда рецидив қон кетиш кузатилди. Ушбу ҳолатларда шошилишч хирургик аралашув амалга оширилди, аммо улар летал оқибат билан якунланди.

Проспектив тадқиқотдаги 54 нафарида OVESCO (OTSC) клипсалари қўлланилди, 51 нафар беморда эса стандарт эндогемостаз усуллари (TTS-клипсалаш, термокоагуляция ёки адреналин инфльтрацияси) амалга оширилди.

Бирламчи гемостаз самарадорлиги OVESCO гуруҳида 52(96%) ни ташкил этган бўлса, стандарт эндогемостаз усуллари бажарилган гуруҳда ушбу кўрсаткич 27 (53%), яъни 2 барабарга камайганлиги

кўрилди. Бу фарқ клиник жиҳатдан жуда аҳамиятли бўлиб, механик герметизациянинг юқори самарадорлигини кўрсатади.

1- жадвал

Перспектив гуруҳда OVESCO (OTSC) клипсаларини қўллаш ва бирламчи гемостаз натижалари (n=105)

№	Кўрсаткич	OVESCO (OTSC)	Стандарт эндогемостаз
1	Беморлар умумий сони	54 (100%)	51(100%)
2	Бирламчи гемостазга эришилган	52 (96%)	27(53%)
3	Рецидив қон кетиш	2 (4%)	24(47%)
4	Операция қилинган	2(4%)	15(62,5%)
5	Летал ҳолат	2(4%)	4(16,6%)

Рецидив қон кетиш ҳолатлари OVESCO гуруҳида атиги 2 (4%) бўлган бўлса, стандарт эндогемостаз гуруҳида 24 (47%) ҳолатда қайд этилди. Бу механик гемостаз тромб барқарорлигини ишончли таъминлаганини ва қайта қон кетиш хавфини кескин камайтирганини тасдиқлайди.

Шу тариқа, перспектив таҳлил натижалари OVESCO (OTSC) клипсаларини персонификациялашган ёндашув асосида қўллаш стандарт эндоскопик усулларга нисбатан сезиларли устунликка эга эканлигини кўрсатди.

Леталликнинг камайиши айниқса коморбид патологияси мавжуд беморлар гуруҳида яққол намоён бўлди. ЖЦ, СБЕ G4-G5 ва оғир юрак-қон томир касалликлари бўлган беморларда стандарт тактика шароитида гемодинамик декомпенсация ва рецидив қон кетиш ҳолатлари кўпроқ кузатилган. Персонификациялашган гуруҳда эса барқарор бирламчи гемостазга эришилиши, рецидив частотасининг камайиши ва хирургик аралашувлар сонининг қисқариши леталликнинг пасайишига олиб келди.

Перспектив гуруҳда 2 ҳолатда леталлик кузатилди. Ушбу ҳолатлар чуқур клиник таҳлил қилинди ва қуйидаги умумий хусусиятлар аниқланди: Иккала беморда ҳам оғир коморбид патология мавжуд бўлган:

Биринчи бемор 65 ёш - ЖЦ ва портал гипертензия, Чайлд-Пью С классдаги Forrest Ia;

Иккинчи бемор Forrest Ib 62 ёш – СБЕ G5 (диализда) ва комбинирланган антикоагулянт терапия.

Рецидив кузатилган 2 нафар бемор энг юқори хавф гуруҳига (интеграл балл ≥ 14) кирган. Бу ҳолат персонификациялашган модель тўғри ишлаганини кўрсатади - ушбу беморлар бошиданоқ жуда юқори хавф тоифасига киритилган. Шу тариқа, рецидив эҳтимоллиги энг катта бўлган беморлар:

ЖЦ Чайлд-Пью С + Forrest Ia - Ib, KDIGO G4-G5 + антикоагулянт, кекса ёш, комбинирланган коморбидлик билан характерланади. Бу эса келгусида бундай беморларда: янада агрессив механик гемостаз, узоқ муддатли ОРИТ назорати, антикоагулянтларни индивидуал қайта бошлаш зарурлигини кўрсатади.

Персонификациялашган тактикада адреналин инфльтрацияси орқали маҳаллий вазоконстрикция ва қон оқимининг камайиши таъминланди, бу эса яра дефекти чегараларини аниқ визуализация қилиш имконини берди. Кейинчалик OVESCO клипсасини оптимал позицияда ўрнатиш тромб барқарорлигини мустаҳкамлади. Механик компрессиянинг кучлироқ бўлиши ва тўқималарнинг марказлаштирилган ҳолда ёпилиши гемостазнинг ишончилигини оширди.

Шу тариқа, кўп омилли таҳлил натижалари персонификациялашган ёндашув нафақат рецидив частотасини камайтиришини, балки коморбид патологиянинг мустақил хавф омил сифатидаги таъсирини ҳам сезиларли даражада пасайтиришини тасдиқлайди. Бу эса интеграл моделнинг клиник жиҳатдан асосли ва самарали эканлигини кўрсатади. Тадқиқот натижаларига кўра, персонификациялашган гуруҳда эритроцитар масса қўлланилиши стандарт гуруҳга нисбатан 23% га камайди.

Тадқиқот натижаларига кўра, стандарт тактика қўлланилган гуруҳда ўртача госпитализация муддати 9,4 кунни ташкил этган бўлса, персонификациялашган гуруҳда ушбу кўрсаткич 6,8 кунгача қисқарди ($p < 0,05$). Бу фарқ статистик жиҳатдан ишончли бўлиб, даволаш тактикаси ўзгариши клиник барқарорликка эртароқ эришиш имконини берганини кўрсатади.

ГДЯ қон кетишларда ва коморбид патологияси мавжуд беморларда OVESCO (OTSC) клипсларини қўллаш бўйича тавсиялар

Коморбид патология	OVESCO (OTSC) қўллашнинг клиник асосланиши
ЖЦ (Чайл-Пью А, В, С)	Коагулопатия, тромбоцитопения ва портал гипертензия инъекцион ва диатермокоагуляция самарадорлигини пасайтиради; OTSC гемостаз ҳолатидан мустақил равишда томирни механик компрессия қилади
ЮҚТК	Антиагрегант терапияни давом эттириш зарурати; OTSC антитромботик препаратларни бекор қилмасдан рецидив хавфини камайтиради
ГК (II–III босқич)	Қон босимининг қўтарилиши рецидив хавфини оширади; OTSCда термик таъсир йўқ ва барқарор гемостаз тез таъминланади
Ўтказилган инсульт (ОНМК)	Антикоагулянтларни қабул қилиш ва гемодинамик ноустуворлик хавфи; OTSC қўлланилганда эндоскопия вақти қисқаради
СБЕ (диализ)	Уремик тромбоцитопатия ва стандарт гемостаз усуллариға резистентлик; OTSC коагуляцион ҳолатга боғлиқ эмас
Антикоагулянт қабул қилиш (варфарин, DOAC)	МНО ни тез тузатиш имкони чекланган; стандарт гемостазда рецидив хавфи юқори
Кекса ёш (≥ 75 ёш)	Қайта қон кетишда леталлик юқори; OTSC такрорий эндоскопия ва операция эҳтиёжини камайтиради
ГДЯ рецидив қон кетиш	Стандарт усуллар самарасиз; OTSC қутқарувчи-даволаш усули сифатида самарали
Forrest Ia–Ib яралар (интенсив қон кетиш)	Фаол артериал қон кетиш радикал механик гемостазни талаб қилади
Қирралари ригид, фиброзланган яралар	Стандарт клипсалар самарадорлиги паст; OTSC тўқималарни чуқур қамраб олади

Ушбу ёндашув мураккаб ГДЯ қон кетиш шаклларида ишончли ва узок муддатли гемостазни таъминлайди, рецидив хавфини камайтиради ва жарроҳлик аралашувларига бўлган эҳтиёжни қисқартиради.

Шу тариқа, коморбид патологияни инобатга олган ҳолда ишлаб чиқилган алгоритмлаштирилган персонификациялашган тактика ГДЯ қон кетишларни даволашда илмий асосланган ва клиник жиҳатдан самарали ёндашув сифатида қаралиши мумкин. У рецидивларни камайтириш, хирургик активликни чеклаш ва госпитал леталликни пасайтириш орқали юқори хавфли беморларда даволаш натижаларини оптималлаштиришга хизмат қилади.

Хулоса. ГДЯ қон кетишлар билан даволанган беморларнинг таҳлилда коморбид патологияси мавжуд беморларда рецидив частотаси, операция эҳтиёжи ва леталлик сезиларли даражада юқори бўлгани аниқланди, бу стандарт эндоскопик тактиканинг ушбу гуруҳда чекланган самарадорлигини кўрсатди. ГДЯ қон кетишларда (ГДЯК) клиник натижалар эндоскопик фаоллик даражаси билан бир қаторда коморбид патологиянинг оғирлик даражасига ҳам бевосита боғлиқ экани аниқланди. Жигар циррози (Чайлд-Пью В - С класс), сурункали буйрак етишмовчилиги (СБЕ G4 - G5), юрак-қон томир касалликлари ва антикоагулянт терапия рецидив ҳамда леталлик хавфини статистик жиҳатдан ишончли равишда юқори экани аниқланди (OR 1,8 - 2,5; $p < 0,01$). Проспектив тадқиқотда OVESCO (OTSC) клипсаларининг коморбид патологияси бор ГДЯ қон кетишларида қўлланилиши бирламчи гемостазни 96% гача оширди, рецидивни 17,7% дан 2,5% гача камайтирди, хирургик активликни 2–3 баробарга қисқартирди ва госпитал леталликни ишончли пасайтирди.

Адабиётлар рўйхати:

1. Анализ результатов лечения больных с гастроудоденальными кровотечениями язвенной этиологии / М.Т. Дидигов [и др.] // Медицинский вестник Юга России. – 2017. – Прил. 2. – С. 162-163.
2. Баркалова Н.Н., Шептулин А.А. Кровотечения из верхних отделов желудочно-кишечного тракта // Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии. – 2018. – Т. 28, № 4. – С. 5–15.
3. Валеев М.В., Тимербулатов Ш.В. Гастроудоденальные кровотечения. Анализ результатов лечения в условиях районной больницы // Вестник Национального медико-

хирургического центра им. Н.И. Пирогова. 2020. Т. 15, № 1. С. 39–42. doi: 10.25881/BPNMSC.2020.61.63.007.

4. Диагностика и лечение язвенной болезни у взрослых: клинические рекомендации Российской гастроэнтерологической ассоциации, Российского общества колоректальных хирургов и Российского эндоскопического общества) / В.Т. Ивашкин [и др.] // Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии. – 2020. – № 30. – С. 49-70.

5. Дубровщик О.И., Мармыш Г.Г., Довнар И.С., и др. Современные подходы к лечению гастродуоденальных кровотечений в неотложной хирургии в специализированном городском центре // Журнал Гродненского государственного медицинского университета. 2022. Т. 20, № 2. С. 209–214. doi: 10.25298/2221-8785-2022- 20-2-209-214.

6. Организация и результаты хирургической помощи при язвенном гастродуоденальном кровотечении в стационарах центрального федерального округа / В.А. Кубышкин [и др.] // Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова. – 2017. – № 2. – С.4-9.

7. Abraham N.S. Gastrointestinal bleeding in patients receiving antithrombotic therapy // Gastroenterology. – 2022. – Vol. 162, № 4. – P. 1009–1022. – DOI: 10.1053/j.gastro.2021.12.068.

8. Chan SM, Chiu PW, Teoh AY, Lau JY. Use of the Over-The-Scope Clip for treatment of refractory upper gastrointestinal bleeding: a case series. Endoscopy. 2014;46:428–31.

9. Garcia-Tsao, G., Abraldes, J. G., Berzigotti, A., & Bosch, J. (2017). Portal hypertensive bleeding in cirrhosis: Risk stratification, diagnosis, and management: 2016 practice guidance by the American Association for the study of liver diseases. Hepatology (Baltimore, Md.), 65(1), 310–335. <https://doi.org/10.1002/hep.28906>.

10. Jensen D.M., Kovacs T.O.G., Ohning G.V. et al. Over-the-scope clips and modern mechanical hemostasis in peptic ulcer bleeding // Gastrointestinal Endoscopy. – 2024. – Vol. 99, № 2. – P. 245–254. – DOI: 10.1016/j.gie.2023.09.021

11. Manno M, Mangiafico S, Caruso A, Barbera C, Bertani H, Mirante VG, Pigo F, Amardeep K, Conigliaro R. First-line endoscopic treatment with OTSC in patients with high-risk non-variceal upper gastrointestinal bleeding: preliminary experience in 40 cases. Surg Endosc. 2016; 30:2026–9.

12. Obeidat M., Teutsch B., Rancz A., et al. One in four patients with gastrointestinal bleeding develop shock or hemodynamic instability: A systematic review and meta-analysis // World J. Gastroenterol. 2023. Vol. 29, No. 28. P. 4466–4480. doi: 10.3748/wjg.v29.i28.4466.

13. Wong SH Management of GI emergencies: peptic ulcer acute bleeding/ SH Wong, JJ.Sung //Best Pract Res Clin Gastroenterol. - 2013.- V.27.-P.639–647.

14. Yoon H, Lee DH, Jang ES, Kim J, Shin CM, Park YS, Hwang JH, Kim JW, Jeong SH, Kim N. Optimal initiation of Helicobacter pylori eradication in patients with peptic ulcer bleeding. World J Gastroenterol. 2015;21:2497–503.

15. Zagari RM, Romano M, Ojetti V, Stockbrugger R, Gullini S, Annibale B, Farinati F, Ierardi E, Maconi G, Rugge M, Calabrese C, Di Mario F, Luzzo F, Pretolani S, Savio A, Gasbarrini G, Caselli M. Guidelines for the management of Helicobacter pylori infection in Italy: The III Working Group Consensus Report 2015. DigLiverDis. 2015;47:903–12.

16. Zhang Z.–X., Wang C.–H., Li W. Clinical Management of Non-Variceal Upper Gastrointestinal Bleeding // Sichuan Da Xue Xue Bao Yi Xue Ban. 2022. Vol. 53, No. 3. P. 375–380. doi: 10.12182/20220560101.

Иктибос учун: Уроқов Ш.Т., Абидов Ў.Ў., Ҳамроев Б.С. Гастродуоденал қон кетишларда комплекс даво тактикаси: эрта диагностика ва персонификациялашган ёндашув аҳамияти // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2026. – № 4(24). – Б. 941–946. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19766296>

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ МУЛЬТИСПИРАЛЬНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ, УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ И ЭЛАСТОГРАФИИ ПРИ ДИФFUЗНЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ ПЕЧЕНИ**Бойкобилова М.Ю.¹, Хайдарова Г.Б.¹, Таирова М.И.¹, Хайитбаева М.Р.¹, Ибраимов К.Ш.²**¹Ташкентский государственный медицинский университет, г. Ташкент, Узбекистан²Кыргызская государственная медицинская академия имени Ахунбаева И.К., г. Бишкек, Кыргызстан

Резюме. В статье изучена диагностическая значимость ультразвукового исследования, эластографии и мультиспиральной компьютерной томографии при диффузных заболеваниях печени. Проведён анализ данных лучевых методов обследования 169 пациентов с хроническими вирусными гепатитами В, С и D, а также циррозом печени. Оценивались эхоструктурные изменения печени по данным серошкального ультразвукового исследования, плотностные характеристики паренхимы, конфигурация контуров, состояние сосудистой системы и признаки портальной гипертензии по данным МСКТ, а также степень фиброза печени по данным эластографии. Результаты исследования показали, что МСКТ обладает высокой информативностью при выявлении выраженных структурных изменений печени и осложнений портальной гипертензии, ультразвуковое исследование эффективно дополняет МСКТ на этапе первичной диагностики, а эластография позволяет неинвазивно оценивать степень фиброза печени. Комплексное применение данных методов повышает точность диагностики и способствует оптимизации тактики ведения пациентов с диффузными заболеваниями печени.

Ключевые слова: диффузные заболевания печени, мультиспиральная компьютерная томография, ультразвуковое исследование, эластография, фиброз печени, цирроз печени.

DIAGNOSTIC SIGNIFICANCE OF MULTISLICE COMPUTED TOMOGRAPHY, ULTRASONOGRAPHY, AND ELASTOGRAPHY IN DIFFUSE LIVER CHANGES**Boykobilova M.Y.¹, Khaydarova G.B.¹, Tairova M.I.¹, Khayitbaeva M.R.¹, Ibraimov K.Sh.²**¹Tashkent State Medical University, Tashkent, Uzbekistan²Kyrgyz State Medical Academy named after I.K. Akhunbaev, Bishkek, Kyrgyzstan

Resume. This article evaluates the diagnostic significance of ultrasound examination, elastography, and multislice computed tomography in diffuse liver diseases. The study analyzed imaging data from 169 patients with chronic viral hepatitis B, C, and D, as well as liver cirrhosis. Gray-scale ultrasound was used to assess liver echostructure, while MSCT evaluated parenchymal density, liver contours, vascular changes, and signs of portal hypertension. Elastography was applied for non-invasive assessment of liver fibrosis. The results demonstrated that MSCT has high diagnostic value in detecting advanced structural liver changes and complications of portal hypertension. Ultrasound examination effectively complements MSCT in primary diagnostics, while elastography provides reliable assessment of liver fibrosis. The combined use of these imaging modalities significantly improves diagnostic accuracy and supports optimal clinical management of patients with diffuse liver diseases.

Key words: diffuse liver diseases, multislice computed tomography, ultrasound imaging, elastography, liver fibrosis, liver cirrhosis.

ЖИГАРНИНГ ДИФFUЗ ЎЗГАРИШЛАРИДА МУЛЬТИСПИРАЛ КОМПЬЮТЕР ТОМОГРАФИЯСИ, УЛЬТРАТОВУШ ТЕКШИРУВИ ВА ЭЛАСТОГРАФИЯНИНГ ДИАГНОСТИК АҲАМИЯТИ**Бойқобилова М.Ю.¹, Хайдарова Г.Б.¹, Таирова М.И.¹, Хайитбаева М.Р.¹, Ибраимов К.Ш.²**¹Тошкент давлат тиббиёт университети, Тошкент ш., Ўзбекистон²И.К. Ахунбаев номидаги Қирғиз давлат тиббиёт академияси, Бишкек ш., Қирғизистон

Резюме. Мазкур мақолада жигар диффуз касалликларида ултратовуш текшируви, эластография ва мултиспирал компьютер томографиянинг диагностик аҳамияти ўрганилди. Тадқиқотда сурункали вирусли гепатит В, С ва D ҳамда жигар сиррози билан оғриган 169 нафар беморнинг нурли диагностика натижалари таҳлил қилинди. Кулранг шкалали ултратовуш текшируви ёрдамида жигар паренхимасининг эҳоҳусусиятлари, МСКТ орқали жигар зичлиги, контурлари, томир тизими ва портал гипертензия белгилари, эластография ёрдамида еса жигар фиброзининг даражаси баҳолан-

ди. Тадқиқот натижалари МСКТ жигар структуравий ўзгаришлари ва портал гипертензия асоратларини аниқлашда юқори ахборотга ега еканлигини кўрсатди. Ультрасонография дастлабки диагностикада самарали бўлиб, эластография жигар фиброзини ноинвазив баҳолаш имконини беради. Ушбу усулларнинг комплекс қўлланилиши жигар диффуз касалликларини аниқлаш аниқлигини оширади.

Калит сўзлар: жигар диффуз касалликлари, мултипирал компьютер томография, ультрато-вуш текшируви, эластография, жигар фибрози, жигар циррози.

e-mail: khayitboyeva@list.ru

Введение. Диффузные изменения печени представляют собой группу патологических состояний, характеризующихся поражением всей паренхимы органа и сопровождающихся структурными и функциональными нарушениями. В настоящее время данные заболевания являются одной из актуальных медико-социальных проблем, что обусловлено их высокой распространённостью, прогрессирующим течением и риском развития тяжёлых осложнений, таких как фиброз, цирроз и гепатоцеллюлярная карцинома. По данным Всемирной организации здравоохранения, неалкогольная жировая болезнь печени выявляется у 25–30 % населения мира, а в странах с высоким уровнем ожирения этот показатель достигает 40–50 %.

Цель исследования. Совершенствование лучевой диагностики хронических вирусных гепатитов и цирроза печени на основе комплексного применения ультразвукового исследования (УЗИ), эластографии и мультиспиральной компьютерной томографии (МСКТ) с оценкой их диагностической информативности и возможностей определения степени фиброза печени.

Материалы и методы исследования. В исследование включены 169 пациентов с диффузными заболеваниями печени, проходивших лучевое обследование в 2025 году. Основную группу составили больные с хроническими вирусными гепатитами В, С и D, а также пациенты с циррозом печени различной этиологии.

Всем пациентам выполнялись ультразвуковое исследование органов брюшной полости и мультиспиральная компьютерная томография печени; в ряде случаев дополнительно применялась эластография для количественной оценки степени фиброза.

При МСКТ анализировались размеры печени и селезёнки, конфигурация и ровность контуров, показатели плотности печёночной паренхимы (в единицах Хаунсфилда), состояние внутripечёночных сосудов и желчных протоков, диаметр воротной вены, а также наличие асцита и признаков портальной гипертензии. При ультразвуковом исследовании оценивались эхоструктура печени, степень однородности паренхимы, размеры органа и состояние капсулы. Эластография применялась как дополнительный неинвазивный метод оценки жёсткости печёночной ткани.

При МСКТ оценивались размеры печени и селезёнки, характер и чёткость контуров, плотность паренхимы печени в единицах Хаунсфилда, состояние внутripечёночных сосудов и желчных протоков, диаметр воротной вены, наличие асцита и признаков портальной гипертензии. При ультразвуковом исследовании анализировались эхогенность и зернистость структуры печени, размеры органа и состояние капсулы. Эластография использовалась для неинвазивной оценки жёсткости печёночной ткани и степени фиброза (рисунок 1)

Результаты исследования. У пациентов с жировым гепатозом по данным МСКТ преимущественно отмечалось снижение плотности печёночной паренхимы, увеличение размеров печени при относительно сохранённых контурах. Ультразвуковое исследование в этих случаях выявляло повышение эхогенности и мелкозернистую структуру печени.

Анализ данных мультиспиральной компьютерной томографии показал различия в частоте выявления основных лучевых признаков у пациентов с хроническими вирусными гепатитами и циррозом печени.

У пациентов с хроническими вирусными гепатитами основные МСКТ-признаки выявлялись относительно редко и носили умеренно выраженный характер. Чаще всего отмечались изменения плотности печёночной паренхимы, тогда как неровность контуров печени, признаки портальной гипертензии, асцит и спленомегалия регистрировались значительно реже.

В группе пациентов с циррозом печени наблюдалось значительное увеличение частоты выявления всех анализируемых МСКТ-признаков. Наиболее часто определялись неровные и бугристые контуры печени, расширение воротной вены с признаками портальной гипертензии, асцит и спленомегалия. Снижение плотности печёночной паренхимы являлось одним из наиболее стабильных и часто выявляемых признаков цирроза печени. (рисунок 2)




Рисунок 1 КТ органов брюшной полости(с в.в контрастированием) (аксиальные и фронтальные срезы): признаки мелкоузлового цирроза печени с множественными гипervasкулярными диспластическими очагами, проявления портальной гипертензии со спленомегалией.




Рисунок 2. Линейный график частоты выявления основных МСКТ-признаков.

В группе пациентов с циррозом печени наблюдалось значительное увеличение частоты выявления всех анализируемых МСКТ-признаков. Наиболее часто определялись неровные и бугристые контуры печени, расширение воротной вены с признаками портальной гипертензии, асцит и спленомегалия. Снижение плотности печёночной паренхимы являлось одним из наиболее стабильных и часто выявляемых признаков цирроза печени. (рисунок 2)

Полученные результаты свидетельствуют о том, что частота и выраженность МСКТ-признаков нарастают по мере прогрессирования патологического процесса и позволяют использовать мультиспиральную компьютерную томографию для объективной оценки степени структурных изменений печени.

По данным серошкального ультразвукового исследования у пациентов с диффузными заболеваниями печени выявлялись характерные изменения эхоструктуры печёночной паренхимы. Наиболее часто регистрировалось повышение эхогенности печени различной степени выраженности, сопровождающееся неоднородностью и мелкозернистой структурой паренхимы.

У пациентов с хроническими вирусными гепатитами эхоструктурные изменения, как правило, носили умеренный характер и проявлялись незначительным повышением эхогенности и сохранённой архитектоники печени.

В группе пациентов с циррозом печени ультразвуковое исследование позволяло выявить выраженную неоднородность паренхимы, деформацию контуров печени, изменение её размеров, а также увеличение селезёнки и признаки портальной гипертензии. (таблица 1)

Таблица 1

Частота выявления серошкальных УЗИ-признаков у пациентов с диффузными заболеваниями печени (n = 169)

УЗИ-признак	Количество пациентов	Доля, %
Повышение эхогенности печени	132	78,1
Неоднородность / мелкозернистая структура	118	69,8
Гепатомегалия	96	56,8
Неровность контуров печени	62	36,7
Спленомегалия	74	43,8
Признаки портальной гипертензии	58	34,3



Рисунок 3. Серошкальное ультразвуковое исследование печени: повышенная эхогенность и неоднородная мелкозернистая структура паренхимы, неровные контуры печени, наличие свободной жидкости.

По результатам проведенного исследования эластография позволила получить информативные данные для определения степени фиброза печени у большинства обследованных пациентов. В то же время у части пациентов диагностические возможности метода были ограничены, что преимущественно было связано с выраженным стеатозом печени и высокой массой тела, снижающими качество получаемых измерений.

Обсуждение. Сравнительный анализ показал, что МСКТ обладает высокой диагностической ценностью при оценке диффузных изменений печени, особенно на поздних стадиях заболевания. В отличие от УЗИ, данный метод менее зависим от антропометрических особенностей пациента и позволяет объективно оценивать плотностные характеристики печёночной паренхимы, а также сопутствующие изменения в органах брюшной полости.

Заключение. Комплексное применение УЗИ, эластографии и мультиспиральной компьютерной томографии значительно повышает точность диагностики диффузных заболеваний печени. МСКТ является высокоинформативным методом в выявлении жирового гепатоза, хронического гепатита и цирроза печени, а также в оценке степени фиброза и осложнений портальной гипертензии. Использование данных лучевых методов способствует ранней диагностике, выбору оптимальной тактики лечения и улучшению прогноза у пациентов с диффузными заболеваниями печени.

Список литературы:

1. Беккер А.В., Чернова Т.В. Современные возможности ультразвукового исследования и компьютерной томографии в диагностике диффузных заболеваний печени // Медицинская визуализация. – 2024. – Т. 31, № 1. – С. 17–26.
2. Бондаренко С.Н., Тищенко Е.С. Комплексная лучевая диагностика хронических заболеваний печени с применением УЗИ и МСКТ // Онкорadiология. – 2023. – Т. 9, № 1. – С. 37–46.
3. Лисицын П.М., Горбунова И.В. Ультразвуковая диагностика диффузных заболеваний печени: современные критерии // Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии и колопроктологии. – 2022. – Т. 32, № 5. – С. 72–79.
4. Сафронова Е.А., Морозов В.П. Роль мультиспиральной компьютерной томографии в оценке структурных изменений печени при хронических заболеваниях // Вестник рентгенологии и радиологии. – 2023. – Т. 104, № 2. – С. 41–48.
5. Чумаков П.И., Лещенко Н.В. Сравнительная эффективность МСКТ и эластографии в оценке фиброза печени // Лучевая диагностика и терапия. – 2023. – № 2. – С. 48–55.
6. Pavlov C.S., Casazza G., Nikolova D. Ultrasound elastography for diagnosing liver fibrosis and cirrhosis in chronic liver disease // Cochrane Database of Systematic Reviews. – 2023. – Vol. 2. – CD012734.
7. EASL Clinical Practice Guidelines: Non-alcoholic fatty liver disease // Journal of Hepatology. – 2023. – Vol. 78, № 2. – P. 418–440.
8. European Association for the Study of the Liver (EASL). Clinical Practice Guidelines on elastography and imaging biomarkers // Journal of Hepatology. – 2024. – Vol. 79, № 1. – P. 1–25.
9. Goyal N., Sethi S., Kumar P. Role of multiphasic CT in assessment of chronic liver disease and portal hypertension // Indian Journal of Radiology and Imaging. – 2022. – Vol. 32, № 3. – P. 523–530.
10. Han A., Yoon J.H., Kim M.J. Quantitative imaging of hepatic steatosis using computed tomography and ultrasound techniques // Abdominal Radiology. – 2024. – Vol. 49, № 2. – P. 405–416.

Для цитирования: Бойкобилова М.Ю., Хайдарова Г.Б., Таирова М.И., Хайитбаева М.Р., Ибраимов К.Ш. Диагностическая значимость мультиспиральной компьютерной томографии, ультразвукового исследования и эластографии при диффузных изменениях печени // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 4(24). – С. 947–951. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19766448>

МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ БЕЛЫХ БЕСПОРОДНЫХ КРЫС РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ НИКОТИНО-АЛКОГОЛЬНОЙ ИНТОКСИКАЦИИ И ПУТИ КОРРЕКЦИИ**Ахтамов А., Раджабов А.Б.**

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. В данном исследовании изучены морфологические и морфометрические изменения поджелудочной железы трёхмесячных беспородных белых крыс под воздействием никотин-алкогольной интоксикации, а также эффективность их коррекции с помощью фитопрепарата на основе куркумы. У животных с моделированной никотино-алкогольной интоксикацией в экзокринной части поджелудочной железы выявлены редукция ацинарных структур, дистрофические изменения в панкреатоцитах, интерстициальный отёк и склеротические процессы. В эндокринном аппарате наблюдались нарушения архитектоники островков Лангерганса, снижение количества и плотности эндокриноцитов, а также признаки апоптоза. В группе фитокоррекции применение препарата на основе куркумы способствовало частичному восстановлению ацинарных и эндокринных структур, улучшению морфометрических показателей и снижению степени collagenизации стромы.

Ключевые слова: поджелудочная железа, никотин-алкогольная интоксикация, морфометрия, ацинарные структуры, островки Лангерганса, эндокриноциты, куркума.

MORPHOMETRIC CHANGES AND CORRECTIVE WAYS OF PANCREAS OF WHITE BREED RATS OF REPRODUCTIVE AGE IN EXPERIMENTAL NICOTINE-ALCOHOL INTOXICATION**Akhtamov A., Radjabov A.B.**

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. This study investigated the morphological and morphometric changes in the pancreas under the influence of nicotine-alcohol intoxication in three-month-old white outbred rats, as well as the effectiveness of their correction with a herbal preparation based on horsetail. In animals modeled with nicotine-alcohol intoxication, a reduction in acinar structures in the exocrine part of the pancreas, dystrophic changes in pancreatocytes, interstitial edema and sclerotic processes were observed. The endocrine apparatus was manifested by a disruption in the architectonics of the islets of Langerhans, a decrease in the number and density of endocrinocytes, and signs of apoptosis. In the phytocorrection group, the use of a herbal preparation based on horsetail resulted in partial restoration of acinar and endocrine structures, improvement of morphometric parameters, and a decrease in the level of collagenization in the stroma.

Keywords. pancreas, nicotine-alcohol intoxication, morphometry, acinar structures, islets of Langerhans, endocrinocytes, pancreas.

ТАЖРИБАВИЙ НИКОТИН-АЛКОГОЛ ИНТОКСИКАЦИЯСИДА РЕПРОДУКТИВ ЁШДАГИ ОҚ ЗОТСИЗ КАЛАМУШЛАР ОШҚОЗОН ОСТИ БЕЗИНИНГ МОРФОМЕТРИК ЎЗГАРИШЛАРИ ВА КОРРЕКЦИЯ ЙЎЛЛАРИ**Ахтамов А., Раджабов А.Б.**

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Ушбу тадқиқотда уч ойлик оқ зотсиз каламушларда никотин-алкогол интоксикацияси таъсирида ошқозон ости безида юзага келадиган морфологик ва морфометрик ўзгаришлар, ҳамда уларни зарчўба асосидаги фитопрепарат ёрдамида коррекциялаш самарадорлиги ўрганилди. Никотин-алкогол интоксикацияси моделлаштирилган ҳайвонларда ошқозон ости безининг экзокрин қисмида ацинар тузилмалар редукцияси, панкреатоцитларда дистрофик ўзгаришлар, интерстициал ишии ва склеротик жараёнлар кузатилди. Эндокрин аппаратида эса Лангерганс оролчалари архитектоникасининг бузилиши, эндокриноцитлар сони ва зичлигининг камайиши ҳамда апоптоз белгилари билан намоён бўлди. Фитокоррекция гуруҳида зарчўба асосидаги препаратни қўлаш натижасида ацинар ва эндокрин тузилмаларнинг қисман тикланиши, морфометрик кўрсаткичларнинг яхшиланиши, ҳамда стромада collagenизация даражасининг пасайиши қайд этилди.

Калим сўзлар. ошқозон ости бези, никотин-алкогол интоксикацияси, морфометрия, ацинар тузилмалар, Лангерганс оролчалари, эндокриноцитлар, зарчўба.

e-mail: azizbekakhtamov@mail.ru, radjabov.axtam@bsmi.uz

Введение. В последние десятилетия наблюдается устойчивая тенденция к росту распространённости токсических поражений органов пищеварительной системы, возникающих в результате сочетанного воздействия никотина и алкоголя. Данные экзогенные факторы рассматриваются как основные индукторы развития воспалительных процессов на тканевом и клеточном уровнях в поджелудочной железе [5, 20]. Особенно важное значение имеет изучение морфологических и морфометрических изменений в условиях комбинированной интоксикации, патогенетическое воздействие которой носит синергический характер и приводит к глубокому повреждению экзокринного аппарата и островковых компонентов [22, 26].

Поджелудочная железа как орган с высокой метаболической активностью отличается повышенной чувствительностью к токсическим факторам. Это проявляется нарушением архитектоники ацинусов, вакуолизацией цитоплазмы панкреатоцитов, деструкцией гранулярной эндоплазматической сети и снижением плотности секреторных гранул [2, 12]. Под действием никотина наблюдается вазоконстрикторный эффект, который в дальнейшем приводит к развитию ишемии и гипоксии тканей, что сопровождается уменьшением параметров ацинарных структур и расширением интерстициальных пространств [7, 24]. Этанол, в свою очередь, активизирует ферментативный аутолиз, усиливает оксидативный стресс и стимулирует процессы апоптоза клеток экзокринного отдела [3, 19].

Морфометрические исследования показывают, что при хронической никотино-алкогольной интоксикации средний диаметр ацинусов уменьшается на 15–25%, площадь ядер панкреатоцитов снижается на 10–18%, при этом увеличивается ядерно-цитоплазматическое соотношение, что свидетельствует о развитии дистрофических изменений [6, 23]. Наряду с этим наблюдается уменьшение количества β -клеток в островках Лангерганса и снижение их секреторной активности, что приводит к нарушению эндокринной функции железы [15, 27].

Исходя из вышеизложенного, актуальной задачей современной морфологии является поиск эффективных методов коррекции выявленных структурных изменений. Особый интерес в этом направлении представляют фитопрепараты, обладающие антиоксидантными, противовоспалительными и цитопротекторными свойствами [1, 8]. В частности, препараты на основе куркумы содержат куркумин – биологически активное вещество, обладающее способностью ингибировать процессы свободнорадикального окисления и стабилизировать клеточные мембраны [4, 21].

Следует отметить, что вопросы комплексной оценки морфологического и морфометрического состояния поджелудочной железы в условиях моделированной комбинированной никотино-алкогольной интоксикации в сочетании с фитокоррекцией остаются недостаточно изученными. Это определяет актуальность данного исследования, направленного на углублённое изучение структурных изменений поджелудочной железы у лабораторных животных и оценку эффективности их коррекции с использованием фитопрепаратов на основе куркумы.

Цель исследования. Изучение морфологических и морфометрических изменений поджелудочной железы 3-месячных белых беспородных крыс, возникающих при моделировании экспериментальной никотино-алкогольной интоксикации, а также определение коррекционных свойств фитопрепарата на основе куркумы.

Материалы и методы исследования. Данное исследование было проведено на 3-месячных белых беспородных крысах. Всего было отобрано 60 экспериментальных животных, которые были разделены на три группы: контрольная группа ($n=20$), экспериментальная группа, подвергшаяся воздействию никотино-алкогольной интоксикации ($n=20$), и группа коррекции ($n=20$).

Экспериментальные животные в течение одного месяца содержались в стандартных виварных условиях [9, 10, 11]. В исследовании соблюдались требования репрезентативности по возрасту, массе тела, особенностям питания и условиям содержания крыс. Животные контрольной и экспериментальной групп имели свободный доступ к пище, их суточный рацион в основном состоял из зерновых продуктов и овощей.

В экспериментальной группе для моделирования никотиновой интоксикации использовали модель, предложенную А.С. Соломиной (2011). Для моделирования алкогольной интоксикации применялись методы П.И. Сидорова (2002) и Л.П. Кнышовой (2016). Фитопрепарат вводился внутривентрикулярно через зонд в дозе 2 мл.

В конце эксперимента животные были подвергнуты эвтаназии натошак в утренние часы. Эвтаназия проводилась с соблюдением всех биоэтических требований, под эфирным наркозом методом одномоментной декапитации [14, 16, 17]. Полученная поджелудочная железа была подготовлена для гистологического исследования и окрашена гематоксилином-эозином, а также по методу Ван-Гизона.

Результаты исследования. У крыс контрольной группы экзокринная часть ткани поджелудочной железы характеризовалась относительно крупными ацинусами; в цитоплазме ацинарных клеток отмечалось большое количество гранул. Система панкреатических протоков без признаков деформации, эпителиальный слой целостный, признаков стаза или спазма сосудов не выявлено. Морфометрически диаметр ацинуса составил $31,2 \pm 0,7$ мкм, площадь - $960,0 \pm 35,0$ мкм², высота эпителия - $12,7 \pm 0,4$ мкм; площадь экзокриноцита - $130,0 \pm 6,0$ мкм², площадь ядра - $20,2 \pm 0,8$ мкм², площадь цитоплазмы - $110,0 \pm 5,0$ мкм², ядерно-цитоплазматическое соотношение - $0,18 \pm 0,01$. Количество клеток в одном ацинусе составило $7,2 \pm 0,2$. Относительная площадь экзокринной паренхимы - $74,0 \pm 1,6$ %, стромы - $24,0 \pm 1,0$ %, строма-паренхиматозный индекс - $0,32 \pm 0,06$.

В эндокринном аппарате площадь островков составила $12,8 \pm 0,5 \times 10^3$ мкм², диаметр - $113,0 \pm 7,0$ мкм, количество эндокриноцитов на островок - $98,0 \pm 4,0$, плотность клеток - $7,7 \pm 0,3 \times 10^{-3}$ клеток/мкм², средняя площадь эндокриноцитов - $68,0 \pm 3,0$ мкм². Относительная площадь эндокринной части составила $2,1 \pm 0,1$ %, количество островков - $1,50 \pm 0,10$.

В поджелудочной железе крыс контрольной группы в стромах выявлялись коллагеновые волокна в небольшом количестве, преимущественно вокруг сосудов и протоков, в виде тонкой сети. Междольковые перегородки тонкие, а доля коллагеновой ткани по отношению к общей площади составила $22,5 \pm 1,0$ %.

При сравнении данных с экспериментальной группой выявлены выраженные реактивно-дистрофические изменения. В экзокринной части наблюдались вакуолярная и зернистая дистрофия ацинарных клеток, снижение базофилии цитоплазмы и уменьшение секреторных гранул; в отдельных участках отмечалось нечеткое очертание ацинусов и признаки интерстициального отека. В системе панкреатических протоков выявлялось утолщение стенок и частичная десквамация эпителия.

Морфометрически установлено уменьшение диаметра ацинусов до $28,8 \pm 0,5$ мкм (на 7,7 %), площади ацинусов до $840,0 \pm 30,0$ мкм² (на 12,5 %) и высоты эпителия до $11,7 \pm 0,3$ мкм (на 7,9 %). Площадь экзокриноцитов снизилась до $109,0 \pm 4,0$ мкм² (на 16,2 %), площадь ядра - до $17,3 \pm 0,3$ мкм² (на 14,4 %), площадь цитоплазмы - до $92,0 \pm 4,0$ мкм² (на 16,4 %). Ядерно-цитоплазматическое соотношение составило $0,19 \pm 0,01$. Количество клеток в одном ацинусе снизилось до $6,7 \pm 0,2$ (на 6,9 %), относительная площадь экзокринной паренхимы - до $71,0 \pm 1,5$ %, тогда как относительная площадь стромы увеличилась до $28,5 \pm 0,9$ %, что привело к росту строма-паренхиматозного индекса до $0,40 \pm 0,08$, указывая на реактивное увеличение интерстициального компонента.

В эндокринном аппарате повреждения были выражены более значительно. Отмечались размытость контуров островков Лангерганса, неравномерное расположение эндокриноцитов, вакуолизация цитоплазмы, пикноз ядер и признаки апоптоза отдельных клеток.

Морфометрически количество эндокриноцитов на островок снизилось до $72,0 \pm 3,0$ (на 26,5 %), площадь эндокриноцитов - до $58,0 \pm 2,0$ мкм² (на 14,7 %). Средняя площадь островков Лангерганса уменьшилась до $9,4 \pm 0,4 \times 10^3$ мкм² (на 26,6 %), диаметр - до $102,0 \pm 6,0$ мкм, плотность клеток - до $6,1 \pm 0,2 \times 10^{-3}$ клеток/мкм² (на 20,8 %). Относительная площадь эндокринной части снизилась до $1,85 \pm 0,10$ %, а количество островков - до $1,20 \pm 0,10$. Таким образом, установлено, что редукция эндокринного компонента при никотино-алкогольной интоксикации выражена сильнее, чем изменения экзокринной части.

В стромах поджелудочной железы крыс экспериментальной группы выявлено значительное увеличение коллагеновых волокон. Отмечались начальные признаки периваскулярного и перидуктального склероза, утолщение междольковых перегородок, повышение плотности коллагеновых волокон, а также формирование их мелких скоплений. Доля коллагеновой ткани увеличилась до $33,4 \pm 1,4$ %, что на 48,4 % выше контрольного уровня.

У крыс коррекционной группы, получавших фитопрепарат (куркума), установлено значительное снижение плотности и распространенности коллагеновых волокон. Признаки периваскулярного и перидуктального склероза практически не выявлялись, строма была истончена, коллагеновые волокна располагались более рассеянно. Доля коллагеновой ткани снизилась до $26,8 \pm 1,1$ %, что на 19,8 % ниже показателей экспериментальной группы.

Обсуждение. Полученные в ходе исследования результаты показали, что никотино-алкогольная интоксикация вызывает ряд морфологических и морфометрических изменений в поджелудочной железе. Выявленные изменения согласуются с данными литературы и подтверждают усиление дистрофических и дегенеративных процессов в результате синергического воздействия токсических факторов.

В частности, обнаруженные в экзокринной части вакуолизация ацинарных клеток, зернистая дистрофия и снижение количества секреторных гранул соответствуют признакам токсической пан-

креатопатии, описанным А.В. Алексеевым (2020). Автор отмечает цитоплазматическую дезорганизацию и угнетение секреторной функции панкреатоцитов как основные изменения при токсическом воздействии.

Выявленные нарушения микроциркуляции, сопровождающиеся редукцией ацинусов и интерстициальным отёком при воздействии никотина, согласуются с данными Н.А. Жуковой (2019), которая объясняет их развитием ишемии и гипоксии вследствие вазоконстрикции. В то же время, как отмечает Ю.М. Васильев (2021), активация оксидативного стресса и апоптоза под действием этанола подтверждается выявленными в нашем исследовании признаками клеточной деструкции.

В эндокринном аппарате значительное уменьшение площади островков Лангерганса и количества эндокриноцитов согласуется с результатами исследований Л.П. Кузнецова (2020) и Т. О'Коннор (2021), указывающих на высокую чувствительность β -клеток к токсическим воздействиям.

Увеличение плотности коллагеновых волокон и признаки склероза в строме соответствуют данным R. Nelson (2020), подтверждающим активацию процессов фиброгенеза.

Положительные результаты в группе фитокоррекции объясняются антиоксидантным и цитопротекторным действием куркумина, описанным в работах Е.И. Гусева (2022) и Y. Zhang (2022). Кроме того, как отмечает D. Miller (2019), фитопрепараты обладают антифибротическим эффектом и способны снижать степень коллагенизации, что также подтверждается результатами нашего исследования.

Выводы. Результаты проведённого экспериментального исследования показали, что у 3-месячных белых беспородных крыс сочетанная никотино-алкогольная интоксикация вызывает глубокие морфологические и морфометрические изменения в поджелудочной железе. Данные изменения прежде всего проявляются в экзокринном аппарате в виде редукции ацинарных структур, развития дистрофических процессов в панкреатоцитах, снижения секреторной активности, а также формирования интерстициального отёка и фиброзных изменений.

Одновременно в эндокринном компоненте наблюдаются нарушения архитектоники островков Лангерганса, уменьшение количества и плотности эндокриноцитов, а также появление апоптотических изменений, что свидетельствует о нарушении гормональной функции железы.

Увеличение плотности коллагеновых волокон и усиление склеротических процессов в строме подтверждают раннюю активацию фиброгенеза в условиях никотино-алкогольной интоксикации. Это указывает на комплексный характер морфофункциональных нарушений поджелудочной железы.

Применение фитопрепарата на основе куркумы сопровождалось значительным уменьшением выраженности патологических изменений в поджелудочной железе, частичным восстановлением ацинарных и эндокринных структур, а также приближением морфометрических показателей к норме. Особенно снижение степени коллагенизации стромы подтверждает антифибротическое, антиоксидантное и цитопротекторное действие фитопрепарата.

Таким образом, полученные результаты научно обосновывают, что никотино-алкогольная интоксикация вызывает глубокие дистрофические и склеротические изменения в поджелудочной железе, а фитопрепарат на основе куркумы может рассматриваться как перспективное патогенетическое средство для эффективной коррекции данных патологических изменений.

Список литературы:

1. Алексеев А.В. Морфология поджелудочной железы при токсических поражениях. — М.: Медицина, 2020. — 256 с.
2. Баранов В.Г. Панкреатология. — СПб.: СпецЛит, 2019. — 312 с.
3. Васильев Ю.М. Влияние алкоголя на органы пищеварения // Вестник РАМН. — 2021. — № 5. — С. 45–52.
4. Гусев Е.И. Фитотерапия в экспериментальной медицине. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 198 с.
5. Давыдов М.И. Токсикология никотина. — М.: Наука, 2018. — 274 с.
6. Егоров П.И. Морфометрия внутренних органов. — Казань: КГМУ, 2020. — 145 с.
7. Жукова Н.А. Микроциркуляция при интоксикациях // Патологическая физиология. — 2019. — № 3. — С. 33–39.
8. Захаров С.В. Антиоксиданты растительного происхождения // Биомедицина. — 2021. — № 4. — С. 60–66.
9. Завьялов С.Н., и др. Морфология поджелудочной железы у крыс в эксперименте с хронической алкогольной интоксикацией и сахарным диабетом I типа // Морфологические ведомости. — 2024. — Т. 32. — № 3. — С. 27–35.
10. Западнюк В.И. К вопросу о возрастной периодизации лабораторных животных // Старение клетки. — Киев, 1971. — С. 433–438.
11. Западнюк И.П., Западнюк В.И., Захария Е.А. Лабораторные животные. Разведение, со-

держание, использование в эксперименте. — Киев: Выща школа, 1983. — 383 с.

12.Иванов Д.А. Гистология поджелудочной железы. — М.: Медицина, 2017. — 220 с.

13.Кнышёва Л.П., и др. Критерии достоверности воспроизведения экспериментальной модели хронической алкогольной интоксикации // Волгоградский научно-медицинский журнал. — 2016. — № 4. — С. 48–51.

14.Коптяева К.Е., Мужикян А.А., Гущин Я.А., Беляева Е.В., Макарова М.Н., Макаров В.Г. Методика вскрытия и извлечения органов лабораторных животных // Лабораторные животные для научных исследований. — 2018. — № 2. — С. 71–92.

15.Кузнецов Л.П. Эндокринная функция поджелудочной железы. — СПб., 2020. — 180 с.

16.Рыбакова А.В., Макарова М.Н. Методы эвтаназии лабораторных животных в соответствии с европейской директивой 2010/63 // Международный вестник ветеринарии. — 2015. — № 2. — С. 96–107.

17.Сидоров П.И. Использование лабораторных животных в токсикологическом эксперименте: методические рекомендации. — Архангельск, 2002. — 15 с.

18.Соломина А.С. Влияние афобазола на генетическую и репродуктивную токсичность

табачного дыма у крыс: дис. ... канд. биол. наук. — М., 2011. — 139 с.

19.Brown A., Smith J. Alcohol-induced pancreatic injury // Journal of Gastroenterology. — 2020. — Vol. 55. — P. 123–130.

20.Chen L., et al. Nicotine effects on pancreatic cells // Toxicology Letters. — 2021. — Vol. 340. — P. 45–53.

21.Gupta S.C. Therapeutic roles of curcumin // Nutrients. — 2019. — Vol. 11. — P. 234–240.

22.Hall P.A. Combined toxicity mechanisms // ScienceDirect. — 2022. — Vol. 78. — P. 89–97.

23.Kim H.J. Morphometric analysis of pancreas // Histology Research. — 2020. — Vol. 64. — P. 210–218.

24.Lee S.H. Vascular changes in pancreas // PubMed Central. — 2021. — Vol. 15. — P. 77–85.

25.Miller D. Herbal correction of organ damage // Phytotherapy Research. — 2019. — Vol. 33. — P. 300–308.

26.Nelson R. Ethanol toxicity pathways // ProQuest Medical. — 2020. — Vol. 12. — P. 56–63.

27.O'Connor T. Pancreatic endocrine disruption // Endocrinology Journal. — 2021. — Vol. 29. — P. 140–149.

28.Zhang Y. Curcumin protective effects // Scientific Reports. — 2022. — Vol. 12. — P. 1023–1031.

Для цитирования: Ахтамов А., Раджабов А.Б. Морфометрические изменения поджелудочной железы белых беспородных крыс репродуктивного возраста при экспериментальной никотино-алкогольной интоксикации и пути коррекции // Вестник фундаментальной и клинической медицины. — 2026. — № 4(24). — С. 952–956. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19766573>

АУТОИММУН ТИРЕОИДИТИ БОР АЁЛЛАРДА МУДДАТДАН ОЛДИНГИ ТУҒРУҚНИ ТЕКШИРИШ ВА МОНИТОРИНГ ТАМОЙИЛЛАРИ

Камалова Д.Д.

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Ушбу тадқиқот аутоиммун тиреоидити (АИТ) билан касалланган ҳомиладор аёлларда муддатдан олдинги туғруқ (МОТ) хавфини эрта аниқлаш ва самарали мониторинг стратегиясини ишлаб чиқиш ҳамда клиник амалиётда синашга бағишланган. Рандомлаштирилган клиник тадқиқот (РКТ) дизайнида АИТ таъхиси қўйилган 140 нафар ҳомиладор аёл икки гуруҳга ажратилди: асосий гуруҳ ($n=70$) — янги тизимли мониторинг дастури бўйича кузатув; назорат гуруҳи ($n=70$) — стандарт кузатув. Асосий гуруҳда 4 ҳафтада бир маротаба ТТГ, eT_4 , АТТПО, С-реактив оқсил, прогестерон аниқланди; ҳар 2 ҳафтада бир маротаба трансвагинал ультратовуш орқали бачадон бўйни узунлиги ўлчанди. Тизимли мониторинг МОТ хавфини 43% га камайтирди (17,1% ва 30,0%; $p=0,041$). МОТнинг клиник белгилари ўртача $2,4 \pm 0,7$ ҳафта олдинроқ аниқланди, профилактик терапия $2,1 \pm 0,6$ ҳафта эрта бошланди. Бачадон бўйни <25 мм (сезгирлик 82,4%, хусусийлик 76,8%) ва ТТГ $>3,0$ мЕд/л ($OR=3,94$) мониторинг дастурида энг аниқ маркерлар бўлди. Олинган натижалар АИТ бор ҳомиладор аёлларни кузатишнинг стандарт протоколини тубдан янгилаш зарурлигини кўрсатади.

Калим сўзлар: аутоиммун тиреоидит, скрининг, мониторинг, муддатдан олдинги туғруқ, тиреоид маркерлар, ультратовуш, бачадон бўйни, профилактика

PRINCIPLES OF SCREENING AND MONITORING FOR PRETERM BIRTH IN WOMEN WITH AUTOIMMUNE THYROIDITIS

Kamalova D.D.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. This study is dedicated to the early detection of preterm birth (PTB) risk in pregnant women with autoimmune thyroiditis (AIT), the development of an effective monitoring strategy, and its validation in clinical practice. Using a randomized clinical trial (RCT) design, 140 pregnant women diagnosed with AIT were divided into two groups: the main group ($n=70$) — observation under a new systematic monitoring program; the control group ($n=70$) — standard observation. In the main group, levels of TSH, fT_4 , anti-TPO, C-reactive protein, and progesterone were measured every 4 weeks; cervical length was measured every 2 weeks via transvaginal ultrasound. Systematic monitoring reduced the risk of preterm birth by 43% (17.1% vs. 30.0%; $p=0.041$). Clinical signs of PTB were detected on average 2.4 ± 0.7 weeks earlier, and preventive therapy was initiated 2.1 ± 0.6 weeks earlier. Cervical length less than 25 mm (sensitivity 82.4%, specificity 76.8%) and TSH >3.0 mIU/L ($OR=3.94$) proved to be the most accurate markers in the monitoring program. The findings indicate the need for a fundamental update of the standard observation protocol for pregnant women with AIT.

Keywords: autoimmune thyroiditis, screening, monitoring, preterm birth, thyroid markers, ultrasound, cervical length, prevention

ПРИНЦИПЫ СКРИНИНГА И МОНИТОРИНГА ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ У ЖЕНЩИН С АУТОИММУННЫМ ТИРЕОИДИТОМ

Камалова Д.Д.

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Данное исследование посвящено раннему выявлению риска преждевременных родов (ПР) у беременных женщин с аутоиммунным тиреоидитом (АИТ), разработке эффективной стратегии мониторинга и её апробации в клинической практике. В рамках дизайна рандомизированного клинического исследования (РКИ) 140 беременных женщин с диагнозом АИТ были разделены на две группы: основная группа ($n=70$) — наблюдение по новой системной программе мониторинга; контрольная группа ($n=70$) — стандартное наблюдение. В основной группе каждые 4 недели определялись уровни ТТГ, sT_4 , АТТПО, С-реактивного белка и прогестерона; каждые 2 недели посредством трансвагинального ультразвукового исследования измерялась длина шейки матки. Системный мониторинг позволил снизить риск преждевременных родов на 43% (17,1% против 30,0%; $p=0,041$).

Клинические признаки ПР выявлялись в среднем на $2,4 \pm 0,7$ недели раньше, профилактическая терапия начиналась на $2,1 \pm 0,6$ недели раньше. Длина шейки матки менее 25 мм (чувствительность 82,4%, специфичность 76,8%) и $ТТГ > 3,0$ мЕд/л ($OR = 3,94$) оказались наиболее точными маркерами в программе мониторинга. Полученные результаты свидетельствуют о необходимости коренного обновления стандартного протокола наблюдения за беременными женщинами с АИТ.

Ключевые слова: аутоиммунный тиреоидит, скрининг, мониторинг, преждевременные роды, тиреоидные маркеры, ультразвук, шейка матки, профилактика.

Кириш. Аутоиммун тиреоидити бор ҳомиладор аёлларни самарали мониторинг қилиш замонавий акушерлиқнинг долзарб муаммоларидан бири ҳисобланади. Ушбу касалликда МОТ ривожланишига олиб борадиган патофизиологик механизмлар доимий фаол бўлиб туради, аммо уларнинг клиник намоён бўлиши вақт жиҳатдан олдиндан башоратлаш қийин. Мавжуд клиник кўрсатмалар тиреоид гормонлар мониторингини умумий тавсия сифатида тавсия этсада, конкрет мониторинг стратегияси, текшириш тезлиги, прогностик маркерлар ва уларнинг ўзаро комбинациялари белгиланмаган.

МОТ патогенезида тиреоид дисфункциянинг алоҳида ўрни ҳар томонлама ўрганилган. ТТГ ошиши плацентар дисфункция орқали бачадон қисқаришини рағбатлантирувчи простагландинлар синтезини кучайтириши мумкин. Конкрет механизм шундан иборатки: ТТГ рецепторлари плацентада ҳам экспрессия қилинади ва ТТГ нинг юқори даражаси трофобласт метаболизмини бузиши мумкин. Шунингдек, антитиреоид антитаналар плацентага ўтиб, ҳомиланинг тиреоид функциясини бостириши ва плацентанинг иммун мувозанатини бузиши мумкин.

Бачадон бўйни узунлигини ультратовуш орқали мониторинг қилиш МОТни башоратлашда универсал усул сифатида тан олинган. Иамс Ж.Д. ва бошқалар (1996) ўтказган ёлдан тадқиқотда бачадон бўйни < 25 мм бўлиши МОТ хавфи билан кучли боғлиқлиги аниқланган. АИТ да гипотиреоз ва аутоиммун яллиғланиш бачадон бўйни коллаген матриксини ерта йўқотишини тезлаштириши мумкин, бу эса цервикометрия мониторингини ушбу гуруҳда айниқса зарур қилади.

Тизимли мониторинг дастурини ишлаб чиқиш ва унинг клиник самарадорлигини рандомлаштирилган дизайнда баҳолаш ушбу тадқиқотнинг асосий мақсади ҳисобланади. Бу натижалар АИТ бор ҳомиладор аёлларни кузатишнинг клиник протоколини такомиллаштириш учун илмий асос яратади.

Ўзбекистонда акушерлик ёрдами ислоҳоти доирасида АИТ бор ҳомиладор аёлларга мўлжалланган стандартлаштирилган мониторинг дастурини ишлаб чиқиш ва амалиётга жорий этиш нафақат клиник, балки иқтисодий аҳамиятга ҳам эга: эрта профилактика чоралари туфайли МОТни интенсив даволаш харажатлари камайади.

Тадқиқот мақсади. АИТ билан касалланган ҳомиладор аёлларда МОТ хавфини эрта аниқлаш учун оптимал мониторинг дастурини ишлаб чиқиш, унинг клиник самарадорлигини рандомлаштирилган клиник тадқиқот дизайнида баҳолаш ва Ўзбекистон акушерлик амалиёти шароитларига мослаштирилган стандарт протокол таклиф этиш.

Материал ва усуллар. Рандомлаштирилган, очик, бирқўр клиник тадқиқот 2020–2023 йиллар мобайнида ўтказилди. Тадқиқот биоэтика қўмитаси томонидан тасдиқланди (Баённома №8, 2020 йил). Барча иштирокчилардан ёзма маълумотлашган розилик олинди. Тадқиқот CONSORT 2010 кўрсатмаларига мувофиқ ўтказилди.

Тадқиқот популяциясини АИТ ташхиси қўйилган ҳомиладор аёллар ташкил этди. АИТ диагностика мезонлари: $АТТПО > 34$ МЕ/мл ва тиреоид безнинг характерли ультратовуш белгилари (диффуз гипеохогенлик, гетероген эхоструктура, псевдонодуллар, кучайган васкуляризация). Танлов мезонлари: ёш 18–40 йил, яқка ҳомилали ҳомиладорлик, тадқиқотга 8–12 ҳафталик ҳомиладорликда кириштиш, аввало ташхисланган АИТ (ёки тадқиқот давомида ташхисланган). Истисно мезонлари: қўп ҳомилали ҳомиладорлик, бошқа аутоиммун ёки тизимли касалликлар, аввалги МОТ анамнезида, анатомик бачадон патологиялари (бачадон миомаси > 5 см, бачадон анатомик аномалиялари), МОТ профилактикасига бошқа кўрсатмалар.

Рандомлаштириш блок усулда (4 та блок) амалга оширилди. Мустақил биостатистик лойиҳалаштирган рандомлаштириш жадвалидан фойдаланилди. Рандомлаштириш натижалари муҳрланган конвертларда сақланди ва фақат бемор жалб этилган пайт очилди.

Асосий гуруҳда ($n=70$) янги тизимли мониторинг дастури қўлланилди: (1) ТТГ, eT_4 , АТТПО, С-реактив оксил, прогестерон 4 ҳафтада бир маротаба аниқланди; (2) Трансвагинал цервикометрия 2 ҳафтада бир маротаба бажарилди; (3) Левотироксин ТТГ $> 2,5$ мЕд/л бўлганда тайинланди, доза 25 мкг/сут дан бошлаб 25 мкг/сут оралиқда 4 ҳафта давомийликда коррекция қилинди; (4) Вагинал про-

гестерон 200 мг/сут бачадон бўйни <30 мм бўлганда тайинланди; (5) Стационар кузатувга бачадон бўйни <25 мм ёки ТТГ >4,0 мЕд/л бўлганда юборилди.

Назорат гуруҳида (n=70) стандарт кузатув тактикаси қўлланилди: ТТГ ҳар триместрда бир мартаба аниқланди; бачадон бўйни руит скрининг ташрифларида (20–22 ҳафта) ўлчанди; левотироксин факат манифест гипотиреозда тайинланди.

Биринчилик натижа: МОТ частотаси (<37 ҳафтада туғиш). Иккиламчи натижалар: туғруқгача сақлаб қолиш давомийлиги (ҳафта), МОТ аниқланиши ва профилактика бошланиши ўртасидаги вақт оралиғи, неонатал натижалар (тана вазни, Апгар кўрсаткичи, РДС, ОРIT га ётқизиш), ТТГ мақсадли даражасига эришилган аёллар улуши. Статистик таҳлил: ниятга кўра даволаш (ITT) принципи, хи-квадрат тести, Манн–Уитни тести, Каплан–Меер яшаш эгри чизиғи ва Кокс пропорционал хавф модели, ROC-таҳлил.

Натижалар. Тадқиқотга 140 нафар аёл жалб этилди, 137 нафари (97,9%) тадқиқотни тугатди (асосий гуруҳда 68, назорат гуруҳида 69 нафар). Гуруҳлар асосий демографик ва клиник кўрсаткичлар бўйича тенг эди: ўртача ёш 27,8±3,9 ва 28,1±4,2 йил (p=0,623), тана вазни индекси 23,9±3,1 ва 24,2±3,4 кг/м² (p=0,581), ТТГ ишга киришишдаги даражаси 3,52±1,18 ва 3,48±1,21 мЕд/л (p=0,859), АТТПО медианаси 286 ва 294 МЕ/мл (p=0,712).

МОТ биринчилик натижаси: асосий гуруҳда 12 нафарда (17,6%), назорат гуруҳида 21 нафарда (30,4%) кузатилди ($\chi^2=3,17$; p=0,041; RR=0,58; 95% ДИ: 0,31–0,97; NNT=7,8). Кеч МОТ (34–36 ҳафта) асосий гуруҳда 10,3%, назорат гуруҳида 20,3% (p=0,087). Эрта МОТ (22–33 ҳафта) асосий гуруҳда 7,4%, назорат гуруҳида 10,1% (p=0,558).

МОТ аниқланиш вақти ва профилактика самарадорлиги: асосий гуруҳда МОТнинг клиник белгилари ўртача 2,4±0,7 ҳафта олдинроқ аниқланди ва профилактик терапия ўртача 2,1±0,6 ҳафта эрта бошланди. Натижада туғруқгача сақлаб қолиш даври асосий гуруҳда ўртача 1,8±0,5 ҳафтага узайди (p=0,038).

ТТГ мақсадли даражасига (<2,5 мЕд/л) эришиш асосий гуруҳда 87,1%, назорат гуруҳида 55,1% ни ташкил этди (p<0,001). Бу кўрсаткич тизимли мониторинг ва левотироксин дозасини мунтазам коррекция қилишнинг амалий самарасини яққол кўрсатади. Асосий гуруҳда АТТПО даражаси кузатув давомида ўртача 18,3% га пасайди; назорат гуруҳида бу кўрсаткич 4,2% га камайди (p=0,008).

Бачадон бўйни <25 мм эрта аниқланган аёллар: асосий гуруҳда 9 нафар (13,2%), назорат гуруҳида 6 нафар (8,7%) (p=0,378; бу фаркнинг аҳамиятли бўлмаслиги мониторинг интервалидаги фарк билан эмас, балки танлама ҳажмининг кичиклиги билан изоҳланади). Асосий гуруҳда бачадон бўйни <25 мм аниқланган 9 нафар аёлнинг 7 тасига (77,8%) вагинал прогестерон тайинланди ва улардан 5 тасида (71,4%) туғиш 37 ҳафтадан кейин амалга ошди.

Неонатал натижалар: РДС асосий гуруҳда 11,8%, назорат гуруҳида 27,5% ни ташкил этди (p=0,028). ОРIT га ётқизиш асосий гуруҳда 14,7%, назорат гуруҳида 30,4% (p=0,022). Апгар кўрсаткичи 5-дақиқада <7: асосий гуруҳда 7,4%, назорат гуруҳида 17,4% (p=0,061). Туғилиш вазни: асосий гуруҳ — 2410±280 г, назорат гуруҳи — 2180±310 г (p=0,003).

ROC-таҳлил натижасида бачадон бўйни <25 мм МОТ ривожланишининг энг сезгир тезкор маркери эканлиги аниқланди (сезгирлик 82,4%, хусусийлик 76,8%; AUC=0,81; 95% ДИ: 0,70–0,92). ТТГ >3,0 мЕд/л комплекс маркерлар ичида энг аниқ прогностик кўрсаткич бўлди (OR=3,94; 95% ДИ: 1,62–9,58; AUC=0,78). С-реактив оксил >5 мг/л (AUC=0,71) ва прогестерон <45 нмоль/л (AUC=0,74) иккиламчи маркерлар сифатида аниқланди. Тўрт маркердан иборат комбинацион индекс: AUC=0,91 (95% ДИ: 0,84–0,98).

Муҳокама. Тизимли мониторинг дастурининг самарадорлиги бир нечта ўзаро тўлдирувчи механизмлар билан изоҳланади. Биринчидан, тиреоид функция кўрсаткичларини 4 ҳафтада бир мартаба кузатиш субклиник гипотиреознинг эрта аниқланиши ва левотироксин дозасини ўз вақтида коррекция қилишга имкон беради. Бу асосий гуруҳда ТТГ мақсадли даражасига эришилган аёллар улушини назорат гуруҳига нисбатан 1,6 баробар оширди (87,1% ва 55,1%).

Иккинчидан, бачадон бўйни узунлигини трансвагинал ультратовуш орқали 2 ҳафтада бир мартаба мунтазам ўлчаш бачадон бўйнининг эрта қисқаришини аниқлаш ва прогестерон терапиясини ўз вақтида бошлаш имконини яратади. Асосий гуруҳда бачадон бўйни <25 мм бўлган аёлларнинг 77,8% ида прогестерон вақтли тайинланди ва бу 71,4% ида туғишни 37 ҳафтадан кейинга суриш имконини берди.

Учинчидан, С-реактив оксил ва прогестерон мониторинги системали яллиғланиш реакциясини ва лютеин-плацентар инсуффисиентликни эрта аниқлашга имкон беради. СРО >5 мг/л бўлган аёлларда допoлнитель антияллиғланиш чоралари (омега-3 ёғ кислоталари, юқори дозали прогестерон) ўз вақтида тайинлаш мумкин.

Тадқиқотимиз натижалари Roman A.S. ва бошқалар (2004) ни тадқиқоти билан мос келади: универсал бачадон бўйни скринингини АИТ бор аёлларга қўллаш МОТ частотасини камайтиришда самарали эканлиги аниқланган. Назарий жиҳатдан, Negro R. ва бошқалар (2006) тавсия этган «эрта левотироксин» стратегияси ва «цервикометрия» ёндашувлари биргаликда синергетик таъсир кўрсатади.

Тадқиқотимиз чегараланишлари орасида мониторинг гуруҳини тўлиқ кўр қилишнинг имкони бўлмагани (очиқ дизайн) ва ягона клиник база сабабли беморлар сонининг нисбатан кичиклиги кўрсатилиши керак. Шунингдек, асосий ва назорат гуруҳлари орасида кузатув хусусиятлари бўйича фарқ (ташриф тезлиги, диққат-этибор) Ҳоторн эффектини юзага келтириши мумкин. Бу чекловларни бартараф этиш учун кейинги тадқиқотларда кўп марказли, рандомлаштирилган, кўр дизайнни қўллаш тавсия этилади.

Иқтисодий жиҳатдан баҳолаш натижалари шуни кўрсатдики, асосий гуруҳда мониторинг харажатлари назорат гуруҳига нисбатан 1,8 баробар юқори бўлсада, неонатал даво харажатлари (ORIT, сунъий вентиляция, РДС даволаш) 2,6 баробар камайди. Умуман олганда, тизимли мониторинг иқтисодий самарали стратегия эканлиги исботланди.

Хулоса. АИТ билан касалланган ҳомиладор аёлларда тизимли мониторинг дастурини қўллаш МОТ хавфини 43% га камайтirdи (17,6% ва 30,4%; $p=0,041$; $NNT=7,8$). Асосий гуруҳда РДС частотаси 2,3 баробар ($p=0,028$), ORIT га ётқишиш 2,1 баробар ($p=0,022$) камайди. 4 ҳафтада бир маротаба тиреоид маркерларни аниқлаш ва 2 ҳафтада бир маротаба бачадон бўйни узунлигини ўлчашни ўз ичига олган дастур оптимал мониторинг стратегияси сифатида тавсия этилади. Ушбу дастур АИТ бор ҳомиладор аёлларни кузатишнинг Ўзбекистон стандарт клиник протоколига киритилиши мақсадга мувофиқ.

Адабиётлар рўйхати:

1. Iijima T., Tada H., Hidaka Y. et al. Effects of autoantibodies on the course of pregnancy and fetal prognosis in autoimmune thyroid disease // *Obstet. Gynecol.* — 1997. — Vol. 90, No. 3. — P. 364–369.
2. Negro R., Formoso G., Mangieri T. et al. Levothyroxine treatment in euthyroid pregnant women with autoimmune thyroid disease // *J. Clin. Endocrinol. Metab.* — 2006. — Vol. 91, No. 7. — P. 2587–2591.
3. Roman A.S., Rebarber A., Pereira L. et al. The efficacy of sonographic cervical length as a predictor of preterm birth // *J. Ultrasound Med.* — 2004. — Vol. 23, No. 7. — P. 899–904.
4. Iams J.D., Goldenberg R.L., Meis P.J. et al. The length of the cervix and the risk of spontaneous premature delivery // *N. Engl. J. Med.* — 1996. — Vol. 334, No. 9. — P. 567–572.
5. Romero R., Conde-Agudelo A., Da Fonseca E. et al. Vaginal progesterone for preventing preterm birth // *Am. J. Obstet. Gynecol.* — 2018. — Vol. 218, No. 2. — P. 161–180.
6. Blencowe H., Cousens S., Oestergaard M.Z. et al. National, regional, and worldwide estimates of preterm birth rates // *Lancet.* — 2012. — Vol. 379, No. 9832. — P. 2162–2172.
7. Alexander E.K., Pearce E.N., Brent G.A. et al. 2017 Guidelines of the American Thyroid Association // *Thyroid.* — 2017. — Vol. 27, No. 3. — P. 315–389.
8. Stagnaro-Green A., Abalovich M., Alexander E. et al. Guidelines of the American Thyroid Association // *Thyroid.* — 2011. — Vol. 21, No. 10. — P. 1081–1125.
9. Nazarpour S., Ramezani Tehrani F., Simbar M. et al. Effects of levothyroxine on pregnant women with subclinical hypothyroidism // *J. Clin. Endocrinol. Metab.* — 2018. — Vol. 103, No. 3. — P. 926–935.
10. Каримова Л.А., Мусаева З.Б. Ҳомиладорлик даврида тиреоид безининг ультратовуш кўрсаткичлари // *Тиббиёт ва таълим.* — 2021. — №3. — Б. 22–27.
11. Hasegawa T., Ishihara T., Kamata K. et al. Prediction of preterm delivery using cervical length // *Arch. Gynecol. Obstet.* — 2018. — Vol. 297, No. 5. — P. 1135–1142.
12. Рашидова Н.А., Юсупов Ш.Ж. АИТ бор ҳомиладор аёлларни кузатиш тажрибасидан // *Репродуктив тиббиёт.* — 2022. — №2. — Б. 29–35.

Иқтибос учун: Камалова Д.Д. Аутоиммун тиреоидити бор аёлларда муддатдан олдинги туғрукни текшириш ва мониторинг тамойиллари // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси.* — 2026. — № 4(24). — Б. 957–960. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19766666>

ҲОМИЛАДОРЛАРДА АРТЕРИАЛ ГИПЕРТОНИЯ ПРОФИЛАКТИКАСИ ВА УНИ НАЗОРАТ ҚИЛИШ СТРАТЕГИЯЛАРИ

Бекмурадова М.С.

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Мазкур илмий иш ҳомиладорлик даврида кузатиладиган артериал гипертензия (ХГ) муаммоларини комплекс таҳлил қилишга бағишланган. Тадқиқот объекти сифатида Самарқанд шаҳрида истиқомат қилувчи 200 нафар ҳомиладор аёл танлаб олинди. Ўтказилган таҳлиллар натижасида иштирокчиларнинг тўртдан бир қисмида (25%) юқори қон босими патологияси қайд этилди. Касаллик ривожланишининг асосий детерминанти сифатида ортиқча вазн, ирсий мойиллик ва психофизиологик зўриқишлар (стресс) аниқланган. Шунингдек, респондентларнинг 60 фоизиди гиподинамия (кам ҳаракатлилиқ), 55 фоизиди эса тузни меъёридан ортиқ истеъмол қилиш одати борлиги маълум бўлди. Тадқиқот хулосалари акушерлик амалиётида гипертензияни барвақт аниқлаш ва профилактик таълим дастурларини жорий этиш она ва бола саломатлигини муҳофаза қилишда фундаментал аҳамиятга эга эканлигини исботлайди.

Калим сўзлар: ҳомиладорликдаги гипертензия, тарқалиш, хавф омиллари, она саломатлиги, қон босими.

STRATEGIES FOR PREVENTION AND CONTROL OF ARTERIAL HYPERTENSION IN PREGNANT WOMEN

Bekmuradova M.S.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. This scientific work is devoted to a comprehensive analysis of the problems of arterial hypertension (HG) observed during pregnancy. 200 pregnant women living in Samarkand were selected as the object of the study. As a result of the analyzes, a quarter of the participants (25%) had high blood pressure pathology. The main determinants of the development of the disease were identified as overweight, hereditary predisposition and psychophysiological stress (stress). It was also found that 60% of respondents had a habit of hypodynamia (low mobility), and 55% had a habit of consuming salt in excess of the norm. The study findings prove that early detection of hypertension in obstetric practice and the implementation of preventive education programs are of fundamental importance in protecting the health of mothers and children.

Keywords: hypertension in pregnancy, prevalence, risk factors, maternal health, blood pressure.

СТРАТЕГИИ ПРОФИЛАКТИКИ И КОНТРОЛЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН

Бекмурадова М.С.

Самаркандский государственный медицинский университет, г.Самарканд, Узбекистан

Резюме. Данная научная работа посвящена всестороннему анализу проблем артериальной гипертензии (АГ), наблюдаемых во время беременности. В качестве объекта исследования были отобраны 200 беременных женщин, проживающих в Самарканде. По результатам анализа у четверти участниц (25%) была выявлена патология высокого кровяного давления. В качестве основных факторов развития заболевания были определены избыточный вес, наследственная предрасположенность и психофизиологический стресс. Также было установлено, что 60% респондентов имели привычку к гиподинамии (сниженной подвижности), а 55% имели привычку потреблять соль сверх нормы. Результаты исследования доказывают, что ранняя диагностика гипертонии в акушерской практике и внедрение профилактических образовательных программ имеют основополагающее значение для защиты здоровья матерей и детей.

Ключевые слова: гипертензия при беременности, распространенность, факторы риска, здоровье матери, артериальное давление.

e-mail: bekmuradova.maxsuda84@gmail.com

Кириш қисми. Ҳомиладорликдаги гипертензия (ХГ) жаҳон бўйича соғлиқни сақлаш муаммоларидан бири ҳисобланади [1]. Ўзбекистонда бу муаммо нафақат она, балки чақалоқ саломатлигига

хам жиддий хавф туғдирмоқда. Гипертония ҳомиладорликда ривожланишнинг энг кенг тарқалган патологияларидан биридир ва бу муаммога жамиятда тобора кўпроқ эътибор қаратилмоқда [1]. Ушбу тадқиқотда ҳомиладорликдаги гипертония ҳолатининг сабаблари, хавф омиллари ва олдини олиш усуллари таҳлил қилинади. Ҳомиладорлик пайтида гипертония ҳолатлари жиддий тиббий муаммоларни келтириб чиқаради. Статистика маълумотларига кўра, гипертония 10-20% ҳомиладор аёлларда учрайди ва бу ҳолатларнинг аксарияти ўз вақтида аниқланмайди [1,15]. Ушбу ҳолатларни таҳлил қилишда тадқиқотлар шуни кўрсатадики, гипертония нафақат шахсий омиллар, балки экологик, ижтимоий ва иқтисодий шароитлар билан ҳам боғлиқдир.

Ўзбекистоннинг тиббиёт тизимида ҳомиладорликдаги гипертония масаласи ўзига хос ўрин тутати. Бу мамлакатда ҳомиладорлик даврида гипертония ҳолатларининг ўсиши, айниқса, шаҳар жойларда, турли экологик омиллар ва соғлиқни сақлаш хизматларининг чекланганлиги билан боғлиқ. Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни Сақлаш Вазирлиги томонидан олиб борилган сўнгги тадқиқотлар, гипертония билан боғлиқ ҳолатларни таҳлил қилиш ва уларнинг олдини олишда зарурий чора-тадбирларни ишлаб чиқиш зарурлигини кўрсатмоқда. Гипертония феномени мураккаб ва кўп омилли бўлиб, унинг сабаблари генетик, биологик ва психологик жиҳатларга боғлиқ [12,17]. Гипертония ва ҳомиладорлик ўртасидаги боғлиқликни тушуниш учун бир қатор назариялар, жумладан, гомеостаз назарияси ва стресс назарияси қўлланилади. Бу назариялар ҳомиладорлик пайтида қон босимининг ошиши ва унинг оқибатларини тушунишга ёрдам беради. Гипертония масаласи ҳақида мавжуд тадқиқотлар, асосан, гипертония ва унинг хавф омилларини таҳлил қилишга қаратилган, аммо ўзбек шароитида бу масалалар юзасидан етарлича маълумотлар мавжуд эмас. Ҳомиладорликдаги гипертония билан боғлиқ ижтимоий, иқтисодий ва экологик омиллар ҳақида маълумотлар кам. Шунингдек, илгари олиб борилган тадқиқотлар асоратларни камайтириш бўйича аниқ стратегияларни таклиф қилмайди.

Тадқиқот мақсади. Ушбу тадқиқотнинг мақсади ҳомиладорликдаги гипертония масаласини чуқур ўрганиш, уни келтириб чиқарувчи омилларни таҳлил қилиш, ҳамда самарали олдини олиш усулларини ишлаб чиқишдир. Тадқиқот натижалари гипертония билан боғлиқ хавф омилларини аниқлаш ва соғлиқни сақлаш тизимида гипертония билан боғлиқ касалликларни бошқариш учун асос бўлиши кутилмоқда. Ушбу тадқиқотнинг янгилиги шундаки, у Ўзбекистондаги ҳомиладор аёлларда гипертония масаласини кенг қамровли равишда ўрганади ва янги назарий ва амалий таклифларни тақдим этади. Тадқиқот давомида олинган натижалар асосида ҳомиладорлик даврида гипертония хавфини камайтириш бўйича инновацион ёндашувлар ишлаб чиқилади.

Ушбу тадқиқот натижалари ҳомиладорликдаги гипертония хавфини тушунишга, унинг олдини олишга ва соғлиқни сақлаш тизимида гипертония билан боғлиқ касалликларни бошқаришга ёрдам беради. Шунингдек, тадқиқот натижалари қон босимини назорат қилиш ва профилактика чораларини ишлаб чиқишда янги стратегияларни келтириб чиқариши кутилмоқда.

Методологияси. Ушбу тадқиқот дескриптив-кузатув методологиясига асосланган бўлиб, ҳомиладорликдаги гипертония ҳолатларини ўрганиш мақсадида Ўзбекистоннинг Самарқанд шаҳридаги кўплаб тиббий муассасаларда амалга оширилди. Тадқиқот даври 2023 йилнинг январидан 2024 йилнинг июнигача бўлган вақтни қамраб олди. Тадқиқотда 200 нафар ҳомиладор аёл иштирок этди. Иштирокчилар 18 ёшдан 45 ёшгача бўлган, ҳомиладорликнинг 12-32 ҳафталари орасида бўлган аёллардан танлаб олинди. Иштирокчилар орасида гипертония тарихи бўлмаган, шунингдек, сурункали касалликлар (масалан, диабет, юрак касалликлари) билан оғриган аёллар киритилмади. Иштирокчилар рўйхати тиббиёт муассасалари томонидан тақдим этилган маълумотлар асосида тузилди.

Тадқиқот давомида қуйидаги маълумотлар тўплаш усуллари қўлланилди:

Иштирокчилар билан яратилган структураланган сўровномалар орқали маълумотлар тўпланди. Сўровномалар ҳомиладорлик тарихи, соғлиқ ҳолати, қон босими кўрсаткичлари, ҳаёт тарзи, овқатланиш одатлари ва стресс даражасини ўлчашга қаратилган саволлардан иборат эди.

Иштирокчиларнинг қон босим кўрсаткичлари тиббий муассасаларда ўлчанди. Ҳар бир иштирокчининг қон босими ҳолати 2 ҳафта давомида мунтазам равишда кузатилди. Бу кузатувлар гипертония ҳолатлари аниқланишига ёрдам берди.

Бошқа маълумотларни тўплаш мақсадида бир қатор иштирокчилар билан чуқур интервьюлар ўтказилди. Интервьюлар соғлиқ муаммолари, ҳуқ-атвор ўзгаришлари ва уларнинг ҳаёт сифатига таъсири ҳақида батафсил маълумот олиш учун ўтказилди.

Тадқиқот давомида тўпланган маълумотлар статистик таҳлил қилиш учун SPSS 26.0 дастури қўлланилди.

Натижалар. Тадқиқот 200 нафар ҳомиладор аёлнинг иштирокида ўтказилди, улардан ўртача ёши 28 йилни ташкил этди ва ҳомиладорликнинг 12-32 ҳафталари орасида бўлишди. Иштирокчиларнинг 25% гестацион гипертензия (ГГ) ташхиси қўйилган, 10% эса преэклампсия белгилари борлигини кўрсатган. Статистика таҳлиллари натижаларига кўра, қон босимининг кўтарилиши семизлик, гипертензия тарихи ва юқори стресс даражаси билан муҳим даражада боғлиқ бўлиб ($p < 0.05$), семизлик индекси (ТМИ) 30 дан юқори бўлган иштирокчилар ГХ ривожланиш хавфини 3,5 баробар оширган.

Бундан ташқари, турмуш тарзи омиллари ҳам таҳлил қилинди. Натижалар шуни кўрсатдики, иштирокчиларнинг 60% ҳаракат даражасининг етарли эмаслигини, 55% эса юқори натрий истеъмол қилишини билдирган, бу ҳолатлар қон босимининг кўтарилиши билан боғлиқ. Сўровнома давомида иштирокчиларнинг фақат 30% қон босимини мунтазам равишда назорат қилишнинг аҳамиятини тушуниши маълум бўлди.

Ушбу тадқиқот натижалари, айниқса Ўзбекистоннинг шаҳар жойларида гестацион гипертензия масаласини ҳал қилиш зарурлигини таъкидлайди. Ҳомиладорлик пайтида гипертензия нафақат она, балки чақалоқ саломатлиги учун ҳам жиддий хавф туғдириши мумкин. Олинган натижалар жаҳон миқёсидаги тадқиқотлар билан бир хил бўлиб, гипертензия ҳолатлари ортаётганини кўрсатади.

Гестацион гипертензия назариялари унинг кўп омилли табиати борлигини кўрсатади. Ушбу тадқиқот турмуш тарзидаги танловларнинг гипертензия касаллигига таъсирини очиқ бериб, назарий мунозараларга ҳисса қўшади. Шу билан бирга, келажақда тадқиқотларни олиб бориш учун кенгрок ижтимоий-иқтисодий ва экологик ўзгарувчиларни киритиш зарурлигини кўрсатади.

Тадқиқот натижалари ҳомиладор аёлларга мўлжалланган таълим дастурларини кучайтириш зарурлигини кўрсатади. Овқатланиш, жисмоний фаоллик ва стрессни бошқаришга қаратилган тадбирлар гестацион гипертензия хавфини сезиларли даражада камайитириши мумкин. Антенатал парваришда қон босимини мунтазам равишда ўлчаш, эрта аниқлаш ва бошқаришни таъминлашга ёрдам беради, бу эса она ва чақалоқ саломатлигини яхшилайдди.

Тадқиқот давомида баъзи камчиликлар аниқланди, хусусан, ҳомиладорлик давридаги гестацион гипертензия психологик жиҳатлари тўғрисида тушунча етишмайди. Келажақда тадқиқотлар ҳомиладор аёлларнинг қийинчиликлари ва стресс даражасининг қон босими регуляциясига таъсирини ўрганиши керак. Шунингдек, узоқ муддатли тадқиқотлар гестацион гипертензия ҳолатларининг она ва бола саломатлиги натижаларига бўлган таъсирини баҳолашда муҳимдир. Бундан ташқари, тиббий хизматларга чекланган кириш имкониятига эга бўлган жойларда ҳомиладор аёлларнинг соғлиқни сақлаш хатти-ҳаракатларига таъсир кўрсатадиган маданий омилларни ўрганиш зарур. Ушбу ўзгарувчиларни ўрганиш аниқ жамоавий эҳтиёжларга жавоб берадиган махсус тадбирларни ишлаб чиқиш имконини беради, натижада ҳомиладорлик давридаги гипертензия тарқалишини камайтиради. Натижада, гестацион гипертензия масаласини ҳал этиш назарий, амалий ва таълимий жиҳатларни бирлаштиришни талаб қилади. Мавжуд билим бўшлиқларини бартараф этиш ва тадқиқотларни кенгайтириш орқали, соғлиқни сақлаш тизимлари ушбу муаммони самарали равишда ҳал қилиш учун стратегиялар ишлаб чиқишлари мумкин, бу эса оналар ва уларнинг чақалоқлари учун яхшироқ саломатлик натижаларини таъминлайди.

Хулоса. Ушбу тадқиқот гестацион гипертензия (ГГ) ва ҳомиладор аёлларнинг саломатлиги ўртасидаги боғлиқликни ўрганиш орқали муҳим натижаларни келтириб чиқарди. Олинган натижалар 25% иштирокчида гипертензия ташхиси қўйилиши ва юқори семизлик, оилавий тарих ва стресс даражаси билан алоқаси аниқланди. Ушбу натижалар гестацион гипертензия ҳолатларини эрта аниқлаш ва бошқариш зарурлигини кўрсатади, шунингдек, аёлларнинг соғлиқни сақлашни ошириш учун махсус таълим дастурларини ишлаб чиқишнинг аҳамиятини таъкидлайди. Тадқиқот натижалари, айниқса, Ўзбекистоннинг шаҳар жойларида гестацион гипертензия билан боғлиқ саломатлик муаммоларини ҳал қилишда салмоқли ҳиссасини қўшади. Келажақда гестацион гипертензия психологик жиҳатлари ва ижтимоий-иқтисодий омилларнинг таъсирини ўрганиш мақсадида янада чуқурроқ тадқиқотлар олиб борилиши лозим, бу эса соғлиқни сақлаш тизимлари томонидан энг яхши амалиётларни амалга оширишга ёрдам беради ва ҳомиладорлик даврида оналар ва чақалоқлар учун яхшироқ саломатлик натижаларини таъминлайди.

Адабиётлар рўйхати:

1. ACOG Practice Bulletin No. 222: gestational hypertension and preeclampsia. Obstet Gynecol. 2020;135:1492–1495.
2. Brown, M. A. Hypertension in Pregnancy: International Society for the Study of Hypertension in Pregnancy (ISSHP) Classification, Diagnosis, and Management Steps for International Practice / M. A. Brown [et al.] // Hypertension. — 2018. — Vol. 72, № 1. — P. 24–43.

3. ESC Guidelines for the management of cardiovascular diseases during pregnancy // *European Heart Journal*. — 2018. — Vol. 39, № 34. — P. 3165–3241.
4. Magee, L. A. The Diagnosis, Evaluation, and Management of the Hypertensive Disorders of Pregnancy: ISSHP Comprehensive Post-partum Management / L. A. Magee [et al.] // *Pregnancy Hypertension*. — 2021. — Vol. 25. — P. 154–164.
5. Nazarov, F. Y., & Bekmuradova, M. S. (2022). Research of Local Contractability of the Myocardial with the Help of Tissue Dopplera Streets Suffering with Dilated Cardiomyopathy. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 10(1), 317-319.
6. Uzokov, J. B., Khusainova, M. A., Bekmuradova, M. S., & Makhmudova, K. D. (2023). Dynamics of quality of life indicators during personalized rehabilitation of patients with rheumatoid arthritis with arterial hypertension. *Science and Education*, 4(5), 196-204.
7. Артериальная гипертензия у взрослых. Клинические рекомендации 2020. Разраб.: Российское кардиологическое общество. — М., 2020. — 164 с.
8. Бекмурадова, М. С., & Мехмонов, А. З. (2025). Натрийуретический пептид как предиктор ранней диагностики хронической сердечной недостаточности у больных с артериальной гипертензией. *Zamonaviy tibbiyot jurnali* (Журнал современной медицины), 11(4), 469-473.
9. Бекмурадова, М. С., & Узокова, Г. Ф. (2025). Роль кишечной микробиоты в развитии сердечно-сосудистых заболеваниях. *Zamonaviy tibbiyot jurnali* (Журнал современной медицины), 11(4), 453-547.
10. Бекмурадова, М. С., & Хайдаров, С. Н. (2022). Связь между повышенным пульсовым давлением и натрийуретическим пептидом. *Journal of cardiorespiratory research*, 3(1), 26-29.
11. Бекмурадова, М. С., & Эркинова, З. У. (2025). Артериал гипертензияси бор беморларда сурункали юрак етишмовчилигини эрта аниқлашда натрийуретик пептиднинг ахамияти. *Журнал гуманитарных и естественных наук*, (28 [2]), 14-18.
12. Гипертензивные расстройства во время беременности, в родах и послеродовом периоде. Преэклампсия. Эклампсия. Клинические рекомендации (протокол лечения). — М.: Министерство здравоохранения РФ, 2021.
13. Макаров, О. В. Артериальная гипертензия у беременных. Только ли преэклампсия? / О. В. Макаров, Н. Н. Николаев, Е. В. Волкова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 224 с.
14. Стрижаков, А. Н. Беременность высокого риска / А. Н. Стрижаков, П. В. Буданов, М. В. Рыбин. — М.: МИА, 2020. — 264 с.
15. Ткачева, О. Н. Клинические рекомендации «Диагностика и лечение сердечно-сосудистых заболеваний при беременности» / О. Н. Ткачева [и др.] // *Российский кардиологический журнал*. — 2018. — № 23(3). — С. 91–134.
16. Хайдарова, З. Э. (2021). Энтропия и нарушения сердечного ритма у больных, перенесших инфаркт миокарда. *Journal of cardiorespiratory research*, 2(4), 59-62.
17. Шапошник, И. И. Артериальная гипертензия у беременных: учебное пособие / И. И. Шапошник. — Челябинск: Изд-во ЮУГМУ, 2022. — 88 с.
18. Ярмухамедова, С. Х., & Бекмурадова, М. С. (2019). Развитие сердечной недостаточности у больных с гипертонической болезнью по показателям натрийуретического пептида. *Евразийский кардиологический журнал*, (S1), 283-284.

Иктибос учун: Искандарова И.М. Хавфли ўсмалар ва ўпка туберкулёзининг коморбид кечишида ўзига хос хусусиятлар // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси*. — 2026. — № 4(24). — Б. 961–964. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19895702>

**RESTORATIVE CONSIDERATIONS FOR ENDODONTICALLY TREATED TEETH:
STRUCTURAL AND CLINICAL ASPECTS****Kim V.E.**

Tashkent State Medical University, Tashkent, Uzbekistan

Resume. The restoration of endodontically treated teeth (ETT) remains one of the most extensively studied yet debated subjects in restorative dentistry. Despite considerable research, questions persist regarding the optimal clinical protocols and materials to be employed, particularly since fractures are frequently associated with these teeth. To address these concerns, a comprehensive search of the MEDLINE/PubMed database was conducted, focusing on studies published over the past decade. The search strategy included the following keywords: nonvital teeth, endodontically treated teeth, pulpless teeth, devitalized teeth, dental restoration, dental pins, dental post, root canal preparation, and post-and-core technique. This search yielded 207 studies, of which 43 were selected for inclusion in this review. The selection was based on their relevance to fracture resistance in endodontically treated teeth restored using different approaches and restorative materials.

Key words: teeth, endodontics, restorative dentistry

**ЭНДОДОНТИК ДАВОЛАНГАН ТИШЛАРНИ РЕСТАВРАЦИЯ ҚИЛИШДАГИ
ЁНДАШУВЛАР: ТУЗИЛМАВИЙ ВА КЛИНИК ЖИҲАТЛАР****Ким В.Э.**

Тошкент давлат тиббиёт университети, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. Эндодонтик даволанган тишларни (ETT) тиклаш реставрацион стоматологияда энг кўп ўрганилган, бироқ баҳсли мавзулардан бири бўлиб қолмоқда. Кўплаб тадқиқотлар мавжуд бўлишига қарамай, оптимал клиник протоколлар ва қўлланиладиган материалларни танлаш бўйича саволлар сақланиб қолмоқда, айниқса, бундай тишларда синиш ҳолатлари тез-тез учраши сабабли. Ушбу масалаларни ўрганиш мақсадида сўнги ўн йил ичида чоп этилган тадқиқотларга эътибор қаратилган ҳолда MEDLINE/PubMed маълумотлар базасида кенг қамровли қидирув ўтказилди. Қидирув стратегияси қўйидаги калит сўзларни ўз ичига олди: нонвитал тишлар, эндодонтик даволанган тишлар, пульпасиз тишлар, девитализация қилинган тишлар, стоматологик реставрация, стоматологик пинлар, стоматологик штифт, илдиз каналли тайёрлаш ва штифт-культя техникаси. Қидирув натижасида 207 та тадқиқот аниқланди, шулардан 43 таси ушбу шарҳга киритилиш учун танлаб олинди. Танлов турли ёндашувлар ва реставрацион материаллар ёрдамида тикланган эндодонтик даволанган тишларнинг синишга чидамлилигига оид аҳамияти асосида амалга оширилди.

Калит сўзлар: тишлар, эндодонтия, реставрацион стоматология

**РЕСТАВРАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ЭНДОДОНТИЧЕСКИ ЛЕЧЕННЫХ ЗУБОВ:
СТРУКТУРНЫЕ И КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ****Ким В.Э.**

Ташкентский государственный медицинский университет, г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. Восстановление эндодонтически леченных зубов (ETT) остаётся одной из наиболее изучаемых и одновременно дискуссионных тем в реставрационной стоматологии. Несмотря на большое количество исследований, вопросы выбора оптимальных клинических протоколов и материалов остаются актуальными, особенно в связи с высокой частотой переломов таких зубов. Для анализа данной проблемы был проведён поиск в базе данных MEDLINE/PubMed по исследованиям, опубликованным за последнее десятилетие. Поисковая стратегия включала ключевые слова: неживые зубы, эндодонтически леченные зубы, депульпированные зубы, девитализированные зубы, стоматологическая реставрация, стоматологические штифты, внутрикорневые штифты, подготовка корневого канала и техника штифтово-культевой реставрации. В результате было найдено 207 исследований, из которых 43 включены в данный обзор на основании их значимости в оценке устойчивости к перелому эндодонтически леченных зубов, восстановленных различными методами и материалами.

Ключевые слова: зубы, эндодонтия, реставрационная стоматология

Characteristics of Endodontically Treated Teeth. Fractures are reported more frequently in pulpless teeth compared to teeth with vital pulps [1]. However, some studies indicate only a modest difference in fracture incidence between non-endodontically treated teeth (41%) and endodontically treated teeth (58%) among Chinese patients. Interestingly, the higher fracture rate in non-treated teeth within this population was attributed to specific dietary habits, such as chewing bones in meat, which may increase occlusal stress [2]. Additional variables, including sex, age, and dental arch, also appear to influence fracture prevalence [3]. For instance, Chan et al. [2] observed that fractures were 1.4 times more common in men than in women, with peak incidence occurring between 40 and 49 years of age in men and between 50 and 59 years in women.

To better understand the underlying causes of fractures in endodontically treated teeth, early research focused on the role of dentin alterations. Helfer et al. [4] suggested in 1972 that pulpless teeth lose approximately 10% of their water content, potentially affecting their biomechanical properties. Nevertheless, subsequent investigations evaluating dentin parameters such as microhardness, elastic modulus, and tensile/compressive strength demonstrated only minor changes between vital and pulpless teeth, insufficient to significantly compromise fracture resistance, although slight differences in moisture content and dentin properties were noted [5–7].

Historically, endodontically treated teeth were considered more brittle due to structural modifications of dentin, including reduced water content and diminished collagen cross-linking following root canal therapy [8]. Current evidence, however, emphasizes that the primary factor contributing to increased fracture susceptibility is the loss of structural integrity. This arises mainly from extensive caries, pre-existing restorations, and access cavity preparation, which collectively weaken the tooth and increase cuspal deflection during function [1,9]. Thus, it is challenging to differentiate whether fracture risk is mainly due to intrinsic changes in dentin or the cumulative loss of coronal structure.

Another critical issue affecting endodontically treated teeth is coronal microleakage and subsequent bacterial contamination when definitive restorations are delayed. This condition can result in endodontic failure and the need for retreatment [10]. To mitigate this risk, bonded restorative techniques are recommended as they provide improved sealing ability and reduce microleakage.

Treatment Planning. Despite the extensive research conducted on endodontically treated teeth, the optimal treatment planning and restorative materials remain a subject of debate. The complexity of decision-making in this field is illustrated by a study reported by Türp et al. [11], in which four dental specialists were asked to provide treatment strategies for a fractured lateral incisor. Notably, each specialist proposed a different approach, reflecting the diversity of perspectives found in the literature.

This variability highlights the ongoing uncertainty among clinicians regarding the most appropriate restorative method—whether to employ direct or indirect restorations, to incorporate posts or not, and which restorative materials and preparation principles should be prioritized.

When planning treatment, several criteria must be taken into consideration. The amount of residual coronal tooth structure is a decisive factor, as it directly influences the choice of restoration type. Additionally, the functional requirements of the restored tooth—such as occlusal load and position within the dental arch—must be carefully assessed. Together, these parameters provide the foundation for selecting both the restorative material and the technique that will best ensure long-term clinical success.

Functional Requirements. The functional demands placed on endodontically treated teeth vary depending on their position within the dental arch, and this factor should be carefully considered when selecting restorative materials and techniques. Occlusal forces differ significantly between anterior and posterior regions, influencing both the risk of fracture and the need for specific restorative strategies.

Clinical studies have demonstrated that mandibular first molars exhibit more than twice the incidence of fractures compared with maxillary first molars, premolars, and mandibular second molars [2]. This increased susceptibility has been attributed to the combination of higher masticatory loads in this region and the relatively thin or flat root morphology characteristic of mandibular first molars. Similarly, Tamse et al. [12] reported that longitudinal root fractures are more prevalent in teeth with narrow mesiodistal dimensions, particularly the maxillary premolars.

Chan et al. [2] further noted that canines tend to be the most resistant to fracture, while incisors become more vulnerable following endodontic treatment. These observations emphasize the influence of occlusal force distribution on tooth integrity. Posterior teeth primarily withstand vertical loading forces, whereas anterior teeth must resist lateral and shearing stresses. Consequently, the placement of posts is often indicated in anterior teeth to improve stress distribution across the coronal and radicular portions, thereby reducing the risk of structural failure [2,13].

Remaining Tooth Structure. The extent of residual coronal tooth structure plays a decisive role in treatment planning for endodontically treated teeth. When tooth structure loss exceeds 50% (Fig. 1), the use of intraradicular posts is generally indicated to retain a core and ensure proper stress distribution. It is important to emphasize that, contrary to earlier misconceptions, posts do not reinforce or strengthen endodontically treated teeth; rather, they serve solely to provide retention for the core in cases where significant coronal loss is present (Fig. 1A).

A strong correlation exists between the amount of remaining tooth structure and fracture resistance. Nagasiri and Chitmongkolsuk [14] reported that teeth with greater residual coronal tissue demonstrate superior long-term survival, with molars retaining substantial structure after endodontic therapy showing a 78% survival rate over a 5-year period. Similarly, Costa et al. [15] observed that cusp fractures in endodontically treated maxillary premolars were closely associated with the width of cavity preparation. Their findings indicated that increased mesio-occluso-distal (MOD) preparation width reduced fracture resistance, whereas the use of onlay restorations incorporating cusp coverage significantly improved it.

In a laboratory investigation, Steele and Johnson [16] compared fracture resistance of maxillary premolars with various preparation designs and restorative approaches. Their results showed that teeth with only endodontic access cavities preserved exhibited higher resistance to fracture than those subjected to extensive preparations, underscoring the importance of conservative tooth structure preservation whenever possible.

Restoration design and material choice play a critical role in reinforcing endodontically treated teeth. Studies have shown that teeth restored with amalgam or composite resin exhibit greater fracture resistance than unrestored teeth, regardless of the use of bonding agents. Cerutti et al. [17], in an investigation of cuspal deflection, demonstrated that endodontically treated teeth restored with amalgam recovered only about 17% of cuspal stiffness, whereas those restored with composite resin recovered between 54% and 99%, depending on the specific material employed. This highlights the superior reinforcing potential of adhesive restorative systems compared to traditional amalgam.

Cuspal Coverage. The presence or absence of cuspal coverage significantly influences the fracture resistance of endodontically treated teeth. One study demonstrated that teeth restored with crowns exhibited a sixfold higher success rate compared to uncrowned teeth, after controlling for tooth type and the presence of caries at access preparation [20]. Although alternative restorative options—such as gold, ceramic, or composite resin onlays—may also provide cuspal protection, there is insufficient clinical evidence to recommend their use for posterior teeth.

The necessity of full-coverage restorations has been debated, particularly in cases restored with fiber posts and composites. Some authors reported no additional advantage of using metal-ceramic crowns in such cases, noting that endodontically treated premolars with Class II carious lesions and preserved cusps restored with fiber posts and direct composite restorations achieved comparable clinical success to those restored with full metal-ceramic crowns over a 3-year observation period [11].

The choice of crown material also plays a role in long-term outcomes. A comparative study reported survival rates of 91.7% for cast restorations, 86.5% for amalgam restorations, and 83% for composite restorations [12]. These findings suggest that while full-coverage crowns generally enhance fracture resistance, the ultimate decision should be based on functional demands and the quantity of remaining tooth structure. Notably, teeth with preserved cusps may still demonstrate satisfactory resistance to fracture without the need for full coverage.

Use of Posts. Historically, posts were thought to reinforce endodontically treated teeth. However, current evidence indicates that preparation of a post space actually increases the risk of root fracture [13]. Consequently, posts should be employed only when essential for retaining a core, and not as a means of strengthening the tooth [1].

The decision to use a post is primarily determined by the quantity of remaining coronal tooth structure and the functional demands placed on the restoration [8,14]. Comparative studies assessing fracture resistance in teeth restored with and without posts highlight that post selection should be case-specific.

Among available options, posts can be classified as metallic, ceramic, or prefabricated (metal, glass fiber, or carbon fiber). Fiber posts, when combined with direct resin restorations, have been advocated as a conservative and time-efficient approach that preserves remaining tooth structure. Grandini et al. [15] demonstrated satisfactory clinical outcomes for fiber post-resin restorations at 6-, 12-, 24-, and 30-month follow-ups, although no direct comparison was made with teeth restored without posts.

In another study, endodontically treated teeth restored with fiber posts and composite resin exhibited superior performance in reducing root fractures compared to amalgam restorations; however, they were less effective in preventing secondary caries [16].

The mechanical properties of posts play a critical role in treatment success. Glass fiber and carbon fi-

ber posts are particularly advantageous in cases with limited radicular tooth structure, as their modulus of elasticity closely approximates that of dentin. This biomechanical compatibility allows for more uniform stress distribution within the root, thereby reducing the risk of catastrophic failure. Fredriksson et al. [17], in a clinical evaluation of carbon fiber posts, observed no root or post fractures and no dislodgement over the study period, supporting the clinical viability of this system as an alternative to conventional metallic posts.

Esthetic Considerations and Failure Modes of Fiber Posts. Although carbon fiber posts demonstrated favorable biomechanical properties, their dark color posed esthetic limitations, particularly in anterior teeth. To address this drawback, modifications such as mineral coatings were introduced to enhance their appearance. In clinical situations where esthetics is a primary concern, ceramic and glass fiber posts are generally preferred [18]. Case reports underscore the importance of using such posts in anterior teeth, where cosmetic outcomes are often a determining factor for treatment success.

Martelli [19] described the development of carbon-based and glass fiber posts with translucency and elasticity moduli closely approximating those of dentin, thereby improving both esthetics and biomechanical compatibility. In a prospective clinical follow-up study, Malferrari et al. [20] evaluated quartz fiber-reinforced epoxy posts (“Aesthetic posts”) over a 30-month period. The reported failure rate was only 1.7%, and importantly, none of the failures involved root fractures. Instead, the failures were limited to a cohesive fracture at the composite core margin and two adhesive failures due to cement–post–core detachment from the dentinal walls, all of which were manageable and successfully retreated.

These findings highlight a key difference between fiber and conventional metallic cast posts. While fiber posts most commonly fail due to displacement, detachment, or prosthesis decementation, metal cast posts tend to cause catastrophic root fractures. This is attributed to their high rigidity, which transmits lateral forces as high-frequency vibrations that can induce longitudinal root fractures when critical stress levels are reached [13].

Fiber posts, by contrast, have an elastic modulus similar to that of dentin, resulting in more favorable stress distribution. Nevertheless, adhesive failures may still occur, often due to technical inaccuracies during the cementation procedure. Another drawback is that prefabricated fiber posts typically require a thicker cement layer compared to custom-cast posts, potentially compromising retention. To overcome this, Boudrias et al. [14] proposed a double-tapered post system designed to better adapt to the anatomy of the root canal, thereby minimizing the need for excessive dentin removal, enhancing apical and coronal adaptation, and improving post retention.

Custom versus Prefabricated Posts. A clinical case report described the use of a bondable polyethylene ribbon as an alternative to conventional post-and-core build-up materials. This technique offered several advantages, including favorable esthetic properties, mechanical performance, and a neutral color of the reinforcing material. Furthermore, because the canal required minimal enlargement, the risk of apical or lateral root perforation was reduced [12]. Prefabricated posts in general offer additional benefits, such as the ability to restore teeth with minimal remaining coronal structure in a single appointment, thereby simplifying treatment planning while achieving esthetically acceptable outcomes [3,4].

The comparison between custom and prefabricated posts has been extensively studied. Fokkinga et al. [15] evaluated the fracture resistance of endodontically treated teeth restored with prefabricated metallic posts, prefabricated glass fiber posts, and custom-made glass fiber posts compared with teeth restored without posts. The study found no significant differences in fracture resistance or failure modes among the groups. Similar findings were reported by other researchers [6,12], who assessed different post designs in the context of fixed prosthetic rehabilitation.

However, fracture patterns appear to vary depending on the type of post and loading conditions. Hayashi et al. [18] demonstrated that teeth restored with cast metallic post–cores exhibited higher resistance under vertical loading, whereas prefabricated metallic posts required less force to fail under oblique loading. Importantly, the mode of failure differed: vertical loading typically caused cracks propagating through the middle or apical third of the roots, while oblique loading led to cervical root fractures with fiber posts and middle-root fractures with prefabricated or cast metallic post–cores. Although cast metallic posts provide greater absolute fracture resistance, failures in these cases are often catastrophic and render the tooth unrestorable. In contrast, cervical root fractures associated with fiber posts may still allow for retreatment and tooth preservation.

Long-term clinical data further support the use of fiber posts. Glazer [19] reported on a 5-year clinical follow-up of patients whose remaining coronal tooth structure was less than 50%. Teeth restored with carbon fiber posts and metal-ceramic crowns demonstrated an overall failure rate of 7.7% and a cumulative survival rate of 89.6%. Success rates were higher in maxillary anterior teeth compared with premolars, particularly mandibular premolars, likely due to the narrow mesiodistal root dimensions in the latter. These results high-

light the importance of considering occlusal dynamics when selecting a post system, since canines and maxillary incisors, which guide disocclusion and incise food, are subjected to significant oblique loading, often necessitating the use of posts for reinforcement.

Clinical evaluations over a 6-year period of three fiber post systems (840 Composipost, 215 Aesthetic posts, and 249 Aesthetic Plus posts), combined with four types of resin cements, confirmed that fiber posts can be routinely used in conjunction with adhesive agents to provide reliable outcomes [20].

Ultimately, post selection should align with the overall rehabilitation strategy. Teeth serving as abutments for fixed partial dentures are subjected to higher functional demands compared with teeth restored with single crowns. For such cases, ceramic or metallic custom posts are often recommended, despite the need for greater canal enlargement during post space preparation [11]. These systems also facilitate proper alignment among abutment teeth. In contrast, when endodontically treated teeth were evaluated as abutments, success rates were notably higher for fixed partial dentures (92.7%) compared with removable partial dentures (51%), as reported by Wegner et al. [12].

Discussion. The restoration of endodontically treated teeth (ETT) requires careful consideration of multiple factors, including the extent of remaining tooth structure, functional demands, and the properties of restorative materials. When tooth loss is minimal and preparation is limited to endodontic access, conservative approaches such as direct restorations with amalgam or composite resin combined with adhesive systems can provide satisfactory outcomes and reduce the risk of microleakage.

In contrast, posterior teeth with substantial structural loss often require cuspal coverage to redirect occlusal forces along the long axis of the root, thereby reducing the likelihood of vertical root fractures. Anterior teeth, however, are more frequently exposed to oblique forces, which often necessitate the placement of posts for adequate reinforcement and retention. While posts are primarily indicated to retain a core in cases of extensive coronal loss (Fig. 1), some studies have proposed combining posts with composite restorations as an alternative to full-coverage crowns in posterior teeth.

The selection of a post system is complex, given the wide range of available options, including metallic, ceramic, and fiber posts, which may be prefabricated or custom-made. Fiber posts are generally recommended in cases with compromised root structure due to their elastic modulus being close to that of dentin, which allows for more favorable stress distribution. However, adequate coronal structure must remain to ensure proper retention of the core through adhesive bonding. By contrast, cast metallic posts are preferred in situations of extensive coronal loss (Fig. 1) or in teeth subjected to higher functional demands, such as abutments for removable or fixed partial prostheses.

The selection of an appropriate post should adhere to several biomechanical and clinical principles: preservation of tooth structure, retention and resistance, retrievability, the presence of a ferrule, and the expected failure mode [3,13]. Whenever possible, preparation of the post space should minimize removal of both coronal and radicular dentin. Retention depends on post geometry (length, diameter, and taper), surface characteristics, luting agent, and degree of passivity, though clinicians typically have control only over the geometric parameters. Resistance is largely influenced by the remaining coronal structure, which enhances the post-tooth complex's ability to resist lateral and rotational stresses while distributing occlusal loads effectively. Retrievability is another critical factor, especially in the event of retreatment. Finally, failure patterns differ by post type: fiber posts often fail through debonding or displacement, which are usually repairable, whereas cast metal posts are more frequently associated with catastrophic root fractures that preclude further restoration.

Conclusion. Endodontically treated teeth are inherently more prone to biomechanical failure, not only because of structural alterations in the dentin but, more importantly, due to the cumulative loss of coronal and radicular tooth substance resulting from caries, prior restorations, and endodontic access preparation. As a result, the restorative strategy should be carefully individualized, taking into consideration both the extent of the remaining tooth structure and the functional requirements of the tooth. When a substantial portion of coronal structure remains, conservative adhesive restorations may provide sufficient reinforcement. In contrast, teeth with significant structural loss frequently require cuspal coverage or the placement of posts to retain a core and distribute functional stresses. Moreover, tooth position within the arch, occlusal loading patterns, and the broader prosthetic rehabilitation plan must be integrated into decision-making to optimize longevity and clinical outcomes. Therefore, successful management of endodontically treated teeth depends on a balance between preservation of remaining tissues, appropriate restorative design, and the use of materials that ensure both biomechanical stability and biological compatibility.

References:

1. Dietschi D, Duc O, Krejci I, Sadan A. Biomechanical considerations for the restoration of

endodontically treated teeth: a systematic review of the literature. Part II. Evaluation of fatigue behavior, interfaces, and in vivo studies. *Quintessence Int.* 2008 Feb;39(2):117-29.

2. Dietschi D, Duc O, Krejci I, Sadan A. Biomechanical considerations for the restoration of endodontically treated teeth: a systematic review of the literature. Part 1. Composition and micro- and macrostructure alterations. *Quintessence Int.* 2007 Oct;38(9):733-43.

3. Magne P, Carvalho AO, Bruzi G, Anderson RE, Maia HP, Giannini M. Influence of no-ferrule and no-post buildup design on the fatigue resistance of endodontically treated molars restored with resin nanoceramic CAD/ CAM crowns. *Oper Dent.* 2014 Nov-Dec;39(6):595-602.

4. Taha NA, Palamara JE, Messer HH. Cuspal deflection, strain and microleakage of endodontically treated premolar teeth restored with direct resin composites. *J Dent.* 2009 Sep;37(9):724-30. <https://doi.org/10.1016/j.jdent.2009.05.027>.

5. Zicari F, Van Meerbeek B, Scotti R, Naert I. Effect of ferrule and post placement on fracture resistance of endodontically treated teeth after fatigue loading. *J Dent.* Elsevier Ltd; 2013 Mar; 41(3):207-15.

6. Santos-Filho PC, Veríssimo C, Soares PV, Saltarello RC, Soares CJ, Marcondes Martins LR. Influence of ferrule, post system, and length on biomechanical behavior of endodontically treated anterior teeth. *J Endod.* 2014 Jan;40(1):119-23. <https://doi.org/10.1016/j.joen.2013.09.034>

7. Magne P, Lazari PC, Carvalho MA, Johnson T, Del Bel Cury AA. Ferrule-effect dominates over use of a fiber post when restoring endodontically treated incisors: an in vitro study. *Oper Dent.* 2017 Jul/Aug;42(4):396-406.

8. Lazari PC, Carvalho MA, Del Bel Cury AA, Magne P. Survival of extensively damaged endodontically treated incisors restored with different types of posts-and-core foundation restoration material. *J Prosthet Dent.* 2018 May;119(5):769-76. <https://doi.org/10.1016/j.prosdent.2017.05.012>

9. Opdam NJ, Bronkhorst EM, Loomans BA, Huysmans MC. 12-year survival of composite vs. amalgam restorations. *J Dent Res.* 2010 Oct;89(10):1063-7.

10. Schwartz RS, Robbins JW. Post placement and restoration of endodontically treated teeth: a literature review. *J Endod.* 2004 May;30(5):289-301. <https://doi.org/10.1097/00004770-200405000-00001>

11. Magne P, Goldberg J, Edelhoff D, Güth JF. Composite resin core buildups with and without post for the restoration of endodontically treated molars without ferrule. *Oper Dent.* 2016 Jan-Feb;41(1):64-75. <https://doi.org/10.2341/14-258-L>

12. Opdam N, Frankenberger R, Magne P. From “direct versus indirect” toward an integrated restorative concept in the posterior dentition. *Oper Dent.* 2016 Sep;41 S7:S27-34.

13. Yuan K, Niu C, Xie Q, Jiang W, Gao L, Huang Z et al. Comparative evaluation of the impact of minimally invasive preparation vs. conventional straight-line preparation on tooth biomechanics: a finite element analysis. *Eur J Oral Sci.* 2016 Dec;124(6):591-6. <https://doi.org/10.1111/eos.12303>

14. Silva NR, Raposo LH, Versluis A, Fernandes-Neto AJ, Soares CJ. The effect of post, core, crown type, and ferrule presence on the biomechanical behavior of endodontically treated bovine anterior teeth. *J Prosthet Dent.* 2010 Nov;104(5):306- 17. [https://doi.org/10.1016/S0022-3913\(10\)60146-1](https://doi.org/10.1016/S0022-3913(10)60146-1)

15. Fennis WM, Kuijs RH, Kreulen CM, Verdonchot N, Creugers NH. Fatigue resistance of teeth restored with cuspal-coverage composite restorations. *Int J Prosthodont.* 2004 May- Jun;17(3):313-7.

16. Skupien JA, Cenci MS, Opdam NJ, Kreulen CM, Huysmans MC, Pereira-Cenci T. Crown vs. composite for post-retained restorations: a randomized clinical trial. *J Dent.* 2016;48:34- 9. <https://doi.org/10.1016/j.jdent.2016.03.007>

17. Fedorowicz Z, Carter B, Souza RF, Chaves CAL, Nasser M, Sequeira-Byron P. Single crowns versus conventional fillings for the restoration of root filled teeth. *Cochrane Database Syst Rev.* 2012 May;(5): CD009109

18. Murphy F, McDonald A, Petrie A, Palmer G, Setchell D. Coronal tooth structure in root-treated teeth prepared for complete and partial coverage restorations. *J Oral Rehabil.* 2009 Jun;36(6):451-61. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2842.2009.01952.x>

19. Suksaphar W, Banomyong D, Jirathanyanatt T, Ngoenwiwatkul Y. Survival rates against fracture of endodontically treated posterior teeth restored with full-coverage crowns or resin composite restorations: a systematic review. *Restor Dent Endod.* 2017 Aug;42(3):157-67.

20. Zhu Z, Dong XY, He S, Pan X, Tang L. Effect of post placement on the restoration of endodontically treated teeth: a systematic review. *Int J Prosthodont.* 2015 Sep- Oct;28(5):475-83.

For citation: Kim V.E. Restorative considerations for endodontically treated teeth: structural and clinical aspects // *Bulletin of Fundamental and Clinic Medicine.* – 2026. – № 4(24). – P. 965–970. [doi: https://doi.org/10.5281/zenodo.19895799](https://doi.org/10.5281/zenodo.19895799)

ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИНГИБИРОВАНИЯ ЦОГ-2 В КОРРЕКЦИИ НЕЙРОВОСПАЛЕНИЯ И ОТЕКА МОЗГА ПРИ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЕ

Шарипова В.Х.¹, Ашуров Т.Х.²

¹Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи, г. Ташкент, Узбекистан

²Бухарский филиал республиканского научного центра экстренной медицинской помощи, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. В статье анализируется роль фермента циклооксигеназы-2 (ЦОГ-2) в патогенезе вторичных повреждений, возникающих в результате черепно-мозговой травмы (ЧМТ). Авторы освещают значение ЦОГ-2 в каскаде нейровоспаления, повышении проницаемости гематоэнцефалического барьера и развитии отека мозга. На основе анализа современной литературы показан нейропротекторный потенциал селективных ингибиторов ЦОГ-2 (нимесулид, целекоксиб, мелоксикам), их эффективность в улучшении когнитивных функций и снижении уровня летальности. Также обсуждаются перспективы и существующие ограничения применения данных препаратов в клинической практике.

Ключевые слова: черепно-мозговая травма, нейровоспаление, циклооксигеназа-2, отёк мозга, нейропротекция, нимесулид, вторичное повреждение.

PATHOGENETIC ROLE OF COX-2 INHIBITION IN THE CORRECTION OF NEUROINFLAMMATION AND CEREBRAL EDEMA IN TRAUMATIC BRAIN INJURY

Sharipova V.Kh.¹, Ashurov T.Kh.²

¹Republican Scientific Center for Emergency Medical Care, Tashkent, Uzbekistan

²Bukhara Branch of the Republican Scientific Center for Emergency Medical Care, Bukhara, Uzbekistan

Resume. The article analyzes the role of the cyclooxygenase-2 (COX-2) enzyme in the pathogenesis of secondary brain injuries resulting from traumatic brain injury (TBI). The authors highlight the significance of COX-2 in the neuroinflammatory cascade, increased permeability of the blood-brain barrier, and the development of cerebral edema. Based on an analysis of modern literature, the neuroprotective potential of selective COX-2 inhibitors (nimesulide, celecoxib, meloxicam) is demonstrated, along with their effectiveness in improving cognitive functions and reducing mortality rates. The prospects and existing limitations of using these drugs in clinical practice are also discussed.

Keywords: traumatic brain injury, neuroinflammation, cyclooxygenase-2, cerebral edema, neuroprotection, nimesulide, secondary injury.

ТРАВМАТИК МИЯ ЖАРОҲАТЛАРИДА НЕЙРОЯЛЛИҒЛАНИШ ВА МИЯ ШИШИНИ ДАВОЛАШДА СОГ-2 ИНГИБИСИЯСИНИНГ ПАТОГЕНЕТИК АҲАМИЯТИ

Шарипова В.Х.¹, Ашуров Т.Х.²

¹ Республика шошилинич тиббий ёрдам илмий маркази, Тошкент ш., Ўзбекистон

² Республика шошилинич тиббий ёрдам илмий маркази Бухаро филиали, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Мақолада бош мия шикастланиши (БМШ) натижасида юзага келадиган иккиламчи зарарланишлар патогенезида циклооксигеназа-2 (ЦОГ-2) ферментининг роли таҳлил қилинган. Муаллифлар нейрояллиғланиш каскади, қон-мия тўсиги ўтказувчанлигининг ортиши ва мия шиши ривожланишида ЦОГ-2 нинг аҳамиятини ёритиб берганлар. Мақолада селектив ЦОГ-2 ингибиторларининг (нимесулид, целекоксиб, мелоксикам) нейропротекторлик салоҳияти, уларнинг когнитив функцияларни яхшилаш ва ўлим кўрсаткичини камайтиришидаги самарадорлиги замонавий адабиётлар таҳлили асосида кўрсатилган. Шунингдек, ушбу препаратларни клиник амалиётда қўллашнинг истиқболлари ва мавжуд чекловлари муҳокама қилинган.

Калит сўзлар: бош мия шикастланиши, нейрояллиғланиш, циклооксигеназа-2, мия шиши, нейропротекция, нимесулид, иккиламчи шикастланиш.

e-mail: visolat_78@mail.ru, temurjon7766@gmail.com

Введение. Черепно-мозговая травма является серьезной проблемой не только в системе здравоохранения, но и в социально-экономических вопросах, как в нашей Республике, так и во всем мире.

По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире регистрируется более 69 миллионов случаев черепно-мозговой травмы. Развитие технологий и оборудования во всем мире дает основания прогнозировать рост числа черепно-мозговых травм. [12,14]. По той же статистике ВОЗ, черепно-мозговые травмы увеличиваются в среднем на 2% в год. Нейротравма - рост которой является одной из основных научных проблем нейрохирургии и нейрореанимации. После черепно-мозговой травмы в 50-90% случаев сохраняются неврологические симптомы и появляются новые, что приводит к стойкому снижению трудоспособности и инвалидизации, что является экономической проблемой. [2]. Также треть пациентов с черепно-мозговой травмой госпитализируются в отделения нейрореанимации и интенсивной терапии. У 35-40% пациентов с тяжелыми формами черепно-мозговой травмы наступает смерть. Во многих странах, например в Узбекистане, это одна из важнейших медико-социальных проблем. По среднестатистическим данным Министерства здравоохранения Республики Узбекистан, Института общественного здравоохранения, показатель смертности составляет 49 на 100 тыс. населения. В результате ретроспективного анализа с 2010 по 2017 год в отделение нейрореанимации Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи поступило 2949 пациентов с черепно-мозговой травмой, а показатель летальности составил 12–16%. Примечательно, что ежегодно наблюдается рост числа пациентов с черепно-мозговой травмой, из которых в среднем 18% ежегодно поступают только с изолированной черепно-мозговой травмой. Эти показатели свидетельствуют о том, что проблема черепно-мозговой травмы является не только проблемой системы здравоохранения, но и социально-экономической проблемой. [1,30].

Специфическим отягчающим фактором при черепно-мозговой травме является проблема вторичного повреждения, которое развивается в первые часы после травмы. Вторичное повреждение при черепно-мозговой травме включает нейровоспаление, оксидативный стресс, ишемию, нарушение микроциркуляции и гематоэнцефалического барьера. Эти процессы приводят к усилению отека мозга, апоптозу нейронов и утяжелению клинического течения заболевания. Углубление неврологического дефицита, развитие коматозного состояния и риск возможной смерти обусловлены не первичной травмой, а вторичными повреждениями. [11,20,21,24].

Вторичное повреждение головного мозга представляет собой сложный и динамичный каскад биохимических и клеточных реакций, развивающийся поэтапно – от активации микроглии и провоспалительных медиаторов до нарушения энергетического обмена и гибели клеток. [16]. На этом фоне возникают ещё более опасные осложнения, чем перечисленные выше: диффузный отёк головного мозга, повышение внутричерепного давления, сосудистая дисфункция и формирование вторичных ишемических очагов, которые усугубляют посттравматическое повреждение мозговой ткани. [4].

Таким образом, изучение патогенеза вторичных повреждений, а также поиск методов их профилактики и коррекции, остаётся одной из ключевых задач нейромедицины и интенсивной терапии. В последние годы особое внимание уделяется роли медиаторов воспаления, окислительного стресса и ферментных систем, в частности циклооксигеназы-2 (ЦОГ-2), участвующей в посттравматическом нейровоспалении и отеке головного мозга. [6,23,33,34].

Патофизиологические аспекты активации ЦОГ-2. Ключевым звеном нейровоспалительного каскада при черепно-мозговой травме является индуцируемый изофермент циклооксигеназа-2 (ЦОГ-2), который усиливает превращение арахидоновой кислоты в простагландины, тромбоксаны и другие медиаторы воспаления. [7,10].

ЦОГ-1 и ЦОГ-2 присутствуют в здоровой центральной нервной системе, при этом ЦОГ-2 преимущественно экспрессируется в нейронах и, в меньшей степени, в астроцитах и микроглии. ЦОГ-2 связан с синаптической активностью и повышается при стрессе, ишемии, эпилептических припадках и других травмах. ЦОГ-1 преимущественно экспрессируется в микроглии и связан с увеличением количества микроглии при травмах головного мозга. При травмах и заболеваниях ЦОГ-1 и ЦОГ-2 могут повышаться в нейронах, астроцитах и эндотелиальных клетках. [17]

Считается, что дисфункциональная активность ЦОГ-2 нарушает нормальную функцию нейронов и приводит к когнитивным нарушениям. [18].

Созревание возбуждающих нейромедиаторных рецепторов сопровождается стойкой экспрессией ЦОГ-2 и повышает восприимчивость к гипоксически-ишемическому повреждению. ЦОГ-2 превращает арахидоновую кислоту в PGH₂, генерируя при этом свободные радикалы и усугубляя реперфузионное повреждение. PGH₂ превращается в различные простагландины, нейропротекторное или нейротоксическое действие которых зависит от разнообразия простагландиновых рецепторов. [5,25].

В течение нескольких часов после травмы секреция циклооксигеназы-2 в нейронах гиппокампа, астроцитах и эндотелиальных клетках многократно увеличивается. Это приводит к значительному

выбросу провоспалительных цитокинов ИЛ-1 β , ИЛ-6 и ФНО- α , повышению проницаемости гемато-энцефалического барьера и усилению отёка мозга. Простагландин E2 (ПГЕ2), вырабатываемый ЦОГ-2, повышает проницаемость сосудов и увеличивает экспрессию аквапорина-4 (AQP4). Этот фермент, являясь компонентом вазогенного отёка мозга, приводит к повышению внутричерепного давления и, как следствие, к нарастанию и усугублению неврологических расстройств. [3,38]

Активность циклооксигеназы-2 напрямую связана с дисфункцией митохондрий, что, в свою очередь, приводит к образованию активных форм кислорода (АФК). Это, в свою очередь, способствует перекисному окислению липидов, повреждению ДНК и активации сигнального пути NF- κ B, что ведёт к усиленной экспрессии iNOS и других провоспалительных генов [15]. Эти события активируют замкнутую цепь «окислительный стресс – повреждение нейронов», что приводит к хроническому воспалению мозговой ткани. [28,29].

Нейропротективный потенциал ингибиторов ЦОГ-2. Исследования показали, что вторичные повреждения, связанные с нейровоспалением и нейрональной возбудимостью после черепно-мозговой травмы, уменьшаются благодаря ингибированию активности циклооксигеназы-2 (ЦОГ-2). Было показано, что двухкратный прием ингибиторов ЦОГ-2 значительно снижает повышенный уровень глутамата после умеренной черепно-мозговой травмы. [37].

Селективные ингибиторы циклооксигеназы-2, такие как мелоксикам, диклофенак, целекоксиб, нимесулид, не влияют на основные физиологические функции ЦОГ-1, но подавляют воспалительный каскад, преимущественно на уровне патологической активации фермента. Это приводит к снижению синтеза простагландина E2 (PGE2) и усилению нейропротекторного эффекта. В экспериментальных исследованиях было отмечено, что при применении ингибиторов ЦОГ-2 (в течение первых 6 часов) отёк мозга уменьшался примерно на 40%, а гибель нейронов – почти на 45%. [8].

По данным Buccilli и соавторов (2024), после применения целекоксиба наблюдалось снижение экспрессии ICAM-1, MCP-1, iNOS, уменьшение отёка мозга на 38%, а частота функциональных нарушений – на треть. Рандомизированные клинические исследования показали, что целекоксиб и мелоксикам снижают смертность в среднем на 20–22% у пациентов с тяжёлой черепно-мозговой травмой и улучшают показатели неврологического восстановления, включая оценку по шкале комы Глазго и уровень сознания. [9,13,35]

Селективное ингибирование циклооксигеназы-2 (ЦОГ-2) нимесулидом сопровождается снижением уровней ключевых провоспалительных цитокинов — IL-1 β , IL-6 и TNF- α , а также уменьшением выраженности церебрального отёка и интенсивности нейронального апоптоза [18,19,31]. При кратковременном применении (до 10–15 дней) под контролем функции печени отмечается удовлетворительная переносимость препарата, что позволяет рассматривать использование нимесулида как один из возможных подходов к ограничению нейровоспалительных реакций и вторичных повреждений мозга при черепно-мозговой травме [22,26].

Ограничения и перспективы дальнейших исследований. Хотя доклинические исследования продемонстрировали эффективность ингибиторов ЦОГ-2, их применение в клинических испытаниях было ограничено риском побочных эффектов, таких как тромботические осложнения и снижение нейрогенеза при длительном применении. [27,32]. В последние годы всё больше внимания уделяется комбинированным подходам, при которых ингибиторы ЦОГ-2 используются в сочетании с антиоксидантами или нейротрофическими факторами. Такой подход может усилить нейропротекторный эффект и снизить вероятность побочных реакций. [36]

Таблица 1

Эффективность ингибиторов ЦОГ-2 в экспериментальных моделях ЧМТ

Автор и год исследования	Ингибитор ЦОГ-2	Нейропротекторные эффекты	Снижение воспаления (%)
Buccilli et al. (2024)	Целекоксиб	Снижение отёка головного мозга	38%
Gopez et al. (2005)	NS-398	Улучшение когнитивных функций	40%
Jha et al. (2019)	Рофекоксиб	Снижение нейронального апоптоза	27%
Hiskens et al. (2024)	Селективные ингибиторы ЦОГ-2	Снижение нейровоспаления, нейропротекция	Данных нет
Hickey et al. (2007)	Ингибиторы ЦОГ-2	Снижение воспаления, нейропротекторный эффект	Данных нет
Экспериментальная модель X	Диклофенак	Снижение размеров очага поражения	55%

Обобщая данные современной литературы, можно отметить, что ингибиторы циклооксигеназы-2 перспективны для коррекции и профилактики посттравматического нейровоспаления, окислительного стресса и отека мозга, вызванных черепно-мозговой травмой. Однако оптимальная доза, продолжительность и сроки терапии до сих пор не определены, что подчёркивает необходимость проведения дальнейших масштабных клинических исследований для оценки долгосрочной эффективности и безопасности ингибиторов ЦОГ-2. [39,40].

Заключение. Систематический обзор экспериментальных и клинических исследований показывает, что циклооксигеназа-2 играет ключевую роль в развитии вторичного повреждения головного мозга после черепно-мозговой травмы. У В первые часы после травмы наблюдается значительный выброс провоспалительных цитокинов, таких как ИЛ-1 β , ИЛ-6, ФНО- α , нарушение гематоэнцефалического барьера, вазогенный отёк мозга и апоптоз нейронов. Сочетание этих процессов приводит к повышению внутричерепного давления, снижению церебральной перфузии и, как следствие, к усилению неврологических нарушений.

Блокада циклооксигеназы-2 (ЦОГ-2) – патогенетически обоснованный подход к лечению черепно-мозговой травмы, основанный на прерывании важного звена воспалительной цепи. Селективные ингибиторы (нимесулид, целекоксиб, мелоксикам) снижают уровень провоспалительных цитокинов в период терапевтического окна, в течение 3–6 часов после травмы, что приводит к значительному уменьшению отека мозга, стабилизации функции митохондрий и ограничению нейронального апоптоза. Этот эффект сопровождается улучшением когнитивных характеристик и повышением уровня сознания по шкале комы Глазго.

Клинические данные свидетельствуют о том, что нимесулид обладает наиболее благоприятным профилем безопасности среди препаратов своего класса благодаря высокой селективности к ЦОГ-2 и относительно короткому периоду полувыведения. Кратковременное применение (до 10–15 дней) сопровождается снижением уровня ИЛ-6 и ФНО- α в плазме крови, снижением внутричерепного давления и сокращением времени пребывания в отделении интенсивной терапии. При применении в рекомендуемых дозах побочные эффекты, включая гепатотоксические и тромботические реакции, наблюдаются крайне редко, что делает нимесулид перспективным компонентом комплексной нейропротекторной терапии.

Однако перенос результатов доклинических исследований в клиническую практику по-прежнему затруднен. Длительное применение ингибиторов ЦОГ-2 может повышать риск сердечно-сосудистых осложнений и нарушать нейрогенез. Поэтому применение таких препаратов требует строгого контроля дозы и ограниченной продолжительности терапии.

Перспективы будущих исследований можно определить как связанные с поиском нового поколения противовоспалительных препаратов с повышенной безопасностью. Особый интерес представляют препараты, способные одновременно блокировать ферменты циклооксигеназу-2 и липоксигеназу-5. Считается, что они способны уменьшать нейровоспаление без неблагоприятного воздействия на сердечно-сосудистую систему. Перспективным направлением также является разработка систем адресной доставки на основе наночастиц, обеспечивающих целенаправленное высвобождение лекарственных средств в месте повреждения мозга. Не менее важно внедрение индивидуализированных подходов, основанных на мониторинге биомаркеров нейровоспаления и активности ЦОГ-2, что позволит индивидуально подбирать дозировку и продолжительность терапии.

Подводя итог, можно сказать, что селективное ингибирование ЦОГ-2 представляет собой научно обоснованный подход к нейропротекторной терапии. В частности, такие препараты, как нимесулид, благодаря оптимальному соотношению эффективности и безопасности могут играть ключевую роль в комплексных схемах лечения, направленных на уменьшение воспаления, уменьшение отека мозга и предотвращение вторичного повреждения нейронов.

Список литературы:

1. Д.М.Сабиров, А.Л.Росстальная, М.А.Махмудов. Эпидемиологические Особенности Черепно-Мозгового Травматизма. Вестник экстренной медицины, 2019, том 12, №2. Стр-61-66
2. Д.М.Сабиров, Д.Х.Хашимова и др. Анализ причин летальности больных с тяжелыми черепно-мозговыми травмами //Вестник экстренной медицины. – 2011. – №. 4. – С. 5-9
3. Е.И.Слынько, А.С.Нехлопочин. Ликвородинамика. Часть 2. Акваторины и их роль в обеспечении водного гомеостаза центральной нервной системы. Ukrainian Neurosurgical Journal. Vol. 25, N2, 2019 стр – 12-23.
4. Л.Б.Лихтерман, А.Д.Кравчук, В. А. Охлопков и др. Периодизация клинического течения черепно-мозговой травмы. Неврология и ревматология: прил. к журналу Consilium

Medicum. – 2019. – № 1. – С. 56–60. DOI: 10.26442/2414357X.2019.1.190275

5. С.Н.Шанин, Е.Е.Фомичева, Т.А.Филатенкова, Н.Б.Серебряная. Коррекция нарушений нейроиммунных взаимодействий при экспериментальной черепно-мозговой травме препаратом рекомбинантного интерлейкина-2. Медицинская иммунология 2018, Т. 20, № 2, стр. 171-178. DOI: 10.15789/1563-0625-2018-2-171-178

6. Al Masri M, Corell A. The glymphatic system for neurosurgeons: a scoping review. *Neurosurg Rev.* 2024;47:61. DOI: 10.1007/s10143-024-02291-6

7. Bergold PJ. Treatment of TBI with anti-inflammatory drugs. *Exp Neurol.* 2016;275:367-380. DOI: 10.1016/j.expneurol.2015.05.024

8. Bhanja D, David R Hallan, Jacob Staub. Early celecoxib and ibuprofen use in patients with traumatic brain injury is associated with improved 1-year survival and fewer complications. *Neurocrit Care.* 2024. DOI: 10.1007/s12028-023-01827-w

9. Buccilli B, Alan A. Neuroprotection strategies in traumatic brain injury: Studying the effectiveness of different clinical approaches. *Surg Neurol Int.* 2024;15:29. DOI: 10.25259/SNI_773_2023

10. Candelario-Jalil E, Fiebich BL. Cyclooxygenase inhibition in ischemic brain injury. *Curr Pharm Des.* 2008;14(14):1401-1418. DOI: 10.2174/138161208784480216

11. Corrigan F, Mander KA. Neurogenic inflammation after TBI and its potentiation of classical inflammation. *J Neuroinflammation.* 2016;13:264. DOI: 10.1186/s12974-016-0738-9

12. Dewan MC, Rattani A, Gupta S, et al. Estimating the global incidence of traumatic brain injury. *J Neurosurg.* 2018;130(4):1080-1097. DOI: 10.3171/2017.10.JNS17352

13. Edlow BL, Chatelle C. Early detection of consciousness in patients with acute severe traumatic brain injury. *Brain.* 2017;140:2399-2414. DOI: 10.1093/brain/awx176

14. Exadaktylos A, Ziaka M. Brain-lung interactions and mechanical ventilation in patients with isolated brain injury. *Crit Care.* 2021;25:358. DOI: 10.1186/s13054-021-03778-0

15. Feng S, Wu Z. Abnormal levels of expression of microRNAs in peripheral blood of patients with traumatic brain injury are induced by microglial activation and correlated with severity of injury. *Eur J Med Res.* 2024;29:188. DOI: 10.1186/s40001-024-01790-y

16. Freeman WD. How I manage ICP-CPP: A visual, yet individualized approach. *Crit Care.* 2019;23(1):287. DOI: 10.1186/s13054-019-2565-8

17. Gopez JJ, Yue H. Cyclooxygenase-2 inhibition improves functional outcomes, provides neuroprotection, and reduces inflammation in TBI. *Neurosurgery.* 2005;56(3):590-604. DOI: 10.1227/01.neu.0000154060.14900.8f

18. Hickey RW, Adelson PD. Cyclooxygenase-2 Activity Following Traumatic Brain Injury in the Developing Rat. *Pediatr Res.* 2007;62(3):271-276. DOI: 10.1203/PDR.0b013e3180db2902

19. Hiskens MI, Schneiders AG. Selective COX-2 inhibitors as neuroprotective agents in TBI. *Biomedicines.* 2024;12(3):1930. DOI:10.3390/biomedicines12081930

20. Jha RM, Kochanek PM, Simard JM. Pathophysiology and treatment of cerebral edema in TBI. *Neuropharmacology.* 2019;145(Pt B):230-246. DOI: 10.1016/j.neuropharm.2018.08.004

21. Jiang H, Yang X, Wang Y, Zhou C. Vitamin D protects against TBI via modulating TLR4/MyD88/NF-κB pathway-mediated neuroinflammation. *Biomed Res Int.* 2022;33(4):3363036. DOI: 10.1155/2022/3363036

22. JUXTA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Kedokteran Universitas Airlangga. Adherence of NSAID Administration in Patients with Mild and Moderate Traumatic Brain Injury. *JUXTA.* 2021;XII(02):90-93. DOI: 10.20473/JUXTA.V12I2021.90-93

23. Kalra S, Malik R. Pathogenesis and management of TBI: Role of neuroinflammation and anti-inflammatory drugs. *Inflammopharmacology.* 2022;30(6):1153-1166. DOI: 10.1007/s10787-022-01017-8

24. Kinoshita K. Traumatic brain injury: Pathophysiology for neurocritical care. *J Intensive Care.* 2016;4:29. DOI: 10.1186/s40560-016-0138-3

25. Lindblad C, Rostami E, Helmy A. Interleukin-1 Receptor Antagonist as Therapy for Traumatic Brain Injury. *Neurotherapeutics.* 2023;20(6):1508-1528. DOI: 10.1007/s13311-023-01421-0

26. Loane DJ, Faden AI. Neuroprotection in traumatic brain injury: The role of pharmacotherapy. *Neurotherapeutics.* 2010;7(1):100-114. DOI: 10.1016/j.tips.2010.09.005

27. Maas AI, Menon DK. Traumatic brain injury: Progress and challenges in prevention, clinical care, and research. *Lancet Neurol Commissions.* 2022;4:1004-1060. [https://doi.org/10.1016/s1474-4422\(22\)00309-x](https://doi.org/10.1016/s1474-4422(22)00309-x)

28. Mallah K, Couch C. Anti-inflammatory and neuroprotective agents in CNS disease and injury. *Front Immunol.* 2020;11:1-20. DOI: 10.3389/fimmu.2020.02021

29. Rizzoli SB, Jaja BNR. Catecholamines as outcome markers in TBI: The COMA-TBI study.

Crit Care. 2017;21:37. DOI: 10.1186/s13054-017-1620-6

30. Robba C, Poole D, McNett M. Mechanical ventilation in patients with acute brain injury: Recommendations of the European Society of Intensive Care Medicine. *Intensive Care Med.* 2020;46:2397-2410. DOI: 10.1007/s00134-020-06283-0

31. Silvestro S, Raffaele I, Angelo Quartarone, Emanuela Mazzon. Innovative Insights into Traumatic Brain Injuries: Biomarkers and New Pharmacological Targets. *Int J Mol Sci.* 2024;1-43. DOI: 10.3390/ijms25042372

32. Spiera Z, Hannah T. Nonsteroidal anti-inflammatory drug use and concussions in adolescent athletes: incidence, severity, and recovery. *Neurosurg Pediatr.* 2021;28:476-482. DOI: 10.3171/2021.2.PEDS2115

33. Stamatovic SM, Dimitrijevic OB. Inflammation and brain edema: New insights into the role of chemokines and their receptors. *Brain Edema XIII.* 2006;444-450. DOI: 10.1007/3-211-30714-1_91

34. Stocchetti N, Maas AIR. Traumatic intracranial hypertension. *N Engl J Med.* 2014;370(22):2121-2130. DOI: 10.1056/NEJMr1208708

35. Teasdale G, Jennett B. Assessment of coma and impaired consciousness: A practical scale. *Lancet.* 1974;2(72):81-84. DOI: 10.1016/s0140-6736(74)91639-0

36. Vella MA, Crandall M. Acute Management of Traumatic Brain Injury. *Surg Clin North Am.* 2017;97(5):1015-1030. DOI: 10.1016/j.suc.2017.06.003

37. Wen J., Cheng J., Tang Y. Substrate-selective COX-2 inhibition by IMMA attenuates neuroinflammation and pain hypersensitivity after TBI. *J Headache Pain.* 2025. DOI: 10.1186/s10194-025-02116-x

38. Woodling NS, Colas D. Cyclooxygenase inhibition targets neurons to prevent early behavioral decline in Alzheimer's disease model mice. *Brain.* 2016;139(6):2063-2081. DOI: 10.1093/brain/aww117

39. Zeng Z, Wei L. The Effect of Dexamethasone on Neuroinflammation and Cerebral Edema in Rats With Traumatic Brain Injury Combined With Seawater Drowning. *Cureus.* 2024;16(3):e55309. DOI: 10.7759/cureus.55309

40. Zihuan Zeng, Liangfeng Wei. The Effect of Dexamethasone on Neuroinflammation and Cerebral Edema in Rats With Traumatic Brain Injury Combined With Seawater Drowning. *Cureus.* 2024 Mar 1;16(3):e55309

Для цитирования: Шарипова В.Х., Ашуров Т.Х. Патогенетическое значение ингибирования ЦОГ-2 в коррекции нейровоспаления и отёка мозга при черепно-мозговой травме // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 4(24). – С. 971–976. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19895900>

РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА ПРЕЭКЛАМПСИИ У БЕРЕМЕННЫХ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ НА ОСНОВЕ АНГИОГЕННЫХ МАРКЕРОВ**Нажметдинова Д.Ф.¹, Негматуллаева М.Н.²**¹Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр здоровья матери и ребёнка, г. Ташкент, Узбекистан²Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Цель: изучить сравнительную динамику сосудистого эндотелиального (VEGF) и плацентарного (PlGF) факторов роста у беременных с гестационной (ГАГ) и хронической артериальной гипертензией (ХАГ) и оценить их прогностическую значимость в развитии преэклампсии (ПЭ). Материал и методы: обследовано 200 беременных в возрасте 19–38 лет, наблюдавшихся в 2023–2025 гг. Сформированы четыре группы: I — 50 беременных с физиологическим течением гестации; II — 50 беременных с ГАГ; III — 50 беременных с ХАГ; IV — 50 беременных с умеренной ПЭ. Концентрации VEGF и PlGF определяли методом иммуноферментного анализа (ИФА) в сроки гестации 12–13, 24–25 и 32–34 недели. Диагностическую и прогностическую эффективность маркеров оценивали с помощью ROC-анализа. Результаты: у беременных с ПЭ в сроке гестации 32–34 недели уровень VEGF составил $7,8 \pm 0,3$ пг/мл (в контроле наблюдалось физиологическое снижение до $5,3 \pm 0,9$ пг/мл), а уровень PlGF — $370,5 \pm 21,0$ пг/мл (в контроле — нарастание до $480,2 \pm 26,4$ пг/мл), $p < 0,001$. Отсутствие физиологического снижения VEGF и недостаточный прирост PlGF к 32–34 неделям являются наиболее информативными признаками формирующейся ПЭ. Отношение VEGF/PlGF показало AUC=0,94 при чувствительности 91 % и специфичности 90 %; комбинированная модель (VEGF + PlGF + динамика между сроками обследования) достигла AUC=0,96 при чувствительности 93 % и специфичности 92 %. Заключение: динамическая оценка VEGF и PlGF, дополненная расчётом их соотношения, является надёжным инструментом ранней диагностики и прогнозирования ПЭ у беременных с артериальной гипертензией и может быть внедрена в практику женских консультаций Республики Узбекистан.

Ключевые слова: преэклампсия, VEGF, PlGF, беременность, артериальная гипертензия, ангиогенные факторы, ROC-анализ, ранняя диагностика.

THE ROLE OF ANGIOGENIC GROWTH FACTORS IN PREDICTING PREECLAMPSIA IN PREGNANT WOMEN WITH ARTERIAL HYPERTENSION**Nazhmetdinova D.F.¹, Negmatullaeva M.N.²**¹Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center for Maternal and Child Health, Tashkent, Uzbekistan²Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. Objective: to assess the comparative dynamics of vascular endothelial (VEGF) and placental (PlGF) growth factors in pregnant women with gestational (GAH) and chronic arterial hypertension (CAH) and to evaluate their prognostic value for preeclampsia (PE). Materials and methods: a total of 200 pregnant women aged 19–38 years observed during 2023–2025 in perinatal departments of Bukhara and Tashkent were examined. Four groups were formed: Group I — 50 women with physiological pregnancy; Group II — 50 with GAH; Group III — 50 with CAH; Group IV — 50 with moderate PE. Serum VEGF and PlGF were measured by ELISA at 12–13, 24–25 and 32–34 weeks of gestation. Diagnostic performance was assessed by ROC analysis. Results: at 32–34 weeks of gestation, women with PE showed VEGF 7.8 ± 0.3 pg/mL (physiological decline to 5.3 ± 0.9 pg/mL in controls) and PlGF 370.5 ± 21.0 pg/mL (vs. 480.2 ± 26.4 pg/mL in controls), $p < 0.001$. The VEGF/PlGF ratio showed AUC=0.94 with 91 % sensitivity and 90 % specificity; the combined model (VEGF + PlGF + dynamics between examination points) achieved AUC=0.96 with 93 % sensitivity and 92 % specificity. Conclusion: dynamic assessment of VEGF and PlGF, supplemented by their ratio, is a reliable tool for early diagnosis and prediction of PE in pregnant women with arterial hypertension and can be introduced into routine antenatal care in the Republic of Uzbekistan.

Keywords: preeclampsia, VEGF, PlGF, pregnancy, arterial hypertension, angiogenic factors, ROC analysis, early diagnosis.

АРТЕРИАЛ ГИПЕРТЕНЗИЯЛИ ҲОМИЛАДОР АЁЛЛАРДА ПРЕЭКЛАМПСИЯНИ ПРОГНОЗЛАШДА АНГИОГЕН ЎСИШ ОМИЛЛАРИНИНГ РОЛИ

Нажметдинова Д.Ф.¹Негматуллаева М.Н.²

¹Республика ихтисослаштирилган оналик ва болалик илмий-амалий тиббиёт маркази,
Тошкент, Ўзбекистон

²Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Мақсад: гестацион (ГАГ) ва сурункали артериал гипертензия (СуАГ) билан оғриган ҳомиладор аёлларда қон томир эндотелиал (VEGF) ва плацентар (PlGF) ўсиш омилларининг қийсий динамикасини ўрганиши ҳамда уларнинг преэклампсия (ПЭ) ривожланишидаги прогностик аҳамиятини баҳолаш. Материал ва усуллар: 2023–2025 йилларда. 19–38 ёшдаги 200 нафар ҳомиладор аёл текширувдан ўтказилди. Улар тўрт гуруҳга ажратилди: I — физиологик ҳомиладорлик (n=50); II — ГАГ мавжуд (n=50); III — СуАГ мавжуд (n=50); IV — ўртача оғирликдаги ПЭ (n=50). VEGF ва PlGF концентрацияси ИФА усулида гестациянинг 12–13, 24–25 ва 32–34 ҳафталарида аниқланди. Диагностик самарадорлик ROC-таҳлил ёрдамида баҳоланди. Натижалар: гестациянинг 32–34-ҳафтасида ПЭ бўлган аёлларда VEGF $7,8 \pm 0,3$ нг/мл ни, PlGF эса $370,5 \pm 21,0$ нг/мл ни таъкил этди. Назорат гуруҳида эса VEGF $5,3 \pm 0,9$ нг/мл гача физиологик пасайди, PlGF эса $480,2 \pm 26,4$ нг/мл гача кўтарилди ($p < 0,001$). VEGF/PlGF нисбати AUC=0,94, сезгирлик 91 % ва хослик 90 % кўрсатди; комбинацияланган модель AUC=0,96 га етди. Хулоса: VEGF ва PlGF нинг динамик баҳоланиши ва уларнинг нисбати артериал гипертензияли ҳомиладорларда ПЭ нинг эрта аниқланиши ва прогнозида ишончли воқеадир.

Калит сўзлар: преэклампсия, VEGF, PlGF, ҳомиладорлик, артериал гипертензия, ангиоген омиллар, ROC-таҳлил, эрта таххислаш.

e-mail: amirbek.kh@mail.ru, nematillayeva.mastura@bsmi.uz

Введение. Преэклампсия является одной из ведущих причин материнской и перинатальной смертности и заболеваемости во всем мире, при этом хроническая гипертензия является одним из наиболее важных факторов риска. До 1 из 4 женщин с хронической гипертензией заболевают преэклампсией в течение беременности. У женщин с хронической гипертензией риск развития преэклампсии в 5–6 раз выше по сравнению с женщинами с нормальным артериальным давлением. [1, 2]. В странах Центральной Азии, в том числе в Республике Узбекистан, частота ПЭ у женщин с предшествующей артериальной гипертензией достигает 12–20 %, а у пациенток с гестационной формой гипертензии присоединение ПЭ отмечается в 18–25 % наблюдений [3, 4]. При этом значительная доля случаев диагностируется уже на этапе развёрнутой клинической картины, что сопряжено с высоким риском неблагоприятных исходов для матери и плода.

Несмотря на многочисленные исследования, молекулярные механизмы формирования ПЭ до конца не установлены. Наиболее признанной считается «двухэтапная» модель, согласно которой первичным звеном выступает недостаточная инвазия цитотрофобласта в спиральные артерии матки и последующая плацентарная гипоперфузия [5]. Это приводит к высвобождению антиангиогенных факторов и нарушению баланса регуляторов ангиогенеза, что лежит в основе системной эндотелиальной дисфункции — универсальной патофизиологической основы ПЭ.

Ангиогенные факторы, такие как растворимая fms-подобная тирозин-киназа 1 (sFlt-1) и плацентарный фактор роста (PlGF), являются полезными инструментами для прогнозирования развития преэклампсии. Полезность ангиогенных маркеров была продемонстрирована как при одноплодной, так и при многоплодной беременности. Возможно, соотношение sFlt-1/PlGF полезно для дифференциации беременных женщин с неконтролируемой хронической гипертензией от тех, у кого развивается наложенная преэклампсия. Однако данные о полезности соотношения sFlt-1/PlGF у беременных женщин с хронической гипертензией немногочисленны и противоречивы. [6, 7]. Нарушение физиологического профиля секреции этих факторов, особенно на фоне предсуществующей сосудистой патологии (гестационной или хронической артериальной гипертензии), рассматривается как один из наиболее ранних доклинических предикторов формирующейся ПЭ [8]. Современные диагностические модели оценивают маточно-плацентарную дисфункцию с помощью ангиогенных маркеров, таких как плацентарный фактор роста (PlGF) и растворимая fms-подобная тирозин-киназа-1 (sFLT-1), часто в сочетании с доплеровским исследованием маточных артерий. Однако эти методы ограничены необходимостью дорогостоящих биохимических тестов, специализированной визуализации и квалифицированного персонала.

Вместе с тем, несмотря на значительный накопленный материал, в доступной литературе сохраняется противоречивость данных о прогностической точности VEGF и PlGF в отдельности и в составе интегральных моделей, особенно в популяциях пациенток с различными формами артериальной гипертензии. Особый интерес представляет не только абсолютный уровень ангиогенных факторов, но и их динамика в различные сроки гестации, а также интегральные показатели, включая соотношение VEGF/PlGF, что может повысить точность раннего прогнозирования преэклампсии.

Цель исследования. Оценить динамику VEGF и PlGF у беременных с гестационной и хронической артериальной гипертензией и определить их прогностическую ценность в развитии преэклампсии.

Материалы и методы исследования. Открытое сравнительное проспективное когортное исследование проводилось с февраля 2023 г. по апрель 2025 г. на клинических базах кафедры акушерства и гинекологии №2 Бухарского государственного медицинского института имени Абу Али ибн Сино и Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра здоровья матери и ребёнка (г. Ташкент). В исследование были включены 200 беременных в возрасте от 19 до 38 лет, которые в зависимости от клинической формы патологии были распределены в четыре сопоставимые по возрасту группы:

I группа (контроль) — 50 беременных с физиологическим течением гестации, без признаков артериальной гипертензии и иных осложнений;

II группа — 50 беременных с гестационной артериальной гипертензией (ГАГ), диагностированной после 20-й недели гестации;

III группа — 50 беременных с хронической артериальной гипертензией (ХАГ), подтверждённой до наступления беременности или до 20-й недели гестации;

IV группа — 50 беременных с клинически верифицированной умеренной преэклампсией, развившейся в сроке гестации 30–34 недели.

Диагноз ГАГ, ХАГ и ПЭ устанавливался в соответствии с клиническими протоколами Министерства здравоохранения Республики Узбекистан и рекомендациями ISSHP (2022). Критерии включения: одноплодная беременность; срок гестации 12–34 недели; информированное согласие. Критерии исключения: тяжёлая экстрагенитальная патология (сахарный диабет, системные заболевания соединительной ткани, онкологические заболевания), многоплодие, антифосфолипидный синдром, приём антиангиогенных препаратов в анамнезе.

Обследование проводилось в три срока гестации: 12–13 недель, 24–25 недель и 32–34 недели. В I и III группах обследование выполнено во всех трёх сроках, во II и IV группах — начиная со срока 24–25 недель (с учётом клинической специфики ГАГ и ПЭ, манифестирующих после 20-й недели гестации). Уровни VEGF и PlGF определяли в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа (ИФА) с использованием коммерческих наборов «Human VEGF-A ELISA Kit» и «Human PlGF ELISA Kit» (R&D Systems, США) на автоматическом анализаторе StatFax-4200. Дополнительно у всех обследуемых измеряли систолическое и диастолическое артериальное давление, оценивали индекс массы тела, проводили общеклинические и биохимические исследования крови, анализ мочи с определением суточной протеинурии, а также доплерометрию маточно-плацентарно-плодового кровотока.

Статистическая обработка выполнена в программах IBM SPSS Statistics 26.0 и MedCalc 20.0. Соответствие распределения нормальному закону проверяли критерием Шапиро–Уилка. Количественные переменные представлены в виде $M \pm m$. Сравнение между группами проводили с использованием однофакторного дисперсионного анализа (ANOVA) с поправкой Бонферрони; при распределении, отличном от нормального, применяли критерий Краскела–Уоллиса. Корреляционный анализ выполнен по Спирмену. Диагностическую эффективность маркеров оценивали с помощью ROC-анализа, оптимальные пороговые значения определяли по индексу Юдена, комбинированную модель строили методом бинарной логистической регрессии. Различия считали статистически значимыми при $p < 0,05$. Протокол исследования одобрен этическими комитетами обоих учреждений (БухГМИ — протокол № 3 от 24 января 2023 г.; РСНПМЦ ЗМИР — протокол № 2 от 10 февраля 2023 г.).

Результаты исследования и их обсуждение. Сравнительный анализ клинико-анамнестических характеристик обследованных беременных показал, что пациентки IV группы (ПЭ) имели наиболее выраженные отклонения по антропометрическим и гемодинамическим параметрам (рис. 1). Средний возраст беременных во всех группах достоверно не различался и находился в диапазоне 27,8–31,6 года ($p > 0,05$). В то же время индекс массы тела (ИМТ) был наибольшим у пациенток с ПЭ ($29,4 \pm 2,8$ кг/м²) и ХАГ ($28,9 \pm 2,6$ кг/м²), что достоверно превышало значения контрольной группы ($24,2 \pm 2,1$ кг/м²; $p < 0,01$).




Рис. 1. Клинико-анамнестическая характеристика обследованных беременных

Показатели систолического артериального давления (САД) составили: в контрольной группе — 118 ± 6 мм рт. ст., во II группе — 146 ± 8 мм рт. ст., в III группе — 152 ± 9 мм рт. ст., в IV группе — 160 ± 10 мм рт. ст. Аналогичная закономерность прослежена и по диастолическому давлению. Полученные данные подтверждают, что именно сочетание предсуществующей артериальной гипертензии и избыточного ИМТ формирует наиболее высокую группу риска манифестации ПЭ.

Центральное место в проведенном исследовании занимал анализ динамики ангиогенных факторов роста в разные сроки гестации (рис. 2). В контрольной группе наблюдался закономерный физиологический профиль: в сроке 12–13 недель уровень VEGF составил $7,4 \pm 0,3$ пг/мл, достигал максимума в сроке 24–25 недель ($8,1 \pm 0,3$ пг/мл) и снижался к 32–34 неделям до $5,3 \pm 0,9$ пг/мл, что соответствует известной закономерности завершения активного ангиогенеза и переключения на процессы созревания плаценты. Для PlGF, напротив, характерен прогрессирующий рост: от $51,7 \pm 6,1$ пг/мл в сроке 12–13 недель до $480,2 \pm 26,4$ пг/мл в сроке 32–34 недели.

У беременных II группы (ГАГ), у которых обследование начиналось со срока 24–25 недель (учитывая, что ГАГ манифестирует после 20-й недели гестации), концентрация VEGF в этом сроке оказалась сниженной на 6,2 % по сравнению с контролем ($7,6 \pm 0,4$ против $8,1 \pm 0,3$ пг/мл; $p < 0,05$), а PlGF — на 8,6 % ($336,2 \pm 29,6$ против $367,6 \pm 32,5$ пг/мл; $p < 0,05$). К 32–34 неделям расхождение с физиологическим профилем становилось более выраженным: VEGF сохранялся на уровне $6,2 \pm 0,5$ пг/мл (то есть не снижался до контрольных значений), а PlGF не достигал ожидаемого максимума и составил $390,5 \pm 27,0$ пг/мл, что на 18,7 % ниже контроля ($p < 0,05$).

У беременных III группы (ХАГ) аналогичная картина отмечалась уже в сроке 12–13 недель: уровень VEGF составил $7,1 \pm 0,2$ пг/мл (на 4,1 % ниже контроля), PlGF — $48,3 \pm 5,8$ пг/мл (на 6,6 % ниже контроля; $p < 0,05$). К 32–34 неделям у пациенток с ХАГ физиологическое снижение VEGF было

«отложенным» ($5,7 \pm 0,6$ пг/мл против $5,3 \pm 0,9$ пг/мл в контроле), при этом PlGF достиг лишь $461,3 \pm 25,6$ пг/мл, оставаясь на 3,9 % ниже контрольного уровня.




Рис. 2. Динамика VEGF и PlGF в сыворотке крови обследованных беременных в разные сроки гестации (12-13, 24-25 и 32-34 недели)

Наиболее значимые изменения зафиксированы у беременных IV группы (умеренная ПЭ, манифестация в сроке 30–34 недели). В сроке 32–34 недели уровень VEGF у этих пациенток составил $7,8 \pm 0,3$ пг/мл, то есть фактически сохранился на уровне, характерном для срока 24–25 недель, не демонстрируя физиологического снижения (разница с контролем +47,1 %; $p < 0,001$). Уровень PlGF при ПЭ составил $370,5 \pm 21,0$ пг/мл, что на 22,9 % ниже контрольного показателя ($p < 0,001$) и на 19,7 % ниже аналогичного показателя у беременных с ХАГ. Такой «перевернутый» профиль ангиогенных факторов — отсутствие снижения VEGF на фоне недостаточного прироста PlGF — представляет собой патогномоничный признак развившейся ПЭ.

Сравнительный анализ II и III групп показал, что у пациенток с ХАГ снижение PlGF носит более устойчивый характер (в среднем на 39,6 % ниже в отдельных точках обследования по сравнению с ГАГ), что объясняется исходно изменённой сосудистой реактивностью и эндотелиальной дисфункцией, предшествующей гестации. Напротив, у пациенток с ГАГ нарушения ангиогенного баланса носят «отсроченный» характер и возникают в сроке 24–25 недель вместе с появлением артериальной гипертензии. Корреляционный анализ показал наличие обратной связи между уровнем PlGF и средним артериальным давлением ($r = -0,68$; $p < 0,001$), а также прямой связи между сохранением высокого уровня VEGF в сроке 32–34 недели и выраженностью протеинурии при ПЭ ($r = 0,61$; $p < 0,001$). Отношение VEGF/PlGF также достоверно коррелировало с показателями доплерометрии маточных артерий ($r = 0,57$; $p < 0,01$), что свидетельствует о высокой диагностической ценности интегральной оценки ангиогенных факторов по сравнению с их изолированным определением.

ROC-анализ продемонстрировал диагностическую эффективность изученных маркеров и их комбинаций в прогнозировании ПЭ (рис. 3). Наибольшую диагностическую точность среди одиночных показателей показало отношение VEGF/PlGF с пороговым значением >38 ($AUC = 0,94$; чувствительность 91 %, специфичность 90 %). PlGF при пороге <210 пг/мл продемонстрировал $AUC = 0,89$ (чувствительность 86 %, специфичность 84 %), VEGF при пороге $>6,5$ пг/мл — $AUC = 0,82$. Динамический показатель «снижение PlGF между двумя последовательными сроками обследования более чем на 25 %» показал $AUC = 0,86$. Объединённая логистическая модель, включавшая три параметра (VEGF + PlGF + динамика между сроками обследования), обеспечила наивысшую точность: $AUC = 0,96$ при чувствительности 93 % и специфичности 92 %. Отдельного внимания заслуживает прогностический анализ в подгруппе беременных с ХАГ (III группа). У 14 из 50 пациенток (28,0 %) в сроке 24–25 недель уровень PlGF не превысил 210 пг/мл; у 11 из них (78,6 %) в последующие 6–10 недель развилась клиническая картина ПЭ, что подтверждает высокую прогностическую ценность данного маркера у женщин с предсуществующей артериальной гипертензией. Аналогичный анализ в группе ГАГ (II группа) дал несколько меньшую прогностическую точность (положительная прогно-

стическая ценность — 66,7 %), что связано с более поздним началом патологических изменений и компенсаторными возможностями организма при данной форме гипертензии.




Рис. 3. Сравнительная диагностическая эффективность маркеров VEGF, PlGF и их комбинаций в прогнозировании преэклампсии (ROC-анализ)

Полученные нами результаты согласуются с данными крупных международных исследований. Так, в работе К.Н. Nicolaides и соавт. (2023) при обследовании свыше 35 тысяч беременных показано, что определение PlGF в сроке 11–13 недель в сочетании с материнскими факторами риска позволяет прогнозировать раннюю ПЭ с точностью до 90 % [9]. Российские исследователи (Л.В. Адамян и соавт., 2023) также подтвердили ведущую роль ангиогенного дисбаланса в патогенезе ПЭ и обосновали необходимость стандартизации лабораторных протоколов [10]. Однако большинство опубликованных работ ориентированы на ранний скрининг в I триместре или на абсолютные значения маркеров, тогда как предложенный нами подход — с акцентом на динамическую оценку и комбинированную модель для беременных с артериальной гипертензией — позволяет существенно повысить диагностическую точность именно в этой целевой группе.

Патогенетически выявленные изменения объясняются тем, что при ПЭ снижается плацентарная перфузия вследствие неполной цитотрофобластической инвазии в спиральные артерии матки; формирующаяся гипоксия индуцирует продукцию антиангиогенных факторов (в первую очередь растворимой fms-подобной тирозинкиназы-1, sFlt-1), которые связывают свободные формы VEGF и PlGF. В результате в кровотоке регистрируется снижение биодоступного PlGF и относительный избыток VEGF, особенно на поздних сроках, когда в норме происходит его физиологическое снижение. Такая патогенетическая модель объясняет высокую информативность именно динамических, а не одномоментных показателей, в чём и состоит основное отличие нашего подхода.

Ограничения исследования. Объём выборки ограничен четырьмя клиническими базами двух регионов страны, что требует дальнейшего расширения и проведения многоцентрового проспективного исследования с включением данных о долгосрочных исходах для матери и новорождённого. Кроме того, в работе не оценивалась прогностическая значимость маркеров в отношении тяжёлой ПЭ и HELLP-синдрома, что представляет перспективу дальнейших научных разработок.

Выводы. У беременных с артериальной гипертензией (гестационной и хронической) нарушение физиологической динамики ангиогенных факторов роста VEGF и PlGF выявляется задолго до клинической манифестации преэклампсии — начиная со срока гестации 12–25 недель. Для преэклампсии патогномичным является «перевернутый» профиль ангиогенных маркеров: отсутствие физиологического снижения VEGF к 32–34 неделям ($7,8 \pm 0,3$ пг/мл против $5,3 \pm 0,9$ пг/мл в контроле) в сочетании с недостаточным приростом PlGF ($370,5 \pm 21,0$ пг/мл против $480,2 \pm 26,4$ пг/мл; $p < 0,001$). Наибольшую диагностическую эффективность среди изученных показателей демонстрирует отношение VEGF/PlGF (AUC=0,94; чувствительность 91 %, специфичность 90 %); комбинированная модель, включающая VEGF, PlGF и динамику их изменения между сроками обследования, обеспечивает диагностическую точность AUC=0,96 (чувствительность 93 %, специфичность 92 %) и может быть рекомендована для практического применения. Снижение уровня PlGF менее 210 пг/мл в сроке 24–25 недель у беременных с хронической артериальной гипертензией ассоциировано с развитием преэклампсии в 78,6 % наблюдений, что обосновывает необходимость внедрения динамической оценки ангиогенных факторов в стандартный протокол ведения беременности у женщин данной группы риска в условиях женских консультаций Республики Узбекистан.

Список литературы:

1. Расул-Заде Ю.Г., Мелиева Д.А., Арзикулов А.Ш. Демографические и циркулирующие факторы у беременных с ранней и поздней преэклампсией // *Международный журнал научной педиатрии*. – 2024. – № 2. – С. 45–52.
2. Sadikova N., Eshimbetova G., Musakhodjaeva D. Течение беременности и перинатальные исходы при преэклампсии // *Международный журнал научной педиатрии*. – 2024. – № 3. – С. 78–84.
3. Хасанова У., Сафаралиева Г., Негмаджанов Б. Влияние преэклампсии на течение беременности // *Natural Sciences in the Modern World*. – 2024. – Vol. 2(1). – P. 112–119.
4. Каримов А.Х., Ан Р.Н. Современные аспекты диагностики гипертензивных расстройств при беременности в условиях Республики Узбекистан // *Тиббиётда янги кун*. – 2024. – № 2 (58). – С. 98–105.
5. Staff A.C. The two-stage placental model of preeclampsia: an update // *Journal of Reproductive Immunology*. – 2023. – Vol. 155. – P. 103819.
6. Chappell L.C., Cluver C.A., Kingdom J., Tong S. Pre-eclampsia // *The Lancet*. – 2021. – Vol. 398(10297). – P. 341–354.
7. Rana S., Lemoine E., Granger J.P., Karumanchi S.A. Preeclampsia: Pathophysiology, challenges, and perspectives // *Circulation Research*. – 2019. – Vol. 124(7). – P. 1094–1112.
8. Азизова З.Ш., Ешимбетова Г.З., Жураева Д.М. Дисрегуляция ростовых факторов и плацентарная дисфункция // *Российский иммунологический журнал*. – 2024. – Т. 27, № 1. – С. 52–59.
9. Nicolaides K.H., Wright D., Syngelaki A. et al. Pre-eclampsia screening by maternal factors and biomarkers at 11–13 weeks' gestation // *Ultrasound Obstet Gynecol*. – 2023. – Vol. 62(1). – P. 14–25.
10. Адамян Л.В., Артымук Н.В., Белокриницкая Т.Е. и др. Преэклампсия. Эклампсия. Клинические рекомендации // *Проблемы репродукции*. – 2023. – Т. 29, № 4. – С. 6–54.
11. Космуратова Ш.Б., Битемирова Ш.К. и др. Клинико-анамнестические факторы риска преэклампсии // *Репродуктивная медицина (Центральная Азия)*. – 2024. – № 1 (58). – С. 22–29.
12. Ляшенко Е.Н., Саенко Ю.С. Молекулярные механизмы преэклампсии // *Проблемы репродукции*. – 2024. – Т. 30, № 2. – С. 14–24.
13. ISSHP. The classification, diagnosis and management of the hypertensive disorders of pregnancy: A revised statement from the ISSHP // *Pregnancy Hypertension*. – 2022. – Vol. 27. – P. 148–169.
14. Negmatullaeva M.N., Tuksanova D.I., Akhmedov F.K. Особенности течения перименопаузального периода у женщин с ожирением // *Новости дерматовенерологии и репродуктивного здоровья*. – 2020. – № 1–2. – С. 39–42.
15. Najmetdinova D.F., Negmatullaeva M.N. Тактика ведения беременных с артериальной гипертензией в Республике Узбекистан // *Репродуктивная медицина (Центральная Азия)*. – 2024. – Т. 5, № 3. – С. 41–49.

Для цитирования: Нажметдинова Д.Ф., Негматуллаева М.Н. Ранняя диагностика преэклампсии у беременных с артериальной гипертензией на основе ангиогенных маркеров // *Вестник фундаментальной и клинической медицины*. – 2026. – № 4(24). – С. 977–983. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19896059>

INFLUENCE OF PROTON PUMP INHIBITORS IN PATIENTS WITH LIVER CIRRHOSIS**Bekmuradova M.S., Yarmatov S.T.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Proton pump inhibitors (PPIs) are widely used to manage gastroesophageal reflux disease (GERD) in patients with liver cirrhosis, yet their long-term impact on this vulnerable population remains unclear. The study aimed to assess the association between PPI use and adverse outcomes, including hepatic encephalopathy (HE), *Clostridium difficile* infection, and vitamin B12 deficiency in cirrhotic patients. Despite evidence linking PPI use to these complications, there remains a knowledge gap regarding the mechanisms involved and optimal management strategies. The results indicate that prolonged PPI therapy may exacerbate cirrhosis-related complications through mechanisms involving gut microbiota disruption and nutrient malabsorption. These findings underscore the need for cautious use of PPIs in cirrhotic patients and suggest the importance of monitoring for adverse effects. Further research is necessary to understand the dose-response relationship and to develop guidelines that balance the benefits of acid suppression with potential risks in this population.

Key words: proton pump inhibitors, liver cirrhosis, hepatic encephalopathy, *Clostridium difficile* infection, vitamin B12 deficiency, gut-liver axis.

**ЖИГАР ЦИРРОЗИ БИЛАН ОҒРИГАН БЕМОРЛАРДА ПРОТОН НАСОСИ
ИНГИБИТОРЛАРИНИНГ ТАЪСИРИ****Бекмуродова М.С., Ярмагов С.Т.**

Самарканд давлат тиббиёт университети, Самарканд ш., Ўзбекистон

Резюме. Протон помпа ингибиторлари (ППИ) жигар циррози бўлган беморларда гастроэзофагеал рефлюкс касаллигини (ГЭРК) даволаш учун кенг қўлланилади, аммо уларнинг ушбу касалликда узоқ муддатли таъсири ноаниқлигича қолмоқда. Тадқиқот ППИдан фойдаланиш ва жигар энцефалопатияси (ЖЭ), *Clostridium difficile* инфекцияси ва ушбу беморларда В12 витамини етишмовчилиги каби салбий натижалар ўртасидаги боғлиқликни баҳолашга қаратилган. ППИдан фойдаланишни ушбу асоратлар билан боғлайдиган далилларга қарамай, жалб қилинган механизмлар ва оптимал бошқарув стратегиялари бўйича камчиликлар мавжуд. Натижалар шуни кўрсатадики, узоқ муддатли ППИ терапияси ичак микробиотасини бузиш ва озۇқа моддаларининг мальабсорбциясини ўз ичига олган механизмлар орқали цирроз билан боғлиқ бўлган асоратларни кучайтириши мумкин. Шунингдек, жигар циррози бор беморларда ППИларни эҳтиёткорлик билан қўллаш зарурлигини таъкидлайди ва салбий таъсирларни кузатиш муҳимлигини кўрсатади. Доза-жавоб муносабатларини тушуниш ва кислотани бостириш фойдалари билан ушбу популяциядаги потенциал хавфларни мувозанатлаштирадиган кўрсатмаларни ишлаб чиқиш учун кейинги тадқиқотлар зарур.

Калим сўзлар: протон помпаси ингибиторлари, жигар циррози, жигар энцефалопатияси, *Clostridium difficile* инфекцияси, витамин В12 етишмовчилиги, ичак-жигар ўқи.

**ВЛИЯНИЕ ИНГИБИТОРОВ ПРОТОННОЙ ПОМПЫ НА ПАЦИЕНТОВ С ЦИРРОЗОМ
ПЕЧЕНИ****Бекмуродова М.С., Ярмагов С.Т.**

Самаркандский государственный медицинский университет, г.Самарканд, Узбекистан

Резюме. Ингибиторы протонной помпы (ИПП) широко используются для лечения гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) у пациентов с циррозом печени, однако их долгосрочное влияние на эту уязвимую группу населения остается неясным. Целью исследования было оценить связь между применением ИПП и неблагоприятными исходами, включая печеночную энцефалопатию (ПЭ), инфекцию *Clostridium difficile* и дефицит витамина В12 у пациентов с циррозом. Несмотря на доказательства связи применения ингибиторов протонной помпы (ИПП) с этими осложнениями, сохраняется пробел в знаниях относительно задействованных механизмов и оптимальных стратегий лечения. Результаты показывают, что длительная терапия ИПП может усугубить осложнения, связанные с циррозом печени, посредством механизмов, включающих нарушение микробиоты кишечника и мальабсорбцию питательных веществ. Эти данные подчеркивают необходимость осторожно-

го применения ИПП у пациентов с циррозом печени и указывают на важность мониторинга побочных эффектов. Необходимы дальнейшие исследования для понимания зависимости «доза-эффект» и разработки рекомендаций, которые бы уравнивали преимущества подавления кислотности с потенциальными рисками в этой популяции.

Ключевые слова: ингибиторы протонной помпы, цирроз печени, печеночная энцефалопатия, инфекция *Clostridium difficile*, дефицит витамина B12, ось кишечник-печень.

e-mail: bekmuradova.maxsuda84@gmail.com, yarmatovsuvon@gmail.com

Introduction. Liver cirrhosis is a chronic and progressive condition characterized by the replacement of healthy liver tissue with fibrous scar tissue, leading to a significant decline in liver function [1,12]. This condition can arise from various etiologies, including chronic viral hepatitis, alcohol abuse, and non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD). The global burden of liver cirrhosis is substantial, with millions of individuals affected worldwide, leading to significant morbidity and mortality [2,8]. As cirrhosis progresses, patients often experience numerous complications, particularly those related to the gastrointestinal tract. One common complication in this population is gastroesophageal reflux disease (GERD), which occurs due to increased intra-abdominal pressure, altered esophageal motility, and esophageal hypersensitivity [9,22]. These factors contribute to the regurgitation of gastric contents into the esophagus, resulting in symptoms such as heartburn, chest pain, and dysphagia, which can severely impair the quality of life of patients suffering from liver cirrhosis [6,12,18]. Proton pump inhibitors (PPIs) are a class of medications widely prescribed to reduce gastric acid secretion by irreversibly inhibiting the H⁺/K⁺ ATPase enzyme in the gastric parietal cells. By decreasing gastric acidity, PPIs are effective in managing conditions such as GERD, peptic ulcers, and Zollinger-Ellison syndrome. The mechanism of action involves the binding of PPIs to the proton pump in the stomach lining, thereby preventing the secretion of hydrochloric acid. PPIs have become one of the most commonly prescribed classes of medications worldwide due to their effectiveness and safety profile in the general population. However, the use of PPIs in patients with liver cirrhosis raises specific concerns due to the liver's crucial role in drug metabolism. Given that the liver is responsible for the biotransformation of various drugs, including those in the PPI class, it is essential to assess the safety and efficacy of PPIs in this vulnerable patient population. Alterations in liver function can affect the pharmacokinetics of these medications, potentially leading to increased drug exposure and heightened risk of adverse effects [2,14].

Previous studies have explored the benefits of PPI therapy in alleviating GERD symptoms and improving the quality of life for cirrhotic patients. Research has shown that PPI treatment significantly reduces reflux symptoms and the severity of esophagitis in individuals with liver cirrhosis, thus providing relief from discomfort and improving overall patient satisfaction. Furthermore, the therapeutic use of PPIs has been associated with a reduction in complications arising from acid reflux, such as esophageal stricture and Barrett's esophagus, which can further complicate the management of cirrhosis. However, long-term use of PPIs has been associated with several potential adverse effects, including an increased risk of infections (such as *Clostridium difficile*), renal impairment, and vitamin B12 deficiency. Studies have suggested that chronic acid suppression may disrupt the gut microbiome, leading to dysbiosis and increased susceptibility to infections. Moreover, vitamin B12 deficiency can result in neurological complications and anemia, which are particularly concerning in cirrhotic patients who may already be vulnerable to nutritional deficiencies. Furthermore, the impact of prolonged PPI therapy on the progression of liver disease and the development of hepatic encephalopathy remains inadequately understood, revealing a crucial gap in the existing literature. Hepatic encephalopathy, a neurocognitive disorder stemming from liver dysfunction, poses significant management challenges and may be exacerbated by the use of certain medications, including PPIs.

The primary objective of this study is to thoroughly investigate the implications of PPI therapy in patients with liver cirrhosis, focusing on its effectiveness in managing GERD symptoms while critically assessing the associated risks. This research is novel in its comprehensive evaluation of both the therapeutic benefits and potential complications linked to PPI use in this specific demographic. By synthesizing data from existing studies and new research, this paper aims to clarify the risk-benefit profile of PPIs in liver cirrhosis management. Expected results will not only enhance our understanding of the role of PPIs in liver cirrhosis management but will also provide valuable insights into optimizing treatment strategies for these patients, ultimately aiming to improve their overall quality of life and minimize adverse outcomes.

Methodology. This study followed a retrospective cohort design to assess the impact of proton pump inhibitors (PPIs) on patients with liver cirrhosis. Data was gathered from electronic medical records of patients across three hospitals, supplemented by a meta-analysis of relevant studies. The study involved 300 patients with liver cirrhosis treated with PPIs for at least six months. A control group of 100 patients with

cirrhosis but without PPI use was included for comparison. The patients adults aged 18–80 years, diagnosed with cirrhosis based on **Child-Pugh classification (A, B, C)** on PPI therapy for at least 6 months. Exclusion Criteria: concurrent H2 receptor antagonist therapy, acute gastrointestinal bleeding in the past 3 months and the patients with renal failure or chronic dialysis. Ethical approval was obtained, and patient data was anonymized. Informed consent was waived due to the retrospective nature of the study.

This simplified methodology ensures efficient and accurate evaluation of PPI effects on cirrhotic patients, combining clinical data and advanced statistical techniques for robust results.

Results. The study evaluated 300 patients with liver cirrhosis who were on proton pump inhibitors (PPIs) and 100 patients in the control group. The average duration of PPI use was 12 months. Child-Pugh classification showed that most patients were in classes B and C, indicating moderate to severe liver dysfunction. The results indicated a significant increase in the incidence of hepatic encephalopathy in patients using PPIs. Among PPI users, 45% developed HE, compared to 25% in the control group ($p < 0.01$). This suggests a potential link between prolonged PPI use and the exacerbation of neurological complications in cirrhotic patients. The analysis also found a higher risk of *Clostridium difficile* infection among PPI users (12%) compared to the control group (5%) ($p = 0.02$). This is in line with previous research indicating that acid suppression therapy increases the risk of gastrointestinal infections due to changes in gut flora.

Vitamin B12 levels were significantly lower in PPI users, with 38% showing deficiency versus 18% in the control group. This finding supports the hypothesis that long-term PPI use impairs nutrient absorption, particularly in patients with compromised liver function. The results of this study highlight the dual-edged nature of PPI therapy in patients with liver cirrhosis. While PPIs are effective in managing GERD and preventing esophageal complications, the associated risks, particularly the development of hepatic encephalopathy and increased susceptibility to infections, are concerning.

The significant rise in HE among PPI users can be attributed to the disruption of gut microbiota due to acid suppression, leading to increased intestinal permeability and higher levels of ammonia in the bloodstream. This exacerbates HE, a condition already prevalent in cirrhotic patients due to impaired ammonia metabolism. These findings align with recent studies suggesting that the gut-liver axis plays a critical role in the development of HE in cirrhotic patients on acid suppression therapy. The higher incidence of infections, particularly *Clostridium difficile*, raises important clinical considerations. The reduced gastric acidity allows for the overgrowth of pathogenic bacteria, which can be particularly dangerous in immunocompromised cirrhotic patients. The results suggest that PPI use should be carefully evaluated in this population, especially for those with pre-existing gastrointestinal conditions. Vitamin B12 deficiency in PPI users highlights the long-term effects of acid suppression on nutrient absorption. As cirrhotic patients are already prone to malnutrition, PPI therapy may exacerbate their nutritional deficiencies, further complicating their clinical management. This supports the need for routine monitoring of B12 levels in cirrhotic patients on prolonged PPI therapy. Further research is needed to explore the underlying mechanisms linking PPI use to hepatic encephalopathy and infections in cirrhotic patients. Longitudinal studies with larger sample sizes are essential to determine causality and to establish clear clinical guidelines for the use of PPIs in this vulnerable population. Future investigations should also focus on alternative acid suppression therapies and their impact on liver function and patient outcomes. The long-term effects of PPI therapy on liver disease progression and overall survival in cirrhotic patients remain inadequately explored. Additionally, there is a gap in understanding the dose-dependent relationship between PPI use and the development of HE and other complications, which future studies should address.

Conclusion. Based on the findings of this study, proton pump inhibitor (PPI) use in patients with liver cirrhosis was associated with a significantly higher incidence of hepatic encephalopathy, increased risk of *Clostridium difficile* infection, and greater prevalence of vitamin B12 deficiency. These results suggest that while PPIs are effective in managing gastroesophageal reflux disease (GERD) in cirrhotic patients, their prolonged use may exacerbate liver-related complications due to gut microbiota alterations and nutrient malabsorption. Clinicians should carefully weigh the benefits and risks of PPI therapy in cirrhotic patients, ensuring close monitoring for adverse outcomes. Further research is necessary to explore the mechanisms linking PPI use to cirrhosis-related complications, identify safer alternatives, and develop clear clinical guidelines to optimize treatment in this patient population.

References:

1. Baumgartner, K.; Cooper, J.; Smith, A.; St Louis, J. Liver Disease: Cirrhosis. *FP Es-sent.* 2021, 511, 36–43.
2. Bekmuradova, M. S. (2025). O'zbekistonda bronxial astma va gastroezofageal refluyuks kasalligining komorbid holatini aniqlash

usullari. Вестник Ассоциации Пульмонологов Центральной Азии, 15(10), 87-92.

3. Bekmuradova, M. S., & Bozorova, S. A. (2023). Use of proton pump inhibitors in patients with liver cirrhosis and their impact on the mental status of patients. *World Bulletin of Public Health*, 29, 75-79.

4. Bekmuradova, M. S., & Yarmatov, S. T. (2021). Clinical case of liver Cirrhosis in a patient. *Uzbek journal of case reports*, 1(1), 9-11.

5. Cacciola, I. Effects of Proton Pump Inhibitors in Cirrhotic Patients: What Do We Really Know? *Gastroenterology* 2022, 163, 47–49.

6. Chia, C.T.W.; Lim, W.P.; Vu, C.K.F. Inappropriate use of proton pump inhibitors in a local setting. *Singap. Med. J.* 2014, 55, 363–366.

7. Chinzon, D.; Domingues, G.; Tosetto, N.; Perrotti, M. Safety of Long-Term Proton Pump Inhibitors: Facts and Myths. *Arq. Gastroenterol.* 2022, 59, 219–225.

8. Cole, H.L.; Pennycook, S.; Hayes, P.C. The impact of proton pump inhibitor therapy on patients with liver disease. *Aliment. Pharmacol. Ther.* 2016, 44, 1213–1223.

9. De Roza, M.A.; Kai, L.; Kam, J.W.; Chan, Y.H.; Kwek, A.; Ang, T.L.; Hsiang, J.C. Proton pump inhibitor use increases mortality and hepatic decompensation in liver cirrhosis. *World J. Gastroenterol.* 2019, 25, 4933–4944.

10. Dultz, G.; Piiper, A.; Zeuzem, S.; Kronenberger, B.; Waidmann, O. Proton pump inhibitor treatment is associated with the severity of liver disease and increased mortality in patients with cirrhosis. *Aliment. Pharmacol. Ther.* 2015, 41, 459–466.

11. Dutta, A.K.; Sharma, V.; Jain, A.; Elhence, A.; Panigrahi, M.K.; Mohta, S.; Kirubakaran, R.; Philip, M.; Goenka, M.; Bhatia, S.; et al. Inappropriate use of proton pump inhibitors in clinical practice globally: A systematic review and meta-analysis. *Gut* 2024.

12. Freedberg, D.E.; Kim, L.S.; Yang, Y.-X. The Risks and Benefits of Long-term Use of Proton Pump Inhibitors: Expert Review and Best Practice Advice From the American Gastroenterological Association. *Gastroenterology* 2017, 152, 706–715.

13. Gamelas, V.; Salvado, V.; Dias, L. Prescription Pattern of Proton Pump Inhibitors at Hospital Admission and Discharge. *GE Port. J. Gastroenterol.* 2019, 26, 114–120.

14. García Rodríguez, L.A.; Lanas, A.; Soriano-Gabarró, M.; Vora, P.; Cea Soriano, L. Effect of Proton Pump Inhibitors on Risks of Upper and Lower Gastrointestinal Bleeding among Users of

Low-Dose Aspirin: A Population-Based Observational Study. *J. Clin. Med.* 2020, 9, 928.

15. Garcia-Saenz-de-Sicilia, M.; Sanchez-Avila, F.; Chavez-Tapia, N.-C.; Lopez-Arce, G.; Garcia-Osogobio, S.; Ruiz-Cordero, R.; Tellez-Avila, F.-I. PPIs are not associated with a lower incidence of portal-hypertension-related bleeding in cirrhosis. *World J. Gastroenterol.* 2010, 16, 5869–5873.

16. Ginès, P.; Krag, A.; Abraldes, J.G.; Solà, E.; Fabrellas, N.; Kamath, P.S. Liver cirrhosis. *Lancet* 2021, 398, 1359–1376.

17. Goel, G.A.; Deshpande, A.; Lopez, R.; Hall, G.S.; van Duin, D.; Carey, W.D. Increased rate of spontaneous bacterial peritonitis among cirrhotic patients receiving pharmacologic acid suppression. *Clin. Gastroenterol. Hepatol. Off. Clin. Pract. J. Am. Gastroenterol. Assoc.* 2012, 10, 422–427.

18. Hsiang, J.C.; Gane, E.J.; Bai, W.W.; Gerred, S.J. Type 2 diabetes: A risk factor for liver mortality and complications in hepatitis B cirrhosis patients. *J. Gastroenterol. Hepatol.* 2015, 30, 591–599.

19. Hwang, S.J.; Lee, D.H.; Koh, S.J.; Kim, J.W.; Park, H.S.; Kim, B.G.; Lee, K.L. Correlation Between Proton Pump Inhibitors and the Complications of Liver Cirrhosis: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Turk. J. Gastroenterol.* 2022, 33, 44–52.

20. Rakhmonov, V., Turdalieva, K., Bobokandov, N., Kobulova, B., Mustanov, S., Nurimov, P., ... & Tashpulatov, Y. (2026). The effect of biotechnological treatment using vascular aquatic plants *Azolla* (*Azolla caroliniana*) and duckweed (*Lemna minor*) on changes in polluted water parameters. *International Journal of Agriculture and Biosciences*, 15(3), 1095-1108.

21. Yarmatov, S. T., Khusainova, M. A., Normatov, M. B., Ergasheva, M. M. T., Uzokov, J. B., & Khaydarov, S. N. (2025, December). Rheumatoid Arthritis Activity During Pregnancy And Postpartum: Clinical Observations. In *International Conference on Global Trends and Innovations in Multidisciplinary Research* (Vol. 1, No. 6, pp. 91-96).

22. Бекмурадова, М. С. (2025). Влияние ингибиторов протонных помп на степень развития печеночной энцефалопатии. *Экономика и социум*, (4-1 (131)), 766-771.

23. Бекмурадова, М. С., & Узокова, Г. Ф. (2025). Роль кишечной микробиоты в развитии сердечно-сосудистых заболеваниях. *Zamonaviy tibbiyot jurnali* (Журнал современной медицины), 11(4), 453-547.

For citation: Bekmuradova M.S., Yarmatov S.T. Influence of proton pump inhibitors in patients with liver cirrhosis // *Bulletin of Fundamental and Clinic Medicine*. – 2026. – № 4(24). – P. 984–987. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19896148>

КИМЁТЕРАПИЯ ФОНИДА РИВОЖЛАНГАН БУЙРАК ЕТИШМОВЧИЛИГИДА ИНГИЧКА ИЧАКНИНГ УМУМИЙ МОРФОЛОГИК ЎЗГАРИШЛАРИ

Бахронов С.Т., Давлатов С.С., Худойбердиев Д.К., Баймурадов Р.Р.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Кимётерапия жараёнида қўлланиладиган дори воситаларининг нефротоксик таъсири натижасида ривожланидиган буйрак етишмовчилиги организмнинг бошқа аъзолари қаторида овқат ҳазм қилиш тизимига, хусусан ингичка ичакка ҳам салбий таъсир кўрсатади. Мазкур тадқиқотнинг мақсади тажриба шароитида кимётерапия фонида юзага келган буйрак етишмовчилигида ингичка ичакнинг морфологик кўрсаткичларидаги ўзгаришларни ўрганиш ва уларнинг хусусиятларини баҳолашдан иборат. Тадқиқот экспериментал модел асосида олиб борилиб, гистологик, морфометрик ҳамда иммуногистохимик усуллар қўлланилди. Натижалар шуни кўрсатдики, патологик ҳолатда ингичка ичак шиллиқ қаватида виллуслар қисқариши, эпителий ҳу-жайраларида дистрофик ва дегенератив ўзгаришлар, яллиғланиш инфильтрацияси, лимфоид тузилмалар фаолиятининг бузилиши ҳамда микроциркулятор ўзгаришлар кузатилди. Олинган маълумотлар кимётерапия билан bogлиқ буйрак етишмовчилиги шароитида ингичка ичакда ривожланидиган морфологик жараёнларни чуқурроқ тушунишга имкон беради ҳамда патогенетик асосланган профилактика ва коррекция усулларини шилаб чиқишда муҳим илмий-амалий аҳамиятга эга.

Калим сўзлар: кимётерапия, буйрак етишмовчилиги, ингичка ичак, морфологик ўзгаришлар, морфометрия, гистология, экспериментал тадқиқот.

GENERAL MORPHOLOGICAL CHANGES OF THE SMALL INTESTINE IN RENAL FAILURE DEVELOPED AGAINST THE BACKGROUND OF CHEMOTHERAPY

Bakhronov S.T., Davlatov S.S., Khudoyberdiyev D.K., Baymuradov R.R.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. The nephrotoxic effects of chemotherapeutic drugs lead to the development of renal failure, which negatively affects not only the kidneys but also other organs and systems of the body, particularly the digestive system and the small intestine. The aim of this study was to investigate and evaluate the specific morphological changes of the small intestine in renal failure developed under experimental conditions during chemotherapy. The study was conducted using an experimental model with histological, morphometric, and immunohistochemical methods. The results demonstrated that the pathological condition was characterized by shortening of intestinal villi, dystrophic and degenerative changes in epithelial cells, inflammatory infiltration, impaired activity of lymphoid structures, and microvascular alterations. The obtained findings provide a deeper understanding of morphological processes occurring in the small intestine during chemotherapy-associated renal failure and have important scientific and practical significance for developing pathogenetically justified methods of prevention and correction.

Keywords: chemotherapy, renal failure, small intestine, morphological changes, morphometry, histology, experimental study.

ОБЩИЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ТОНКОЙ КИШКИ ПРИ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ, РАЗВИВШЕЙСЯ НА ФОНЕ ХИМИОТЕРАПИИ

Бахронов С.Т., Давлатов С.С., Худойбердиев Д.К., Баймурадов Р.Р.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Нефротоксическое воздействие лекарственных средств, применяемых в процессе химиотерапии, приводит к развитию почечной недостаточности, которая оказывает отрицательное влияние не только на почки, но и на другие органы и системы организма, в частности на пищеварительную систему и тонкую кишку. Целью данного исследования явилось изучение и оценка особенностей морфологических изменений тонкой кишки при почечной недостаточности, развившейся в условиях экспериментальной модели на фоне химиотерапии. Исследование проводилось на экспериментальной модели с использованием гистологических, морфометрических и иммуногистохимических методов. Полученные результаты показали, что при патологическом состоянии наблюдаются укорочение ворсинок слизистой оболочки тонкой кишки, дистрофические и дегенеративные изменения эпителиальных клеток, воспалительная инфильтрация, нарушение активности лимфоидных

структур, а также микрососудистые изменения. Полученные данные позволяют глубже понять морфологические процессы, развивающиеся в тонкой кишке при почечной недостаточности, ассоциированной с химиотерапией, и имеют важное научно-практическое значение для разработки патогенетически обоснованных методов профилактики и коррекции.

Ключевые слова: химиотерапия, почечная недостаточность, тонкая кишка, морфологические изменения, морфометрия, гистология, экспериментальное исследование.

Кирриш. Бугунги кунда онкологик касалликлар дунё миқёсида ўлим кўрсаткичлари бўйича етакчи ўринлардан бирини эгаллаб, глобал тиббиётнинг долзарб муаммоларидан бири сифатида қаралмоқда. Статистик маълумотларга кўра, саратон касаллиги сабабли ҳар йили миллионлаб инсонлар ҳаётдан кўз юмади ва ушбу касалликни даволашда кимётерапия асосий терапевтик усуллардан бири ҳисобланади. Кимётерапия ўсма хужайраларининг пролифератсиясини тўхтатишга қаратилган бўлса-да, у нафақат патологик хужайраларга, балки соғлом тўқималарга ҳам токсик таъсир кўрсатиши билан характерланади. Айниқса, кимётерапевтик препаратларнинг нефротоксик таъсири натижасида буйрак етишмовчилиги ривожланиши клиник амалиётда тез-тез учрайдиган асоратлардан бири ҳисобланади[1,2].

Адабиёт маълумотларига кўра, кимётерапия олаётган беморларда буйрак фаолиятининг бузилиши дори воситалари метаболизми ва чиқарилиш жараёнига салбий таъсир кўрсатиб, даволаш самарадорлигини камайтиради ҳамда умумий прогностик натижаларни оғирлаштиради. Буйрак етишмовчилиги организмда метаболит маҳсулотларнинг тўпланишига, сув-электролит мувозанатининг бузилишига олиб келади ва турли аъзо ҳамда тизимларда иккиламчи морфологик ўзгаришларни чақиради[3,4].

Овқат ҳазм қилиш тизими, айниқса ингичка ичак, буйрак етишмовчилиги шароитида сезиларли даражада зарарланиши мумкин бўлган аъзолардан бири ҳисобланади. Ингичка ичак организмда нафақат озиқ моддалар сўрилишини, балки иммунологик ҳимоя, эндокрин ва барер функцияларни ҳам таъминлайди. Унинг шиллиқ қавати таркибида жойлашган лимфоид тузилмалар организм имунитетининг муҳим қисми бўлиб, бу тизимдаги ҳар қандай морфологик ўзгариш бутун организм ҳомеостазига салбий таъсир кўрсатади[5,6].

Илмий манбалар таҳлили шуни кўрсатадики, кимётерапия фонида ривожланадиган буйрак етишмовчилиги шароитида ичак тўсиғи функциясининг бузилиши, эпителиал қатламда дегенератив жараёнлар, яллиғланиш инфилтратсияси ҳамда лимфоид аппарат фаолиятининг ўзгариши кузатилиши мумкин[7,8]. Шу билан бирга, ушбу патологик ҳолатда ингичка ичакнинг морфологик ва морфометрик кўрсаткичларидаги ўзгаришлар, айниқса экспериментал модел шароитида, етарли даражада ўрганилмаганлиги илмий муаммо сифатида сақланиб қолмоқда[9].

Шу муносабат билан тажриба шароитида кимётерапия фонида ривожланган буйрак етишмовчилигида ингичка ичак морфологик кўрсаткичларини комплекс ўрганиш, юзага келадиган структуравий ўзгаришларни баҳолаш ҳамда уларнинг патогенетик механизмларини аниқлаш долзарб илмий-амалий аҳамият касб этади. Мазкур тадқиқот натижалари кимётерапия асоратларини чуқурроқ тушуниш, ичак-буйрак ўқи ўртасидаги функционал боғлиқликни аниқлаш ҳамда келгусида самарали профилактика ва коррекция усулларини ишлаб чиқиш учун илмий асос бўлиб хизмат қилади.

Материал ва методлар. Тадқиқот тажриба шароитида бажарилди. Тадқиқот объекти сифатида ургочи жинсига мансуб, 6 ва 9 ойлик, тана вазни 160–180 г бўлган оқ зотсиз лаборатория каламушлари танлаб олинди. Тажриба давомида ҳайвонлар виварий шароитида стандарт озиқланиш ва сақлаш қоидаларига риоя қилинган ҳолда парвариш қилинди.

Тадқиқот предмети сифатида оқ зотсиз каламушлар ингичка ичагидан олинган бўлақчалардан тайёрланган гистологик материаллар хизмат қилди.

Экспериментал моделда кимётерапия фонида буйрак етишмовчилиги чақирилиб, ҳайвонлар назорат ва тажриба гуруҳларига ажратилди. Тажриба якунида ингичка ичак тўқималари олиниб, умумқабул қилинган гистологик ишлов бериш босқичлари (фиксация, сувсизлантириш, парафин блокларга қуйиш, микротомда кесиш ва бўйиш) амалга оширилди.

Морфологик ўзгаришларни аниқлаш мақсадида гистологик тадқиқотлар ўтказилиб, шиллиқ қават, виллуслар, крипталар, лимфоид тузилмалар ҳамда микроциркулятор тизим ҳолати баҳоланди. Морфометрик таҳлил жараёнида виллуслар баландлиги, крипта чуқурлиги ва ичак девори қатламлари қалинлиги каби кўрсаткичлар ўлчанди.


Шунингдек, ингичка ичак тўқималарида структуравий ва функционал ўзгаришларни аниқлаш учун иммуногистохимёвий усуллар қўлланилди. Олинган натижалар статистик усуллар ёрдамида қайта ишланиб, гуруҳлар ўртасидаги фарқлар ишончлилиқ даражаси бўйича баҳоланди.

Натижалар. Тадқиқот давомида тажриба ҳайвонлари 5 та гуруҳга ажратилди ($n = 201$). I гуруҳ — назорат гуруҳи ($n = 40$) бўлиб, физиологик меъёр ҳолати сифатида ўрганилди. II гуруҳга 6 ой 21 кунлик саратон модели чақирилган каламушлар ($n = 24$) киритилиб, уларга 0,4 мг/кг дозада томир ичига сисплатин дори воситаси юборилди ҳамда интрагастрал равишда ошқозон металл зонди орқали 21 кун давомида 0,7 мл ҳажмда дистилланган сув киритиб борилди. III гуруҳга ($n = 24$) шу ёшдаги тажриба ҳайвонларига 3 мг/кг дозада томир ичига карбоплатин юборилиб, интрагастрал равишда 21 кун давомида 0,7 мл дистилланган сув берилди. IV гуруҳдаги ҳайвонларга ($n = 24$) 0,4 мг/кг дозада сисплатин юборилиши билан бир қаторда коррекцион даволаш амалга оширилди. V гуруҳга ($n = 24$) 3 мг/кг дозада карбоплатин юборилиб, коррексия усули қўлланилди.

Мазкур гуруҳларга мансуб каламушларнинг ингичка ичагидан микроскопик препаратлар тайёрланди. Препаратлар гематоксилин–эозин ҳамда ван Гизон бўёқлари ёрдамида бўялиб, ёруғлик микроскопиясида ўрганилди. Бундан ташқари, тўқималардаги структуравий ўзгаришларни чуқурроқ баҳолаш мақсадида иммуногистохимёвий текширувлар ҳам ўтказилди.

Назорат гуруҳидаги 6 ойлик оқ зотсиз каламушлар ингичка ичагининг (оч ва ёнбош ичак) кесимлари микроскопик жиҳатдан комплекс таҳлил қилинганда, ичак деворининг классик, яхши табақаланган архитектоник тузилиши кузатилди. Оч ичак ҳамда ёнбош ичакда сўрғич–крипта релефи аниқ намоён бўлиб, сўрғичлар баланд ва қирралари равшан, крипталар эса чуқур ҳамда бўшлиғи эркин ҳолатда эканлиги аниқланади. Энтероситлар апикал қисмида чўткасимон қирра узлуксиз сақланган бўлиб, ичакнинг абсорбция фаолияти меъёрий ҳолатда эканлигини кўрсатди.

Шиллик ости қаватининг тузилиши мувозанатли, мушак қаватида толалар параллел йўналишда жойлашган бўлиб, шиш ёки яллиғланиш белгиларига дуч келинмади. Сероз қавати юпка ва узлуксиз кўринишга эга эди. Лимфоид тузилмалар, хусусан гумбаз зоналарида жойлашган лимфоид элементлар яхши ривожланган бўлиб, уларнинг тўрсимон тузилиши аниқ идентификация қилинди. Умуман олганда, назорат гуруҳида кузатилган морфологик манзара ингичка ичакнинг эталон (меъёрий) тузилишини акс эттиради (1-расм — оч ичак, 2-расм — ёнбош ичак).




Расм 1. Назорат гуруҳидаги 6-ойлик оқ зотсиз каламуш оч ичагининг микроскопик кўриниши. Гематоксилин–эозин билан бўялган. 20x10 катталаштирилган. 1- мушак қавати; 2-шиллик ости қавати; 3-хусусий пластинка; 3-крипталар; 4-сўрғичлар; 5-шиллик қавати.

Назорат гуруҳида ингичка ичак шиллик қаватининг нисбий улуши оч ичакда $30,24 \pm 1,23$ %, ёнбош ичакда эса $29,69 \pm 1,77$ % ни ташкил этгани аниқланди. Ушбу кўрсаткичлар эпителий ва стромал компонентлар ўртасидаги меъёрий морфологик мувозанат сақланганлигини кўрсатади.


Морфометрик таҳлил натижаларига кўра, ингичка ичак сўрғичларининг баландлиги $267,21 \pm 9,91$ мкм, қалинлиги $66,88 \pm 4,00$ мкм ни ташкил этди. Крипталар чуқурлиги $203,19 \pm 6,11$ мкм, қалинлиги эса $35,97 \pm 1,72$ мкм га тенг эканлиги қайд этилди.

Сўрғич ва крипталар кўрсаткичларининг ўзаро нисбатини акс эттирувчи сўрғич/крипта индекси меъёрий қийматларда бўлиб, бу шиллик қаватда пролифератсия ва регенератсия жараёнларининг физиологик мутаносибликда кечаётганлигини тасдиқлайди. Бирта сўрғичда энтероситлар сони $76,5 \pm 4,42$ дона бўлиб, крипталар бўшлиғида детрит йўқ, энтеросит қаторлари тўла ва тенг эканлиги аниқланди (расм 3).



Расм 2. Назорат гуруҳидаги 6-ойлик оқ зотсиз каламуш ёнбош ичагининг микроскопик кўриниши. Гематоксиллин-эозин билан бўялган. 20x40 катталаштирилган. 1- Энтероцитлар призматик шаклда, цитоплазма эозинофил ва майда доначали — митохондрияларга бой

Назорат гуруҳига мансуб тажриба ҳайвонлари ингичка ичаги микроскопик жиҳатдан таҳлил қилинганда, шиллик қаватнинг яхши сақланган архитектурани тузилиши кузатилади. Эпителлий қавати узлуксиз жойлашган бўлиб, энтеротситлар ситоплазмаси бир хил бўялган, ядролар аниқ кўринишда жойлашганлиги қайд этилди. Крипталар мунтазам шаклда бўлиб, уларнинг чегаралари равшан ва стромал компонентлар билан уйғун ҳолатда эканлиги аниқланди. Шиллик қават стромасида томирлар тармоғи физиологик ҳолатда бўлиб, яллиғланиш инфилтратсияси ёки дегенератив ўзгаришлар кузатилмади. Ушбу морфологик манзара ингичка ичак тўқималарининг меъёрий структуравий ҳолатини акс эттиради ҳамда кейинги тажриба гуруҳларида аниқланадиган патологик ўзгаришлар учун назорат мезони сифатида хизмат қилади.



3 расм. Шу соҳанинг рақамли морфометрияси: лимфоид тузилма полигон тарзида сегментланди (қизил контур), ҳисоб майдони кўк маска билан белгиланган. кичик лимфоситлар $60,5 \pm 3,0\%$, ўртача лимфоситлар $16,9 \pm 2,5\%$, катта лимфоситлар $10,6 \pm 1,3\%$, ретикулёр хужайралар $6,8 \pm 0,8\%$, плазмобластлар $0,7 \pm 0,3\%$, деструктив хужайралар $2,3 \pm 0,7\%$, макрофаглар $1,8 \pm 0,4\%$.

Апикал қисмининг баландлиги $22,89 \pm 0,66$ мкм, хужайра майдони $133,85 \pm 1,96$ мкм², ядро майдони $20,90 \pm 0,91$ мкм²; ён (латерал) юзада мос равишда $31,17 \pm 2,23$ мкм, $168,17 \pm 8,29$ мкм² ва $33,91 \pm 1,08$ мкм². Бу оралиқлар оч ва ёнбош ичакдаги морфогенезнинг бир хил барқарорлигини кўрсатади: ядро–цитоплазма нисбати меъёрида, ядро хроматини бир текис, апикал қирра узлуксиз.

Муҳокама. Олинган натижалар тажриба шароитида кимётерапия фонида ривожланган буйрак етишмовчилиги ингичка ичак тўқималарида сезиларли морфологик ва морфометрик ўзгаришларни

юзга келтиришини кўрсатди. Назорат гуруҳидаги каламушларда ингичка ичакнинг шиллик қавати яхши дифференцияланган архитетоник тузилишга эга бўлиб, сўргич–крипта тизимининг мутаносиблиги, эпителий қатламининг яхлитлиги ҳамда лимфоид тузилмаларининг физиологик ҳолати ичак функционал фаолиятининг меъёрий ҳолатда эканлигини тасдиқлайди.

Назорат гуруҳида аниқланган морфометрик кўрсаткичлар (сўргичлар баландлиги, крипталар чуқурлиги ва қалинлиги, шиллик қават улуши) эпителий–строма мувозанатининг сақланганлигини билдиради. Сўргич/крипта индексининг барқарорлиги энтеротситларнинг доимий регенератсияси ва абсорбция жараёнининг физиологик ҳолатда кечишини ифодалайди.

Кимётерапевтик препаратлар — сисплатин ва карбоплатин қўлланган тажриба гуруҳларида ичак шиллик қаватининг структуравий қайта қурилиши кузатилди. Бу ўзгаришлар сўргичларнинг қисқариши, крипталарнинг чуқурлашиши, эпителий қаватининг дисорганизатсияси ва лимфоид тузилмалар фаолиятининг ўзгариши билан намоён бўлди. Ушбу ҳолатлар организмда ривожланган нефротоксиклик ва метаболик бузилишлар натижасида ичак тўсиғи функциясининг заифлашганлигини кўрсатади.

Кимётерапия фонида юзга келган бу морфологик ўзгаришлар адабиётларда келтирилган маълумотлар билан ҳамоҳанг бўлиб, буйрак етишмовчилиги натижасида организмда тўпланувчи метаболитлар ҳамда яллиғланиш медиаторлари ичак шиллик қаватида дегенератив жараёнларни кучайтиришини тасдиқлайди. Иммуногистокимёвий текширув натижалари лимфоид аппарат хужайраларининг функционал фаоллиги ўзгаришини кўрсатиб, ичак иммун ҳимоя тизими заифлашганлигини билдиради.

Коррекция қилинган гуруҳларда кузатилган натижалар эса табиий воситалар (момоқаймоқ илдизи) қўлланиши шиллик қават регенератсиясини рағбатлантиришини кўрсатди. Сўргичларнинг шакли ва баландлиги қисман тикланган, крипталарнинг морфологик тузилиши меъёрлашган ҳамда яллиғланиш белгиларининг камайиши кузатилган. Бу ҳолат ўсимлик келиб чиқишидаги биофаол моддалар антиоксидант ва яллиғланишга қарши таъсирга эга эканлигини яна бир бор тасдиқлайди.

Шундай қилиб, кимётерапия фонида ривожланган буйрак етишмовчилиги нафақат буйракларда, балки овқат ҳазм қилиш тизими, хусусан ингичка ичакда ҳам жиддий морфологик ўзгаришларга сабаб бўлиши аниқланиб, бу жараёнларнинг патогенезида системали токсик таъсир ва иммун дисбаланс муҳим рол ўйнаши исботланди.

Хулоса:

1. Назорат гуруҳида ингичка ичак шиллик қаватининг морфологик тузилиши меъёрий ҳолатда эканлиги аниқланди. Шиллик қаватнинг нисбий улуши оч ичакда $30,24 \pm 1,23$ %, ёнбош ичакда эса $29,69 \pm 1,77$ % ни ташкил этиб, эпителий ва стромал компонентлар ўртасидаги физиологик мувозанат сақланганлиги тасдиқланди. Морфометрик кўрсаткичлар бўйича сўргичлар баландлиги $267,21 \pm 9,91$ мкм, қалинлиги $66,88 \pm 4,00$ мкм, крипталар чуқурлиги $203,19 \pm 6,11$ мкм, қалинлиги эса $35,97 \pm 1,72$ мкм га тенг бўлиб, сўргич–крипта тизимининг мутаносиблиги ичак шиллик қаватида пролифератсия ва регенератсия жараёнлари физиологик даражада кечаётганлигини кўрсатди.

2. Кимётерапевтик препаратлар (сисплатин ва карбоплатин) қўлланилиши фонида ривожланган буйрак етишмовчилиги ингичка ичакнинг морфологик тузилишида сезиларли ўзгаришлар чақириши аниқланди. Тажриба гуруҳларида сўргичларнинг қисқариши, эпителий қаватининг дистрофик ва дегенератив ўзгаришлари, яллиғланиш инфилтратсияси ҳамда лимфоид тузилмалар фаолиятининг пасайиши кузатилди. Бу жараёнлар ичакнинг абсорбция юзаси камайиши ва регенератив потенциалининг сусайиши билан характерланиб, организмда ривожланган нефротоксик ҳолатнинг ичак барер тизимига салбий таъсир кўрсатишини кўрсатади.

3. Коррекция қўлланган тажриба гуруҳларида ингичка ичак шиллик қаватининг морфологик ҳолати нисбатан яхшилангани қайд этилди. Сўргич–крипта тизимининг структуравий кўрсаткичлари меъёрий қийматларга яқинлашгани, эпителий қавати яхлитлиги қисман тиклангани ҳамда микроциркулятор бузилишларнинг камайгани аниқланиб, коррекцион ёндашувлар ичак шиллик қаватида регенератив жараёнларни фаоллаштиришга хизмат қилиши илмий жиҳатдан асосланди. Бу натижалар кимётерапия фонида ривожланган буйрак етишмовчилигида ингичка ичакдаги патологик жараёнларни камайитириш учун патогенетик асосланган коррекция усуллари қўллаш мақсадга мувофиқлигини кўрсатади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Palipoch S., Punsawad C., Chinnapun D., Sak Journal of Science and Technology. – 2013. – Suwannalert P. Histopathology of Small Intestine Vol. 10(6). – P. 657–663.
Induced by Cisplatin in Male Wistar Rats // Walail-

2. Dahlgren D., Lennernäs H. Review on the effect of chemotherapy on the intestinal barrier: epithelial permeability, mucus and bacterial translocation // *Biomedicine & Pharmacotherapy*. – 2023. – Vol. 162. – 114644.
3. Portilla D., Li S., Nagothu K.K. et al. Metabolomic study of cisplatin-induced nephrotoxicity // *Kidney International*. – 2006. – Vol. 69(12). – P. 2194–2204.
4. Bompert G., Orfila C., Girolami J.P. Distal nephrotoxicity of cisplatin demonstrated by morphological study in rats // *Toxicology*. – 1991. – Vol. 69(2). – P. 121–132.
5. Martinez F., Deray G., Dubois M. et al. Comparative nephrotoxicity of carboplatin and cisplatin in rats // *Anticancer Drugs*. – 1993. – Vol. 4(1). – P. 85–90.
6. Wolfgang G.H., Dominick M.A., Walsh K. Comparative Nephrotoxicity of Cisplatin and Carboplatin in Rats // *Toxicological Sciences*. – 1994. – Vol. 22(1). – P. 73–79.
7. Doroxina E.I., Magomedova A.U., Kulikov S.M. et al. Otdalennaya nefrotoksichnost vysokodoznoy ximioterapii // *Gematologiya i transfuziologiya*. – 2016. – Vol. 61(4). – P. 177–183.
8. Klyosov R.A. et al. Lekarstvennoe porazhenie gastrointestinalnoy sistemy i puti ee korrektsii // *Biomeditsina*. – 2020. – Vol. 16(3). – P. 14–34.
9. Gromova E.G., Biryukova L.S., Djumabaeva B.T. Prakticheskie rekomendatsii po korrektsii nefrotoksichnosti protivopuxolevyx preparatov // *Zlokachestvennye opuxoli*. – 2017. – №3s2. – P. 540–552.

Иқтибос учун: Бахронов С.Т., Давлатов С.С., Худойбердиев Д.К., Баймурадов Р.Р. Кимётерапия фонида ривожланган буйрак етишмовчилигида ингичка ичакнинг умумий морфологик ўзгаришлари // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси*. – 2026. – № 4(24). – Б. 988–993. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19909585>

СУРУНКАЛИ ВИРУСЛИ ГЕПАТИТ БИЛАН ОҒРИГАН БЕМОРЛАРДА ПСИХИК ВА НЕВРОЗ ҲОЛАТЛАРИНИНГ КЛИНИК-ЭПИДЕМИОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ

Облокулов А.Р.¹, Ибраимова Х.Р.²

¹Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

²Урганч давлат тиббиёт институти, Урганч ш., Ўзбекистон

Резюме. Мазкур тадқиқот сурункали вирусли гепатит Б ва С билан оғриган беморларда психик бузилишлар ва невроз ҳолатларининг учраш жиҳати, клиник намоён бўлиши ва касалликнинг эпидемиологик хусусиятлари билан боғлиқлигини аниқлашга бағишланган. Тадқиқотда 53 нафар сурункали гепатит Б ва С билан оғриган бемор иштирок этди. Психик ҳолат депрессия, анксиозлик (ташвишланиш), уйқусизлик, когнитив бузилишлар ва эмоционал лабиллик нуқтаи назаридан комплекс баҳоланди. Натижаларга кўра, беморларнинг 62% да депрессия, 49% да анксиозлик, 37% да уйқусизлик ва когнитив бузилишлар қайд этилди. Шунингдек, йиғлоқлик, кайфиятнинг тушиши ва ижтимоий фаолликнинг пасайиши каби белгилар депрессив ва невроз ҳолатларида кўпинча ҳамроҳ бўлган. Психик бузилишлар асосан касалликнинг узоқ давом этиши, клиник оғирлиги ва соматик симптомлар билан боғлиқ бўлганлиги аниқланди, вирус тури (Б ёки С) билан фарқ сезилмади. Анксиозлик ва депрессиянинг кўпинча касалликнинг илк йилларида ва сурункали босқичларида ривожланиши тадқиқотда қайд этилди. Олинган натижалар сурункали вирусли гепатит билан оғриган беморларни даволашда психик саломат-ликни мунтазам баҳолаш ва психосоциал қўллаб-қувватлашни ўз ичига олган комплекс интервенциялар аҳамиятли эканлигини кўрсатади. Бундай ёндашув беморларнинг ҳаётий сифати ва терапия самарадорлигини сезиларли даражада ошириши имконини беради.

Калит сўзлар: Сурункали вирусли гепатит Б, сурункали вирусли гепатит С, депрессия, анксиозлик, невроз ҳолатлари, уйқусизлик, психик саломатлик.

CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL FEATURES OF MENTAL AND NEUROTIC CONDITIONS IN PATIENTS WITH CHRONIC VIRAL HEPATITIS B AND C

Oblokulov A.R.¹, Ibraximova H.R.²

¹Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

²Urgench State Medical Institute, Urgench, Uzbekistan

Resume. This study aimed to determine the prevalence of mental disorders and neurotic conditions in patients with chronic viral hepatitis B and C, as well as their clinical manifestations and epidemiological characteristics. The study included 53 patients with chronic hepatitis B and C. Mental status was assessed comprehensively in terms of depression, anxiety, insomnia, cognitive impairment, and emotional lability. The results showed that 62% of patients had depression, 49% had anxiety, and 37% had insomnia and cognitive impairment. In addition, symptoms such as tearfulness, low mood, and decreased social activity often accompanied depressive and neurotic conditions. Mental disorders were mainly associated with the prolonged course of the disease, clinical severity, and somatic symptoms, with no significant differences observed between virus types (B or C). The study also noted that anxiety and depression frequently develop in the early years of the disease and during its chronic stage. The findings highlight the importance of regular mental health assessment and psychosocial support as part of a comprehensive approach to treating patients with chronic viral hepatitis. Such an approach can significantly improve patients' quality of life and the effectiveness of therapy.

Keywords: chronic viral hepatitis B, chronic viral hepatitis C, depression, anxiety, neurotic conditions, insomnia, mental health.

ХРОНИЧЕСКИЙ ВИРУСНЫЙ ГЕПАТИТ В И С: КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПСИХИЧЕСКИХ И НЕВРОТИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ

Облокулов А.Р.¹, Ибраимова Х.Р.¹

¹Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

²Ургенчский государственный медицинский институт, г. Ургенч, Узбекистан

Резюме. Данное исследование посвящено выявлению частоты психических нарушений и невротических состояний у пациентов с хроническим вирусным гепатитом В и С, а также их клинической

выраженности и эпидемиологических особенностей заболевания. В исследовании приняли участие 53 пациента с хроническим гепатитом В и С. Психическое состояние оценивалось комплексно с точки зрения депрессии, тревожности, бессонницы, когнитивных нарушений и эмоциональной лабильности. Результаты показали, что депрессия выявлена у 62% пациентов, тревожность — у 49%, бессонница и когнитивные нарушения — у 37%. Кроме того, признаки, такие как плаксивость, снижение настроения и снижение социальной активности, часто сопровождали депрессивные и невротические состояния. Психические нарушения в основном были связаны с длительностью болезни, тяжестью клинических проявлений и соматическими симптомами, различий между типами вируса (В или С) не выявлено. Частое развитие тревожности и депрессии в первые годы болезни и на хронической стадии было отмечено в исследовании. Полученные результаты показывают важность регулярной оценки психического здоровья и психосоциальной поддержки в комплексном подходе к лечению пациентов с хроническим вирусным гепатитом. Такой подход позволяет значительно улучшить качество жизни пациентов и эффективность терапии.

Ключевые слова: хронический вирусный гепатит В, хронический вирусный гепатит С, депрессия, тревожность, невротические состояния, бессонница, психическое здоровье.

e-mail: obloqulov.abdurashid@bsmi, uzzamida.ibrahimova@mail.ru

Мавзунинг долзарблиги. Сурункали вирусли гепатит Б ва С жаҳон соғлиқни сақлаш соҳасида катта аҳамиятга эга бўлиб, жигар функцияси ва беморнинг умумий ҳолатига узоқ муддатли таъсир кўрсатади. Ушбу инфекциялар фақат соматик белгилар билан чекланмай, кўпинча руҳий саломатлик муаммолари — депрессия, анксиозлик, уйқусизлик, когнитив бузилишлар ва невроз ҳолатлари билан ҳам боғлиқ бўлади. Бундай психологик бузилишлар беморнинг ҳаёт сифатини пасайтиради ва даволанишга риоя қилиш ҳамда клиник натижаларга салбий таъсир кўрсатиши мумкин.

Касаллик узоқ давом этган ёки оғир кечган беморларда эмотсионал лабиллик, йиғлоқлик, кайфиятнинг пасайиши ва ижтимоий фаолликнинг камайиши кузатилади. Руҳий бузилишларнинг ривожланиши вирус турига (Б ёки С) боғлиқ бўлмай, касалликнинг давомийлиги, клиник оғирлиги, соматик белгилар ва психосотсиал стресс омиллари билан белгиланади. Касалликнинг илк йилларида анксиозлик кўпинча ташвиш ва ноаниқлик билан боғлиқ бўлса, сурункали босқичларда депрессив белгилар пайдо бўлиб, кучаяди. Сурункали вирусли гепатит билан оғирган беморларда психик ва невроз ҳолатларнинг клиник ва эпидемиологик хусусиятларини ўрганиш, комплекс даволаш стратегияларини ишлаб чиқиш учун муҳимдир. Психологик баҳолаш ва қўллаб-қувватлашни даволаш жараёнига киритиш, муаммоларни вақтида аниқлаш, терапия самарадорлигини ошириш ва беморларнинг ҳаёт сифатини яхшилаш имконини беради. Ушбу тадқиқотнинг мақсади сурункали гепатит Б ва С билан оғирган беморларда руҳий ва невроз ҳолатларнинг учраш частотаси, клиник намоён бўлиши ва эпидемиологик хусусиятларини аниқлашдир.

Тадқиқот мақсади: сурункали вирусли гепатит Б ва С билан оғирган беморларда психик ва невроз ҳолатларининг учраш жиҳати, клиник намоён бўлиши ва касалликнинг эпидемиологик хусусиятларини аниқлаш.

Материал ва усуллар. Тадқиқотда 53 нафар сурункали вирусли гепатит Б ва С билан оғирган бемор иштирок этди. Психик ҳолат комплекс баҳоланди: депрессия, анксиозлик (ташвишланиш), уйқусизлик, когнитив бузилишлар ва эмотсионал лабиллик. Психик ва невроз ҳолатларнинг ривожланиши касалликнинг давомийлиги, клиник оғирлиги ва соматик симптомлар билан боғлиқлиги таҳлил қилинди.

Муҳокама. Ушбу тадқиқот натижалари сурункали вирусли гепатит Б ва С билан оғирган беморларда психик ва невроз ҳолатлари юқори частотада учрашини кўрсатди. Аниқланишича, ушбу бузилишлар касалликнинг вирус турига эмас, балки унинг сурункали кечиши, клиник оғирлиги ва давомийлиги билан бевосита боғлиқ. Тадқиқот доирасида депрессия белгилари 62% беморда аниқланиши, сурункали вирусли гепатит фонида эмотсионал соҳадаги ўзгаришлар кенг тарқалганини кўрсатади. Депрессия клиник жиҳатдан фақат кайфиятнинг пасайиши билан чекланиб қолмасдан, беморларда йиғлоқлик, умидсизлик, келажакга нисбатан пессимистик қарашлар ҳамда ҳаётий қизиқишнинг камайиши каби белгилар билан намоён бўлган. Айниқса, касаллик 3–5 йилдан ортиқ давом этган беморларда кайфиятнинг барқарор пасайиши ва эмотсионал реакцияларнинг сусайиши кўпроқ кузатилди. Анксиозлик белгилар 49% беморда қайд этилган бўлиб, улар кўпинча касаллик бошланганидан сўнг биринчи 6–12 ой ичида пайдо бўлган. Бу ҳолат диагноз қўйилиши билан боғлиқ психологик стресс, касаллик оқибатлари ҳақидаги ноаниқлик, узоқ даволаниш эҳтимоли ва ижтимоий чекловлар билан изоҳланади. Анксиозлик кўпинча ички безовталиқ, сабабли хавотир, уйқу бузилиши

ва эмотсионал бекарорлик билан кечган. Рухий бузилишларнинг бошланиш вақти бўйича таҳлил шуни кўрсатдики, анксиоз ҳолатлар кўпроқ касалликнинг илк босқичларида, депрессив ҳолатлар эса касалликнинг узоқ давом этиши фонида, яъни 2–5 йилдан сўнг шаклланишга мойил бўлган. Бу жараён эмотсионал чарчаш, ижтимоий ролларнинг чекланиши ва соматик белгилар кучайиши билан боғлиқ бўлиши мумкин. Уйқусизлик ва когнитив бузилишлар 37% беморда кузатилиб, улар кўпинча депрессия ва анксиозлик билан биргаликда намоён бўлган. Уйқу бузилишлари беморларда кечаси ухлаб кетиш қийинлашуви, эрта уйғониш ва тунги уйқунинг юзакилиги кўринишида намоён бўлиб, кундузги чарчоқ ва диққатнинг пасайишига олиб келган. Бу ҳолатлар астеноневротик синдром ривожланишини кучайтирган. Невроз ҳолатларининг ривожланишида қуйидаги омиллар асосий кўзғатувчи сабаблар сифатида баҳоланди: - касалликнинг узоқ ва сурункали кечиши; - жигар фаолиятининг издан чиқиши билан боғлиқ доимий соматик шикоятлар; - даволаниш жараёнидаги қийинчиликлар ва узоқ муддатли терапия; - ижтимоий чекловлар ва меҳнат қобилиятининг пасайиши; - беморнинг шахсий психологик хусусиятлари.

Невроз ҳолатлари асосан астеноневротик, ташвишли-невротик ва депрессив-невротик шаклларда намоён бўлиб, улар беморларда эмотсионал лабилитет, йиғлоқлик, жаҳлдорлик ва сабабли чарчаш билан кечган. Бу ҳолатлар беморларнинг кундалик фаолияти, ижтимоий муносабатлари ва даволашга риоя қилиш даражасига салбий таъсир кўрсатган. Умуман олганда, олинган натижалар сурункали вирусли гепатит Б ва С билан оғриган беморларда психик бузилишлар динамик жараён эканлигини, яъни улар касалликнинг турли босқичларида турлича намоён бўлишини кўрсатади. Шу сабабли бундай беморларда психик ҳолатни касалликнинг барча босқичларида мунтазам баҳолаш ва эрта профилактик психосоциал чораларни қўллаш муҳим аҳамиятга эга.

Хулоса. Сурункали вирусли гепатит Б ва С билан оғриган беморларда депрессия, анксиозлик, уйқусизлик, когнитив бузилишлар ва невроз ҳолатлари кенг тарқалганлиги аниқланди. Бу психик бузилишлар касалликнинг клиник оғирлиги ва давомийлиги билан бевосита боғлиқ бўлиб, уларнинг ривожланиши кўпинча касалликнинг илк йилларида бошланади ва узоқ муддатли сурункали босқичларда янада мураккаблашади. Беморларда йиғлоқлик, кайфиятнинг пасайиши, ички чарчоқ ва ижтимоий фаолликнинг чекланиши каби белгилар ҳам учрайди, бу уларнинг ҳаётининг сифати ва кундалик фаолиятига сезиларли салбий таъсир кўрсатади. Тадқиқот натижалари шуни кўрсатадики, психик ва невроз ҳолатларини ўз вақтида аниқлаш, уларни комплекс даволаш жараёнига киритиш ҳамда психологик ва психиатрия ёрдами таъминлаш беморларнинг умумий саломатлиги ва терапия самардорлигини сезиларли даражада яхшилайдди. Шу билан бирга, психосоциал қўллаб-қувватлаш, стрессни камайтириш ва эмотсионал ҳолатни барқарорлаштиришга қаратилган чоралар касалликнинг давомийлиги ва клиник оғирлигини юмшатишга ёрдам беради. Шу сабабли сурункали вирусли гепатит Б ва С билан оғриган беморларни даволашда фақат гепатологик терапия билан чекланмай, балки психиатрия ва психологик ёрдамни ўз ичига олган комплекс, мултидисциплинар ёндашувни жорий этиш мақсадга мувофиқдир. Бундай интеграцияланган ёндашув беморларнинг ҳаётининг сифати ва даволашга риоя қилишини яхшилаш, шунингдек касалликнинг ижтимоий ва эмотсионал оқибатларини камайтириш имконини беради.

Адабиётлар рўйхати:

1. Polukchi T.V., Slavko Ye.A., Abuova G.N., Kasymova T.V. Anxiety depressive disorders in chronic viral hepatitis: literature review.
2. Baramzina S.V., Bondarenko A.L., Tokareva N.V. Chronic hepatitis B and C in patients with mental illnesses: clinical and epidemiological aspects.
3. Rakhmanova A.M. Assessment of psycho emotional state in chronic hepatitis B and C patients. (Toshkent, O'zbekiston)
4. Oslanov A.A., Kadirov J.F., Murodov S. Psychological self-monitoring in chronic viral hepatitis. (Samarqand, O'zbekiston)
5. Muxamedov B.I. Clinical and epidemiological indicators in chronic hepatitis B and C patients. (O'zbekiston)
6. Polukchi T.V., Slavko Ye.A., Abuova G.N., Kasymova T.V. Anxiety depressive disorders in chronic viral hepatitis. (Qozog'iston/Rossiya)
7. Baramzina S.V., Bondarenko A.L., Tokareva N.V. Clinical and epidemiological aspects of chronic hepatitis and mental disorders. (Rossiya)

Иктибос учун: Облокулов А.Р., Ибраимова Х.Р. Сурункали вирусли гепатит билан оғриган беморларда психик ва невроз ҳолатларининг клиник-эпидемиологик хусусиятлари // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2026. – № 4(24). – Б. 994–996. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19909975>

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ГИПЕРТИРЕОЗ ЧАҚИРИЛГАН КАЛАМУШ АВЛОДЛАРИНИНГ ИЛК КУНЛИГИДА ОШҚОЗОН ОСТИ БЕЗИ МОРФОЛОГИК, МОРФОМЕТРИК СОЛИШТИРМА ТАХЛИЛИ

Орипов Ф.С., Тогаева Г.С.

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Мазкур тадқиқотда экспериментал гипертиреоз шароитида она каламушларда ҳосил қилинган эндокрин ўзгаришларнинг авлодлар ошқозон ости безига таъсири морфологик ва морфометрик жиҳатдан ўрганилди. Тадқиқотнинг долзарблиги тиреоид гормонлар мувозанатининг бузилиши перинатал даврда организм аъзоларининг шаклланиши ва функционал етилишига сезиларли таъсир кўрсатиши билан изоҳланади.

Калит сўзлар: экспериментал гипертиреоз, каламуш, авлод, морфометрия, морфология.

COMPARATIVE MORPHOLOGICAL AND MORPHOMETRIC ANALYSIS OF THE PANCREAS IN ONE-DAY-OLD OFFSPRING OF RATS WITH EXPERIMENTALLY INDUCED HYPERTHYROIDISM

Togayeva G.S., Oripov F.S.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. This study investigates, under conditions of experimental hyperthyroidism in maternal rats, the effects of induced endocrine changes on the offspring's pancreas using morphological and morphometric approaches. The relevance of the study is explained by the fact that disruption of thyroid hormone balance during the perinatal period significantly affects organ formation and functional maturation.

Key words: experimental hyperthyroidism, rats, offspring, morphometry, morphology.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ И МОРФОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У ОДНОДНЕВНОГО ПОТОМСТВА КРЫС С ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО ИНДУЦИРОВАННЫМ ГИПЕРТИРЕОЗОМ

Тогаева Г.С., Орипов Ф.С.

Самаркандский государственный медицинский университет, г.Самарканд, Узбекистан

Резюме. В данном исследовании в условиях экспериментального гипертиреоза у материнских крыс морфологически и морфометрически изучено влияние индуцированных эндокринных изменений на поджелудочную железу потомства. Актуальность исследования обусловлена тем, что нарушение баланса тиреоидных гормонов в перинатальном периоде оказывает значительное влияние на формирование органов и их функциональное созревание.

Ключевые слова: экспериментальный гипертиреоз, крысы, потомство, морфометрия, морфология.

e-mail: gulnora.togayeva1981@mail.ru

Ишнинг мақсади – экспериментал гипертиреоз чақирилган она каламушлардан туғилган авлодларнинг ҳаётининг илк кунларида ошқозон ости безининг морфологик тузилиши ва морфометрик кўрсаткичларидаги ўзгаришларни солиштирма таҳлил қилишдан иборат.

Материал ва усуллар: Материал ва усуллар сифатида лаборатория каламушлари авлодлари назорат ва тажриба гуруҳларига ажратилди. Ошқозон ости бези тўқималари стандарт гистологик усулларда тайёрланиб, микроскопик текширувдан ўтказилди. Морфометрик таҳлилда ацинуслар ўлчами, Лангерганс оролчалари диаметри ва ҳажми, ҳамда эндокрин ва экзокрин қисмлар нисбати баҳоланди.

Тадқиқот натижалари ва муҳокама. Тажриба оқ зотсиз, лаборатор каламуш авлодлари 2 та гуруҳга ажратилди. 1-гуруҳни соғлом назорат гуруҳидаги 20 та каламуш болалари ташкил қилиб, 2-гуруҳни тажриба гуруҳига кирувчи экспериментал гипертиреоз модели чақирилган каламушлардан туғилган 40 та каламуш болалари ташкил қилди. Каламушлар туғилганидан сўнг илк кунлигида жонсизлантирилди. Оғриқсизлантириш учун Ўзбекистонда ишлатишга рухсат берилган ва ветеринария дорихоналарида мавжуд бўлган 2%ли ксилазиндан фойдаланилди (2% ли ксилазни

0.2мл/кг дозада мушак орасига юборилади). Жонсизлантирилган авлодлар декапитация қилиниб, ўрганиш учун ошқозон ости беи олинди.

Назорат гуруҳидаги она каламушлардан туғилган, каламуш болаларини ошқозон ости беи морфометрик параметрларининг структур тузилиши илк кунида аниқланди. Бунда панкреатоцитлар ядросининг ҳажми 2.05 ± 0.10 ни ташкил қилган бўлса, цитоплазма ҳажми эса 4.55 ± 0.20 деб қайд этилди. Шу билан бирга хужайранинг умумий ҳажми эса 6.60 ± 0.17 га тенг бўлди. Морфометрик таҳлил натижасида, хужайра ядросининг цитоплазма ҳажмига нисбати эса 0.45 ± 0.02 га тенг эканлиги аниқланди. Бир кунлик каламуш авлодларининг ошқозон ости беи эндокрин қисми Лангерганс оролчалари морфометрик кўрсаткичлари ўрганилганда бу оролчалар майдони $4706.3 \pm 440.3 \mu\text{m}^2$ ни ташкил қилди. Бу кўрсаткич каламуш болаларининг постнатал онтогенезнинг илк даврида оролчалар ривожланишининг типик ҳолатига хос ҳисобланади. Бунда Лангерганс оролчаларида хужайралар сони ўртача 52 ± 6.5 донани ташкил қилди.

Экспериментал гипертиреоз модели яратилган она каламушлардан туғилган каламуш болаларинининг ошқозон ости беи морфометрик структур параметрларини илк кунлигини солиштирма таҳлил қилинди. Бунда экзокрин хужайралар ядросининг ҳажми $2,10 \pm 0,10$ ни ташкил қилиб, назорат гуруҳидагиларга нисбатан 2,4% катталашган. Цитоплазма ҳажми 4.65 ± 0.10 га тенг бўлиб, назорат гуруҳига нисбатан 2.2% га ўсганини кўришимиз мумкин. Панкреатоцитларнинг умумий ўртача ҳажми эса 6.75 ± 0.17 га тенг ва назорат гуруҳига нисбатан 2%га юқори. Бунда хужайра ядросининг унинг цитоплазмаси ҳажмига нисбати 0.45 ± 0.02 га тенг бўлиб, назорат гуруҳига нисбатан сезиларли фарқ қилмаганлигини кўришимиз мумкин.

Гипертиреоз шароитида туғилган, бир кунлик каламуш авлодлари меъда ости беи Лангерганс оролчасининг майдони $5327.83 \pm 750.8 \mu\text{m}^2$ ни ташкил қилиб, бу назорат гуруҳидаги каламуш авлодлари шундай кўрсаткичларидан ишонарли юқоридир. Хужайралар сони ҳам фарқли равишда 61 ± 5.1 донани ташкил қилиб назорат гуруҳидан сезиларли юқоридир. Бизнинг фикримизча бу гормонларнинг таъсирида эрта намоён бўлган ўзгаришлардир

Олинган натижалар шуни кўрсатдики, экспериментал гипертиреоз шароитида ривожланган авлодларда ошқозон ости безининг тузилишида муайян ўзгаришлар кузатилди: ациноз тузилмаларнинг дискомплексацияси, эндокрин оролчаларда хужайралар зичлигининг ўзгариши ва морфометрик кўрсаткичларда ишончли фарқлар аниқланди. Бу ўзгаришлар перинатал гормонал таъсирлар натижасида органогенез жараёнларининг модификацияланишини кўрсатади.

Хулоса қилиб айтганда, она организмда гипертиреоз ҳолати авлодлар ошқозон ости безининг морфофункционал ривожланишига салбий таъсири, каламушлар ошқозон ости беи панкреатоцитлари ва Лангерганс оролчасининг морфологияси ва морфометриик кўрсаткичларида ишонарли ўзгаришлар кузатилди. Бу ўзгаришлар без эндокрин қисмига тиреоид гормонларнинг кўп миқдордаги таъсири билан боғлиқ.

Адабиётлар рўйхати:

1. Aziza, O., Ziyodillo, B., Gulnora, T., Maqsad, M., Anjim, S., Furkat, J., & Shaxnoza, A. (2025). Intermittent fasting and endothelial function in metabolic syndrome: A randomized controlled trial on vascular health and oxidative stress markers. *Revista Latinoamericana de Hipertension*, 20(6), 468-473.
2. Zayniddin qizi, X. R. ., & Siddikovna, T. G. . (2026). Care of Pregnant Women with Diabetes Mellitus. *Best Journal of Innovation in Science, Research and Development*, 5(2), 201–206.
3. Орипов Ф.С., Тогаева Г.С. Орган ва тизимларининг турли патологияларида ошқозон ости безининг морфофункционал ҳолатидаги реактив ўзгаришлар // Биология ва тиббиёт муаммолари журнаи. - Самарқанд, 2024. - №4 (155). – С. 114-119
4. Орипов Ф.С., Тогаева Г.С. Экспериментал гипертиреоз модели чакирилган она каламушлардан туғилган авлодлар ошқозон ости беи морфометрик кўрсаткичларини коррекциялаш натижалари // Проблемы биологии и медицины. – Самарқанд, 2025. - №4 (163). – С. 264-270
5. Oripov F.S., Togaeva G. S. Eksperimental gipertireoz natijasida oshqozon osti bezi parenximasining reaktiv morfofunktsional o'zgarishlari// Биомедицина ва амалиёт журнаи. - Самарқанд, 2025. - №4 (10). – С. 283-289
6. Орипов Ф.С., Тогаева Г.С. Влияние экспериментального тиреотоксикоза на патоморфологию и функцию поджелудочной железы (Обзорная статья) //Кардиореспираторных исследований. – Самарқанд, 2025. - №2 (1). – С.64-69
7. Орипов Ф.С., Тогаева Г.С. Экспериментал гипертиреоз шароитида ошқозон ости беида юзага келган морфометрик ўзгаришларни коррекциялаш // Фундаментал ва

клиник тиббиёт ахборотномаси. – Бухоро, 2025.- №4 (18). – С.536 -539

8. Орипов Ф.С., Тогаева Г.С. Экспериментал гипертиреоз шароитида туғилган каламуш авлодларининг ошқозон ости бези паренхимасининг морфометрик кўрсаткичлари // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – Бухоро, 2025.- №4 (18). – С. 491-495

9. Орипов Ф.С., Тогаева Г.С. Экспериментал гипертиреоз натижасида ошқозон ости бези паренхимасининг морфометрик кўрсаткичлари // Yosh olimlar tibbiyot jurnali. – Toshkent, 2025. №15(09). С. 67-69

10.Rahimova M., Tog'ayeva G. Qandli diabet bilan og'rikan homilador ayollarda kasallik kechishining o'ziga xosligi //Modern Science and Research. – 2025. – Т. 4. – №. 1. – С. 1034-1038

11.Togaeva G.S., Oripov F.S. Pathomorphologic and Morphofunctional Changes of Pancreatic Parenchyma under Experimental Influences (Review Article)// American Journal of Medicine and Medical Sciences 2024, 14(9): 2166-2170

12.Тогаева Г.С., Орипов Ф.С. Экспериментал гипертиреоз ҳолатида она каламушдан туғилган авлодлари ошқозон ости безининг тўқимасидаги морфофункционал ўзгаришлар ва уни аниқлаш// Биология ва тиббиёт муаммолари журнали. Самарқанд, 2025. - № 3 (161). – С.245 -2

13.Bagirova Umida Jabbarovna¹, Togayeva Gulnora Siddikovna², (2026). Neuroendocrine Regulation of Female Fertility Under Chronic Stress.. AAMS General Medicine, 7(03), 78-90. <https://doi.org/10.4103/AAMS.0498>

14.Ulug'bekovna, S. A., Siddikovna, T. G. (2026). Changes in the body of children born to mothers with hyperthyroidism. International Journal of Cognitive Neuroscience and Psychology, 4(2),47–49.

15.Bekzod qizi. A. M., Siddikovna, T. G. Changes in the Body of a Pregnant Woman as a Result of Hyperthyroidism. American Journal Of Bioscience And Clinical Integrity 2026, 3(2), 51-55 Received: 10th Nov 2025

Иқтибос учун: Орипов Ф.С., Тогаева Г.С. Экспериментал гипертиреоз чақирилган каламуш авлодларининг илк кунлигида ошқозон ости бези морфологик, морфометрик солиштирма тахлили // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2026. – № 4(24). – Б. 997–999. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19910065>

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В ЧАСТНЫХ МНОГОПРОФИЛЬНЫХ КЛИНИКАХ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН**Акилов Х.А.¹, Исламов М.Т.^{2,3}, Мардонов Ж.Н.^{4,5}**¹Центр развития профессиональной квалификации медицинских работников, г. Ташкент, Узбекистан²Частная клиника «Doktor Servis», г. Ташкент, Узбекистан³Центральный госпиталь Министерства внутренних дел Республики Узбекистан, г. Ташкент, Узбекистан⁴ГУ «Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр хирургии им. акад. В. Вахидова», г. Ташкент, Узбекистан⁵Ташкентский государственный медицинский университет, г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. В статье рассмотрены вопросы повышения качества и безопасности медицинской помощи в частных многопрофильных клиниках Республики Узбекистан. Изучена эффективность организационно-управленческой модели, основанной на риск-ориентированном подходе, стандартизации клинических процессов, внедрении протоколов и чек-листов, регистрации медицинских инцидентов, клинко-экспертном аудите и обучении персонала. Цель исследования - разработать и оценить эффективность организационно-управленческой модели обеспечения качества и безопасности медицинской помощи в частных многопрофильных клиниках. Материалы и методы. Исследование проведено на базе 4 частных многопрофильных клиник Республики Узбекистан в 2023–2025 гг. Проанализированы 2047 случаев медицинской документации, 52 повторных обращения и результаты анкетирования 1020 пациентов. Оценка проводилась до и после внедрения разработанной модели. Основными критериями эффективности являлись частота дефектов медицинской помощи, количество обоснованных жалоб, качество медицинской документации, частота повторных клинических ошибок и уровень удовлетворённости пациентов. Результаты. После внедрения модели частота дефектов медицинской помощи снизилась с 17,8% до 8,9% ($p < 0,001$), количество обоснованных жалоб - с 12,4% до 7,6% ($p = 0,001$), удовлетворённость пациентов повысилась с $4,2 \pm 0,6$ до $4,8 \pm 0,3$ балла ($p < 0,001$), а качество медицинской документации улучшилось с 74% до 92% ($p < 0,001$). Частота повторных клинических ошибок снизилась на 34%. Заключение. Разработанная организационно-управленческая модель позволила достоверно улучшить основные показатели качества и безопасности медицинской помощи в частных многопрофильных клиниках. Полученные результаты подтверждают целесообразность внедрения риск-ориентированного подхода в систему внутреннего контроля качества частных медицинских организаций.

Ключевые слова: качество медицинской помощи, безопасность пациентов, управление качеством, частная медицина, клинический аудит, медицинская документация, Республика Узбекистан.

ORGANIZATIONAL AND MANAGEMENT MODEL FOR ENSURING THE QUALITY AND SAFETY OF MEDICAL CARE IN PRIVATE MULTIDISCIPLINARY CLINICS OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN**Akilov Kh.A.¹, Islamov M.T.^{2,3}, Mardonov J.N.^{4,5}**¹Center for the development of professional qualification of medical workers, Tashkent, Uzbekistan²Private Clinic "Doktor Servis", Tashkent, Republic of Uzbekistan³Central Hospital of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Uzbekistan, Tashkent, Uzbekistan⁴Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Surgery named after Academician V. Vakhidov, Tashkent, Uzbekistan⁵Tashkent State Medical University, Tashkent, Uzbekistan

Resume. The article addresses issues related to improving the quality and safety of medical care in private multidisciplinary clinics in the Republic of Uzbekistan. The effectiveness of an organizational and management model based on a risk-oriented approach, standardization of clinical processes, implementation of protocols and checklists, registration of medical incidents, clinical expert audit and staff training was studied. Aim of the study - to develop and evaluate the effectiveness of an organizational and management model for ensuring the quality and safety of medical care in private multidisciplinary clinics. Materials and methods. The study was conducted in 4 private multidisciplinary clinics in the Republic of Uzbekistan from 2023 to 2025. A total of 2047 medical records, 52 repeated visits and survey results from 1020 patients were

analyzed. The assessment was performed before and after implementation of the developed model. The main effectiveness criteria were the frequency of medical care defects, the number of justified complaints, the quality of medical documentation, the frequency of repeated clinical errors and the level of patient satisfaction. Results. After implementation of the model, the frequency of medical care defects decreased from 17.8% to 8.9% ($p<0.001$), the number of justified complaints decreased from 12.4% to 7.6% ($p=0.001$), patient satisfaction increased from 4.2 ± 0.6 to 4.8 ± 0.3 points ($p<0.001$), and the quality of medical documentation improved from 74% to 92% ($p<0.001$). The frequency of repeated clinical errors decreased by 34%. Conclusion. The developed organizational and management model significantly improved the main indicators of quality and safety of medical care in private multidisciplinary clinics. The obtained results confirm the feasibility of implementing a risk-oriented approach in the internal quality control system of private medical organizations.

Keywords: quality of medical care, patient safety, quality management, private healthcare, clinical audit, medical documentation, Uzbekistan.

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДАГИ ХУСУСИЙ КЎП ТАРМОҚЛИ КЛИНИКАЛАРДА ТИББИЙ ЁРДАМ СИФАТИ ВА ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ ТАШКИЛИЙ-БОШҚАРУВ МОДЕЛИ

Акилов Х.А.¹, Исломов М.Т.^{2,3}, Мардонов Ж.Н.^{4,5}

¹Тиббиёт ходимларининг касбий малакасини ривожлантириш маркази, Тошкент ш., Ўзбекистон

²“Doktor Servis” хусусий клиникаси, Тошкент ш., Ўзбекистон

³Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Марказий госпитали, Тошкент ш., Ўзбекистон

⁴“Академик В.Вохидов номидаги Республика ихтисослаштирилган хирургия илмий - амалий тиббиёт маркази” ДМ, Тошкент ш., Ўзбекистон

⁵Тошкент давлат тиббиёт университети, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. Мақолада Ўзбекистон Республикасидаги хусусий кўп тармоқли клиникаларда тиббий ёрдам сифати ва хавфсизлигини ошириш масалалари кўриб чиқилган. Хавфга йўналтирилган ёндашув, клиник жараёнларни стандартлаштириш, протоколлар ва чек-листларни жорий этиш, тиббий ходисаларни рўйхатга олиш, клиник-эксперт аудит ҳамда ходимларни ўқитишга асосланган ташкилий-бошқарув моделининг самарадорлиги ўрганилган. Тадқиқот мақсади - хусусий кўп тармоқли клиникаларда тиббий ёрдам сифати ва хавфсизлигини таъминлашнинг ташкилий-бошқарув моделини ишлаб чиқиш ва унинг самарадорлигини баҳолаш. Материаллар ва усуллар. Тадқиқот 2023–2025 йилларда Ўзбекистон Республикасидаги 4 та хусусий кўп тармоқли клиника базасида ўтказилган. Жами 2047 та тиббий ҳужжат, 52 та қайта мурожаат ва 1020 нафар бемор сўровномаси на-тижалари таҳлил қилинган. Баҳолаш ишлаб чиқилган модел жорий этилишидан олдин ва кейин амалга оширилган. Самарадорликнинг асосий мезонлари сифатида тиббий ёрдамдаги нуқсонлар частотаси, асосли шикоятлар сони, тиббий ҳужжатлар сифати, такрорий клиник хатолар частотаси ва беморлар қониқиш даражаси баҳоланган. Натижалар. Модел жорий этилгандан сўнг тиббий ёрдамдаги нуқсонлар частотаси 17,8% дан 8,9% гача камайган ($p<0,001$), асосли шикоятлар сони 12,4% дан 7,6% гача камайган ($p=0,001$), беморлар қониқиш даражаси $4,2\pm0,6$ баллдан $4,8\pm0,3$ баллгача ошган ($p<0,001$), тиббий ҳужжатлар сифати эса 74% дан 92% гача яхшиланган ($p<0,001$). Такрорий клиник хатолар частотаси 34% га камайган. Хулоса. Ишлаб чиқилган таш-килий-бошқарув модели хусусий кўп тармоқли клиникаларда тиббий ёрдам сифати ва хавфсизлигининг асосий кўрсаткичларини ишончли яхшилаш имконини берган. Олинган натижалар хусусий тиббиёт ташкилотларининг ички сифат назорати тизимига хавфга йўналтирилган ёндашувни жорий этиш мақсадга мувофиқлигини тасдиқлайди.

Калит сўзлар: тиббий ёрдам сифати, бемор хавфсизлиги, сифатни бошқариш, хусусий тиббиёт, клиник аудит, тиббий ҳужжатлар, Ўзбекистон Республикаси.

e-mail: doctor_jamshid@inbox.ru

Введение. Качество и безопасность медицинской помощи являются ключевыми критериями эффективности функционирования современной системы здравоохранения, поскольку напрямую определяют клинические исходы, уровень доверия пациентов, устойчивость медицинской организации и рациональность использования ресурсов. В современных условиях качество медицинской помощи рассматривается не только как результат профессиональной деятельности врача, но и как интегральный показатель управляемости всей медицинской системы, включающий организацию процес-

сов, стандартизацию лечебно-диагностических мероприятий, полноту медицинской документации, внутренний аудит, профилактику ошибок и постоянную обратную связь с пациентами [1-8, 13-18].

Проблема безопасности пациентов имеет глобальное значение. По данным Всемирной организации здравоохранения, примерно каждый десятый пациент сталкивается с вредом при получении медицинской помощи, а более 3 млн случаев смерти ежегодно ассоциируются с небезопасным оказанием медицинской помощи. При этом более 50% случаев вреда считаются потенциально предотвратимыми [1,3,5]. В амбулаторной и первичной медицинской помощи, по оценкам ВОЗ, неблагоприятные события могут затрагивать до 4 из 10 пациентов, а значительная часть этих случаев также может быть предупреждена при наличии эффективной системы управления рисками [1]. Эти данные подчёркивают, что обеспечение безопасности пациентов является не только клинической, но и организационно-управленческой задачей.

Современная концепция качества медицинской помощи базируется на представлении о многоуровневой системе, включающей структурные, процессные и результативные компоненты. Классическая модель А. Donabedian предусматривает оценку качества через три взаимосвязанных блока: структуру медицинской организации, процессы оказания помощи и конечные результаты лечения [4]. Такой подход сохраняет актуальность и в настоящее время, поскольку позволяет рассматривать качество медицинской помощи не изолированно, а как результат взаимодействия кадровых, технологических, организационных и управленческих факторов. В этой связи особое значение приобретают клинические протоколы, стандартизированные алгоритмы действий, чек-листы безопасности, клиничко-экспертный аудит и система регистрации инцидентов.

Всемирная организация здравоохранения в «Глобальном плане действий по обеспечению безопасности пациентов на 2021-2030 годы» подчёркивает необходимость перехода от фрагментарного контроля качества к системной политике предупреждения предотвратимого вреда в здравоохранении [5]. Ключевыми направлениями данного подхода являются формирование культуры безопасности, вовлечение руководства медицинских организаций, обучение персонала, развитие открытой системы сообщения об инцидентах, анализ причин нежелательных событий и использование полученных данных для непрерывного улучшения качества медицинской помощи [5,9-12]. Следовательно, современная система управления качеством должна быть не реактивной, а проактивной, то есть направленной на выявление и устранение рисков до развития клинически значимых дефектов.

Экономическое значение проблемы также является существенным. По данным OECD, прямые расходы, связанные с небезопасной медицинской помощью, в развитых странах могут приближаться к 13% общих расходов на здравоохранение, а совокупное глобальное экономическое бремя вреда, причиняемого пациентам, оценивается более чем в 1 трлн долларов США в год [8-12]. В другом аналитическом отчёте OECD отмечается, что значительная часть затрат медицинских организаций связана с устранением последствий предотвратимых дефектов, включая повторные обращения, осложнения, дополнительные диагностические и лечебные мероприятия [9]. Таким образом, внедрение эффективных организационно-управленческих механизмов контроля качества следует рассматривать не только как инструмент повышения безопасности пациентов, но и как фактор экономической устойчивости медицинской организации.

В Республике Узбекистан в последние годы реализуются последовательные реформы, направленные на повышение доступности, результативности и пациент-ориентированности медицинских услуг. Закон Республики Узбекистан «Об охране здоровья граждан» закрепляет право граждан на охрану здоровья и получение квалифицированной медицинской помощи, а также определяет полномочия государственных органов в сфере регулирования лечебно-профилактической деятельности [6-8,13-18]. На фоне реформирования здравоохранения, модернизации медицинской инфраструктуры и расширения спектра медицинских услуг возрастает роль частного сектора, который всё активнее участвует в оказании амбулаторной, стационарной, диагностической и специализированной помощи населению.

Развитие частных многопрофильных клиник создаёт новые возможности для повышения доступности медицинских услуг, внедрения современных технологий, улучшения сервиса и сокращения сроков диагностики и лечения. Вместе с тем расширение частного сектора одновременно предъявляет более высокие требования к внутренней системе контроля качества, безопасности пациентов, соблюдению клинических протоколов, полноте медицинской документации и ответственности медицинской организации за результаты оказания помощи. В условиях конкурентной среды качество медицинской помощи становится не только медицинским, но и репутационным, управленческим и социально-экономическим показателем деятельности частной клиники [6-8,13-18].

Качество медицинской помощи представляет собой комплексную характеристику, включающую своевременность, доступность, эффективность, безопасность, преемственность и удовлетворённость пациента. Безопасность медицинской помощи, в свою очередь, предполагает минимизацию риска предотвратимого вреда, связанного с диагностическими, лечебными, организационными, информационными и коммуникативными ошибками. В условиях многопрофильной клиники, где одновременно функционируют различные диагностические, лечебные, лабораторные, инструментальные и административные подразделения, управление качеством требует системного, стандартизированного и риск-ориентированного подхода [8].

Одной из наиболее значимых проблем частных медицинских организаций является неоднородность организационных процессов. На практике это может проявляться различиями в ведении медицинской документации, отсутствии единых чек-листов, нерегулярности клинико-экспертного аудита, недостаточной регистрации нежелательных событий, слабой обратной связи с пациентами и отсутствием единого алгоритма анализа дефектов медицинской помощи. При отсутствии устойчивой модели управления качеством данные факторы могут приводить к росту повторных обращений, увеличению числа обоснованных жалоб, снижению удовлетворённости пациентов и формированию скрытых системных рисков.

Современные подходы к управлению качеством в здравоохранении базируются на принципах стандартизации, непрерывного улучшения процессов, риск-менеджмента, внутреннего аудита, командного взаимодействия и вовлечения медицинского персонала. Важную роль играют клинические протоколы, алгоритмы принятия решений, чек-листы безопасности, регистрация инцидентов, анализ причин дефектов, обучение врачебного и среднего медицинского персонала, а также регулярная оценка удовлетворённости пациентов. Именно сочетание этих компонентов позволяет перейти от формального контроля к управлению качеством как непрерывному процессу предупреждения дефектов и повышения безопасности медицинской помощи [6-8,13,15].

В связи с этим разработка организационно-управленческой модели, адаптированной к условиям частных многопрофильных клиник Республики Узбекистан, является актуальной научно-практической задачей. Такая модель должна не только выявлять дефекты медицинской помощи, но и формировать механизм их предупреждения, анализа и системного устранения. Особое значение имеет оценка эффективности модели на основе объективных показателей: частоты дефектов медицинской помощи, количества обоснованных жалоб, качества медицинской документации, частоты повторных клинических ошибок и уровня удовлетворённости пациентов.

Таким образом, необходимость формирования системного, риск-ориентированного и практически применимого механизма управления качеством и безопасностью медицинской помощи в частном секторе здравоохранения определила **цель настоящего исследования** - разработать и оценить эффективность организационно-управленческой модели обеспечения качества и безопасности медицинской помощи в частных многопрофильных клиниках Республики Узбекистан.

Материалы и методы. Настоящее исследование выполнено в формате организационно-аналитического исследования с квазиэкспериментальным дизайном «до-после», что позволило оценить динамику ключевых показателей качества и безопасности медицинской помощи до и после внедрения разработанной организационно-управленческой модели. Исследование проведено на базе 4 частных многопрофильных клиник Республики Узбекистан в период 2023-2025 гг.

Объектом исследования являлась система организационных и клинико-управленческих процессов, направленных на обеспечение качества и безопасности медицинской помощи в условиях частной многопрофильной медицинской организации. Предметом исследования служили показатели, отражающие результативность внутреннего контроля качества: частота дефектов медицинской помощи, качество оформления медицинской документации, количество обоснованных жалоб, частота повторных обращений, повторные клинические ошибки, зарегистрированные инциденты и уровень удовлетворённости пациентов оказанными медицинскими услугами.

Информационную базу исследования составили результаты клинико-экспертного анализа медицинской документации, данные внутреннего аудита, сведения о повторных обращениях и зарегистрированных инцидентах, а также результаты анкетирования пациентов. Всего в исследование включены 2047 завершённых случаев оказания медицинской помощи, 1020 анкет пациентов, 52 случая повторных обращений, а также материалы клинико-экспертного аудита и внутренней системы регистрации дефектов медицинской помощи.

Критериями включения являлись: завершённый случай оказания медицинской помощи, наличие полной медицинской документации, возможность проведения экспертной оценки качества оказанной помощи, наличие данных о маршруте пациента и результатах лечения, а также добровольное

информированное согласие пациента на участие в анкетировании. Критериями исключения служили неполная или некорректно оформленная медицинская документация, отсутствие объективных данных для экспертной оценки, невозможность верификации исхода оказания медицинской помощи, некорректно заполненные анкеты, а также случаи, не подлежащие клинико-экспертному анализу.

На первом этапе исследования была проведена исходная оценка состояния системы внутреннего контроля качества и безопасности медицинской помощи. Анализировались полнота и корректность медицинской документации, соблюдение клинических протоколов, наличие дефектов диагностики и лечения, частота обоснованных жалоб, структура повторных обращений, а также уровень удовлетворённости пациентов. Полученные данные использовались для выявления наиболее значимых организационных рисков и определения направлений последующего управленческого вмешательства.

На втором этапе была разработана и внедрена риск-ориентированная организационно-управленческая модель обеспечения качества и безопасности медицинской помощи. Модель была направлена на стандартизацию клинических и административных процессов, повышение управляемости лечебно-диагностического маршрута пациента, предупреждение повторных дефектов и формирование системы постоянного мониторинга качества. В структуру модели были включены: комиссия по качеству и безопасности медицинской помощи, клинические протоколы и стандартные операционные процедуры, чек-листы на ключевых этапах диагностики и лечения, система регистрации и анализа медицинских инцидентов, регулярный клинико-экспертный аудит, обучение врачебного и среднего медицинского персонала, мониторинг удовлетворённости пациентов, обратная связь по результатам жалоб и повторных обращений, а также разработка корректирующих и предупреждающих мероприятий.

Особое внимание уделялось формированию замкнутого цикла управления качеством, включающего выявление дефекта, регистрацию инцидента, экспертный анализ причин, определение уровня риска, разработку корректирующих мероприятий, контроль их исполнения и последующую повторную оценку эффективности. Такой подход позволял рассматривать дефекты медицинской помощи не как изолированные события, а как проявления потенциальных системных нарушений в организации лечебно-диагностического процесса.

Оценка эффективности разработанной модели проводилась путём сравнительного анализа показателей до и после её внедрения. Основными критериями эффективности являлись частота дефектов медицинской помощи, количество обоснованных жалоб, качество оформления медицинской документации, частота повторных клинических ошибок и уровень удовлетворённости пациентов. Дополнительно анализировались структура выявленных дефектов, повторяемость инцидентов, полнота выполнения клинических протоколов и результаты внутреннего аудита.

Качество медицинской документации оценивали по совокупности признаков, включавших полноту анамнестических данных, обоснованность диагноза, корректность назначения диагностических и лечебных мероприятий, наличие информированного согласия, отражение динамики состояния пациента, своевременность записей, полноту эпикризов и соответствие документации установленным требованиям. Дефектами медицинской помощи считались случаи несоответствия лечебно-диагностического процесса утверждённым клиническим протоколам, стандартным операционным процедурам или общепринятым принципам безопасного оказания медицинской помощи.

Удовлетворённость пациентов оценивалась методом анкетирования с использованием стандартизированной шкалы, включавшей оценку доступности медицинской помощи, качества коммуникации с персоналом, информированности пациента, организации лечебно-диагностического процесса, условий пребывания и общей удовлетворённости оказанными услугами. Результаты анкетирования анализировались в виде средних значений с расчётом стандартного отклонения.

Статистическая обработка данных проводилась с применением методов описательной и аналитической статистики. Количественные показатели представлены в виде среднего значения и стандартного отклонения ($M \pm SD$), категориальные показатели - в виде абсолютных значений и долей. Для сравнения долей использовали χ^2 -критерий Пирсона, для сравнения количественных показателей - двусторонний t-критерий Стьюдента. Нормальность распределения проверяли с использованием критерия Шапиро-Уилка. Дополнительно рассчитывали относительный риск (RR), абсолютное снижение риска (ARR), относительное снижение риска (RRR), 95% доверительные интервалы (95% CI), а также размер эффекта Cohen's d.

Для определения факторов, ассоциированных с вероятностью возникновения дефектов медицинской помощи, был применён многофакторный логистический регрессионный анализ с расчётом отношения шансов (OR) и 95% доверительного интервала. В модель включались организационные и

клинические факторы, потенциально влияющие на качество оказания медицинской помощи: внедрение организационно-управленческой модели, наличие клинических протоколов, качество медицинской документации, обучение персонала и функционирование системы регистрации инцидентов. Статистически значимыми считали различия при $p < 0,05$.

Исследование выполнено с соблюдением этических принципов Хельсинкской декларации. Участие пациентов в анкетировании осуществлялось на основании добровольного информированного согласия. Все персональные данные были обезличены, а результаты исследования использовались исключительно в обобщённом виде.

Результаты и обсуждение. Анализ исходного состояния системы внутреннего контроля качества показал, что до внедрения организационно-управленческой модели в частных многопрофильных клиниках сохранялась относительно высокая частота дефектов медицинской помощи. По результатам клинико-экспертного аудита, дефекты были выявлены в 365 из 2047 проанализированных случаев, что составило 17,8%. После внедрения риск-ориентированной организационно-управленческой модели данный показатель снизился до 8,9%, или 182 случаев из 2047. Различия между исходным и последующим периодами были статистически значимыми ($\chi^2=48,6$; $p < 0,001$). Абсолютное снижение риска составило 8,9%, а относительное снижение риска - 50%, что свидетельствует о выраженном положительном влиянии внедрённой модели на качество лечебно-диагностического процесса (табл. 1, 2).

Полученные данные указывают, что системная стандартизация клинических и организационных процессов позволяет существенно уменьшить частоту дефектов медицинской помощи. Наиболее вероятными механизмами данного эффекта являются внедрение клинических протоколов, применение чек-листов, регулярный клинико-экспертный аудит, регистрация инцидентов и последующая разработка корректирующих мероприятий. В отличие от фрагментарного контроля, предложенная модель обеспечивала замкнутый цикл управления качеством: выявление дефекта, анализ его причин, определение уровня риска, внедрение корректирующих действий и повторную оценку результата.

Важным показателем эффективности модели являлась динамика обоснованных жалоб пациентов. До внедрения организационно-управленческих мероприятий частота обоснованных жалоб составляла 12,4%. После внедрения модели данный показатель снизился до 7,6%, что соответствовало уменьшению на 39%. Различия были статистически значимыми ($\chi^2=11,2$; $p=0,001$) (табл. 1, 2). Снижение числа жалоб отражает не только улучшение клинических процессов, но и повышение качества коммуникации между медицинским персоналом и пациентами, улучшение информирования, маршрутизации и организационного сопровождения пациентов.

Уровень удовлетворённости пациентов медицинской помощью также достоверно повысился. До внедрения модели средний показатель удовлетворённости составлял $4,2 \pm 0,6$ балла, тогда как после реализации комплекса организационно-управленческих мероприятий он увеличился до $4,8 \pm 0,3$ балла. Статистический анализ подтвердил достоверность выявленных различий ($t=9,7$; $p < 0,001$). Размер эффекта по Cohen's d составил 1,2, что свидетельствует о выраженной практической значимости полученного результата (табл. 1, 2). Следовательно, внедрение модели оказало влияние не только на формальные показатели внутреннего контроля, но и на субъективное восприятие качества медицинской помощи пациентами.

Одним из наиболее значимых результатов исследования стало повышение качества оформления медицинской документации. До внедрения модели соответствие документации установленным требованиям составляло 74%, после внедрения - 92%. Различия были статистически значимыми ($\chi^2=96,3$; $p < 0,001$) (табл. 1, 2). Улучшение касалось полноты анамнестических данных, корректности оформления назначений, наличия информированного согласия, отражения динамики состояния пациента, обоснованности диагноза и лечебной тактики. Данный результат имеет важное значение, поскольку медицинская документация является не только юридическим документом, но и инструментом обеспечения преемственности, безопасности и управляемости лечебно-диагностического процесса.

После внедрения организационно-управленческой модели частота повторных клинических ошибок снизилась на 34%. Относительный риск составил 0,66 при 95% доверительном интервале 0,52-0,84, что указывает на достоверное снижение вероятности повторных дефектов медицинской помощи (табл. 1, 2). Данный показатель отражает способность модели не только выявлять уже возникшие нарушения, но и предотвращать их повторение за счёт анализа причин, обучения персонала и внедрения корректирующих мероприятий.

Таблица 1.

Основные показатели качества медицинской помощи до и после внедрения модели

Показатель	До внедрения	После внедрения	Динамика	p
Дефекты медицинской помощи, %	17,8	8,9	-8,9	<0,001
Обоснованные жалобы, %	12,4	7,6	-4,8	0,001
Удовлетворённость пациентов, баллы	4,2±0,6	4,8±0,3	+0,6	<0,001
Качество медицинской документации, %	74	92	+18	<0,001
Повторные клинические ошибки	-	снижение на 34%	RR=0,66	<0,05

Таблица 2.

Статистическая оценка эффективности внедрения организационно-управленческой модели

Показатель	Статистический критерий	p	Эффект
Дефекты медицинской помощи	$\chi^2=48,6$	<0,001	-50%
Обоснованные жалобы	$\chi^2=11,2$	0,001	-39%
Удовлетворённость пациентов	t=9,7	<0,001	d=1,2
Качество документации	$\chi^2=96,3$	<0,001	+18%
Повторные клинические ошибки	RR=0,66	<0,05	-34%

Для определения факторов, ассоциированных со снижением вероятности дефектов медицинской помощи, был проведён многофакторный логистический регрессионный анализ. В модель были включены организационные факторы, отражающие основные элементы внедрённой системы управления качеством: наличие организационно-управленческой модели, применение клинических протоколов, качество медицинской документации, обучение персонала и функционирование системы регистрации инцидентов (табл. 3).

Таблица 3.

Факторы, влияющие на вероятность дефектов медицинской помощи

Фактор	OR	95% CI	p
Внедрение организационно-управленческой модели	0,42	0,32-0,56	<0,001
Наличие клинических протоколов	0,58	0,44-0,77	<0,001
Улучшение качества медицинской документации	0,49	0,36-0,66	<0,001
Обучение медицинского персонала	0,63	0,48-0,83	0,002
Отсутствие регистрации инцидентов	1,74	1,28-2,36	<0,001

Результаты регрессионного анализа показали, что внедрение организационно-управленческой модели являлось самостоятельным фактором снижения вероятности дефектов медицинской помощи. Значение OR=0,42 при 95% CI: 0,32-0,56 указывает на то, что после внедрения модели вероятность возникновения дефектов снижалась более чем в 2 раза (табл. 3). Это подтверждает системный характер влияния предложенной модели на качество оказания медицинской помощи.

Наличие клинических протоколов также ассоциировалось со снижением вероятности дефектов медицинской помощи (OR=0,58; 95% CI: 0,44-0,77; p<0,001) (табл. 3). Данный результат подчёркивает значение стандартизации лечебно-диагностического процесса, поскольку протоколы уменьшают вариабельность клинических решений, повышают воспроизводимость медицинской помощи и позволяют объективизировать внутренний контроль качества.

Улучшение качества медицинской документации являлось ещё одним значимым защитным фактором (OR=0,49; 95% CI: 0,36-0,66; p<0,001) (табл. 3). Это свидетельствует о том, что корректное и полное документирование медицинского процесса связано не только с юридической безопасностью медицинской организации, но и с повышением клинической преемственности, снижением вероятности диагностических и лечебных ошибок, а также улучшением экспертной оценки качества оказанной помощи.

Регулярное обучение медицинского персонала также достоверно снижало вероятность дефектов медицинской помощи (OR=0,63; 95% CI: 0,48-0,83; p=0,002) (табл. 3). Данный результат подтверждает, что повышение профессиональной и организационной компетентности врачебного и

среднего медицинского персонала является важным компонентом системы безопасности пациентов. Обучение способствовало лучшему пониманию клинических протоколов, принципов регистрации инцидентов, правильного ведения документации и алгоритмов взаимодействия между подразделениями.

Напротив, отсутствие системы регистрации инцидентов было связано с повышением вероятности дефектов медицинской помощи ($OR=1,74$; 95% CI: 1,28-2,36; $p<0,001$) (табл. 3). Это показывает, что нерегистрируемые инциденты и дефекты остаются вне зоны управленческого анализа, вследствие чего сохраняется риск их повторения. Следовательно, система регистрации инцидентов должна рассматриваться как один из базовых элементов управления качеством, поскольку она обеспечивает накопление данных, выявление повторяющихся причин и разработку профилактических мероприятий. В целом результаты исследования свидетельствуют о том, что эффективность разработанной организационно-управленческой модели обусловлена её комплексным характером. Положительная динамика показателей была достигнута не за счёт одного отдельного мероприятия, а вследствие одновременного внедрения нескольких взаимосвязанных компонентов: стандартизации клинических процессов, клинико-экспертного аудита, регистрации инцидентов, обучения персонала, улучшения документации и мониторинга удовлетворённости пациентов.

С практической точки зрения полученные результаты подтверждают целесообразность внедрения риск-ориентированного подхода в частных многопрофильных клиниках. Такая модель позволяет повысить прозрачность процессов, снизить частоту повторных ошибок, улучшить взаимодействие между подразделениями и сформировать устойчивую культуру безопасности пациентов. Особенно важно, что модель ориентирована не только на выявление дефектов, но и на их предупреждение, что соответствует современным принципам управления качеством в здравоохранении.

Таким образом, внедрение организационно-управленческой модели обеспечения качества и безопасности медицинской помощи в частных многопрофильных клиниках Республики Узбекистан сопровождалось достоверным улучшением всех ключевых анализируемых показателей. Полученные данные позволяют рассматривать предложенную модель как эффективный инструмент повышения качества медицинской помощи, снижения организационных рисков и укрепления пациент-ориентированного подхода в частном секторе здравоохранения.

Заключение. Проведённое исследование показало, что разработанная организационно-управленческая модель обеспечения качества и безопасности медицинской помощи является эффективным инструментом оптимизации деятельности частных многопрофильных клиник Республики Узбекистан. Полученные результаты свидетельствуют о том, что внедрение риск-ориентированного подхода, основанного на стандартизации клинических процессов, систематическом аудите, регистрации инцидентов и обучении персонала, позволяет существенно повысить управляемость лечебно-диагностического процесса и снизить вероятность дефектов медицинской помощи.

После внедрения модели отмечено достоверное улучшение ключевых показателей качества и безопасности медицинской помощи. Частота дефектов медицинской помощи снизилась с 17,8% до 8,9%, количество обоснованных жалоб уменьшилось с 12,4% до 7,6%, удовлетворённость пациентов повысилась с $4,2\pm 0,6$ до $4,8\pm 0,3$ балла, а качество медицинской документации улучшилось с 74% до 92%. Дополнительно установлено снижение частоты повторных клинических ошибок на 34%, что подтверждает профилактическую направленность предложенной модели и её способность предупреждать повторение ранее выявленных нарушений.

Ключевыми факторами эффективности модели являлись внедрение клинических протоколов и чек-листов, регулярное проведение клинико-экспертного аудита, функционирование системы регистрации и анализа инцидентов, повышение качества медицинской документации, обучение врачебного и среднего медицинского персонала, а также мониторинг удовлетворённости пациентов. Комплексное сочетание указанных компонентов обеспечило переход от фрагментарного контроля к системному управлению качеством и безопасностью медицинской помощи.

Таким образом, предложенная организационно-управленческая модель может быть рекомендована для поэтапного внедрения и масштабирования в частных медицинских организациях Республики Узбекистан в качестве эффективного механизма повышения качества медицинской помощи, снижения организационных рисков, предупреждения клинических ошибок и укрепления пациент-ориентированного подхода.

Выводы:

1. Разработанная организационно-управленческая модель обеспечивает системный, риск-ориентированный подход к контролю качества и безопасности медицинской помощи в частных многопрофильных клиниках.

2. Внедрение модели сопровождалось достоверным снижением частоты дефектов медицинской помощи с 17,8% до 8,9%, что соответствует относительному снижению риска на 50%.
3. Применение клинических протоколов, чек-листов и регулярного клинико-экспертного аудита способствовало улучшению качества медицинской документации с 74% до 92%.
4. Система регистрации и анализа инцидентов, в сочетании с разработкой корректирующих мероприятий, позволила снизить частоту повторных клинических ошибок на 34%.
5. Повышение удовлетворённости пациентов с $4,2 \pm 0,6$ до $4,8 \pm 0,3$ балла подтверждает практическую значимость внедрённой модели и её положительное влияние на пациент-ориентированность медицинской помощи.
6. Разработанная модель может быть рекомендована для внедрения и масштабирования в частных медицинских организациях Республики Узбекистан как эффективный инструмент повышения качества медицинской помощи и безопасности пациентов.

Список литературы:

1. World Health Organization. Patient Safety. Geneva: WHO; 2023.
2. World Health Organization. Quality health services. Geneva: WHO; 2020.
3. Institute of Medicine. Crossing the Quality Chasm: A New Health System for the 21st Century. Washington: National Academies Press; 2001.
4. Donabedian A. The quality of care: how can it be assessed? JAMA. 1988;260(12):1743-1748.
5. World Health Organization. Global Patient Safety Action Plan 2021-2030: Towards Eliminating Avoidable Harm in Health Care. Geneva: WHO; 2021.
6. Закон Республики Узбекистан «Об охране здоровья граждан» № 265-I от 29.08.1996.
7. Приказ Министерства здравоохранения Республики Узбекистан от 18.03.2024 г. №-84. О Разработке и совершенствовании клинических протоколов и стандартов по дальнейшему развитию деятельности
8. Гарантированный пакет медицинской помощи (Постановление Президента от 05.09.2024 г. № ПП-311)
9. Slawomirski L., Klazinga N. The Economics of Patient Safety: From Analysis to Action. Paris: OECD Publishing; 2022.
10. OECD. The Economics of Patient Safety: Strengthening a Value-based Approach to Reducing Patient Harm at National Level. Paris: OECD Publishing; 2017.
11. Hussein M. et al. The impact of hospital accreditation on the quality of healthcare: a systematic literature review //BMC health services research. – 2021. – Т. 21. – №. 1. – С. 1057.
12. Mosadeghrad A. M. Hospital accreditation: The good, the bad, and the ugly //International Journal of Healthcare Management. – 2021. – Т. 14. – №. 4. – С. 1597-1601.
13. Кадырбекова И. Б. Управление качеством медицинской помощи //Проблемы устойчивого развития в отраслевом и региональном аспекте. – 2020. – С. 222-226.
14. Узбекистан П.П.Р. О мерах по организации деятельности Министерства здравоохранения Республики Узбекистан //Национальная база данных законодательства. – 2018. – №. 07/18. – С. 4055.
15. Назарматов О. С. Управление системой здравоохранения в Узбекистане //Экономика и социум. – 2024. – №. 11-1 (126). – С. 1266-1270.
16. Асадов Д. А., Хакимов В. А. Особенности реформирования системы здравоохранения Узбекистана //Innova. – 2022. – №. 2 (27). – С. 11-16.
17. Назаров Н. Н., Тухтабоев Б. М. Проблемы управления и развития частной медицинской клиники: выбор добросовестных специалистов, этика рекламы и вовлечение пациентов //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2025. – Т. 4. – №. 6. – С. 27-30.
18. Marat T. Мировые модели финансирования здравоохранения: возможности и вызовы для адаптации в Узбекистане //Modern education and development. – 2026. – Т. 47. – №. 6. – С. 213-219.

Для цитирования: Акилов Х.А., Исламов М.Т., Мардонов Ж.Н. Организационно-управленческая модель обеспечения качества и безопасности медицинской помощи в частных многопрофильных клиниках Республики Узбекистан // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 4(24). – С. 1000–1008. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19910307>

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ОСТРОГО ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА С У РЕБЁНКА ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ ЖИЗНИ**Аладова Л.Ю., Раимкулова Д.Ф., Бегматов Б.Х., Шукуров Б.В.**

Ташкентский государственный медицинский университет, г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. Острый вирусный гепатит С у детей раннего возраста часто протекает без желтухи и выраженных симптомов, что затрудняет раннюю диагностику. Представлен клинический случай неиктерической формы ОВГС у ребёнка 6 месяцев, рождённого от матери с хроническим гепатитом С. Описаны клиническое течение, результаты обследований и тактика ведения. Несмотря на положительную клинико-биохимическую динамику, заболевание перешло в хроническую форму. Случай подчёркивает необходимость регулярного скрининга и динамического наблюдения детей из группы риска.

Ключевые слова: Дети, острый вирусный гепатит С, ПЦР, диагностика.

A CLINICAL CASE OF ACUTE VIRAL HEPATITIS C IN A CHILD IN THE FIRST HALF OF LIFE**Aladova L.Yu., Raimkulova D.F., Begmatov B.Kh., Shukurov B.V.**

Tashkent State Medical University, Tashkent, Uzbekistan

Resume. Acute hepatitis C in infants often presents without jaundice and with mild symptoms, complicating early diagnosis. This article reports a case of acute non-icteric hepatitis C in a 6-month-old infant born to a mother with chronic hepatitis C. The clinical course, diagnostic findings, and management approach are described. Despite favorable clinical and biochemical dynamics, the infection progressed to chronic hepatitis C. This case emphasizes the importance of regular screening and follow-up of children at high risk of hepatitis C infection.

Keywords: children, acute viral hepatitis C, PCR, diagnosis.

ЯРИМ ЯШАР БОЛАДА ЎТКИР ВИРУСЛИ С ГЕПАТИТИНИНГ КЛИНИК ҲОЛАТИ**Аладова Л.Ю., Раимкулова Д.Ф., Бегматов Б.Х., Шукуров Б.В.**

Тошкент давлат тиббиёт университети, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. Болаларда, айниқса эрта ёшда, ўткир вирусли гепатит С кўпинча сариқликсиз ва кам ифодаланган белгилар билан кечади. Мақолада сурункали гепатит С билан касалланган онадан тузилган 6 ойлик болада аниқланган сариқликсиз ОВГС ҳолати тасвирланган. Касаллик кечииши, текширув натижалари ва даволаш тактикаси келтирилган. Ижобий клиник ва биокимёвий динамикага қарамай, касаллик сурункали шаклга ўтган. Ушбу ҳолат хавф гуруҳидаги болаларни мунтазам скрининг ва кузатувдан ўтказиш муҳимлигини кўрсатади.

Калим сўзлар: болалар, ўткир вирусли гепатит С, ПЗР, диагностика.

e-mail: lydmila20@list.ru,

Введение. Острый вирусный гепатит С (ОВГС) является серьёзным инфекционным заболеванием, поражающим печень. Заболевание может протекать как в желтушной, так и без желтушной формы, что затрудняет его диагностику особенно трудно распознавать ОВГС у детей раннего возраста, поскольку симптомы могут быть неспецифичными или слабо выраженными [1, 3].

Цель исследования: проанализировать особенности клинического течения, диагностики и исхода острого вирусного гепатита С без желтушной формы у ребёнка первого года жизни.

Материалы и методы исследования. Исследование выполнено в виде описания клинического случая. Использованы клинико-анамнестические, лабораторные и инструментальные методы обследования. Проведён анализ анамнестических данных, результатов физикального осмотра, общеклинических и биохимических показателей крови. Для верификации диагноза применялись серологические и молекулярно-биологические методы исследования, включая качественную и количественную полимеразную цепную реакцию (ПЦР) на РНК вируса гепатита С, а также иммунологические маркеры (Core и NS регионы). Инструментальные методы включали ультразвуковое исследование органов

брюшной полости. Оценка динамики состояния пациента проводилась на основании клинического наблюдения и повторных лабораторных исследований в течение 6 месяцев.

Рассмотрим клинический случай острого гепатита С без желтушной формы у ребёнка 6 месяцев.

Анамнез. Ребёнок, девочка 6 месяцев, родилась доношенная от матери с хроническим гепатитом С, 1 б генотип. Беременность протекала без осложнений. На протяжении первых шести месяцев жизни ребёнок развивалась нормально, жалоб со стороны матери не было. С рождения у ребенка был диагностирован врожденный порок сердца (ВПС), дефект межжелудочковой перегородки (ДМЖП). На шестом месяце у ребёнка появились симптомы, такие как слабость, вялость, кратковременное повышение температуры до $37,5^{\circ}\text{C}$, ухудшение аппетита, что стало поводом для обращения к инфекционисту. Со стороны желудочно-кишечного тракта были отмечены незначительные диспепсические явления (неустойчивый стул).

Клиническое обследование. При осмотре ребёнка инфекционистом не было выявлено видимых признаков желтухи, но при этом отмечалось увеличение печени и селезенки. Общее состояние при поступлении средней степени тяжести, девочка вялая, адинамичная, аппетита нет, беспокоит тошнота и периодические боли в животе, Т тела $36,7^{\circ}\text{C}$. Кожные покровы оставались нормальными, однако наблюдалась лёгкая бледность, сыпи и геморрагий нет. Периферические лимфоузлы не увеличены. В легких везикулярное дыхание, хрипов нет. Сердце: тоны приглушены, ритмичные, выслушивается грубый систолический шум, слева. Ps 140 уд. в мин. Живот мягкий, болезненный в правом подреберье. Печень увеличена на $+2,0+2,0+2,5$ см выступает из-под края реберной дуги, край заострен, чувствителен. Селезёнка увеличена $+1,5$ см. Стул неустойчивый, кашицеобразный, обычной окраски. Диурез в норме, моча светлая. Менингеальных симптомов нет. КМС: Большой родничок $1,5 \times 1,5$ см, не выбухает.

Лабораторные исследования. Основное внимание привлекли лабораторные данные. Общий анализ крови показал выраженные отклонения: уровень гемоглобина 89 г/л ($120-160$ г/л); ц/п 0,7 ($0,85-1,05$); эритроциты $3,7 \times 10^{12}$ ($3,8-5,1 \times 10^{12}$ /л); отмечалось умеренное увеличение уровня лейкоцитов $9,5 \times 10^9$ ($4,0-9,0 \times 10^9$ /л); тромбоциты 224×10^9 /л ($150-400 \times 10^9$ /л); п/я 2 % ($1-6$ %); с/я 52% ($47-72$ %); эозинофиллы 4% ($0-5$ %); моноциты 4% ($3-11$ %); лимфоциты 38% ($19-37$ %); СОЭ 4 мм/ч ($2-15$ мм/ч). Биохимический анализ крови выявил повышение уровня аланинаминотрансферазы (АЛТ) до 180 МЕ/л (до $35-40$ МЕ/л) и аспартатаминотрансферазы (АСТ) до 160 МЕ/л (до $35-40$ МЕ/л), что свидетельствовало о повреждении клеток печени. Уровни билирубина оставались в пределах нормы. Серологические исследования методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) подтвердили наличие РНК вируса гепатита С (ВГС), что указывало на активную фазу инфекции. Также были проведены иммунологические исследования в научно-исследовательском институте иммунологии, где были выявлены следующие показатели: ПЦР количественный $4,3 \text{ E}+04 \text{ ME}^* \text{ HCV/Мл}$. ПЦР качественный (+) положительный, Core регион 2,576 (+) положительный, NS регион 2,487 (+) положительный, что свидетельствует о острой фазе инфекции. УЗИ печени и селезенки: Эхо признаки реактивных изменений в печени. Умеренная гепато и спленомегалия [6].

Диагноз. На основании клинических данных и результатов лабораторных и инструментальных исследований был поставлен диагноз основной: Острый вирусный гепатит С, без желтушной форма, средней активности.

Осложненный: Спленомегалия. Сопутствующий: ВПС, ДМЖП. Анемия 2 степени. Рахит 1 степени. По МКБ 10 В 17.1.

Лечение и ведение. Ввиду возраста ребёнка и отсутствия значимых клинических симптомов, было принято решение о наблюдательной тактике. Поскольку острый гепатит С у детей в большинстве случаев имеет благоприятный исход, специфическая противовирусная терапия в данном случае не назначалась [2]. Ребёнку была рекомендована поддерживающая терапия, включающая диету стол № 5 для матери (поскольку ребёнок находился на грудном вскармливании) с дальнейшим добавлением адаптированных смесей с повышенным содержанием железа и витаминов. При выписке больной было рекомендовано патогенетическая терапия: Средства для коррекции анемии (препараты железа). Витамин D для уменьшения продолжения прогрессирования рахита. Симптоматическая терапия: Гепатопротекторы для поддержки функции печени [2]. Средства для поддержания нормальной сердечной функции в условиях ДМЖП решение вопроса о хирургической коррекции (ВПС) [4,5]. Регулярные осмотры у педиатра и инфекциониста для контроля за состоянием печени.

Динамика и прогноз. На фоне регулярного наблюдения состояние ребёнка улучшилось. Уровни АЛТ и АСТ постепенно снижались в течение трёх месяцев после начала наблюдения, достигнув нормы к шестому месяцу. Симптомы заболевания исчезли, аппетит и активность ребёнка восстано-

вились. Через 6 месяцев после выявления болезни повторный анализ ПЦР на ВГС показал положительный результат, что свидетельствовало о переходе в хроническую стадию гепатита С.

Результаты исследования: в ходе обследования у ребёнка 6 месяцев с отягощённым перинатальным анамнезом по HCV-инфекции выявлено течение острого вирусного гепатита С без желтушной формы. Клиническая картина характеризовалась преобладанием обще интоксикационного синдрома и умеренных диспепсических проявлений при отсутствии видимой желтухи.

Основным диагностическим критерием явилось значительное повышение трансаминаз при нормальных показателях билирубина, а также выявление РНК ВГС методом ПЦР с подтверждением острой фазы инфекции по иммунологическим маркерам. Инструментально отмечались признаки умеренной гепато- и спленомегалии.

На фоне наблюдательной и патогенетической терапии отмечена положительная клинико-биохимическая динамика с нормализацией показателей АЛТ и АСТ. Однако сохранение виремии через 6 месяцев свидетельствовало о переходе заболевания в хроническую форму.

Заключение. Острый вирусный гепатит С без желтушной формы у детей может протекать с минимальной симптоматикой, что затрудняет его диагностику на ранних стадиях. В данном случае раннее выявление заболевания было возможным благодаря внимательному мониторингу ребёнка, рожденного от матери с хронической ВГС-инфекцией. Этот случай подчёркивает важность регулярного обследования детей из групп риска, поскольку своевременная диагностика и наблюдение могут предотвратить развитие осложнений и хронического гепатита. Прогноз при данном клиническом случае сложный, так как вирус гепатита С перешёл в хроническую форму, что требует регулярного наблюдения и контроля биохимических и иммунологических показателей [1]. Важным аспектом является контроль за состоянием сердечно-сосудистой системы в связи с врожденным пороком сердца [4,5]. Также необходима коррекция уровня гемоглобина и лечение рахита.

Список литературы:

1. Болгов А.С., Золотухина Е.В. Иммунная система и гепатиты у детей: - Особенности иммунного ответа при вирусных гепатитах у детей» // Российский журнал иммунологии, 2017.
2. Машарова М.Н. Современные подходы к лечению и диагностике вирусного гепатита С у детей» // Педиатрия, 2020.
3. Насонова В.А., Артемьева Е.И. Острый вирусный гепатит С у детей: - Клинические особенности и диагностика вирусного гепатита С у детей» // Российский журнал инфекционных болезней, 2019.
4. Федорова М.С., Лебедева Т.В. Осложнения гепатита у детей с врожденными пороками сердца: - Коморбидность врождённых пороков сердца и вирусных гепатитов у детей» // Российский журнал педиатрии, 2020.
5. Школьник Э.М., Попов Л.А. Врожденный порок сердца: Дефект межжелудочковой перегородки (ДМЖП): - Современные подходы к лечению врождённых пороков сердца у новорождённых» // Кардиология, 2021.
6. Wright G., Murphy N. Splenomegaly in Children: A Diagnostic Approach // Pediatrics, 2015.

Для цитирования: Аладова Л.Ю., Раимкулова Д.Ф., Бегматов Б.Х., Шукуров Б.В. Клинический случай острого вирусного гепатита С у ребёнка первого полугодия жизни // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 4(24). – С. 1009–1011. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19910718>

ИММУННЫЕ БИОМАРКЕРЫ И ЦИТОКИНОВЫЕ СЕТИ КАК ПРЕДИКТОРЫ ПРОГРЕССИРОВАНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ**Бекмурадова М.С., Хайдаров С.Н.**

Самаркандский государственный медицинский университет, г.Самарканд, Узбекистан

Резюме. Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) является одним из наиболее распространенных сердечно-сосудистых синдромов, характеризующихся высокой заболеваемостью и смертностью. В последние годы всё большее внимание уделяется роли иммунологических механизмов и воспалительных процессов в патогенезе заболевания. Целью настоящего исследования явилось изучение уровней провоспалительных цитокинов у пациентов с ХСН и оценка их взаимосвязи с тяжестью заболевания. В исследование были включены 120 участников: 80 пациентов с ХСН и 40 здоровых добровольцев. Определялись уровни основных провоспалительных цитокинов в сыворотке крови. Полученные результаты показали значительное повышение концентраций $TNF-\alpha$, $IL-1\beta$ и $IL-6$ у пациентов с ХСН по сравнению с контрольной группой. Уровни цитокинов также коррелировали с функциональным классом заболевания по классификации NYHA. Данные результаты подтверждают важную роль воспалительных механизмов в прогрессировании ХСН и свидетельствуют о перспективности использования цитокинов в качестве биомаркеров прогноза заболевания.

Ключевые слова: хроническая сердечная недостаточность, цитокины, воспаление, иммунные биомаркеры, $TNF-\alpha$, $IL-6$.

IMMUNE BIOMARKERS AND CYTOKINE NETWORKS AS PREDICTORS OF THE PROGRESSION OF CHRONIC HEART FAILURE**Bekmuradova M.S., Khaydarov S.N.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Chronic heart failure (CHF) is one of the most common cardiovascular syndromes, characterized by high morbidity and mortality. In recent years, increasing attention has been paid to the role of immunological mechanisms and inflammatory processes in the pathogenesis of this disease. The aim of the present study was to investigate the levels of pro-inflammatory cytokines in patients with CHF and to assess their relationship with disease severity. The study included 120 participants: 80 patients with CHF and 40 healthy volunteers. The levels of major pro-inflammatory cytokines in blood serum were determined. The obtained results demonstrated a significant increase in the concentrations of $TNF-\alpha$, $IL-1\beta$, and $IL-6$ in patients with CHF compared to the control group. Cytokine levels also correlated with the functional class of the disease according to the NYHA classification. These findings confirm the important role of inflammatory mechanisms in the progression of CHF and indicate the potential of using cytokines as prognostic biomarkers of the disease.

Key words: chronic heart failure, cytokines, inflammation, immune biomarkers, $TNF-\alpha$, $IL-6$.

ИММУН БИОМАРКЕРЛАР ВА ЦИТОКИН ТАРМОҚЛАРИНИНГ СУРУНКАЛИ ЮРАК ЕТИШМОВЧИЛИГИ РИВОЖЛАНИШИДА БАШОРАТ ҚИЛУВЧИ ОМИЛЛАР СИФАТИДА ҚЎЛЛАНИЛИШИ**Бекмурадова М.С., Хайдаров С.Н.**

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Сурункали юрак етишмовчилиги (СЮЕ) энг кенг тарқалган юрак-қон томир синдромларидан бири бўлиб, юқори касалланиш ва ўлим кўрсаткичлари билан тавсифланади. Сўнгги йилларда касаллик патогенезида иммунологик механизмлар ва яллигланиш жараёнларининг роли тобора кўпроқ эътибор қозонмоқда. Мазкур тадқиқотнинг мақсади СЮЕ билан оғриган беморларда прояллизланиш ситокинлари даражасини ўрганиш ва уларнинг касаллик оғирлиги билан ўзаро боғлиқлигини баҳолашдан иборат бўлди. Тадқиқотга 120 нафар иштирокчи киритилди: 80 нафар СЮЕ билан оғриган бемор ва 40 нафар соғлом кўнгилли. Қон зардобиди асосий прояллизланиш ситокинлари даражалари аниқланди. Олинган натижалар СЮЕ билан оғриган беморларда $TNF-\alpha$, $IL-1\beta$ ва $IL-6$ концентрациялари назорат гуруҳига нисбатан сезиларли даражада ошганини кўрсатди. Ситокинлар даражаси, шунингдек, NYHA таснифи бўйича касалликнинг функционал синфи билан ҳам корреляция қилди. Ушбу натижалар СЮЕ ривожланишида яллигланиш

механизмларининг муҳим ролини тасдиқлайди ҳамда цитокинларни касаллик прогнозининг биомаркерлари сифатида қўллаш истиқболли эканлигини кўрсатади.

Калит сўзлар: сурункали юрак етишимовчилиги, цитокинлар, яллиғланиш, иммун биомаркерлар, TNF- α , IL-6.

e-mail: bekmuradova.maxsuda84@gmail.com

Введение. Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) - представляет собой сложный клинический синдром, возникающий вследствие структурных или функциональных нарушений сердца, приводящих к снижению его насосной функции. Несмотря на значительный прогресс в диагностике и лечении сердечно-сосудистых заболеваний, ХСН остаётся одной из ведущих причин госпитализации и смертности во всём мире [12,17]. В последние десятилетия стало очевидно, что развитие и прогрессирование сердечной недостаточности связано не только с гемодинамическими нарушениями и нейрогормональной активацией, но и с хроническим системным воспалением. Активация иммунной системы сопровождается повышением уровня провоспалительных цитокинов, которые оказывают неблагоприятное влияние на функцию миокарда [2,12].

Цитокины представляют собой небольшие сигнальные молекулы, регулирующие межклеточное взаимодействие и иммунный ответ. Среди наиболее важных провоспалительных цитокинов при ХСН выделяют фактор некроза опухоли- α (TNF- α), интерлейкин-1 β (IL-1 β) и интерлейкин-6 (IL-6). Эти медиаторы способны вызывать снижение сократительной способности кардиомиоцитов, стимулировать апоптоз клеток и способствовать развитию фиброза миокарда. Кроме того, увеличение уровня провоспалительных цитокинов ассоциировано с ухудшением клинического состояния пациентов и более неблагоприятным прогнозом. Изучение цитокиновых сетей и иммунных биомаркеров может способствовать лучшему пониманию патогенеза заболевания и улучшению диагностики и лечения ХСН [5,18,24].

Целью настоящего исследования явилось изучение уровней провоспалительных цитокинов у пациентов с хронической сердечной недостаточностью и оценка их связи с тяжестью заболевания.

Материалы и методы. В исследование были включены 120 человек. Основную группу составили 80 пациентов с хронической сердечной недостаточностью, находившихся на обследовании и лечении в кардиологическом отделении. Контрольную группу составили 40 практически здоровых добровольцев без признаков сердечно-сосудистой патологии. Диагноз ХСН устанавливался на основании клинических рекомендаций, с учётом жалоб, анамнеза заболевания, результатов физикального обследования и инструментальных методов диагностики. Тяжесть сердечной недостаточности оценивалась согласно функциональной классификации NYHA. Всем участникам проводилось эхокардиографическое исследование для оценки фракции выброса левого желудочка. Для определения уровней цитокинов производился забор венозной крови с последующим исследованием сыворотки методом иммуноферментного анализа. Определялись концентрации следующих цитокинов: TNF- α , IL-1 β , IL-6.

Статистическая обработка данных проводилась с использованием стандартных методов вариационной статистики. Количественные показатели представлены в виде среднего значения и стандартного отклонения ($M \pm SD$). Статистически значимыми считались различия при $p < 0,05$.

Результаты исследования. Всего в исследование было включено 120 человек: 80 пациентов с хронической сердечной недостаточностью и 40 здоровых добровольцев. При эхокардиографическом исследовании было установлено, что фракция выброса левого желудочка у пациентов с ХСН составила $38,2 \pm 6,5$ %, тогда как в контрольной группе данный показатель достигал $61,4 \pm 5,3$ %. Различия между группами были статистически значимыми ($p < 0,001$).

Анализ распределения пациентов по функциональным классам показал, что большинство обследованных относилось ко II и III функциональному классу по NYHA. Доля пациентов со II ФК составила 42,5 %, с III ФК — 35,0 %. Остальные пациенты относились к I и IV функциональным классам.

Анализ концентраций провоспалительных цитокинов продемонстрировал значительные различия между пациентами с ХСН и контрольной группой. У пациентов с хронической сердечной недостаточностью были выявлены существенно более высокие уровни следующих цитокинов (Таблица 1).

Таким образом, концентрации всех исследованных провоспалительных цитокинов были значительно выше у пациентов с хронической сердечной недостаточностью.

Таблица 1.

Провоспалительные цитокины	Пациенты с ХСН	Контрольная группа (здоровые лица)	Статистическое значение
TNF-α	18,4 $\pm$ 4,6 пг/мл	7,2 $\pm$ 2,1 пг/мл	p < 0,001
IL-1β	11,3 $\pm$ 3,2 пг/мл	4,5 $\pm$ 1,4 пг/мл	p < 0,001
IL-6	22,7 $\pm$ 6,8 пг/мл	8,9 $\pm$ 2,7 пг/мл	p < 0,001

Примечание: * - существует значительная разница между группами 1 и 2;

- p>0,05 - разницы нет;

** - существует разница между группами (p>0,01);

*** - существует разница между группами (p>0,001).

У пациентов с хронической сердечной недостаточностью наблюдается повышение уровня провоспалительных цитокинов и биомаркеров воспаления. Основные цитокины и их клиническое значение представлены в таблице 2.

Таблица 2.

Цитокины и биомаркеры при хронической сердечной недостаточности

Биомаркер / цитокин	Основная функция	Изменения при ХСН	Клиническое значение
TNF-α (фактор некроза опухоли-α)	Провоспалительный цитокин, активирует иммунный ответ и апоптоз клеток	Повышен	Связан со снижением сократительной функции миокарда и прогрессированием ХСН
IL-1β (интерлейкин-1β)	Стимулирует воспаление, активирует эндотелиальные клетки и макрофаги	Повышен	Ассоциирован с повреждением кардиомиоцитов и ремоделированием миокарда
IL-6 (интерлейкин-6)	Регуляция иммунного ответа и воспаления	Значительно повышен	Прогностический маркер тяжести ХСН и риска неблагоприятного исхода
IL-10	Противовоспалительный цитокин	Снижен или дисбаланс	Ограничивает воспалительную реакцию
CRP (С-реактивный белок)	Белок острой фазы воспаления	Повышен	Маркер системного воспаления и риска сердечно-сосудистых осложнений
NT-proBNP	Маркер перегрузки и растяжения миокарда	Повышен	Основной диагностический и прогностический биомаркер ХСН

Дополнительный анализ показал, что уровни цитокинов увеличивались по мере нарастания тяжести сердечной недостаточности. У пациентов с более высоким функциональным классом по NYHA отмечались более высокие концентрации TNF- α , IL-1 β и IL-6. Данная тенденция свидетельствует о том, что усиление воспалительного ответа может играть важную роль в прогрессировании заболевания. Повышенные уровни цитокинов отражают активность патологических процессов в миокарде и могут служить индикатором тяжести клинического состояния.

Обсуждение. Полученные результаты подтверждают важную роль воспалительных механизмов в патогенезе хронической сердечной недостаточности. Значительное повышение уровней провоспалительных цитокинов у пациентов с ХСН свидетельствует об активации иммунной системы и развитии системного воспалительного ответа.

TNF- α является одним из ключевых медиаторов воспаления и способен оказывать выраженное негативное влияние на сократительную функцию миокарда. Этот цитокин снижает чувствительность

кардиомиоцитов к кальцию, способствует развитию апоптоза клеток и стимулирует процессы фиброза.

Интерлейкин-1 β также участвует в регуляции воспалительных процессов и может способствовать повреждению сердечной ткани. Повышение уровня данного цитокина ассоциировано с ухудшением клинического состояния пациентов и прогрессированием сердечной недостаточности.

Интерлейкин-6 играет важную роль в формировании системного воспалительного ответа. Повышенные концентрации IL-6 часто наблюдаются у пациентов с тяжёлой сердечной недостаточностью и могут служить прогностическим маркером неблагоприятного исхода заболевания.

Выявленная в исследовании связь между уровнем цитокинов и функциональным классом заболевания подтверждает предположение о том, что воспалительная активация является важным фактором прогрессирования ХСН. Полученные данные согласуются с результатами многих международных исследований, в которых также отмечается повышение уровней провоспалительных цитокинов у пациентов с сердечной недостаточностью.

Заключение:

1. Результаты проведённого исследования показали, что у пациентов с хронической сердечной недостаточностью наблюдается значительное повышение уровней провоспалительных цитокинов TNF- α , IL-1 β и IL-6 по сравнению со здоровыми лицами. Кроме того, установлена связь между концентрацией цитокинов и тяжестью заболевания, что подтверждает роль воспалительных механизмов в прогрессировании сердечной недостаточности.

2. Определение уровней цитокинов может рассматриваться как перспективный подход для оценки активности воспалительного процесса и прогнозирования течения заболевания. Использование иммунных биомаркеров может способствовать более точной стратификации риска и улучшению мониторинга эффективности терапии у пациентов с ХСН.

Дальнейшие исследования в данной области необходимы для разработки новых диагностических и терапевтических стратегий, направленных на коррекцию иммунных нарушений и снижение воспалительной активности при хронической сердечной недостаточности.

Список литературы:

1. Bekmuradova, M. S. (2025). O'zbekistonda bronxial astma va gastroezofageal refluyus kasalligining komorbid holatini aniqlash usullari. Вестник Ассоциации Пульмонологов Центральной Азии, 15(10), 87-92.
2. Rakhmonov, V., Turdalieva, K., Bobokandov, N., Kobulova, B., Mustanov, S., Nurimov, P., ... & Tashpulatov, Y. (2026). The effect of biotechnological treatment using vascular aquatic plants *Azolla* (*Azolla caroliniana*) and duckweed (*Lemna minor*) on changes in polluted water parameters. International Journal of Agriculture and Biosciences, 15(3), 1095-1108.
3. Gullestad, L. Immunomodulatory therapy in heart failure / L. Gullestad, T. Ueland, L. E. Vinje [et al.] // Journal of the American College of Cardiology. – 2012. – Vol. 59, № 15. – P. 1341–1349.
4. Khusainova, M. A., Bekmuradova, M. S., Makhmudova, K. D., & Uzokov, J. B. (2023). Echocardiographic changes of the left ventricle in bronchial asthma. Science and Education, 4(5), 214-221.
5. Mann, D. L. Innate Immunity and the Failing Heart: The Cytokine Hypothesis Revisited / D. L. Mann // Circulation Research. – 2015. – Vol. 116, № 7. – P. 1254–1268.
6. Nazarov, F. Y., & Bekmuradova, M. S. (2022). Research of Local Contractability of the Myocardial with the Help of Tissue Dopplera Streets Suffering with Dilated Cardiomyopathy. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 10(1), 317-319.
7. Ridker, P. M. Antiinflammatory Therapy with Canakinumab for Atherosclerotic Disease / P. M. Ridker, B. M. Everett, T. Thuren [et al.] // New England Journal of Medicine. – 2017. – Vol. 377, № 12. – P. 1119–1131.
8. Van Linthout, S. Role of inflammation in heart failure with preserved ejection fraction / S. Van Linthout, C. Tschöpe // Progress in Cardiovascular Diseases. – 2017. – Vol. 60, № 1. – P. 83–89.
9. Арутюнов, Г. П. Терапия факторов риска при хронической сердечной недостаточности : руководство для врачей / Г. П. Арутюнов. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2021. – 640 с.
10. Бекмурадова, М. С., & Мехмонов, А. З. (2025). Натрийуретический пептид как предиктор ранней диагностики хронической сердечной недостаточности у больных с артериальной гипертензией. Zamonaviy tibbiyot jurnali (Журнал современной медицины), 11(4), 469-473.
11. Бекмурадова, М. С., & Узокова, Г. Ф. (2025). Роль кишечной микробиоты в развитии сердечно-сосудистых заболеваниях. Zamonaviy tibbiyot jurnali (Журнал современной медицины), 11(4), 453-547.
12. Бекмурадова, М. С., & Хайдаров, С. Н. (2022). Связь между повышенным пульсовым

давлением и натрийуретическим пептидом. *Journal of cardiorespiratory research*, 3(1), 26-29.

13. Бекмурадова, М. С., & Эркинова, З. У. (2025). Артериальная гипертензия и бор беморларда сурункали юрак етишмовчилигини эрта аниқлашда натрийуретик пептиднинг аҳамияти. *Журнал гуманитарных и естественных наук*, (28 [2]), 14-18.

14. Бекмурадова, М. С., Гаффаров, Х. Х., & Ярматов, С. Т. (2020). Значение определения мозгового натрийуретического пептида в процессе диагностики хронической сердечной недостаточности. *Достижения науки и образования*, (4 (58)), 75-78.

15. Бекмурадова, М. С., Махмудова, Х. Д., & Назаров, Ф. Ю. (2021). Диагностическая значимость мозгового натрийуретического пептида при выявлении хронической сердечной недостаточности. *Scientific progress*, 2(1), 810-814.

16. Беленков, Ю. Н. Цитокиновая модель сердечной недостаточности: от гипотезы к практике / Ю. Н. Беленков, В. Ю. Мареев, Ф. Т. Агеев // *Кардиология*. – 2019. – Т. 59, № S3. – С. 13–21.

17. Клинические рекомендации. Хроническая сердечная недостаточность / Российское кардиологическое общество // *Российский кардиологический журнал*. – 2020. – Т. 25, № 11. – С. 4083.

18. Насонов, Е. Л. Роль интерлейкина-1 в развитии сердечно-сосудистых заболеваний / Е. Л. Насонов, Е. В. Попкова // *Научно-практическая ревматология*. – 2018. – Т. 56, № 4. – С. 477–487.

19. Палеев, Ф. Н. Иммунологические аспекты патогенеза сердечной недостаточности / Ф. Н. Палеев, И. С. Абудеева, Н. К. Белоконов // *Клиническая медицина*. – 2020. – № 98 (4). – С. 254–261.

20. Терещенко, С. Н. Биомаркеры в диагностике и прогнозировании хронической сердечной недостаточности / С. Н. Терещенко, И. В. Жиров // *Терапевтический архив*. – 2021. – Т. 93, № 9. – С. 1012–1018.

21. Шляхто, Е. В. Трансляционные исследования в кардиологии: молекулярные мишени для терапии сердечной недостаточности / Е. В. Шляхто // *Кардиология*. – 2022. – Т. 62, № 5. – С. 4–12.

22. Ярмухамедова, С. Х., & Бекмурадова, М. С. (2019). Развитие сердечной недостаточности у больных с гипертонической болезнью по показателям натрийуретического пептида. *Евразийский кардиологический журнал*, (S1), 283-284.

23. Ярмухамедова, С. Х., Бекмурадова, М. С., & Назаров, Ф. Ю. (2020). Диагностическая ценность натрийуретического пептида при выявлении пациентов с бессимптомной систолической или диастолической дисфункцией. *Достижения науки и образования*, (8 (62)), 84-88.

24. Ярмухамедова, С. Х., Бекмурадова, М. С., & Назаров, Ф. Ю. (2020). Значение уровня мозгового натрийуретического пептида в ранней диагностике хронической сердечной недостаточности у больных с артериальной гипертензией. *Достижения науки и образования*, (4 (58)), 61-63.

Для цитирования: Бекмурадова М.С., Хайдаров С.Н. Иммунные биомаркеры и цитокиновые сети как предикторы прогрессирования хронической сердечной недостаточности // *Вестник фундаментальной и клинической медицины*. – 2026. – № 4(24). – С. 1012–1016. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19910825>

РОЛЬ ИММУНОГЕНЕТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ИЗУЧЕНИИ ПАТОГЕНЕЗА БРУЦЕЛЛЕЗА (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)

Мирзажонова Д.Б.¹, Ниязова Т.А.¹, Эрнazarов Х.Х.²

¹Ташкентский государственный медицинский университет, г. Ташкент, Узбекистан

²Кашкадаринская областная инфекционная больница, г. Карши, Узбекистан

Резюме. При патологии бруцеллеза полиморфизмы генов цитокинов приводят к модификации конечного продукта, оказывая влияние на иммунный ответ. Определенное значение в различных стадиях бруцеллезной инфекции имеют соотношение про- и противовоспалительных цитокинов и развивающиеся изменения в иммунном статусе больных.

Ключевые слова: цитокины, иммунитет, бруцеллез, лимфоциты, прогноз.

THE ROLE OF IMMUNOGENETIC RESEARCH IN THE STUDY OF THE PATHOGENESIS OF BRUCELLOSIS (LITERATURE REVIEW)

Mirzajonova D.B.¹, Niyazova T.A.¹, Ernazarov X.X.²

¹Tashkent State Medical University, Tashkent, Uzbekistan

²Kashkadarya Regional Infectious Diseases Hospital, Karshi, Uzbekistan

Resume. In the pathology of brucellosis, cytokine gene polymorphisms lead to modification of the final product, influencing the immune response. The ratio of pro- and anti-inflammatory cytokines and developing changes in the immune status of patients are of certain importance at various stages of brucellosis infection.

Keywords: cytokines, immunity, brucellosis, lymphocytes, prognosis.

БРУЦЕЛЛЁЗ ПАТОГЕНЕЗИНИ ЎРГАНИШДА ИММУНОГЕНЕТИК ТАДҚИҚОТЛАРНИНГ ЎРНИ (АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ)

Мирзажонова Д.Б.¹, Ниязова Т.А.¹, Эрнazarов Х.Х.²

¹Тошкент давлат тиббиёт университети, Тошкент ш., Ўзбекистон

²Қашқадарё вилоят юқумли касалликлар шифохонаси, Қарши ш., Ўзбекистон

Резюме. Бруцеллёзда цитокин ген полиморфизмлари иммун жавобига таъсир қилиб, якуний маҳсулотни ўзгартиради. Яллигланишга ва яллигланишга қарши цитокинларнинг нисбати ва беморларнинг иммунитет ҳолатидаги ўзгаришлар бруцеллёз инфекциясининг турли босқичларида алоҳида аҳамиятга эга.

Калим сўзлар: цитокинлар, иммунитет, бруцеллёз, лимфоцитлар, прогноз.

Актуальность. Высокий удельный вес заболеваемости бруцеллезом в Республике Узбекистан, его хронизация, реинфекция, суперинфекция, остаточные явления, инвалидизация все больше приобретает озабоченность практической медицины.

По информации Регионального Совещания по Борьбе с Бруцеллезом в Центральной Азии и Восточной Европе (09-11 апреля 2013, Измир) несмотря на высокие показатели заболеваемости этой инфекцией, ее фактический уровень намного выше.

По длительности болезни выделяют острую, подострую и хроническую формы. При острой форме заболевания в процесс может вовлекаться любой орган, но наиболее часто (50%) отмечается поражение суставов. В современной западной литературе вовлеченность отдельных органов в патологический процесс при острой форме бруцеллеза рассматривается как осложнение, тогда как при хронической форме это может быть единственным проявлением болезни [2,19,23,33].

Иммунные сдвиги при бруцеллезе сопровождаются нарушениями во взаимодействии факторов врожденного иммунитета, клеточного и гуморального иммунитета, аутоиммунными процессами. Определенное значение в различных стадиях бруцеллезной инфекции имеют соотношение про- и противовоспалительных цитокинов и развивающиеся изменения в иммунном статусе больных [11–13].

Цитокины - биологически активные вещества, регулирующих пролиферацию активных клеток в норме и при патологии, позволяет оценить механизм формирования воспалительных реакций, ал-

аллергических и иммунных состояний и разработать новые методы прогнозирования характера инфекционного заболевания.

Между тем, в доступной литературе роль нарушений обмена цитокинов при бруцеллезе не получила достаточного освещения, что и определяет актуальность исследований, проводимых в этом направлении. Поэтому решили более широко рассмотреть литературы по этой теме.

В ранней стадии инфицирования острого бруцеллеза выявлено снижение уровня ИФН- γ , который восстанавливается после антибактериальной терапии [14]. При хроническом бруцеллезе показано, что специфический антиген стимулирует значительный синтез ИФН- α и ИФН- γ . У больных хроническим бруцеллезом выявлено существенное повышение уровня провоспалительных цитокинов и менее выраженное увеличение содержания ИЛ-4 [19]. При остром, хроническом и резидуальном бруцеллезе происходит снижение уровня в сыворотке крови спонтанного ИФН- γ . Уменьшение производства Th1-цитокинов (ИФН- γ , ИЛ-2) связано с невосприимчивостью Т-клеток к антигенам, что ведет к развитию хронического бруцеллеза [18,19,20].

ИФН- γ является провоспалительным цитокином, который Th1-клетками секретируется, модулирует активацию и транскрипцию ряда генов. ИФН- γ является одним из мощных цитокинов, на который возлагается решающая роль в защите организма от бруцелл [22,23,24,25].

Исследования ряда авторов показали, что при бруцеллезе придает эффектам ИФН- γ , который стимулирует продукцию активных форм кислорода, NO макрофагами и индукцию апоптоза. А также усиливает дифференцировку лимфоидных клеток и синтез цитокинов, обеспечивает превалирование IgG подкласса 2а, увеличивает экспрессию молекул МНС (главный комплекс гистосовместимости). Обнаружено, что выраженность эффектов ИФН- γ зависит от полиморфизма его гена. Оказалось, что люди, гомозиготные по аллелю +874А, более склонны к возникновению бруцеллеза. Обычно при бруцеллезе уровень ИФН- γ в крови повышен [14,18,25].

Уровень экспрессии цитокинов зависит от полиморфизма генов. Генетически детерминированная дисрегуляция цитокинов приводит не только к хроническим воспалительным процессам, но и к генерализованным нарушениям [21].

Определенную роль играют на ранней стадии инфицирования бруцеллеза V γ 9V δ -Т-лимфоциты, в крови содержание этих клеток значительно увеличивается. Доказано, что стимулированные V γ 9V δ -Т-лимфоциты секретируют ИФН- γ и ФНО- α и уменьшают размножение бруцелл в фагосомах [35]. Функция CD4-лимфоцитов воздействия на инфицированные макрофаги, а также стимулирования размножения цитолитических CD8-клеток. Увеличение количества γ/δ -CD4- и CD8-лимфоцитов является характерным для бруцеллеза [1,3,14,25,35].

Проведенные результаты исследования выявили, что у больных бруцеллезом нарушения различных звеньев иммунной системы, а именно: Т- и В-клеточных звеньев, мононуклеарно-фагоцитарного звена, а также цитокинового статус. Изучение Т- и В-клеточных звеньев иммунитета у больных бруцеллезом выявили значительное снижение содержания в периферической крови абсолютного количества CD3-, CD4- и CD8-лимфоцитов в сравнении со здоровыми лицами. Более значимое снижение этих клеток выявлялось у больных с острой формой бруцеллеза. Количество CD20-лимфоцитов снижалось в группе больных хроническим и увеличивалось у больных острым бруцеллезом [1]. По данным ряд авторов, в изучении состояния клеточного иммунитета, сывороточных иммуноглобулинов и активности фагоцитоза у больных бруцеллезом было выявлено наличие дисбаланса во взаимодействии Т- и В-лимфоцитов и их регуляторных субпопуляций, снижения фагоцитоза [19].

Установлено, что у больных острым бруцеллезом наблюдается повышение в крови количества CD16-лимфоцитов, увеличение активности нейтрофилов и активности макрофагов за счет увеличения продукции ими ИЛ-1 β и ФНО- α . В процессе хронизации бруцеллеза наблюдается уменьшение абсолютного количества нейтрофилов и снижение активности макрофагов за счет низкого уровня продукции ИЛ-1 β и ФНО- α . При остром бруцеллезе наблюдается увеличение активности плазматических клеток, на что указывает повышение уровня иммуноглобулинов всех классов в сыворотке крови. Однако в конце процесс дифференцировки В-лимфоцитов в плазматические клетки у этих пациентов нарушен, на что указывает низкий уровень продукции ИЛ-6 и увеличение содержания в крови CD21-лимфоцитов. У больных хроническим бруцеллезом активность плазматических клеток снижается, на что указывает низкий уровень продукции IgM. Дифференцировка В-лимфоцитов в плазматические клетки нарушается на всех этапах, подтверждением чего является низкий уровень продукции ИЛ-6 и ИЛ-4. Активность клеточного звена иммунитета при остром бруцеллезе снижена, о чем свидетельствует уменьшение количества CD3- и CD4-лимфоцитов и низкая продукция ИЛ-2. У больных хроническим бруцеллезом нарушение клеточного иммунитета прогрессирует, что подтверждается сниже-

нием у них количества не только CD3- и CD4-, но и CD8-лимфоцитов, а также низким уровнем продукции ИЛ-2 и ИЛ-4. Уменьшение абсолютного количества нейтрофилов, моноцитов, CD4-, CD8-, CD21-лимфоцитов и IgM в периферической крови, а также снижение спонтанной и стимулированной продукции ИЛ-4, ИЛ-6 и ФНО-α можно расценивать как неблагоприятный прогноз в отношении хронизации бруцеллеза [26].

Гуморальный ответ при бруцеллезе, хотя и не представляет сложностей в диагностике, имеет ограниченное значение в иммунной реакции организма [19].

Существуют три основных механизма взаимодействия вирулентных бруцелл с макрофагами хозяина; которые включают внедрение бруцелл в фагоциты, внутриклеточный транспорт веществ и внутриклеточное размножение. Два первых механизма патогенеза бруцеллеза представлены четвертым типом системы секреции (T4SS), которая обеспечивает внутриклеточный транспорт, а также репликацию и метаболизм эритрогана, участвующих во внутриклеточном выживании бруцелл. Кроме того, показана важная роль T4SS в активации инфламмосомы, которая участвует в аутокаталитическом возбуждении каспазы-1 [26]. Как известно, T4SS имеет важное значение для селективной транслокации белков и ДНК-белковых комплексов [20]. T4SS бруцелл, кодируемая *virB* опероном, является главным фактором патогенности [19 – 21]. T4SS *virB* бруцелл включает 12 генов, экспрессия которых происходит в результате закисления фagosомы при фагоцитозе бруцелл. Установлено, что T4SS необходима для движения S-бруцелл к репликационным нишам и внутриклеточного выживания в клетках макроорганизма. Вместе с тем, для бруцелл в R-форме экспрессия T4SS является важной в механизмах реализации цитотоксичности в макрофагах [20]. Гибель клеток макроорганизма является главным итогом взаимодействия хозяин-патоген. Известно, что вирулентные бруцеллы для выживания и репликации препятствуют апоптозу макрофагов.

Показано, что CD4⁺T-клетки, продуцирующие ИФН-γ и дендритные клетки, продуцирующие индуцибельную синтазу оксида азота (iNOS/NOS2) являются главными компонентами протективного иммунного ответа против возбудителя бруцеллеза. В активацию этих клеток вовлечены TLR4 и TLR9, соединенные с цитозольным адаптерным белком MyD88 [28–34]. Установлено, что *B. melitensis* активирует TLR9/MyD88 сигнальные пути, вызывая продукцию NO инфицированными провоспалительными дендритными клетками. NO проявляет токсичность как в отношении тканей хозяина, так и патогенов и его регуляция является важной в супрессии цитотоксичности хозяина. Индукция Arg1 экспрессии через TLR/MyD88-зависимый путь в ответ на обнаружение бактерий может считаться ответным механизмом, который ограничивает токсичность для иммунной системы во время хронической инфекции. Тем не менее, этот механизм может также способствовать внутриклеточной персистенции бактерий путем ограничения продукции NO и представляет собой механизм уклонения внутриклеточных патогенов от действия иммунной системы [6, 12, 19]. Бруцеллы вызывают хроническое гранулематозное воспаление в печени и селезенке у природных хозяев [35]. Между тем, важность гранул в контроле роста бруцелл, их клеточного состава и сигнальных путей изучены недостаточно. В результате проведенных исследований установлено, что MyD88, IL-12p35 и ИФН-γ являются ключевыми элементами Th1 иммунного ответа, контролирующего рост бруцелл в селезенке [28, 30, 32, 36]. Альтернативная активация макрофагов (M2a), вызванная IL-4/IL-13 через STAT6 сигнальные пути часто описывается как выгодная ниша для длительно продолжающейся персистенции внутриклеточных бактерий.

У человека ген, кодирующий ИФН-γ, расположен на 12-й хромосоме и содержит 4 экзона. К изучению полиморфизма гена ИФН-γ при бруцеллезе привлечено внимание ряда исследователей. Исследователи сообщают ИФН-γ с высоким риском заражения бруцеллезом [27–29]. Данный полиморфизм рассматривают в качестве генетического фактора восприимчивости к бруцеллезу среди обследованных людей. В свою очередь устойчивость к бруцеллезу ассоциируют с генотипами ИФН-γ +874TA (+874/uTr5644) [28], +874TT в комбинации с ИЛ-4 -590CC [29]. Изучена взаимосвязь аллельных вариантов генов цитокинов с развитием очаговых поражений при бруцеллезе. Установлено, что риск осложнений при этом заболевании ассоциируется с полиморфизмом +5644ga гена ИФН-γ [30]. Опубликованы работы, которые демонстрируют отсутствие ассоциации между полиморфизмом гена +874 ИФН-γ и бруцеллезом [31–33].

Заключение. При патологии бруцеллеза полиморфизмы генов цитокины приводят к модификации конечного продукта, оказывая влияние на иммунный ответ. Все вышеперечисленные исследования касаются изучения полиморфизма генов ИФН-γ в основном при остром бруцеллезе. Данные по изучению полиморфизмов генов данного цитокина при хроническом бруцеллезе у людей отсутствуют или имеющиеся некоторые результаты исследований противоречат друг другу. Хронический бруцел-

лез представляет особый интерес для исследователей, открывая новые перспективы в изучении иммунных механизмов при данной инфекции и разработки новых подходов к терапии.

Список литературы:

1. Кулаков Ю.К., Желудков М.М. Молекулярные основы персистенции бруцелл // Журн. микробиол. – 2006. – №4. – С. 72-77.
2. Кутманова А.З. Патология почек при бруцеллезе: дис. ... д-ра мед. наук. СПб., 2001. 230 с.
3. Лабинская А.С., Костюкова Н.Н., Иванова С.М., ред. Руководство по медицинской микробиологии. Частная медицинская микробиология и этиологическая диагностика инфекций. Книга II. Москва: БИНОМ; 2012.
4. Нагоев Б.С. и др. Состояние основных компонентов микробицидной системы лейкоцитов у больных острым и подострым бруцеллезом // Эпидемиология и инфекционные болезни. 2004. № 3. С. 45-49.
5. Нанаева Г.К., Исмаилова Ж.С., Сергеева Г.С. Новые подходы в лечении бруцеллеза (Обзор зарубежной и отечественной литературы). <http://rudocs.exdat.com/docs/index-134962.html> (дата обращения: 17.01.2014 г.).
6. Нурпейсова А.Х. Клинико-лабораторные критерии диагностики и эффективности терапии хронического бруцеллеза: Дис. ... канд. мед. наук. – СПб, 2009. – 171 с.
7. Павлова О.М. Клинико-иммунологические особенности бруцеллеза: Автореф. дис. ... канд. мед. наук 14.00.10. и 14.00.36. Ростов-на-Дону. 2004.
8. Русанова Д. В. Эпидемиологические особенности бруцеллеза в Ставропольском крае: автореф. дис. ... канд. мед. наук. Ставрополь, 2011.
9. Сафонов А.Д., Камышева В.Ф., Михайлов Ю.Д. и др. Бруцеллез в Омской области // Зоонозы: Актуальные проблемы в клинике и эксперименте: Сб. науч. тр. 6-й Респ. науч.-практ. конф. – Махачкала, 2000. – С. 43-45.
10. Сергеева И.В. Ошибки в диагностике хронического бруцеллеза // Совр. Пробл. Науки и образования. – 2013. - № 4. URL: www.science-education.ru/110-9838 (дата обращения: 17.01.2014).
11. Сологуб Т.В., Романцов М.Г., Шульдяков А.А. Бруцеллез. Современные подходы к терапии: Пособие для врачей. – Саратов: Санкт – Петербург, 2006. – 28 с.
12. Сычев Д.А., Игнатьев И.В., Раменская Г.В. и др. Фармакогенетические исследования системы биотрансформации и транспортеров для персонализации фармакотерапии в кардиологии (российский опыт): фармакогенетические исследования СYP2C9 // Клин. фармакол. и терапия. – 2007. – №3. – С. 44-48.
13. Умарова Х. С., Влияние различных клинических форм бруцеллеза на состояние половой сферы женщин: дис. ... канд. мед. наук. М., 1960.
14. Фазылов В.Х. и др. Диагностика и лечение хронического бруцеллеза в реальной практике // Практ. медицина. – 2014. – №7 (83). – С. 72-75.
15. Черкасский В.Л., Иванов А.А. Эпидемиологическая ситуация по зоонозам в России // Эпидемиол. и инф. бол. – 2006. – №2. – С. 12-13.
16. Шанин Ю.Н., Шанин В.Ю., Зиновьев Е.В. Антиоксидантная терапия в клинической практике: теоретическое обоснование и стратегия проведения. СПб.: Элби, 2003. 128 с.
17. Шульдяков А. А. Эффективность применения цитофлавина в лечении больных хроническим бруцеллезом // Клиническая медицина. 2011. Т. 89, № 2. С. 56-58.
18. Юшук Н.Д., Венгеров Ю.Я., ред. Инфекционные болезни: национальное руководство. Москва: ГЭОТАР-Медиа; 2010.
19. Baldi P.C., Giambartolomei G.H. Immunopathology of Brucella infection. Recent Patents on Anti-Infective Drug Discovery. 2013; 8 (1): 18 – 26.
20. Barquero-Calvo E., Chaves-Olarte E., Weiss D.S., Guzman-Verri C., Chacon-Diaz C., Rucavado A. et al. Brucella abortus uses a stealthy strategy to avoid activation of the innate immune system during the onset of infection. PLoS One. 2007; 2 (7): e631.
21. Boschiroli M.L., Ouahrani-Bettache S., Foulongne V., Michaux-Charachon S., Bourg G., Allardet-Servent A. et al. Type IV secretion and Brucella virulence. Veterinary Microbiology. 2002; 90 (1 – 4): 341 – 348.
22. Burkhardt S., Jimenez de Bagues M.P., Liautard J.P., Kohler S., Analysis of the behavior of eryC mutants of Brucella suis attenuated in macrophages. Infection and Immunity. 2005; 73 (10): 6782 – 6790.
23. Crasta O.R., Folkerts O., Fei Z., Mane S.P., Evans C., Martino-Catt S. et al. Genome sequence of Brucella abortus vaccine strain S19 compared to virulent strains yields candidate virulence genes. PLoS One. 2008; 3(5): e2193.
24. Corbel M.J. Brucellosis: An overview. Emerging Infectious Diseases. 1997; 3: 213 – 221.
25. De Jong M.F., Sun Y.H., den Hartigh A.B., van Dijk J.M., Tsolis R.M. Identification of VceA and VceC, two members of the VjbR regulon that

are translocated into macrophages by the Brucella type IV secretion system. *Molecular Microbiology*. 2008; 70 (6): 1378 – 1396.

26. De Figueiredo P., Ficht T.A., Rice-Ficht A., Rossetti C.A., Adams L.G. Pathogenesis and immunobiology of brucellosis: review of Brucella-host interactions. *American Society for Investigative Pathology*. 2015; 185 (6): 1505 – 17.

27. Dornand J., Gross A., Lafont V., Liautard J., Oliaro J., Liautard J.P. The innate immune response against Brucella in humans. *Veterinary Microbiology*. 2002; 90 (1 – 4): 383 – 394.

28. Enright F.M., Duncan J.R. The pathogenesis and pathobiology of

29. Brucella infections in domestic animals. In *Animal Brucellosis*. 1990; Ed.: .H. Nielsen, J.R. Duncan; Boca Raton; CRC Press: 301 – 320.

30. Forestier C., Deleuil F., Lapaque N., Moreno E., Gorvel J.P. Brucella abortus lipopolysaccharide in murine peritoneal macrophages acts as a down-regulator of T cell activation. *Immunology*. 2000; 165 (9): 5202 – 10.

31. Gomes M.T., Campos P.C., de Almeida L.A., Oliveira F.S., Costa M.M., Marim F.M., Pereira G.S.M., Oliveira S.C. The role of innate immune signals in immunity to Brucella abortus. *Frontiers in Cellular and Infection Microbiology*. 2012 2(130).

32. Jarvis B.W., Harris T.H., Qureshi N., Splitter G.A. Rough lipopolysaccharide from Brucella abortus and Escherichia coli differentially activates the same mitogen-activated protein kinase signaling pathways for tumor necrosis factor alpha in RAW

264.7 macrophage-like cells. *Infection and Immunity*. 2002; 70 (12): 7165 – 7168.

33. O'Callaghan D., Cazeville C., Allardet-Servent A., Boschirolu M.L., Bourg G., Foulongne V. et al. A homologue of the Agrobacterium tumefaciens VirB and Bordetella pertussis Ptl type IV secretion systems is essential for intracellular survival of Brucella suis. *Molecular Microbiology*. 1999; 33 (6): 1210 – 20.

34. Pei J., Wu Q., Kahl-Mc Donagh M., Ficht T.A. Cytotoxicity in macrophages infected with rough Brucella mutants is type IV secretion system dependent. *Infection and Immunity*. 2008; 76(1): 30 – 37.

35. Pei J., Kahl-McDonagh M., Ficht T.A. Brucella dissociation is essential for macrophage egress and bacterial dissemination. *Frontiers in Cellular and Infection Microbiology*. 2014; 4 (23): 1 – 9.

36. Roop R.M. II, Gaines J.M., Anderson E.S., Caswell C.C., Martin D.W. Survival of the fittest: how Brucella strains adapt to their intracellular niche in the host. *Medical Microbiology and Immunology*. 2009; 198 (4): 221 – 238.

37. Sangari F.J., Aguero J., Garcia-Lobo J.M. The genes for erythritol catabolism are organized as an inducible operon in Brucella abortus. *Microbiology*. 2000; 146 (Pt 2): 487 – 495.

38. Zhan Y.F., Cheers C. Endogenous Interleukin-12 is involved in resistance to Brucella-abortus infection. *Infection and Immunity*. 1995; 63: 1387 – 1390.

Для цитирования: Мирзажонов Д.Б., Ниязова Т.А., Эрназаров Х.Х. Роль иммуногенетических исследований в изучении патогенеза бруцеллеза (обзор литературы) // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 4(24). – С. 1017–1021. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20064017>

**СУРУНКАЛИ ВИРУСЛИ ГЕПАТИТ В БЕМОРЛАРДА ҚИЗАМИҚНИНГ КЛИНИК
КЕЧИШИ: ТИЗИМЛИ ШАРҲ****Мирзажонов Д.Б.¹, Чўлиева Н.Ф.², Махаммаджонов И.А.³, Акбаров Н.Ш.⁴**¹Тошкент давлат тиббиёт университети, Тошкент ш., Ўзбекистон²Тошкент вилояти юқумли касалликлар шифохонаси, Тошкент ш., Ўзбекистон³Чирчиқ вилояти юқумли касалликлари шифохонаси, Чирчиқ ш., Ўзбекистон⁴Андижон давлат тиббиёт институти, Андижон ш., Ўзбекистон

Резюме. Қизамиқ – юқумлилиги жуда юқори бўлган морбилливирус қўзғатадиган касаллик хисобланиб ривожланаётган давлатларда халигача катта муаммоларга сабаб бўлади. Эмлашлардаги оқсоқликлар эса қизамиқ касаллигининг ҳар қандай ёш орасида учрашига олиб келади. Сурункали В гепатити (SVG) – В гепатити вирусининг (VGB) узоқ давом этадиган инфекцияси бўлиб ушбу касаллик ҳам дунё миқёсида долзарб муаммолардан бири хисобланади. Ушбу касалликнинг юқиши парентерал бўлишига қарамай касаллик ривожланаётган давлатларда кенг тарқалиб, таъхиснинг кечикиши, аҳолининг тиббий савиясининг етарли эмаслиги ҳисобиға касаллик асоратларининг кўплиги алоҳида этиборга моликдир. Ушбу икки инфекциянинг бирга учраш ҳолатлари камдан кам бўлсада ҳозирги эмлашга қаршилиқ қилишлар даврида бунга имкон яратилмоқда. Ўткир вирусли экзантемалар ва сурункали вирусли инфекциялар ўртасидаги ўзаро таъсир касалликларнинг намоён бўлиши, оғирлиги ва оқибатларини ўзгартириши мумкин. Ушбу шарҳ SVG бўлган шахсларда қизамиқнинг клиник кечилиши, асоратлари, иммун ўзаро таъсирлари ва уни бошқариш масалалари тўғрисидаги мавжуд далилларни умумлаштирган ҳолда кўриб чиқади. Мавжуд тадқиқотлар натижаси шуни кўрсатадики, бу икки вирус ўртасидаги ўзаро таъсир ўзига хос иммунологик динамикага олиб келиши, жигар яллиғланишини кучайтириши, қизамиқ намоён бўлиши ва клиник кечилишини ўзгартириши ва уни бошқаришни мураккаблаштириши мумкин. Ушбу мақолада эпидемиологик тадқиқотлар, клиник ҳисоботлар ва иммунологик тадқиқотлар, яқка тартибда элон қилинган клиник вазиятларни қамраб олади ва натижаларини бирлаштиради.

Калит сўзлар: қизамиқ, сурункали В гепатит, SVG да қизамиқ

**CLINICAL COURSE OF MEASLES IN PATIENTS WITH CHRONIC HEPATITIS B: A
SYSTEMATIC REVIEW****Mirzajonova D.B.¹, Chulieva N.F.², Makhammadjonov I.A.³, Akbarov N.Sh.⁴**¹Tashkent State Medical University, Tashkent, Uzbekistan²Tashkent Regional Infectious Diseases Hospital, Tashkent, Uzbekistan³Chirchik Regional Infectious Diseases Hospital, Chirchik, Uzbekistan⁴Andijan State Medical Institute, Andijan, Uzbekistan

Resume. Measles is a highly contagious disease caused by the morbillivirus, which continues to cause significant problems in developing countries. Deficiencies in vaccination coverage lead to the occurrence of measles in any age group. Chronic Hepatitis B (CHB) is a prolonged infection caused by the Hepatitis B Virus (HBV), which is also a pressing global issue. Despite its parenteral mode of transmission, this disease is widespread in developing countries, and the late diagnosis, coupled with the insufficient level of medical awareness among the population, make its numerous complications particularly noteworthy. Although cases of co-occurrence of these two infections are rare, the current era of vaccine hesitancy is creating opportunities for this. The interaction between acute viral exanthems and chronic viral infections can alter the manifestation, severity, and outcomes of diseases. This review examines existing evidence on the clinical course, complications, immune interactions, and management issues of measles in individuals with CHB. The results of available studies indicate that the interaction between these two viruses may lead to unique immunological dynamics, exacerbate liver inflammation, change the presentation and clinical course of measles, and complicate its management. This article covers and consolidates findings from epidemiological studies, clinical reports, immunological research, and individually published clinical cases.

Key words: measles, chronic hepatitis B, measles in CHB

КЛИНИЧЕСКОЕ ТЕЧЕНИЕ КОРИ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМ ВИРУСНЫМ ГЕПАТИТОМ В: СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

Мирзажоннова Д.Б.¹, Чўлиева Н.Ф.², Махаммаджонов И.А.³, Акбаров Н.Ш.⁴

¹Ташкентский государственный медицинский университет, г. Ташкент, Узбекистан

²Ташкентская областная инфекционная больница, г. Ташкент, Узбекистан

³Чирчикская областная инфекционная больница, г. Чирчик, Узбекистан

⁴Андижанский государственный медицинский институт, г. Андижан, Узбекистан

Резюме. Корь – это высококонтагиозное заболевание, вызываемое вирусом кори, которое до сих пор вызывает серьезные проблемы в развивающихся странах. Недостаточный охват вакцинацией приводит к возникновению кори в любых возрастных группах. Хронический гепатит В (ХГВ) – это длительная инфекция, вызываемая вирусом гепатита В, которая также является одной из актуальных проблем в мире. Несмотря на парентеральный путь передачи, это заболевание широко распространено в развивающихся странах, и поздняя диагностика, а также недостаточный уровень медицинской грамотности населения делают многочисленные осложнения болезни заслуживающими особого внимания. Случаи совместного возникновения этих двух инфекций встречаются редко, однако в эпоху роста антипрививочных настроений создаются условия для этого. Взаимодействие между острыми вирусными экзантемами и хроническими вирусными инфекциями может изменить проявления, тяжесть и исходы заболеваний. Этот обзор рассматривает существующие данные о клиническом течении кори, ее осложнениях, иммунных взаимодействиях и вопросах лечения у лиц с ХГВ. Результаты имеющихся исследований показывают, что взаимодействие между этими двумя вирусами может привести к уникальной иммунологической динамике, усилить воспаление печени, изменить проявления и клиническое течение кори и осложнить ее лечение. В этой статье рассматриваются и обобщаются результаты эпидемиологических исследований, клинических отчетов и иммунологических исследований, а также отдельно опубликованные клинические случаи.

Ключевые слова: корь, хронический гепатит В, корь при ХГВ

Кириш. Қизамиқ эмлаш йўли билан олдини олиш мумкин бўлган ўлимнинг етакчи сабабларидан бири бўлиб қолмоқда[1]. Сурункали В гепатити дунё бўйича ўртача 296 миллион кишига таъсир қилади ва сироз ва гепатоселюляр ракларнинг асосий сабаби сифатида намоён бўлади [2]. Бир нечта вирусли ва бактериал касалликларнинг коинфексияси ёки суперинфексияси хозирда ноёб ҳолат ҳисобланмайди. Ушбу ҳолат организмнинг иммунологик ҳолатига боғлиқ тарзда сурункали инфекциянинг ўткир касаллик кечишини ўзгартириши, оғирлашишига сабаб бўлиши, айрим ҳолатларда ёмон асоратларга олиб келиши мумкин [3].

Қизамиқнинг клиник кечиши одатда ўз-ўзидан яқунланувчи ва кам ҳолларда асоратланувчи ҳолат бўлиб, аммо иммунитетни заифлашган беморларда, ёмон овқатланган болаларда ва ҳомиладор аёлларда оғир бўлиши, асоратларнинг учраш частотаси юқори бўлиши мумкин [4]. SVG ли беморлада доимий антиген таъсири мавжуд бўлиб, Т-хужайралар жавоб реакцияси ва қобилятининг пастлиги ва кўпинча жигар яллиғланиши кузатиладиган мураккаб иммунологик ҳолатда бўлади [5,6].

Касалликларнинг эпидемиологияси. VGB учун юқори эндемик бўлган ҳудудлар, масалан, жанубий Осиё ва Африканинг баъзи қисмлари, кўпинча етарли даражада эмлаш қилинмаганлиги сабабли қизамиқ эпидемиялари юз берадиган ҳудудлар билан ўхшаш ҳисобланади [7,8]. Бу географик ўхшашлик ко- ва суперинфексия хавфини оширади. SVG беморлари қизамиқ вирусини юқтиришга нисбатан табиий юқори сезувчанликка эга эмас; сезувчанлик, биринчи навбатда, қизамиққа нисбатан хос бўлган иммуноглобулин G (ИгГ)нинг қондаги серологик ҳолати билан белгиланади [9]. Бироқ, SVG беморларининг баъзи кичик гуруҳлари, айниқса иммуносупрессив терапия олаётганлар (masalan, saraton yoki avtoimmun kasalliklar tufayli) ёки ривожланган сиррози бўлганлар, эмлашдан кейинги иммунитетни заифлашган ёки ваксинатсияга бирламчи жавоб бермайдиган бўлиши мумкин, бу уларнинг касалланишсига имкон яратади ва хавф даражасини оширади [10, 11].

СВГли бемор ва қизамиқ вирусининг ўзаро иммунологик таъсири. Қизамиқ ҳисобига юзага келган иммунопатология ҳам туғма, ҳам орттирилган иммунитетга таъсир қилувчи вақтинча, аммо чуқур иммуносупрессияни ўз ичига олади [12, 13]. Қизамиқ вируси дендритик хужайралар ва лимфоситларга таъсир қилиб, лимфопенияга ва “иммун хотира йўқолиши” га олиб келади, бунда олдиндан мавжуд Т-хужайра ва Б-хужайралардаги хотира ретсепторлари йўқолади [14, 15]. Ушбу ҳолат SVG ли беморлар организмда бир қатор назарий ва кузатилган оқибатларга эга:

ВГБ-спетсифик иммунитетга таъсири: Қизамиқ чақирадиган иммуносупрессия сурункали бемор организмда аввалдан ўзгаришга учраган ва VGB га нисбатан спетсифик ҳисобланган CD8+

бўлган Т лимфотситларнинг жавоб реакциясини бузилишига олиб келиши ва оқибатда вирусли гепатитнинг қайта фаоллашишига олиб келиши мумкин [16, 17]. Клиник тадқиқотларда ва очик манбаларда мавжуд маълумотларга таяниб шуни айтиш мумкинки вирусли гепатит касаллиги аввалроқ ремиссияга ўтган бўлишига қарамай системали вирусли касаллик ҳисобига қайта фаоллашиши келтирилган, аммо айнан қизамиқ касаллиги билан боғлиқ гепатитнинг фаоллашиши ҳақида маълумотлар етарли эмас [18].

Қизамиқ вируси чиқарилиши (клиренс)нинг ўзгариши: SVG даги асосий иммун дисрегуляция бўлиб регулятор Т-хужайралар (Трегс) даражасининг ошиши ва Т-хужайраларда PD-1 каби ингибитор вазифасига эга ретсепторларнинг бўлиши, қизамиқ вирусини клиренс учун зарур бўлган Тх1 томонидан қўзғатилган кучли жавобнинг ривожланишига тўсқинлик қилади [19, 20]. Бу назарий жиҳатдан организмда кузатиладиган виремия муддатини узайтириши ёки қонда вирус юкласини оширади.

Ситокин бўрони хавфи: организмда бир вақтнинг ўзида иккала вирус томонидан иммун тизимнинг фаоллашиши ва иммун хужайраларнинг қўзғалиши ҳаддан ташқари миқдорда яллиғланиш ситокинларини (масалан, IL-6, TNF- α) ишлаб чиқарилишини юзага келтиради, ва бунинг натижаси ўларок умумий белгиларни ҳамда жигар зарарланиши белгиларини оғирлаштириши мумкин. Беморда кузатиладиган клиник ҳолатларни оғирлаштириши вирусли касалликларнинг SVG ли беморларда оғирроқ ўтиши ва ситокин бўрони юзага келиш хавфини оширади [21, 22].

Қизамиқнинг клиник кечиши ва жигар ўзгаришлари: SVG беморларида ҳам иситма, йўтал, бурун оқиши ва конъюнктивит, макулопапулёз тошма каби классик клиник белгилар пайдо бўлиши бўлади [23]. Бироқ, касалликнинг кечиши ва клиник белгиларнинг намоён бўлиш даври ўзгариши мумкин.

Ўткир касалликнинг кучайиши: айнан қизамиқ ва SVG билан боғлиқ бўлган касаллик ва унинг кечишига қаратилган қиёсий ёки кузатув тадқиқотлари мавжуд бўлмасда беморда мавжуд сурункали касалликлар барча ўткир вирусли касалликларнинг кечишини оғирлаштириши принципи ушбу ҳолатда ҳам ишлайди. SVG ли беморларда, айниқса ривожланган фибрози ёки сирози (Child-Pugh B/C) бўлганлар, доимий системали яллиғланиш ва потенсиал иммунитет заифлиги сабабли қизамиқнинг қиёсий оғир ва ёки чўзилган клиник белгилар билан кечишини ўтказди [24, 25].

Жигар асоратлари: жигарда кузатиладиган муаммолар асосий хавотирли ва хавфли қисм ҳисобланади. Шуни эътиборга олиш керакки, қизамиқ касаллиги гепатотроп ҳисобланмайди, аммо касаллик ҳисобига жигарда умумий ўзгаришлар кузатилади, масалан ферментопатия тез-тез учрайди, асосий касаллик тугагач аслида жигардаги ўзгаришлар ўз ўзидан ўтиб кетади [26]. SVG да бу олдиндан мавжуд бўлган жигар шикастланишига қўшилади ва сурункали касалликнинг кучайишига, одатий кузатиладиган қизамиқ белгиларининг эса кучли ифодаланишига олиб келади.

Гепатитнинг бирдан кучайиши: Қизамиқ бошқа системали инфекциялар каби иммунологик триггер вазифасини бажаради, бу қон зардобиде аланин аминотрансфераза (ALT) ва VGB нинг DNK си юкласининг қондаги миқдорининг кескин ошиши билан тавсифланган SVG нинг ўткир кучайишига сабаб бўлади [27, 28]. Ушбу ҳолатни VGB нинг иммунитетнинг қайта тузилиши ва ситолитик клиренс ҳисобига юзага келган ситолитик бўлмаган супрессияси ҳисобига деб тушунтирилади [29].

Жигар етишмовчилиги хавфи (Acute-on-chronic liver failure) ACLF: Жигарининг асосий касаллиги бўлган беморларда қизамиқнинг системали яллиғланиш таъсири потенсиал VGB кучайиши ҳолати билан бирлашиб, ACLF ни қўзғатиши мумкин – бу қисқа муддат ичида ўлим даражаси юкори бўлган синдромдир [30, 31]. Бу хавф пневмония ва бошқа касалликлар каби бошқа асоратлар бўлганда янада ошади.

Атипик кечиш: Иммунитети заифлашган ёки атайин супрессия қилинган SVG беморлари (масалан, transplantatsiyadan keyin, kimyoterapiya olayotgan) қизамиқнинг классик тошмаларисиз атипик ёки гигант хужайрали пневмонит ва энсефалитни ўз ичига олган оғир прогрессив касалликни ривожлантириши мумкин, бошқа иммунитетни заифлашган беморларда ҳам шундай ҳолат кузатилади ва бу тадқиқотлар билан келтирилган [32, 33].

SVG терапиясининг қизамиқ кечишига таъсири. Кўпгина SVG беморлар вирусга қарши терапия олмаслиги ёки зарурат бўлмаслиги мумкин. Аммо вирусга қарши даво олаётганлар учун айрим жиҳатларга мавжуд. Жумладан:

Нуклеоз(т)ид аналоглари (NA) терапияси: Баркарор NA терапияси (масалан, entekavir, tenofovir) га мунтазам амалқилувчи ва қондаги вирус юкласини тўғри назорат қилган беморлар қизамиқ касаллигининг клиник белгиларини кўп ҳолларда одатий тарзда бошдан ўтказди. VGB нинг қондаги реактивацияси, сурункали касалликнинг қўзғалиши, жигарда бошқа белгиларнинг юзага

келиши хавфи паст ҳисобланади [34, 35]. Ушбу гуруҳ беморларда касаллик иммунокомпетент макроорганизмларга ўхшашроқ бўлади.

Пегилирланган Интерферон-алфа (ПЕГ-ИФН) терапияси: антивирус терапия пайдо бўлма-сидан олдин қўлланилган ПЕГ-ИФН, иммуномодуляторни ҳозирда фаол олаётган беморлар жуда кам гуруҳни ташкил қилади. ПЕГ-ИФН нинг ноҳўя таъсирларидан бўлган иситма, миалгия қизамиқнинг продромал белгиларини тақлид қилиши мумкин [36]. Бундан ташқари, IFN нинг таъсир механизмига асосланадиган бўлсак назарий жиҳатдан қизамиққа қарши юзага келадиган организмнинг иммун жа-вобини модулятсия қилиши мумкин, ва яна айтиб ўтиш керак ушбу ҳолат бўйича тадқиқотларнинг камлиги ҳисобига натижани олдиндан тахмин қилиш жуда қийин [37].

Касалликни назорат қилиш

Профилактика: Ваксинатсия устувор аҳамиятга эга. Қизамиқ, паротит ва қизилча (QPQ) вак-синаси тирик заифлаштирилган вакцина ҳисобланади. Албатта QPQ эмламаси болаларнинг ёшлик чоғида қилиниб иммунитет пайдо бўлиши таъминланади. Аммо эмлашдан қолиб кетган беморларда ҳаётий зарурият туғилиши мумкин. QPQ одатда иммунитетни заифлашган шахсларга, шу жумладан декомпенсацияланган сиррози бор ёки юқори дозали иммуносупрессантлар олаётган SVG беморла-рига қарши кўрсатма ҳисобланади [38, 39]. SVG ли беморларда сурункали касаллик барқарор ремис-сияда бўлса, ҳамда бемор қонида қизамиққа нисбатан серонегатив натижа олинса эмлаш масаласи хавфсиз ва энг керакли тадбир ҳисобланади. [40]. Иммун тизими заиф шахслар шу жумладан SVG билан оғриган ва қонида қизамиққа нисбатан IG бўлмаган беморлар қизамиқнинг тасдиқланган шак-ли билан контактда бўлганда контакт гуруҳга мушак орасига қизамиққа қарши иммуноглобулин қилиш амалиёти мавжуд бўлиб ўз самарадорлигини исботлаган [41].

Диагностика: қизамиқ касаллигининг кўтарилиши вақтида юқори даражада хавф мавжуд бўлиб сезгир контингентда айрим белгилар пайдо бўлган захоти клиник текширувлар амалга ошири-лиш зарур. Серологик диагностика усуллари иммунитетни заиф ёки иммуносупрессорлар таъсиридаги беморларда нотўғри маълумот бериши мумкин. Натижада ушбу тестинг ишончлилики даражаси па-саяди транскриптаза-полимераза занжирли реакцияси (РТ-ПЗР) афзал усул ҳисобланади. Ушбу ташхисот усулини юқоридаги ҳавф гуруҳларида ишлатиш самарали натижа беради ва диагностика-нинг кечикмаслиги эвазига касалликнинг асоратланиши олдини олади [42, 43].

Касаллик мониторинги ва даволаш: SVG ли беморларда ҳам қолган беморлар каби қўллаб қувватловчи терапия амалга оширилади (gidratatsiya, isitmani pasaytiruvchi vositalar, A vitamini) [44]. Бемор ахволининг оғирлигига қараб симптоматик даво қўлланади, зарурат туғилганида гормо-нал терапия амалга оширилади. SVG ли беморлар қизамиқ билан оғриганида жигар функциясини ку-чайтирилган мониторинг қилиш жуда муҳим. ALT, AST, билирубин ва MNO текширувлари, айниқса беморда фиброз жараёни маълум бўлганда тез тез текшириш тавсия қилинади. NA терапиясини ола-ётганлар учун даволаниш режимида риоя қилиш таъминланиши керак. Аввал номалум бўлган ёки даволаниши тўхтатилган беморларда VGB нинг реактиватсияси ва гепатит белгиларининг кучайиши кузатилса, SVG ни даволаш кўрсатмаларига мувофиқ NA терапиясини бошлаш кўриб чиқиши ке-рак [45].

Инфекция назорати: қизамиқ касаллиги аниқланган ва кўтарилиши даврида гепатология ва гастроэнтерология бўлимларида ҳаво томчи инфекцияларининг назорати кучайтирилиши ва олдини олишга қаратилган чора тадбирларга амал қилиш қатъий назорат қилиниши керак [46]. Шу орқали хавф гуруҳига кирувчиларни касалликдан химоя қилиш мумкин ва юқорида келтирилган тарзда кон-такт гуруҳлари алоҳида назоратга олиниши, қонининг серо ҳолатининг аниқланиши ва тегишли тар-тибда ҳаракат қилиниши керак.

Хулосалар. SVG беморларида қизамиқнинг клиник кечиши, асосан, жигар сурункали касалли-гининг кўзғатилиш хавфи ёки жигар касаллиги терминал босқичларида, камдан-кам ҳолларда, ACLF ни юзага келтириши мумкинлиги, иммун тизимнинг чарчаганлиги оқибатида касаллик чўзилиши, клиник белгиларнинг чуқур ифодаланиши кузатилади. Икки вирус ўртасидаги иммунологик ўзаро таъсир – қизамиқ кўзғатган иммуносупрессия ва SVG билан боғлиқ иммун дисрегулятсия – бемор организм учун мураккаб муҳит яратади. Касалликни асосий бошқарув стратегиялари хавфсиз бўлган-да эмлаш орқали профилактика, жигар функциясини хушёрлик билан мониторинг қилиш ва атипик кўринишлар юзага келиши мумкинлигини доимо ёдда сақлашни ўз ичига олади.

SVG беморларини даволовчи шифокорлар ҳамда уларни назорат қилувчи соғлиқни сақлаш со-ҳасидаги ходимлар қизамиқ инфекцияси даврида беморларни даволашни ва парвариш қилишни оп-тималлаштириш учун вирусология, эпидемиология ва юқумли касалликлар соҳасидаги билимларни ўзлаштиришлари ва гепатология соҳаси билан бирлаштиришлари керак. Шунини таъкидлаб ўтиш жо-изки қизамиқ касаллигини даволашдан кўра олдини олиш самаралироқдир.

Адабиётлар рўйхати:

1. Strebel, P. M., Orenstein, W. A., & Halsey, N. A. (2019). Measles. *New England Journal of Medicine*, *381*(4), 349-357.
2. JSST. (2024). Global hepatitis report 2024. JSST.
3. Cox, M. A., Kahan, S. M., & Zajac, A. J. (2020). Programming and reprogramming virus-specific T-cell memory. *Nature Reviews Immunology*, *20*(12), 705-717.
4. Moss, W. J. (2017). Measles. *The Lancet*, *390*(10111), 2490-2502.
5. Bertoletti, A., & Ferrari, C. (2016). Adaptive immunity in HBV infection. *Annual Review of Immunology*, *34*, 29-60.
6. Maini, M. K., & Schurich, A. (2010). The molecular basis of the failed immune response in chronic HBV: therapeutic implications. *Journal of Hepatology*, *52*(4), 616-619.
7. Schweitzer, A., Horn, J., Mikolajczyk, R. T., Krause, G., & Ott, J. J. (2015). Estimations of worldwide prevalence of chronic hepatitis B virus infection: a systematic review of data published between 1965 and 2013. *The Lancet Infectious Diseases*, *15*(8), 974-984.
8. Patel, M. K., Dumolard, L., Nedelec, Y., et al. (2020). Progress toward regional measles elimination — worldwide, 2000–2019. *Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR)*, *69*(45), 1700-1705.
9. Chen, R. T., Markowitz, L. E., Albrecht, P., et al. (1990). Measles antibody: reevaluation of protective titers. *Journal of Infectious Diseases*, *162*(5), 1036-1042.
10. Fiorino, S., Loggi, E., Verucchi, G., & Andreone, P. (2015). Management of HBV infection in immunocompromised patients. *World Journal of Gastroenterology*, *21*(18), 5496-5504.
11. Kim, G. A., Lim, Y. S., An, J., et al. (2019). HBsAg seroclearance after nucleoside analogue therapy in patients with chronic hepatitis B: clinical outcomes and durability. *Hepatology*, *69*(2), 771-780.
12. Griffin, D. E. (2010). Measles virus-induced suppression of immune responses. *Immunological Reviews*, *236*(1), 176-189.
13. Mina, M. J., Kula, T., Leng, Y., et al. (2019). Measles virus infection diminishes preexisting antibodies that offer protection from other pathogens. *Science*, *366*(6465), 599-606.
14. de Vries, R. D., McQuaid, S., van Amerongen, G., et al. (2012). Measles immune suppression: lessons from the macaque model. *PLoS Pathogens*, *8*(8), e1002885.
15. Petrova, V. N., Sawatsky, B., Han, A. X., et al. (2019). Incomplete genetic reconstitution of B cell pools contributes to prolonged immunosuppression after measles. *Science Immunology*, *4*(41), eaay6125.
16. Rehermann, B., & Nascimbeni, M. (2005). Immunology of hepatitis B virus and hepatitis C virus infection. *Nature Reviews Immunology*, *5*(3), 215-229.
17. Seto, W. K., Chan, T. S., Hwang, Y. Y., et al. (2014). Hepatitis B reactivation in patients with previous hepatitis B virus exposure undergoing rituximab-containing chemotherapy for lymphoma: a prospective study. *Journal of Clinical Oncology*, *32*(33), 3736-3743.
18. Jang, J. W., Choi, J. Y., Bae, S. H., et al. (2011). A randomized controlled study of pre-emptive lamivudine in patients receiving transarterial chemo-lipiodolization. *Hepatology*, *53*(4), 1202-1209.
19. Stoop, J. N., van der Molen, R. G., Baan, C. C., et al. (2005). Regulatory T cells contribute to the impaired immune response in patients with chronic hepatitis B virus infection. *Hepatology*, *41*(4), 771-778.
20. Fisicaro, P., Valdatta, C., Massari, M., et al. (2010). Early kinetics of innate and adaptive immune responses during hepatitis B virus infection. *Gut*, *59*(7), 974-982.
21. H e, S., Mention, J. J., Monteiro, R. C., et al. (2013). A direct role for NKG2D/MICA interaction in villous atrophy during celiac disease. *Immunity*, *21*(3), 367-377.
22. Tan, A. T., Loggi, E., Boni, C., et al. (2010). Host ethnicity and virus genotype shape the hepatitis B virus-specific T-cell repertoire. *Journal of Virology*, *84*(9), 4246-4257.
23. Perry, R. T., & Halsey, N. A. (2004). The clinical significance of measles: a review. *Journal of Infectious Diseases*, *189*(Suppl 1), S4-S16.
24. Gounder, P. P., Bulkow, L. R., Snowball, M., et al. (2012). End-stage liver disease and death in Alaska Native people with chronic hepatitis B: a population-based study. *Clinical Infectious Diseases*, *55*(1), 108-116.
25. Trepo, C., Chan, H. L., & Lok, A. (2016). Hepatitis B virus infection. *The Lancet*, *388*(10061), 2579-2588.
26. Gavish, D., Kleinman, Y., Morag, A., & Chajek-Shaul, T. (1983). Hepatitis and jaundice associated with measles in young adults. An analysis of 65 cases. *Archives of Internal Medicine*, *143*(4), 674-677.
27. Liaw, Y. F. (2009). Hepatitis B reactivation after cytotoxic chemotherapy: the disease and its prevention. *Clinical Gastroenterology and Hepatology*, *7*(4), 453-457.

- 28.Yeo, W., Chan, T. C., Leung, N. W., et al. (2009). Hepatitis B virus reactivation in lymphoma patients with prior resolved hepatitis B undergoing anticancer therapy with or without rituximab. *Journal of Clinical Oncology*, *27*(4), 605-611.
- 29.Webster, G. J., Reignat, S., Brown, D., et al. (2004). Longitudinal analysis of CD8+ T cells specific for structural and nonstructural hepatitis B virus proteins in patients with chronic hepatitis B: implications for immunotherapy. *Journal of Virology*, *78*(11), 5707-5719.
- 30.Arroyo, V., Moreau, R., Jalan, R., & Ginès, P. (2015). Acute-on-chronic liver failure: A new syndrome that will re-classify cirrhosis. *Journal of Hepatology*, *62*(1 Suppl), S131-S143.
- 31.Jalan, R., Saliba, F., Pavesi, M., et al. (2014). Development and validation of a prognostic score to predict mortality in patients with acute-on-chronic liver failure. *Journal of Hepatology*, *61*(5), 1038-1047.
- 32.Kaplan, L. J., Daum, R. S., Smaron, M., & McCarthy, C. A. (1992). Severe measles in immunocompromised patients. *JAMA*, *267*(9), 1237-1241.
- 33.Mustafa, M. M., Weitman, S. D., Winick, N. J., Bellini, W. J., Timmons, C. F., & Siegel, J. D. (1993). Subacute measles encephalitis in the young immunocompromised host: report of two cases diagnosed by polymerase chain reaction and treated with ribavirin and review of the literature. *Clinical Infectious Diseases*, *16*(5), 654-660.
- 34.Terrault, N. A., Lok, A. S. F., McMahon, B. J., et al. (2018). Update on prevention, diagnosis, and treatment of chronic hepatitis B: AASLD 2018 hepatitis B guidance. *Hepatology*, *67*(4), 1560-1599.
- 35.European Association for the Study of the Liver. (2017). EASL 2017 Clinical Practice Guidelines on the management of hepatitis B virus infection. *Journal of Hepatology*, *67*(2), 370-398.
- 36.Fried, M. W., Shiffman, M. L., Reddy, K. R., et al. (2002). Peginterferon alfa-2a plus ribavirin for chronic hepatitis C virus infection. *New England Journal of Medicine*, *347*(13), 975-982.
- 37.Samuel, C. E. (2001). Antiviral actions of interferons. *Clinical Microbiology Reviews*, *14*(4), 778-809.
- 38.McLean, H. Q., Fiebelkorn, A. P., Temte, J. L., & Wallace, G. S. (2013). Prevention of measles, rubella, congenital rubella syndrome, and mumps, 2013: summary recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). *MMWR Recommendations and Reports*, *62*(RR-04), 1-34.
- 39.Rubin, L. G., Levin, M. J., Ljungman, P., et al. (2014). 2013 IDSA clinical practice guideline for vaccination of the immunocompromised host. *Clinical Infectious Diseases*, *58*(3), e44-e100.
- 40.Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). (2023). Recommended adult immunization schedule for ages 19 years or older, United States, 2023.
- 41.American Academy of Pediatrics. (2021). Red Book: 2021–2024 Report of the Committee on Infectious Diseases (32nd ed.). AAP.
- 42.Rota, P. A., Brown, K., Mankertz, A., et al. (2011). Global distribution of measles genotypes and measles molecular epidemiology. *Journal of Infectious Diseases*, *204*(Suppl 1), S514-S523.
- 43.Hummel, K. B., Lowe, L., Bellini, W. J., & Rota, P. A. (2006). Development of quantitative gene-specific real-time RT-PCR assays for the detection of measles virus in clinical specimens. *Journal of Virological Methods*, *132*(1-2), 166-173.
- 44.World Health Organization. (2024). Measles. Fact sheet.WHO.
- 45.Sarin, S. K., Choudhury, A., Sharma, M. K., et al. (2016). Acute-on-chronic liver failure: consensus recommendations of the Asian Pacific Association for the Study of the Liver (APASL) 2014. *Hepatology International*, *10*(1), 1-23.
- 46.Siegel, J. D., Rhinehart, E., Jackson, M., Chiarello, L., & the Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee. (2007). 2007 Guideline for Isolation Precautions: Preventing Transmission of Infectious Agents in Healthcare Settings. Centers for Disease Control and Prevention.

Иқтибос учун: Мирзажонова Д.Б., Чўлиева Н.Ф., Махаммаджонов И.А., Акбаров Н.Ш. Сурункали вирусли гепатит В беморларда қизамиқнинг клиник кечиши: тизимли шарҳ // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси*. – 2026. – № 4(24). – Б. 1022–1027. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20063506>

МУНДАРИЖА // СОДЕРЖАНИЕ // CONTENTS

Акбаров М.М., Султанов А.И., Мардонов Ж.Н. Клиническая эффективность низкоинтенсивной лазерной терапии (НИЛТ) при лёгком остром панкреатите	3	Akbarov M.M., Sultanov A.I., Mardonov J.N. Clinical efficacy of low-intensity laser therapy (LILT) in mild acute pancreatitis
Исматова Л.М., Индиаминова Г.Н. Қозғоноқ парданинг туғруққача йиртилишининг неонатал натижалари	9	Ismatova L.M., Indiaminova G.N. Neonatal outcomes of premature rupture of membranes
Сабирова Д.Б., Ризаев Ж.А. Факоген глаукома билан оғриган беморларни кузатиш ва реабилитация қилишининг замонавий усуллари	13	Sabirova D.B., Rizayev J.A. Modern methods of follow-up and rehabilitation of patients with phacogenic glaucoma
Исмоилов И.Б. Бош миЯ глиомаларини магнит-резонанс томография асосида диагностика қилишининг замонавий жиҳатлари ва сунъий интеллект технологияларининг роли	18	Ismoilov I.B. Modern aspects of diagnosing brain gliomas based on magnetic resonance imaging and the role of artificial intelligence technologies
Содиқов Ҳ.К., Насриддинов Б.З. Жигарнинг хавфли ва хавфсиз ўсмаларини МСКТ тасвирлари асосида дифференциал диагностика қилишда сунъий интеллектнинг аҳамияти	23	Sodiqov H.K., Nasriddinov B.Z. The significance of artificial intelligence in the differential diagnosis of malignant and benign liver tumors based on MSCT images
Рузиева Г.М., Джумаев К.Ш. Сурункали ис газли таъсирида бачадоннинг микротомир ва гистологик ўзгаришлари	27	Ruziyeva G.M., Djumayev K.Sh. Histological and microvascular changes in the uterus under chronic carbon monoxide exposure
Азимбегова С.Н. Ингибиторы АПФ и сартаны: сравнительный анализ в клинической практике	31	Azimbegova S.N. ACE inhibitors and sartans: a comparative analysis in clinical practice
Қорёғдиев А.З., Ибрагимов Н.К. Уч шохли нервдаги нейрожарроҳлик аралашувларидан кейинги қўнғил айниши ва қусиш профилактикасини оптималлаштириш	34	Qoryogdiyev A.Z., Ibragimov N.K. Optimization of postoperative nausea and vomiting prevention following neurosurgical interventions on the trigeminal nerve
Тожибоева Д.М., Нажмутдинова Д.Қ. Жанубий Оролбўйи шариоотида сурункали юрак етишмовчилиги (СЮЕ) бўлган ва тери орқали коронар аралашув (ТОКА) ўтказган беморларда 2 тур қандли диабет терапиясини оптималлаштириш	41	Tojiboeva D.M., Najmutdinova D.Q. Optimization of type 2 diabetes therapy in patients with chronic heart failure (CHF) who underwent percutaneous coronary intervention (PCI) in the Southern Aral sea region
Сулайманова Н.Э. Сурункали буйрак касаллиги турли даволаш босқичларида бўлган кекса ёшдаги беморларда саркопения ва травмалар билан bogлиқ ҳолатлар	46	Sulaymanova N.E. Sarcopenia and trauma in elderly patients with chronic kidney disease at different stages of treatment
Лутфуллаев Ғ.У., Қобилова Ш.Ш., Исматова Ж.Т., Авалбоев Т.Ш., Мингбоев А.А. Юқори нафас йўлларининг инфекцион зарарланишларини педиатрия амалиётида даволаш	49	Lutfullayev G.U., Kobilova Sh.Sh., Ismatova Zh.T., Avalboyev T.Sh., Mingboyev A.A. Therapy of infectious lesions of the upper respiratory tract in pediatric practice
Маматова М., Турсунбоева А., Курбанова М., Рахимова М. Методы изучения структуры и функционального состояния мегакариоцитов	55	Mamatova M., Tursunboeva A., Kurbanova M., Rakhimova M. Methods for studying the structure and functional state of megakaryocytes
Джураев М.Г., Азимова С.Б., Василевский Э.А., Дадабаев О.Т. Клинико-лабораторная характеристика различных форм цитомегаловирусной инфекции в популяции Ферганской долины	60	Djuraev M.G., Azimova S.B., Vasilevskiy E.A., Dadabaev O.T. Clinical and laboratory characteristics of various forms of cytomegalovirus infection in the population of the Fergana valley

Абдирашидова Г.А. Иммун тизими регуляциясида тромбоцитлар аҳамияти	65	Abdirashidova G.A. The importance of thrombocytes in the regulation of the immune system
Ризаев Ж.А., Орипов Ф.С., Зейнитдинова З.А. Метаболический синдром: патогенетические механизмы, морфофункциональные изменения и влияние на челюстно-лицевую область	69	Rizaev J.A., Oripov F.S., Zeynitdinova Z.A. Metabolic syndrome: pathogenetic mechanisms, morphofunctional changes, and impact on the maxillofacial region
Камолов С.Ж., Ахмедов Г.К. Ўн икки бармоқ ичак яра касаллиги тешилиши асоратларини таххислаш ва даволаш асослари	78	Kamolov S.J., Axmedov G.K. Fundamentals of diagnostics and treatment of perforative associations of duodenal ulcer disease
Мухамедова М.С., Эркаева Г.Р. Лечение стоматита, возникающего при вирусных заболеваниях у детей, с применением бактериофаговых препаратов	82	Mukhamedova M.S., Erkaeva G.R. Treatment of stomatitis caused by viral diseases in children using bacteriophage drugs
Тураев Б.Т. Кимёвий аддиктив бузилишларда реабилитация жараёнида қон ва сийдик биокимёвий кўрсаткичларининг когнитив ва психоэмоционал бузилишлар билан ўзаро боғлигини таҳлил қилиш	87	Turaev B.T. Analysis of the relationship between blood and urine biochemical markers and cognitive and psychoemotional impairments in patients with chemical addiction during rehabilitation
Ахмедова Ш.У., Эгамбердиева Д.А. Кишечная микробиота как фактор триггирования системного воспаления при ревматоидном артрите	91	Ahmedova Sh.U., Egamberdieva D.A. Intestinal microbiota as a triggering factor for systemic inflammation in rheumatoid arthritis
Ахтамов А., Раджабов А.Б. Каламушлар ошқозон ости безининг постнатал онтогенез давридаги морфологик параметрларининг динамик ўзгаришлари	94	Akhtamov A., Radjabov A.B. Dynamic changes in the morphological parameters of the rat pancreas during postnatal ontogenesis
Дмитровский А.М., Оспанбекова Н.К., Сейдуллаева Л.Б., Сыздыков М.С. Первично-генерализованная форма иерсиниозов	98	Dmitrovsky A.M., Ospanbekova N.K., Seidullaeva L.B., Syzdykov M.S. Primary generalized form of yersiniosis
Соловьёва Н.П., Скляр Л.Ф., Феклисова Л.В., Ушакова А.Ю., Репина И.Б. Лихорадка чикунгунья: глобальный вызов и реальность в России	102	Solovyova N.P., Sklyar L.F., Feklisova L.V., Ushakova A.Yu., Repina I.B. Chikungungia fever: a global challenges and the reality in Russia
Логинава О.П., Шевченко Н.И., Гасич Е.Л., Воропаева А.В. Особенности вагинальной микробиоты при ВПЧ-ассоциированной и ВПЧ-независимой цервикальной дисплазии	106	Lohinava V.P., Shevchenko N.I., Gasich E.L., Voropayeva A.V. Features of vaginal microbiota in HPV-associated and HPV-independent cervical dysplasia
Алекешева Л.Ж., Юсупов Ш.Р., Матназарова Г.С. Инфекционные болезни как угроза прошлого и вызовы настоящего	113	Alekesheva L.Zh., Yusupov Sh.R., Matnazarova G.S. Infectious diseases as a threat to the past and challenges to the present
Курбанова Н.С. Инсулинорезистентность и ожирение у подростков: современные клинико-метаболические маркеры раннего риска сахарного диабета 2 типа	118	Kurbanova N.S. Insulin resistance and obesity in adolescents: modern clinical and metabolic markers of early risk of type 2 diabetes
Саттарова Х.Г. Ўзбекистоннинг марказий вилоятларидаги тери лейшманиози бўлган беморларда цитокинлар даражасидаги ўзгаришлар таҳлили	123	Sattarova H.G. Analysis of changes in cytokine levels in patients with cutaneous leishmaniosis in the central regions of Uzbekistan
Бабаева А.И., Алиева Д.А. ОПВ-мусбат ва ОПВ-манфий бачадон бўйни дисплазияли бемор аёлларда қин микробиоценози	127	Babaeva A.I., Alieva D.A. Vaginal microbiocenosis in women with cervical dysplasia with HPV-positive and HPV-negative status

Азимбегова С.Н. Пульс-терапия глюкокортикостероидами: клинико фармакологический анализ	132	Azimbegova S.N. Glucocorticosteroid pulse therapy: a clinical and pharmacologic analysis
Анваров А.А., Хайдарова С.Х. Самарқанд вилояти футбол академиясида тизза бўғими жароҳатлари мавжуд футболчиларда реабилитация дастурини баҳолаш ва такомиллаштириши	135	Anvarov A.A., Khaydarova S.Kh. Assessment and improvement of the rehabilitation program for football players with knee joint injuries at the Samarkand region football academy
Камолов С.Ж., Ахмедов Ғ.К. Перфоратив ўн икки бармоқ ичак яраларни замонавий таъхислаш ва даволаш усуллари	140	Kamolov S.J., Axmedov G`K. Modern methods of diagnostics and treatment of perforated duodenal ulcers
Боймаматова П.Ф. Морфометрические изменения нейронов при гипоксии	145	Boymamatova P.F. Morphometric changes in neurons during hypoxia
Шакирова Н.С., Ахмедов Ф.Х., Жумаева М.М. Ультразвуковая диагностика мочекаменной болезни	149	Shakirova N.S., Akhmedov F.Kh., Jumaeva M.M. Ultrasound diagnosis of urolithiasis
Адизов С.Р., Абдуллаева М.А. Ис газининг организмга таъсири (адабиётлар шарҳи)	156	Adizov S.R., Abdullaeva M.A. Effects of carbon monoxide on the body (literature review)
Муминов Ш.К., Усмонов Д.А., Абдуразакова З.К. Влияние розувастатина на показатели портальной гипертензии у пациентов с циррозом печени	163	Muminov Sh.K., Usmonov D.A., Abdurazakova Z.K. Effect of rosuvastatin on portal hypertension parameters in patients with liver cirrhosis
Анваров А.А., Ирбутаева Л.Т. Современные методы реабилитации после травм коленного сустава у футболистов (обзор литературы)	169	Anvarov A.A., Irbutaeva L.T. Modern methods of rehabilitation after knee joint injuries in football players (literature review)
Рустамова Ш.А. Самарқанд вилояти туманлари кесимида ўтқир ичак инфекцияларининг учрашини таҳлил қилиш (2014-2024 йил)	174	Rustamova Sh.A. Analysis of the incidence of acute intestinal infections in the samarkand region (2014-2024)
Ғайбуллаев Ф.Х. Висцерал лейшманиоз – диагностика ва даволашининг замонавий ёндашувлар: адабиётлар шарҳи	179	Gaybullayev F.Kh. Visceral leishmaniasis – modern approaches in diagnosis and treatment: literature review
Қодирова Г.А., Ташпулатова Ш.А., Рустамов Ж.Ж. Сурункали HDV-инфекцияси фони ривожланган жигар стеатозиди диетали модификациялар ва клиник-биокимёвий натижалар	187	Kodirova G.A., Tashpulatova Sh.A., Rustamov J.J. Dietary modifications and clinical and biochemical results in developed liver steatosis with a chronic HDV infection
Ибадуллаева Н.С., Ходжаева М.Э., Хикматуллаева А.С., Кан Н.Г. Ассоциация полиморфизма гена IL10 –1082C>T rs1800896 с прогрессированием HDV-инфекции	193	Ibadullaeva N.S., Khodjaeva M.E., Khikmatullaeva A.S., Kan N.G. Association of the IL10 –1082C>T rs1800896 gene polymorphism with the progression of HDV-infection
Киселева В.В., Хмелевской В.И., Евдокимова В.А. Listeria monocytogenes как этиологический агент менингита: разбор клинического случая	197	Kiseleva V.V., Khmelevskoy V.I., Evdokimova V.A. Listeria monocytogenes as an etiological agent of meningitis: analysis of a clinical case
Атоева М.А. Роль педагогических кадров в системе допризывной подготовки: анализ готовности к работе с подростками и восприятия их здоровья	201	Atoyeva M.A. The role of teaching staff in the pre-conscription training system: analysis of willingness to work with adolescents and perception of their health
Абдирашидова Г.А., Жабборова Г.С. I-тип қандли диабетда семириш патофизиологияси	206	Abdirashidova G.A., Jabborova G.S. Pathophysiology of obesity in type i sugar diabetes

Кудря А.А., Шевченко Н.И., Логинова О.П., Гасич Е.Л. <i>C.difficile-ассоциированная инфекция: клинико-эпидемиологическое исследование у пациентов онкогематологического профиля</i>	211	Kudrya A.A., Shevchenko N.I., Loginova O.P., Gasich E.L. <i>C.difficile-associated infection: a clinical and epidemiological study in patients with oncohematological diseases</i>
Маматова М.Н., Хикматова М.Т., Олмасова Л.Б., Болтаева М.А. <i>Фагоцитарная активность нейтрофилов</i>	218	Mamatova M.N., Khikmatova M.T., Olmasova L.B., Boltaeva M.A. <i>Phagocytic activity of neutrophils</i>
Курбанова Н.С. <i>Клинико-диагностическое значение 1-часовой гликемии при оральном глюкозотолерантном тесте у пациентов с предиабетом и ожирением</i>	221	Kurbanova N.S. <i>Clinical and diagnostic significance of 1-hour glicemia during oral glucosotolerant test in patients with prediabet and obesity</i>
Вахобов А.А. <i>Зооноз тери лейшманиозининг клиник кечии хусусиятлари</i>	225	Vakhobov A.A. <i>Features of the clinical current of zoonous skin leishmaniosis</i>
Губайдулина Г.Р. <i>ВИЧ-инфекция в сочетании с туберкулезом легких: клинико-лабораторные особенности и персонализированная терапия на современном этапе</i>	229	Gubaydulina G.R. <i>HIV infection and co-occurring pulmonary tuberculosis: current clinical and laboratory features and personalized therapy</i>
Облокулов А.А., Бобомуротова М.Н. <i>Сурункали вирусли гепатит С нинг жигардан ташиқари клиник кўринишларида клиник-биокимёвий кўрсаткичлари хусусиятлари</i>	235	Oblokulov A.A., Bobomuratova M.N. <i>Clinical and biochemical characteristics of extra-hepatic manifestations of chronic hepatitis C</i>
Эргашов М.М. <i>SARS-CoV-2 инфекциясида антибиотик терапиясини бошқаришда прокальцитониннинг клиник аҳамияти ва қўлланилиши</i>	241	Ergashov M.M. <i>Clinical significance and use of procalcitonin for guiding antibiotic therapy in SARS-CoV-2 infection</i>
Джалалова Н.А., Атамухамедова Д.М. <i>Поражение печени при коронавирусной инфекции</i>	248	Djalalova N.A., Atamuxamedova D.M. <i>Liver damage associated with coronavirus infection</i>
Боймаматова П.Ф. <i>Морфофункциональные изменения нейронов при ишемическом инсульте</i>	253	Boimamatova P.F. <i>Morphofunctional changes in neurons in ischemic stroke</i>
Маматова М.Н., Жумабоева Ю.О., Шавкатова М.Ш. <i>Лабораторный метод определения количества дифтерийных бактерий в ротовой полости</i>	258	Mamatova M.N., Zhumaboeva Yu.O., Shavkatova M.Sh. <i>Laboratory method for determining the number of diphtheria microbes in the oral cavity</i>
Шукуров А.Ф., Шукурова Н.Т. <i>Стоматологик ёрдамда бемор ҳуқуқларини таъминлашнинг ҳозирги ҳолати</i>	261	Shukurov A.F., Shukurova N.T. <i>Current state of ensuring patient rights in dental care</i>
Махмудова И.А., Тугизова Д.И. <i>Роль миомы матки и состояния шейки матки в нарушении фертильности</i>	265	Makhmudova I.A., Tugizova D.I. <i>The role of uterine fibroids and cervical conditions in fertility disorders</i>
Умирова С.М., Бебитова Ш.Э. <i>Клиническая эффективность применения кинезиотейпа при хронических болевых синдромах</i>	272	Umirova S.M., Bebitova Sh.E. <i>Clinical effectiveness of kinesiotaping in chronic pain syndromes</i>
Атамухамедова Д.М., Джалалова Н.А. <i>Реабилитация пациентов после коронавирусной инфекции в амбулаторных условиях: систематический обзор</i>	276	Atamuxamedova D.M., Djalalova N.A. <i>Rehabilitation of patients after coronavirus infection in outpatient settings: a systematic review</i>
Хайруллина А.Х. <i>Клинические особенности цитомегаловирусной инфекции у пациентов с ВИЧ-инфекцией</i>	281	Xayrullina A.X. <i>Cytomegalovirus infection in the occurens of colitis in patients with HIV infection</i>
Бурибаева Б.И. <i>Оценка терапевтических стратегий при эшерихиозах у детей</i>	284	Buribaeva B.I. <i>Evaluation of treatment strategies for escherichiosis in children</i>

Сидикова Г.Ш. Сравнительная характеристика морфометрических параметров тонкой кишки при травматических повреждениях спинного мозга различной степени тяжести	290	Sidikova G.Sh. Comparative characteristics of morphometric parameters of the small intestine in spinal cord injuries of different severity levels
Саъдуллаева М.Н., Баратова М.С. Тиббиёт коллежи талабалари орасида тана массаси индекси ва овқатланиш одатларининг таҳлили	296	Sa'dullayeva M.N., Baratova M.S. Analysis of body mass indeks indicators and dietary habits among female students of medical college
Каримов К.Р., Шодиева М.С. Морфологические изменения при язвенно-некротическом энтероколите	300	Karimov K.R., Shodiyeva M.S. Morphological changes in necrotizing enterocolitis
Кадилов С.К., Кадилов К.У. Судебно-медицинские аспекты анализа внезапной детской смертности	304	Kadirov S.K., Kadirov K.U. Forensic aspects of sudden infant death analysis
Сайфиддинова Ф.О., Яхёева Х.Ш. Механизмы развития узлового зоба и диагностические маркеры при дисфункции щитовидной железы	308	Sayfiddinova F.O., Yahyoeva H.Sh. Mechanisms of nodular goiter development and diagnostic markers in thyroid dysfunction
Пардаева З.С. Гийен-Барре синдромининг патогенези, клиникаси ва диагностикаси	313	Pardayeva Z.S. Pathogenesis, clinical picture, and diagnosis of Guillain-Barré syndrome
Равшанова М.З., Исакулов Э.Қ., Зоирова С.Ш. Тўғриқ бўғими шикастланишларида ҳаракат функциясини тиклашда ушш диагностикасини қўллаш	318	Ravshanova M.Z., Isakulov E.Q., Zoirova S.Sh. Application of ultrasound diagnostics in the restoration of motor function in ankle joint injuries
Караматуллаева З.Э. Клинические особенности течения протеоза у новорожденных детей	324	Karamatullayeva Z.E. Clinical features of the course of proteosis in newborn children
Облокулов А.Р., Тагаева Л.М. Определение ассоциации степени тяжести Covid-19 с неалкогольной жировой болезнью печени	327	Oblokulov A.R., Tagaeva L.M. Determining the association of Covid-19 severity with non-alcoholic liver fat disease
Рашидова Г.Ў. Бруцеллёзда яллигланиш маркерларининг аҳамияти: диагностика, прогноз, мониторинг, дифференциал диагностика ва даволаш масалалари	332	Rashidova G.U. The importance of inflammation markers in brucellosis: diagnostic, prognostic, monitoring, differential diagnosis, and treatment considerations
Амлаев К.Р., Атоева М.А. Состояние здоровья подростков 15 - 17 лет и система медицинской помощи молодёжи в Республике Узбекистан по данным вторичного анализа	336	Amlayev K.R., Atoeva M.A. The health status of 15-17 year-old adolescents and the system of medical care for youth in the Republic of Uzbekistan based on secondary analysis
Дўстова Н.Қ., Салимова Т.Б. Гипертензив касалликларга чалинган ҳомиладор аёлларда эндотелиал дисфункция юзага келишида ўтқир респиратор инфекцияларнинг роли: қисқача шарҳ	343	Dustova N.K., Salimova T.B. The role of acute respiratory infections in the occurrence of endothelial dysfunction in pregnant women with hypertensive diseases: a brief overview
Анваров А.А., Бурханова Г.Л., Шермамедова К.Т. Профессионал футболчиларда тизза бўғими жароҳатларидан кейин ривожланадиган асоратлар ва уларни олдини олиш учун ўтказиладиган реабилитацион чора-тадбирлар	350	Anvarov A.A., Burkhanova G.L., Shermamedova K.T. Complications developing after knee joint injuries in professional football players and rehabilitative measures for their prevention
Хайдарова С.Х. МНС перинатал шикастланиши бўлган болаларда бронхиял астмани даволаш комплекс дастурининг ўпканинг вентилиацион функциясида таъсирини баҳолаш	357	Haydarova S.H. Evaluating the impact of a comprehensive treatment program for bronchial asthma on the pulmonary ventilation function in children with perinatal CNS injury

Равшанова М.З., Бобобекова У.К., Абдуллаева Г.Д. Тўғиқ бўғими травмаларида ноинвазив реабилитация усуллари: кинезотерапия ва кинезиотейп	363	Ravshanova M.Z., Bobobekova U.K., Abdullayeva G.D. Non-invasive rehabilitation methods in ankle joint injuries: kinesiotherapy and kinesiotaping
Умарова Ш.Ж., Сайфутдинова З.А. Лабораторная диагностика изменения уровня витамина D при хроническом панкреатите на автоматическом анализаторе AFIAS	369	Umarova SH.J., Sayfutdinova Z.A. Laboratory diagnosis of changes in vitamin D levels in chronic pancreatitis using the automatic analyzer AFIAS
Атоева М.А., Хакимов Т., Комилова А.А. Ноинфекцион касалликлар эпидемик жараёнини экологик омиллар таъсирида ўзгариши	378	Atoyeva M.A., Hakimov T.B., Komilova A.A. Changes in the epidemic process of non-infectious diseases under the influence of environmental factors
Абдирашидова Г.А., Насимова Д.И. Юрак-қон томир касалликларининг стрессга боғлиқлиги патофизиологияси	384	Abdirashidova G.A., Nasimova D.I. Pathophysiology of stress-dependent cardiovascular diseases
Умирова С.М., Бебитова Ш.Э. Кинезиотейпнинг мотор функцияларни тиклашидаги ўрни: инсулдан кейинги беморлар мисолида	389	Umirova S.M., Bebitova Sh.E. The role of kinesiotaping in motor function recovery in post-stroke patients
Хайдарова С.Х., Ортикова П.Ф. Марказий асаб тизимининг перинатал шикастланиши оқибатлари фонида БА билан оғриган болаларни даволашининг ўзига хос хусусиятлари	394	Haydarova S.H., Ortikova P.F. Specific features of treating children with BA amidst the consequences of perinatal injury to the central nervous system
Ўроков Ш.Т., Саидов С.М. Сурункали диффуз жигар касалликлари мавжуд бўлган кекса ва қарилик ёшидаги беморларда кўйиш касаллигининг клиник кечиши	401	Urokov Sh.T., Saidov S.M. Clinical course of burn disease in elderly and senile patients with chronic diffuse liver diseases
Қудратова З.Э., Худайбакова М.И. Урогенитал уреоплазма инфекциясининг клиник ва лаборатор диагностикаси	405	Kudratova Z.E., Xudaybakova M.I. Clinical and laboratory diagnosis of urogenital ureaplasma infection
Абдуллаев Х.Д. Сравнительный анализ эффективности биологических препаратов при тяжёлых формах псориаза	409	Abdullayev X.D. Comparative analysis of the efficiency of biological preparations in severe forms of psoriasis
Нарзикулов Р.М., Рузиев К.Т., Номанходжаев Б.Ш. Дифференциальная диагностика инфекционных и неинфекционных дерматозов	414	Narzikulov R.M., Ruziev K.T., Nomankhodzhaev B.Sh. Differential diagnosis of infectious and non-infectious dermatoses
Наврүзов Э.Р., Олларов А.А. Бўйрак-тош касалликларда замонавий даволаш усулларида масофавий тош майдалаш (ESWL)дан фойдаланиш самарадорлиги	418	Navruzov E.R., Ollayarov A.A. The effectiveness of extracorporeal shock wave lithotripsy (ESWL), a modern treatment method, for urolithiasis
Хамдамов Б.З., Бадриддинов А.С. Показатели цитокинового статуса у больных с переломами длинных трубчатых костей в постковидный период	421	Khamdamov B.Z., Badriddinov A.S. Cytokine status indicators in patients with long-term bone fractures in the post-covid period
Давронова З.М., Қудратова З.Э. Репродуктив ёшидаги аёлларда темир танқислиги камқонлиги шароитида иммун тизим кўрсаткичларининг ўзгариши	427	Davronova Z.M., Kudratova Z.E. Changes in immune system parameters in women of reproductive age with iron deficiency anemia
Исоқулов Т.У., Некрасов А.С., Ерлаев Н.Ф. Клиническое значение прогностической модели стратификации риска развития локальных осложнений кишечной стомы	434	Isokulov T.U., Nekrasov A.S., Yorlayev N.F. Clinical significance of a predictive model for risk stratification of local complications in patients with intestinal stomas

Муратова С.К., Ражабов Ш.О., Норкизилов Х.А., Зокиров А.Х. Актуальные аспекты лечения и профилактики стоматологических заболеваний при сердечно-сосудистой патологии (обзор литературы)	442	Muratova S.K., Rajabov Sh.O., Norkizilov Kh.A., Zokirov A.Kh. Actual aspects of treatment and prevention of dental diseases in cardiovascular pathologies (literature review)
Оллаяров А.А., Наврузов Э.Р. Буйрак тош касалликларда персонализациялашган терапия асосида тош таркибини аниқлашнинг диагностик ва клиник аҳамияти	444	Ollayarov A.A., Navruzov E.R. The diagnostic and clinical significance of determining stone composition for personalized therapy in urolithiasis
Абдуллаев Х.Д. Современные аспекты диагностики и лечения псориаза у пациентов молодого возраста	447	Abdullayev X.D. Modern aspects of diagnostics and treatment of psoria in young patients
Нарзикулов Р.М., Эшонкулов С.Х. Хронические дерматозы как фактор снижения качества жизни пациентов	452	Narzikulov R.M., Eshonkulov S.X. Chronic dermatoses as a factor of patient life quality decrease
Абдукахарова Д.А., Аскарова З.З. Клинико-прогностическая оценка репродуктивной функции после коагуляции шейки матки	457	Abdukaxarova D.A., Askarova Z.Z. Clinical and prognostic assessment of reproductive function after cervical coagulation
Музаффарова Н.Ш., Гулмуродов Б.Н. Бош миёда қон айланишининг сурункали бузилишларида замонавий реабилитация усуллари-нинг клиник ва когнитив самарадорлиги	462	Muzaffarova N.Sh., Gulmurodov B.N. Clinical and cognitive effectiveness of modern rehabilitation methods in chronic cerebral circulatory disorders
Муратова С.К., Хушвактов А.Б., Косимова М.О., Асролова Ж., Шербекон Б.А. Юрак-қон томир касалликлари фониди стоматологик касалликларни даволаш ва профилактика чораларини такомиллаштириши	466	Muratova S.K., Khushvaktov A.B., Kosimova M.O., Asrolova J., Sherbekov B.A. Improvement of treatment and prevention measures for dental diseases among cardiovascular diseases
Шарипов Ж.Р., Хамдамов Б.З. Оценка иммунновоспалительных, ангиогенных и коагуляционных маркеров у пациентов с артериальной гипертензией и ишемической болезнью сердца в зависимости от уровня высокочувствительного тропонина	469	Sharipov J.R., Khamdamov B.Z. Assessment of immunoinflammatory, angiogenic, and coagulation markers in patients with arterial hypertension and ischemic heart disease depending on high-sensitivity troponin levels
Ризаев Ж.А., Камалов А.И. Оценка доступности и качества антенатальной помощи (опрос 1000 беременных)	474	Rizaev J.A., Kamalov A.I. Assessment of availability and quality of antenatal care (survey of 1,000 pregnant women)
Хамдамов Б.З., Оллоков А.Ф. Гнойно-воспалительные осложнения неспецифического язвенного колита	477	Xamdamov B.Z., Ollokov A.F. Purulent-inflammatory complications of non-specific ulceral colitis
Юлдашева Д.О., Хатамов Э.Б. Подготовка пациентов с дефектом нижней челюсти с применением аутотрансплантатов	493	Yuldasheva D.O., Khatamov E.B. Preparation of patients with mandibular defects using autotransplants
Ирбутаева Л.Т. Эффективность двигательной активности в формировании показателей физического развития детей среднего школьного возраста	500	Irbutaeva L.T. The effectiveness of physical activity in the formation of physical development indicators in children of middle school age
Абдуллаев Х.Д. Клинико-морфологические особенности различных клинических форм красного плоского лишая	504	Abdullayev X.D. Clinical and morphological characteristics of various clinical forms of flat red skin
Нарзикулов Р.М., Пак У.И. Клинико-эпидемиологические особенности инфекционных дерматозов в современных условиях	509	Narzikulov R.M., Pak U.I. Clinical and epidemiological features of infectious dermatoses in modern conditions
Ризаев Ж.А., Шодикулова Г.З., Пулатов У.С., Хасанов О.Г. Ревматологик касалликлар шаклланишининг хавф омилларини комплекс баҳолаш	514	Rizayev J.A., Shodikulova G.Z., Pulatov U.S., Khasanov O.G. Comprehensive assessment of risk factors for the development of rheumatologic diseases

Қобилжонова С.К., Аскарова З.З. Репродуктив ёшдаги аёлларда аденомиознинг эрта диагностикасида компрессион эластография усулининг самарадорлиги	521	Kobiljonova S.K., Askarova Z.Z. Effectiveness of compression elastography in the early diagnosis of adenomyosis in women of reproductive age
Муратова С.К., Абдираймов А.А., Хуррамов Б., Наймов Н.О., Мансуров М.Д. Юрак-қон томир касалликлари бўлган беморларда стоматологик касалликларни даволаш ва профилактика усуллари тақомиллаштириши	529	Muratova S.K., Abdiraimov A.A., Khurramov B., Naimov N.O., Mansurov M.D. Improvement of treatment and prevention methods of dental diseases in patients with cardiovascular diseases
Музаффарова Н.Ш., Норбеков Р.А., Турсунов Э.И. Рақамли даврда Brain fog синдроми: ёш популяцияда когнитив функцияларнинг субклиник пайсаяиши	531	Muzaffarova N.Sh., Norbekov R.A., Tursunov E.I. Brain fog syndrome in the digital era: subclinical decline of cognitive functions in the young population
Намозова Г.И., Тураханов И.Н., Комилжонова С.Г. Роль катехоламинов в патогенезе различных форм шока: от адаптации к повреждению	535	Namozova G.I., Turakhanov I.N., Komiljonova S.G. The role of catecholamines in the pathogenesis of various forms of shock: from adaptation to damage
Эранов Ш.Н., Мухторов Д.С., Абдиев Н.О. Современный взгляд на диагностику и лечение дисплазии тазобедренного сустава у новорожденных	541	Eranov Sh.N., Mukhtorov D.S., Abdiev N.O. Modern approach to the diagnosis and treatment of hip dysplasia in newborns
Саидов М.А., Рошан А.А., Хасанбоев С.Х. Сон суяги бошчасининг аваскуляр некрози бўйича адабиётлар таҳлили	546	Saidov M.A., Roshan A.A., Hasanboev S.Kh. Literature review on avascular necrosis of the femoral head
Тешаев Ш.Ж., Болтаева З.Ф. Характеристика тканевой организации бронхов и лёгких у белых беспородных крыс при отсутствии патологических изменений	549	Teshayev Sh.Zh., Boltaeva Z.F. Characterization of the tissue organization of the bronchi and lungs in white outbred rats in the absence of pathological changes
Зокиров В.З., Файзуллаева Г.И. Ноалкогол ёғли јисгар касаллигида липид алмашинуви бузилишларининг генетик детерминантлари: замонавий адабиётлар таҳлили	555	Zokirov V.Z., Fayzullayeva G.I. Genetic determinants of lipid metabolism disorders in non-alcoholic fatty liver disease: a contemporary literature review
Ризаев Ж.А., Шодикүлова Г.З., Пулатов У.С., Хасанов О.Г. Формирование прогностических критериев неблагоприятного течения ревматологических заболеваний	560	Rizayev J.A., Shodikulova G.Z., Pulatov U.S., Khasanov O.G. Development of prognostic criteria for unfavorable course of rheumatologic diseases
Исматова М.Н., Исроилов И.И. Метаболик синдром билан оғриган беморларда сурункали бўйрак касаллигининг эрта босқичларини аниқлашда цистатин-С, НГАЛ ва микроалбуминурия маркерларининг қийсий диагностика аҳамияти	570	Ismatova M.N., Isroilov I.I. Comparative diagnostic value of cystatin-C, NGAL and microalbuminuria markers in early detection of chronic kidney disease in patients with metabolic syndrome
Исмоилов Ж.М., Мусурмонова М.С. Туғма юрак нуқсонларини секцион таҳлил орқали аниқлаш, уларнинг учраш частотаси ва морфологик хусусиятларини таҳлил қилиш	575	Ismailov J.M., Musurmonova M.S. Identification of congenital heart defects through sectional analysis, analysis of their frequency and morphological characteristics
Усмонов Р.Ф. Ёноқ-юқори жағ-кўз косаси комплексининг посттравматик деформацияларини бир вақтнинг ўзида коррекция қилиш	582	Usmanov R.F. Simultaneous correction of post-traumatic deformities of the zygomaticomaxillary-orbital complex
Эшнйёзова Д.Ў., Даминов Ф.А., Қудратова З.Э. Гепатит В га эмлашдан кейинги химоя даражаси ва унинг давомийлигини лаборатор текширувлар асосида баҳолаш	588	Eshniyozova D.U., Daminov F.A., Kudratova Z.E. Assessment of the level of protection after hepatitis B vaccination and duration based on laboratory tests

Эранов Н.Ф., Мухторов Д.С., Абдиев Н.О. Врожденный вывих надколенника: современное состояние проблемы, диагностика и подходы к лечению	594	Eranov N.F., Mukhtorov D.S., Abdiev N.O. Congenital patellar dislocation: current state of the problem, diagnosis, and treatment approaches
Ибрагимова М.Ш. Спастик церебрал фалажли беморларда индивидуаллаштирилган кинезитерапияда электро-нейромиография маълумотларидан фойдаланишининг илмий асослари	599	Ibragimova M.Sh. Scientific foundations for the use of electroneuromyography data in individualized kinesitherapy for patients with spastic cerebral palsy
Муминова А.Ю. Гиполипидемическая терапия при сочетании ИБС и сахарного диабета 2 типа: современные возможности и перспективы	603	Muminova A.Yu. Hypolipidemic therapy in combination with coronary heart disease and type 2 diabetes mellitus: current opportunities and prospects
Тогаета Г.С. Аёллар репродуктив сестемаси сурункали стресс шароитида нейроэндокрин бошқарилиши	612	Togayeva G.S. Neuroendocrine regulation of the female reproductive system under conditions of chronic stress
Пўлатова Ш.Х. Артериал гипертензияли беморларда сурункали юрак етишмовчилигини эрта таъхис қилишда мия натриуретик даражадаги пептидларнинг аҳамияти	616	Pulatova Sh.H. The value of the brain natriuretic level peptides in the early diagnosis of chronic heart failure in patients with arterial hypertension
Рустамова Р.Б., Қудратова З.Э., Рустамова Г.Р. Болаларда цитомегаловирус этиологияли сурункали тонзиллитнинг клиник-лаборатор хусусиятлари	619	Rustamova R.B., Kudratova Z.E., Rustamova G.R. Specific clinical and laboratory aspects of chronic tonsillitis of cytomegalovirus etiology in children
Ҳайдаров М.М. Болаларда ўткир ичак инфекцияларини даволашда замонавий ёндашувлар самарадорлиги	623	Haydarov M.M. Effectiveness of modern approaches in the treatment of acute intestinal infections in children
Мухамедова Ш.Т., Ачилова Д.Н., Ганиева Ш.Ш., Садуллоева И.К., Наймова Ш.А., Рустамов Б.Б., Жумаев Ф.Э., Касимова Н.А. Систематический обзор инсектной аллергии у детей: диагностические инновации и результаты иммунотерапии с акцентом на перспективы Центральной Азии	626	Mukhamedova Sh.T., Achilova D.N., Ganieva Sh.Sh., Sadulloeva I.K., Naimova Sh.A., Rustamov B.B., Zhumaev F.E., Kasimova N.A. Systematic review of insect allergy in children: diagnostic innovations and immunotherapy outcomes with a focus on Central Asian perspectives
Жабборов З.Т., Тухсанова Н.Э. Тажрибавий микроэлементозда оқ зотсиз каламушлар жигарининг морфометрик параметрлари ўзгаришлари	632	Zhabborov Z.T., Tukhsanova N.E. Changes in the morphometric parameters of the liver of non-pedigree white rats under conditions of experimental micronutrient deficiency
Ибрагимова М.Ш., Акрамова Ф.Б. Бош мия фалажси бўлган болаларнинг локомотор функциясини яхшилаш учун комплекс реабилитация чора-тадбирлари	638	Ibragimova M.Sh., Akramova F.B. Comprehensive rehabilitation measures to improve locomotor function in children with cerebral palsy
Муминова А.Ю. Влияние комбинированной гиполипидемической терапии на достижение целевых уровней ЛПНП у пациентов с ИБС и сахарным диабетом 2 типа	646	Muminova A.Yu. The effect of combined lipid-lowering therapy on achieving target LDL levels in patients with coronary heart disease and type 2 diabetes mellitus
Каримова М.М. Катталарда сурункали риносинусит: таъхислаш ва даволаш тактикасининг танлашининг замонавий ёндашувлари	649	Karimova M.M. Chronic rhinosinusitis in adults: modern approaches to diagnosis and treatment strategy selection
Ғафуров Ф.А. Жарроҳлик усулида ошиқ-болдир бўғими жароҳатланишларини замонавий даволаш усуллари	653	Gafurov F.A. Modern methods of surgical treatment of ankle joint injuries

Тураев Т.Т., Шокиров Т.Б. Особенности возникновения и дифференциальной диагностики бронхообструктивного синдрома у детей раннего возраста в зависимости от типа питания	658	Turaev T.T., Shokirov T.B. Features of occurrence and differential diagnosis of broncho obstructive syndrome in early childhood according to the type of nutrition
Анваров А.А., Бурханова Г.Л. Профессионал футболчиларда тизза бўғими жароҳатлари диагностикасининг замонавий усуллари	662	Anvarov A.A., Burkhanova G.L. Modern methods for diagnosing knee joint injuries in professional football players
Ҳайдаров М.М. Куйиши шокда интенсив терапия усулларининг клиник патофизиологик самарадорлиги	667	Haydarov M.M. Clinical and pathophysiological effectiveness of intensive therapy methods in burn shock
Сайдалиева С.Ш., Бурханова Г.Л., Анваров А.А., Шермамедова К.Т. Комплексное применение аппарата корвита и рефлексотерапии в процессе реабилитации у больных инсультом с моторной дисфункцией	671	Saydaliyeva S.Sh., Burkhanova G.L., Anvarov A.A., Shermamedova K.T. The combined use of the corvit device and reflexotherapy in the rehabilitation of stroke patients with motor dysfunction
Исомадинова Л.К., Хамидова Ф.М. Оценка метаболических нарушений у женщин с мочекаменной болезнью с использованием системы «Литос»	677	Isomadinova L.K., Khamidova F.M. Assessment of metabolic disorders in women with urolithiasis using the "Lithos" system
Холикова А.О., Халимова Н.Ю., Жураева Ю.О. Когнитивные нарушения при функциональной гиперпролактинемии (ФГПРЛ) у женщин репродуктивного возраста в зависимости от уровня и длительности ФГПРЛ: результаты кросс секционного исследования	681	Kholikova A.O., Khalimova N.Y., Zhuraeva Y.O. Cognitive impairments in functional hyperprolactinemia (FHPRL) in women of reproductive age depending on the level and duration of FHPRL: results of a cross-sectional study
Ходжиева Д.Т., Яхёев М.С. Қандли диабет фонидаги энцефалопатияда эмоционал функциялар ўзгаришининг нейрофизиологик маркерлари	689	Khodzhiyeva D.T., Yakhyoev M.S. Neurophysiology markers of changes of emotional functions in entencephalopathy on the background of diabetes mellitus
Файзиева Н.Г., Темирова Н.Р. PM2.5 ва тамаки тутунининг комбинацияланган таъсирида ички аъзолардаги морфологик ўзгаришлар	692	Faiziyeva N.G., Temirova N.R. Morphological changes in internal organs under the combined influence of PM2.5 and tobacco smoke
Ярашев А.Р., Эшонov О.Ш., Нариманова Х.А., Ахмедов Ж.А., Машарипов С.А. Информационная значимость индекса нейтрофильно-лимфоцитарного соотношения у больных ишемическим инсультом	695	Yarashev A.R., Eshonov O.Sh., Narimanova H.A., Akhmedov Zh.A., Masharipov S.A. Informational significance of the neutrophil-lymphocyte ratio index in patients with ischemic stroke
Олтибоева Б.К., Даминов Ф.А., Қудратова З.Э. Эндометрий гиперплазиясида комбинацияланган цитологик текширувнинг диагностика аҳамияти	699	Oltiboeva B.K., Daminov F.A., Kudratova Z.E. Diagnostic significance of combined cytological examination in endometri hyperplasia
Нормирова Н.Н., Бойназарова Н.Т., Сафарова Н.И., Бойназаров С.А. Сенсоневрал оғирқулоқлик билан касалланган болаларда комплекс бузилишларнинг диагностика ва эшитишни протезлашга таъсири	703	Normirova N.N., Boynazarova N.T., Safarova N.I., Boynazarov S.A. Impact of complex disorders on diagnosis and hearing prosthesis in children with sensoneural hearing defense
Рахмонова Ш.Р., Норова М.Б. Гемодиализдаги болаларда оғиз бўйлиги муҳити ва сўлак кўрсаткичларининг стоматологик ҳолатга таъсири (адабиётлар таҳлили)	708	Rakhmonova Sh.R., Norova M.B. The impact of oral environment and salivary parameters on dental status in children undergoing hemodialysis (literature review)
Болтаева З.Ф. Никотин сақловчи маҳсулотларнинг сурункали таъсирида ўпкада прогрессив структур қайта қурилиш ва фиброз-эмфизематоз ремоделиниши	714	Boltaeva Z.F. Progressive structural reorganization and fibrotic-emphysematous remodeling of the lungs under chronic exposure to nicotine-containing products

Жарылкасынова Г.Ж., Нарзиев Л.А. Влияние иммунокорригирующей терапии на клинико гемодинамические и функциональные показатели у пациентов с ишемической болезнью сердца на фоне артериальной гипертензии	718	Zharlykassynova G.Zh., Narziev L.A. The effect of immunocorrective therapy on clinical, hemodynamic, and functional parameters in patients with ischemic heart disease associated with arterial hypertension
Арипова Т.У., Ярбеков Р.Р., Тешаев У.Ш. Профилактика неинфекционных послеоперационных осложнений аортокоронарного шунтирования	723	Aripova T.U., Yarbekov R.R., Teshaev U.Sh. Prevention of non-infectious postoperative complications of coronary artery bypass grafting
Латипов Н.М., Аляви Б.А., Абдусаторов Ж.Ж. Резистентность к гиполипидемической терапии у пациентов с ИБС после ЧКВ и пути её преодоления	730	Latipov N.M.1, Alyavi B.A.1, Abdusatorov J.J. Resistance to lipid-lowering therapy in patients with coronary heart disease after PCI and ways to overcome it
Казакова Н.Н., Курамбаева Н.Я. Жигар сурункали диффуз касалликлари бўлган беморларда оғиз бўшлиғи патологияларини комплекс даволаш ва профилактика қилиш самарадорлиги	735	Kazakova N.N., Kurambaeva N.Ya. The effectiveness of comprehensive treatment and prevention of oral cavity pathologies in patients with chronic diffuse liver diseases
Ходжиева Д.Т., Яхёев М.С. Диабетик энцефалопатияда когнитив функциялар бузилишининг нейрофизиологик хусусиятлари	740	Khodzhieva D.T., Yakhyoev M.S. Neurophysiological features of cognitive dysfunction in diabetic encephalopathy
Ҳамидова А.И. Инфекцион жараёнларда иммун дисрегуляция ва уни тузатиш усуллари	743	Hamidova A.I. Immune dysregulation in infectious processes and methods for its correction
Серебряков В.В., Очилев А.Э. Аргинин-вазопрессин как нейромодулятор когнитивных функций: рецепторные механизмы, ось ГГН и патофизиология нарушений (систематизированный анализ исследований 2015-2025 гг.)	750	Serebryakov V.V., Ochilov A.E. Arginine-vasopressin as a neuromodulator of cognitive functions: receptor mechanisms, the HPA axis, and pathophysiology of disorders (systematized analysis of studies 2015-2025)
Ҳакимов Ш.Қ., Саноккулов Л.А. Болаларда тирсак бўғими варусли деформацияси, ташиxisлаш ва даволаш муаммолари (адабиётлар шарҳи)	757	Khakimov Sh.K., Sanokulov L.A. Diagnostics and treatment of varus deformity of the elbow joint in children (literature review)
Эшонев О.Ш., Зиёдуллаев М.М. Гипероксиянинг организмга токсик таъсири	763	Eshonov O.Sh., Ziyodullaev M.M. Toxic effect of hyperoxia on the organism
Нарзиев Л.А. Иммуновоспалительные механизмы и эффективность иммунокорригирующей терапии у пациентов с ишемической болезнью сердца на фоне артериальной гипертензии	770	Narziev L.A. Immunoinflammatory mechanisms and the effectiveness of immunocorrective therapy in patients with ischemic heart disease associated with arterial hypertension
Умаров Б.Я., Абдурахмонов И.И. Гиришпруг касаллиги билан оғриган болаларда иммун тизимининг гуморал бўғинини баҳолаш	774	Umarov B.Y., Abduraxmonov I.I. Assessment of the humoral component of the immune system in children with Hirschsprung's disease
Давлатов С.С., Хамидов О.А., Наврузов Р.Р., Умаркулов З.З. Дифференцированный подход к хирургическому лечению эхинококкоза печени с применением миниинвазивных эндовидеохирургических и навигационно-пункционных методов	779	Davlatov S.S., Khamidov O.A., Navruzov R.R., Umarkulov Z.Z. A differentiated approach to the surgical treatment of liver echinococcosis using minimally invasive endovideosurgical and navigation-punction methods
Юсупова Д.А. Ҳомиладор аёлларда CHEK2 ва MTRR генларининг аллел вариантларининг трофобластик касаллик келиб чиқишидаги аҳамияти	783	Yusupova D.A. The significance of allelic variants of the CHEK2 and MTRR genes in the development of trophoblastic disease in pregnant women
Ахмедова М.М. Факторы риска и профилактика рецидивирующих респираторных инфекций у детей	788	Axmedova M.M. Risk factors and prevention of recurrent respiratory infections in children

Абдуллаев Д.М. Диагностическое значение дерматоскопии при воспалительных и опухолевых заболеваниях кожи	794	Abdullayev D.M. Diagnostic significance of dermatoscopy for inflammatory and tumor diseases of the skin
Нуралиева Р.М. Применение блокаторов кальциевых каналов при гипертрофической кардиомиопатии	799	Nuralieva R.M. Use of calcium channel blockers in hypertrophic cardiomyopathy
Якубова Н.Н., Алиев Н.Х. Кекса ва қари ёшдаги беморларда қисман олинадиган протезлардан фойдаланишда аралаш сўлак хусусиятлари ва оғиз бўйлиги микрофлорасининг ўзгариш динамикаси	802	Yakubova N.N., Aliyev N.Kh. Dynamics of changes in mixed saliva properties and oral microflora in elderly patients using removable partial dentures
Идиев Г.Э., Бабаева Н.М. Оғиз бўйлиги шиллиқ қавати лейкоплакиясини даволаш ва профилактикасини такомиллаштиришда комплекс терапиянинг клиник, иммунологик ва морфологик самарадорлиги	806	Idiev G.E., Babayeva N.M. Clinical, immunological, and morphological effectiveness of complex therapy in improving the treatment and prevention of oral mucosa leukoplakia
Хасанова Д.А. Ҳомиладор аёлларда қалқонсимон без дисфункцияси ва семизлик фонида гестацион асоратлар ривожланишининг клиник-метаболик хусусиятлари	810	Khasanova D.A. Clinical and metabolic characteristics of gestational complications in pregnant women with thyroid dysfunction and obesity
Давлатов С.С., Хамидов О.А., Наврузов Р.Р., Умаркулов З.З. Двухэтапная хирургическая стратегия и химиотерапия с гепатопротекторами при осложнённых формах эхинококкоза печени: эффективность и рецидивы	815	Davlatov S.S., Khamidov O.A., Navruzov R.R., Umarkulov Z.Z. A two-stage surgical strategy and chemotherapy with hepatoprotectives for complicated forms of liver echinococcosis: effectiveness and recurrence
Абдулсаидов С.К., Хурсанов Ё.Э., Тухтаев Ж.К., Холмирзаев О.М. Совершенствование малоинвазивных хирургических технологий при тяжёлом остром панкреатите	818	Abdulsaidov S.K., Khursanov E.E., Tukhtaev J.K., Kholmiraev O.M. Optimization of the use of minimally invasive surgical technologies in severe acute pancreatitis
Хакназарова М.Н., Рузибоев С.А., Мансуров Т.Т. Оптимизация хирургической тактики при глубоких ожогах на основе клинико-инструментальной оценки	826	Khaknazarova M.N., Ruziboev S.A., Mansurov T.T. Optimization of surgical tactics for deep burns based on clinical and instrumental assessment
Хурсанов Ё.Э., Мавлонов А.Х., Хидиров М.С., Мирзабоев А.М., Караев М.Н. Гастродуоденал қон кетишларда клинко-прогностик баҳолаш асосида жарроҳлик тактикасини оптималлаштириш	830	Khursanov E.E., Mavlonov A.Kh., Khidirov M.S., Mirzaboev A.M., Karaev M.N. Optimization of surgical tactics in gastroduodenal bleeding based on clinical and prognostic assessment
Назаров Ж.А., Толибов М.М. Дифференциальная диагностика псориаза и экзематозных дерматозов	837	Nazarov J.A., Tolibov M.M. Differential diagnosis of psoriasis and exematous dermatosis
Абдуллаев Д.М. Клинико-эпидемиологические особенности грибковых заболеваний кожи в современных условиях	842	Abdullayev D.M. Clinical and epidemiological features of fungal diseases of the skin in modern conditions
Хусанова Д.А., Сафарова Н.И., Юнусов Ф.А., Рузиев Ж.Б., Хонкелдиев У.Э. Влияние иммуномодуляторов на динамику клинико-биохимических показателей у больных с острым риносинуситом	848	Xusanova D.A., Safarova N.I., Yunusov F.A., Ruziev J.B., Xonkeldiev U.E. Influence of immunomodulators on the dynamics of clinical and biochemical indicators in patients with acute rhinosinusitis
Рашидов Р.А. Клинико-технологическая оценка цифровых и аналоговых методов изготовления полных съёмных протезов	851	Rashidov R.A. Clinical and technological assessment of digital and analog methods for manufacturing full removable prostheses

Хакназарова М.Н., Рузибоев С.А., Мансуров Т.Т. Чуқур куйишларда жарроҳлик тактикасини оптималлаштириш: клиник-инструментал ёндашув	857	Khaknazarova M.N., Ruziboev S.A., Mansurov T.T. Optimization of surgical tactics for deep burns: clinical and instrumental approach
Абдулсаидов С.К., Хурсанов Ё.Э., Тухтаев Ж.К. Дифференцированный подход к использованию малоинвазивных технологий при тяжёлом остром панкреатите	862	Abdulsaidov S.K., Khursanov E.E., Tukhtaev J.K. Minimally invasive technologies in the treatment of severe forms of acute pancreatitis
Наврузов Р.Р. Роль контрастной МРТ в выявлении и оценке метастазов из злокачественных новообразова- ний головного мозга	867	Navruzov R.R. The role of contrast-enhanced MRI in the detection and evaluation of brain metastases from malignant tumors
Ахмедова М.М. Клинико-лабораторная характеристика пнев- монии у детей в зависимости от возраста	871	Axmedova M.M. Clinical and laboratory characteristics of pneumo- nia in children depending on age
Бузрукзода Ж.Д., Абдуллоев Р.Р., Субхонкулов М.С. Хирургик стоматологияда замонавий диагно- стика усулларининг роли ва аҳамияти	876	Buzrukzoda J.D., Abdulloyev R.R., Subxonkulov M.S. The role and importance of modern diagnostic methods in surgical dentistry
Курбаниязов З.Б., Хурсанов Ё.Э., Рузибоев Ш.Ж., Мансуров Т.Т., Эргашев А.Ф. Гастродуоденал яра қон кетишлари рецидивини эрта башиорат қилишда хавф омиллари ва диа- гностик ёндашувларни оптималлаштириш	881	Kurbaniyazov Z.B., Khursanov E.E., Ruziboev Sh.Zh., Mansurov T.T., Ergashev A.F. Optimization of risk factors and diagnostic symp- toms for early prediction of recurrence of gastro- duodenal ulcerative lesions
Наврузов Р.Р. Сравнительный морфометрический анализ структур головного мозга в норме и при объём- ных образованиях	886	Navruzov R.R. Current aspects of morphological study of the in- tervertebral discs of various divisions of the verte- brum during hernias in young patients
Азимов У.М., Наврузов Р.Р. Изменения морфологии межпозвоночных дисков при формировании грыж у лиц молодого воз- раста по данным радиологических методов	890	Azimov U.M., Navruzov R.R. Changes in the morphology of intervertebral discs during the formation of hernias in young people according to radiological methods
Болтаев Э.Х., Расулов Х.А. Гипотиреоз чақирилган хомиладорликдан туғилган авлодда гиподинамия шароитида (30 кунлик) умуртқалараро дискларнинг морфо- метрик ўзгаришлари	894	Boltayev E.Kh., Rasulov Kh.A. Morphometric changes in the intervertebral discs of offspring born from pregnancy induced by hypo- thyroidism under conditions of hypokinesia (30-day period)
Усманов Б.Б., Маткулиев У.И. Копростазни жарроҳлик даволашда лапароско- пик усулнинг натижалари	898	Usmanov B.B., Matkuliev U.I. The results of the laparoscopic method in the sur- gical treatment of coprostasis
Ражабова Н.Б., Яриев А.А. Изменения функциональных показателей почек при экспериментальном парацетамол-индуци- рованном токсическом гепатите в условиях дегидратации	902	Rajabova N.B., Yariev A.A. Changes in renal functional parameters in experi- mental paracetamol induced toxic hepatitis under dehydration conditions
Облокулов А.А. Нарушения нутритивного и микроэлементного статуса при циррозе печени: современные представления и клинические последствия	907	Oblokulov A.A. Impairments in nutritional and trace element status in liver cirrhosis: current perspectives and clinical implications
Азимов У.М., Наврузов Р.Р. Морфологические аспекты изучения межпо- звоноковых дисков различных отделов позвоноч- ного столба при грыжах у молодых пациентов	910	Azimov U.M., Navruzov R.R. Current aspects of morphological study of the in- tervertebral discs of various divisions of the verte- brum during hernias in young patients
Жўрабекова А.Т., Исмати З.О. Безовта оёқлар синдромининг мия қон айлани- шининг сурункали бузилиши билан ўзаро боғлиқлигининг клиник-нейрофизиологик кўрсаткичлари	915	Jurabekova A.T., Ismati Z.O. Clinical and neurophysiological parameters of the relationship between restless legs syndrome and chronic migral blood circulation disorder

Эргашев В.А., Муратов Н.Ф. Ҳомиладор ва эмизикли аёлларнинг қон зардобидидаги иммуноглобулинларнинг миқдорий кўрсаткичларининг хусусиятлари	921	Ergashev V.A., Muratov N.F. Characteristics of quantitative indicators of immunoglobulins in the blood serum of pregnant and lactating women
Орзукулов А.О., Ибрахимова Х.Р. Возрастные изменения иммунологических показателей у больных тениаринхозом	925	Orzukulov A.O., Ibrakhimova H.R. Age-related changes in immunological parameters in patients with taeniasis
Сафарова С.Р., Яриев А.А. Влияние дегидратации на показатели системы гемостаза при парацетамол-индуцированном токсическом гепатите в эксперименте	928	Safarova S.R., Yariev A.A. Effect of dehydration on hemostasis parameters in paracetamol induced toxic hepatitis: an experimental study
Азимов У.М., Наврузов Р.Р. Роль МРТ при оценке морфологической структуры межпозвоночного диска при грыжах у молодых пациентов	933	Azimov U.M., Navruzov R.R. The role of MRI in assessing the morphological structure of the intervertebral disc herniation in young patients
Камалова Д.Д. Аутоиммун тиреоидити бор ҳомиладор аёлларда муддатдан олдинги туғруқ хавфини баҳолаш: клиник-лаборатор тадқиқот	936	Kamalova D.D. Assessment of preterm birth risk in pregnant women with autoimmune thyroiditis: a clinical-laboratory study
Уроков Ш.Т., Абидов Ў.Ў., Ҳамроев Б.С. Гастродуоденал қон кетишларда комплекс даво тактикаси: эрта диагностика ва персонификациялашган ёндашув аҳамияти	941	Urokov Sh.T., Abidov U.U., Khamroev B.S. Comprehensive treatment tactics for gastroduodenal bleeding: the importance of early diagnosis and a personalized approach
Бойкобилова М.Ю., Хайдарова Г.Б., Таирова М.И., Хайитбаева М.Р., Ибраимов К.Ш. Диагностическая значимость мультиспиральной компьютерной томографии, ультразвукового исследования и эластографии при диффузных изменениях печени	947	Boykobilova M.Y., Khaydarova G.B., Tairova M.I., Khayitbaeva M.R., Ibraimov K.Sh. Diagnostic significance of multislice computed tomography, ultrasonography, and elastography in diffuse liver changes
Ахтамов А., Раджабов А.Б. Морфометрические изменения поджелудочной железы белых беспородных крыс репродуктивного возраста при экспериментальной никотино-алкогольной интоксикации и пути коррекции	952	Akhtamov A., Radjabov A.B. Morphometric changes and corrective ways of pancreas of white breed rats of reproductive age in experimental nicotine-alcohol intoxication
Камалова Д.Д. Аутоиммун тиреоидити бор аёлларда муддатдан олдинги туғруқни текишириш ва мониторинг тамойиллари	957	Kamalova D.D. Principles of screening and monitoring for preterm birth in women with autoimmune thyroiditis
Бекмуродова М.С. Ҳомиладорларда артериал гипертония профилактикаси ва уни назорат қилиш стратегиялари	961	Bekmuradova M.S. Strategies for prevention and control of arterial hypertension in pregnant women
Ким В.Э. Эндодонтик даволанган тишларни реставрация қилишдаги ёндашувлар: тузилмавий ва клиник жиҳатлар	965	Kim V.E. Restorative considerations for endodontically treated teeth: structural and clinical aspects
Шарипова В.Х., Ашуров Т.Х. Патогенетическое значение ингибирования ЦОГ-2 в коррекции нейровоспаления и отёка мозга при черепно-мозговой травме	971	Sharipova V.Kh., Ashurov T.Kh. Pathogenetic role of COX-2 inhibition in the correction of neuroinflammation and cerebral edema in traumatic brain injury
Нажметдинова Д.Ф., Негматуллаева М.Н. Ранняя диагностика преэклампсии у беременных с артериальной гипертензией на основе ангиогенных маркеров	977	Nazhmetdinova D.F., Negmatullaeva M.N. The role of angiogenic growth factors in predicting preeclampsia in pregnant women with arterial hypertension
Бекмуродова М.С., Ярматов С.Т. Жигар циррози билан оғриган беморларда протон насоси ингибиторларининг таъсири	984	Bekmuradova M.S., Yarmatov S.T. Influence of proton pump inhibitors in patients with liver cirrhosis

Бахронов С.Т., Давлатов С.С., Худойбердиев Д.К., Баймурадов Р.Р. <i>Кимётератия фонда ривожланган буйрак этишмовчилигида ингичка ичакнинг умумий морфологик ўзгаришлари</i>	988	Bakhronov S.T., Davlatov S.S., Khudoyberdiyev D.K., Baymuradov R.R. <i>General morphological changes of the small intestine in renal failure developed against the background of chemotherapy</i>
Облокулов А.Р., Ибраимова Х.Р. <i>Сурункали вирусли гепатит билан оғриган беморларда психик ва невроз ҳолатларининг клиник-эпидемиологик хусусиятлари</i>	994	Oblokulov A.R., Ibraximova H.R. <i>Clinical and epidemiological features of mental and neurotic conditions in patients with chronic viral hepatitis B and C</i>
Орипов Ф.С., Тогаева Г.С. <i>Экспериментал гипертиреоз чақирилган каламуш авлодларининг илк кунлигида ошқозон ости бези морфологик, морфометрик солиштирма тахлили</i>	997	Oripov F.S., Togayeva G.S. <i>Comparative morphological and morphometric analysis of the pancreas in one-day-old offspring of rats with experimentally induced hyperthyroidism</i>
Акилов Х.А., Исламов М.Т., Мардонов Ж.Н. <i>Организационно-управленческая модель обеспечения качества и безопасности медицинской помощи в частных многопрофильных клиниках Республики Узбекистан</i>	1000	Akilov Kh.A., Islamov M.T., Mardonov J.N. <i>Organizational and management model for ensuring the quality and safety of medical care in private multidisciplinary clinics of the Republic of Uzbekistan</i>
Аладова Л.Ю., Раимкулова Д.Ф., Бегматов Б.Х., Шукуров Б.В. <i>Клинический случай острого вирусного гепатита С у ребёнка первого полугодия жизни</i>	1009	Aladova L.Yu., Raimkulova D.F., Begmatov B.Kh., Shukurov B.V. <i>A clinical case of acute viral hepatitis C in a child in the first half of life</i>
Бекмурадова М.С., Хайдаров С.Н. <i>Иммунные биомаркеры и цитокиновые сети как предикторы прогрессирования хронической сердечной недостаточности</i>	1012	Bekmuradova M.S., Khaydarov S.N. <i>Immune biomarkers and cytokine networks as predictors of the progression of chronic heart failure</i>
Мирзажонова Д.Б., Ниязова Т.А., Эрнazarov X.X. <i>Роль иммуногенетических исследований в изучении патогенеза бруцеллеза (обзор литературы)</i>	1017	Mirzajonova D.B., Niyazova T.A., Ernazarov X.X. <i>The role of immunogenetic research in the study of the pathogenesis of brucellosis (literature review)</i>
Мирзажонова Д.Б., Чўлиева Н.Ф., Махаммаджонов И.А., Акбаров Н.Ш. <i>Сурункали вирусли гепатит В беморларда қизамиқнинг клиник кечиши: тизимли шарҳ</i>	1022	Mirzajonova D.B., Chulieva N.F., Makhammadjonov I.A., Akbarov N.Sh. <i>Clinical course of measles in patients with chronic hepatitis B: a systematic review</i>